

濟生拔粹方

三

潔古老人珍珠囊卷第五

防風 甘

純陽太陽經本藥 身去上風 稍去下風與

乾姜 藜蘆 白斂 羌花相反

貫芎 辛

純陽少陽本藥治 頭痛 頸痛

細辛 辛

純陽主少陰苦頭痛

白芷 辛

純陽陽明經本藥去遠治 正陽陽明頭痛

黃芩 苦

陰中微陽酒炒上頸主上部積血

東垣曰泄肺火而解肌 熱肺苦氣急食苦以泄之

甘草 生甘平 炙甘溫

純陽補血養胃 稍去腎經之痛與 遠志

大戟 羌花 甘遂 海藻相反

當歸

陽中微陰 頭破血 身行血 尾止血

治上酒浸 治外酒洗 糖色大辛可能潰堅與

蒲黃 海藻相反

連翹 苦平

陰中微陽諸客熱非此不能除

又治手足少陽瘡癩癰腫

黃連 苦

純陰瀉心火心下痞酒炒酒浸上頸已上與

羌花 菊花 僵蚕 欵花相反

蒼朮 甘辛

陽中微陰諸腫濕非此不能除

足陽明太陰能建胃安脾

羌活 甘苦

純陽太陽經頭痛去諸骨節疼痛非此不能除亦

能溫膽太陽風藥也

白朮 溫甘

陽中微陰脾胃苦溫急食苦以燥之 又利腰膝間

血與蒼朮同用 海云蒼白有止發之異

陰中微陽涼血補不足血治頸已上酒浸惡

貝母 蕪荑相反

白朮藥性 陰中之陽 白補赤散 瀉肝補脾胃 酒浸行經 止中

部腹痛與 石斛 硝石相反

人參 甘苦 陽中微陰 養血補胃氣 瀉心火 喘嗽勿用之 短氣

用之與 藜芦相反

柴胡 苦 陰中之陽 去往來寒熱 膽痺非柴胡 稍子不能除

與皂莢 藜芦相反 少陽厥陰行經藥也

黃耆 甘 純陽益胃氣 去肌熱 止自汗 諸痛用之與

鱉甲相反

葛根 甘 純陽止渴 升陽解酒毒 陽明經之本藥也

澤瀉 鹹 陰中微陽 滲泄止渴 泄伏水

升麻 甘苦 陽中微陰 主脾胃解肌肉間熱 脾痺非升麻 稍不

能除手足陽明傷風引用之的藥也

半夏 苦辛 陰中之陽 除痰涎 膏中寒痰 治太陽痰厥 頭痛與

烏羊血 鱉甲 皂莢 雄黃相反

桔梗 辛苦 陽中之陰 療咽喉痛 利肺氣 治鼻塞 為舟楫之劑

與草龍膽相反

蔓荊子 苦 陰中之陽 涼諸經血 止頭痛 主目睛內痛 與

石膏相反

枳殼 苦酸 陰中微陽 破氣泄肺中不利之氣

枳實 苦酸 純陰去胃中濕熱 消心下痞痞

厚朴 苦 陰中之陽 去腹脹厚腸胃

梔子 苦 純陰去心懊 煩燥

橘皮 苦辛 陰中之陽 利胸氣 有甘則補 無則瀉 脾枯人治

五味子酸陰中微陽治嗽補真氣與 威靈 烏頭相反

知母苦陰中微陽涼腎經本藥上頸行經皆酒炒

乾姜辛純陽經曰寒淫所盛以辛散之見火後稍苦故止而不走也

麻黃苦甘陰中之陽泄衛中實去榮中寒發太陽少陰之汗入手大陰

藁本辛苦陽中微陰太陽經本藥治巔頂痛腦齒痛與青箱子相反

地榆苦甘酸陽中微陰治下部有血與 麥門冬相反
大黃苦純陰熱淫所盛以苦泄之 酒浸入太陽經 酒

獨活甘苦陰中之陽頭眩目運非此不能除足少陰行經藥

吳茱萸辛陽中微陰温中下氣腹痛温胃與 丹參 硝石 五石英相反

郁里仁苦陰中之陽破血潤燥
豉苦鹹純陰去心中懊懣傷寒頭痛煩躁

黃蘗苦辛陰中之陽治腎水膀胱不足諸痿厥腰膝無力
防尾辛苦陽中之陰泄湿氣與 細辛相反

川烏頭辛純陽去寒湿風痺血痺行經與 半夏 瓜蒌相反 与附子同

瞿麥辛陽中微陰利小便為君
黍粘子辛純陽潤肺散氣主風毒腫利咽膈

白豆蔻辛純陽散肺中滯氣主積冷氣止吐逆反胃消穀進

麥門冬 陽中微陰治肺中伏火生脉保神強陰益精與苦參相反

茯苓 甘淡 純陽溼泄止渴伐腎邪小便多則能止之澀則能利之白入辛壬癸赤入丙與白斂 地榆相反

熟地黄 甘 陰中微陽大補血虛不足通血脉益氣力忌蘿蔔 阿膠 甘 純陽補肺補虛安胎止痢

蘇木 甘鹹 陽中之陰破死血及血脹欲死 猪苓 甘苦 陽中之陰溼泄止渴 又治淋腫

肉桂 甘辛 純陽太陽經本藥去衛中風邪秋冬下部腹痛非桂不能除 湯液發汗用桂枝補腎用肉桂 忌生葱

草龍膽 苦 純陰瀉肝熱止眼睛疼 酒浸上行

木香 辛 純陽和胃氣 療中下焦氣結滯刺痛須用檳榔為使

石膏 辛甘 陰中之陽止陽明頭痛止消渴中暑潮熱 甘遂 甘 純陽水結背脊中非此不能除與甘草相反

天南星 苦 與半夏同 金鈴子 苦酸 陰中之陽心暴痛非此不能除

神麴 辛 純陽益胃氣 紅藍花 苦 陰中微陽入心養血 又治血運惡血不盡絞痛

地骨皮 苦 純陰涼骨熱酒浸解骨蒸非此不能除 瓜蒌根 苦 純陰心中枯渴非此不能除與乾姜牛膝相反

秦艽 苦 陰中微陽去陽明經風濕痺仍治口瘡毒 通草 甘 純陽瀉肺利小便通陰竅濕

牡丹皮苦陰中微陽涼骨蒸 又治腸胃積血衄血吐血手

厥陰足少陰治無汗骨蒸也 地骨皮手少陽足

少陰治有汗骨蒸也

琥珀甘純陽利小便清肺 又消痰血 安魂魄

薑黃辛

牡蠣鹹 更疔積 又治帶下 溫瘧瘡腫為更堅收濕之劑

梧桐淚鹹 治瘰癧非此不能除

草薺寇辛 純陽益脾胃去寒 又治客寒心胃痛

巴豆辛 純陽去胃中濕破癥瘕結聚 斬關奪門之將不

可輕用

茯神甘 純陽療風眩心虛非此不能除

蜀葵花 陰中微陽治帶下 赤治赤 白治白

珍珠清毒

檳榔辛 純陽破氣滯泄胃中至高之氣

苦參苦 純陰氣沉去濕與 兔絲子相反

藿香甘 純陽微陰補衛氣益胃氣進飲食又治吐逆霍亂

青皮鹹 陰中之陽主氣滯破積結少陽經下藥也 陳皮

治高 青皮治低

甘菊花苦 純陽養目血

茵陳蒿苦 陰中微陽治傷寒散黃

丁香辛 純陽去胃中之實 又治腎氣奔豚痛

大棗甘 純陽溫胃

天門冬甘 陰中之陰保肺氣治血熱侵肺上喘氣促

生薑辛 純陽益脾胃散風寒

黃芩苦 陰中微陽涼心

黃連苦 陰中微陽涼心

第一發 出陰中之陽破氣瀉真氣主老癖癥瘕氣結塊血脉
不調氣虛者不用

高良姜 辛 純陽溫通脾胃

款冬花 甘 純陽溫脾止咳

香附子 甘 陽中之陰快氣

黑附子 辛 純陽治脾中大實腎中寒甚通行諸經與

防風相反

白芨 苦甘 陽中之陰止肺澀 白斂同

蜀膝 辛 純陽破血

射干 苦甘 陽中之陰去胃中癰瘡

葶苈仙 甘 純陽去風去大腸之風通十二經絡

馬兜鈴 苦 陰中微陽利小便主肺熱安肺氣補肺

燈草 甘 純陽利小便

葫蘆芭 苦 純陰治元氣虛冷及腎虛冷

白附子 苦 純陽溫中血痺行藥勢主中風失音 乃行而不

止者也

槐花 苦 純陽涼大腸之熱

槐實 苦 同上

沉香 甘 純陽補腎又能去惡氣調中 東垣曰能養諸氣

上而至天下而及泉與藥為使

檀香 甘 陽中微陰主心腹霍亂中惡引胃氣上升進食

乳香 甘 純陰定經之痛

川練子 甘 純陽入心主上下部腹痛

竹葉 苦 陰中微陽涼心經

山茱萸酸 陰中之陽溫肝又能強陰益精 經云滑則氣脫

滑則可以收之山茱萸之澀以收其滑

蜀椒辛 純陽明目 又溫中止精洩

朱砂苦 純陰涼心熱非此不能除

龍骨甘 純陽固大腸脫

赤石脂酸 陽中之陰固脫 白石脂同

芫花辛 純陽散諸經之風

茜根苦 陰中微陽去諸死血

艾葉苦 陰中之陽溫胃

正不留行苦 陽中之陰妳子導引利瘡瘍主治痢 苦寒以

為君

黃芩去心 黃連去頂 黃蘗去皮 知母去頂

生地黄 但用酒洗過用之以酒熱為因也

甘寒以為佐 黃耆 人參 甘草

大辛以解結為臣結者散之 通翹 當歸去芦 藁本

通經以為使手之三陽手走頭而頭走足 足之三陰足走臍而臍走手

足太陽膀胱經 羌活 藁本

足少陽膽經 柴胡

足陽明胃經 升麻 葛根 白芷

足太陰脾經 芍藥白者補 赤破經

足少陰腎經 獨活 桂

足厥陰肝經 柴胡

手太陽小腸經 羌活 藁本

手少陽三焦經 柴胡

手陽明大腸經

白芷

手太陰肺經

白芷

升麻

加葱白亦能走經

手少陰心經

獨活

手厥陰心包絡

柴胡

辛溫活血去惡血

當歸稍

蘇木

紅花

牡丹皮 專治胃流血凝血

必先歲氣無伐天和

春防風 升麻

夏黃芩

知母

白芍藥

秋澤瀉 茯苓

冬桂

桂枝

補胃實胃進飲食

橘皮

人參

甘草

內實內熱者

黃連

黃蘗

知母

表虛表寒者

黃耆

人參

桂枝內發在外

珍珠膏

氣虛氣弱者 陳皮

黃耆

人參

入脾

氣實氣結者 青皮

厚朴

木香

沉香

血虛者 生地黄

當歸身

血實惡血積聚者

當歸稍

蘇木

紅花

散陰瘡之結聚排膿者

肉桂

入心引血化汗化膿

出瘡毒消瘡腫

黍粘子

用半生半熟解表裏

一名

大力子

牛旁子

瘡出膿已上須用防風上節

羌活

桔梗

此一味為舟楫使諸藥不能下沉

瘡出身中已下須用酒水中半盞

瘡堅而不潰者

昆布

王芫根

廣茂

京三稜

瘡痛甚者加用

黃芩

黃連

黃蘗

知母

十二經中但有瘡皆血結氣聚必用 連翹

瘡發而渴者加 葛根

瘡出而嘔吐者 半夏 薑膏

瘡出而渴悶者 黃連

瘡出而飲水者 澤瀉 茯苓

瘡出而大便不通者 煨大黃

大便結燥而難得者 桃仁 麻子仁 郁里仁

上焦有瘡者須用 黃芩 酒洗

中焦有瘡須用 黃連 酒洗

下焦有瘡須用 黃蘗 知母 防己 俱酒洗

先有燥熱而病瘡者蓋胃火受邪當補腎水之不足

黃蘗 知母

因酒過多瘡出者當除膀胱留熱用 澤瀉 防尾

瀉腎火補下焦元氣 生甘草稍子

補三焦元氣調和諸藥共力成功者 炙甘草

馬刀挾瘦須用 昆布 王瓜根 草龍膽

馬刀未破而堅者須用 廣茂 京二稜

地之濕氣濕寒傷之外鬱壅經絡不行外有大寒濕之邪而內

必生大熱當以辛溫之藥及行本經藥通其皮毛壅滯內則

苦寒之劑瀉其當氣之不從是其治也

病在上為天

製度宜炒酒洗 煎藥宜武宜清 服之宜緩飲

病在下為地 煎藥宜文宜濃 服之宜急飲

去咽嗝近者奇之 遠者偶之 汗不可奇 下不可偶

補上治上以緩緩者氣味薄能透其表劑小服而頻食後使氣

味能遠去表去上故曰治肺者九蓋欲少而頻者也

肺 氣 石膏 辛 血 黃芩 苦

腎 氣 知母 血 黃蘗

地骨皮 瀉腎火 摠治熱在外 地為陰骨為裏皮為表

牡丹皮 治包火 無汗而骨蒸 四物內加上二味治婦

人骨蒸

知母 瀉腎火 有汗而骨蒸

潔古老人珍珠囊 甲

Multiple vertical columns of faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '血', '氣', '火', '汗', '骨', '蒸', '地', '骨', '皮', '丹', '皮', '牡', '丹', '皮', '人', '骨', '蒸', '知', '母', '瀉', '腎', '火', '有', '汗', '而', '骨', '蒸'.

醫學發明藥目錄

吳茱萸丸 氣不交通

消痞丸 心下痞

本草十劑

乳香神應散 止痛

紫金丹 接骨

調中順氣丸 痞滿

木香順氣湯 腹脹

加減瀉白散 喘嗽

三奇湯 痰嗽

失砂安神丸 鎮固

人參益肺散 氣鬱

單豆蔻丸 心痛

丁香練實丸 癩疔

茴香練實丸 疝

托裏榮衛湯 瘡

續隨子丸 虛腫

木香搗氣丸 腹脹

導滯通經湯 脾濕

薑附湯 寒厥

十全大補湯 補弱

中滿分消湯 寒脹

加減二陳湯 吐

參蘇溫肺湯 寒嗽

黃耆補中湯

傷元活血湯 墜墮

當歸導滯散 隊馬

聖靈丹 止痛

沉香導氣丸 痞痛

沉香交泰丸 腹脹

神秘湯 喘嗽

補中益氣湯 勞倦

用藥加減法

通氣防風湯 太陽氣鬱

白木附子湯 寒中

天台烏藥散 疝

川練子散 疝

沉香海金沙丸 腹腫

海金沙散 脾濕

廣茂潰堅湯 積

赤茯苓丸 脾濕

沉香桂附丸

中滿分消丸 熱脹

養香安胃散 嘔吐

人參平肺散 肺痿

滋腎丸 熱閉不渴



清肝飲子 渴小更閉

不憂丹 補

補益腎肝丸 因多

水芝丸 補

地黄丸 腎虛

三才封髓丹 益腎水

离珠丹 虛冷

天真丹 下焦虛

八味丸 腎氣虛

通幽湯 幽門不涌

潤腸湯 燥結

當歸拈痛湯 脚氣疼

羌活導滯湯 脚氣

開結導飲丸 痞悶

除濕丹 濕腫

除風湯 淋瀝

枳實大黃湯 脚腫

小續命湯 中風

疎風湯 中風

三化湯 治風燥

大羌活愈風湯 風

大秦朮湯 中風

半夏溫肺湯 痰冷嗽

丁香半夏丸 停飲

紫蘇飲子 脾寒

巴戟丸 腎虛

双和散 補血氣

附子溫中丸 溫胃

五邪相干

醫學發明藥目錄

高咽不通并四時換氣用藥法

黃帝絨經云胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩脇高咽不通
通食飲不下取三里六咽者噉物之門戶也高者上焦胃中心
肺之分野不通者升降之氣上不得交又云清氣在下則生殮
泫泫黃如糜米穀不化者是也濁氣在上則生腫脹腹中脹滿
不得大便或大便難或先結後溏皆是也濁氣在上當降而不
降者乃腎肝吸入之陰氣不得下而反在上也胃氣逆上或為
嘔或為吐或為噦者是陰火之邪上衝而吸入之氣不得入故
食不下也此皆氣衝之火逆胃之脈反上而作者也清氣在下
則生殮泫者胃氣未病之日當上行心肺而經營也因飲食失
節勞役形體心火乘於土位胃氣弱而下陷於陰中故米穀入
而不得升反降而為殮泫也膈咽之間交通之氣不得表裏者
皆衝脈上行逆氣所作也蓋胃病者上支兩脇膈咽不通飲食
不下取三里者是也絨經云清濁相干亂於胃中是為大恍惚
者惑也氣不交通最為急證不急去之諸變生矣聖人治此有
要法陽氣不足陰氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升
發在陽分而後瀉陰也春夏之月陽氣在經當益其經脈去其
血絡秋冬陽氣降伏當先治其藏府若有噎有寒寒者五藏之
所生陰也血也噎者六府之所生陽也氣也二者皆由陰中伏
陽而作也今立四氣用藥并治法于后

冬三月陰氣在外陽氣內藏當外助陽氣不得發汗內消陰火
勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛夏乃水旺之時水旺則金
旺子能令母實肺者腎之母皮毛之陽元本虛弱更以夏月助

其令故病者善嚏鼻流涕寒甚七瀉涕嚏不止比常人大惡
風寒小便數而大便或上或下便色清而多大便不調夜寒無寐
甚則為痰咳為嘔為噦為吐為唾白沫以至口開目瞪氣不交
通欲絕者**集靈丹**主之

吳茱萸 草豆蔻仁 各一分 橘皮 益智仁

人參 黃耆 升麻各八分 澤瀉 白殭蚕

姜黃 柴胡 各四分 當歸身 炙甘草 各陸分

木香 三分 青皮 三分 大麥蘖 壹分伍分 半夏 壹分

右件為細末湯浸蒸餅為丸如菴豆大細嚼三十九白湯送下
無時夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病而值此時是天
助正氣而挫其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋陰
氣極盛正氣不能伸故耳且如南咽不通咽中如梗甚者前證

作治法當從時利膈丸泄肺火以黃耆補中湯送下如兩足
痿厥行步怔忡然欲倒臂膊如折及作痛而無力或氣短氣
促而喘或不足以息以黃耆人參甘草白木蒼朮澤瀉猪苓茯苓
苓橘皮等作湯送下滋腎丸一百五十九六七月之間濕熱之
令大行氣短不能言者加五味子麥門冬如心下痞膨悶食不
下以上件白木蒼朮等湯送下消痞丸五七十九更當審而用
之

利膈丸 主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香 七分 檳榔 半 厚朴 姜製 人參 藿香葉

當歸 炙甘草 枳實 麸炒各一兩 大黃 酒洗

右為細末滴水和丸或少用蒸餅亦可如桐子大每服二十五
十九食後諸飲下

治一切心下痞悶及積年久不愈者

黃連去須揀淨

黃芩剉黃色

姜黃

白朮各壹兩

人參肆分

炙甘草壹分

縮砂仁叁分

枳實

熱炒黃色伍分

橘皮肆分

乾生姜貳分

半夏湯洗柒

麴肆分

炒黃色貳分

一方加澤瀉厚朴

各壹分

猪苓

貳分半

右為極細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五七十九至百丸白湯送下食後

黃耆補中湯

黃耆壹分

人參捌分

白朮

蒼朮

橘皮各伍

澤瀉

猪苓

茯苓

各叁分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓大溫送下上件丸藥

本草十劑

宣可以去壅姜橘之屬是也此大略言之蓋外感六淫之邪欲傳入裏二陰尚實而不受逆邪氣于膏中窒塞不通而或噦或嘔所謂壅也仲景云嘔多雖有陽明證不可攻之况乾噦者乎二陰者脾也故單用生姜宜散必愈若嘔者有聲而有物邪在

胃系未深入胃中以生姜橘皮治之或以藿香香半夏亦此之類投之必愈此天分氣分虛無處一無所受今乃窒塞仲景謂藹之上屬上焦悉屬於表或有形質之物因而越之則可若氣壅則不可越之者吐也亦無下之理破氣藥也辛瀉氣若陰

虛穢氣逆上窒塞嘔噦不足之病此地道不通也止當用生地黃當歸桃仁紅花之類和血涼血潤血兼用甘草以補其氣微加大黃芒硝以通其閉大便利邪氣去則氣逆嘔噦自不見矣

之上穀皆為胃中虛熱穀氣久積而為嘔噦者但得五穀之陰以和

兒班後餘熱不退加不收斂大便不行是謂血燥則當以陰藥
治血因而補之用清涼飲子通利大便而瀉其熱也索古云涼
風至而草木實夫清涼飲子乃秋風微熱之劑傷寒家邪入於
裏日晡潮熱以酒引飲譫語燥狂不大便是謂胃實乃可攻之
夫胃氣為濕熱所傷以承氣湯瀉其土實元氣乃得周流承氣
之名於此見矣今哀世人以苦瀉火故備陳之除熱瀉火非甘
寒不可以苦寒瀉火非徒無益而反害之故諄諄及此至如孫
真人言生姜嘔家之聖藥謂上焦氣壅表實而言之非以瀉氣
而言之也

若脾胃虛弱穀氣不行榮衛下流清氣不上膏中閉塞惟益胃

推陽穀氣而已不宜瀉也若妄以瀉氣瀉血藥下之則轉
增閉塞疼痛或變作結習復下其毒由此致危者多矣鍼經說
呵欠噦噦振寒噦噦譫涕淚出太息涎下耳中鳴自齧舌頰唇
視生病者補之此十二邪者皆奇邪之走空竅者也凡邪之所
在皆為不足宜補而不宜瀉空竅者胃之清氣能通也胃既虛
則穀氣不上行是氣路不利經云廉泉玉英者津液之道路也
津液不上膏中氣路不開亦令人噦勿作外實以辛藥生姜之
類瀉其壅滯蓋肺氣已虛而反瀉之是重瀉其氣必膏中如刀
剗之痛與正結膏無異亦聲聞于外用藥之際可不慎哉
通可以去滯通草防己之屬是也防己大苦寒能瀉血中大熱
之滯也亦能瀉大便與大黃氣味同者皆可瀉血滯豈止防己
而已通草甘淡能助西方秋氣下降利小便專瀉氣滯也小便

燥化若熱絕津液之流於肺經源絕則寒水斷流故膀胱受濕
執津液癸閉約縮小便不通宜以此化之其脈右寸洪緩而數
左尺亦然其證胸中煩熱口燥舌乾咽嗌亦乾大渴引飲小便
淋瀝或閉塞不通脛膝脚熱此通草主之凡與通草同者茯苓
澤瀉燈草猪苓琥珀瞿麥車前子之類皆可以滲泄利其滯也
此雖泄氣滯小便不利於肺中有所未盡亦予昔寓長安有王
善夫病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石雍塞之極脚腿堅
脹破裂出黃水双睛凸出晝夜不得眠飲食不下痛苦不可名
狀其親戚輩求治病人始病不渴近添嘔噦所服治中滿利小
便之藥甚多細思素問云無陽者陰無以生無陰者陽無以化
膀胱之液之府氣化乃能出矣此病小便癃閉是無陰陽氣不
化者也凡利小便之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥謂崇西方

燥金之化自天降地是陽中之陰非北方寒水陰中之陰所化
者也此蓋奉養太過膏邊積熱損北方之陰腎水不足膀胱腎
之室久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦非膈上所生也
獨為關非膈病也素古曰熱在下焦填塞不便是治關格之法
少病者內關外格之證悉具死在旦夕但治下焦乃可愈遂處
以稟北方之寒水所化大苦寒氣味者

黃蘗

知母各等分酒洗之以肉桂為之引用所謂冬

丙執用者也同為極細末煎熟水為丸如桐子大焙乾空腹令
以沸湯下一二百丸少時來報藥之須臾如刀刺前陰火燒之痛
如瀑泉湧出卽具尺濕絳下成流顧盼之間腫脹消散故因
之或曰乃之性苦何曰切已大苦矣能泄血中之濕熱通
滯中之滯氣陰陽動秋之瀉春夏藥也此之於人則陰而

地此稟賦之秉聖人有所存而不廢耳大抵聞其真則可思下
咽則令人心為之煩亂飲食為之減少至於十一經有濕熱
壅塞不通及治下疔脚氣除膀胱積熱而庇其基本非此藥不
可真行經之仙藥無可代之者復有不可用者數事若遇飲食
勞倦陰虛生內熱元氣穀氣已虧之病以防已泄大便則重亡
其血此不可用一也如人大渴引飲是熱在上焦肺經氣分宜
淡滲之此不可用二也若人久病津液不行上焦虛渴宜補以
人參葛根之甘溫用苦寒之劑則速危此不可用三也若下焦
有濕熱流入十二經致一陰不通然後可審而用之耳
補可以去弱人參羊肉之屬是也夫人參之甘溫能補氣之虛

卷之三

一

羊肉之甘熱能補血之虛羊肉有形之物也能補有形肌肉之
氣凡氣味與人參羊肉同者皆可以補之故云屬也人參補氣
羊肉補形形氣者有無之象也以大言之具天地兩儀者也以
小言之則人之陰陽氣血也以此之養生則莫重於斯以天地物
類論之則形者坤土也人之脾胃也乃生長萬物也地欲靜靜
則萬物安坤元一正之土亘古不遷者也耕種之土乃五行運
用者也動之有時春耕是也若冬時動之令天氣閉藏者泄地
氣凝聚者散精氣竭絕萬化不安亦如人之勞役形體則大病
生焉故曰不妄作勞則明當靜之時若勞後妄作則百脉爭張
血脈沸騰精氣竭絕則九竅閉塞衛氣散解夫以人參甘草之
類治其已病曷若救其未病為根本至源之計哉內經云志閒
少欲飲食有節起居有節而減其思慮省語養氣庶幾於道何病

之有如或不慎病形已彰若能調其脾胃使胃氣在津液上則四臟各得其所以氣論之天地人三才之氣各異損其脾胃者益其氣損其脾胃調其飲食適其寒溫黃耆之甘溫能補皮毛之氣人參之甘溫能補肺之氣甘草之甘溫能補脾胃之中經管之氣人生諸氣氣旺則精自生形自盛血氣以平故曰陽生則陰長此之謂也血不自生須得生陽氣之藥血自旺矣是陽主生也若陰虛單補血血無由而生無陽以化也仲景以人參為補血藥其以此故乃補氣補血之大略也

瀉可以去閉蓋瀉大黃之屬是也此二味皆大苦寒氣味俱厚不減大黃又性過於諸藥以瀉陽分結中之閉也亦能瀉大便為體輕象陽故也大黃之苦寒能走而不守瀉血閉也血閉謂胃中阻穢有形之物閉塞者也陽明病胃家實是也

熱大渴躁作有形之熱故瀉其大便使通利汗出而愈之治血病瀉大便一則瀉氣閉利小便使若經絡中及皮毛分肉皆但有疼痛一藥用牽牛大黃下之毒反甚矣通則不痛痛作不通痛隨利減當通其經絡則疼痛去矣如輕可以去實麻黃葛根之屬是也謂如頭痛當以紙辛川芎之類通之則無所凝滯即痛隨利減也發痛有六道經絡究其痛在何經絡之閉以行本經行其氣血氣血通利則愈矣若表上諸疼痛便下之則不可當詳細而辨之也

經可以去實麻黃葛根之屬是也夫六淫有餘之邪客於陽分以毛之開腠理閉拒謂之實也實者氣滯血不行之謂也且利閉結理致津液滯也皮毛之經絡受邪之實去矣故二

以發汗本寒而受外寒之汗力愈實以發之為味甘溫可
以發是陽明燥火之經身已前所受寒邪也非止發汗之藥謂
陽明禁發汗利小便但解去經絡肌肉間寒邪其氣和汗自出
矣麻黃專發汗去皮毛氣力足邪葛根和解血分寒邪乃一陰
一陽能瀉表實不能瀉裏實若飲食勞倦雜病自汗表虛之證
認作有餘復用麻黃發之汗大出則表益虛此蓋不知表虛宜
補其亡陽開其自汗秋冬用桂枝春夏用黃耆代之黃耆者能
治虛勞自汗陽明標病者也陽明胃主自汗小便數若以人參
甘草之類補之脾胃實脾胃實則衛氣行衛氣行則表自實表
既實自汗何由而出清氣上行雖飧泄亦止矣此治其本也葛
根雖為和解之藥亦不可用用之則重虛其表仲景所論內外
不足自汗之證大禁發汗利小便若已經發汗寒邪未去雖發
汗數多不可止也寒邪已去重發其汗則脫人元氣若多汗小
便赤澀不得利小便為汗奪津液故也汗家不得重發汗小便
多不得發汗汗多不得利小便小便多不得重利小便聖人所
以切禁此者為津液乃氣血之基本也一云亡陽一云脫血病
人重發汗重利小便必脫元氣七神無依則必危困矣因辨麻
黃葛根之宜禁故兼及之

中風同從高墜下

夫從高墜下惡血留於內不分十二經絡其人俱作風中肝經
留於脇下以中風癱瘓之血者皆肝之所主而心血必歸於肝不問
何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛者則必有自汗但人
有汗出皆為風證諸痛皆屬於肝才疏

其法從其屬入於

肝氣從高墜下逆其上行之血氣非肝而何非傷風無汗既自
汗必是化也以破血行經之藥治之

傷元氣血馬治從高墜下血留於脇下及疼痛不可忍

柴胡 山方 瓜蒌根 當歸 各各 紅花 甘草 各各

大黃 酒浸 川山甲 炮 桃仁 酒浸去皮尖研

黃帝鍼經云有所墜惡血留內若有所大怒氣上而不行下
干脇則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥陰少陽宜以柴胡

為引用為君以當歸和血脈又急者痛也甘草緩其急亦能生
新血 甘生血 陽生陰長故也為臣川山甲瓜蒌根桃仁紅花破

血潤血為之佐大黃酒製以盪滌敗血為之使氣味和合氣血
各有以歸痛自去矣

右件除桃仁外挫如麻豆大每服一兩水一盞酒半盞同

煮至七分去滓大溫服之食前以利為度得利痛或不盡服

乳香神應散

乳香神應散治從高墜下疼痛不可忍及腹中疼痛

乳香 沒藥 雄黑豆 桑白皮 獨科栗子 各各

破故布 式兩妙香

右為細末每服五錢醋一盞於砂石器內煎至六分入麝香
少許去粗溫服

當歸導瀉散治落馬墜車打撲損傷瘀血大便不通洪腫暗香

疼痛昏悶畜血內壅欲死

川大黃 兩 川當歸 分 麝香 少許

右三味除麝香另研外各為極細末研勻每服二錢熱酒一盞

調下食前內瘀血去或當歸折疼痛不可忍以定痛後

紫金丹治之

大醫

川烏頭炮

草烏頭炮各五分五靈脂

木鱉子土金殼

骨碎補

威靈仙

金毛狗脊

自然銅醋碎

防風各半

地龍去土

烏藥

青皮去白

陳皮去白

茴香各半

乳香

沒藥

紅娘子

麝香各半

黑牽牛半

禹餘糧石醋炒

右為細末醋麵糊為丸如桐子大每服十九至二十九溫酒

送下病在上食後病在下食前

聖靈

治打撲損傷及傷折疼痛不可忍者

烏梅去核

白朮乙拾

萬貫子乙拾

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼熱酒送下喫

了一伏時不效如痛再服

衛氣留於腹中積積不行脉眩急及腹皮急宛蘊不得常所

古脇胃中滿喘逆息者

調中順氣丸

治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香

白豆蔻仁

青皮去白

陳皮去白

京三稜乙拾

大腹子

半夏湯洗七

縮砂仁

檳榔

沉香各半

右為細末水糊為丸如桐子大每服二十九漸加至五十丸

煎陳皮湯下

沉香

治一切氣不升降脇肋刺痛胃膈痞塞

沉香半

人參半兩

檳榔各半

烏藥乙兩

阿子肉半兩

麥蘖乙兩

白朮乙兩

神麴乙兩

香附子乙兩

紫蘇葉乙兩

姜黃

紅皮各兩

京三稜乙拾

廣茂

益智

炙甘草 四兩 大腹皮 半兩 厚朴 姜製 一兩

右為極細末每服一錢食前沸湯點服

清氣在下則生飧泄濁氣在上則生腹脹 陰陽反作病之逆從也飲食失節則為脹又濕熱亦為脹右關脉洪緩而沉弦脉浮於上是風濕熱三脉合而為病也是脾胃之令不行陰火亢甚乘於脾胃故噎咽不通致濁陰之氣不得下降而大便乾燥不行胃之滯與寒陰之火俱在其中則脹作使幽門通利泄其陰火潤其燥血生益新血則大便不閉吸門亦不受邪濁陰得下歸地也經云中滿者泄之於內此法是也

木香順氣湯 治濁氣在上則生腹脹

木香 三分 厚朴 姜製 四分 青皮 去白 陳皮 益智仁

白茯苓 去 澤瀉 乾生姜 半夏 湯洗 吳茱萸 湯洗 各分

當歸 五分 升麻 柴胡 各壹分 草豆蔻 熟製 燒去皮 叁分

蒼朮 出浸 叁分

右以咀都作一服水二大盞煎至一盞去滓大溫服食前忌生冷硬物及怒經云留者行之結者散之以柴胡升麻苦辛行少陽陽明一經發散清氣運行陽分為君 以生姜半夏草豆蔻仁益智仁辛甘大熱消散中寒為臣 厚朴木香蒼朮青皮苦辛大溫通順滯 當歸人參陳皮辛甘溫調香榮衛滋養中氣濁氣不降以苦泄之 吳茱萸苦熱泄之者也 氣之薄者陽中之陰茯苓甘平澤瀉鹹平氣薄引道瀉陰之氣自大而下故以為佐氣味相合散之泄之上之下之使清濁之氣各安其位也 范天賦夫人先因勞役飲食失節加之憂鬱氣結病心腹脹滿是食則不能毒食兩則者

張五細至夜濁陰之氣當降而不降臍脹尤甚大抵陽主
運化飲食無緣於傷脾胃陽氣不能運化精微聚而不散故
為脹滿元氣中脫乃胃之寒穴引胃中生發之氣上行陽道
又以前藥助之使濁陰之氣自此而降矣

沉香

治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而不伸以為臍脹

沉香

白朮

陳皮去白各五分

枳實去穢炒

吳茱萸湯洗

白茯苓去澤瀉

當歸洗

木香

青皮去白各

大黃酒浸厚朴

姜製五分

右件各揀淨同為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五十
丸至七八十九丸溫白湯下食前微利即止

嘔效氣喘

所謂嘔效

上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從

故嘔效上氣喘也

加減湯

治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

桑白皮配地骨皮甘草

陳皮

青皮去白

五味子

人參去芦各五分

白茯苓各

右件咬咀每服四錢水一盞半入粳米十粒同煎至一盞去
滓大溫服食後

神效湯

治病人不得卧則喘者水氣逆上乘於肺肺得水而

浮而使氣不通流其脉沉太宜此治之

橘皮洗

生姜

紫蘇葉

人參

桑白皮剉炒各

木香

白茯苓去皮各

右咬咀以水三升煎至一升去滓大溫分二服

加減三奇湯

治咳嗽上氣痰涎喘促胃膈不利

桔梗 甘草 青皮

人參 五味子 加紫蘇葉桑白皮

右咬咀每服四錢水一大盞生姜二片煎至一盞去粗大溫服食後

飲食勞倦論

古之至人窮於陰陽之化究乎生死之際所著內經悉言人以胃氣為本入受水穀之氣以生所謂清氣營氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也夫胃為水穀之海飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通滌水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四經五藏陰陽揆度以為常也苟飲食失節寒溫不適則脾胃乃傷豈意憂恐而損耗元氣既脾胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不

主令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負脾胃氣虛則下流於腎肝陰火得乘其土位故脾胃之證始得之則氣高而喘身熱而煩其脈洪大而頭痛或渴不止其皮膚暈暈不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高喘而煩熱為頭痛空渴而脈洪脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是春生之令不行則無陽以護其榮衛則不任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣不足所致也然而外感風寒所得之證頗同而實異內傷脾胃傷其氣外感風寒乃傷其形傷其外為有餘有餘者瀉之傷其內為不足不足者補之

苟誤認作外感而瀉之則虛其虛也實實虛虛補不足而補有餘而瀉之則實則奈何

者溫之濕能除之熱大已苦寒之濕瀉其上可今立補中氣

湯主之

黃耆半份病其勞當歸身去心酒焙乾或人參去心戶參三分

白朮調中氣柴胡升行少陽之經炙甘草半份

升麻調中氣黃耆升胃氣黃耆升胃氣

橘皮益元氣得諸甘藥可一方加白芍藥黃蘗紅花

古件咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗大溫服食遠

夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其次肺氣受

邪瀆用黃耆最多甘草人參次之脾始一虛肺氣先絕故用黃

耆以益皮毛而閉腠理不令自汗損其元氣上喘氣短人參以

補之心火乘脾瀆炙甘草之甘以瀉火熱而補脾胃中元氣若

脾胃急痛并上虛腹皮急縮者最宜多用急者緩之胃中清氣

在下必加升麻柴胡以引之引黃耆甘草上升能補衛氣之散

解以緩帶脉之縮急一味苦平味薄者陰中之陽而引清氣上

升也黃耆人參甘草二味皆甘溫為主用脾胃虛乃必用之藥

氣亂於胃為清濁相干用去白橘皮以瀉之又助陽氣之升

以散滯氣助諸甘辛為用也口乾噎乾者加葛根脾胃氣虛不

能升浮為陰火傷其生發之氣榮血大虧營氣不營陰火熾盛

是血中伏火日漸煎熬血氣日減心包與心主血血減則心無

所養致使心亂而煩病名曰恍惚者心惑而煩悶不安也故加

辛溫甘溫之劑生陽陽生則陰長或曰甘溫何能生血云仲景

之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血更加當歸和之又宜

加黃蘗以救腎水能瀉陰中之伏火如煩猶不止少加生地黃

水水旺而心火自降如氣浮心亂以朱砂安神丸鎮固之則愈

朱砂

伍方另研水飛陰乾

黃連

去須擇淨酒洗解降分

炙甘草

方半

生地黃

氣力半

當歸

去芦貳分半

右件四味為細末另研朱砂水飛如塵陰乾為衣湯浸餅為泥如黍米大每服一十五丸津唾嚥之食後熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以苦連之苦寒去心煩除濕熱為君以甘草生地黃之甘氣瀉火補氣滋生陰血為臣以當歸補其血不足朱砂納浮溜之火而安神明也

四時用藥加減法

長夏濕土客邪大旺加蒼朮白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣濕熱大勝主食不消故食減不知穀味則加麴以消之加五味

子麥門冬助火益肺氣助秋損也在二伏中為聖藥

堵塞咽喉陽氣不得出病名曰窒陰氣不得降病名曰噎噎室迎逆於咽喉膈之間令諸經周身陽氣不行令人口閉目昏氣欲絕者何也清氣在陰濁氣在陽清濁相干亂於胃中是為大惋夏月加青皮陳皮益氣黃蘗泄陰火之上逆或以消痞丸滋腎丸各七八十九丸則愈冬月加吳茱萸大熱大辛苦之味以瀉陰寒之氣則愈食不消則加炒麴空心約宿食消及服之待小時以美饌壓之不令胃中停留也

食不下乃胃中有寒胃上

有寒或氣寒滯滯加青皮陳皮木香此三味為定法冬月加益智仁草豆蔻仁夏月少加黃芩黃連秋更加檳榔草豆蔻仁縮砂仁白豆蔻仁如春初猶寒更少加辛熱之劑以補其虛之不足為屬寒之佐益

加佛口立效冬花各二分若痰嗽久病肺中伏火者去人參
防痰嗽增益自然調和陰陽血氣之際甘溫為必用之藥

肺洪大兼見熱證少加黃芩黃連生地黃甘草

味子
肺緩頭沉困怠心慳無力者濕勝也加蒼朮澤瀉人參白茯苓五

味子
肺澀氣滯澀者加當歸身木香天門冬青陳皮覺寒者加桂枝
黃耆不足病難見熱證須加冬熱藥不宜多以從權

腹中氣上逆者衝脈逆也加黃蘗二分黃連一分以瀉之
下急或痛甚俱加柴胡甘草人參

多唾或嘔白沫胃口上停寒也加益智仁如少氣不足以息服
正藥二三服猶氣短促此肺上及皮表間有寒所遏當引陽

氣上升則愈多加羌活獨活升麻柴胡蘗木次之黃耆倍之
捫之而肌熱者表證也只服正藥一二服得微汗則已

躁熱作蒸蒸而熱者腎間伏火上騰也加黃蘗生地黃各二分
脚膝痠軟行步乏力或痛乃腎肝伏熱少加黃蘗空心服如不
愈更加漢防己半錢則愈使脚膝中氣力湧出矣

肺緩有痰而痞加半夏黃連

肺弦四肢滿悶便難而心下痞加黃連柴胡甘草

大便秘燥心下痞加黃連桃仁少加大黃當歸身

心下痞旁悶者加白芍藥黃連

心下痞腹脹加五味子白芍藥縮砂仁如冬少加乾姜或中

心下痞覺中寒加附片黃連

心下痞加黃連生薑橘皮冬月加黃連木香藿香葉

能食而心下痞加黃連半錢枳實二分

噎中氣滯加赤白青皮

噎痛領腫脈洪大面赤者加黃芩桔梗甘草

耳鳴目黃頰頰腫頭有膿肘臂久後廉痛面赤脈洪大者以羌

活防風甘草藁朮以通其經血加黃芩黃連消其腫人參黃

耆益元氣而瀉火邪如脈浮面白喜噦或面色惡者皆寒也

亦羌活等四味中加之當瀉足太陽也不用寒藥

小便遺失肺金虛也宜安臥養氣以黃耆人參之類補之不愈

是有熱也加黃蘗生地黄切禁勞役

卧而多驚小便淋瀝者邪在少陽厥陰亦宜太陽經所加之藥

更添柴胡半錢如淋加澤瀉半錢此下焦風寒合病也腎肝

之病同一治為俱在下焦非風寒行經則不可乃受客邪之

濕熱也宜升發散以除之

頭痛加蔓荊子半錢痛甚加川芎一分頂痛腦痛加藁朮二分

若苦頭痛加細辛二分諸頭痛併用此四味是矣

臍下痛者加熟地黄二分不已者太寒也其寒從傳變者來加

肉桂二分徧關內經少腹痛皆寒非傷寒厥陰之證也仲景

以抵當湯丸主之乃血結下焦膀胱

身有疼痛及身重者濕也以五苓散主之如風濕相搏一身盡

痛加羌活防風各半錢升麻柴胡各半錢藁朮蒼朮各一錢

所以然者為風藥也能勝濕故另作一服與之

脊背痛汗出小便數而久者風熱乘脾脾氣鬱長也當瀉以熱

則愈以人參益脚散主之

柴胡

升麻

黃耆各壹分

防風

人參

甘草

藁本

陳皮

青皮

黃芩

白豆蔻仁

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後如面

白脫色氣短者不可服

肩背痛不可迴顧者此手太陽氣鬱而不行以風藥散之脊痛

項強腰似折項似拔者此足太陽經不通行以通氣防風湯

主之

羌活

獨活

藁本

防風

甘草

川芎

蔓荊子

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服空心如身重

腰沉沉然經中有寒濕也更加酒洗漢防已半錢輕者附子

重者川烏頭

腹中痛不惡寒加黃芩芍藥

腹中痛惡寒而脉弦者小建中如脉沉細者理中湯類主之

腹痛在寒涼時加半夏益智草豆蔻仁類

胃脘當心而痛氣欲絕者胃虛之極也俗言心以胃氣為主

草豆蔻

白殭蚕

黃耆

益智仁

橘皮

白殭蚕

黃耆

益智仁

生甘草

炙甘草

當歸身

青皮

神麴末

姜黃

桃仁

澤瀉

半夏

大麥蘖

柴胡

胡麻

右一十八味除桃仁只研如泥外為極細末同研勻湯浸

餅為丸如桐子大每服二十九熱白湯送下食後服之
少用之

夫脾胃之證始則熱中終則寒中陰盛生內寒厥氣上逆寒氣
積於胃中是腎水反來侮土此謂所勝者亡支行也作中滿腹
脹作涎作清涕或多溺是下痛不能任身履地骨之無力喜睡
兩丸多冷時作陰陰而痛或妄見鬼狀夢亡人腰背脚眼腰脊
脊痛而不渴不瀉不瀉則溫氣去矣獨留寒獨留則血凝
泣血凝泣則脈不通故其脈盛大以瀉曰寒中當以**白朮附子**

湯主之

白朮

附子

炮去

蒼朮

陳皮

厚朴

姜製

半夏

湯洗

茯苓

澤瀉

各二兩

猪苓

去皮

肉桂

四分

右件剉如麻豆大每服五錢水三盞生姜二片同煎至一盞
去滓食前溫服之量病人虛實加減多少
滑脈生癩疝

丁香鍊寶丸

治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任脈所

主陰經也乃腎肝受病治法同歸於一

當歸

去芦

附子

炮製去

川練子

剉碎

茴香

炒

右四味各一兩剉碎以好酒三升同煮酒盡為度焙乾作細
末每秤藥末一兩再入下項藥

丁香

各一分

木香

各一分

全蝎

二付

玄胡

一兩

右四味同為細末入在前項當歸等藥末內拌和酒糊為丸
如桐子大每服二十九至一百丸溫酒送下空心食前凡疝
氣帶下皆皆屬於風全蝎治風之聖藥茴香川練子皆入小
腸經當歸玄胡和血止痛疝氣帶下皆積寒入小腸之

故以附子佐之丁香木香亦宜也

六神散

天台烏藥 木香 茴香炒 青皮 良薑 檳榔 川練子 十個 巴豆 十個

右八味先以巴豆微打破同練子用麩炒候黑色豆麩不用外為細末每服一錢温酒送下疼甚者炒生姜熱酒下亦得

宣香練實丸

川練子炒 茴香 山茱萸 食茱萸 吳茱萸 湯 青橘皮 去白 陳橘皮 馬蘭花 醋 芫花 各一兩 右為極細末醋糊為丸如桐子大每服二十九温酒送下食前量入虛實加減丸數以利為驗

川香練散

木香

為細末 兩另 煉淨 一兩 盞 匙 一 炒

川練子

與川練子 一兩 到碎 用巴豆 一十個 微破皮 炒 黃不用 巴豆

右件為極細末每服二錢温酒一盞調下空腹大抵此疾因虛得之不可以虛而驟用補藥邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄之邪然後補之是以諸方多借巴豆氣者蓋謂此

瀉之則脹已汗之則瘡已

東南一方者在人則為丙小腸熱甲膽風小腸與膽皆居其下其性炎上其瘡外有六經之形證內無便溺之阻隔飲食如故清便自調知不在裏非疽瘡也止癰癰也小則為癰大則為癰其邪所受於下風濕之地氣自外而來侵加於身者也經云營氣不從逆於肉理乃生癰腫諸瘡皆屬心火此瘡自外而

入是丙、小腸左迂入於膽作滿而非痒也此一方皆主五更夢遺
必痛此元氣不足營氣逆行其瘡初出未有傳變在於肌肉之
上皮毛之間只於風熱六經所行經絡地分出矣宜瀉其風濕
熱醫者不知陰覆其陽則汗也此宜發汗者乃濕熱鬱其手足
少陽致以凝滯逆使營衛周身元氣消弱也其風熱鬱滯於下
其面色必赫赤而腫微黯色東方有埋沒之色也
風水之性上衝頭必怒色其人多怒其瘡之色亦赫赤腫硬微
帶黯色其瘡之形勢亦奮然高起結硬而作痛也其脈止在左
手寸主表左寸外洪緩左關洪緩而弦是客邪在於血脉之
上皮膚之間宜急發其汗而通其榮衛則邪氣去矣以

續隨子

黃耆二兩 柴胡一分 羌活 防風 當歸身各一分半

連翹一分 炙甘草 人參各一分 蒼朮三分 生黃芩一分半

紅花 桂枝各五分

右咬咀都作一服水酒各一大盞同煎至一盞去滓大溫服

續隨子丸 治一切積聚脾濕腫脹肚大青筋羸瘦惡證

沉香一分 海金砂一分半 輕粉一分 牽牛頭末一兩

右各秤分兩同為細末研獨科蒜如泥為丸如桐子大每服
三十九丸或五十九丸煎百沸灯心通草湯送下空腹食前量大
小虛實加減丸數取利為驗

續隨子丸 治通身虛腫喘悶不快

人參 漢防己 赤茯苓 木香 續隨子 海金砂 苦葶藶 續隨子 續隨子

右件為細末...

通身腫滿坐不得臥腹脹如鼓

牽牛半斤 甘遂半兩 海金沙

方為細末每服二錢煎倒流水一盞調下食前得宣利止後服

太陰所至為痞滿中滿霍亂吐下

木香去白 治中滿腹脹下虛虛損者

陳皮去白 雞薑子炒各半兩 胡椒 木香 草豆蔻酒裹

青皮去白各三分 蝎尾去毒二分半

右為細末水糊為丸桐子大每服二十九溫米飲送下食後

忌服白米白豆黃者一年小兒麻子大桑白皮湯送下十九

日三服大人桐子大四十九如陰囊洪腫水冷次用滄鹽乾

姜白面各三分水和交攤紙上塗用

治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐臥不能

大小便澀滯上喘氣促面色痿黃通身虛腫

厚朴 黃芩 草豆蔻 益智仁 當歸各半分

黃連六分 半夏七分 廣茂 紅花 吳茱萸

升麻各一分 生甘草 柴胡 澤瀉 神麴

青皮各三分 橘皮各三分 如渴加葛根四分

右以明都作一服水一盞先浸少時煎至一盞去滓大溫服

食前

治脾濕有餘及氣不宣通面目手足浮腫

陳皮 桑白皮 白朮 木香 茯苓去皮

霖雨時加澤瀉半兩

右改阻每服五錢水二盞煎至一盞去渣大溫服食則

赤茯苓

治脾濕太過四肢腫滿腹脹泄瀉赤白痢疾

濕

浮腫四兩

防己二兩

赤茯苓一兩

木香半兩

右件為細末棗肉為丸如桐子大每服二十九煎桑白皮湯

送下食前

諸脈按之無力所生病證并治法

六脈中之下得弦細而瀋按之無力腹中時痛心胃控裏陰陰
而痛或大便洩洩鼻不聞香臭清濁涕不止目中泣出喘鳴痰
嗽唾出白沫腰沉沉苦痛項背骨皆時作痛目中流火口鼻腥
寒時頭痛目眩苦振寒不止或嗽或吐或嘔或噦則發躁蒸二
而熱如坐甑中必得去衣居寒處或飲寒水則便過其振寒復
至氣短促臂中滿悶而痛必有膈咽不通欲絕之狀甚則目睛
聲聞於外而淚涕涎痰大作方過其發躁須臾而已振寒復至
或面白而不澤者脫血也悲愁不樂情慘二意悲二健忘或善
噫間出此風熱大損寒水燥金之復也如六脈細弦而瀋按之
空虛此大寒證亦傷精氣以辛甘溫甘熱滑潤之劑大瀉西方
北方則愈

姜附湯

治中寒口噤四肢強直失音不語或卒然暈倒口吐涎

沫狀如暗風手足厥冷或復煩躁兼治陰證傷寒大便自利

而發熱者

乾姜

熟附各二兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去粗溫服或慮此藥

大燥即以附子理中湯相繼服餌姜附本治傷寒經下之後

又復發汗內外俱虛身無大熱晝則煩燥夜則安靜不嘔不

渴六脈沉伏並宜服此不知脈者更須審之兼治中脫虛寒

人積痰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆 一方附子湯以
注用者名曰通湯加白朮倍之甘草減半名生附白朮湯治
中風濕昏悶恍惚腹滿身重手足緩縱熱自汗失音不語
便利不禁 一方用姜附湯加麻黃白朮人參甘草等分名
附子麻黃湯治中寒濕昏暈緩弱腰背強急口眼喎斜語聲
渾濁心腹脹氣上喘急不能動轉更宜審而用之

沉香藜附丸

沉香

附子

炮去皮

乾姜

炮

良姜

剉炒

官桂

去皮

茴香

炒

川烏頭

炮去皮

附子

剉作小塊

吳茱萸

湯浸

去苦炒

右各一兩為細末用好醋煮麪糊為丸如桐子大每服五七
十九丸熟米飲送下空心腹食前日進二服忌生冷硬物

十全大補湯

人參

肉桂

川芎

熟地黃

茯苓

去皮

白朮

甘草

黃耆

當歸

去芦

白芍藥

右件一十一味剉為麤末每服二錢水一盞入生姜二片棗
二枚同煎至七分去滓溫服不拘時候

諸脹腹大皆屬於熱

諸腹脹大皆屬於熱此乃八益之邪有餘之證自天外而入是
感風寒之邪傳裏寒變為熱作胃實日晡潮熱大渴引飲譫語
是太陽陽明并大實大滿者大承氣下之少陽陽明微滿實者
小承氣下之泄之則脹已此之謂也假令痲瘡為脹滿亦有寒
脹熱脹是天之邪氣傷暑而得之不即時發至秋暑氣衰絕心
瘡病作矣知其寒也高方用交解飲子者是也內虛不足寒濕
令人中滿及五藏六府俱有脹滿更以味寒藥治之

中寒則脹滿濁氣在上則生脹腹脹取二陽二陽者足太陽膀胱寒水為脹腹暴滿按之不下取太陽經絡者胃之募也正高腹滿腹脹支昂膝脇下厥上胃過在太陰陽明胃中寒濕鬱遏也太陰腹脹後不利不欲食食則嘔不得卧按所說寒脹之多如此中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分清其氣下焦如瀆氣血自然分化不待泔滓穢如或大實大滿大小便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麪及味厚之物膏粱之人或食已便卧使濕熱之氣不得施化致令腹脹滿此脹亦是熱脹治熱脹分清丸主之 如或多食寒涼及脾胃久虛之人背中寒則脹滿或藏寒生滿病以治寒脹中滿分清湯主之病勢大小用藥輕重臨時加減不敢少越耳

分清丸 治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹不治寒脹

黃芩去腐剉 炒半兩 姜黃 白朮 人參去土 炙甘草

豬苓去黑皮 各一分 黃連去頭剉 炒半兩 白茯苓去皮 縮砂仁

乾生姜各一分 枳實麸炒 黃 半夏湯浸七次 各伍分 厚朴姜製 一兩

知母剉炒 四分 澤瀉二分 陳皮

右細碾茯苓澤瀉生姜各各為末另秤外共為極細末秤入上三味和勻水浸蒸餅為丸如桐子大每服一百丸焙熟白湯送下 寒因熱用故焙熱服之 食遠量病人虛實加減

中滿分清湯 治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥逆食入反出下虛中滿腹中寒心下痞下焦躁寒沉厥奔豚不收並宜服之

益智仁 半夏 茯苓 木香 升麻 各三分

川烏頭

澤瀉

人參

青皮

當歸

生薑

麻黃

柴胡

乾姜

葶澄茄

黃連

黃耆

吳茱萸

草豆蔻

厚朴

黃藥

半分使涼又為熱因寒用

右件剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去滓大溫服食前大忌房勞酒濕麪生冷硬物

諸嘔吐酸皆屬於熱

養胃安胃散

治胃虛弱不能飲食嘔吐不待腐熟

藿香

丁香

人參

橘皮

右件四味為細末每服二錢水一盞生薑二片同煎至七分和滓冷服食前

加減二陳湯

治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不

快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和並宜服之

丁香

香薷

半夏

橘紅

茯苓

炙甘草

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片烏梅一個煎至六分去粗熱服不拘時候治痞疾加草豆蔻一兩半麪裹燒熟用

諸痿喘嘔今立熱喘寒喘一方

人參平肺散

治心火形肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛骨膈

瘕滿咽嗑不利

桑白皮

知母

炙甘草

地骨皮

五味子

茯苓

青皮

人參

陳皮

天門冬

右件咬咀水一盞煎至一盞去滓溫服食後如熱甚加

黃芩

紫蘇葉

半夏

人參養肺湯

治形寒飲冷傷肺喘嗽煩心骨痛氣不得動轉

人參 紫蘇葉 甘草各四 桂 五味子

木香各四 陳皮去白 白朮各四 半夏姜製 白茯苓去心

桑寄生各兩

右件為鹿末每服五錢水一盞半生姜二片同煎至八分去滓大溫服食後如冬寒每服中加不去節麻黃半錢先洗去沫下諸藥

諸脉有閉有格有澀有溢

滋腎丸 治不渴而小便閉邪熱在血分也

黃蘗參兩細剉酒拌 知母各兩酒浸 肉桂壹分半

右上一味氣味俱陰以同腎氣故能滋腎而瀉下焦火也桂芍火邪同体故曰宗因熱用凡諸病在下焦皆不渴也熟水為丸百沸湯送下

清脾飲子 治渴而小便閉邪熱在氣分也

茯苓去皮 豬苓各五分 白朮各五分 澤瀉 琥珀

藎麥 桂各半分 灯心壹分 木通七分 車前子壹分

通草各五分 菡蓄壹分

右為細末每服五錢水一盞半煎至一盞帶熱服或剉如麻豆大作湯煎服亦可局方中八正散仲景五苓散亦宜用揅其腎者益其精

腎有兩枚右為命門相火左為腎水同質而異事也夫揅者當揅何藏而治之形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣化精生味和形長無陰則陽無以化當以味補腎真陰之虛而瀉其火邪以封髓丹滋腎丸地黃湯之類是也陰本既固陽氣自生化成精髓若相火妄動則用辛溫之劑世之用辛熱

人參

紫蘇葉

甘草各五分

桂

五味子

木香各四分 陳皮去白

白朮各陸分

半夏美製

白茯苓去白

桑寄生書兩

右件為鹿末每服五錢水一盞半生薑二片同煎至八分去滓大溫服食後如冬寒每服中加不去節麻黃半錢先洗去沫下諸藥

諸脉有閉有格有澀有溢

滋腎丸

治不渴而小便閉邪熱在血分也

黃蘗參兩細剉酒拌

知母參兩酒浸

肉桂壹分半

右上一味氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉下焦火也桂芍火邪同体故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也熟水為丸百沸湯送下

清肺飲子

治渴而小便閉邪熱在氣分也

茯苓去皮

豬苓去白

白朮各五分

澤瀉

琥珀

藎麥

桂各半分

灯心壹分

木通七分

車前子壹分

通草各二分

菡蓄壹分

右為極細末每服五錢水一盞半煎至一盞帶熱服或剉如麻豆大作湯煎服亦可苟方中入正散仲景五苓散亦宜用損其腎者益其精

腎有兩枚右為命門相火左為腎水同質而異事也夫損者當損何藏而治之形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣化精生味和形長無陰則陽無以化當以味補腎真陰之虛而瀉其火邪以封髓丹滋腎丸地黃湯之類是也陰本既固陽氣自生化成精氣若相火不足宜用辛溫之劑世之用辛熱

治一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰脚沉

重肢體倦怠血氣羸乏小便渾濁

乾山藥 牛膝酒浸 遠志 山茱萸 白茯苓

五味子 巴戟酒浸 石菖蒲 肉蓯蓉酒浸一宿

楮實各壹兩 枸杞壹兩半 杜仲去皮姜汁并酒

舶上茴香各壹兩 熟地黄壹兩半

右為細末煉蜜同棗肉為丸如桐子大每服二十九溫酒或

鹽湯送下日二服食前五日覺有力十日精神爽半月氣力

頗壯二十日日明一月夜思飲食冬月手足常暖筋骨壯盛

加減熱加山梔子一兩心氣不寧加麥門冬一兩少精神加

五味子一兩陽弱加續斷一兩常服齒牙永無墮落婦人服

之暖子宮安胎悅懌

補益腎肝丸 治目中溜火視物昏花耳聾耳鳴困倦乏力癢汗

增風行步不正兩足軟側卧而多驚脚膝無力腰已下消

柴胡 羌活 生地黄炒 苦參 防己炒

附子炮 肉桂各壹 當歸身去心

右件為細末熟水為丸如鷄頭大每服四十九溫水下食前

水芝丸

蓮實去皮不以多少用好酒浸一宿猪肚幾個將酒浸蓮

實切碎焙乾

右為極細末酒糊為丸如鷄頭實大每服五十九溫酒下

下食前

上部有脉下部有脉其人當吐衄傷大陰

瓜蒂

赤小豆

各等分

右一味為細末每服一錢匕溫漿水調下取吐為度

黃芩

治腎氣虛久新憔悴發熱五藏齊損瘦弱虛煩燥

蒸痿弱下血

乾山藥

山茱萸

各肆分

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各叁分

熟地黄

捌分

右為末煉蜜為丸如桐子大每服五十九溫水送下空心

三才封髓丹

降心火益腎水

天門冬

法熟地黄

人參

去芦各

黃藥

叁兩

縮砂仁

壹兩

右件為細末水糊為丸如桐子大每服五十九用菴苓半兩

切作片子酒一大盞浸一宿次日煎三四沸去滓送下空心

廿草

示分半炙

膏珠丹

又名神珠丹

治下焦陽虛臍腹冷痛足脘寒而逆

杜仲

去絲兩

車釐

式兩

訶子

伍个

黃骨

壹兩

破故紙

炒叁兩

朱砂

壹分

胡桃

壹個

去隔皮

拾个

縮砂仁

兩半

巴戟

法熟去

右件為細末酒糊為丸如桐子大朱砂為衣每服二十九空

心益湯溫酒下

具

治下焦陽虛

沉香

巴戟

酒浸

去心

茴香

鹽炒香

草薢

酒浸

胡芦巴

炒香

破故紙

炒杜仲

絲去

牽牛

鹽炒香

琥珀

各壹

桂半兩

右件一十味為細末用元澄藥酒打麵糊為丸如桐子大每

服五十九至七八十九空心溫酒下

人參

治腎氣虛之下元冷備臍腹疼痛夜多旋溺脚膝痠痛

肢躄倦怠面色痿黃或驚重久虛勞不足渴欲飲水腰重

痛少腹急痛小便不利並宜服之

熟地黄兩

山藥

山茱萸各四兩

桂去皮

澤瀉各參兩

附子炮

白茯苓去皮

牡丹皮

右件為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十九至七十九濕酒送下鹽湯亦得空腹食前婦人淡醋湯下

陽事多痿不振依全方然夏減桂附一半春秋三停減一疾去精走全減桂附只服六味地黄丸

精滑山茱萸為君小便或多或少或赤黃白茯苓為君小便

淋瀝澤瀉為君心虛腸胃間積熱心火盛心氣不足牡丹皮

為君皮膚燥濕乾山藥為君已上但言為君者其分兩用藥

地黃分兩其乾地黃却依立為君分兩同

幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥熱

通淋湯

當歸身 升麻

桃仁泥子各壹分

生地黄

熟地黄各伍分

紅花

炙甘草各壹分

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食前

潤腸湯

升麻

當歸尾

生甘草

煨大黃

桃仁

麻仁

熟地黄各壹分

生地黄分

紅花參分

右件剉如麻豆大都作一服水二盞先拌藥濕煎至一盞去

滓帶熱服食前

脚氣論

夫脚氣之疾實水濕之所為也蓋濕之害人皮肉筋脉而為於下然亦有一焉一則自外而感一則自內而致其治法白濁不

南方之疾北方之疾自內而發者也南方地下水寒其清涼
之氣中於人必自足始北方之常食漣乳又飲之無節且漣
乳之為物其形質則水也酒醴亦然人之水穀入胃胃氣蒸騰
其氣與味宣之於經絡化為營氣血苟元氣不充胃氣不強
食自倍脾胃乃傷其氣與味不付宣暢旁通水濕之性滯下
致之也

當歸拈痛湯

治濕熱為病肢節煩疼有背沉重骨膈不利及遍
身疼痛下痊於足脛腫痛不可忍

- 羌活半兩 人參去黃 苦參酒洗 升麻
- 蒼朮各五分 炙甘草 黃芩酒洗 茵陳葉酒炒各五分 葛根
- 防風去白 當歸身 知母酒洗 黃芩炒 澤瀉
- 猪苓各三分 白朮壹分

右咬咀如麻豆大每服一兩水二大盞半先以水拌濕候少
時煎至一大盞去滓溫服空心食前待少時以美饌壓之
引一服不須飯壓

獨活湯

治脚氣初發一身盡疼或肢節腫痛便溺阻隔以
此藥導之後以當歸拈痛湯除之

- 羌活 獨活各半 大黃酒煨壹兩 防己 當歸各叁分
- 枳實麩炒三分

右件咬咀如麻豆大每服秤五錢或七錢水二盞煎至一盞
去滓溫服以微利則已重虛實加減

開胃散

治飲食不消心下痞悶

- 橘皮 白朮 澤瀉 茯苓 麥蘗麩
- 炒麩各壹兩 乾生姜 枳實 豬苓

如有積塊加巴豆霜一錢半

右件為細末湯浸餛餅為丸如桐子大每服三五十九至七十丸溫水下食遠

除濕丸 治諸濕客傳腰膝重痛足脛浮腫

檳榔 甘遂 威靈仙 赤芍藥 葶藶 各二兩

乳香 沒藥 各壹兩另研 牽牛 半兩 大戟 炒叁兩

陳皮 去白肆兩

右為末麪糊為丸如桐子大每服五十九至七十九溫水下食前得更衣止後服如服藥前後忌酒二日藥後亦忌濕麪二兩日食溫淡粥補胃尤佳

除濕湯 內受濕氣不能外達淋漓開導泄越其邪

葶藶仙 防風 去聲 荆芥穗 當歸 土產 地骨皮

薤白葉 升麻 去腐 白芍藥 去皮肥上各乙兩

右件各剉細末水二斗煮至一斗五升去滓執滌洗無時

積實大黃湯 治脚氣腫痛

羌活 半斤 當歸身 斤 枳實 大黃 各半斤

右剉如麻豆大都作一服水一大盞半煎至一盞去滓大溫服空心下利一兩行痛止

中風有二

內經曰人之氣以天地之疾風名之故中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾四旬氣衰者多有此疾壯歲之際無有也若壯盛則間有之亦形盛氣衰如此治法和藏府通經效便是治風然輕重有三中血脉則口眼喎邪亦有賊風龍蟄虛傷之者

中府則肢廢中藏則性命危此二者治各不同如中血脉

外有六經之形證則從小續命湯加減及疎風湯治之中府內
有便溺之阻隔宜三化湯或局方中麻仁丸通利外無六經之
形證內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦羌湯羌活愈風湯治
之中藏痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若中血脈中府之病初
不宜用龍麝牛黃為麝香治脾入肉牛黃入肝治筋龍腦入腎
治骨恐引風深入骨髓如油入麩莫之能出又不可一槩用大
戟羌花甘遂瀉大便損其陰血真氣愈虛方列于后

續命湯

麻黃 去節 人參 去芦 黃芩 去腐 芍藥 炙甘草
川芎 杏仁 送炒去皮尖 防已 官桂 各壹兩

防風 去節 附子 炮去皮臍

杏仁 外搗為麩末後入 一味令勻每服五錢水一

盞半入牛姜五片煎至一盞去滓稍熱服食前

始治中風不審六經之形證加減雖治與不治無異也開則油
然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯隨證治之
中風無汗惡寒 **續命湯**

麻黃 防風 杏仁

依本方加一倍宜鍼太陽經至陰出血昆崙舉踏

中風有汗惡風 **續命湯**

桂枝 芍藥 杏仁

依本方加一倍宜鍼風府此二證太陽中風也

中風身熱無汗惡寒 **續命湯**

石膏 知母 一料中各加式兩 甘草

依本方加一倍

中風身熱有汗不渴用續命湯

葛根

桂枝

黃芩

本方加一倍宜針陷谷刺厲兌鍼陷谷者去陽明之賊也刺厲兌者瀉陽明之實也此二證陽明中風也

中風無汗身涼用續命湯

附子

加壹倍

乾姜

甘草

加叁兩

宜鍼厲兌去太陰之賊也此一證太陰經中風也

中風有汗無執用續命湯

桂枝

附子

甘草

依本方加一倍宜鍼太谿此一證少陰經中風也

無此四證六經混者繫於少陽厥陰或肢節牽痛或麻木不仁

宜用續命湯

小續命

枳實兩

羌活

肆兩

連翹

陸兩

廿四

右古之續命混者無經今立分經治療又分各經鍼刺無不愈也治法厥陰之井入數刺以通其經少陽之經絕骨灸以引其熱此通經引熱是鍼灸同象治法之大躰也

續命湯治半身不遂或肢躄麻痺筋骨疼痛

麻黃

去節

益智仁

杏仁

炒去皮

炙甘草

升麻

各伍兩

右件咬咀每服一兩水一小盞煎至六分去滓熱服脚登熱水葫芦以大汗出去葫芦冬月不可

中風外有六經之形證先以加減續命隨證治之內有便溺之

證隔復以續命湯導之

厚朴

黃芩

枳實

羌活

芍藥麻豆入每服二兩水三升煎至一升半終日服之以

除外邪已盡當從愈風湯以行中道久服
可天於通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此為常治之
法也又之清濁自分榮衛自和矣

弱者是風熱躄重也或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂或
恐而健忘喜已多思思忘之道皆精不足也故心亂則百病
生靜則萬病息是以此藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活 甘草 防風 黃耆 蔓荊子

川芎 細辛 枳殼 人參 地骨皮

麻黃 知母 甘菊 薄荷 枸杞

當歸 獨活 白芷 杜仲 秦艽

柴胡 半夏 厚朴 熟地黄 防已

芍藥 黃芩 白茯苓 石膏

生地黄 蒼朮 桂枝 前胡

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服如遇天陰加生
姜三片煎服空心一服臨卧再煎滓服俱要食遠空心一服
喫下二丹丸為之重劑臨卧喫下四白丸為之輕劑立其法
是動以安神靜以清肺

假令一氣而微汗用愈風湯二兩加麻黃一兩勻作四服每
服加生薑五七片空心服之以粥投之得微汗則佳

如一句之通利用愈風湯二兩大黃一兩亦勻作四服如前
煎臨卧服之得利為妙

常服之藥不可失四時之轉如至春大寒之後加半夏二兩

柴胡一兩通四兩人參二兩通四兩請迎而奪少陽之氣也
望夏之月半加石膏一兩通六兩黃芩二兩通五兩知母二
兩通四兩請迎而奪陽明之氣也

季夏之月加防已二兩通四兩白朮二兩茯苓二兩通五兩
謂勝脾土之濕也

初秋大暑之後加厚朴二兩通四兩藿香二兩桂一兩通二
兩謂迎而奪太陰之氣也

霜降之後望冬加附子一兩官桂一兩當歸二兩通四兩謂
勝少陰之氣也

二丹丸四白丸方在後衛生寶鑑內附

得春減冬所加藥四時加減類此此藥具七情六慾四氣無
使五藏偏勝反不動於榮衛如風秘則服之永不燥結如

瀉則服之能自調適初覺風氣便能服此藥及病之中二天

丸一料相為表裏治未病之聖藥也及已病者更宜常服無
問男子婦人小兒風癩急慢驚風等病服之神效如解利四

時傷寒隨四時加減法服之

中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知為血弱不能養於
筋故手足不能運化舌強不能言其養血而筋自榮也當以大

秦朮湯主之

秦朮

石膏

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風

黃芩

白芍藥

吳白芷

白朮

生地黄

熟地黄

白茯苓

細辛半兩

右對每服一兩水一盞煎至一盞六分溫服無時如過天

加生薑七八片如心下痞每服一兩內加枳實一錢同煎
肺寒則面白生痰喘咳噎唾

半夏瀉心湯 治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋噎雜腸鳴多唾
口中清水目出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脈沉
絃細溼

細辛 橘皮 桂心 人參 旋覆花

甘草 桔梗 芍藥 半夏各半 赤茯苓參分

右為麤末每服四錢水一盞半生薑七片煎至八分去滓溫
服食後

赤石脂湯 治心下停飲冷痰頭目眩運睡卧口中多涎

檳榔三分 丁香 半夏各壹兩 細辛 乾姜
人參合半兩

右為細末三錢 薑麪糊為丸如桐子大每服二十九生薑湯
日三

射干麻黃湯 治脾肺虛寒痰涎咳嗽

紫蘇葉 桑白皮 青皮 五味子 杏仁
麻黃 甘草 陳皮各伍分 人參 半夏湯洗各

右以咀每服五錢水二盞生薑二片煎至七分去滓溫服

白朮散 治肝腎俱虛收斂精氣補真氣陽充越肌膚進美飲食

五味子 川巴戟去肉從蓉 人參 虎絲子
熟地黃 覆盆子 白朮 益智仁炒 骨碎補 洗去
白龍骨 茴香 牡蠣各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服二十九空心食前米飲

送下 補精氣止汗

補益血氣治虛勞少力

黃耆 熟地黄 當歸 川芎各壹兩 白芍藥參兩半

官桂 各參分 人參參分

右咬咀每服五錢水二盞生姜三片肥棗一枚同煎至八分去滓溫服大疾之後虛勞氣乏者以此調治皆驗溫而有補

附子 乾姜 白朮各壹兩 肉桂 炙甘草各伍分

良姜 參分

右為細末煉蜜為丸一兩作十九每服一九細嚼生姜搗末湯送下米飲亦得食前

五邪相干 謂賊實微虛正也

假令肝病 實邪風熱相合風性急火搖動熾而旋轉其脈弦而緊洪風熱發狂宜黃湯

羌活 川芎 大黃各壹兩 甘草半兩

右咬咀每服半兩水二盞煎至六分去粗溫服

虛邪風寒相合木慮腎熱拘急自汗其脈弦緊而沉仲景云風感太陽移證在太陽經中桂枝加附子湯主之

賊邪風燥相合血虛筋縮皮膚皴揭脈弦浮而濇仲景云血虛筋急桂枝加栝婁湯主之

微邪風濕相合脉重節痛藏府洞泄脉弦長而緩仲景云身體疼痛下痢清熱急當救裏四逆湯主之

正邪中風目眩頭重叫怒不吐脉弦緊而長仲景云甚則如

活湯全
三五

完者相大人為症

後令心病 實邪也

心經起於心二經

證在羊大陽宮極

虛邪熱口相合妄聽

銅人不利關衝出血瀉支溝脉浮大而弦初小柴胡湯後

大柴胡濕此證是太陽與少陽為病前客後主也

賊邪熱寒相合膽惕心懸如飢神怯恐怖足少陰與手厥陰

相接水中心經守邪故神怯怖耳脉大而沉濡亦在太陽

經中內經曰心虛則熱收於內黃連附子瀉心湯主之法

一云謂熱之寒少以為佐天如寒多熱少加附子乾姜佐之

幾邪熱燥相合過飲歌樂實為熱燥俗言暢飲也病人曰快

活快活是有聲於歌樂也以意思聚是無聲歌樂也脉洪

大而濡白虎湯主之喘則加人參

正邪熱也脫陽見鬼躁擾狂起脉洪實一呼四至是八至脉

也小承氣湯主之謂復不堅大也

積令脾病 實邪濕燥相合胃中燥屎腹滿堅痛其脉緩而長

湯是正易陽明證也調胃承氣湯主之

虛邪濕寒相合熱陷胃中腸辟下血熱中緩大黃黃連解毒

湯主之

賊邪濕風相合嘔吐泄瀉後天寒濕

主之

微邪濕寒相合嘔吐泄瀉後天寒濕 黃而不

謂之定濕其脈緩沉而滑木附湯主之如小便不利

加茯苓
正邪濕自病腹滿可痛手足自溫其脈沉滑而長虛羸桂枝
加芍藥湯主之實痛桂枝加大黃湯

假令肺病 實邪燥熱相合毛絨以涼澀多而清其脈短滑而
沉此證如秋冬宜八味丸若春夏宜地黃丸

虛邪燥濕相合微喘而痞便難而痰其脈浮滑而緩枳實理
中丸主之如喘甚加人參若復難加木香檳榔各半錢為
極細末煎下理中丸

賊邪燥熱相合鼻窒動血溢血泄其脈滑而浮大甚者桃
仁承氣湯微者犀角地黃湯極者抵當湯微極抵當丸

微邪燥風相合皮著甲枯血虛氣虛二藏俱虛先血後氣其
脈浮滑而大者承氣血藥主之

正邪燥自病一氣奔鬱皆屬於肺諸燥有聲其脈浮滑而短
列諸嗽藥選而用之

假令腎病 實邪風濕相合癰不藏散下利純清其脈沉滑而
弦仲景云少陰證口燥咽乾下利純清大承氣湯主之脈
沉弦而遲四支逆冷者宜四逆湯等

虛邪寒清相合腎虛多呻洒淅寒清無寐經言燥化清其脈
沉實而滑酸棗仁湯主之

賊邪寒濕相合腎虛胃閉關水溢閉閉不利水在胃為腫
水在肺為喘 諸證其脈沉緩而大仲景云大病差後

腹下有水氣者 續命湯主之

諸病來者相合者 諸病來者相合者

少乾渴也猪苓湯主之

正邪寒自病寒急用藏黑痺經沉其脉沉濡而滑黑痺天麻
心經證司脉異微者其病也甚者藏病也

淹疾瘧病

肝病 正青脉弦皮急多青則痛形成骨脇痛耳聾口苦舌乾
往來寒熱而嘔以上是形盛 當和之以小柴胡湯也

如形衰骨搖而不能安於地此乃膝筋治之以羌活湯本草
云羌活為君也瘧證取以少陽如久者發為痺瘧宜以鑱針
刺絕骨以復以小柴胡湯治之

心病 面赤身熱洪身熱赤多則熱暴病壯熱惡寒麻黃加知母
石膏湯主之此證如不發汗久不愈為瘧也淹疾頓腫
面赤身熱脉洪緊而消瘦婦人則亡血男子則失精

脾病面黃脉緩皮膚黃亦緩黃多則熱形盛依傷寒說是為濕

其脉陽浮而弱陰小而急治在太陰濕溫自汗白虎湯加
木主之如久不愈為濕瘧重暘白虎加桂枝主之淹疾肉消
食少無力故曰熱消肌肉宜以養血涼藥內經曰血生肉

肺病面白皮濇脉亦濇多白則寒暴病濇痒氣虛麻黃加桂枝
令少汗則出也傷寒論云夏傷於暑汗不得出為痒若久不
痊為風瘧形表面白脉濇皮膚濇形羸氣弱形淹衛氣不
足

腎病面黑身涼脉沉而滑多黑則痺暴病形冷惡寒二焦傷也

治之宜附湯或四逆湯久不愈為瘧暴氣衝上吐食夜寐

內之宜瘧太陽經桂枝證形衰淹疾黑痺羸瘦風痺

肥行也

病者... 晝則發熱夜則安靜是陽病有餘乃氣病而血不病也

晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也

晝則發熱煩燥夜則發熱煩燥是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室

晝則發熱煩燥夜則發熱煩燥是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

晝則發熱煩燥夜則發熱煩燥是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

晝則發熱煩燥夜則發熱煩燥是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

晝則發熱煩燥夜則發熱煩燥是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

晝則發熱煩燥夜則發熱煩燥是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

晝則發熱煩燥夜則發熱煩燥是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

晝則發熱煩燥夜則發熱煩燥是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

晝則發熱煩燥夜則發熱煩燥是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

晝則發熱煩燥夜則發熱煩燥是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

肝熱者輕手捫之... 手重者其間熱之肌肉... 收無氣以動溼也

肝熱者重按之肌肉之下... 其脉絃四肢滿則便難轉筋多怒多驚四肢困熱筋疼不能起于床瀉青丸柴胡飲子

腎熱者輕手重手俱不熱如重手按手骨分其熱... 其人骨蒸蘇如虫蝕其骨困熱不任亦不能起于床瀉腎丸六味地黄丸

必瀉求責

假令治痰無問傷寒畜息結脊發黃等諸證并一切雜證等名當於六經中求責之謂如黃證或頭痛腰痛有強惡寒即有太陽証也或身熱目痛鼻乾不得臥即有陽明証也餘皆倣此





