


傷寒要旨藥方

一

據中國國家圖書館藏宋乾
道七年姑孰郡齋刻本影印
原書版框高十七·九釐米
寬十四·一釐米



張明正印

張明正印

張明正印

張明正印



芍藥甘草附子湯第二十七

茯苓四逆湯第二十八

五苓散第二十九

茯苓甘草湯第三十

猪苓湯第二十一

梔子豉湯第三十二

梔子甘草豉湯第三十三

梔子生薑豉湯第三十四

梔子乾薑湯第三十五



梔子厚朴湯第三十六

真武湯第三十七

禹餘糧圓第三十八 本方關

四逆湯第三十九

小柴胡湯第四十

大柴胡湯第四十一

小建中湯第四十二

柴胡加芒硝湯第四十三

柴胡加龍骨牡蠣湯第四十四

要方下

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆

湯第四十五

桂枝加桂湯第四十六

桂枝甘草龍骨牡蠣湯第四十七

桃核承氣湯第四十八

抵當湯第四十九

抵當圓第五十

大陷胃圓第五十一

大陷胃湯第五十二

小陷胃湯第五十三

文蛤散第五十四

柴胡桂枝湯第五十五

柴胡桂枝乾薑湯第五十六

十棗湯第五十七

半夏瀉心湯第五十八

大黃黃連瀉心湯第五十九

附子瀉心湯第六十

生薑瀉心湯第六十一

甘草瀉心湯第六十二

赤石脂禹餘糧湯第六十二

旋復代赭湯第六十四

桂枝人參湯第六十五

瓜蒂散第六十六

白虎湯第六十七

黃芩湯第六十八

桂枝附子湯第六十九

去桂加白朮湯第七十
別本無

甘草附子湯第七十一

炙甘草湯第七十二

大承氣湯第七十三

小承氣湯第七十四

調胃承氣湯第七十五

茵陳蒿湯第七十六

吳茱萸湯第七十七

麻子仁圓第七十八

梔子蘘皮湯第七十九

要旨

七

北

麻黃連軹赤小豆湯第八十

麻黃細辛附子湯第八十一

麻黃附子甘草湯第八十二

黃連阿膠湯第八十三

附子湯第八十四

桃花湯第八十五

猪膚湯第八十六

炙甘草湯第八十七

苦酒湯第八十八

半夏湯第八十九 一本多散及二字

白通湯第九十

白通猪膽湯第九十一

通脉四逆湯第九十二

四逆散第九十三

烏梅圓第九十四

當歸四逆湯第九十五

當歸四逆加吳茱萸萸生薑湯第九十六

麻黃升麻湯第九十七

乾薑黃芩黃連人參湯第九十八

白頭翁湯第九十九

四逆加人參湯第一百

理中圓作湯加減法見本方第一百一

通脉四逆加猪膽湯第一百二

燒禪散第一百三

枳實梔子湯第一百四

牡礪澤瀉散第一百五

竹葉石膏湯第一百六

蜜煎第一百七

白圓子第一百八 別本無此方

已上方計一百八道

別本方計一百十二道 有桂枝加葛根湯 白散

桔梗湯 黃連湯 芍藥甘草湯 猪胆汁方

傷寒要旨藥方目錄

崇禎甲申元宵蝶菴孫道兄見惠向
置亂卷中庚戌端節後雨如瀑布檢

出裝好補方六道以備參考云

桂枝加葛根湯

桂枝二分 芍藥二分 甘草一分 生姜三分 大棗十二枚 葛根四兩

白散

桔梗三分 貝母三分 巴豆一分

桔梗湯

桔梗一分 甘草二分

黃連湯 大棗十二枚

黃連 甘草 乾姜 桂枝 各三分 人參二分 半夏半升

芍藥甘草湯

芍藥 甘草 各四兩

猪胆汁方

大猪胆一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一
食頃當大便出



傷寒要旨藥方



桂枝湯第一

鹿末



桂三兩

芍藥三兩

甘草二兩

每服五錢水一盞半入生薑五片棗二箇同煎至一盞去滓服須臾喫熱稀粥一盞溫覆令一時許遍身熱熱微汗不可令如水流離病必不除若一服汗出病差停後服不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令盡三服若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病猶在者更服汗若不出服至二三劑

桂枝加厚朴杏仁湯第二

厚朴二兩

杏仁一百五十粒餘同本方

桂枝加附子湯第三

附子一枚炮去皮尖切八片餘同

本方今合用三枚恐多斟酌之

要旨方

十

後

桂枝去芍藥湯第四

桂枝湯中但去芍藥餘同本方

桂枝去芍藥加附子湯第五

桂枝加附子湯中但去芍藥餘同桂枝加附子湯方

桂枝麻黃各半湯第六 鹿末

麻黃一兩半 桂一兩

甘草半兩 杏仁一百五箇

甘草杏仁更加一半

梨膏方

每服五錢水一盞半煎至一盞去滓服覆取微汗

桂枝二麻黃一湯第七 鹿末

麻黃一兩 桂二兩

甘草一兩 杏仁二百十箇

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服覆取微汗

桂枝二越婢一湯第八 鹿末

桂枝 芍藥 甘草 各半兩

石膏

六錢 搥碎

麻黃

半兩

每服五錢水一盞半生薑四片棗一箇煎八分去滓溫服

桂枝去桂加茯苓白朮湯第九 鹿末

茯苓四兩

白朮

甘草

各二兩

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服

桂枝加芍藥湯第十 鹿末

芍藥六兩

甘草

桂

各二兩

每服五錢水一盞半入生薑五片棗二

箇同煎至一盞去滓服

桂枝加大黃湯第十一 鹿末

桂三兩

芍藥六兩

甘草二兩

大黃二兩

每服五錢水一小盞半入生薑五片棗子二箇同煎至一盞去滓服

甘草乾薑湯第十二 鹿末

甘草四兩

乾薑二兩

每服五錢水一盞半煎至一盞去滓服

葛根湯第十三 鹿末

葛根四兩 麻黃三兩

桂二兩 甘草二兩

芍藥二兩

每服五錢水一小盞半生薑五片棗二

枚同煎至一盞去滓服取微汗金匱芍

藥三兩

葛根加半夏湯第十四 鹿末

前葛根湯中加半夏二兩半餘同本方

葛根黃連黃芩湯第十五 鹿末

葛根半斤 甘草二兩

黃連三兩 黃芩三兩

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服

麻黃湯第十六 鹿末

麻黃三兩 桂二兩

甘草一兩 杏仁二百一十箇

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓

服覆取微汗

大青龍湯第十七 鹿末

麻黃六兩 桂二兩

甘草二兩 生薑三兩

杏仁四十箇 大棗十枚

石膏一塊 如鷄子大

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉粉之一服汗者停後服若復汗出多亡陽遂一作逆

鼎前方

虛惡風煩躁不得服也

小青龍湯第十八 鹿末

麻黃 芍藥

細辛 乾薑

甘草 桂 各二兩

五味子半升 半夏二兩半

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服加減法若渴去半夏加苦蕒根三兩若微利去麻黃加茺花如一鷄子大熬赤

色若噎者去麻黃加附子一枚炮小便

不利者去麻黃加茯苓若喘者去麻黃加杏仁

乾薑附子湯第十九 鹿末

乾薑一兩 附子一枚 生用去皮切八片

右二味用水三升煮取一升去滓頓服

新加湯第二十 鹿末

桂三兩 芍藥四兩

生薑四兩 甘草二兩

人參三兩 大棗十二枚 擘破

藥言方

主

煮

右六味以水一斗二升煮取三升去滓

溫服一升本云桂枝湯今加芍藥生薑

人參

麻黃杏子甘草石膏湯第二十一 鹿末

麻黃四兩 杏仁五十箇

甘草二兩 石膏半斤 碓碎綿裹

右四味以水七升煮麻黃減二升去上

沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升本

云黃耳杯

白虎加人參湯第二十二 鹿末

知母六兩 石膏一斤

甘草二兩 人參三兩

每服五錢水一小盞半入粳米同煎至一盞去滓服

桂枝甘草湯第二十三 鹿末

桂四兩 甘草二兩

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服

茯苓桂枝甘草大棗湯第二十四 鹿末

茯苓半斤 桂四兩

甘草二兩

每服五錢入棗三枚水一盞半煎至一盞去滓服用甘爛水煎甘爛水法取水一斗置大盆中以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

厚朴半夏生薑人參湯第二十五 鹿末

厚朴半斤 半夏四兩

甘草二兩 人參一兩

每服五錢水一小盞半入生薑十片煎至一盞去滓服

茯苓桂枝白朮甘草湯第二十六 鹿末

茯苓四兩 桂三兩

白朮二兩 甘草二兩

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服

芍藥甘草附子湯第二十七 鹿末

芍藥三兩 甘草二兩

附子一枚

要方

十一

方

右三味以水五升煮取一升五合去滓分溫三服疑非仲景方

茯苓四逆湯第二十八 鹿末

茯苓四兩 人參一兩

甘草二兩 附子一枚 生用

乾薑一兩半

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服

五苓散第二十九

猪苓三分 去皮 赤茯苓

白朮

各三分

桂半兩

去皮

澤瀉一兩一分

並為細末

每服方寸匕白湯調日三服多飲煖水汗出愈

茯苓甘草湯第三十 鹿末

茯苓四兩 桂三兩

白朮二兩 甘草二兩

每服五錢水一盞半煎至一盞去滓服

猪苓湯第三十一 鹿末

猪苓 去皮 赤茯苓

澤瀉 滑石 各一兩

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓入炙過阿膠二片服

梔子豉湯第三十二 鹿末

梔子十四箇 擘 香豉四合 綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分為二服溫進一服得吐時止後服

梔子甘草豉湯第三十三

梔子十四箇擘甘草二兩炙

香豉四合綿裹

右三味以水四升先煮梔子甘草取二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

梔子生薑豉湯第三十四

梔子十四箇擘生薑五兩

香豉四合綿裹

右三味以水四升先煮梔子生薑取二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

梔子乾薑湯第三十五鹿末

梔子十四箇擘乾薑二兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

梔子厚朴湯第三十六

梔子十四箇擘厚朴四兩去皮炙

枳實四枚

水浸多
令黃

右三味以水三升半煮取一升半去滓
分二服溫進一服得吐者止後服

真武湯第三十七

鹿末

茯苓二兩

芍藥二兩

白朮二兩

附子一枚

今合用
三枚

每服五錢水一盞半入生薑五片同煎
一盞去滓服

加減法若欬者加五味子半升細辛乾

要方

六

上經

薑各一兩若小便利者去茯苓若下利
者去芍藥加乾薑二兩若嘔者去附子
加生薑足前成半斤

禹餘糧圓第三十八

本方
開

四逆湯第三十九

鹿末

甘草二兩

乾薑一兩半

附子一枚

生用

每服四五錢水一小盞半煎至一盞去
滓服

小柴胡湯第四十 鹿末

柴胡半斤 黃芩三兩

人參三兩 半夏二兩半

甘草三兩

每服五錢水一小盞半入生薑五片棗
二枚同煎至一盞去滓服

加減法若胃中煩而不嘔去半夏人參
加苦薑實一枚若渴去半夏加人參合
前成四兩半苦薑根四兩若腹中痛去

要方

十一

七

黃芩加芍藥三兩若脇下痞硬去大棗
加牡礪四兩若心下悸小便不利者去
黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者
去人參加桂三兩溫覆微汗愈若欬者
去人參大棗生薑加五味子半升乾薑
二兩

大柴胡湯第四十一 鹿末

柴胡半斤 枳實二十四片

黃芩三兩 芍藥二兩

半夏二兩半 大黃二兩

每服四五錢水一小盞半入生薑五片棗二枚煎至一盞量病輕重虛實為劑得下勿再服

小建中湯第四十二 唐末

桂三兩 甘草二兩

芍藥六兩

每服五錢水一盞半入生薑五片棗二枚煎成入膠飴一大匙膠飴稠飴也

要方本

二二二

三二八

柴胡加芒硝湯第四十三 唐末

柴胡二兩三分 黃芩二兩

人參二兩 甘草二兩

芒硝二兩 半夏三分半

每服五錢水一盞半入生薑五片棗二枚煎至一盞去滓服一方芒硝三合大黃四兩桑螵蛸五枚

柴胡加龍骨牡蠣湯第四十四 唐末

柴胡四兩 龍骨

黃芩

鈔丹

人參

茯苓

各一兩半

半夏一兩一分

大黃二兩

每服五錢水一盞半入生薑五片棗二枚煎至一盞去滓服

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆

湯第四十五

鹿末

桂三兩

去皮

甘草二兩

生薑三兩

大棗十二枚

要方

十三

支

牡蠣五兩

蜀漆三兩

龍骨四兩

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二

升內諸藥煮取三升去滓服一升本云

桂枝湯去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨

桂枝加桂湯第四十六

鹿末

桂枝湯中更加桂二兩并舊成五兩

桂枝甘草龍骨牡蠣湯第四十七

鹿末

桂一兩

甘草二兩

牡礪二兩

龍骨二兩

每服五錢水一盞半煎至一盞去滓服

桃核承氣湯第四十八 鹿末

桃仁一百五十箇

去皮尖

大黃四兩

桂二兩

甘草二兩

芒硝二兩

每服四五錢水一盞半煎至一盞去滓

服量輕重虛實為劑得下勿再服

抵當湯第四十九

鹿末

水蛭三十箇

熬

蝨蟲三十箇

去翅足熬

桃仁二十箇

去皮尖

大黃三兩

酒洗

右四味以水五升煮取三升去滓溫服

升不下更服

抵當圓第五十

水蛭二十箇

熬

桃仁二十五箇

去皮尖

大黃三兩

蝨蟲二十箇

去翅足熬

右四味搗分四圓以水一升煮一圓取

七合服之晬時當下不下更服

大陷胃圓第五十一

大黃半斤

苦葶藶子半升熬

芒硝半升

杏仁半升

去皮尖

右搗羅上二味內杏仁芒硝各研如脂和散如彈子圓一枚別搗甘遂末一錢白蜜二合水二盞煎至一盞溫頓服之一宿乃下不下更服取下為効甘遂性猛宜斟酌量虛實服之

大陷胃湯第五十二

要言

二五

毛月

大黃六兩

芒硝一升

甘遂一錢匕

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

小陷胃湯第五十三

鹿木

黃連一兩

半夏半升

洗

苦葶藶實一枚

右三味以水六升先煮苦葶藶取三升去

滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服

文蛤散第五十四

文蛤五兩

右一味為散以沸湯和一方寸匕服用
五合

柴胡桂枝湯第五十五

柴胡四兩

黃芩一兩半

人參一兩半

甘草一兩

芍藥一兩半

桂一兩半

半夏一兩半

每服五錢水一盞半入生薑五片棗二枚煎至一盞去滓服

柴胡桂枝乾薑湯第五十六

鹿末

柴胡半斤

桂三兩

乾薑二兩

苦薑根四兩

黃芩三兩

牡礪二兩熬

甘草二兩炙

右七味以水一斗二升煮取六升去滓

再煎取三升温服一升日三服勿服微
煩復服汗出便愈

十棗湯第五十七

芫花 熬

甘遂

大戟 各等分

右三味搗為散以水一升半先煮大棗
肥者十枚取八合去滓內藥末強人服
一錢匕羸人服半錢温服之平旦服若
下少病不除者明日更服加半錢得快

要方

二十七

經

下利後糜粥自養

半夏瀉心湯第五十八 麩末

半夏半升 洗 黃芩

乾薑 人參

甘草 各二兩 黃連一兩

大棗十二箇

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎
取三升温服一升日三服須大陷胃湯
者方用前第二法一方用半夏一升

大黃黃連瀉心湯第五十九 鹿末

大黃二兩 黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服林億注加黃芩一兩此法當是

附子瀉心湯第六十 鹿末

大黃二兩 黃連一兩

黃芩一兩 附子一枚 炮去皮破別煮取汁

右四味切三味以水沸湯二升漬之須

臬絞去滓內附子汁分溫再服

生薑瀉心湯第六十一 鹿末

甘草 人參

黃芩 各三兩 乾薑一兩

黃連一兩 半夏二兩半

每服五錢水一小盞半入生薑七片棗二枚煎至一盞去滓再煎膠散溫服

甘草瀉心湯第六十二 鹿末

甘草二兩 炙 黃芩

乾薑

各一兩半

半夏一兩一分

大棗六枚

黃連半兩

人參半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服

赤石脂禹餘糧湯第六十三

赤石脂一斤碎太一禹餘糧一斤碎

右二味以水六升煮取二升去滓分溫三服

要前方

二十九

卷之三

旋復代赭湯第六十四 鹿末

旋復花三兩 人參三兩

代赭石一兩 甘草三兩

半夏二兩半

每服五錢水一小盞半入生薑五片棗二枚煎至一盞去滓服

桂人參湯第六十五 鹿末

桂枝四兩 甘草四兩

人參三兩 水三兩

乾薑三兩

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服
瓜蒂散第六十六

瓜蒂一分熬黃赤小豆一分

右件二味各別搗篩為散已合治之取
一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作
稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者
少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可
與瓜蒂散

要方

三十一

乾

白虎湯第六十七鹿末

知母六兩 石膏一斤

甘草二兩

每服五錢水一小盞半入粳米同煎至
一盞去滓服

黃芩湯第六十八鹿末

黃芩三兩 芍藥二兩

甘草二兩炙 棗十二箇擘

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服

一升日再夜一服

桂枝附子湯第六十九 鹿末

桂枝四兩 去皮 附子三枚 炮去皮破

生薑三兩 切 大棗十二枚 擘

甘草二兩 炙

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

去桂加白朮湯第七十

於前方中但去桂加白朮四兩餘同本方

要言

三二

劉全

甘草附子湯第七十一 鹿末

甘草二兩 炙 附子二枚 炮去皮破

白朮二兩 桂四兩 去皮

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗止復煩者將服五合恐一升多者宜服六七合為始

炙甘草湯第七十二

甘草四兩 人參二兩

桂三兩

麥門冬半升

麻仁半升

生地黄一斤

切如豆
無即用

生乾地
黃五兩

每服五錢至七錢入生薑五七片棗三

枚以清酒一盞水半盞同煎至一盞去

滓入炙過阿膠二片再煎膠散溫服

大承氣湯第七十三

鹿末

大黃四兩

厚朴半斤

枳實三十片

芒硝三合

重三兩

要方

十二

每服四五錢水一小盞半煎至一盞去

滓服量輕重虛實為劑得下勿再服此

藥太峻勿輕用之

小承氣湯第七十四

鹿末

大黃四兩

厚朴二兩

枳實大者十八片

每服四五錢水一小盞半煎至一盞去

滓服量病輕重人虛實為劑得下勿

再服

調胃承氣湯第七十五 鹿末

甘草二兩 芒硝半升

大黃四兩

每服四五錢水一小盞半煎至一盞去滓服量輕重虛實為劑得下勿再服

茵陳蒿湯第七十六 鹿末

茵陳蒿六兩 山梔子四十箇

大黃二兩

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓

要方

三三

三川

服小便當便如皂莢汁一宿腹減黃從小便去也

吳茱萸湯第七十七 鹿末

吳茱萸一升 湯洗十遍 人參三兩

每服四錢水一小盞半入生薑十片棗二枚煎至一盞去滓服

麻子仁圓第七十八

麻子仁二升 芍藥半斤

枳實半斤 大黃一斤 去皮

厚朴一尺

去皮炙

杏仁一升

去皮尖熬別研

右六味蜜和為圓如梧桐子大每服十圓日三服米飲下漸加以知為度

梔子蘘皮湯第七十九

鹿末

甘草一兩

黃蘘二兩

山梔子四十五箇

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服

麻黃連軹赤小豆湯第八十

鹿末

麻黃二兩 去節 連軹一兩

要方

二十四

三

甘草二兩

杏仁四十箇

赤小豆一升 大棗十二枚

生梓白皮一升 切 生薑二兩

右八味以水一斗先煮麻黃再沸去土沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服半

日服盡

麻黃細辛附子湯第八十一 鹿末

麻黃二兩

細辛二兩

附子一枚

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去
上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升
日三服

麻黃附子甘草湯第八十二 鹿末

麻黃二兩 甘草二兩

附子一枚

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去
上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升
日三服

要方

三三五

黃連

黃連阿膠湯第八十三 鹿末

黃連四兩 黃芩一兩

芍藥二兩 鷄子黃二枚

阿膠三兩

右五味以水六升先煮三物取二升去
滓內膠洋盡小冷內鷄子黃攪令相得
溫服七合日三服

附子湯第八十四 鹿末

附子一枚 炮去皮 茯苓一兩半

人參一兩

白朮二兩

芍藥一兩半

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至七分去滓溫服日三服

桃花湯第八十五

鹿末

赤石脂半斤碎乾薑一兩哎咀

每服四錢入粳米一撮水一小盞半煎至一盞去滓再入赤石脂末以方寸匕日三服若一服愈餘更勿服

猪膚湯第八十六

鹿末

猪膚半斤水五升煮二升去滓入白蜜半升白米粉二合半炒香和令相得溫分六服

甘草湯第八十七

甘草二兩

右剉如麻豆大每服抄四錢匕水一盞煮至六分去滓溫服日二服

苦酒湯第八十八

半夏十四枚

洗破如棗核大

鷄子一枚

去黃內上苦酒著鷄子殼中

右二味內半夏著苦酒中以鷄子殼置刀環中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑

半夏湯第八十九

鹿末

半夏

洗

桂枝

去皮

甘草

炙各等分

每服四五錢水一盞半煎至一盞去滓

要方

三十一

劉全

少冷少少嚥之

白通第九十

葱白四莖

乾薑一兩

剉

附子一枚

生去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

白通猪膽湯第九十一

葱白四莖

乾薑一兩

剉

人尿五合

猪膽汁一合

附子一枚

生去皮
破八片

右五味以水三升煮取一升去滓内膽汁人尿和令相得分温再服若無膽汁亦可用

通脉四逆湯第九十二 鹿末

甘草二兩 炙

乾薑三兩

強雄人
四兩

附子一枚

生去皮
破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服其脉即出者愈面色赤者加

要方

十八

通脉

葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔者加生薑二兩咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加人參二兩病皆與方相應者乃服之

四逆散第九十三

甘草 炙

枳實

破水浸
炙乾

柴胡

芍藥

各一
兩

右四味為細末白米飲和服方寸匕日三服欬者加五味子乾薑各五分并主

下利悸者加桂枝五分小便不利者加茯苓五分腹中痛者加附子一枚炮令坼泄利下重者先以五升水煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升半分溫再服

烏梅圓第九十四

烏梅二百二十箇

細辛一兩半 乾薑二兩半

桂二兩 川椒一兩

要方

二十九

卷之

人參二兩 黃蘗二兩

附子二兩 當歸一兩

黃連四兩

右九味為細末將烏梅用醎醋浸一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得曰中與蜜杵二千下如梧桐子大食前飲下十圓日三服稍加至三十圓

當歸四逆湯第九十五 鹿末

當歸

桂

芍藥

細辛

各三兩

甘草

木通

各二兩

每服五錢水一小盞半入棗三枚煎至一盞去滓服

當歸四逆加吳茱萸生薑湯第九十六

當歸三兩

芍藥三兩

甘草二兩

木通二兩

桂枝三兩

細辛三兩

生薑半斤

吳茱萸二升

要旨方

四

黃寔

大棗二十五枚

並為鹿末

右九味以水六升清酒六升和煮取五升去滓溫分五服一方水酒各四升

麻黃升麻湯第九十七

鹿末

麻黃二兩半

去節

升麻一兩一分

當歸一兩一分 知母

黃芩

萎蕤

各三分

芍藥

麥門冬

去心

桂枝

茯苓

甘草

石膏

碎綿裹

白朮

乾薑

各一分

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服取汗出愈

乾薑黃芩黃連人參湯第九十八

右四物等分為麋末每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服

白頭翁湯第九十九 鹿末

白頭翁二兩 黃蘗

黃連

秦皮 各三兩

每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服

四逆加人參湯第一百

前四逆湯中加人參一兩餘同本方

理中圓作湯加減法見本方第一百一

人參

甘草

乾薑

白朮 各三兩

右為細末蜜和圓如雞頭黃大以沸湯數合研一圓溫服日三夜一作湯煎服

更佳

加減法若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者還用朮悸者加茯苓二兩渴欲得水者加朮足成四兩半腹中痛者加人參足前四兩半寒者加乾薑足前四兩半腹滿者去朮加附子一枚溫服後如食頃飲熱粥一盞許微自溫勿發揭衣被又千金霍亂轉筋者加石膏

通脈四逆加豬膽湯第一百二 鹿末

甘草二兩 炙 乾薑三兩 炮

附子一枚 大者生用 破八片

豬膽汁半合

右三味以水三升煮取一升一合去滓內豬膽汁分溫再服其脈即來無豬膽以羊膽代之

燒禪散第一百二

婦人中禪近隱處取燒灰

右一味水服方寸匕日三服小便即利
陰頭微腫此為愈矣婦人病取男子禪
燒服

枳實梔子湯第一百四

枳實三箇

炙

梔子十四箇

擘

豉一升

綿裹

右三味以清漿水七升空煮取四升內
枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸
去滓溫分再服覆令微似汗若有宿食

要方

四十二

七

者內大黃如博碁子五六枚服之愈

牡礪澤瀉散第一百五

牡礪

澤瀉

蜀漆

煖水洗
去腥

葶藶子熬

商六根

熬

海藻

洗去
鹹

苦萋根

各等
分

右為細末更治之白飲和服方寸匕日
三服

竹葉石膏湯第一百六

鹿末

石膏一斤 半夏二兩半
人參二兩 甘草二兩

麥門冬一升

每服五錢水一小盞半入竹葉十片粳米一撮煎至一盞去滓溫服。

蜜煎第一百七

食蜜七合

右一味於銅器內微火煎當須凝如飴狀攪之勿令焦著欲可圓併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之疑非仲景已試甚良又大猪膽一枚瀉汁和少許法醋以灌穀道內如一食頃當大便出宿食惡物甚効

白圓子第一百八

滑石末飯爲圓如桐子大每服十圓微嚼破新水嚥下立止只以末一錢飯少許同嚼水下亦得不以老幼皆可服

傷寒要旨藥方卷終

是跋不知何人所書指為明初年刻本
蓋翁跋之信為宋本字樣見第二冊跋
語



右傷寒要旨一卷藥方一卷

乾道辛卯歲刻于姑孰郡齋

南宋孝宗朝乾道七年鐫板紙乃白宋版也宜實之
即非宋板亦是明朝初年書不可因其不
全而輕廢之 甲申正月十有六日記

陽旦湯 桂枝湯中加炙 再加乾姜即名陽旦



