

經史證類備急本草

十

經史證類備急本草卷第七

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本經白

二種名醫別錄墨

續注

二種唐本先附

注云
唐附

五種唐本餘

十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下正唐謹微續證類

藍寶

深青布

蘿蔔

黃連

續注

錦葵芳

木

葛根

續注

白水耆赤水

蓮常春蕪寧續注

方風

菜附花開

芒芸

續注

葛根

開枝

漏蘆

續注

葛根

開枝

決明子

續注

飛廉

開枝

白芍根

續注

葛根

開枝

忍冬

根續注

葛根

開枝

千歲藟

根續注

葛根

開枝

葛根

根續注

留軍待

地不容

獨馬將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寡婦薦

自經死繩

刺蜜

骨路支

長松

含子草

福州馬藍


證類本草六

二

醫士



江陵府吳藍



蜀州藍葉

證類本草七

三

藍寶



五百主

證類本草七

四

張仁

其葉上殺百藥毒解狼毒射罔毒其葉

葉可以染青生河內平澤

閩隱居

云此即今染織藉碧所用者

浣繹布汁以解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂蠻毒唐云藍寶有三種一種圓徑二十許厚三四分出嶺南云療毒腫太常名

此草為木藍子如陶所引乃是菘藍其汁抨搘更為澱澱者按經所用乃是蓼藍實也其苗似蓼而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍今並

以赤菘藍為澱惟搘染青其蓼藍不堪為澱惟作碧色爾

國經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑色今所在下濕地有人比

種之

六歲馬藍注今大葉冬藍也疏今為澱者是也

云藍寶具

味甘能填骨髓明耳目利五藏調六腑利關節治經絡中結氣使人健少睡

益心力藍汁止心煩躁解蠭毒

云吳藍味苦甘冷無毒治天行熱狂

丁瘡遊風熱毒腫毒風疹除煩止渴殺疳解毒藥毒箭金瘡血悶蟲蛇傷毒

刺臙洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼產後血運解金石藥毒解狼毒射罔毒小

兒丹熱和水服之藍有數種蓼藍最堪入藥甘藍比人食之去熱黃也

又傳惡瘡經年不差以水及灸瘡止血令不中風水和蠟熏惡瘡入水不重

藍澱寒傳執蘆解諸毒李傅小兒禿瘡熱初作上沫堪塗如青黛解毒小兒丹熱和水服之藍有數種蓼藍最堪入藥甘藍比人食之去熱黃也

青布味鹹寒主解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作

灰傳惡瘡經年不差以水及灸瘡止血令不中風水和蠟熏惡瘡入水不重

勦殺蟲熏虎狼咬瘡出水毒又於器中燒令煙出以器口熏人中風水寒露等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥療丁腫狐刺等惡瘡又浸汁和生薑煮服止霍亂真者入用假者不中

圖經曰

藍實生河內平澤今處處有之人家蔬圃中作畦種蒔三月四月

月六月採實按藍有數種有木藍出嶺南不入藥有松藍可以爲漿者亦名馬藍爾雅所謂歲馬藍是也有蓼藍但可染碧而不堪作漿即醫方所用者也又福州有一種馬藍四十日根白葉類苦益菜土人連根採焙擣下從酒服錢七治婦人敗血甚佳又江寧有一種吳藍二三月乃生如嵩狀葉青花白性寒去熱解毒止吐衄此二種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并附之後漢趙岐云藍賦其序云余就醫復師道經陳留此境人皆以種藍染紺爲葉或曰赤藍亦是毒者即并細服其汁神異之極也昔張薦貞外在劍南爲張延賞判官忽被班蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從首前下至心經兩宿頭面腫疼如數外盃大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家田五百千井薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信故驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大蓋汁一盞盜取蜘蛛投之蓋汁良方士得汁中其困不能動又別搗藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至午而死又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取蜘蛛投汁中隨化爲水張相及諸人甚異之遂令點

證類本草七

五

王叔

聖惠方

治時氣熱毒心神煩躁用藍

又方

熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煮葛根令濃汁以洗瘡日十度并擣葛根爲

千金

於咬處兩日內悉平愈但咬處作小瘡而落如舊又中品著青黛條方從胡

來及太原廬陵南康等處亦傳熱毒等處染瓮上池沫紫褐色若同青黛出

散煮葛根汁服方

抱取心下猶溫者刺雞冠血

滴着口中即活也

雌雄

散煮葛根汁服方

十七日五服差

取藍殼搗取汁洗不過三日差

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

日十度夜四度差

又方

陰易瘡多癰重小便急難上衝胃頭重不能舉眼

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

兩頭尖者二十七枚煮取

葛氏方

治瘡口令煙熏入瘡中佳

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

二外盡服之溫覆取汗

葛氏方

治瘡口令煙熏入瘡中佳

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

兩頭尖者二十七枚煮取

葛氏方

治瘡口令煙熏入瘡中佳

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

口數日欲死

取葛根煎一升日二千金羹

治急症

中水清擣藍青汁以少


又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍

又方

州僧病瘧不下食告弟子吾死之後便可開吾脣疾視有何物言終而卒子依言而開視脣中得一物形似魚而有兩頭遍體是肉鱗弟子致器中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中盛作漿水病僧以漿致器中此虫遂遶器中走湏臾化爲水

鳳翔府考覈



百六

永康軍考覈

證類本草七

六

三四



苦蘿

無毒

風

寒

筋

瘡婦

除

腦

動

面

遊

風

去

目

多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛

脅風痛溫中內寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生

武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾

得細辛薺金瘡止痛得桂橘療風頭

吐逆白芷爲之使陶隱居云今惟出歷陽節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎
俗方多用道家時須爾胡居士云武功去長安二百里正長安西與扶風狄
道相近斜谷是長安西嶺下去長安一百八十里山連接七百里

云

今出秦州其人間種者形塊大重實多脂潤山中採者瘦細未若干以九月
十月採爲佳今云三月四月虛惡非時也陶不見秦地芎藭故云出歷陽

歷陽出者今不復用

目高錫等著本草圖經云苗似芥胡荽蛇牀輩叢生

花白今出秦州者爲善九月採根乃佳

云

赤如葵本冬夏叢生五月華亦一月實黑莖端兩葉三月採根有節似馬銜
狀

云

芎藭巨能治腰脚臥弱半身不遂主胞衣不生治腹內冷痛

目

華王云畏黃連治一切風一切熱一切勞損一切血補五勞壯筋骨調眾脈

目

于廿四

證類本草七

七

苟中

破癩結宿血養新血止肉覃牡吐血及崩漏

排膿消瘀

圖經曰古今關陝蜀川江東山

多有之而以蜀川者爲勝其苗四五月間

生葉似芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細淮南子所謂夫亂人皆若芎藭之與葵

其葉作飲香云可以止泄渴七八月開白花根堅瘦黃黑色三月四月採暴

乾一云九月十月採爲佳三月四月非時也閑中出者俗呼爲京芎並通用

惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀腦芎此最有力也蘇蕪一名蘄

字

享

單用芎藭含咀以主口齒疾近世或蜜和作指大丸欲寢服之治風痰殊佳

至五分去滓入生地黃汁二合煎三兩沸食前分二服

靈芝方治婦人崩中十血晝夜不止以芎藭一兩剉酒一大盞煎

兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙杵爲末煉蜜爲丸小如小彈子大不拘時茶酒嚼下一丸

治胎忽因倒地忽舉動擎重促損腹中不安及子死

腹中以芎藭爲末酒服方寸匕須臾一二服立出

金力煎取二升半分一服不耐者徐徐進之

治頭風化痰

斗門方

治偏頭疼用京芎細剉酒浸服之佳

續十全方

御

藥院方真宗賜高祖相國去疾清目進飲食生犀九川芎十兩緊小者粟米泔浸三日薄切片子日乾爲末作兩料每料入麝脑各一

八分生犀牛半兩重湯煎蜜杵爲丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加朱砂半兩膈壅加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏眩加細辛一分口眼喎斜炮天南星

分春秋云

山芎蕷能去甲濕風氣

簡文帝勸吳良

麥麴芎蕷繞止河魚之腹

蘆薈

主風熱目赤翳膜

主風熱目赤翳膜

無毒

去風服

主身中老風頭中久風風眩

採葉暴乾

驕人借以爲醫方藥用甚稀

古今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香葉一種如蛇牀香氣相似用亦不殊爾

高陽等著本草云此有二種一種似芹

葉一類如蛇牀香氣相似用亦不殊爾

一名荊離芎蕷苗也

生雍州川澤及冤句四月五月

採葉暴乾

驕人借以爲醫方藥用甚稀

古今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香葉一種如蛇牀香氣相似用亦不殊爾

高陽等著本草云此有二種一種似芹

圖經曰

蘆蕷說文已具芎蕷條下

廣志曰

蘆蕷香草魏武帝以藏衣中

管子曰

五沃之土生蘆蕷

郭璞贊曰

蘆蕷香草亂之蛇牀不墮

其貴自烈以芳

澧州黃連

證類本草七

八

三十三



宣州黃連



證類本草七

九

四庫

黃連
微寒無毒
熱氣冒痛
傷寒
渴大驚除水利
肯調胃厚腸益膽
療口瘡

名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月

採

黃連龍骨理石爲之使巫陽二光花玄參白鮮畏欒文勝烏頭解巴豆
云巫陽在達平今西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最

勝臨海諸縣者不佳用之當布裹按去毛令如連珠俗方多取下附及渴道
方服良長生

云蜀道者葛藤大節平味極濃苦寒渴道最江東者節如

連珠麻大葉今湖州者更勝

醫家見用宣州九節堅重相較有聲者
云苦似細茶花苦根生一莖生三葉高尺許

冬不凋江左者節直不連珠蜀郡者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳
云黃連草一名十一種惡白蘋蠶忌猪肉惡冷水殺小兒疳蟲熟赤眼
昏痛鎮肝去熱毒

云主羸瘦氣急

肉止血并疗於盜汗天行熱
疾壯壯茎爲丸治小兒疳氣

圖經曰黃連生巫陽川谷及蜀郡秦山今江湖荆襄州郡亦有而以宣城
者爲勝產熟者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黃色六

月結實似芥子色亦黃二月八月採根用生江左者根苦連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開化作細穗淡白微黃色六七月根繁哈堪採古方以黃連爲治痢之最胡治方載九盛湯主下痢不問冷熱赤白穀帶休息久下悉主之以黃連長三寸三十枚秤重一兩半龍骨如葵子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠一兩半並切先以水五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸止又上水五合如此九上九下內諸藥著火上沸輒下著土上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止又杳連九亦主下痢近此盛行其法以宣連青木香分兩停同擣篩白蜜丸如梧子空腹飲下三十九日再如神其父令人即用煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手集方嬰孺用之亦効又治目方用黃連多矣而羊肝尤奇異取黃連末一大兩白羊子肝一具去膜同於沙盆內研令極細衆手燃爲丸如梧子每食以煨藥水吞二七枚連作五劑差但是諸眼目疾及障翳青盲皆王之禁食猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官尚一死罪囚出法之囚後累年以病自致死一旦崔爲內障所苦喪明逾年後半夜數息獨坐時聞告除間逐窄之聲崔問爲誰曰是昔所蒙活者至今故報恩至此也以此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方於此又今醫家洪眼湯以當歸子黃連等分停細以雪水或甜水煎濃汁乘熱洗冷即尋溫洗甚益眼目但是風毒亦日花翳等皆可用之其驗不可見眼目之病皆以耳鼻氣滯便汎故以行血藥合黃連治之血得熱即行

故乘熱洗之用者無不神妙

雷公云

凡使以布拭上肉毛止後用藥水浸三天時漉出以柳木火中焙乾用若服以藥得十兩不得食猪肉至三年不得食猪肉一

主百六十五

證類本草十七

十

生外臺秘要

治卒心痛黃連八兩一味㕮咀以小升片

也

未黃連乳汁

黃取五升

浸點酒中止

千金方

治大熱上

純血痢宣連六兩以水七升煎取二

升

外半夜

臨星月

下平旦空腹頓服之少卧封之

肘後

方

治眼淚不止濃

又方

亦

剝熱下

又

不

止黃連末雞子

差不差再服

服三十九

治年

又方

白

九

無服

十九

三十

九

而

差

再服

多薦黃連縮絲和

又方

治

卒

消

下當小紗痛

即

經

方

治

卒

消

各

一

兩

以水

一升

煎取

升

半

分

再

服

膚

小

便

服

三

十

九

而

差

再服

小豆末尤良

又方

治

卒

消

小豆

藥水三升慢火煎成膏白痴加酒半盞同煎每服半合溫米飲調下食前照

大合浸經宿微煎三四沸去滓食上水兩服如人行四五里再服

錢薑半錢和勻

空心溫酒下

子母秘錄

因驚風重胎動出血取黃連末酒服方寸匕日三服

孫尚藥同又方

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

七服量其大小每煎三分水減二分

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

七服量其大小每煎三分水減二分

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

廣利方

治骨節熱積漸黃瘦黃連四分等切以童子小便用

治氣痢漏裏急後重神妙方宣連

一兩乾薑半兩各爲末每用連二

錢薑半錢和勻

空心溫酒下

酒服方寸匕日三服

孫尚藥同又方

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

鼻下兩道赤者名曰瘡亦名赤蠶

以手摩之則利

蜜服

小兒耳後月蝕

蜜服

小兒耳後月

絡石

微寒無毒

大驚入腹除邪氣養筋

主腰髓寬痛取筋督利陽

通神

音

一名石蹉一名略石

陵

或高山巖石上或生人間正月採

杜仲牡丹爲之使惡鐵落畏
貝母昌蒲陶隱居云不識此

藥仙俗方法都無用者或云是石類既云或生人間則非石猶如石斛等繫
石以爲名爾本注云此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞樹
石側若在石間者葉細厚而圓短纏樹生者葉大而薄人家亦種之俗名耐
冬山南人謂之石血療產後血結大良以其包絡石木而生故名絡石別錄

謂之石龍藤主療蝮蛇瘻絞取汁洗之服汁亦去蛇毒心悶刀斧諸瘻封之
立差本草陳藏器本草云絡石生火炎汁服之主一切風寒白宣老在石者良在
木者隨木有功生山之陰與薜荔相似更有木蓮石血地錦等十余種藤並
是其類大略皆主風血暖腰脚亦白不衰若呼石血爲絡石殊誤雨石血葉
尖一頭赤絡石葉圓正青本草圖經云生木石間麥冬不周葉似細橘蔓延木石之陰莖節者處即生根鬚自絡石傍花白子黑子所生

證類本草十七卷

十二

王氏 祝先

有六月七月採莖葉日乾本草云絡石君君鐵精殺孽毒味甘平主治疾
痺陳藏器云地錦味甘溫無毒子破老血產後血結婦人瘦損不能以食腹
中有塊淋澀不尽赤白帶下天行六門並煎服之亦浸酒生淮南林下葉如
鴨掌藤蔓著地節處有根赤綠本草冬月不死山人產後用之一名地蘿蘇
恭注曰絡石石血亦此類也又扶芳藤味苦小溫無毒主一切血一切氣
一切冷去百病久服延年更白不老山人取楓樹上者爲附楓亦如桑上
寄生大主風血一名滂藤隋朝稠禪師作青飲進煬帝以止渴生吳郡采之
忌塚墓間者取莖葉細剉煎爲煎性冷以酒浸服藤苗小時如絡石薜荔黃
綠樹木三五十年漸大枝葉繁多葉圓長二三寸厚若石韋生子似蓮房中
有細子二年一熟子亦入用房破血一石木蓮打破有白汁停久如漆採取
無時也又土鼓藤味苦子味甘溫無毒主風血羸老腹內諸冷癰瘍腫

腳變白煮服浸酒服生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如珠碧色正圓小
兒取藤於地打作鼓声李邕名爲常春藤本草云木蓮藤
汁傳白癰瘍及風惡疥癬又常春藤一名龍鱗薜荔

圃經曰絡石生泰山川谷或石山之陰或高山巖上或生人間今在處有

周其莖蔓延莖節著處即生根鬚包絡石上以此得名花白子黑正月採或
云六月七月採莖葉日乾以石上生者良其在木上者隨木性而移薜荔木
連地錦石血皆其類也薜荔與此極相類但莖葉廣大如藤狀近人用其葉
治背癰乾木服之下利即愈木蓮更大如絲石其實若蓮房能壯陽道尤勝
地錦葉如薜荔葉有根亦綠木
石上石血極與外不同葉頭小大而赤耳

雷公云

凡採得後用簾布拭葉上莖蔓一毫了用熟甘草水浸一伏時出切日乾

外臺秘要

治喉瘡

咽喉寒

喘息不通須臾欲絕神驗以絡石草二兩水一升半煎取一盞去滓細細喫須臾即通

皆離

圖經云薜荔治背癱最項寓宜興縣張渚鎮有一老舉人聚村學年七十餘忽一日患發背村中無他醫藥急取薜荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以其滓傅療上後以他藥傅貼遂愈醫者云其本蓋得

薜荔之力乃知
圖經所載不妄



秦州薜荔子

三七八

證類本草七

十三

申

同州白熟梨



三
卷

證類本草

十四

五
曲

辛夷 微寒無毒
身體風痒頭痛逆傷肺腑瘦上煩下氣小兒頭
瘡癬腫陰癟可作藥粉其葉主風瘡可煮水服

**肌肉明見
氣血通流
人一名止衝
名疾**

羽一名升推一名即黎一名茨生馮翊平澤或道傍七

月八月採雲乾
無頭爲之實圓屬多生道上而葉有葉子在
刺狀如菱而小長安最饑人行多著木屐今軍家
乃尋載不之以而散落不平美方易云蒙子矣復言其
名爲鳥詩一齋有大不

刀鑄鑄作之以布商路亦可
刺藜子云據王漁藥書傷寒有此方
可掃也以刺梗穢也方用甚稀爾今按別本注云本經云溫別錄云寒此藥
性宣通久服不冷而無壅熱則其溫也
地黃生細葉子有三角刺人藥性論云白蒺藜子君味甘有小毒治諸風癰
瘍破宿血療吐膿主難產去躁熱不入湯用目華子云治費純腎氣肺氣
膈滿催生并墮胎益精療腫毒及水藏多小便多止遺瀝泄精弱血入帶不

言九散並

圖經曰

疾藜子生土馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾又冬採黃白色類草家鐵蒺藜此詩所謂牆有茨者郭璞注爾雅云布地蔓生繩

葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓縣布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作蒺子便可採其實味甘而微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又真馬藻子醋相類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之今人多用然古方云蒺藜子皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單餌蒺藜云不問黑白但取堅實者春去刺用兼主痔漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒中五尸擣蒺藜子蜜

丸服如胡豆二枚日三愈

金匱云

凡使採得後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木臼

聖靈方

臯

塞多年不聞脊臭水出不止以蒺藜二握當道車碾過以水一大盞煮取半盞仰卧先蒲口含飯以汁一合灌鼻中不過再灌之吐出一兩個葱肉似赤蛹蟲即差

外臺秘要

治急引腰脊痛壽老蚕和丸酒服如胡豆大二丸日三服

又方

補肝散治三十年失明蒺藜子七月

七日收陰乾擣散

又方

治腫疾蒺藜子炒令燒黑以鹽放布上前剪如腫大勿開頭搭上

日三服

又方

治一切丁腫蒺藜子一升作灰以鹽酢和封頭上如

破塗

又方

治急治小兒癰瘍瘻瘍身面即死以蒺藜擣葉傅之無葉用子亦可

日三服

又方

治一切丁腫蒺藜子一升作灰以鹽酢和封頭上如

食後水服方寸匕

又方

治蛇蟲心如刺吐清汁十七日一服

日三服

又方

治一切丁腫蒺藜子一升作灰以鹽酢和封頭上如

之佳

又方

治蛇蟲心如刺吐清汁十七日一服

日三服

又方

治一切丁腫蒺藜子一升作灰以鹽酢和封頭上如

梅蜀方

人食忌

治難產凝胎在腹中如已見兒并胞衣不出胎死蒺藜子

日母各四兩爲末米湯下一匙

相去四五里不下再服

又方

治白癲風以白蒺藜子生擣爲末作湯服之

生擣爲末作湯服之

神仙秘旨

服蒺藜子一碩當七八月熟時收日乾春去刺然後杵爲末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一年

已後冬不寒夏不熱服之二年老者復少緩白復黑齒落重生服之三年身

輕長

生

憲州黃耆



黃耆味甘微溫無毒。主癰疽久敗瘍，婦人子藏風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損，勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攀癰腫瘡瘍名戴椹一名獨椹一名支草一名蜀脂一名

百本生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾

惡龜甲

云第

一出隴西叨陽色黃白甜美今亦難得次用黑水宕昌者色白肌膚纏新者亦甘溫補又有蠶陵白水者色理勝蜀中者而冷補又有赤色者可作膏貼用消癰腫俗方多用道家不須唐宋云此物葉似羊齒或如蒺藜獨莖或作叢生今出原州及華原者最良蜀漢不復採用之

目高陽

圖

經云葉似羊齒草獨莖枝扶疎紫花根如甘草皮黃肉白長二三天許今原州者好宜州寧州者亦佳蜀漢不復採用之

云黃耆一名王孫治發背內補主虛喘腎襄耳聾瘡寒熱生隴西者下補五藏蜀白水赤皮者微寒此治客熱用之

云出原州華原谷子山花黃目高陽圖云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨長肉補血破癰癩瘡瘍麻癰腸風血崩帶下赤白利產前後一切病月候不勺消渴痰嗽并治頭風熱毒亦自平爲羊肉

白水耆涼無毒排

癰治血及煩悶熱毒骨蒸勞功次黃耆赤水耆涼無毒治血退熱毒餘功用並同上木耆涼無毒治煩熱體力微於黃耆遇觸即倍用之

圖經曰

黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡多有之根長二三尺已來獨莖作叢生枝幹去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如

蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水耆有木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫今人多以苜蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色內中白色此爲異耳唐許齊宗初仕陳爲新蔡王外兵參軍時柳太后感風不能言脉沈而口噤齊宗曰旣不能下藥宜湯氣熏之藥入腠理周時可差乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其効如此因附著之使善醫者知所取法焉

雷公云

凡使勿用木耆草真相似只是生時葉短并根橫先湏去頭上破皮一重了蒸半日出後用手擊令細於槐砧上剉用

又方

治緩疽以一兩杵成散不計時候溫水調下二

聖惠

錢外臺秘要
上甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉比痔差時發者以二兩三錢水一中盞煎至六分溫服日三四服

又方
治緩疽以一宿以猪脂五合微火上煎取三合敍去滓以封瘡上日十日治瘡疽心懊痛足脰滿小便黃飲酒發赤黑黃三兩度其肉即消月後方
斑由大醉當風入水所致黃耆二兩本蘭一兩爲末酒服方梅師方
補肺排膿以黃耆六兩剉碎以水三升煎取一升去滓服初虞壯治陷甲生入寸匕口三服

孫用和

治陽風瀉血黃耆黃連等分右爲末麪糊丸如棗大每服三十九粒

告吉

下

米卦


下

別爾

以乾脆

爲別爾

肉蓯蓉



五十五

蓋類本草十七

十六

張

肉蓯蓉味甘酸咸微溫無毒

性平味甘酸寒無毒主治腰背冷痛

氣腰痛止癆

生河西山谷及代郡鴈門五月採陰乾

地所生生時以內以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生散芍
芍河南至多今第一出龍西形扁葉細花而赤皆次出北國者形短
而少花已東肆平間亦有而大者也唐本草云此注論草蓯蓉未見肉者
今人所用乃草蓯蓉別大也用之內湖本經有肉蓯蓉功力殊勝比來醫人
時有用者良萬錫等詳本草圖經云出肅州糧福縣沙中三月四月掘根
切取中央籽者三四寸繩剪數八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘其草
莢蓉四月中旬折長五六寸至一尺已來莖圓紫色採取壓令扁曰乾原州
秦州靈州皆有之

云肉蓯蓉一名肉蓯客神農黃帝鹹雷公酸季氏小
溫生河西山陰地長三四寸叢生或一尺二月至八月採
臣益髓悅顏色延年治女人血崩壯陽日御渴大補益主赤白下補精敗
面黑勞傷用蓯蓉四兩水煮令爛薄切細研末半兩分爲四度五味以米煮
粥空心服之

云治男絕陽不與女絕陰不產潤五藏長肌肉腰疼腰膝
男子泄精尿血遺瀝帶下陰痛據本草云即是野馬糞餘瀝結成深褐色人方
知敷落樹下并土漸上此即非馬糞之處陶說誤耳又有花蓯蓉却是春抽苗者力較微耳

圖經曰

肉從蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡多有之然不及西羌界中宋者肉厚而力堅舊說是野馬遺瀝落地所生今西人云

大木闇及土塗垣中多生此非游牧之所而乃有者則知自有種類耳或疑其初主於馬瀝後乃滋殖如蕘根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經云五月五月採五月恐已老不堪故又三月採之西人多用作食品取之刮去鱗甲以酒淨洗去黑汁薄切合山羊羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草莢蓉極相類但根短莖圓紫色比來人多取刮去花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名草莢蓉性溫補男子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者因附見於此

陳藏器序云

強筋健體從蓉鱗魚為末黃精酒

雷公云

凡使先須用清酒浸一宿


至明以梭刷刷去沙土浮尹盡尋破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒浸并刷草了却蒸從午至酉出又用酥灸得所

齊州防風


證類本草七

十九

宋本



解州防風



同州防風

證類本草七

二十一



河中府石防風



證類本草七

二十一

其

肢癰無掌乳全瘡內瘻

葉主中風熱汗出
四肢頭面云來四

一名苗草一名百枝一名屏風一名蕘根一名
百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴

乾得澤瀛藻本療風得當歸芍藥陽起石禹餘根療婦人子藏風殺附子毒

近琅邪者鄆鄆州互市亦得之次出襄陽義陽縣界亦可用即近上蔡者惟實
而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者爲好俗用療風最要道方時用

齊州龍山最善淄州兗州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等別錄六义頭者
令人發狂以尾者發癇疾子似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑
在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元
無防風而乃委注爾

圖經云葉似牡蒿白花八月齊月

採根江水去防風臣花主心腹痛四肢拘急行履不得經脉虛羸益節
間疼痛

云青州防風子可亂華撥同治三十一年

風男子一切勞劣補中益神風赤眼止淚及癰緩通利五藏

關脉五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定思匀氣脈

經曰

防風生沙苑川澤及鄆鄆上蔡今京東淮浙州郡皆有之根土黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿而短小初

時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似時葵花實似胡荽而大二月十月採根暴乾關中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風眩痛又宋毫間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣本經云

藥主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳

經驗後方

治破傷風防風天南星等分爲末每服二三匙童子小便五斗煎三四升服愈即止

又方

治崩中防風去蘆頭

灸赤色爲末每服二錢以麵糊酒調下更以麵糊酒投之此藥累經有效


蒲黃

二十六 七

證類本草七

主

主其



生河東池澤四月採

周易

此即花上黃粉也同其有便拂取之甚療血仙經亦用此

云蒲黃君通經脈止女子崩中不住主崩血止鼻衄治采血利

水道同補子云蒲黃君通經脈止女子崩中不住主崩血止鼻衄治采血利痛姪孕人下血墮胎血運血癥兒枕急痛小便不通陽風濕血遊風腫毒蟲

洪吐血下乳止泄精血痢此即是蒲上黃花入藥要破血消腫即生使要補血止血即炒用蒲黃篩下後有赤滓名爲蕎炒用甚溫腸止渴血及血痢

圖

經曰

蒲黃生河東池澤赤蒲蒲黃苗也生南海池澤今處處有之而秦州者爲良春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然周禮以爲薺謂

其始生取其中心入地大如匕柄白色生取之甘膳以苦酒浸如食筭大美亦可以爲飾今人罕復有食者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端似武士楂杆故俚俗謂蒲槌亦謂之蒲簷花黃即花中藥也細若金粉當其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒醫家又取其粉研末後

有赤滓謂之蒲蕎入藥以溫腸已洩珠勝

雷公云

凡使勿用松黃并黃葛其二件全似只是味距及土人凡飲千金

使蒲黃須隔三重紙焙令色黃蒸半日却焙令乾用之妙

方

治重舌舌上生瘡涎出以蒲黃傳之不過三度差

又方

治丈夫陰下濕痒蒲黃末傳之三四良

肘後方

小兒瘧症

水服蒲黃方寸

葛氏方

忍小便久致胞轉以蒲黃裹腰膏令頭致之三度通

又方

若血

者蒲黃二錢水服方

寸匕梅師方

治產後血不下蒲黃三兩水三升煎取一外領服

孫真人食忌

主卒止血以水

服蒲黃一升

簡要濟衆

治吐血垂血薄黃一兩擣爲散每服三錢溫酒或冷水調亦得

又方

治小兒吐血不止

服蒲黃一升

生地黃汁調下量

塞上方

溫酒下

方才一

日三服

兒大小加減進之

黃末空心熱酒

調下三錢匕服

猪脂傅上

楊氏產乳

療婦勞熱胎動下血手足煩

口三五度

煎取八合頓服

黃二兩水二升

又方

治產後奶少并癰腫蒲黃草熟杵傅腫上日三

煎取一錢水服

蒲黃地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微黃各爲末三匙

貼之如經日不產各抄一錢匕新汲水調服立產此常親用之甚效

證類本草七

二十三

祝先

奇齋

雷公云

治產後血不下蒲黃三兩水三升煎取一外領服

又方

治小兒吐血不止蒲黃細研每服半錢用

治脫肛腸

出蒲黃和

治產後下血虛羸過死蒲

產寶

治產後下血虛羸過死蒲

又方

治隊傷撲損瘀血在內煩悶蒲

出蒲黃和

治脫肛腸

出蒲黃和

催生

治產後下血虛羸過死蒲

又方


治產後奶少并癰腫蒲黃草熟杵傅腫上日三

煎取一錢水服

蒲黃地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微黃各爲末三匙

貼之如經日不產各抄一錢匕新汲水調服立產此常親用之甚效

本草香蒲



證類本草七

二十四

祝先
百全

一名醜生南海池澤

六方藥不復用俗人無採候上人亦不復識昔江南貢菁茅一名青茅以供祭酒或六是薰草又云是薰麥此蒲亦相類耳唐本草云此即甘蒲作薦者春初生用白為薦亦可蒸食山南名此蒲為香蒲謂昌蒲為薰蒲聞引菁茅乃三脊茅也其薦麥薰草香辛異俗皆織都不為類此並非例也蒲黃即此香蒲花是也

圖經曰

文具蒲
黃條下


晉少續斷




十六 蔡類本草七

二十五

絳州續斷



越州續斷



四六三

證類本草

二十六

里

無毒

朋中漏血金瘡血內漏止痛生肌乃此傷寒血腰痛關節繕急

一名接骨一名南草一名裸生常山山谷七月

八月採陰乾

地黃爲之使惡雷丸

云按桐君藥錄云續斷生蔓

莖葉節節斷皮黃鱗如桂大根子黃白有汁七月八月採根今皆用骨髓高丈餘葉似刺柏莖醋皮主療金瘡有此接骨名疑或是而廣州又有

有一藤名續斷

一名訪藤斷其莖器承其汁飲之瘳虛損絕傷用沐頭又長

髮折枝挿地即生根此又指類李云是虎薑與此大乖而虎薑亦自療血

漏

云此藥所在山谷皆有今俗用者是葉似苧而莖方根如大薑黃白

色陶主冒心

根如大薑一株有五六枝

云續斷君主絕傷去諸溫毒能通宣氣

木根云助氣調血脉前五後十湯破癩結瘀血消腫毒腸風痔瘻

止泄精尿血胎漏子宮冷又名大薑山牛蒡

壅挫損婦人產前後一切病面黃虛腫縮小便

續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒越晉州亦有之三月已後生苗莖四稜似苧麻葉亦類之兩兩相對而生四月開花紅白

圖經曰

色似益母花根如大薊赤黃色七月八月採謹按范注方云續斷即是馬薺與小薺葉相似但大於小薺耳葉似旁翁葉而小厚兩邊有刺刺人其花紫
色與今越州生者相類而市之貨者亦有數種少能辨其種良醫人用之但以節節斷皮黃皴者爲真

雷公云

凡使勿用草布根緣眞似續斷若誤用服之令人筋軟得後橫切剉之又去向裏硬筋了用酒浸一伏時焙乾用

治淋取生續斷絞取汁服之馬薺根是

子母秘錄

治產後心悶手足煩熱獸獸氣欲絕血暈心頭硬乍寒乍熱增溫服如人行三二里再服無所忌此藥救產後垂死

外臺

秦州漏蘆

二四四


證類本草七

二十七

三



沂州漏蘆




海州漏蘆

證類本草

三十六



單州漏蘆



五五

證類本草七

廿九

張

漏蘆

肉

大寒無毒及膚

根陰莖

草瘦亦可久服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗用之俗中

取根名鹿驪切支根苦酒摩以療瘡疥

云此藥俗名莢蒿莖葉似白

蒿花黃生莢端莖長似細麻如筋許有四五

七月八月後皆黑異於衆草蒿之

類也常用其莖葉及子未見用根其理驪山謂之木藜蘆有毒非漏蘆也

公按

別本注云漏蘆莖筋大高四至五尺子房似油麻房而小江東人取其苗

用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名鹿驪唐注云山南人名不藜蘆昔

非也漏蘆自別爾

目錄

圖經

云葉似角蒿今曹兗州下濕地

最多六月七月採莖日乾之白黑於衆草中

論

云漏蘆君能治身上熱毒風

生惡瘡皮肌癰痒瘻瘍

云按漏蘆南人用苗北土多用根樹生如茱

萸樹高三尺有毒殺蟲山人洗瘡疥用之

云連翹爲使治小兒壯熱

通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背瘰疬喉嚨風排膿補血治撲損續筋骨傳

金瘡止血長肉通經脉花苗並同用俗呼爲

鬼油麻形并氣味似乾牛蒡頭上有白花子

漏蘆生嵩山山谷今京東州郡及秦海州皆有之舊說莖葉似白

蒿有白花黃生莢端莖若筋大其子作房類油麻房而小七八月

圖經

漏蘆生嵩山山谷今京東州郡及秦海州皆有之舊說莖葉似白

蒿有白花黃生莢端莖若筋大其子作房類油麻房而小七八月

後皆黑異於衆草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡丹
秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹上海州者花紫碧如單葉葷花
翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鋸齒狀耳一物而
殊類若此醫家何所適從當依舊說以單州出者爲勝六月七月採莖苗日
乾八月採根陰乾南方用苗北土多用根又此下有飛廉條云生河內川澤
一名漏蘆與苦芙蓉老相類惟葉下附莖白皮起似箭羽文多刻缺花紫色
生平澤又有一種生山崗上葉頗相似而無疏缺且多毛莖亦無羽根直下
更傍枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參經云七月八月採花陰
乾用蘇恭云用莖葉及療疳蝕殺蟲有驗據此所說與秦州海州所謂漏蘆
者花葉及根頗相近然彼人但謂之漏蘆今醫家罕
有用飛廉者旣未的識故不復分別但附其說於下

雷公云

驗夫使漏蘆細剉拌生甘草相對蒸從已至申去甘草淨揀用聖

惠方

治小兒無牽疳肚脹或時鴻糞冷熱不調以漏蘆一兩杵爲散

金方

治乳無汁方漏蘆石鍾乳各二兩以水下篩飲服方寸匕即下

金方

治乳無汁方漏蘆石鍾乳各二兩以水下篩飲服方寸匕即下

藏客熱除邪逆氣疽癧諸惡瘡瘍傷撻生肉復肌

即是牆薇子也

氣陰虛

久服輕身益氣根止洩利腹痛五

名牆薇

一名牆麻一名牛膝

一名牆麻一名牛勒一名牆蘿一名

山棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾

順應本草云營實

即是牆薇子也

白花者爲良根亦可煮釀酒莖葉亦可煮作飲

圖經云即薔薇也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所在有之

葛洪治金匱

用薔薇灰末一方寸匕日三服之

云白薔薇根味苦澀冷無毒

治熱毒風癰疽惡瘡疥癬小兒疳蟲肚痛血經止亦白

痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疳蟲肚痛野白者用良

張

雷公云

今薔薇也凡採得去根并用礪布拭蕁毛了用力於

入膿囊不出堅燥及鼠撲服之十日

日三服之

云白薔薇根味苦澀冷無毒

治熱毒風癰疽惡瘡疥癬小兒疳蟲肚痛血經止亦白

中遺尿不自覺以根

隨多少剉以酒飲之

子金方

治口瘡久不差入膏中並生瘡三年已上不

愈

差以根浸煮含之又稍稍煎之冬取根夏取

莖葉

用之

治備急口中及舌生瘡爛剉根濃

之即愈

又方

治小兒疳瘡行數暴多生薔薇根洗

根濃

又方

諸癰腫發背及癰瘡

已潰爛疼痛薔薇根

根濃

治口瘡以根

肘後方


治口瘡以根

追風打去上

著者不詳
卷之三

李易經畫

天名精



明州天名精

證類本草七

三王

玩

便除口舌干燥而血利小

輕身止煩渴逐水大吐下火眼
一名名參草一名天藍一名天

門精一名玉門精一名痴顱一名蟾蜍蘭一名觀生平
原川澤五月採

垣衣爲之使

陳藏器

云此即今人呼爲豨莶

音

莶亦名

是唐本草六鹿活草是也別錄一名天蔓菁南人名爲地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名蝦薹藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌止渴利小便殺三蟲除諸毒腫丁瘡癰痔金瘡內射身痒癢摩不止者揩之立已其豨莶苦而臭名精乃辛而香全不相類也

圖經云地菘也小品

猶首可以燭蠶蛹若三蒼云燭敷也

云麥句薑使味辛治瘡止血及

臯創不止陳藏器云天名精本經一名麥句薑蘇云鹿活草也別錄云一名天蔓菁南人呼爲地菘與蔓菁相似故有此名爾雅云大蘿蕷麥注云麥句薑蕷麥即今之瞿麥然終非麥句薑爾雅注錯如此陶公注釣樟條云有一草似狼牙氣辛良名爲地菘人呼爲劉懨草主金瘡言劉懨昔曾用之異苑云青州劉懨宋元嘉中射一麌剖五藏以此草塞之蹶然而起僵淫而拔草

證類本草七

三十二

王元
七十

便倒如此三度燭密錄此草種之主折傷多愈因以名焉既有活

瘡之名雅與癟事相會陶蘇兩說俱是地菘功狀既同定非二物

圖經曰

天名精生平原川澤今江湖間皆有之夏秋抽條頗如薄荷花紫

如蓋故名蝦薹蓋其味甘辛故名麥句薑一名豕首爾雅所謂荔焰蘋藶豕首是也江東人用以燭

陳藏器云五月採此草呼名地菘下品又有地菘條陶隱居注鈎樟條說地菘事見異苑宋元嘉中劉懨爲青州射一麌既

剖五藏以此草塞之蹶然而起僵淫而拔草便假如此者三憤瘡錄以種之主折傷多愈因名劉懨草陳藏器以謂此草旣有瘡活之名雅與癟事相會當便是一物不疑矣故并於此見之

決明子

馬仁

潤雪



滁州決明子

證類本草七

三十三

王元



眉州波明子



四九十

證類本草七

三十四

三元

苦甘平微寒無毒生青盲目治膚亦白膜
療脣口青以服之生龍門川澤
石波明生豫章十月十日採陰乾百日

于圖隱同云龍門

云薜荔葉莖葉爲之使惡大麻

在長安北今處處有葉如芷其子形似馬蹄呼爲馬蹄波明用之當擣碎又
別有草波明是萎蕷葛子在下品中也

端類形似紫貝附見別出在魚戲作中皆主明日故並有史明之名俗方惟
以療眼也道術時領圖經云葉似苜蓿而闊大夏花秋生子作角實似
馬蹄俗名馬蹄波明今出廣州桂州十月採子陰乾

論云波明有利五藏常可作菜食之又除肝家熱乾取一匙搜令淨忘
吞之百日見夜光

云芷是江離子生字音吐草也似莞生海邊可
爲席又與波明葉不類卒草波明注又無好事者更詳之陶云波明葉如芷
其按芷性平無毒火炭作飲極香除痰止渴今人不睡調中生道傍葉小
於波明隋稠禪師作五色飲以爲黃飲進湯帝嘉之

云馬蹄波明助肝氣益精水調末塗消踵毒瘍太陽穴治頭痛又貼腹心止臯癰作枕勝黑
豆治頭風

明日也

圖經曰

波明子生龍門川澤今處處有之人家園圃所蔞夏初王苗高四尺許根帶紫色葉似苜蓿而大十月有花黃白色其子作種

青葉三而紫十月十日採陰乾百日按爾雅釋名謂之蘚若與此種頗不類又有一種
琪江云葉黃蕊赤花實如山茱萸關西謂之蘚若馬蹄決明葉如江豆子形似馬蹄故得此名又萋蒿子亦謂之草決明未知

孰爲入藥者然今醫家但用子如菉豆者其右決明是蝶蛤類當在蟲獸部中

食療去

平葉主明目利五臟食之甚良子主肝家熱毒氣風眼赤疾

臺秘要

治積年失明不識人決明子二

千金方

治肝毒熱取度外明作菜食之

外


分粒散食後以粥飲服方寸匕


隨州丹參

證梨草七

三五

王光





無毒

風寒

止血內崩下

血膀胱不足。跌蠱毒又服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹蕙一名茅蒐一名蒨生喬山川谷二月

三月採根暴乾

畏鼠姑

云此則今染絳茜草也東間諸處乃有少而莖殘故也詩云茹蕙在坂者是也馬錫等著本草圖經云染絳草葉似蓬葉頭尖下闊莖葉俱澀四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色今所

在有八月採根

附推

云茹蕙茅蒐疏引陸機云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓

云茜根味甘主治六極傷心肺吐血衄血川之陳藏器

云茜根主蠱蕡汁服之今之染絳亦作蒨周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草蘘荷與茜主蠱爲最也

云朱酸止鼻洪帶下產後血運乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘻癩泄精尿

血撲損瘀血酒煎服殺蠱毒入藥剉炒用

圖經曰

茜根一作蒨生喬山山谷近處皆有之染絳草也許

說文解

字以爲人血所生葉似蓬華而頭尖下闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陸機草木疏云茹蕙茅蒐蒨草也齊人謂之茜草二月三月採根暴乾今圃人或作畦種莖故貨殖傳云言茜千石示比于乘之家言地利之厚也醫家用治蠱毒尤勝周禮庶氏掌除毒蠱

以嘉草攻之千寶以嘉草爲蘘荷陳藏器以爲蘘荷與茜主蠱之最也

八〇六九

蓋類本草十七

三十七

鬼光

雷公子

人患內障眼赤服甘草水解之即毒氣散凡使茜根用銅刀於根砧上剗日草勿犯鐵并鉛

簡要濟衆

治吐血不定茜草一兩生擣羅爲散每服二錢水一中盞煎至十分放冷食後服之良

傷寒類要

治心癢煩心心火

方

治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根蘘荷葉根各三兩切以水四升煮取二升去滓適寒溫酒

效嗽下乳汁

治心火益氣明日不老可煮可乾

中熱

茜草

根

葉

根

葉

根

服即愈

通寒溫酒

飛廉味苦平無毒

治目翳久視不明頭眩頂重皮間

目

皮

頭

眩

頂

重

皮

間

頭

邪風如蜂蟄針刺魚子細起熱瘡癰疽痔瘻止風邪

頭

瘡

癰

疽

痔

瘻

止

風

邪

風

如

蜂

蟄

針

刺

效嗽下乳汁

治心火

益氣

明目

不老

可煮可乾

一名鴟盧

一名天磬

一名伏猪

一名伏兔

一名飛雉

一名木禾

生河內川澤

正月採根七月八月採

花陰乾

待鳥頭良惡麻黃

雲處處有極似苦艾鳴老鳴草附莖

枝莖可得長生又入沖枕方入

別有漏蘆非此別名爾

云此有

兩種

莫証生平澤中者其生山崗上者葉頗相似而無疏缺且多毛莖

枝莖可得長生又入沖枕方入

別有漏蘆非此別名爾

云此有

亦無羽根直下更無傍枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉
莖反根療疳蟲殺諸蟲平澤者俱有驗今俗以馬齒以苦芨爲漏蘆並非
也

澤皆有五月六月採日乾圖經云葉似苦芨莖似軟羽紫花子毛白今所在平

也

圖經云葉似苦芨莖似軟羽紫花子毛白今所在平

也

兒疳瘡爲散以

漿水下之大効

無頭公云凡使勿用赤脂蔓與飛廉形狀相似只赤脂蔓見酒色便如血色
可表之凡修事先刮去麤皮了杵用苦酒拌之一夜至明瀝出日
乾細杵千金蠶

治疳蟲食口齒及下部飛廉蒿燒灰擣篩以兩錢匕著痛
處其痛忍之若不痛非疳也下部蟲如馬尾大相纏出無

數十日差二

十日平復


秦州五味子

證類本草七

三八

曰光

二五十五



越州五味子



號州五味子

本草七

三九



無毒自益氣少走火傷寒

名玄及生齊山谷及代郡八月採實陰乾

從荅爲之使
惡萎蕤勝烏

頭闕隱云今第一出高麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似
猪腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可
擣篩道方亦須用唐本云六五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此則五味
具也本經云味酸當以木爲五行之先也其葉似杏而大蔓生木上子作弓
如落葵大如蘡子一出蒲州及藍田山中公注今河中府歲貢焉

蜀本圖經云莖赤色蔓生花黃白生青熟紫味甘者佳八月採子口乾
云茱莖蕷注五味也蔓生子叢在莖頭疏云一名茱一名莖蕷本譜
云五味子君能治中下氣口嘔逆補諸虛勞令人體悅澤除熱氣病人虛而
有氣兼嗽功用之日華子云明日暖水藏治風下氣消食霍亂轉筋疾
癖并施冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨

置經曰五味子生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡尤多而杭越間亦
有春初生苗引赤蔓於高木莖長六七天葉尖圓似杏葉三四月
開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許大生青熟紅紫爾稚云茱莖蕷注
云五味也蔓生子叢莖端疏云一名茱一名莖蕷古今有數種大抵相近而以
味甘者爲佳八月採陰乾用一說小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸
鹹苦辛甘味全者真也千金月令五月宜服五味湯取五味子一大合以水

證類本草七

四十

光四十

杵臼細擣之置小瓷瓶中以百沸湯投之
少蜜即密封頭置火邊良久湯成堪飲

雷公云

凡小顆皮皺泡者有白撲鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者佳
也凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從已至中却以漿水浸一宵

抱朴子

移門子服五朱子十六年面赤
用焙乾

旋花



施少旋花



五百十字

證類本草七

四十一

張仁

一名美草生豫州平澤五月採陰乾

宋人呼爲
根

山薑南人呼爲美草根似杜若亦似高良薑腹中冷痛煮服甚効作丸散服之辟穀止飢近有人從南還遂用此術與人斷穀皆得半年百日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉以薑花赤色殊辛美子狀如豆蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多

周易

公

云

此即

生平澤

旋

葛

是

也

其

根

似

筋

故

一

名

筋

故一名筋根旋音徐充陶所證真山薑爾陶復於下品旋葛注中云此根出河南北國來根似芍藥惟膏中用今復道似高良薑二說自相矛盾且此

根味甘山薑味辛都非此類其旋葛膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可以杜若亂之也又將旋葛花名金沸作此別名非也別錄云根主續筋也

今本

陳藏器

本草

云

旋

花

本

功

外

取

根

食

之

不

飢

又

取

根

苗

擣

絞

汁

服

之

主

續

筋

也

丹

毒

熱

根

主

續

筋

也

周易

小兒

毒

熱

根

合

金

瘡

陶

注

誤

而

唐

注

是

也

元

復倍用花蓄偏旋偏用根今云旋復根即葛旋誤矣

旋偏

花生

豫州

平澤

今處

處

皆有

之

蘇恭

云

此即

平澤

所生

旋

蓄

元

爲

續筋根苗作叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋間遍田野根無毛節蒸煮甚
嫩甚甘美五月採花陰乾二月八日月採根日乾花今不見用者下品有旋鈕
復花與此殊別人疑其相近殊無謂也救急方續斷筋法取旋鈕草根淨洗
去土擣量瘡大小傅之日一二易之乃差止一名肫腸草俗謂鼓子花也黔
南山一種旋花蘿莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

癥

水香生大吳池澤

四月五月林

六方藥俗人並不復識用大吳即應是吳國爾太伯所居故呼大吳今東間有前澤草名蘭香亦或是此也生濕地

李云是今人所種似都梁香草蜀本云此是蘭澤香草也八月花白人問多種之以飾庭池溪水澗傍往往亦有幽云不識又言前澤草或稱李云都梁香近之終非的識也金匱別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼爲驚尾香時人皆煮水以浴療風故又名香水蘭陶云煎澤草唐注云蘭澤香並非也蜀本云蘭草與澤蘭二物同名陶公竟不能知蘇亦強有分別按蘭草本功外主惡氣澤可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰小紫五月六月採陰乾婦人和油頭故云蘭澤李云都梁是也蘇注蘭草云八月花白人多種於庭池此即澤蘭非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節初採微辛乾辛入產後補虛用之已別出中品之下蘇乃將澤蘭注於蘭草之中殊誤

證類本草七

四十二

張仁

忍冬味甘溫無毒主寒熱身腫火服輕身長年益壽十

二月採陰乾

陶藏店

云今處處皆有似藤生凌冬不凋故名忍冬人惟常株服凡易得之草而人多不肯爲之更求難得者是貴遠賤近之情平蜀本云此草藤生繞覆草木上苗莖赤紫色宿者有薄白皮膜黯之其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛花白榮紫今人或以絡石當之非也金匱陳藏器本草云忍冬主熱毒血痢水癆濃煎服之小寒本條云溫非也蜀本云令濃取汁煎之服如雞子一枚日二三服


味辛主治腹脹滿能止氣下澼

肘後方

飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍喪聞哀哭便作風尸者燔燬四肢

不知痛之所在每發昏恍得風雪便作沉尸考繩結臟骨衝心胸每發絞切遇寒令便作尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣改變此一條別有治後鬚也忍冬莖葉剉數副煮器本草云忍冬主熱毒血痢水癆濃煎服之小寒本條云溫非也蜀本云令濃取汁煎之服如雞子一枚日二三服

南京蛇牀子



證類本草七

四三

四仲

無毒。婦人陰腫癰。男子陰瘻。
熱。男子陰強。女人好顏色。令人有子。
一名玄牀。一名思益。一名繩毒。一名棗棘。一名

牆靡。生臨淄川谷及田野。五月採實。陰乾。

惡牡丹。巴豆。貝母。陳隱居云。近道田
地。有出揭陽縣者。名馬牀。論云。蛇牀

野墟落間甚多。花葉正似蘿蔔。但圖經云似小葉芎藭。花白子如黍粒。著白色。生下濕地。今所在皆有出。揚州襄州者良。採子暴乾。爾雅云。盱眙也。一名蛇牀。一名馬牀。論云。蛇牀人君有小毒。治男子女人虛濕。癰毒。風瘡。痛去。男子腰疼。浴男女陰去風冷。大益陽事。主大風。身痺。前湯浴之。差。療癰瘍。及小兒驚癇。日華子云。治暴冷。煖丈夫。陽氣助女人。陰氣撲摸。瘀血。腰疼。陰汗。濕癬。四肢頑痺。赤白帶下。縮小便。凡合藥服食。即按去皮殼取人微炒殺毒。即不粹。作湯洗病。則生使。

巢。俗馬片類。四五五月開白色。又似散水一千。黃褐色。如粟米至輕虛。五月採實。陰乾。爾雅謂之。盱眙。一名蛇牀。

圖經曰

蛇牀子生臨淄川谷及田野。今處處有之。而揚州襄州尤勝。三月

雷公矣

凡使須用濃藍汁并百部草自然汁二味同浸三伏時漬出日乾却用生地黃汁相拌蒸從午至亥日乾用此藥只令陽氣盛數考也

自然汁二味同浸三伏時漬出日乾用此藥只令陽氣盛數

千金方

治產後陰下脫蛇牀子袋盛蒸熨之亦治陰戶漏少許和令勿相得如棗大綿裹內之自然溫矣

又方

治小兒癰瘍竹蛆床末和猪脂塗之

金

匱方

溫中坐藥蛇牀子散方蛇牀子人面爲末以白粉少許和令勿相得如棗大綿裹內之自然溫矣

密州地膚子




蜀州地膚子

證類本草七

四四

五五



地膚

無毒

小便通利

精氣去

皮膚中熱氣散惡瘡痘，強陰，明目，聰明，輕身，耐老，無毒。

若使人潤澤。

一名地麥。生荊州平澤及田野。

八月十月採實陰乾。

微

細入補丸散用。

仙經不甚須。

云今田野間亦多皆取莖苗爲掃帚子。

子田野人名爲地麥草葉細莖赤多出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪爲掃帚恐人未識之別錄云擣絞取汁主赤白痢洗目去熱暗雀盲澀痛苗灰地花黃白子青白色今所在有主丈夫陰痿不起補氣益力治陰卵癆疾去熱風可作湯沐。

浴

華子

云治客熱丹腫又名落帚子色青似一眼起蠶沙矣。

圖經曰

地膚子生荊州平澤及田野八蜀川關中近地皆有之初生薄地

五六寸根形如萬莖赤葉青大似荆芥三月開黃花八月九月採實陰乾用神仙七精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨掃也一名鴨舌草。

菌

謂莖苗可爲掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今

醫家便以爲獨掃是也密州所上者其說益明云根作叢生每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而蕪革成可採正與此地

獨掃相類若然恐西北所出者短弱放蘇注云爾其葉味苦寒無

毒

主大腸洩瀉止赤白痢和氣澀腸胃解惡瘡毒三四月五月採

證類本草七

四十五

黃

外臺秘要

治目痛及眩忽中渴因有熱
瞑者取地膚子白汁注目

又方

療手足煩痺地膚草三兩水四外煮取二外半

分三服肘後方

治久疾有痔發動脅疼如打六月七月

日一劑

取地膚子乾末酒服方寸匕

日五六服

妊娠

娠患淋小便數去少忽熱痛酸索于足疼煩地膚

子十二兩初以水四升煎取二外半分溫三服

楊氏產乳

療小便數多或熱病

酸楚手足煩疼地膚草三兩以水四升煮取二外半分三服

四十六

兗州千歲蘿



四三七十

證類本草七

四六

王寅

千歲蘿名訥切汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉去諸癆又服輕身不飢耐老通神明一名蘿蕪生太
山川谷

藥都不復識用此仙經數處須之而遠近道俗咸不識此非甚是異物正是未研訪尋識之爾唐云即蘿蔓藤片也此藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終不死藤汁味甘酸苗似葡萄其莖主曬

於月逆大善傷寒後嘔㝱更良今故陳藏器本草六千歲蘿蕪謂云藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白人不復識仁方或頌唐注即云蘿蔓藤得千歲者汁甘子酸按蘿蔓是山蒲桃斫斷藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣滴目中去熱翳赤障更無甘汁本經六汁甘明非蘿蔓也千歲蘿似葛蔓葉下白子赤條中有白汁草木疏云一名苣苣連蔓而生子亦可食毛詩云葛藟纏蕘云似葛之草也此藤大者盤薄故六千歲蘿謂蘿蔓者深是妄言焉

葛藟注云似葛之草也此藤大者盤薄故六千歲蘿謂蘿蔓者深是妄言焉

子六味甘酸止渴悅色年多大者佳莖葉同用又名蘿蔓藤

圖經曰葛汁白而甘五月開花七月結實六月採子青黑微赤冬惟凋葉

千歲蘿生泰山川谷作藤生蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其

此即註云葛蘿者也蘇恭謂是蘿蔓藤

深爲謬矣陶隱居陳藏器說最得之

景天

證類本草七

四十七

王元



景天味苦性平無毒。大熱火瘡身癰諸癰
毒瘡死切寒熱風癰諸不足。

根入漏下。白目明目火服通神不老。
一名火母。一名救火。一名據火。名貞火。生太山川。

谷。四月四日七月七日採陰乾。

問隱居云今人皆盆盛養之於屋上云以碎火葉可療金瘡止血以

洗浴小兒去煩熱驚風廣州城外有一樹云大三四圍呼爲慎火樹江東者甚細小方用亦稀其花入服食衆藥之名此最爲麗。

國醫錫等譜圖經云慎火草葉似馬齒莧而大葉性論云景夫君有小毒能治風癰惡痒主小兒丹毒及治發熱驚疾花能明目。

華子云景夫令治心煩熱狂赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下。

根經曰。

景天生泰山山谷今南北皆有之人家多種於中庭或以盆盎植

莖梗脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿根若四月四日七月七日採

其花并苗葉陰乾攻治瘡毒及嬰孺風癰在皮膚不出者生取苗葉五六兩和鹽三大兩同研絞取汁以熱手摩之日再但是熱毒丹瘡皆可如此日日之

外臺秘要

治癰瘡以慎火草一斤擣絞取
傳上熱敷摸之再三即差

千金方

治小兒丹發生一握擣絞汁
草生陰

又方

以拭之擣上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同

子母秘錄

治產後陰下脫慎火草一斤陰乾酒五外煮取汁分溫四服

治小兒赤遊行於體上下至心即死擣生景天傳磨上


楊氏產乳

療煙火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末一

兩搗和如泥塗之又方療蟹火丹從頭起慎兩搗和苦酒塗之

又方

火草搗和苦酒塗之



絳州苗陳嵩


二八

證類本草七

黑六

元

江寧府茵陳



五十一

證類本草七

四九

王氏

茵陳蒿味苦辛微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸

通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕以服輕身益氣耐
老面白悅長年白免食之仙生太山及丘陵坂岸上五月及立秋採陰乾

陶隱居云今處處有似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生惟入療黃痘用仙經云白蒿白免食之仙而今

茵陳乃云此恐是誤爾今按陳藏器本草云茵陳本功外通關節去滯熱傷寒用之雖葛頰苗細經冬不死更因舊苗而生古云茵陳後加蒿字也今又詳此非菜中茵陳也

曰華子云六石茵陳味苦涼無毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘡瘍女人癥瘕并明損乏絕又名茵陳蒿山茵陳本出和州及南山嶺上皆有

圖經曰茵陳蒿生泰山及丘陵坂岸上今近道皆有之而不及泰山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春更因舊苗而生新葉故名茵陳蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府又有一種茵陳葉大根麤黃白色至夏有花實常州有一種名白蒿亦似青蒿而背白本土皆通入藥用之今南方醫人用山茵陳乃

有數種或著其說云山茵陳京下及北地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用莖葉都似家茵陳而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗又名龍腦薄荷吳中所用乃石香葉也葉至細色黃味辛甚香烈

性溫誤作解脾濕服之大令人煩以本草論之但有茵陳蒿而無山茵陳本草注云茵陳者葉似蓬蒿而緊細今京下北地用爲山茵陳者是也大體坐

方用山茵陳療腦解傷寒發汗行滯氣化痰利膈治勞倦最要詳本草
正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試取京卡所用山茵陳宜解肌發
汗藥灼然少効江南山茵陳療傷寒腦痛絕勝此是諸醫議論謂家茵陳亦
能解肌下膈去暑宁煩方家少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵
陳蒿復當別是一物主療自異不得爲山茵陳此說亦未可據但以功較之
則江南者爲勝以經言之則非本草所出醫方所用且可計較功效本草之
義更當

雷公云 凡使須用葉有八角者採得
千金方 治遍身風癬生瘡疥茵陳
陰乾去根細剉用勿令犯火 不計多少黃濃汁洗之立
差食醫心鏡 茵陳主除大熱黃疸傷寒頭痛風熱
瘧利小便切煮羹生食之亦宜人

千金方 治遍身風痒生瘡疥茵陳根細剉用勿令犯火不計多少煎濃汁洗之立因陳主除大熱黃疸傷寒頭痛風熱獐癘利小便切煮羹生食之亦宜人


千金方

治遍身風癉生瘡疥茵陳
不計多少煮濃汁洗之立
宜人

杜若

證類本草

五十



杜若

無毒

目盲

溫中風入眼

戶頭

睡

眩倒

目眴眴

莫郎切

止痛除口臭氣以服益

精明目

令人不忘

一名杜衡

一名杜連

一名白連

一名白芩

一名若芝

生武陵川澤及冤句二月八月採

根暴乾

得辛夷細辛良惡茈胡前胡

今處處有葉似薑而有文理根似高良薑而細味辛香又絕似旋復根殆欲相亂葉小異爾

楚詞云山中人芳芳杜若此者一名杜衡今復別有杜衡不相似

云社若苗似廉薑生陰地根似高良薑全少辛味陶所注旋復根即真杜若也

馬鈞錫等譜

圖經云苗似山薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出破州嶺南者甚好

云杜衡杜若出南郡漢中大者大善

圖經曰

杜若生武陵川澤及冤句今江湖多有之葉似薑花赤色根似高

良薑而小辛味子如豆蔻二月八月採根暴乾用謹接此草一名

杜衡而中品自有杜衡條杜衡弱雅所謂土鹵者出杜若廣雅所謂楚衡者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若又離騷云離杜衡與芳芷王逸輩皆不分別但云香草也古

方或用而今人罕使故亦少有識之者

雷公云

凡使勿用鴨蓼草根

真相似只是味効不同凡修事採得後刀刮

上黃赤皮了細剉用三重絹作袋盛陰乾

齒使以蜜浸一夜至明

淄州沙參

梁出爾雅云杜若國釋用

爾雅

云杜若國釋


蓋類本草二

王一

張乙




歸來集



隨州深參

本草二

五十一



沙參

無毒

生血續

療胃痺、心腹痛、結熱邪氣、頭痛皮間邪熱、安五藏、補中

火根

名智參

一名苦心、一名志取、一名虎鬚、一

名白參、一名識美、一名文希、生河內川谷及兔句般陽、續山二月八月採根暴乾。

參是爲五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙

在中品唐本注云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州爲善

蜀本圖經云花白色根若葵根

氣下墜治常欲眠養肝氣宣五藏風氣目養子云補虛止驚煩益心肺并

一切惡瘡疥癬及身瘡排膿消腫毒

沙參生河內川谷及兔句般陽續山今出淄齊潞靖州而江淮荆

湖洲郡或有之苗長一二尺以來叢生崖壁間葉似枸杞而有叉

牙七月開紫花根如葵根筋許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴

乾南土生者葉有細有大花白瓣上仍有白黏膠此爲小異占方亦單用葛

洪卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞白

汗出欲死者擣篩末酒服方寸匕立差

證類本草七

五三

秉

風症諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末苦痛

上立消毒入腹者煮飲之即解

信

生交州山谷

閻隱居云此藥療毒莫之與敵而人不復用殊不可解都不間有識之者想當以葛爾須別廣訪交州人未得委悉唐本注云此草荆襄間山谷大有苗以蘿摩葉圓厚莖俱有白毛與衆草異蔓生山南俗謂之白葛用療毒有效而交廣又有白朮藤生葉似女貞莖葉俱無毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則非葦也用葉苗者貞矣二物療治並如經說各自一物下條載白朮蕨也目青鋤等謹按蜀本圖經云蔓生葉圓若葦公襄州北洪


州南崗上有五月六月採苗乾

海藥云

主風邪熱極宜煮白朮

飲之乾則擣末傳諸毒

淄州徐長卿




泗州徐長卿

證類本草

五舌

王承





瀛州雲實

證類本草七

五十六

宋析

草小者爲小吳風草也
陳藏器云一名無心草非草無心者南人名吳風草方藥不用之少氣此爲何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉木各十分棗銜五分金以二輪撮爲後飯

陳藏器

云

人名吳風草

非草無心者南

以藥不用之

少氣此爲何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐伯

曰以澤瀉木各十分棗銜五分金以二輪撮爲後飯

矣

云

黃帝曰有病者身熱

解發汗出如浴惡風

草小者爲小吳風草也

陳藏器本草云

葉似茺蔚叢生

有毛黃花根赤黑也

圖經云葉似茺蔚叢生

有毛黃花根赤黑也

苦蕷無毒

利腰膝殺蟲去邪惡結

氣消渴

物多食殺精物下水燒之致鬼

生河間川谷十月採暴乾

圖經

古今處處有子細如草莖子而小黑其實亦類荳若燒之致鬼未見其

法術云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如細槐亦如苜蓿枝間微刺俗謂苗爲草雲母陶云似萬赤菲也

豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有五月六月採實

生河間川谷十月採暴乾

圖經

去今處處有子細如草莖子而小黑其實亦類荳若燒之致鬼未見其

圖經云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如細槐亦如苜蓿枝間微刺俗謂苗爲草雲母陶云似萬赤菲也豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有五月六月採實

生河間川谷十月採暴乾

圖經

去今處處有子細如草莖子而小黑其實亦類荳若燒之致鬼未見其

生河間川谷十月採暴乾

圖經

去今處處有子細如草莖子而小黑其實亦類荳若燒之致鬼未見其

生河間川谷十月採暴乾

圖經

去今處處有子細如草莖子而小黑其實亦類荳若燒之致鬼未見其

生河間川谷十月採暴乾

圖經

去今處處有子細如草莖子而小黑其實亦類荳若燒之致鬼未見其


河中府王不留行

證類本草

五十七



廣德軍王不留行



江寧府王不留行

證類本草七

五十六

三元

王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風

庫內寒止心煩臯効癰疽惡瘡癰乳婦人難產以服輕

身而老增壽生太山山谷一月八月採

閭隱居云今處處有人言是葵子亦不爾葉似

酸漿子似菘子而多入癰瘍方用之因西蜀等謹按蜀本圖經云葉似葵藍等花紅白色子殼似酸漿實圓黑以荀子如黍粟今所在有之二月收苗五月收子曬乾

鐵性論云王不留行能治風瘻透而一日革子去治發背遠

風瘻婦人血經不与及難產根苗花子並通用又名禁宮花剪金花

圖經曰王不留行生泰山山谷今江浙及並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸已來根黃色如齊根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月

開花黃紫色隨莖而生如菘子狀又似猪藍花五月內採苗葉曬乾俗間亦謂之前金草河北生者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留

行散小瘡粉其中大瘡但服之產婦亦服正元廣利方療諸風瘻有王不留行湯最效

雷公云

凡採得拌渾蒸從已至未出却下行參末熟水調方寸匕即出

梅師方

台竹木口不出疼痛以王不留行水浸一宿至明出焙乾用之

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百

證類本草七

五十九

每溫瘡疫疾強腰脚益膂力一名獨搖草

唐本醫經大正苗惟一莖生

莖端若繖能根如牛膝而細黑所在有之有必叢生今人以徐長卿代之非也唐本先附目萬動草本云徐長卿赤箭之類亦一名爲鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭筈高三尺已下葉生莖端狀纖蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色二月八月採根所在皆有

雷公云

凡採並細剉了擣用生甘草水煮一伏時漉出用也

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主

虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤

唐本醫經大正苗云苗似野葛而白花根皮厚肉白其骨柔於野葛

唐本先附目萬動草本圖經云葉有細毛蔓生花白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗凌冬不凋


雷公云

凡使勿用菜花藤緣直似白花藤只是味不同菜花藤酸澁不堪用其白花藤味甘香採得後去根細剉陰乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩蠻痛生劍州山谷其葉似楠木而細長採無時

戎州地不容



一證類本草七

六十

正

苦不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉
閑及痰毒一名解毒子生山西谷採無時

圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌久不凋無花實根黃白色外皮微麤褐累累相連如藥實而圓大採無時能解蠱毒辟瘴氣治咽喉閑寨鄉人亦呼爲解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒瘡疥癬解毒破惡血生林
野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用
山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之
似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有効

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有
之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子
紅色可愛根莖花實並入藥使

二十種陳藏器餘

人肝藤生解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮服之亦傳病上生嶺南葉三桿花紫色一名承露仙又有伏雞子亦名承靈仙葉圓與此名同物異

海藥云

廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及手腳不遂等風生研服

楊氏產乳

療中蠱毒人肝藤以清水

磨一彈丸飲之

不過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹筭子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似骨黑者似角云是越王行海作筭有餘弃於水中而生

海藥云

謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑角白骨筭筭所餘弃水中故生此遂名筭味鹹溫主水腫浮氣結聚宿滯不消散

中虛鳴並
軍考服之

證類本草七

六十

三定

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云似紫菜色青陸海異物志曰附石生也

海藥云

主風秋不通五萬氣并小便不利臍下
結氣宜黃汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小溫無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉痺蟲毒癰疽惡腫赤白遊彤蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菝葜而小也海人極用之

海藥云

胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦搣小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之自經死絩主卒發顛狂燒爲末服三指撮三年陳蒲煮服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽荆暴下血開胃止渴除煩
生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡
人呼爲給勃羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中
餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香
安南亦有一名飛滕

長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松
葉上有脂山人服之生關內山谷中
含子草有小毒子及葉主蠱毒蟻咬擣傳瘡上蔓生岸
傍葉尖花白子中有兩片如含子

本草證類備急本草卷第七

