

重刊孫真人備急千金要方

二十五

重刊孫真人備急千金要方卷之二十二疔漏

九漏第一

瘰癧附

二百

論一首

灸法十六首

論曰夫九漏之為病此寒熱瘰癧在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣也堪留於脈而不去者也鼠瘻之本皆根在於臟其末上出於頸腋之下其浮於脈中而未著於肌肉而外為膿血者易去去之奈何曰請從其末引其本可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往來以去之其小如麥者一刺知三刺已決其死生奈何曰反其針視其中有赤脈從上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈一歲半死見一脈二歲死見二脈半一歲半死見三脈二歲死亦脈不下貫瞳子可治凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏也宜禁五辛酒麪及諸

食凡漏有似石癰累累然作瘰癧子有核在兩頸及腋下痛不熱治者皆練石散傳其外內服五香連翹湯下之瘰癧者治如癰法諸漏結核未破者火針針使著核結中瘰癧者何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏三曰蠛蛄漏四曰漏五曰蚘蟬漏六曰蠛蠃漏七曰浮沮漏八曰瘰癧

治狼漏始發於頸腫無頭有根起於缺盆之連延耳根腫大此得之憂恚氣上不得下其根在肝作空青土之商陸為之佐方

空青 獨活 商陸

黃參 斑蝥

蠟甲 乾薑

婦人葶藶 地膽

蠟腦各貳分 蠟肝壹具 乾 芎藭半分

當歸

茴香

礬石

各言五分蜀椒

右十六味治下篩酒下方寸匕日三服十五日服之

狸骨和世散治鼠漏如發於頸無頭尾如鼯鼠使人寒熱脫肉此得之食有鼠毒不去其根在胃狸骨主之知母為之佐方

狸骨

知母

桂心

鯨鯉甲

山龜殼

甘草

雄黃

乾薑各言五分

右八味治下篩飲服方寸匕日三仍以蜜和內瘡中與不瘡先灸作瘡後以藥傅之已作瘡不用灸

地黃膏治鼠漏瘡瘻復發及不愈出膿血不止方

以不中水猪脂吹咀生地黃內脂中令脂與地黃足相淹和煎六七沸其瘡先用桑灰汁洗去惡汁次以

地黃膏傅上日一易

鼠漏方

得蛇虺所吞鼠燒末服方寸匕日再不過三服此大驗但難遇耳并傅瘡中佳

又方

死鼠青殼中

亂髮如雞子大壹枚

右二味以臘日猪脂煎之令消盡膏成分作二分一分稍稍塗瘡一分稍稍酒服之瘡鼠子當從瘡中出良

桂子信通圓治蟻蝮漏始發於頸項狀如腫此得之食瓜

菓實毒不去其根在大腸桂子主之桔梗為之佐方

桂子

龍骨各半

附子

壹兩

蜀椒

伯粒

桂心

桔梗

乾薑

礬石

獨活

苦參各言五分

右十味為末以棗二十枚合搗醋漿和丸如大豆

下五丸加至十九

雄黃解毒散 治蜂漏始發於頸瘰癧三四處俱相連以酒
此得之飲流水中有蜂毒不去其根在脾雄黃主之黃芩
為之佐

雄黃

黃芩

各壹兩

龍甲

茴香

吳茱萸

乾薑

各半兩 蜀椒 貳伯粒

石八味治下篩傳瘡口上日一度十日止

礬石防風散 治蚘蜂漏始發於頸初得如傷寒此得之食

中有蚘蜂毒不去其根在腎礬石主之防風為之佐

礬石

防風

知母

雌黃

桃白皮

乾地黄

獨活

青黛

斑猫

白芷

松脂

一作柏脂

芍藥

海藻

當歸 各壹分

白木

蠟皮

各肆分

蜀椒

伯粒

右十七味治下篩飲服一錢匕日三

礬石白木散 治蟻螬漏始發於頸下無頭尾如棗核塊累

移在皮中使人寒熱心滿此得之因喜怒哭泣其根在心

礬石主之白木為之佐

礬石

白木

空青

當歸 各壹分

細辛

壹兩

蠟皮

斑猫

枸杞

地膽

各壹分

乾烏腦

參朮各壹分

右十味治下篩以酢漿服方寸匕日二病在上側輪卧

在下高枕卧使藥流下

地膽白草散 治浮沮漏始發於頸如兩指使人寒熱欲臥

此得之因思慮憂適其根在膽地膽主之甘草為之佐

地膽

雄黃

乾薑

續斷

石決明

菴藷根

龍膽各三分

細辛貳分

大黃半分 甘草壹分

右十七味治下篩傳瘡日四五度古人云錄驗無雄黃有硫黃

斑猫白正圓

治瘰癧漏始發於頸有根初苦痛令人寒熱

此得之因新沐濕結髮汗流於頸所致其根空腎雌黃主之方藥為之佐

雌黃

芍藥

茯苓

續斷

乾地黄

空青

礬石

乾薑

桔梗

蜀椒

怕山

虎腎

狸肉

烏腦

斑猫

礬石各壹分

附子壹兩

右十七味為末蜜丸如大豆酒服十九日

斑猫白正圓

治轉脉漏始發於頸濯濯脉轉苦驚傷身

太熱此得之因驚卧失枕其根在小腸作煤驗斑猫主之方

主為之佐

斑猫

白芷

續膏

大黃各壹分 升麻

鍾乳

甘草

防風

地膽

續斷

麝香

礬石各壹分 人參

當歸

桂心各壹分

白木

麥門冬各壹兩

右十七味為末蜜丸如大豆酒服十九日勿食菜酒

房室百日外臺無大黃性心麥門冬白木鍾乳

治九漏方

空青

商陸

知母

狸骨

桔梗

防風

荏子

礬石

黃芩

白芷

芍藥

甘草

雌黃

白木

礬石

地膽

斑蝥

雄黃

各等分

右十八味為末蜜丸如大豆以酢服三九三十日知四
十日愈六十日平復百日內慎房室一方為散醋服壹

又方

蝟皮

半枚

鱖鯉甲

樗雞

各肆枚

蜥蜴

蜈蚣

各壹枚

蜀椒

附子

當歸

蜂房

地榆

桂心

通草

乾漆

牡蛎

薏苡人

茯苓子

漏蘆

一作龍膽

龍膽

一作龍骨

上瓜

各叁分

斑蝥

肆分

蛇牀子

苦參

大黃

雄黃

蛇蛻皮

蘭茹

細辛

各壹分

鶴骨

陸分

右二十八味治下篩酒服五分匕以知為度日二服

又方

斑蝥

壹拾枚

蝟皮

真珠

雄黃

各壹分

右四味治下篩酒服半錢匕日二

金方子二

五

又方

末成鍊松脂

填瘡孔

令滿日二

四度

七日

瘡有神

各壹分

又方

斑蝥

貳拾枚

雄黃

桂心

犀角

各壹分

右四味治下篩酒服一錢匕日再服病從小便出

又方

馬齒莧

陰乾

臘月燭燼

各等分

右一味為末以臘月猪脂和其瘡先以暖泔清洗淨拭

乾然後以藥傅之日三

又方

乾牛屎

乾人屎

各等分

右一味搗先用綿裹瘡上綿上著桑蟲聞屎香即出若

瘡即舉綿去之更別取屎及綿著其上如前蟲盡乃止

又方

苦瓠

四枚

大如蠶者

各穿一孔

如指大

置湯中

煮十

數沸

取一竹筒

長一尺一頭內瓠乳中一頭注瘡孔

上冷則易之徧止

治一切漏方

斑蝥肆拾枚 鼓肆拾枚 元青貳拾枚 生大豆黃

地膽各拾枚 蜈蚣壹升半 犀角 牛黃各棗大

右八味為末蜜丸如梧子大飲服二丸須臾多作酸漿

粥冷飲之病從小便出尿盆中相視如有蟲形狀又似

膠汁此病出也間日一服飲粥如常小弱者隔三四日

候無蟲出瘡漸瘳特忌油膩一切器物皆須灰洗乃作

食崔氏云治九漏初服藥少夜食明日服二丸至七日

類並不不得食人強隔日一服人弱兩三日一服

又方煮鹽花以麪攤病上內鹽花麪匡中厚二寸其下以

桑葉二重藉鹽花冷熱得所可忍冷則無益熱則以

肉一日一度候瘳癢根株勢消則止若已作瘡者

稗穀為末粉之

又方搗北陰白皮三十斤剉碎以水一石煮取一斗去滓

煎如糖又取都則上雌雄鼠屎各十四枚燒令汁盡

為末內煎中又溫酒一升投煎中合攪之羸人服五

合當有蟲出

又方霜下瓠花曝乾為末傳之

又方搗土瓜根傳之燥則易不限時節

又方死蛇去皮肉取骨為末合和封瘡上天痛以舌入

摩之止

又方死蛇和臘月猪脂合燒灰為末內孔中

又方燒死蛻蝦為末醋和塗又死蛇交醋和傳之

又方故布裹鹽加彈丸大燒令赤為末酒服

又方服白馬菜汁一升

又方水研杏仁服之

又方猪脂一升酒五合煎沸頓服之

又方鹽麩和燒灰傳

又方正月雄狐屎陰乾搗末水和服

治漏作瘡孔方

露蜂房為末臘月猪脂和傳孔上

治漏發心骨以下者方

松脂

武都雄黃

各參兩

右二味和為塊刀子刮為散飲服一方寸匕日二不瘥

更合

治漏方

殺落鐵骨

狗頰車連齒骨

炙

鹿皮

合毛燒為灰。各等

右四味治下篩以猪膏和內瘡中漬更即易日五六

治一切冷瘻方

燒人所吐蛔蟲為灰先用甘草湯洗去瘡惡然後

交無不瘥者慎口味

治鼠瘻腫核痛未成膿者方

以柏葉傳腫上熬鹽者葉上熨之令熱氣下即消

治風漏及鼠漏方

赤小豆

白欬

黃耆

牡蠣

各等分

右四味治下篩酒服方寸匕日二

治螻蛄瘻方

先以泔清煮柵葉取汁洗瘡拭乾次以柵葉灰內

治蜂瘻初生狀如桃而瘻極極之則引大如雞子如覆手者

焚爛對熨之二宿四日不瘥至百日成癰其狀大如四
五寸石廣二寸中生蜂作孔乃有數伯以石硫黃燻
多少燃燭燒令氣出著瘡孔中須更間見蜂數十蜂
盡乃瘥

治蜂瘻方

人屎蛇蛻灰臘月猪膏和傳之

又方 鷓頭灰傳之 又方 取蜂巢燒灰臘月猪膏和傳孔中

治蟻漏孔容針亦有三四孔者方

蛻皮肝心燒灰為末酒服一錢匕

又方 死蛇腹中鼠取臘月猪脂煎候焦去滓傳之

又方 取大黃鮓燒耕坐土令赤以苦酒浸坐土時合壁土

故熱以黃鮓着壁土上展轉令熱傳瘡上

金方廿二

又方 錢鯉甲二十七枚燒末以猪膏和傳瘡上

又方 半夏一枚擣末以鴨脂和傳瘡上

治瘰癧瘻橫潤作頭狀若舌人形亦作瘰癧方

用雄雞屎燒灰臘月猪脂和封之

治蛻娘瘻方

牛屎燒灰臘月猪脂和傳之

又方 蛻娘丸即蛻娘所食屎也為末傳之

又方 乾牛屎為末傳之瘻即撥却更厚封瘻乃止

又方 熱牛屎塗之數易應有蛻娘出

治蛻娘瘻方

雞屎 蛻娘屎

右一味為末用社猪下頰髓和傳之

治蠍瘻五六孔皆相通者方

搗茅根汁著孔中

治蝦蟇瘻方

五月五日蛇頭及野猪脂同水衣封之佳

治蛇瘻方

蛇蛻皮燒灰臘月猪脂和封之

治蛙瘻方

蛇腹中蛙燒灰封之

治顛當瘻方

搗土瓜根傅至瘻慎口味

治雀瘻方

取母猪屎燒交臘月猪膏和傅上當有蟲出如雀

查方十三

九

治膿瘻方

桃花末以猪脂和封之佳

治石瘻兩頭出者其狀堅實令人寒熱方

以大鈹針破之次用鼠粘葉二分為末和雞子白一

枚封之

又方搗槐子和井花水封之

灸漏法

葶藶子

或合

豉壹升

右二味和搗令極熟作餅子如大錢厚一分許取一枚

當瘻孔上作大艾炷如小指大灸餅上三炷一易二餅

九炷隔三日復一灸之

外其甚灸原葶藶子古今錄驗云不可灸願瘻瘻氣入

又方搗生商陸根捻作餅子如錢大厚三分安漏上以艾

灸上餅乾易之灸三四升艾瘥 外學灸瘥餅

又方 七月七日日未出時取麻花五月五日取艾葉分合
擣作炷用灸瘡上百壯 外學灸瘥餅

九漏多肩井二百壯○漏灸鳩尾骨下宛宛中七十壯○
諸漏灸瘻周四畔瘥○諸惡漏中冷息肉灸足內踝止各
三壯二年六壯

寒熱胃滿頸痛四肢不舉腋下腫上氣胃中有音喉中鳴
天池主之 寒熱頸頷腫後谿主之

寒熱酸脊痛四肢不舉腋下腫馬刀瘻喉痺脾膝胫骨搖
酸痺不仁陽輔主之 寒熱頸腋下腫中脈主之

胃中滿腋下腫馬刀瘻善自嚙舌頰天牖中腫寒熱胃脇
腰膝外廉痛臨泣主之 寒熱頸腫丘墟主之

腋下腫馬刀有腫吻傷太衝主之

寒熱頸瘰癧大迎主之

白濁 治鼠漏及瘰癧方

- 白馬屎
- 白牛屎
- 白猪屎
- 白羊屎
- 白雞屎 各青并
- 漏蘆 貳斤

右六味各於石上燒作灰研絹篩之以猪膏一升三合
煎亂髮一兩半令極沸盡消乃內諸末微火上煎五六
沸藥成去瘡加以鹽湯洗新帛拭乾然後傅膏若無疣
猶須湯洗日再若著膏當以帛裹上勿令中風冷神驗

曾青散 治寒熱瘰癧及鼠瘻方

- 曾青
- 荏子
- 礬石 一作礬石
- 附子 各半
- 枯薑
- 鹿茸
- 當歸
- 防風
- 芫花
- 黃耆

黃芩 狸骨 甘草各二兩 細辛 乾薑各二兩
斑猫 元青各五枚

右十七味治下篩以酒服一方寸匕日再

治寒熱瘰癧方

土瓜根 連翹 龍膽 黃連

栝蒌根 苦參 芍藥 恒山各壹兩

右八味治下篩酒服五分匕日二千金翼外基有狸骨壹枚又千方翼一方

有當歸歸照栝蒌相山

黃微圓治身體有熱氣瘰癧及常有細瘡并口中生瘡方

薔薇根各二兩 苦著 黃芩 鼠李根皮

栝蒌根 芍藥 苦參 石龍芮

防風一作防己 白欬 龍膽各壹兩 梔子人肆分

金方廿三十一

十一

右十一味為末蜜丸如梧子大飲服十五丸日再千金翼有

黃微圓壹兩

治瘰癧方

白殭蠶治下篩水服五分匕日二服十日瘥

又方 狸頭一枚炙擣篩飲服方寸匕日二

又方 故鞋內糞替燒末五匕和酒一升平日向日服之強

行須臾吐鼠出二朝服外臺不同

又方 狸頭蹄骨等炙黃擣篩為散飲服一錢匕日一

又方 猫兩眼陰乾燒灰并花水服方寸匕日再

又方 乾猫舌為末傳瘡上

又方 狼朶灰傳之

又方 狐頭狸頭灰傳之

又方 五月五日取一切種種雜草煮取汁洗之

灸癰瘰法

本草

右一味各等分為末著乳中

灸癰瘰法

一切癰瘰在項上及觸處但有肉結疑似作癩及癰癩者以獨頭蒜截兩頭留心大作艾炷稱蒜大小帖癰子上灸之勿令上破肉但取熱而已七壯一易蒜日日灸之取消一切癰瘰灸兩膈裏患癰處宛宛中日一壯七日止神驗又灸五里人迎各二十壯 又灸耳後髮際直脉七壯又灸患人背兩邊腋下後文上隨年壯

腸癰第一論一首 方二十一首

論曰卒得腸癰而不曉其病候愚醫治之錯則殺人腸癰之為病小腹重而強抑之則痛小便數似淋時時汗出

惡寒其身皮皆甲錯腹皮急如腫狀其脉數者小有膿也

其脉遲緊者未有膿也其甚者腹脹大轉側聞

水聲或遠臍生瘡或膿從臍中出或大便出膿血

問曰官羽林婦病醫脉之何以知婦人腸中有膿為下之

即愈師曰寸口脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮

數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為濁敗小腹

痞堅小便或澀或復汗出或復惡寒膿為已成設脉遲緊

即為痰血血下則愈

大黃牡丹湯治腸癰方

大黃 牡丹 芒消 瓜子 枳實 桃人

右五味以水五升煮取一升頓服當下膿血

芒消半合瓜子伍合枳實半升桃人伍拾

腸癰

便於調時白汗出其脈遲取者未成膿可下之
當有血脈數膿成不復可下

明方

廿丹

甘草

敗醬

生薑

枳實 各貳兩

桔梗

薏苡人

麥門冬

丹參

芍藥 各肆兩

生地黃

伍兩

右十一味 㕮咀以水一斗 煮取三升 分三服 日三

又方 薏苡人 壹升

牡丹皮

桃人

各叁兩

瓜瓣人

貳升

石四味 㕮咀以水六升 煮取二升 分再服

姚氏不用桃人用杏人 崔氏有消貳兩云腹中痛煩毒不安或脹滿不下飲

食小便澀此病多疑腸雖人多不識婦人產後虛熱者

冬成此病非雞也

又方 雞雞頂上毛并采燒作末 空心酒服之

又方 截取擔頭尖少許 燒灰水和服 當作孔出膿血 取愈

金方卷之十一

十三

凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯 初患腹中苦痛 或繞臍有

瘡如粟皮熱便膿血出似赤白 下不治必死方

馬蹄灰以雞子白和塗 即拔氣不過再

又方 瓜子三升 擣末以水二升 煮取一升 五合分二服

又方 死人塚上土作泥塗之

治內癰未作頭者方

取伏雞采服之即瘥

又方 馬牙灰雞子和塗之 乾則易

灸腸癰法

屈兩肘正灸肘頭 鈺骨各百壯 則下膿血即瘥

論曰 產後宜勤濟乳 不宜令汁蓄積 蓄積不去 便結不復

出惡汁於內 引熱溫壯 結堅牽掣 痛大渴 引飲乳急痛身

不得近成妬乳非離也急灸兩手的際各二十七壯斷離脈
也不復惡手近乳汁亦自止便可手助近捋之則乳汁大
出皆如膿狀內服連翹湯外以小豆薄塗之便瘥
婦人女子乳頭生小淺執瘡癢搔之黃汁出浸淫為長百
種治不瘥者動經年月名為妬乳婦人飲兒者乳皆欲斷
世謂苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傳一物
飛烏膏及飛烏散佳若始作者可傳黃芩漏蘆散及黃連
胡粉散並佳

赤龍皮湯方

搗皮切二升以水一斗煮取五升夏冷用之冬溫用
之分以洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗竟傳膏散

天麻湯方

天麻草切五升以水一斗半煮取一斗隨寒熱分洗
乳以殺癢也此草葉如麻冬生夏著花赤如鼠尾花
也亦以洗浸淫黃爛執瘡癢疽濕陰蝕小兒頭瘡洗
竟傳膏散

傳膏方

傾粉是燒米砂作水銀上 礬石各各二兩

右二味為末以甲煎和如脂以傳乳瘡日二傳作散者
不須和汁自著者可用散及諸熱瘡黃爛瘡浸淫汁瘡
丈夫陰蝕癢濕瘡小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡鴉瘡等並
皆主之

黃連胡粉散方

黃連貳兩

胡粉拾分

水銀壹兩

右三味黃連為末相和與皮果熟按之自能和合縱不得成一家亦得水銀細散入粉中也以傅乳瘡諸濕瘡黃爛肥瘡等若乾者申前為膏

治妬乳乳生瘡方

蜂房

猪甲中土

車轍中土

各等分

右三味為末苦酒和傅之

聖角散

治婦人乳生瘡頭汁出疼痛欲死不可忍者方

鹿角

二分

甘草

一分

右一味治下篩和以雞子黃於銅器中置溫處炙上傳之日再即愈神驗不傳

治妬乳方

取葵莖火擣篩飲服方寸匕日三即愈集驗方自擣為散不為灰

又方

燒白死蛇為灰和以猪膏塗之大良

十一

灸法

以蒲橫度口以度從乳上行灸度頭一七壯

論曰產後不自飲兒并失兒無兒飲乳乳著喜結癰不飲兒令乳上腫者以雞子白和小豆散傅乳旁令消結也若飲兒不泄者數捻去之亦可令大孩子含水使口中冷為啣取滯乳汁吐去之不含水嗽去熱喜令乳頭作瘡乳孔塞也

凡女人多患乳癰年四十已下治之多瘥年五十已上慎勿治治之多死不治自得終天年

連翹湯治妬乳乳癰方

連翹

芒消各一分 芍藥

射干

妬乳乳

升麻 防己 杏仁 黃芩

大黃 紫胡 甘草 各三兩

右十一味以水九升煮取二升五分二服

治乳癰方

麥門冬 青升 黃芩 芍藥 伏苓 各二兩

桑寄生 人參 黃耆 防風

甘草 各三兩 粘糖 兩 人棗 伍枚

右十一味以水一斗煮取三升去滓內糖一沸分

四服

又方 先服前件湯五日後服此丸即愈方

天門冬 兩 澤蘭 伍分 大黃 伍分 升麻 陸分 羌活

桑寄生 防風 人參 黃耆 乾地黃

三引方

白芷 通草 各二兩 黃芩 枳實 五味子

茯神 天雄 芍藥 當歸 各二兩

右十九味為末蜜丸酒服二十九日一加至四十九

治乳癰始作方 黃芩方云治乳癰大堅硬赤

大黃 棟實 芍藥 馬蹄 各等分

右四味治下篩飲服方寸匕取汁出瘡 黃芩方云酒服方寸匕覆取汗

皆由腫者竟後腫處散不痛經前乃消

抹膿散 治乳癰除惡肉方

茯苓 鐵精 桂心 細辛

黃芩 芍藥 人參 防己 一作防風

乾薑 芍藥 當歸 各二分 甘草 伍分

右十二味治下篩酒服方寸匕日三夜一服藥十日

血出多勿怪

又方 生地黄各升

芒消各分

豉壹升

右三味合搗傅上熱即易之取瘥止一切癰腫皆用之

一方單用
地黃傳之

治妬乳乳癰腫方

取研米槌二枚炙令熱以絮及故帛搗乳上以槌更互熨之瘥止已用立效

治乳癰堅方

以水罐中盛醋泔清燒石令熱內中沸止更燒如前少熱內乳清之及冷更燒石內漬不過二度燒石愈

又方 黃芩

白斂

芍藥各等分

右三味為末以漿水飲服半錢七日三若左乳汁結者

重方廿二

十七

即將去右乳汁若右乳汁結者可將去左乳汁治乳癰

治乳癰方

大黃

鼠屎新者各壹分

黃連貳分

右三味搗為末以黍米粥清和傅乳四邊痛止即愈無黍米粟米粳米亦得

又方 大黃

莽草

生薑各貳分 伏龍肝拾貳分

右四味搗為末以酢和塗乳癰即止有效

又方 鹿角治下篩以猪脂上清汁服方寸匕不過再服亦

可以醋漿水服

又方 取葱白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

治乳癰 二三百日最療不瘥但堅紫色青柳根製方

柳根削取上皮搗令熟熬令溫盛薑黃練藥中對乳

乾則易之一宿即愈

治婦人乳腫痛除熱方

葶藶子

大黃略書

敗醬黃八分

桂心

人參

薏苡人

附子

黃連

黃耆

雞骨

當歸

枳實

芍藥

通草各二分

右十四味為末蜜丸如梧子大未食飲服三丸不知益至五九日三無所忌一方無大黃敗醬黃連通草為散酒服方寸匕

五痔第二

論一首 灸法一首

方二十六首

論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脈痔四曰腸痔

五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時潰膿血出牝痔者肛

腫痛生瘡脈痔者肛邊有瘡癢痛腸痔者肛邊核痛發寒

五痔方寸匕

十六

熱血痔者大便清血隨大便污衣又五痔有氣痔寒溫勞

濕即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如鼠乳在乳中頗出見外

妨於更衣蠶中主之牝痔集驗作從乳中起外腫五六日

自潰出膿血猬皮主之懸痔更衣挺出久乃縮毋緒左足

懸蹄甲主之脈痔更衣出清血蜂房主之五藥皆下篩等

分隨其病倍其主藥為二分日以井花水服半方寸匕病

甚者日暮服之亦可四五服禁寒冷食猪肉生魚菜房室

惟得食乾白肉病瘥之後百日乃通房內又用藥導下部

有瘡內藥瘡中無瘡內孔中又用野葛燒末刀圭內藥中

服藥五日知二十日若二十日愈痔痛通已葷菜

治五痔瘡醫所不能愈者方

秦艽

白芷

厚朴

紫參

亂髮

五痔

紫苑各言兩 雷丸

藁本各言兩 石南

蟻蟲各言兩

貫衆各言兩 蝨蟲半升 猪後懸蹄拾肆枚

右十二味合搗下篩以羊髓脂煎和丸如梧子大空腹飲下十五丸日一若劇者夜一服四日肛邊癢止八日膿血盡鼠乳悉瘳滿六十日終身不復發又服益善忌魚猪肉等

槐子圓治燥濕痔痔有雄雌皆主之方

槐子 乾擦 吳茱萸根 白皮各肆兩 秦光

白芷 桂心 黃耆 白斂

牡蠣 龍骨 雷丸 丁香 木香

蒺藜 附子各貳兩

右十六味為末蜜丸如梧子大飲服二十九日千金

金方子

白斂深師無黃者自二公治苦暴有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者有腸中煩癢者三五年皆殺人主已飲酒及作勞力犯之即發

小槐子圓治五痔十年者方

槐子叁斤 白糖貳斤 礬石 硫黃各壹斤

大蘇 乾擦 龍骨各拾兩

右七味四味搗篩其一種石及糖並細切內銅器中一石米下蒸之以綿絞取汁和藥末併手丸如梧子大陰乾酒服二十九日二稍增至二十九

槐子酒治同前

槐子貳斗 槐東南枝 細剉壹石 槐東南根 細剉叁石

右三味內大釜中以十六升水煮取五斛澄取清更煎取一石六斗炊兩斛黍米上麴二十斤釀之攪令調劑

泥七日酒熟取清飲適性常令小小醉合時更煮痔取汁淘米及洗器不得用水須知此事忌生水故也

又方 塗熊膽取瘡止神良一切方皆不及此

又方 七月七日多採槐子熟搗取汁內銅器中重綿密蓋著宅中高門上曝二十日已上煎成如鼠屎大內穀道中日三亦主瘻及百種瘡

又方 取生槐白皮十兩熟搗九如彈丸綿裹內下部中此病宜常食扁竹葉及煮羹粥大佳

又方 取鯉魚腸二具以火炙令香綿裹內穀道中一食久蟲當出食魚腸數數易之盡三具瘡一方炙腸令香坐上蟲出經用有效

又方 虎頭 犀角

右一味為末和不中水猪脂大如雞子塗瘡上取瘡

治五痔及脫肛方

槐白皮兩猪脂半斤 榛子 桃人各拾 巴豆米拔

薰草 辛夷 甘草 白芷各半 野葛陸錄

右十味咬咀煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔中日四五過蟲死瘡止癢痛大佳

治五痔方

猬皮方參指 熏黃棗大末 熟艾雞子大

右二味穿地作孔調和取便熏之口中熏黃煙氣出為佳火氣消盡即停停二日將息更熏之凡二度永瘡勿犯風冷羹臙將補慎猪雞等

又方 取槐根煮洗之 **又方** 用桃根煮洗

清皮圓治痔方亦治漏

狷皮壹斤礬石

當歸

連翹

乾姜

附子

續斷

黃耆略貳

槐子各三兩

乾地黄兩

右十味為末蜜丸如梧子大每服十五丸日再加至四十丸集驗方無礬石地黄

又方治崩中及痔方

狷皮

人參

茯苓

白芷

禹餘糧

乾地黄

槐耳

續斷各壹兩

蒲黃

黃耆

當歸

艾葉

橘皮

白欬

甘草各貳兩

白馬蹄備晨一宿

鱧魚頭貳拾枚

牛角鯁各肆兩

猪懸蹄甲貳拾壹枚

右十九味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日再稍加

治痔方

取槐耳赤雞一斤即提為末飲服方寸匕日三

以蒲黃水服方寸匕日三良妙外臺云治腸痔每大便常有血者

取桑耳作羹空腹飽食之三日食佳

治痔下血及新產漏下方

附子

好礬石各壹兩

右二味為末白蜜丸如梧子大酒服二九日三稍加不過數日便斷百日服之終身不發崔氏方有干姜壹兩

治外痔方亦治惡瘡瘡瘡

真珠

雄黃

雌黃略壹

竹茹參兩

猪膏壹斤

右五味為末內猪膏中和調又切亂髮半雞子大和東向煎三上三下髮焦出其痔先用鹽湯洗拭乾後

治痔下部出膿血有虫傍生孔竅方

槐白皮一擔剉內釜中煮令味極出置大盆中適寒
溫坐其中如浴狀虫悉出冷又易之不過二三度瘻
治穀道瘻痛繞緣腫起裏許欲生肉突出方

大豆參升以水煮槐白皮參升甘草參兩

槐皮膏 治穀道瘻痛痔瘡方

槐皮 棟實各伍兩外其葉作塵甘草參兩
白芷各貳兩當歸參兩 桃人陸拾枚赤小豆貳合

右七味以豆汁煮取二升浸故帛薄之冷則易日三
取摩瘻上日再并導下部刪繁方无當歸治右腎勞虛或

此門腫生密因酒勞傷發
此門腫生密因酒勞傷發

石穀道痛方

菟絲子 藜黃黑和雞子黃以傳之日二度

又方 取杏人藜令黃搗作脂以傳之

治大便孔卒痛如鳥啄方

以大小豆各一斗和搗內兩袋中蒸令極熱更互坐
之瘥

及法

又冷五痔使血炎脊中白壯

五痔使血失榮炎回氣白壯元在脊窮骨上

疥癬第四論一首 方六十一首

論曰凡瘡疥小秦芹散中加烏蛇肉二兩主之黃耆酒中

加烏蛇脯一尺亦大效千金翼云黃耆酒中加烏蛇脯

分大秦九散中加之亦有人效小小疥癩十
六味小秦九散亦相當黃耆酒見第十七卷中

凡諸疥癩皆用水銀猪脂研令極細塗之

若凡有瘡疥腰膝手足皆生疔疥者方

枯婁根兩黃連 芍藥 薔薇根 雀李根皮

黃蘗各三苦參 黃耆 黃芩 石龍芮兩

大黃 當歸 續斷各壹兩

右十二味為末蜜丸如梧子以薑飲服二十九日三

至二十九日瘡乃止乾疥白癬勿服千金翼云所是

疥癩及風疥諸雜瘡方

千年菰根 好礬石 雄黃 藜蘆

瓜蒂 胡粉各壹分水銀叁分

右七味以柳木研水銀使盡用猪脂一升煮藜蘆菰根

瓜蒂二沸去滓內諸藥和調令相得即成以傅之神良

如雷治一切惡瘡疥癬疽漏腐方

藜蘆 狼牙 青箱 地榆

藜蘆 當歸 菟蓄 羊蹄根各貳

蛇牀子 白飲各陸分漏蘆貳分

右十一味擣以苦酒漬一宿明日以成煎猪膏四升煎

之三上三下膏成絞去滓內後藥如左

雄黃 雌黃 硫黃 礬石

胡粉 松脂各貳兩水銀叁兩

右七味細研看水銀散盡即傾前件膏中以十隻筋攪

數百徧止用瓷器密貯舉勿令泄氣煎膏法必微火急

即不中用傳藥不可近目及陰先研雄黃等令細候膏
小冷即和攪傳之

治疥疽諸瘡方

水銀

胡粉各陸分 黃連

黃蘗各捌分 葶藶拾分

礬石

附子

苦參

蛇牀子各叁分

右九味水銀胡粉別研如泥餘為末以成煎猪膏合和
研令調以傳之千金翼無薑黃

治久疥癬方

丹砂

雄黃

雌黃劉涓子無 亂髮洗淨 松脂

白蜜各壹兩 蘭茹叁兩 猪脂貳升 巴豆拾肆枚

右九味先煎髮消盡內松脂蜜二上三下去滓內諸末
中更一沸止以傳之千金翼用蠟不用蜜

又方水銀

礬石一作礬石

黃連一作雄黃

蛇牀子各

右四味為末以猪脂七合和攪不見水銀為熟傳之一
方加藜蘆一兩又云蘭茹

若諸瘡疥癬久不瘥者方

水銀壹斤

臘月猪脂伍斤

右二味以鐵器中壘竈用馬通火七日七夜勿住火出
之停冷取膏去水銀不妨別用以膏傳一切瘡無不應
手立瘥千金翼又用水銀粉和猪脂塗之

又方特牛尿

羊蹄根各伍升

右二味以牛尿漬羊蹄根一宿日曝乾復內尿中取盡
止作末傳諸瘡千金翼云和猪脂用更精

又方拔取生烏頭十枚切薑汁洗之瘥

論曰凡諸瘡癬初生時或始痛癢即以種種單方救之或
嚼鹽塗之又以穀汁傳之又以蒜墨和傳之千金翼又以
薑黃傳之又以鯉魚鮓糝傳之又以牛李子汁傳之若以
此救不差乃以前諸大方治之

治細癬方

蛇牀子

白鹽一作白堊

羊蹄根各壹斤

赤葛根

苦參

葛蒲各半斤 黃連

莽草各參二兩

右八味咬咀以水七升煮取三升滴寒温以洗身如炊
一石米填為佳澄清後當微温用之滿二日止

又方羊蹄根於磨石上以苦酒磨之以傳瘡欲傳先刮瘡

以火炙乾後傳四五過千金翼云搗羊蹄根苦葛莽草

湯以蜜和者傳之加艾膏石米以糞去更

又方羊蹄根五升以桑柴灰汁煮四五沸以洗凡方中用

羊蹄根皆以日未出採之佳

又方葛蒲末五斤以酒五升漬盆中蒸之使味出先絕酒

一日每服一升或半升

又方用乾荆子燒中央器承兩頭取汁塗之先刮上令傷

次用荆子汁

治癬方

取前餅執搗不限多少日一遍良亦治浸淫瘡

又方淨洗瘡取醬辦雀屎和傳之瘡止千金翼云取醬

又方水銀蕪美和酥傳之

又方日中擣桃葉汁傳之

又方擣刺薊汁服之

又方擣羊蹄根和乳塗之

又方服地黃汁佳

又方 服鹽水良

又方 醋煎艾塗之

又方 搗良岩根蜜和傅之

千金翼無根字

治濕癬肥瘡方

用大麻滿傅之五日瘥

治癬久不瘥者方

取自死蛇燒作灰猪脂和塗即瘥

灸癬法

日中時灸病處影上三姓灸之呪曰癬中蟲毛戎戎若欲

治待日中

八月八日日出時令病人正當東向戶長跪平舉兩手持

一兩邊取肩頭小垂際骨解死宛中灸之兩火俱下各三

壯若七壯十日愈

治小兒癬方

以蛇牀實搗末和猪脂以傅之

治搔癢方

以水銀和胡粉傅之

治身體搔癢白如癬狀者方

楮子參枝

猪脂青貝

鹽青貝

礬石青兩

右四味以苦酒一升合搗令熟以拭身體日三

治癩瘡方

以三年醋磨烏賊骨先以布摩肉令赤次傅之

又方 醋磨硫黃塗取上

集驗又磨附子硫黃上使熟將以布拭病上乃以藥傅之

又方 取途中先死蜈蚣搗爛塗之當指令熱封上一宿瘥

又方 白斂

薰陸香

右二味搗上作末水服瘥

又方 硫黃

雌黃

獺皮煨

蛇蛻各等分

右四味各等分搗篩以清漆合和薄塗白處欲塗時先以巴豆半截拭白處皮微破然後傳之不過三兩度

又方 硫黃

水銀

礬石

竈墨各等分

右四味搗篩內坩子中以葱葉中淨和研臨卧傳病上

九疔散 治白癩風及二百六十種大風方

當歸赤分 石南陸分 附子

躑躅

秦艽

菊花

乾薑

防風

雄黃

麝香

丹砂

斑蝥各肆

蜀椒

連翹

鬼箭羽

石長生

知母各捌分 鬼臼拾壹分 人參

王不留行

石斛

天雄

烏頭

獨活

防己

莽草各拾

水蛭各拾

蜈蚣各拾

蟻蟲

地膽各拾

右三十味諸蟲皆去足翅髮炙令熟為散以酒服方寸

匕日再其病入髮令髮白服之百日愈髮還黑

又方 天雄

白斂

黃芩各叁兩

乾薑肆兩

附子壹兩

商陸

躑躅各壹升

右七味治下篩酒服五分七日三

治白癩方

礬石

硫黃

右二味各等分為末酢和傳之

又方 平日以手掉取韭頭露塗之極效

又方 以酒服生胡麻油一合日二稍稍加至五合慎生冷

猪雞魚蒜等百日服五斗瘥

又方取羅摩草煮汁拭之亦指合傷搗白汁塗之

又方石灰松脂酒主之方見卷末

又方以蛇蛻皮熬摩數百過葉置草中

又方樹空中水洗桂為末唾和塗之日三

又方以水銀數數拭之令熱即消瘡乃止

又方灸左右手中指節去延外亦中三壯未瘥報之

治凡身諸劇白駁漸漸長似癬但無瘡方

取鰻鱺魚脂塗之先指病上使痛然後塗

治皮中紫赤斑痣去蟹穢方

乾漆

雌黃

礬石各各二兩

雄黃伍兩

巴豆拾伍枚

炭皮貳斤

右六味治下篩以雞子白和塗故帛帖病上日一易

金方十三

廿八

治赤斑方

用墨大蒜鮑血合塗之

治蒼斑疔方

雄黃

硫黃

真珠

礬石

巴豆

蘭如

藜蘆各壹兩

右七味治下篩以真漆合和如泥以塗點病上須成瘡

及去面點皮中紫不耐漆人不得用以雞子白和之

去疣目方

七月七日以大豆一合拭疣目上三遍病疣人自種

豆於南屋東頭第一齋中豆生四葉以湯沃殺即瘥

又方松柏脂合和塗之

宿失矣

又方石硫黃指六七遍

又方杏人燒令黑研膏塗之

紫赤斑疔方

又方以猪脂養髮指之令少許血出即瘥神驗不可加

又方每月十五日正時望月以秃條帚掃二七遍瘥

又方苦酒漬石灰六七日滴取汁點疣上小作疣即落

又方取牛口中涎數塗自落

又方著艾炷疣上灸之三壯即除

惡疾大風第五論一首 方十首

論曰惡疾大風有各種不同初得雖徧體無異而眉鬚已落有徧體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人而四肢腹背有頑處重者手足十指已有墮落有患大寒而重衣不暖有尋常患熱不能暫涼有身體枯槁者有津汁常不止者有身體乾癢微骨搔之白皮如麩手下作瘡者外臺作卒不作有瘡痂荼毒重疊而生晝夜苦痛不已者有直置頑逆

五方子二十一 廿九

不知痛癢者其色亦有多種有青黃赤白黑光明枯暗此候雖種種狀貌不同而難療易瘥皆在前人不由醫者何則此病一著無問賢愚皆難與語何則口順心違不受醫教直希望藥力不能求已故難療易瘥曷在前人不關醫藥予嘗手療六百餘人瘥者十分有一莫不一一親自撫養所以深細諳委之姑與其語覺難與語不受入即不須與療終有觸損病既不瘥乃勞而無功也又神仙傳有數十人皆因惡疾而致仙道何者皆由割棄塵累懷穎陽之風所以非止瘥病乃因禍而取福也故余所親病者其中頗有士大夫乃至有異種名人及遇斯患皆愛戀妻孥繫著心髓不能割捨直望藥力未肯近求諸身若能絕其嗜慾斷其所好非但愈疾因茲亦可自致神仙余嘗問諸病

人皆云自作不仁之行久久並為極獲之業於中仍欲更作云為雖有悔言而無悔心但能自新受師救命食進藥餌何有不除余以貞觀年中將一病士入山教服松脂欲至百日鬚眉皆生由此觀之惟須求之於己不可一仰醫藥者也然有人數年患身體頑痺羞見妻子不告之令知其後病成狀貌分明乃云犯藥卒患此皆自誤然斯疾雖大療之於微亦可即瘥此疾一得遠者不過十年皆死近者五六歲而亡然病者自謂百年不死深可悲悼一遇斯疾即須斷鹽常進松脂一切公私物務釋然皆棄猶如脫羸凡百口味特須斷除漸漸斷穀不交俗事絕乎慶弔幽隱巖谷周年乃瘥瘥後終身慎房事犯之還發茲疾有吉凶二義得之脩善即吉若還同俗類必是凶矣今略述其由致以示後之學者可覽而思焉

南豆治惡疾方

細粒烏豆擇取摩之皮不落者取三月四月天雄烏頭苗及根淨去土勿洗搗絞取汁漬豆一宿漉出曝乾如此七反始堪服初服二枚漸加至六七枚日一服禁房室猪魚雞蒜畢身毛髮即生犯藥不瘥

治萬病癱瘓疝癩疥癬風痿骨肉疽敗百節痛

天雄

附子

茵芋

外臺作南草

躑躅

細辛

烏頭

石南

乾薑

各壹兩

蜀椒

防風

葛蒲

白木

獨活

各叁兩

右十三味治下篩酒服方寸匕日三勿增之

狼毒散治惡疾方

狼毒

秦黃各等分

右二味治下篩酒服方寸匕日三服五十日愈

又方煉松脂投冷水中二十遍蜜丸服二九遇飢即服之

日三鼻柱斷離者二百日服之瘥斷鹽及雜食房室

又大門冬酒服百日愈

石灰酒主生毛髮眉鬚去大風方

石灰青石并水和

松脂成煉拾斤為末

上麴壹斗貳升

黍米壹石

右四味先於大鍋內炒石灰以木札著灰中火出為度以枸杞根剉五斗水一石五升煮取九斗去滓以淋石灰三遍澄清以石灰汁和漬麴用汁多少一如釀酒法

金方廿一

廿一

訖封四七日開服常令酒氣相及為度百無所忌不得觸風其米泔及飯糟一事已上不得使人畜大鼠食之皆令深埋却此酒九月作二月止恐執隔上熟者服後進三五口冷飯壓之婦人不能飲食黃瘦積年及尊風不過一石即瘥其松脂末初醱酒攤飯時均散著飯上待飯冷乃投之此酒飯宜冷不爾即醋宜知之

治大風眉鬚落赤白癩病八風十一痺筋急肢節緩弱飛尸道注水腫癰疽疥癬惡瘡脚攣手折眼闇洞洩痰飲宿滯寒冷方

麴貳拾伍斤

商陸根貳拾伍斤馬耳切之

右二味合於甕中水一斛漬之炊黍米一石釀如家法使麴米相淹二酸毘密封二七日開視麴滓酒熟澄清

溫服三升輕者一升藥發吐下為佳宜食弱羹飯牛車
鹿肉羹禁生冷醋滑及猪犬雞魚等

治風身體如蟲行方

鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四遍并療一

又方以淳灰汁洗面不過一月

又方以大豆清飯漿水日日溫洗面洗頭髮不淨加少麩
勿以水濯之不過十度

**成煉雄黃松脂各等分蜜和丸如梧桐子大飲下十
丸日三服百日愈漬酒肉鹽豉等**

重刊錄真人備急千金要方卷之二十三



