

經史證類備急本草

十三

經史證類備急本草卷第九

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本經白字

一十三種名醫別錄墨字

一十二種唐本先附

唐附

二十二種今附

皆醫家嘗用有效注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

艾葉

實續注

證類本草九

惡實

牛蒡葉續注

水萍

紫菜續注

王瓜

地榆

大小薊

海藻

石帆水松續注

澤蘭

昆布

紫菜續注

防己

木防己續注

天麻

附

阿魏

唐附

高良薑

百部根

懷香草

唐附

鬱金

唐附

紅藍花

附

草撥

根續注今附

京三稜

今附

薑黃

附

蘿摩子

唐附

青代赭

今附

蒟蒻

音韻附

蘆會

今附

肉豆蔻

附

補骨脂

今附

零陵香


附

縮沙蜜

附

蓬莪菴

旬律切今附



續雪草

白前

蘇老

白藥

唐附

荭草

音紅

莎草

革澄茄

今附

胡黃連

今附

船底苔

新補

紅豆蔻

今附

時蘿

今附

艾蘂香

今附

甘松香

今附

垣衣

地衣續注

陟釐

离音

鳬葵

唐附

女菀

王孫

土馬駿

新定

蜀羊泉

菟葵

唐附

井中苔萍

藍附

茅香花

唐附

爵牀

新附

蔚草

唐附

鰐腸

唐附

乾苔

新補

百脉根

唐附

白豆蔻

今附

翦草

新附

馬蘭

新補附山

使君子

今附

二

海帶

新定

陀得花

附

地筍

新附

故魚網

附

故繳腳布

附

三

迭迷

附

舍生草

附

四

江中採出蘆

附

虱建草

附

五

菟肝草

附

石芸

附

六

問荆

附

故魚網

附

七

明州艾葉



四九九

證類本草九

三

王亟

艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部墮瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令

見風

良唐公注

太醫司馬文正公論

太艾葉使能止崩血安胎止腹痛醋煎治

乾菜食之又除鬼氣炒艾作餛飩吞三五枚以飯壓之良長服止冷痢又心

腹惡氣取葉搗汁飲又搗末和乾薑末爲丸一服三十丸

敷壓日再服治一切冷氣田

切冷氣鬼邪毒氣最大惡氣

云艾實與乾薑爲末蜜丸消一切冷氣

野人尤與相當

六止霍亂轉筋治心痛鼻洪并帶下及患痢久後分

寒熱急痛和蠚并詞子涼熏神驗艾實

暖無毒壯陽助水藏腰膝及暖子宮

圖經曰

艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之以復道者爲佳

六此種灸百病尤勝初春布地生苗莖類蒿而葉背白以苗短者

爲佳三月三日五月五日採葉暴乾經陳久方可用俗間亦生搗葉取汁飲止心腹惡氣古方亦用熟艾搗金瘡又中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許

擗爛之內少瓶中並下塞諸孔獨留一日以痛處著瓶目下燒艾一時久知

矣又治療取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺痺即差近世亦有單

跋文者或用蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其
毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云

乾者并煎者金瘡崩中霍亂止胎浦春初採爲乾餅子全薑煎服

餛飩可大如彈子許又治百惡氣取其子和乾薑搗作末蜜丸梧子大空

心三十九服以飯三五匙壓之日再服其鬼神速走出頗消一切冷血田

華半兩炙熟老生薑半兩濃煎湯一服便止妙

乾艾

水三外煮取一外頓服

又方

治諸骨哽生艾蒿數外水酒共

一斗煮取四升稍稍飲之良

外臺秘要

治霍亂洞下之無漸卒著

人如刀刺狀冒脇腹內旁刺切痛不可抑按或即吐血鼻中出血

下血一名鬼排以熟艾如鷄子三枚水五升煎取二外頓服之

野人得心痛白熟艾成熟者一升以水三外煮取

外去滓頓服若爲客氣所中者當吐蟲物

又方

治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒或胎

於管中熏下部令煙入更入少雄黃食

又方

治妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎

食但取肥香脯一方寸片先喫令蟲聞香然後即飲一升當下丸

又方

治喉痺青艾和荳蔻一握用醋搗傳

大以酒四升煮取經驗方

又方

治喉痺青艾和荳蔻一握用醋搗傳

二升分爲二服良

月後方

治霍亂洞下之無漸卒著

下部生蟲食其肉爛見五藏便死燒艾

又方

治妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎

於管中熏下部令煙入更入少雄黃食

又方

治妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎

食但取肥香脯一方寸片先喫令蟲聞香然後即飲一升當下丸

又方

治妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎

食但取肥香脯一方寸片先喫令蟲

灰傳


荆楚歲時記

端午四民踏百草採艾以爲人懸之戶上禳毒氣

縛著用

灸有驗

蜀州惡實



五月十四

證類本草九

五

張仁

惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒熱汗出中風面腫消渴熱中遂水久服輕身耐老生魯山平

澤

似栗狀實細長如茺蔚子根主牙齒痛勞瘧脚緩弱風毒癰疽欬

嗽傷肺肺壅亦瘕積血主諸風癥痕冷氣去一枚出癰疽頭別錄名牛蒡一名鼠黏草

陳藏器本草云惡實根蒸暴乾不爾令人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏上有芒能緩急禾苦主風毒腫諸癰根可作茹食之葉亦

搗傅杖瘡不脹辟風

六牛蒡亦可單用味甘無毒能

主面目煩悶四肢不捷通十三經脉洗五藏惡氣可常作菜食之令人身輕子研末投酒中浸三日每日服三二盞任性飲多小除諸風去丹石毒主明日利腰脚又食前吞三枚熟核下散諸結節筋骨煩熱毒又根細切如豆數拌作飲食之消脹壅又莖葉煮汁釀酒良又取汁夏月多浴去皮間習習如蟲行風涉一避風少時又能搗一切腫毒用根葉入少許鹽花擣一

圖經曰

惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長實似蒲

之鼠耗子亦如羊負來之比根有極大者作菜茹充益人秋後採子入藥用根葉亦可生擣入少盞茶以搗腫毒又冬月採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方

方療暴中風用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荆刀刮去土用生布拭了擣絞取汁一大升和好蜜四大合溫分爲兩服每服相去五六里初服

得汗汗出便差此方得之岳鄂鄭中丞鄭頃年至頴陽因食一頓熱肉便中暴風外生盧氏爲頴陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又篋中方風頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉擣取濃汁二升合無灰酒一升鹽花一匙頭塘火前令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時湏極力令作熱乃速效冬

月無苗用根代之亦可

雷公云

凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待上有薄白霜重出去用布拭上然後焙乾別擣如粉用

根作脯食之良熱毒種擣根及葉封之杖瘡金瘡取葉貼之永不畏風又癰瘍及丹石風毒石熱發毒明耳目利腰膝則取其子末之投酒中浸經三日每日飲三兩盞隨性多少欲散支節筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟搗吞之十服後甚良細切根如小豆大半麪作飯煮食尤良又皮毛間習習如虫行黃根汁浴之夏浴避風却入其子炒過末之如茶前三匕通利小便

聖惠方

治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用根據

絞取汁不計時候服一小盞

外臺秘要

治心煖水服方寸匕加至一匕半日再服

孫真人食忌

主

行以生牛蒡根擣取五合空腹分爲兩服服訖取桑葉

大把炙令黃水一升煮取五合去滓頓服暖覆取汗無葉用枝

鏡治熱攻心煩躁恍惚以牛蒡根

搗汁一升食後分爲三服良

斗門方

治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面赤腫觸著痛用牛蒡子

根一名蝙蝠刺洗淨爛研酒煎成膏攤在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減

末每服一錢入荆芥二穗水一盞同煎至七分放溫服如瘡癰已出更服亦妙

初虞山

治皮膚風熱遍身生癰瘍牛蒡子浮萍等分以

萎苟湯調下
二錢日二服

六

裴仁

六

王氏博濟

治瘡疮將出以牛蒡子炒令熟杵爲

食醫心

天

水萍



五月采

證類本草九

七

三言

水萍味酸寒無毒主裏熱身痒下氣勝酒長髮

止消渴下氣以沐浴生毛髮服輕身一名水花

一名水蘇生雷澤二月採暴乾

陶隱居云此是水

萍子藥錄云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得非斯實也唐本草云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉圓水上小浮萍主火瘡今本草藏器本草云水萍有三種大者曰蘋葉圓闊寸許葉下

有一點如水沫一名茱萸暴乾與栝樓等分以人乳爲丸主消渴擣絞汁飲主蛇咬毒入腹亦可傳熱瘡小萍子是溝渠間者末傳面點擣汁服之主水腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又爲膏長髮本經云水萍

應是小者陸機毛詩義疏云其蘋大者謂之蘋小者曰萍季春始生可繆蒸爲茹又可苦酒淹以就酒

云治熱毒

風熱疾熱狂燒腫毒湯火瘡風癬

圖經曰

水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此是水中大萍葉圓闊

也周南詩六子以采蘋陸機云海中浮萍蘋大者謂之蘋季春始生可繆蒸以爲茹又可用苦酒淹以酒三月採暴乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中者芥菜即下鳧葵是也小者水上浮萍即溝渠間生者是也大蘋今醫方每用浮萍俗醫用治時行熱病亦堪效汗甚有功其方用浮萍草一兩四月十

五日者麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物搗細篩每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治遍身瘡者取水中浮萍濃煮汁瀆浴半日多效此方甚奇也

聖惠方

治少年面上起細胞接浮萍
搗之亦可飲少許汁良也

又方

發背初得毒腫熾熱赤爛搗和鷄子清貼之良

千

金方

治中水毒手足指冷即是或至七日三服良

千金翼

治小便不利膀胱水氣流竄以浮萍日乾末服方寸匕差

孫真人食忌

五月取浮萍陰乾燒煙去蚊子又主消渴以浮萍汁服之

子母秘錄

浮萍熟毒

千

高供奉


採萍時日歇不在山不在岸採我之時七月半選其瓣搗汁傳之令遍風與瘧風些小微風都不筭豆淋酒內下三九鐵頭上也出汗

均州王瓜

證類本草九

八

申



王瓜生熟無毒，王滑湯內，痈瘻血月閨寒。

氣熱，療諸邪氣熱結，鼠癰散癰，腫留血婦人帶下。

不適，下乳汁止小便數不禁，逐四肢骨節中水，療馬骨。

刺人瘡，王瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間三

月採根陰乾。

陶隱居云：今土瓜生籬院間亦有子熟時赤如彈九大根今多不預乾臨用時乃掘取不甚入大方正單行小

小爾禮記月令云：王瓜生此之謂也。鄭玄云：莧，殊爲譟矣。唐本草云：此物蔓生葉似括樓圓無叉缺，子如施子，生青熟赤但無稜爾。根似葛細而多繆。

北間者累累相連大如棗皮黃肉白，子相似根狀不同試療黃疸破血南者大勝也。

今本草陳藏器本草云：王瓜主蠱毒，小兒闔辟瘡滿，並瘡取根及葉擣絞汁服當吐下宜少進之有小毒故也。

王禹鵠等謹註云：王瓜子潤心肺治黃

根使平名王瓜子主蠱毒治小便數遺不禁。

王禹鵠等謹註云：王瓜子潤心肺治黃病生用肺痿吐血，腸風瀉血，赤白痢炒用。

王瓜根通血脉，下行熱疾，酒

黃病，熱心煩悶，吐痰，瘻瘍排膿，熱勞治搘損消瘀，血破癰，癥落胎。

圖經曰

王瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間今處處有之。四月王瓜生即此也。葉似括樓圓無叉缺，有刺如毛。五月開黃花，花下結

證類本草九

九

田光
公廿五

子如彈丸，生青熟赤，根似葛細而多棱，謂之土瓜根，北間者其實累累相連，大如棗皮，黃肉白，苗葉都相似，但根狀不同，耳。三月採根陰乾，均房間人呼為老鴉瓜，亦曰莞瓜。謹按爾雅曰：黃辨，善莞瓜。郭璞注云：似士瓜而土瓜自謂之莞。與葵同，又名鈎姑，蓋莞瓜別是一種也。又云：蕩瓣菲，亦謂之土瓜，自別是一物。詩所謂採葑採菲者，非此土瓜也。大凡物有異類，同名甚多，不可不辨也。葛氏療面上疔瘡子，用之仍得光潤皮急，以土瓜根擣篩，漿水勻和，入夜先將水先面傳藥，旦復洗之。百日光華射人。小兒四歲發黃，生擣絞汁三合，與飲不過三飲已。

聖惠方

治黑疽多死，宜急治用土瓜根一斤搗絞汁六盞合頓服，當有苦水隨小便出，如未出更服之。

外臺秘要

治

土瓜根大如母指長三寸，切以酒半升，外潰一宿，一服當吐下。

月後方

治黃疽變成黑疽，醫所不能治。土瓜根汁頓服一小升，平旦服食後湏病汗當小便出，愈不再服。

又方

治小便不通及關格，方生土瓜根擣之，下乳汁取汁以少水解之，筒中吹下部，取通。

爲末，酒服一錢，一日三

江寧府地榆



衡州地榆



證類本草九

十

地榆味苦甘酸無毒

主婦人乳癰瘍及下病

止痛除惡肉止汗齊金

止膿血諸瘡惡瘡熱瘡消酒

除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及冤句

得髮良惡

麥門冬

六近道處處

山谷二月八月採根暴乾

有葉似榆而長初生布地而花子紫黑

色如故名玉豉一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也

古名時用葉作飲亦好

別本注云今人止冷熱痢及疳痢熱極效

國醫錄論

六地榆味苦平能治產後餘瘀癥痛七傷治金瘡止血痢蝕膿

古今方用共樗皮同療赤白痢

華子六排膿止吐血臯洪月經不止血

崩產前後諸血疾赤白痢并水瀉濃煎止腸

風但是平原川澤皆有獨莖花紫七八月採

圖經曰

地榆生桐柏及冤句山谷今處處有之宿根三月內生苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月開花如棋子紫黑色根外黑裏紅似柳根二月八月採暴乾葉不用山人

乏苔時採此葉作飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平療下血二十年者

取地榆尾草各三兩水二升煮半頓服不斷水瀉屋塵飲一小盃投之不

過重作乃愈小兒疳痢亦單煮汁如飴糖與服便已又毒蛇蟄人擣新根取

汁飲兼以清瘡良崔元亮海上方赤白下骨立者地榆一斤水

三升煮取一升半去滓再煎如稠餳絞濃空腹服三合日再

七言三

唐本注云

主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多白三曰水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門僻七曰合陰陽

患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定用葉作飲代茶甚解熱

止令人黃瘦虛竭以地榆三兩細剉米醋一升

煮十餘沸去滓食前稍熱服一合亦治吐血

肘後方

療創大咬人地榆根末服方寸匕日一二亦傳瘡生搗更佳

葛氏

毒蛇蟄人搗地榆根

方

治創大咬人瘡地榆飲之兼末傳瘡上服方寸匕日三服忌酒若治瘡已差者搗生韭汁飲之一二升

酒治風

三洞要錄

地榆草剉一外稻米一升白玉屑一升三物取白露

痈補腦

汁二升置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化爲水名曰

玉液以藥內杯美醴


中所謂神玉漿也

證類本草九

士

余芳

冀州小薊根



四八七

證類本草九

士一

余正

大小薊根味甘溫主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健五月採

閩隱居云大薊是虎薊小薊是猫薊葉並多刺相似田野

甚多方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒唐本草云大小薊葉欲相似功力有殊並無毒亦非虎搘薊也大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也今本草陳藏器本草大小薊破宿血止新血暴下血血痢驚瘡出血嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蠍毒服之亦佳

國高醫學卷之三

論云大薊亦可單用味苦平止崩中血下生取根搘絞汁服半升許多益定

古今考略云小薊根涼無毒治熱毒風并骨膈煩悶開胃下食退熱去虛損苗去煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大

薊能補養下氣又大薊葉涼治腸癰腹藏瘀血血運撲損可生研酒并小便任服惡瘡疥癬研

署傳又名刺薊山牛蒡

圖經曰

小薊根本經不著所出州土今處處有之俗名青刺薊苗高尺餘葉多刺心中出花頭如藍花而青紫色北人呼爲千針草當

月苗初生二三十時并根依茹食之甚美四月採苗九月採根並陰乾入藥亦生搘根絞汁飲以止吐血衄血下血皆驗大薊根苗與此相似但肥大耳而功力有殊破血之外亦

療癰腫小薊專主血疾

陳藏器云

薊門以薊爲名

食療

小薊根主養氣取生根葉搗取白然汁服一盞立佳又取菜煮食之

除風熱根生崩中又女子月候傷過擣汁半升服之全愈。聖惠治心
血口乾用刺薊葉及根擣絞取汁每服一小盞頓服。

臺秘要

治單室塞不通小薊一把水三斗煮取一升去滓分服。有人陰

冷

漸漸冷氣入陰囊腫滿忍死夜疼悶不得眼。大薊根一握

服

之如無青汁只擣乾

者爲末

冷

水調三錢

匕

又

方

治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱。

刺薊末新水調傳瘡上乾即易之。

外

梅師方

治卒吐血及瀉鮮血取小薊葉擣絞取汁溫服。

又

方

治九竅出血以刺薊一握

絞取汁以酒半盞調和頓服。

外

刺薊末新水調傳瘡上乾即易之。

外

刺

薊

末

新

水

調

傳

瘡

上

乾


即

易

之

外

海藻




證類本草九

士三

正刻

海帶 合在後海
帶條下



四十一

證類本草九

古

旁

海藻味苦鹹寒無毒主癰瘤氣頭不破散結氣泄腫
癥瘕墮氣腹中下導下十二水腫療皮間積聚暴瘻
留氣熱結利小便一名海藻一名薄生東海池澤七月

七日採暴乾

反甘草

圖經

云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大

陳藏器本草云此物有馬尾者大而有葉者本經及注海藻功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之常浸去鹹大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主結氣癰瘤是也爾推之綸繩似綸組似組正爲二藻也海人取大葉藻正在深海底以繩繫著沒水下刈得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也

目錄

云蘚海藻注藥草也

名海蘿如亂髮生海中藥性論云海藻臣味鹹有小毒主辟百邪鬼魅治氣疾急蒲療疝氣下墜疼痛核腫去腹中雷鳴幽幽作聲

云海藻主起男子陰氣常食之消男子癆疾南方人多食之傳於北人北人食之倍生諸病更不宜矣

陳藏器云馬藻大寒擣傳小兒赤白遊癧火焱熱瘡擣絞汁服去暴熱熱癰止渴生水上如馬齒根連又云石帆高尺餘根如漆上漸軟作水腫亦生海底吳都賦云石帆水松是也同華子云石帆平無毒紫色硬大者如筋見風漸硬色赤染多人飾作珊瑚裝

圖經曰

海藻生東海地澤今出登萊諸州海中凡水中皆有藻周易詩云于以采藻于沼于沚是也陸機云藻水草生水底有二種一種葉

如雞蘇莖如筋長四五尺一種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻扶風人謂之藻聚爲發聲也二藻皆可食熟授其腥氣米麴蒸爲茹甚佳美荆揚人饑

荒以當穀食今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色如亂髮而簇

大少許葉類水藻而大謂之大葉藻本經云主癰瘤是也海人以繩繫腰沒

水下刈得之旋繫繩上又有一種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾細黑色此

主水癰下水用之陶隱居云爾雅所謂綸似綸組似組東海有之今青苔紫

菜皆似綸昆布亦似組恐即是此也而陳藏器乃謂綸組正謂此二藻也謹

按本經海藻一名薄而爾雅謂薄爲石衣又謂薄徒南名海藻與藻是海藻

自有此二名而注釋皆以爲藥草謂綸組乃別草若然隱居所云似近之蔽器之說亦未可的據又注釋以石衣爲水苔一名石髮石髮即陟釐也色類似苔而鹿齒爲異又云薄葉似鱗鱗而大生海底目陟釐下自有條味性功用與海藻全別又生江南汎澤乃是水中青苔古人用以爲紙亦青黃色今

注以爲石髮是也然則薄與薄皆是海藻之名石髮別是一類無疑也昆布今亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶又云凡海中菜皆瘀癰結氣

青苔紫菜輩亦然又有石帆如柏主石淋水松如松主溪毒吳都賦所謂草則石帆水松劉淵林注云石帆生海嶼石上草類也無葉高尺許其華離樓

相貫連死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水松藥草生水下出西

海交趾是也紫菜附石生海上正青取乾之則紫色南海有之東海又有一

種海帶似海藻而鹿且長登州人取乾之柔韌可以繫束物醫家用下水述

於海藻昆布之類石髮今人亦乾之作菜以蘿蔔喉之尤美青苔可以作羹

食之皆利人苔之類又有井中苔生廢井中并井藍皆主熱毒又上有垣衣

條云生古垣牆陰蘇恭云即古牆北陰青苔衣也生石上者名昔邪至土生

者名屋游大抵王莽略同陸龜蒙苔賦云高有瓦松卑有澤葵散巖竈者曰

石髮補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟釐是也瓦松生古瓦屋上若

松子作層澤葵鳥葵也雖曰異類而皆感瓦石而生故陸推類而云耳今人

卒復用之故但附見於此瓦松即下條昨葉何草也廣志謂之蘭香段成式

云或言構木上多松栽土木氣洩則生瓦松然亦不必爾今醫家或用作女

子行經絡藥陟釐古方治虛冷下痢最要范江治腹中留飲有海藻丸又有

癰酒方用海藻一斤絹袋盛以清酒二升浸春夏二日秋冬三日一服兩合

日三酒盡更合飲之如前淳暴乾末服方寸匕日三不過兩劑皆差廢濟琴

氣膀胱急妨宜下氣昆布臙法高麗昆布一斤白米泔浸一宿洗去醣味以

水一斗煮令向熟擘長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之鹽煮

令昆布極爛仍下鹽酢政慘調和一依臙法不得令酸酸以生薑稻皮

椒末等調和宜食粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大效無所忌

海藻云

主宿食不消五萬痰壅水氣浮腫腳氣貢死氣並良

雷公

凡使先湏用生烏豆并紫貝天葵和海藻三件同蒸一伏

時後日乾用之


肘後方

治頭下瘻瘻如梅李宜透消之海藻一斤酒二斗漬數日稍稍飲之

斤酒二升漬數日稍飲之

酒盡取末服作三劑即差

梧州澤蘭




梧州澤蘭

十一

證類本草九

十六



澤蘭味苦甘微溫無毒主婦內血中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘍產後金瘡

內塞一名虎蘭一名龍葵一名虎蒲生安南諸大澤傍

三月三日採陰乾

防已爲之使
香可煎油或生澤傍故名澤蘭亦名都梁香可作浴

湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭文生澤傍故山中者爲非而藥家乃採用之

云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者是陶云都梁香乃蘭草復云名都梁香並不深識也

云澤蘭一名水香神農黃帝歧伯桐君酸無毒李氏溫生下地水傍葉如蘭通九竅利關脉養血氣破宿血消癥瘕產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治臯洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作纏把子

澤蘭生汝南諸大澤傍今荆徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫

莖紫莖七月八月初採微辛此爲異耳今婦人方中最急用也又有一種馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣臭味辛亦主破血補金割斷下血陳藏器以爲

楚詞所喻惡草即此是也北人呼爲紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生山側似劉寄奴葉無梗不對生花心微黃赤亦能破血皆可用

雷公云

凡使須要別識雄雌其形不同大澤蘭形葉皆圓根青黃能生血調氣與柴合小澤蘭迥別採得後看葉上班根須尖此藥能

破血通久積凡修事大小澤蘭須細剉之用絹袋盛懸於屋南畔角上令乾用

子母秘錄

治小兒瘧瘧

澤蘭心封上

昆布味鹹性平二種水腫癰瘤聚結氣壅瘡生

東海

云今惟北高麗繩把索之如火麻作黃黑色柔韌可食爾雅云綸綴似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸此昆布亦似組

恐即是也凡海中菜皆療癰瘤結氣青苔紫菜輩亦然乾苔性熱柔苔甚冷也今此陳藏器本草云昆布主陰癆含之咽汁生南海葉如手大如薄葦紫色臣禹鼎本草云昆布臣有小毒利水道去面腫治惡瘡鼠瘻惡

之蟲也云海中菜有小螺子損人不可多食

圖經

文具海涼條下

唐本注云

又有石帆狀如柏治石淋

陳藏器云

主癰外腫毒

咽之生

南海葉

小

如手乾紫赤色大似薄韋陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解昆

布乃是馬尾海藻也新注云如癢氣取末蜜丸含化自消也

海藥

不

異志生東海水申其草順流而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之

雲

爲索陰乾舶上來中國性溫主太腹水腫諸浮氣并癰瘤氣結等良

食

公

凡使先弊革同煮去鹹味焙細剉用每修事一斤用敝革大小十箇
洞昆布細剉二末各一處下東流水從已煮至亥水旋添勿少

療云

下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食爲無好菜只食此

物

服久病亦不生遂傳說其功於北人北人食之病皆生是水土不

宜爾

又云

紫菜

下熱氣多食脹人若熱氣塞咽喉煮汁飲之

此是

海中之物

味猶有毒性凡

是海中菜

所以有病矣

核

痛瘡腫硬以昆布一兩洗去鹹擣爲散每以

錢

綿裹於好醋中浸過含蘇津藥味盡再含之

蜜

九含如杏核大稍稍燕汁

欲成囊

以昆布海藻等分爲末

蜜

九含如杏核大稍稍燕汁

千金囊

治五癰昆布一兩並切如

指

大酢漬含蘇汁愈

外臺秘要

治頸下卒

氣

結囊漸大

聖惠方

治癰

黔州防已

四七


證類本草九

丈

田山



與元府防已



證類本草九

十九

田山
四五

防已味辛苦平溫無毒主風寒溫濕諸病除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手腳癢急止洩散癰腫惡結諸蠅疥癬蟲瘡通腰理利九竅一名解離文如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾都建平大而青白色虛軟者好黯黑冰強者不佳服食亦須之是療風水家要藥爾云防已本出漢中者作車輻解黃實而青白虛軟者名木防已都不任用陶謂之佳者蓋未見漢中者爾云漢防已君味苦有小毒能治濕風口面喎斜手足痺散留痰主肺氣嗽喘木防已使畏女菀鹹味苦辛能治男子肢節中風毒風不語主散結氣擁腫溫瘡風水腫治膀胱云木防已出華州

圖經曰防已生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防已二月八月採陰乾用木防已雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減木防已湯及防已地黃五物防已黃耆六物等湯深師療臍間支蒲其人喘滿心下痞坐面黧黑其脉沈緊得之數十日吐下之乃愈木防已湯主之木

防已二兩石膏二枝熟子大碎綿裹桂心二兩人參四兩四物以水六分煮取二升分再服虛者便愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏如

芸消三合以水六分煮三味取二升去滓內芸消分再服微下

利則愈禁生恣孫思邈療遺溺小溲澁亦用三物木防已湯

陳藏器云如陶所注即是木防已用體小同按木漢二防即是根苗爲名漢主水氣木主風氣宣通作藤著木生吹氣通一頭

如通草爲名漢主水氣木主風氣宣通作藤著木生吹氣通一頭

凡使勿使木條以其木條已黃腥皮皴上有丁足子不堪用

夫使防已要心花文黃色者然細剉又剉車前草根相對同

蒸半日後出晒去車前草根細剉用之

時後方

服雄黃中毒防已汁解之防已實培乾爲末如茶法煎服俗用治脫肛

初虞


治肺痿咯血多痰防已草蘆等分爲末糯米飲調下一錢

邵州天麻

證類本草九

二十六

二十六



天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癩驚

氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生

鄭州利州大山嶠山諸山五月採根暴乾

葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭筆端結實狀若續隨子至葉基定彼人多生敬或蒸煑食之今多用

鄭州者佳良高錫等著

時子黃熟其根連二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大小不

定彼人多生敬或蒸煑食之今多用鄭州者佳良高錫等著

云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處處有之時人多用馬莖似箭筆亦色故

莖名赤箭也

梁武

論云赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣癱

痺攣緩不遂語多恍惚多驚失志

陳藏

云天麻寒主熱毒癱瘓擣葉搗之亦取子作飲去熱氣生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青葙子

亦如黃瓜子

亦如蘆菔子

亦如黃瓜子

傷鬼疰蠱毒通血脉開竅服無忌

日華子六味甘暖助陽氣補三勞七

作果食之甚珍

雷公云

凡使勿用御風草緣與天麻相似只是葉莖不同其莖風草根

莖班葉皆白有青點使御風草根勿使

天麻二件若同用即今

人有腸結之患修事天麻十兩用蒺藜子一鑑綏火燉焦熟後便先安置天

麻十兩於瓶中上用火燉過蒺藜子蓋內外便用三重紙蓋并繫從已至未

時又出蒺藜子再入熬炒准前安天麻於瓶內用炒了蒺藜子於中依前蓋

又隔二伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈燒之細剉單

擣然用御風草修

事法亦同天麻

別說云謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤爲分

前後自不同則所爲紫花者又不知


是何物也若依赤箭條後用之爲是

證類本草九

二十一

祝先
七十五

廣州阿魏



證類本草九

壬二

祝先
四七

阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒生西蕃及崑崙

唐本注云苗葉根莖酷似白芷擣根汁日煎作餅考為上截根穿暴乾者

為次體性極臭而能止臭亦為奇物也臣禹錫等謹按韋祖云阿魏出伽闍國即北天竺也伽闍船呼為形虞亦出波斯國波斯呼為阿虞載樹長八九尺皮紫青黃三月生葉葉形似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏拂林國僧寧所說同摩伽陀僧提婆言取其汁自米豆屑合成阿魏同華陀云阿魏熱治傳屍破癰癧冷氣辟溫治瘻兼主

青川口口子口氣母
虛地一川草莫上

圖經曰

阿魏出西蕃及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極似白芷擣根液滴釀結成二說不同謹坡段成式酉陽雜俎云阿魏木生波斯國呼為阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏以水取其汁和米豆屑合釀而成乃與今廣州所上相近耳

海藥云

謹按廣志云生石崑崙國是木津液如桃膠狀其色黑者不堪
鯛又雲南長河中亦有阿魏與舶來者樣力相似一般只無黃色

其狀黃散者為上其味辛溫善去風邪鬼注并心腹中冷服

雷公云

丸使多有訛爲其有三驗第一

驗以將半銖安於熟銅器中一宿

至明露阿魏蕊白如銀永無赤色第二驗將一銖置於五時草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一銖安於抽樹上樹立乾便是真丸使先於靜鉢中研如粉了於熱酒器上裹過任入藥用

今二浙人家亦種枝葉香氣

千金雷與

戶產惡氣阿魏治之神效

別說云

經所說合在木部謹按阿魏補注圖

皆同而差淡薄但無汁膚爾




儋州高良薑

證類本草九

廿三

雷州高良薑



證類本草九

十四

王祺

高良薑大溫主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛

周易云出高良郡人腹痛不止但

嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑唐本云生嶺南者形大虛軟江左者細味亦不甚辛其實一也今相與呼細者爲杜若大者爲高良薑此非也

陳藏器本草云高良薑味辛溫下氣益聲好顏色黃作飲服之止前人有別本注云二月三月採根暴乾味辛苦大熱無毒

孫思邈云高良薑使能治腹內火冷胃氣逆嘔吐治風破氣腹冷氣痛去風冷症弱寒下氣冷逆衝心腹痛吐渴

王叔和云治轉筋渴痢反胃嘔食解酒毒

消宿食

圖經曰

高良薑舊不載所出州土陶隱居云出高良郡今嶺南諸州及黔

蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如骰子塊含之嚥津遠巡即差若臭亦含嚥更加草豆蔻同爲末煎湯常

飲之佳

聖惠方

治霍亂吐利腹痛等疾高良薑一兩剉以水三

大盞煎取二盞半去滓下粳米二合煮粥食之

少食日晚不食如飢可食或粥亦治腹痛氣惡

蘇恭云

凡患脚氣每旦

備急霍亂吐利方火炙高良薑令焦香每用五兩

外煎服亦治腹痛氣惡

打破以酒一升煮三四沸頓服亦治腹痛氣惡

少食日晚不食如飢可食或粥若暝不消欲致霍亂者即以高良薑一兩打碎以水三升煮取一升頓服

即消待極飢乃食一枕薄粥其藥唯極飲之

大盞煎取二盞半去滓下粳米二合煮粥食之

即消待極飢乃食一枕薄粥其藥唯極飲之

良若卒無高良薑母薑一兩代之以清酒一升煮令極熟利溼飲之雖不及高良薑亦大效矣

十全方

治心脾痛以高良薑細剉微炒杵末

米歇調下
錢色立步

衡州百部



滁州百部


證類本草九

二十五

尺



欽州百部



四十九

證類本草九

二十六

戌

百部根微温

良醫切言
謂本云微寒

主欬嗽上氣

根數十相連似天門冬

云山野處處有

而苦強亦有小毒火炙酒漬飲之療欬嗽亦主去蟲煥作湯洗牛犬蟲即去
博物志云九真一種草似百部但長大爾懸火上令乾夜取四五寸短切含
咽汁勿令人知主暴嗽甚良名爲嗽藥疑此是百部恐其土肥潤處是以長
大爾今故陳藏器本草云百部根火炙浸酒空腹飲去蟲蠶咬兼疥癬瘡

論云百部使味甘無毒能治肺家熱上氣欬嗽主潤益肺

華子云味苦無毒治疳蛻及傳尸骨蒸勞殺蟯蟲寸白蟯蟲并治一切樹

木蛀蟲燼之亦可殺蠅蝶又名婆婦草一根三十來莖

圖經曰百部根舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗
作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋子一撮乃十
五六枚黃白色二月三月八月採暴乾用古今方書治嗽多用葛洪主卒嗽
以百部根生薑二物各絞汁合煎服二合張文仲單用百部根酒漬再宿大
溫服一升日再千金方療三十年嗽以百部根溫服二十斤搗絞取汁煎之如飴服方寸匕日三驗

唐本云

小毒微寒有

雷公云

凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於簷下懸令風吹
待土乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細剉用忽一窠自有八十三

條者号曰地仙苗若脩事餌之可千歲也

外臺秘要


治誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿溫服一升日再服續十全

方治暴嗽百部藤根搗自然汁
和蜜等分沸煎成膏服之

抱朴子

百部根理咳
熟及殺風

懷香子




簡州懷香子

證類本草九

二十七

黑



懷音香子味辛平無毒主諸瘧霍亂及蛇傷

唐本注云葉似老胡荽極

一名茴香子亦主膀胱腎間冷氣及育陽氣調

細莖纏高五六尺叢生今卷

國禹錫等謹按藥性論

云懷香亦可單用味苦辛

中止痛嘔吐也唐本先附和諸食中甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煮食之即差川中多食之

用酒炒

云得酒良治乾濕脚氣并腎勞癩疝氣開胃下食治膀胱

痛陰疼入藥炒

圖經曰

懷香子亦名茴香本經不載所出今交廣諸蕃及近郡皆有之入藥多用蕃舶者或云不及近處者有力三月生葉似老胡荽極疎細作叢至五月高三四尺七月生花頭
文華蓋黃色結實如麥而小青色比人呼爲土茴香茴懷聲近故云耳八九月採實陰乾今近地人家園圃種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急牽牽入少腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉擣取汁一升服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方永嘉以來用之起死神效

食療云

國人重之云有助陽道用之未得其方法也生擣莖葉汁一合投熱酒一合服之治卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦甚理

小腸孫真人云

治瘴瘡渾身熱連背項

小腸曲香子擣取汁服

治脾胃進食拘

香二兩生薑四

兩同擣令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中武火炒令黃焦爲末酒丸如梧子大每服十九至十五丸茶酒下

經驗後方

治脾胃進食拘

香二兩生薑四

食醫心鏡

余

茴香治霍亂辟熱除口氣臭者作參及生食並得


秦少翁文苑

集卷一合

余



雄州款冬花



潞州款冬花

十九

證類本草九

三九

申



晉州欵冬花



四百九十九

證類本草九

三十一

王申

款冬花味辛甘溫無毒主發逆上氣

宿草未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花次亦出蜀北

部安昌而並不如其冬月在冰下生十二月正月旦取之

云今出雍州南山溪水及華州山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下

葉似蘆頭圓如小盤子則陶隱居所謂山高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如

直而肥實無子則郭璞注爾雅頸莖赤花生水中冰水字近疑一有誤而傳咸款冬賦序

謂大如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於冰下正月旦採之

郭璞注爾雅頸莖赤花生水中冰水字近疑一有誤而傳咸款冬賦序
華君主療肺氣心促急熱乏勞效連連不絕沸唾稠粘治肺癰肺癰吐膿目
華子云潤心肺益五藏除煩補勞劣消痰止嗽肺痿吐血心虛驚悸洗肝明
日及中風等疾十一

十二月雪中出花

圖

欵冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根紫色莖青紫

葉似蘆頭圓如小盤子則陶隱居所謂山高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如
直而肥實無子則郭璞注爾雅頸莖赤花生水中冰水字近疑一有誤而傳咸款冬賦序
謂大如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於冰下正月旦採之
郭璞注爾雅頸莖赤花生水中冰水字近疑一有誤而傳咸款冬賦序

曰余曾逐禽登于北山于時仲冬之月也冰凌盈谷積雪被崖顧見款冬始敷華艷當是生於冰下爲正也本經主效逆古今方用之爲治嗽之最崔知悌療久嗽熏法每旦取款冬花如雞子許少蜜拌花使潤內一外鐵鑄中又用一瓦碗鑄一孔孔內安一小竹筒筆管亦得其筒稍長作碗鑄相合及抽筒處皆麪塗之勿令漏氣鑄下著炭少時款冬煙自從筒出則口含筒吸取煙嗽之妙背中少悶須舉頭即將指頭於筒頭勿使漏煙氣吸烟使盡止凡如是五日一爲之待至六日則飽食羊肉餌一頓永差

雷公云

凡採得湏去向裏裏花藥殼并向裏實如粟零殼者并枝葉用以甘草水浸一宿却取款冬花葉相伴裹一夜臨用時即乾

去兩件拌者葉了用



紅藍花

二七三

證類本草九

三一

凡

紅藍花味

辛溫無毒主產後血運口噤腹內惡血不盡
絞痛胎死 腹中並酒煮服亦主蠱毒下血甚作煎服其

苗生擣碎

傳遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其熱

脂主小兒疳耳滴耳中生梁漢及西域

一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今滄魏地亦種之

附志云黃藍張騫所得今滄魏地亦種之

今

圖經曰

紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家場圃所種

林上圃人承雷哈採之採已復出至盡而罷林中結實白顆如小豆大者有基

乾以染真紅又作燕脂主產後血病為勝其實亦同葉頗似藍故有藍名又

名黃藍博物志云張騫所得也張仲景治六十二種風兼腹內血氣刺痛用

紅花一大兩分為四分以酒一大升煎強半頓服之不止再服又一方用紅

藍子一升擣碎以無灰酒一大升八合拌了暴令乾重擣從蜜丸如桐子大

空腹酒下四十九正元廣利方治女子中風血熱煩渴者以紅藍子五大合

微熬搗碎旦日取半大匙以水一升煎取七合去滓細研之又崔元亮海

上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花搗絞取汁一小升服之以差為度如冬

月無濕花可浸其者濃絞取汁如前服之極

驗但咽喉塞服之皆差亦療婦人產運絕者

唐本注云

治口噤不語血結

產後諸疾堪染紅

便差服之多少量

腫大小而進之

幹闊灌之子

母秘錄同

產後血量心悶氣絕紅花一兩擣為末分

便半外煮取一

大盞去滓候冷頓服之新汲水煮之亦良

外臺秘要

治一切腫方以紅花熟爛搗取汁服之不過再三服

筒要濟衆

產後血量心悶氣絕紅花一兩擣為末分

作兩服酒二中盞煎取一盞併服如口噤

近効方

治療產後中風煩渴紅花子五合微熬研

血

母秘錄同

產後血量心悶氣絕紅花一兩新者佳無灰酒半升童子小

便半外煮取一

大盞去滓候冷頓服之新汲水煮之亦良

滁州牡丹



證類本草九

三十三

王紳

牡丹味

苦寒

微寒無毒

辛夷

風寒

音

飛

音

纖

音

瘡邪

頭除癰堅瘀

腸胃安

五臟瘻

離瘻

音

瘻

音

瘻

音

頭痛客熱

五勞勞氣

頭腰痛

風噤

癲疾

音

癲

音

癲

音

虎生

巴郡山谷及漢中

一月八月採根陰乾

畏菟絲子

云

根

音

根

音

根

頭痛客熱

五勞勞氣

頭腰痛

風噤

癲疾

音

癲

音

癲

音

今東間亦有

色赤者爲好用之去心按鼠婦亦名鼠姑而此又同殆非其類

恐字誤

唐本草云

牡丹生漢中劍南所出者苗似羊桃夏生白花秋實圓綠

冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹山江劍南土人謂之牡丹亦名百

兩金京下謂之吳牡丹者是真也今俗用者異於此別有躁氣也

王禹錫等

謹按

牡丹能治冷氣散

諸病治女子經脈不通血滯腰疼

開通

云今

出合州者佳白者補赤者利出和州宣州者並良

日華子云除邪氣悅色通

閉腠血脉排膿通月經消撲損瘀血續筋骨除風痺肢腫後一切

女人冷熱血氣此便是牡丹花根巴蜀渝台州者上海鹽者次服忌蒜

閉腠血脉排膿通月經消撲損瘀血續筋骨除風痺肢腫後一切

生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子

黑色如雞頭子大根黃白色可五七十長如筆管大二月八月採銅刀劈去

骨陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圃人欲其花之麗異皆秋冬移

接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真藥中不可用此品絕

圖經曰

牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有

黑色如雞頭子大根黃白色可五七十長如筆管大二月八月採銅刀劈去

骨陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圃人欲其花之麗異皆秋冬移

接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真藥中不可用此品絕

無力也牡丹主血仍去瘀帶正元癢利方。東因傷損血瘀敗散者取牡丹皮八分合蜜蟲二十一枚熬過同橘絲每旦溫酒和散方寸上服血當化爲水下

雷公云

凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨子細剉

如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日暮用

下部生瘡已決洞者服

外臺祕要


治蠱毒方

取牡丹根橘爲末服

一錢匕日三服良

肘後方

牡丹方寸匕日三服




邢州紫三棱

證類本草九

三十四


三神

江陵府京三稜




滑州京三稜

卷九
三五




隨州京三稜



河中府石三棱

本草九

三十六



京三稜味苦平無毒主老癆癰瘍結塊俗傳昔人患癆瘍死渴言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癆瘍也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑色稜狀似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕爲療體並同消惡血補勞通月經治氣脹消樸損瘀血產後腹痛血運并宿血不下

國經曰京三稜舊不著所出地土今河陝江淮荆襄間皆有之春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦以如小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白河中府又有石三稜根黃白色形如鉗股葉綠色如蒲苗高及尺葉上亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣下品別有草三稜條云生蜀地即雞爪三稜也其實一類故附見於此一說三稜生荆楚字當作荆以著其地本經作京非也今出都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根也泰州尤多舉出皆用之雖太醫不以爲繆蓋流習既久用根者不識其苗採亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣下品別有草三稜條云生蜀地即雞爪三稜也其實一類故附見於此一說三稜生荆楚字當作荆以著其地本經作京非也今出都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根也泰州尤多舉出皆用之雖太醫不以爲繆蓋流習既久用根者不識其苗採

藥者莫究其用因緣則失不復再辨今三稜荆湘江淮水澤之間皆有葉如莎草極長莖三稜如削大如人指高五六尺莖端開花大體皆如莎草而大生水際及淺水中苗下即魁其傍有根樺貫一根則連數魁魁上發苗採時斷其苗及橫根形扁長如鯽魚者三稜也根末將盡一魁未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鉤屈如爪者爲雞爪三稜皆皮黑肌白而至輕三者本一物但力有剛柔各適其用因其形爲名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以鳴蓼香附子爲之又本草謂京三稜形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今紅滿根至堅重刻削而成莫知形體又葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三稜皆獨傍引二根無直下根其形大體多亦如鯽魚

陳藏器云本經無傳三稜物有二四種但取根似烏梅有鬚

秘要治癆瘍三稜草前方以三稜草切一石水五石煮一石去滓更煎取三斗汁銅器中重金煎如稠糖出內密器中日服一七酒一盞服之

日二每服常

又方下乳汁取京三稜三箇以水二碗

噙酒煎相續

金酒煎相續

三稜汁作羹粥以米麪爲之與母食每日取一棗大與小兒服亦得作粥與癆熱食之治小兒十歲已下及新生百日無問癆熱無革症

妙不可言大効

證類本草九

三十七

石

