

三因極一病證方論

六

三因極一病證方論卷第九

曾客證治

病者心下堅滿痞急痛肌中苦痺緩急如刺不得俛仰其胷前皮皆痛手不得犯胷中幅幅而滿短氣欬唾引痛咽塞不利習習如痒喉中乾燥時欲吐嘔煩悶白汗時出痛引徹背不治則數日殺人病名曾客由下虛極氣上控膈使然其脉陽微陰結

括樓圓治胷痞胷中痛徹背氣塞喘息咳嗽心腹痞悶

括樓

去穰取子炒杏熟留皮与穰別用

枳殼

麸炒去穰各等分

右二味爲細末先取括樓皮穰研末水熬成膏和二物末爲丸如梧子大熱熟水下二十五圓日二食後服

橘皮生薑湯治胷痞胷中噫塞幅幅如滿習習如痒喉中熣

咳唾燥末

橘皮

壹兩

枳實

麸炒去核或炒去皮

生薑

半兩

梔子湯

治胷痞竊痛方

此方與倉卒散製不同故別出之

梔子

存性去兩燒

附子

炮去兩

右爲剉散每服三錢水一大盞薤白三寸同煎至五分食前溫服

健忘證治

脾主意與思意者記所往事思則兼心之所爲也故論云言心未必是思言思則必是心破外人議患心同時理甚明也今脾受病則意含不清心神不寧使人健忘尺心力思量不來者是也或曰常常喜忘故謂之健忘二者通治

不定忘圓治心氣不定五臟不足甚者憂々愁々不樂忽忽喜忘朝暮更夕朝發夕因事有所大驚夢寐不祥登

高涉險致神竈不安驚悸恐怯

菖蒲炒

遠志

去心姜汁淹各式兩

茯苓

茯神

人參各參

辰砂爲衣

右爲末蜜圓如梧子大每服五十圓米湯下一方去茯
神名開心散飲服二錢已不以時

菖蒲益智圓

治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳目

菖蒲炒

遠志

去心姜汁炒

人參

桔梗炒

牛膝

酒浸各半兩齊分

桂心

參分

茯苓

壹兩附子炮去皮

附子炮去皮

右末蜜圓如梧子大每服三十圓溫酒米湯下食前服

虛煩證治

虛煩者方論中所謂心虛煩悶是也大抵陰虛生內熱陽盛
生外熱外熱曰燥內熱曰煩此不分而分也傷寒太病不復
常霍亂吐瀉之後皆使人心虛煩悶婦人產蓐多有此病其
證內煩身不寬熱頭目昏淡口乾咽燥不渴清々不寐皆虛
煩也方例有虛煩近傷寒之說不可不辨又平人自汗小便
頻併遺泄白濁皆憂煩過度之所致傷寒屬外因憂煩屬內
因霍亂兼不內外因李者當辨析而調治

淡竹茹湯

治心虛煩悶頭疼短氣內熱不解心中悶亂及婦

人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬

去心各式兩半

小麥

各式兩半

甘草

炙

參

白茯苓

各半兩

半夏

湯洗七次

人參

右爲剉散每服四大錢水二盞姜七片棗三枚淡竹茹
一塊如指大煎七分去滓食前服虛勞煩悶尤宜服之
溫膽湯治大病後虛煩不得眠此膽寒故也此藥主之又治

驚悸

半夏

湯洗七次

竹茹

枳實

各式兩半

陳皮

參兩

甘草

炙兩

茯苓

生半

桂心

各一錢

知母

右爲剉散每服四大錢水一盞半姜五片棗一枚煎七分去滓食前服或發寒熱頭疼暉悶

酸棗仁

炒生兩各三分

人參

桂心

各一錢

石膏

煅半兩

甘草

炙或錢

右剉散每服四錢水一盞半姜三片棗一枚煎七分去滓食前服

五痿証論

夫人身之有皮毛血脉筋膜肌肉骨骼以成形內則有肝心脾肺腎以主之若隨情妄用喜怒不節勞佚兼并致內藏精血虛耗榮衛失度發爲寒熱使皮血筋骨肌肉痿弱无力以運動故致痿蹙狀與柔風脚弱皆相類以脈證并所因別之不可混濁柔風脚氣皆外所因痿蹙則屬內臟氣不足之所爲也審之

五痿證例

病者肺熱皮虛弱薄著足痿蹙其色白而毛敗名曰皮痿由肺熱葉焦使然也肺爲五臟長有所失亡所求不得則發肺鳴肺鳴則肺葉焦論曰五臟因肺熱焦發爲痿蹙病者心下熱膝腕樞紐如折去而不相提挈筋縱緩不能任其地其色赤而絡脈溢名曰脉痿由悲哀太甚陽氣內動數溲血故本病論曰大經空虛發爲肌痺傳爲脉痿病者肝熱口苦筋膜乾筋急而挛其色蒼而爪枯名曰筋痿由思想无窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱及爲白淫故下經曰筋痿者生於肝使內也

病者脾熱胃乾而渴肌肉不仁其色黃而肉蠕動名曰肉痿由漸於濕地以水為事居处下澤濡漬婢而不仁故下經曰肉痿者得之濕地也

病者腎熱腰脊不牽滑枯而髓減其色黑而齒槁名曰骨痿因有所遠行勞倦遇大熱而渴陽氣內乏熱食於腎致水不勝火則骨枯而髓虛故下經曰骨痿者生於大熱也

五痿治法

諸治痿法當養陽明與衝脈陽明主胃乃五臟六腑之海主潤宗筋束骨以利機闕衝脈者諸經之海主滻灌谿谷與陽明合養於宗筋會於氣街屬於帶脉絡於督脈故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也治之各補其榮而通其輸調其虛實和其逆順至筋脈骨肉各得其旺時病乃已矣

加味四穴圓

治腎臟肝虛熱淫於內致筋骨痿弱不自勝持

起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食无味不生氣力諸虛不足

旋容

酒浸

牛膝

酒浸

天麻

木瓜乾

鹿茸

燎去毛
切酥炙

熟地黃

兔絲子

酒浸過熟
別研細

五味子

酒浸熟
等分

右為末蜜丸如梧子大每服五十圓溫酒米湯食前下

一法不用五味子有杜仲

靈龜圓治五痿皮緩毛瘁血脉枯槁肌肉薄着筋骨羸弱飲食不滋庶事不異四肢无力爪枯髮落眼昏唇燥疲倦不能支持

麋角

浸一宿

熟地黃

津兩

大附子

生去皮脚
生兩半

右用大麥米二升以一半藉底一半在上以二布巾隔覆炊一日取出藥與麥別焙乾為末以浸藥酒添清酒煮麥粉為糊搜和得所杵三十下圓如梧子大每服五

李濟生集
三卷或此

王啓玄傳玄珠先生耘苗丹三方序曰張長沙戒人妄服燥烈之藥謂藥勢偏有所助勝剋流变則真病生焉猶憫苗不長而揠之者也若稟氣受血不強合服此而不服反忽寥之是不耘苗者也

十圓溫酒米湯任下食前服
上丹養五臟補不足極固真元均調二氣和暢榮衛保神守中火服輕身耐老健力能食明目降心火交腎水益精氣男子絕陽庶事不堪女子絕陰乃不能妊腰膝重痛筋骨衰敗面色黧黑心勞志昏寤寐恍惚煩憤多倦餘灑夢遺膀胱邪熱五勞七傷肌肉羸瘁上熱下冷難任補藥服之半月陰陽自和容色肌肉光潤悅懌開心憶安塊魄消飲食養胃氣

五味子半百部

酒浸宿燒

一兔絲子

酒浸別研

肉蔻谷

酒浸

杜仲

炒斷

巴戟

去心

遠志

去心

枸杞子

防風

去根

白茯苓

炒斷

蛇床子

炒斷

山藥

柏子仁

別研各半兩

右爲末蜜丸梧子大食前溫酒鹽湯任下三十圓春前乾棗湯夏加五味子四兩四季月加旋容六兩秋加枸杞子六兩冬加遠志六兩食後兼服衛生湯

衛生湯補虛勞強五臟除煩養真退邪熱順血脉緩中安和神志潤澤容色常服通暢血脉不生癰瘍養胃益津

當歸

炒斷

白芍藥

各四

黃芪

八兩

甘草

炙去兩

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分去滓不以時年老加酒半盞煎

中丹補百損肺劣少氣善驚嘯憤上焦客熱中脘冷痰不能多食心腹弦滿脾胃氣衰精血妄行容色枯悴

黃芪

白芍藥

當歸

各四

白茯苓

人參

桂心各二兩 川椒炒出紅丹 大附子炮去皮臍 黃芩各三兩 沙參姜汁和作餅 右爲末粟米飲搜和得所搗千杵圓如梧子大酒飲任下三五十圓食前服

金丹補夢益血去風冷百病諸虛不足老人精枯神耗女子絕傷斷續久服益壽延年安寧神志魂魄流滋氣血脉絡開益智慧釋散風濕耳目聰明筋力強壯肌膚悅澤氣宇泰定

熟地黃 肉蓴蓉酒浸各六兩 五味子 兔絲子酒浸各五兩 柏子仁研 天門冬去心 蛇床子炒覆益寧 巴戟去心 石斛各參 繢斷 澤瀉

人參 葛蒲 山藥 遠志去心 山茱萸

葛壹

桂心 白茯苓 杜仲剉炒絲斷 天雄炮去皮破 煉成鍾乳粉共三兩續老式兩常

右爲末蜜丸如梧子大食前酒服三十圓至五十圓忌五辛生葱芫荽鷄鯉魚虛人多起去鍾乳倍地黃多忘倍遠志夜半少氣神虛倍覆盆子欲光澤倍柏子仁風虛倍天雄虛寒倍桂心小便赤濁三倍茯苓一倍澤瀉吐逆倍人參

弓挂散治四肢痠痛軟弱行履不便方見中風門

霍香養胃湯治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明虛宗筋无所養遂成痿躄

藿香 白术 白茯苓 神曲炒 烏藥去末 納砂仁 蒼朮仁炒 半夏曲 人參各半 薑澄茄 甘草各半

右爲末每服四錢水一盞半生姜五片棗二枚同煎七分去滓不以時服

失血叙論

夫血猶水也水由地中行百川皆理則無壅決之震血之周流于人身榮經府俞外不爲四氣所傷內不爲七情所鬱自然順通方一微爽節宣必至壅閉故血不得循經流注榮養百脉或泣或散或下而反或逆而上溢乃有吐衄便利汗痰諸證生焉十種走失無重於斯隨證別之乃可施治

外因衄血證治

病者因傷風寒暑濕流傳經絡陰陽相勝故血得寒則凝泣得熱則淖溢各隨臟腑經絡湧泄于清氣道中衄出一升一升者皆外所因治之各有方

桂枝桔梗根湯治傷風汙下不解鬱于經絡隨氣湧泄衄出清血或清氣道閉流入胃管吐出清血遇寒泣之色必瘀黑者

桂心

白芍藥

桔梗根

甘草炙

川芎各等分

右爲剉散每服四大錢水一盞半姜三片棗一枚煎至

七分去滓服頭痛加石膏

麻黃升麻湯治傷寒發熱解利不行血隨氣壅塞謂紅汙者

是也

麻黃

去節兩半升麻壹兩

白芍藥

各一兩

甘草生

石膏煅

黃芩

各一兩

右剉散每服四大錢水一盞半姜三片煎七分去滓熱

服微汗解

五苓散治伏暑飲熱暑氣流入經絡壅塞發衄或胃氣虛血滲入胃停留不散吐出一二升許

方見傷暑門治肺以

附瀉湯治冒雨着濕鬱于經絡血溢作衄或脾不和濕着經

絡血流入胃胃滿吐血

茯苓

乾薑

甘草

白术各貳錢

右爲剉散每服四錢水一大盞煎六分去滓服頭疼加川芎二錢最止浴室中發劔

內因劔血證治

病者積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失志傷腎暴喜傷心皆能動血蓄聚不已停留脣間隨氣上溢入清氣道中發爲鼻劔名五臟劔

止劔散治氣鬱發劔无比神方

黃氏陸錢

赤茯苓

白芍藥

當歸

生乾地黃

阿膠炙各參錢

右爲細末前黃芪湯調下二錢匕未知再作

不內外因證治

病者飲酒過多及啖炙燙五辛熱食動於血血隨氣溢發爲鼻劔名酒食劔或墮車馬打撲傷損致血淖溢發爲鼻劔名折傷劔

公味理中圓

治飲酒過多及啖炙燙熱食動血發爲鼻劔

人參

白朮

甘草炙

乾薑炮

乾葛

川芎各等分

右爲剉散每服四錢水一大盞煎七分去滓溫服

龍骨石散治一切金瘡打撲傷損猶大咬傷並於傷處摻傅或內損血入臟腑壅溢作劔及婦人產後敗血不散

花藥石

研細

上色硫黃

研細

右二味拌勻入藏瓶中以紙筋搗黃泥固濟候乾焙令熱透以磚藉用白炭一秤頂上發火燒灰尽候冷取出再研極細諸臟傷及婦人產後瘀血不行並用童子小便溫酒調一二錢匕取瘀血即效

二言

卷之六治鼻衄立効

白及不拘多少

右爲末冷水調用紙花貼鼻竅中

一方用黃膠湯令軟

貼鼻竅中

三因吐血證治

病者諸血積聚合發爲衄而清氣道閉濁道湧溢凝停胃中因即涌悶吐出數斗至于一石者名曰內衄或因四氣傷于外七情動于內及飲食房勞墮墮損致榮血留聚膈間痛則吐溢此謂妄行

桂枝加薑湯治傷風吐血

五苓散

治傷暑吐血

除濕湯

治傷濕吐血

三方並見外因衄血證治

金匱治三因吐血及衄血下血一切血溢妄行

葉子雌黃

右一味爲釐末入棗肉內線繫寢竇煮湯煮用黑錫對雌黃斤兩鎔作汁傾入湯煮一日添湯候冷取出雌黃洗淨乾研爲細末却以煮藥棗肉和丸如梧子大每服五七圓黑錫煎湯下

舊有加味壹上陽治妄行方主寒凝血脈

傷胃吐血證治

病者因飲食過度傷胃或胃虛不能消化致齟噉吐逆物与氣上衝誠胃口決裂所傷吐出其色鮮紅心腹絞痛自流名曰傷胃吐血

理中湯能止傷胃吐血者以其功最理中院分利陰陽安定

血脉方證廣如局方但不出吐血證李著當自知之

人參

白朮

甘草

白芍炮各等分

右爲剉散每服四錢水一盞煎七分去滓不以時服或只煮乾姜甘草湯飲之亦妙方見養生必用

肺疽吐血證治

病者因飲啖辛熱二燥傷肺血得熱則溢因作嘔吐出血一合或半升許名曰肺疽傷於府則屬胃傷於臟則屬肺右以此分不可不究

二灰散治肺疽吐血并妄行

紅棗

和核研存性

百藥煎

煅各等分

右爲細末每服二錢米湯調下

折傷吐血證治

病者因墜崩肺致傷五臟損裂出血停留中脘臟熱則吐鮮血臟寒則吐瘀血如鼻羹汁此名內傷治之各有方

朱宣龍湯

治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血或如豆

羹汁

川芎

當歸

白芍藥

百合

水漫荆芥穗各等分

右爲剉散每服四錢水一盞酒半盞同煎七分去滓不

以時服

折傷瘀血證治

病者有所墜墮惡血留內或因大怒肝血淤滯停蓄不散兩脇疼痛脚善瘻骨節時腫氣上不上皆由瘀血在內治之各

有方

雞鳴散

治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積氣絕

欲死并久積瘀血煩躁疼痛叫呼不得並以此藥利去瘀血即愈此藥推陳致新治折傷神效

大黃

蜜水

杏仁

去皮尖

右研細酒一盞煎至六分盞裂去滓雞鳴時服次日取下瘀血即愈若便竄氣絕不能言取藥不及急擘口開以熱小便灌之

病餘瘀血證治

病者或因發汗不徹及吐衄不盡瘀蓄在內使人面黃唇白大便黑脚弱氣喘甚則狂悶皆瘀血所致治之各有方

犀角地黃湯

壹兩

治傷寒及溫病應發汗而不汗內蓄爲瘀血及

鼻衄吐血不盡餘血停留致面黃大便黑

犀角

壹兩

生地黃

捌兩

芍藥

參兩

牡丹皮

貳兩

右爲剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脉大來遲腹不滿自言羸爲无

熱但依方不須加也

汗血證治

病者汗出正赤汚衣名曰汗血皆由太喜傷心喜則氣散血隨氣行婦人產褥多有此證

葎草

半斤 治產婦大喜汗出汚衣赤色及膏淋尿血

葎草 不拘多少

右搗取汁二升醋二合和空腹飲一盃或濃煮汁飲亦治淋瀝尿血

便血證治

病者大便下血或清或濁或鮮或黑或在便前或在便後或與泄物並下此由內外有所感傷疑停在胃隨氣下通亦妄行之類故曰便血

伏龍肝湯 治先便後血謂之遠血兼治吐衄

伏龍肝

半斤

甘草

炙多

白朮

阿膠

乾地黃

千金作
乾姜

甘草

各參兩

右爲剉散每服五錢水一盞煎七分去滓空腹溫服

二法有附子參兩炮入

當歸赤小豆散 治先血而後便謂之近血

赤小豆

伍兩浸令芽出曬乾一法熬令折

當歸

壹兩

右爲末漿水服方寸匕日三四服

風痢下血證治

病者因風停於膚腠委虛入腸胃風動血故便清血或下瘀血注下無度名曰風利古方以此爲蠱痢非也

胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

人參

白茯苓

白朮

桂心

當歸

白芍藥

白朮

右等分爲剉散每服四錢水一盞半入粟米百餘粒同煎七分去滓空心稍熱服

料簡

夫便血有腸痔蠱毒熱痢酒痢血枯肺痿等別有門類其如風痢亦當在痢門以純下清血故附于此不可不知

尿血證治

病者小便出血多因心腎氣結所致或因憂勞房室過度此乃得之虛寒故養生云不可專以血得熱爲淖溢爲說二者皆致尿血與淋不同以其不痛故屬尿血痛則當在血淋門

驟灰散

治小便尿血或先尿而後血或先血而後尿亦遠近之謂也

驟灰

本草云能消瘀血通關格利水道破癥瘕離腫瘀屎刺戶瘡瘍胞通大小便止咳鼻漏

右一味每用二錢以米醋二合湯少許調服并花水調亦得兼治肺疽心効內崩吐血一兩口或舌上血出如針孔若鼻効吹內立已一法搜擗燒灰米飲調下大治大小便下血又一法同葵子等分爲末飲服二錢治轉胞尤妙

王履 治瘀血并五淋砂石疼痛不可忍受者

黃芪 人參 各等分

右爲末用蘿蔔大者切一指厚三指大四五片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸少蜜二兩爲度勿令焦炙熟點黃芪人參末喫不以時仍以鹽湯送下

癥瘕證治

癥瘕積聚隨氣血以分門故方云以癥瘕屬肝部積聚屬肺部不亦明矣况七者火數屬心蓋血生於心八者木數屬肝蓋血歸於肝雖曰強分理似不混夫癥者堅也堅則難破瘕者假也假物成形然七癥八瘕之名經論亦不詳出雖有蛟龍蛇鱉肉髮蟲米等七證初非定名偶因食物相感而致患耳若婦人七癥八瘕則由內外不內外因動傷五臟氣血而成古人將婦人病爲痼疾以蛟龍等爲生瘕然亦不必如此執泥婦人癥瘕並屬血病龍蛇魚鱉等事皆出偶然但飲食間誤中之留聚腹臟假血而成自有活性亦猶承微中僧病噎者腹有一物其狀如魚即生瘕也與夫宿血停凝結爲肝塊雖內外所感之不同治法當以類相從所謂醫者意也如以敗梳治癥瘕銅屑治龍瘕麵蘖治米瘕石灰治髮瘕如此等類方論至多不復繁引學者可以理解

太清石圓

治七癥八瘕聚結坏塊及婦人帶下絕產并欲服

丹藥腹中有癥瘕者當先下之此藥但去癥瘕不令人困

消石

陸兩

大黃 捺兩

人參

甘草

各參兩

右爲末以三年苦酒三升置銅器中以竹作准每一升作一刻挂器中先內大黃常攬不息使微沸盡一刻刀內餘藥又盡一刻極微火熬使可元則圓如雞子中黃若不能服大圓則作小圓如梧子大米湯下三十圓四

肺壞

梨李消大圓

翠竹陰利
極便

日一服婦人服之或下如雞肝或如米泔正赤黑等三
二升下後忌風冷自養如產婦

少二稜頭治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及積
滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦噫酢吞酸脇肋刺痛臂膈痞

悶井脾氣橫泄

京三稜

蓬莪术

各肆

芫花

壹兩去梗葉

右同入甕器中用米醋伍升浸滿封器口以灰火煨令
乾取出稜木將芫花以餘醋炒令微焦焙乾爲末醋糊
丸如菉豆大每服十五圓生姜湯下婦人血分男子脾
氣橫泄腫滿如水用桑白皮煎湯下有道家元土味方

三聖圓治積年癥瘕癖塊諸藥療理不差至効

舶上硫黃

水銀

半兩

硝砂

壹分去砂石

右參物乳盆內叢研如粉却以生鐵鉗內用文武火熬
鎔成汁以火筋攪令勻停冷刀刻下以帛裹置地坑內
埋一宿取出再研細次以

赤芍藥

當歸

荆三稜

蓬莪术

紅花

各壹分同用

並細剉以法酒壹升煎及一半瀝出砂盆內研生布裂
汁再熬放冷入飛羅麪爲糊搜圓如菉豆大治因產後
傷於飲食結伏在腹脇時發疼痛不可忍者當歸浸酒
壹升逐旋取酒燶下七圓至十圓每服磨癖塊空心溫
酒下參圓至伍圓所是藥滓裂了燶乾爲末別入
乾地黃

半兩

真蒲黃

芫花

各壹分炒焦黃醋

右爲末以前一般糊圓如菉豆大治女人血臘冷氣攻
心疼及一切血疾溫酒下拾圓

宣遲止圓治臘腑宿蘊風冷氣血不和停滯宿飲結爲癥瘕

塊及婦人血瘕腸胃中塞飲食不下欬逆脹滿及下痢

赤白霍乱轉筋及踐蹠拳攣腰脊脚膝疼痛行步不能常服建脾暖胃堅骨強陽

神麴

半斤炒黃

大附子

貳隻炮去皮脂

甘草

貳兩炙

右末蜜丸每左手壹握分作七圓每服一圓細嚼米飲下治諸臟氣虛積聚煩悶及飲食中蠭毒或食水陸菓蓏子入腹而成虫蛇魚鱉或宿食留飲婦人產後敗血不消女子月水不通結爲癰瘕時發寒熱唇口焦黑肢痺瘦削嗜卧多厭食少腹痛大便糟粕變成冷痢

附子

肆箇陸朱錢重者生去皮脐剝作尾入硝砂共壹兩七錢半麴剝裹煨熟去麴不用

薑撥

木香

均炒各參

青皮

破故紙炒半兩

右爲末麵糊搜丸如梧子大每服三十圓生姜橘皮湯下出利米湯下加至五十圓

癲癇叙論

夫癲癇病皆由驚動使臟氣不平鬱而生涎閉塞諸經厥而乃成或在母胎中受驚或少小感風寒暑溫或飲食不節逆於臟氣詳而推之三因備具風寒暑溫得之外驚恐震攝得之內飲食飢飽屬不内外三因不同忤氣則一傳變五臟散又六腑蓋諸絡脉但一臟不平諸經皆閉隨其臟氣證候殊分所謂象六畜分五聲氣色脉證各隨本臟所感所成而生諸證古方有三癇五臟癇六畜癇乃至一百二十種癇以其稟賦不同臟腑強弱性理躁靜故諸證蜂起推其所因無越三條病由都尽矣

癲癇證治

病者旋暈擗倒吐涎沫搐搦騰踴作馬嘶鳴多因挾熱着驚心動膽攝鬱涎涎入心之所致也名曰馬癇以馬屬在午手少陰君火主之故其病生于心經病者暈眩四肢煩疼昏悶

擗倒掣縱吐沫作羊叫聲多因少小膝瘡未愈數洗浴溫襲
脾經之所致也名曰羊癇以羊屬未坤位足太陰溫土主之
故其病生于脾經病者昏暈擗倒兩手頻伸叫作雞聲噴更
即醒醒後復發多因少小燥氣傷胃煩毒內作鬱涎入胃之
所致也名曰雞癇以雞屬酉足陽明燥金主之故其病生于

胃經病者眩暈擗倒眼目相引牽縱急強作豬叫鳴吐涎沫
食頃方已多因少小吐利挾風之所致也名曰猪癇以猪屬
亥手厥陰心胞風木主之故其病生于右腎經病者眩暈擗
倒目反口噤癇瘛縱吐沫作牛吼聲多因少小溫熱傷肺涎留
肺系遇燥熱則發動名曰牛癇以牛屬丑手太陰溫土主之
故其病生于肺經

舊本多誤叔濟氏人或以少兒驚癇方主之亦可切合

方力

六珍丹 治風癇失性擗倒欲死或作牛吼馬嘶雞鳴羊叫豬

嘔等聲腑臟相引氣爭掣縱吐沫流涎父而方蘇

通明雄黃

葉子雌黃

朱鑽真珠

各壹兩

鈆

或屑

丹砂

半兩

水銀

壹兩半

右研令極勻蜜丸如梧子大每服參圓至五圓裹襄湯
下湏搗二三萬杵乃可圓

龜丹 治五癲百癇無問陰陽冷熱

絞丹

晉礬

各壹兩

右用博鑿一窠可容貳兩許先安丹在下次安礬在上
以白炭五斤煅令炭尽取出細研以不經水猪心血爲
圓如棗豆大每服十圓至二十圓橘皮湯下

太鎮心丹 治一百二十種癲癇驚狂譖妄擗倒昏不知人噴
吐涎沫及治心驚膽寒清清不睡或左脇偏疼

辰砂

用黃松

龍齒

用遠志

右只取辰砂龍齒各等分爲末猪心血爲丸如雞頭大

每服壹圓以麥門冬葉蓋豆燈心生薑白蜜水煎豆熟爲度臨卧嚥下小兒磨化半圓量歲數與之

蛇黃丹治五臟六腑諸風癲癇掣縱吐涎沫不識人及小兒急慢驚風

蛇含

肆枚建盞內燬紅以
楮樹汁壹碗淬乾

天南星

炮白附子

辰砂

別研楮樹汁壹碗淬乾各半兩

麝香

各

右爲末糯米糊丸如梧子大每服溫湯磨化壹圓量大小與服大人嚼細三五圓溫酒米湯任下

凡例

夫五臟舍屬五臟而無腎有胃者以腎屬鼠非畜養物神無主治故不作瘤胃屬雞係六畜物故有象兼胃爲五臟海非餘府比又大屬戌手少陽小腸經主之雖屬六畜初無大瘤者以辰戌爲胞罡四殺沒處不興瘤象古方類例未之究也

李首宜知之

狂證論

夫三陽并三陰則陽虛而陰實故顙三陰併三陽則陰虛而陽實故狂論曰陽入陰其病靜陰入陽其病怒怒則狂矣病者發狂不食棄衣奔走或自稱神聖登高哭歌踰牆上屋所至之處非人所能罵詈妄言不避親屬病名狂多因陽氣暴折畜怒不決之所致故經曰陽明常動太陽少陽不動不動而動爲大疾此其候也

鎮心丹治心氣不足病苦驚悸自汗心煩悶短氣喜怒悲憂悉不自知士塊失魄狀若神靈所憑及治男子遺泄女子帶下

光明辰砂

研楮樹汁研各半兩

白礬

硯半兩

右爲末水丸如雞頭大每服壹圓前人參湯下食後服

心志過治憂思惡慮過多致神志不寧魂魄失守虛陽外泄則自汗嘔吐瀉利頻數諸陰不生則語言重複忪憒眩暉兼治大病後虛煩不得眠羸瘦困乏及婦人胎前產後悉能主之常服安心神調血脈鎮驚補虛

黃芪

蜜炙

茯神

人參

酸棗仁

炒

熟地黃

各壹兩

遠志

去心炒

五味子

柏子仁

各半兩別研

右爲末蜜丸如梧子大用辰砂爲衣每服三十圓米湯溫酒任下盜汗不止麥麸湯下肌熱虛煩麥門冬湯下吐血人參卷柏湯下大便下血當歸地榆湯下小便尿血赤茯苓湯下中風不語薄荷牛黃湯下風濶涎潮防風湯下癲癇亦治狂方見癲癇門

凡傷寒陽毒及蓄瘀血皆發狂各見本門

九痛叙論

夫心痛者在方論則曰九痛內經則曰卒痛一曰卒痛種種不同以其痛在中脘故揔而言之曰心痛其實非心痛也若真心痛則手足青至節若甚旦發晝死晝發夕死不在治療之數方中所載者乃心主包絡經也若十二經絡外感六淫則其氣閉塞鬱于中焦氣與邪爭發爲疼痛屬外所因若五臟內動汨以七情則其氣痞結聚于中脘氣與血搏發爲疼痛屬內所因飲食勞逸觸忤非類使臟氣不平痞鬲于中食飲道壅變亂腸胃發爲疼痛屬内外因治之當詳分三因通中解散破積潰堅隨其所因無使混滯依經具錄諸證以備治法云爾

外所因心痛證治

足厥陰心痛兩脇急引小腹連陰股相引痛手心主心痛徹

心痛

背心煩掌中熱咽乾目黃赤脣滿足太陰心痛腹脹滿濶
然大便不利鬲閉咽塞手太陰心痛短氣不足以息季脇空
痛遺失無度曾滿煩心足少陰心痛煩劇面黑心懸若肌曾
滿腰脊痛背輸諸經心痛心與背相引心痛徹背背痛徹心
諸府心痛難以俛仰小腹上衝卒不知人嘔吐泄瀉此皆諸
經諸俞諸府涉邪所致病屬外所因

內所因心痛證治

肝心痛者色蒼蒼如死灰狀終日不得太息真心痛者手足
青至節旦發夕死夕發旦死脾心痛者如針錐刺其心腹蘊
蘊然氣滿肺心痛者若從心間起動作痛益甚色不變腎心
痛者與背相引善瘛如物從後觸其心身悶悶胃心者腹脹
滿不下食食則不消皆臟氣不平喜怒憂鬱所致屬內因

不內外因心痛證

久積心腹痛者以飲啖生冷菓實中寒不能消散結而爲積
甚則數日不能食便出乾血吐利不定皆由積物客於腸胃
之間遇食還發名積心痛及其臟寒生就致心痛者心腹中
痛發作腫聚往來上下痛有休止腹熱涎出病屬不內外因
方證中所謂九種心痛曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰虫
曰注曰去來痛者除風熱冷屬外所因餘皆屬不內外更婦
人惡血入心脾經發作疼痛尤甚於諸痛更有卒中客忤鬼
擊戶痛使人心痛亦屬不內外因

三因心痛擗治

蜜附湯治心腹疼痛或吐或泄狀如霍亂及療冒微濕寒賊
風入腹拘急切痛

附子生去皮臍切作四片以白蜜煎令
附子變色以湯洗去蜜切半研

桂心

芍藥各參

甘草

炙肆錢

右爲剉散每服四大錢水壹盞姜五片棗二枚煎七分去滓食前大便祕結入白蜜半匙同煎

麻黃桂枝湯

治外因心痛惡寒發熱內攻五臟拘急不得動

麻黃

云節湯

桂心

白芍藥

細辛

去苗

乾薑

炮

甘草

炙各參分

半夏

湯洗七枚

香附

炒去毛各半兩

右爲剉散每服四大錢水壹盞半姜五片煎七分去滓食前服大便祕入大黃如博碁大兩枚煎

加味小建中湯

治心腹切痛不可忍按輕却痛按重則愈皆虛寒證服熱藥并針灸不差此藥主之

桂心

三分

甘草

炙半兩

白芍藥

壹兩

遠志

去心

兩

甘草

半兩

高良薑

壹兩

白芍藥

貳兩

雞舌薺散

治心腹卒痛安胃進食調冷熱定泄瀉老少通用

丁香

壹百枚

甘草

半兩

高良薑

壹兩

白芍藥

貳兩

右爲細末每服二錢匕陳米飲調下空心食前服王啓玄子序云初余爲禁隊因此證處與御醫使令施用後至富貴乃由此始

調子散

治心脾冷痛不可忍一服見效及老幼霍亂吐瀉其効如神

訶子

炮去皮

甘草

炙

厚朴

姜製

乾薑

炮

草菓

去皮

陳皮

良薑

炒

茯苓

神曲

炒

麴蘖

炒各等分

右爲末每服二錢候發刺不可忍時用水壹盞煎七分

入鹽服如速則鹽點

九痛圓

治九種心痛虫痛瘡痛風痛悸痛食痛飲痛冷痛熱痛往來痛兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流在心腎并冷腫痛上氣落馬墜車瘀血等疾

乃
方

八方訪尋
地支久矣
三百三

附子參去皮炮
人參
乾薑炮
吳茱萸浸酒炒研

薈合香宣治博屍胃蒸確瘰肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘡瘍赤白暴利瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病方

丁香	薑含香桂枝香內研水	薰陸香研水	龍腦各壹兩	白木
朱砂	朱砂研水			
青木香				
白檀香				

沉香
烏犀 銹
安息香 酥
馬末用无灰
壹升熬膏

香附子 言一、校
麝香 真機

花水溫冷任意化下肆圓老人小兒壹圓溫酒
得辟邪用蠅紙裹壹圓如彈子大縫袋盛帶之

行
卷有取

擗氣阿魏圓 治九種心痛五種噎疾痃癖氣塊冷氣攻刺及
脾胃停寒胃滿脹腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦
人血氣血刺等

阿魏宿以麌翻登
胡椒賣金半甘草
茴香炒 川芎 青皮 陳皮

丁香皮 炒
蓬术 各壹兩炒
縮砂仁

右爲末阿魏糊爲圓如雞頭大每藥壹斤用朱砂柒錢
白芷半錢

爲衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下貞粒至參粉
湯下常服茶酒任下貞粒正嚼細嚥食前

倉卒散治氣自腰腹間攀急疼痛不可屈伸腹中冷重如石
痛不可忍白汗如洗手足冰冷久不差垂死方

山梔子

肆拾玖箇連皮燒半喝

附子

壹枚去皮駘

右爲末每服貳錢酒壹小盞入鹽少許煎七分溫服又治胃痞効

尖笑散

方見前疝門

三因極一病證方論卷之九



