

濟生拔粹方

七







金匱黃耆建中湯

易簡杏子湯嗽

易簡胃風湯瀉血

荔芩湯

易老門冬飲子

海藏五飲湯

生地黄黃連湯血風

易簡參蘇飲發熱

理中湯加減例

八物定志丸補

大効牡丹皮散血虛

清心丸治熱

調胃白朮澤瀉散水鼓

海藏當歸丸三陰痛

喉閉不救方

三焦熱 三焦寒

蒸病五蒸湯

三陽頭痛

掌中金乾血氣

黃耆膏子同上

易簡芎歸湯血多

千金蓮子法



大建中湯

大補十全散勞

千里煎

蜜酒

治勞復麥門冬湯

海藏大已寒丸

增損理中丸結胃

萬病紫苑丸

平胃散加減例

紫古天麻丸中風

海藏大五補丸

火府丹瀉丁

四物六合諸方

苦練丸疝

拯濟換骨丹

發班諸藥附

活人敗毒散溫疫

發黃茵陳蒿加減例

龍腦雞蘇丸上焦熱

地骨皮枳殼散骨蒸

三奇六神翹法

搗鼻香子宮冷帶下



傷寒不可汗不可下不可吐諸證



大法春宜吐夏宜汗秋宜下凡用發汗及吐下湯劑皆中病即止

若少陽病脉微不可發汗亡陽故也宜附子湯

若陽已虛尺中弱濇者復不可下之宜小柴胡湯

若動氣在左在右在上在下並不可發汗宜柴胡桂枝湯

若少陰病脉細沉數病在裏不可發汗宜當歸四逆湯

若少陽病不可發汗宜小柴胡湯

若咽中閉塞咽喉乾燥亡血衄家淋家瘡家不可發汗已上

六證並宜小柴胡湯

若下利清穀不可發汗宜理中湯四逆湯之類

若四逆厥及虛家皆不可吐厥者宜當歸四逆湯

虛宜附子湯 有熱人可黃耆人參建中湯

若少陰膈上寒乾嘔不可吐宜小半夏加橘皮湯温中丸

若咽中有動氣不可下咽中閉塞不可下宜烏扇湯

若外實者不可下諸四逆厥者不可下虛家亦然厥宜當歸

四逆湯 虛者宜附子湯 有熱人黃耆人參建中湯

本虛攻其熱必噦宜小柴胡湯

若脉浮而緊法當身疼痛宜以汗解假令尺中遲者不可發

汗榮氣不足血少故也宜小柴胡湯

若脉濡而緊濡則衛氣弱緊則榮中寒陽微衛中風發熱而

惡寒榮緊衛氣冷微嘔心内煩此不可汗宜小柴胡湯

若濡而弱不可發汗宜小柴胡湯



若浮而大浮為氣實大為血虛小便當亦而難胞中當虛

反小便利而大汗出法應衛家微可與小建中湯  
若反更實津液四射榮竭血盡乾煩而不得眠此不可下宜  
與小柴胡湯

若脉浮大應發汗宜柴胡桂枝湯

若脉浮而緊者不可下而反下之為大逆宜桂枝麻黃各半湯

若脉數不可下宜柴胡桂枝湯

若下之必煩利不止宜葛根黃芩黃連湯

若脉濡弱浮數不可下宜小柴胡湯

若濡弱微瀋微則陽氣不足中風汗出而反躁煩瀋則無血

厥而且寒不可下宜桂枝甘草牡蠣龍骨湯

若結胸脉浮大不可下下之即死宜小陷胸湯

元文

若陽病多者熱下之則硬宜小柴胡湯

若太陽發汗不徹轉屬陽明微汗出不惡寒若太陽證不能

不可下下之為逆宜桂枝麻黃湯

若太陽病有外證未解不可下下之為逆宜桂枝麻黃湯

若病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之

因作痞 結胸則有陷胸湯九三 痞則有瀉心湯五

若太陽與陽明合病喘而膏滿不可下宜麻黃杏仁甘草石

膏湯

若太陽與少陽合病心下硬頸項強而弦者不可下宜小柴

胡湯

若病欲吐者不可下宜小半夏加橘皮湯

太陰腹痛吐食自利腹痛下之必宜下結硬



厥陰病渴氣上衝心中熱飢不欲食食則吐虵下之則利不止

若少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐腹不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胃中寒實不可下也宜溫中湯生姜汁半夏湯

若無陽陰強大便硬者下之必清穀腹滿宜用蜜煎導法

若傷寒五六日不結胃腹濡脉虛復厥者不可下此亡血也

宜當歸四逆湯下之則死宜四逆加入參湯

若臧結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也謂下也宜用小柴胡湯

若傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之宜小柴胡湯

若陽明病身面色赤攻之必發熱宜調胃承氣湯

若色黃者小便不利也宜五苓散

若陽明病心下硬滿者不可攻之宜生姜瀉心湯

半夏瀉心湯 攻之利不止者死宜四逆湯

不可汗下吐三法利害非輕前人多列經後大抵醫之失只在

先藥藥之錯則變生若汗下不差則永無亡陽生黃畜血結膏痞氣及下痢洞泄脇熱痢瘕急虛勞等證生矣其如此故錄大禁忌於前使醫者當疾之初不犯也

大陽證 桂枝一十四方麻黃五方在後保命集內

傷寒六經所感形證合用汗下吐和解等湯九仲景活人雲岐子保命集載之詳者此不復重錄數書中所無者并諸方對證加減今載于后

治虛勞重急諸不足宜此方主之



黃耆

桂枝

生薑切名芍藥六兩

炙甘草式兩

膠飴乙升大棗十式个擘

右七味咬咀以水七升先煮六味取三升去滓內膠飴令消  
溫服一升日三若嘔者加生薑 若腹滿者去棗加茯苓兩  
若肺虛損不足痞氣加半夏五兩

易簡建中加減法

若婦人血疼男子心腹疝痛并四肢拘急疼痛甚者加遠志  
半兩

若或吐或瀉狀如霍亂及胃涉濕寒賊風入腹拘急切痛加  
附子七錢半

若疝氣發作當於附子建中湯煎時加蜜一匙頭許

若男子婦人諸虛不足小腹急痛脇肋脹臍下虛滿胃中

元丸

四

煩悸面色痿黃唇口乾燥少力身重短氣腰背強痛骨肉  
酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復  
加黃耆一兩半

若婦人一切血氣虛損及產後傷虛羸不足腹中疝痛吸

吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲食加當歸

一兩名當歸建中湯產後半月每日三服令人丁壯

**大建中湯**

治內虛裏急少氣手足厥逆少腹拳急或腹滿弦急

不能食起即微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦唇口舌乾  
精自出或手足作寒作熱而煩苦酸痛不能久立此補中益  
氣 右咬咀水五盞煎至二盞去滓分三服

仁心參分芍藥

黃耆各式

甘草乙分

生薑伍分

當歸

人參各乙

附子半分

半夏式分

棗式枚

依上煎



治欬不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰

日積來皆治療

人參 半夏 茯苓 細辛 減半 乾姜 減半

甘草 炙 官桂 減半 芍藥 五味子

右以咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚姜五片煎

至六分去滓服

若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用米殼去筋膜碎剉以醋淹炒等分加之每

服加烏梅一枚煎服其効尤驗嘔逆惡心者不可用此

若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃添芍藥如麻

黃之數乾姜五味子各增一半名小青龍湯

大補木全散

元戎

五

參耆木茯苓 芍地桂歸川 三五錢秤用

生薑棗水煎 婦人虛弱用 名美號十全

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發

潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘

欬中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

桂 芍藥 甘草 黃耆 當歸

川芎 人參 白朮 茯苓 熟地黃 各等分

右為鹿末每服二大錢水一盞生薑二片棗一枚煎至七分

不拘時候溫服桂芍藥甘草小建中湯也黃耆與此三物即

黃耆建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥

白朮物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱天得地之成數故

名曰十全散



**胃風湯** 治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉

腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

人參 茯苓 川芎 官桂 當歸

芍藥 白朮各等分

右咬咀每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力減之

若加熟地黃黃耆甘草等分足為十味名十補湯

若虛勞嗽加五味子 若有痰加半夏

若發熱加柴胡 若有汗加牡蠣

若虛寒加附子 若寒甚加乾姜皆依本方等分

若骨蒸發熱飲食自若者用十補湯加柴胡二兩服之

若氣短加人參 若小便不利加茯苓

若脈弦濇加川芎 若惡寒加官桂

若脈濇加當歸 若腹痛加白芍藥

若胃熱濕盛加白朮

潔古云防風為上使 黃連為中使 地榆為下使

若血瘀色紫者陳血也加熟地黃

若血鮮色紅者新血也加生地黃

若寒熱者加柴胡 若肌熱者加地骨皮

若脈洪實痛甚者加酒浸大黃

**千里散** 一名水葫蘆

木香 紫蘇葉 桂各半兩 烏梅肉 赤茯苓各半兩

白朮 羌活 獨活 蔓荊子 大噲化 九噉津

心之百藥煎 烏梅肉 紫蘇葉 人參 甘草



麥門冬

分為細末煉蜜丸嚙化

**荔枝湯**

烏梅肉 甘草各三兩 百果煎乙兩 白芷半兩

白檀叁分 右細末湯點

**蜜酒好蜜**

水一椀 細麴乙升 好乾酵叁兩

右先熬蜜水去花沫令絕冷下麴酵每日三攪三日熟

陽明證葛根湯三方升麻湯大小青龍等湯 在後保命集內承氣湯三方亦在

**湯老門冬飲子**

治老弱虛人大渴

人參 枸杞 白茯苓 甘草各叁分 五味子半兩

麥門冬去心伍分

右為鹿朮生姜水煎

治勞復起死人麥門冬湯氣欲絕者用之有效

元戎

七

麥門冬兩 甘草貳兩 粳米半合

右門冬去心為細末水一盞煎粳米令熟去米約湯一小盞

半入藥五錢已棗一枚去核新竹葉十五片同煎至一大盞

去滓大溫服不能服者綿滴口中 後人治小兒不能灌注

者宜用此綿滴法

此方不用石膏以其二焦無大熱也兼自欲死之人陽氣將

絕者故不用石膏若加人參大妙

**海藏飲湯**

一留飲心下二游飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈

上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮

厚朴 半夏 澤瀉 猪苓

前胡 桂心 芍藥 甘草



七等分判每兩分四服水二盞生姜十片同煎至七分取清

特忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加葛根葛花縮

砂仁

**海藏已寒丸**此丸不僭上陽生於下

治陰證服四逆輩膏中發躁而渴者或數日大便秘小便澀赤服此丸上不躁大小便自利

肉桂

茯苓各伍良姜

烏頭炮各伍附子炮

乾姜炮

芍藥

茴香炒各乙兩

右等分爲細末糊爲丸桐子大溫酒下空腹食前五七十九八九十九亦得酒醋爲糊俱可

婦人血風證因大脫血崩漏或前後血因而枯燥其熱不除循衣撮空摸床閉目不省擲手揚視搖動不寧錯語失神脉弦

元戎

八

浮而虛內燥熱之極也氣虛鼻乾而不潤上下通燥此爲難

治宜**生地黄黃連湯**主之

川芎

生地黄

當歸各七

赤芍藥

梔子

黃芩

黃連各伍

防風乙兩

右爲麤末每服二錢水二盞煎至七分取清飲無時徐徐與之若脉實者加大黃下之

大承氣湯氣藥也自外而之內者用之

生地黄黃連湯血藥也自內而之外者用之氣血合病循衣撮空證同自氣而之血血而復之氣大承氣湯下之自血

而之氣氣而復之血地黄黃連湯主之也一者俱不大便

王朝奉云大小陷胃湯丸不愈者宜與之

人參

白朮

枳實

牡蠣各伍甘草炒各兩



乾姜

兩半

枳實

黃芩

去花壹兩

田

末煉蜜為丸如彈大湯一盞煎服不歇復與之不過

五六啗中豁然矣用藥神速未嘗見也

渴者加括蕪根 汗者加牡蠣

少陽證大小柴胡湯加減在前附又柴胡五方在後保命集內

治感冒發熱頭痛或因痰飲凝積發以為熱並宜

服之若感冒發熱亦如服養胃湯法連進數服微汗即愈大

治中脘痞悶嘔逆惡心開胃進食小兒室女尤宜服之

前胡

人參

紫蘇

乾葛

半夏

茯苓

加參分 枳殼

陳皮

甘草

桔梗

木香

各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜七片棗一枚煎至六分去

滓不以時候素有痰飲者俟熱退以一陳湯或六君子湯間

服若男子婦人虛勞發熱或吐血衄下血過多致虛熱者用此

藥二兩加四物湯二兩合和名茯苓補心湯

活人治婦人傷寒妊娠服藥例

若發熱惡寒不離桂枝芍藥

若往來寒熱者不離柴胡前胡

若大渴者不離知母石膏五味子麥門冬

若大便泄者不離桂附白朮乾姜

若大便燥結者不離大黃黃芩

若經水滯來滯去斷者不離小柴胡

若者不離人參阿膠白朮黃芩

若發汗者不離葱豉生姜麻黃旋覆花



上遺痛者不離前胡石膏梔子

頭痛者不離柴胡石膏其

若滿悶者不離枳實陳皮

若胎氣不安者不離黃芩麥門冬人參

若癰發黑者不離黃芩梔子升麻

萬病

療臍腹文患痲癖如桃大及諸黃病每地氣起時上氣衝心  
遶臍絞痛一切虫咬十種水病十種蠱病反胃吐食嘔逆惡  
心飲食不消天行時病婦人多年月露不通或腹如懷孕多  
血天陰即發又治十一種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與  
鬼交頭白多昏或哭或笑如鬼魅所着腹中生瘡腹痛服之  
皆効

紫苑去土

吳茱萸湯洗

黃連去頭

菖蒲

柴胡去須

厚朴姜製

桔梗去芦

茯苓去皮

皂莢去皮子

桂枝

乾姜炮

黃連去頭

蜀椒去目及閉口

巴豆去皮膜

人參去芦

各半兩

川烏炮

加參分

加羌活

獨活

防風等分

右為細末入巴豆勻煉蜜丸如桐子大每服三九漸加至五  
七丸生姜湯送下食後臨卧初有孕者不宜服且引于后

痔漏腸風酒下

赤白痢訶子湯下

膿血痢米飲湯下

隨傷血悶四肢不收酒下

蛔虫咬心檳榔湯下

氣噎憂噎荷葉湯下

撲傷損酒下

中毒葶灰甘草湯下

一切風升麻湯下

寸白虫檳榔湯下



霍亂乾姜湯下 咳嗽杏仁湯下

腎痛豆淋湯下 陰毒傷寒溫酒下

吐逆生薑湯下 食飲氣塊麩湯下

時氣井花水下 脾風陳皮湯下

頭痛小下 心痛溫酒下

大小便不通灯草湯下 因物所傷以本物湯下

吐水煎湯下 氣病乾姜湯下

小兒天風吊搐防風湯下 防已亦可

小兒疳痢葱白湯下 小兒乳食傷白湯下

月信不通煎紅花酒下 婦人腹痛川芎湯下

懷孕半年後胎漏艾湯下

有子氣衝心酒下 產暈痛溫酒下

血氣痛當歸酒下 產後心腹脹滿豆淋湯下

難產益志湯下 產後血痢當歸湯下

赤白帶下酒煎艾湯下 解內外傷寒粥飲下

室女血氣不通酒下 子死菜子湯下

又治小兒驚癇大人癩狂一切風及無孕婦人身上頑麻

狀如虫行四肢俱腫呻吟等疾

太陰證 陷胃三方瀉心五方在後保命集內

中湯 加減例

若為寒氣濕氣所中者加附子一兩名附子理中湯

若霍亂吐瀉者加橘紅青橘各一兩名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透即

此藥



嘔吐者於治中湯內加丁香半夏一兩每服生薑半片同煎  
石泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯

若溏泄不已者於補中湯內加附子一兩不喜飲水穀不化  
者再加縮砂仁一兩共成八味

若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於大方中去白朮加熟附  
名四順湯

若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後  
膏痞欲絕心鬲高起急痛手不可近者加枳實茯苓各一兩

名枳實理中湯  
若渴者再於枳實理中湯內加栝蒌根一兩

若霍亂後轉筋者理中湯內加火煨石膏一兩  
若臍上築者腎氣動也去朮加官桂一兩半腎惡燥故去朮

恐作奔豚故加官桂 若悸多者加茯苓一兩

若渴欲飲水者添加朮半兩  
若苦寒者添加乾姜半兩

若腹滿者去白朮加附子一兩  
若飲酒過多及啖炙煖熟食發為鼻衄加川芎一兩

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脈只用本  
若中附子毒者亦用本方或止用甘草乾姜等分煎服仍以

烏豆煎湯解之  
胃虛加減例

若瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散一法加霍香半夏  
右加乾姜為厚朴湯

若溫疫時氣一毒傷寒頭痛壯熱加連翹葱白五寸豆豉



六粒煎一二服微汗出愈

石五勞七傷脚手心熱煩躁不安自節酸疼加柴胡

若痰嗽瘧疾加姜製半夏 若本藏氣痛加茴香

若水氣腫滿加桑白皮 若婦人赤白帶下加黃耆

若酒傷加丁香 若飲冷傷食加高良姜

若滑脫泄瀉加肉苳蔻 若風痰四肢沉困加荆芥

若腿膝冷痛加牛膝 若渾身虛癱拘急加地骨皮

若腿膝濕痺加兔絲子 若白痢加吳茱萸

若赤痢加黃連 若頭風加藁本

若轉筋霍亂加楠木皮

若七邪六極耳鳴夢遺盜汗四肢沉重腿膝酸痿婦人宮臍

久冷月脉不調者加桂 若胃寒嘔吐多加生姜

一法加茯苓丁香各三兩共成六味

若氣不舒快中脘痞塞加縮砂仁香附子各二兩生薑煎服

若與五苓散相半為對金飲子

若與六一散相合為黃白散

若與錢氏異功散相合為調胃散

若欲進食加神麴麥蘖吳茱萸蜀椒乾姜桂為吳茱萸湯

若加藁本桔梗為和解散治傷寒吐利

若加藿香半夏為不換金正氣散

若瘧疾寒熱者加柴胡 若小腸氣痛者加苦練茴香

少陰證方七道在保即集內

八物定志丸 補益心神安定魂涎治痰去胃中邪熱理肺腎

人參壹兩 黃蒲 遠志 茯神去心 茯苓去皮各



參砂音分白朮

麥門冬

去心各半兩

牛黃細研

右為細末煉蜜丸桐子大米飲湯下二十九無時

若髓竭不足加 生地黄 當歸

若肺氣不足加 天門冬 麥門冬 五味子

若心氣不足加 上黨參 茯神 菖蒲

若脾氣不足加 白朮 白芍藥 益智

若肝氣不足加 天麻 川芎

若腎氣不足加 熟地黄 遠志 牡丹皮

若膽氣不足加 細辛 酸棗仁 地榆

若神昏不足加 朱砂 預知子 茯神

八味丸

熟地黄補腎水真血

肉桂補腎水真火

牡丹皮補神志不足

附子能行諸經而不止兼益火

白茯苓能伐腎邪濕滯

澤瀉去胞中留垢及遺溺

山茱萸治真滑不禁

乾山藥能治皮毛中燥酸澀

右八味皆君主之藥 若不依易老加減服之終不得効若

加五味子為腎氣丸迷類象形之劑也益火之源以消陰翳

壯水之主以制陽光錢氏地黄丸減桂附

潔古老人天麻治證見活法機要

天麻陸兩酒浸三除風痺

牛膝陸兩酒浸三強筋 玄參陸兩樞機管領

黃蘗陸兩另為末壯骨 杜仲紫兩剉使筋骨相著

當歸全用和養血 羌活拾伍兩或去骨節間風

生地黄壹斤益真血 附子壹兩炮行諸經之止



獨活伍兩 去腎間風邪

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服五七十九丸病大至百丸  
空心食前溫酒白湯下服藥忌壅塞失於通利故服半月稍  
寬壅塞微以七宣丸輕踈之使藥再為用也

**天麻牡丹皮散**

治血藏虛風及頭目不利可思飲食手足煩熱肢節拘急疼  
痛背膈不利大腸不調陰陽相干心驚忪悸或時旋運

牡丹皮 川芎 枳殼麩炒各壹兩 陳皮半兩炙

玄胡 甘草 羌活 半夏湯洗各半兩

木香叁分 呵子肉叁分 芍藥叁分 三稜半兩 乾姜半兩炮

當歸壹兩 白朮叁分炒 桂半兩

右為細末每服二錢水一盞半煎五七沸食前溫服益血海

元丸

十一

退血風勞攻注消寒痰實脾胃理血氣攻刺及氣虛惡寒潮  
熱證至妙

**海藏天麻補丸 同三才丸例**

天門冬 麥門冬 菖蒲 茯神 人參

益智 枸杞 地骨皮 遠志 熟地黃

右為末煉蜜為丸如桐子大空心酒下三十丸 本方數服  
以七宣丸泄之

**清心丸 治熱**

黃蘗貳兩 天門冬壹兩 黃連半兩 龍腦壹分 麥門冬去心壹兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服十九臨卧門冬酒下薄荷湯  
亦得

**火通 丙丁俱瀉**



黃芩壹

黃連壹

生地黄貳

木通參

右為細末煉蜜丸桐子大每服二三十丸溫水下臨卧

**神效白朮湯** 治痰病化為水氣傳變水鼓不能食

白朮

澤瀉

芍藥

陳皮

茯苓

生薑

木香

檳榔

右為末一法加白朮本藥各半治腹臍上腫如神

若心下痞者加枳實 若下盛者加牽牛

**厥陰證**

當歸四逆并加吳茱萸等湯見陰證略例

**四物湯** 益榮衛滋氣血月水不調臍腹疝痛等證並見局方

熟地黄

補血如臍下痛非此不能除乃通於腎經之藥也

川芎

治風血如肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥也

芍藥

和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也

當歸

和血如血刺痛非此不能除刺如刀刺乃通腎經之藥也

右為鹿末水煎

加減于后

若加地骨皮牡丹皮治婦人骨蒸

若妊娠胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠一片又加葱

白黃者

若血藏虛冷崩中去血過多亦加膠艾

若婦人嘗服春倍川芎

脉弦頭痛

夏倍芍藥

脉洪

飧泄

秋倍地黄

脉沉瀯血虛

冬倍當歸

脉沉寒

而不食

若春則防風四物加防風倍川芎

若夏則黃芩四物加黃

芩倍芍藥

若秋則門冬四物加天門冬倍地黄

若冬則

桂枝四物加桂枝倍當歸



若血虛而腹痛微汗而惡風四物湯加茂桂謂之腹痛六合

若風眩運加秦芫羌活謂之風六合

若氣虛弱起則無力眩然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合

若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合

若虛寒脉微自汗氣難布息清便自調加乾姜附子謂之寒六合

若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合

若產後虛勞日久而脉浮疾宜柴胡四物湯

川芎 熟地黄 當歸 芍藥各乙加柴胡八分

人參 黃芩 甘草 半夏各三分同煎

若婦人筋骨肢節痛及頭痛脉弦增寒如瘧宜治風六合

物湯四兩 防風 羌活各壹兩

若血氣上衝心腹助下滿悶宜治氣六合

四物湯四兩 木香 檳榔各壹兩

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合小腹痛者同

四物湯四兩 玄胡 苦練各乙兩碎炒焦

若氣充經脉故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合

四物湯四兩 芍藥壹兩

若經事欲行臍腹絞痛臨經痛者血澁也宜八物湯

四物湯四兩 玄胡 苦練碎炒 檳榔 木香各壹兩

若經水過多別無餘證宜黃芩六合

四物湯四兩 黃芩 白朮各壹兩

若經水澀少宜四物內加葵花煎又加紅花 血見愁

若虛勞氣弱咳嗽喘滿宜厚朴六合



四物湯 四兩 厚朴姜製 枳實麸炒 各半兩

若經水暴下加黃芩一兩

若腹痛者加黃連如夏月不土黃芩

若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩

若經水少而色和者四物湯加熟地黃當歸各一兩

若經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡湯以去其

寒熱後以四物湯和之

若婦人血積者四物湯內加

廣茂 京三稜 桂 乾漆各壹兩

若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜**八物湯**

四物湯 四兩 黃耆 甘草 茯苓 白朮各壹兩

若妊娠傷寒中風表虛自汗頭暈項強身熱惡寒脉浮而弱

九氣

十八

太陽經病宜表虛六合湯

四物湯 四兩 桂枝 地骨皮各柒分

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊太陽經病宜表實六合湯

四物湯 四兩 麻黃 細辛各半兩

若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脉浮而熱頭痛宜

風濕六合湯太陽標病也

四物湯 四兩 防風 蒼朮製各柒分

若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發斑如錦文宜升麻六合湯

四物湯 四兩 升麻 連翹各柒分

若妊娠傷寒膏脇瀉痛而脉弦少陽也宜柴胡六合湯

四物湯 四兩 柴胡 黃芩各柒分

若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脉沉數陽明太陽本病



也急下之宜大黃六合湯

四物湯四兩大黃伍分桃仁拾个去皮尖大麩炒

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯四兩人參各伍分五味子各伍分

若婦人妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴

六合湯 四物湯四兩厚朴枳實麩炒各伍分

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯四兩梔子黃芩各伍分

若妊娠傷寒身熱大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜石膏合湯

四物湯四兩石膏知母各伍分

若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯四兩茯苓澤瀉各伍分

元戎

十九

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯四兩琥珀茯苓各伍分

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯四兩阿膠艾各伍分一方加甘草同上

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病

也宜附子六合湯

四物湯四兩附子炮去皮臍桂各伍分

若赤白帶下宜香桂六合湯

四物湯四兩桂香附子各伍分

若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下

四物湯生地黃酒浸大黃

若虛熱病四物與參蘇飲相合各補心湯主之



若四肢腫痛不能舉動四物蒼朮各半湯主之

若治燥結四物與調胃承氣湯各半為玉燭散

若流濕潤燥宜四物理中各半湯

若保胎氣令人有子四物與縮砂四君子湯各半名八珍湯

若熱與血相搏口舌乾渴飲水加 栝蒌 麥門冬

若腹中刺痛惡物不下加當歸 芍藥

若血崩者加 生地黃 蒲黃 黃芩

若頭昏項強者加 柴胡 黃芩

若因熱生風者加 川芎 柴胡 防風

若藏秘澀者加 大黃 桃仁

若滑瀉者加 官桂 附子 生薑

若嘔者加 白朮 人參 生薑

若大渴者加 知母 石膏

若發寒熱者加乾生薑 牡丹皮 芍藥 柴胡

若水停心下微吐逆者加猪苓 茯苓 防已

若虛寒似傷寒者加 人參 柴胡 防風

若產婦諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服之其効如

若婦人或因病酒或因產亡血或虛勞五心煩熱者宜四物

一連湯 四物湯內生用 黃連 胡黃連真者 溫飲清

四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈等皆

可作各半湯此易老用藥大略也

若虛煩不得睡加 竹葉 人參

若婦人血虛心腹疝痛不可忍者去地黃加乾姜名四神湯

若諸痛有濕者四物與白朮相半加



天麻 茯苓 川山甲 酒煎

若目赤暴發作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯

四物各半羌活各半防風各半草龍膽各半防己各半水煎

海藏云婦人妊娠畜血

婦人妊娠或畜血 抵當桃仁勿妄施 要教子母俱無損

大黃四服對服之

**治三陰受邪心臍少三腹疔痛氣風等證**

四物湯各半防風 獨活 全蝎各半續斷宜兩

苦練 玄胡各半木香 丁香各半茴香壹兩

右為細末酒糊丸桐子大空心溫酒下三五九大効

**治奔豚小腹痛神効**

川苦練 茴香 附子壹兩去皮脂

元戎

二十一

右三味酒二升煮盡為度焙乾細末之每秤藥末一兩入玄

胡半兩全蝎十八个炒丁香十八个別為末和勻酒糊丸桐

子大溫酒下五十九空心痛甚加當歸煎酒下

**治喉閉遠巡不救方**

皂莢去皮子生半兩為細末鑽頭點少許在痛處更以醋糊調藥末厚塗項上須臾便破血出立差

**海云自汗者不宜服**

槐皮各半仙入防首蔓 十味各停勻

苦味香減半龍麝即少許朱砂作衣纏

麻黃膏煎丸 大小如指彈

右治半身不遂口眼喎斜手足不仁言語蹇澀或痛入骨髓

或痺襲皮膚或中急風從潮不言精神昏塞行步艱難筋脈

拘急左攤右瘓一切風疾並皆治之



槐花子 人參 桑白皮 蒼朮 川芎

何首烏 蔓荊子 威靈仙 防風各貳兩 五味子

香附子 苦參各壹兩 香白芷貳兩 麝香貳分另研

右一十四味為細末入香令勻又用麻黃十斤去根節用大河  
水三石二斗熬至六斗濾過去滓再熬至一升半入銀石  
器內熬成膏入前藥末和勻杵三五千下每一兩作十九朱  
砂為衣每服一九先搗碎酒一盞自晨浸至晚食後臨卧撻  
勻服之神清無睡是藥之驗須更隔五日服之如中風無汗  
宜服若躄虛自汗服之是重亡津液也若風盛人於密室溫  
卧取汗

三焦熱用藥大例 方在元戎

中焦

元戎

清神散 連翹防風湯 涼膈散 龍腦飲子

犀角地黄湯

中焦

小承氣湯 調胃承氣湯 洗心散 四順清涼飲

桃仁承氣湯

下焦

大承氣湯 五苓散 立効散 八正散

石韋散 四物湯 抵當湯丸

柴胡飲子 清涼飲子 三黃丸

上焦

血分熱

通治大熱

白虎湯 桃仁承氣湯 黃連解毒湯

三焦寒用藥大例 方在衛生



桂附丸  
鐵刷湯  
胡椒理中丸  
中焦  
二氣丹  
附子理中丸  
大建中湯  
下焦  
還少丹  
八味丸  
天真丹

**氣分寒**

桂枝加附子湯

**血分寒**

巴戟丸

**通治大寒**

大已寒丸

右此內有寒熱之大略也若外有寒熱者當求別法  
發癍諸藥

**葛根湯** 癍在肌

治冬溫始發肌中癍爛欬而心悶但嘔清汁宜此

葛根 橘皮 杏仁 知母 黃芩  
麻黃 甘草

右等分剉每用五錢水煎

**陽毒升麻湯** 癍在面

治傷寒一二日或吐下後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤  
狂言見鬼下刺脉浮大數咽喉痛下膿血五日可治七日難愈

升麻 犀角 射干 黃芩 人參  
甘草 分半

右咬咀水三升煎取半飲一盞刻許再服溫覆手足汗出解  
否則重作

**陽毒玄參升麻湯** 癍在身

治汗下吐後毒不散表虛裏實熱發於外甘煎則煩燥譫語兼  
治喉痺腫痛

玄參 升麻 甘草 各等 右細剉水煎



少陽陽明合病

治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

升麻 梔子仁 黃芩 芍藥 石膏  
知母 甘草 杏仁 柴胡  
右麗末五錢 生姜五片 豉百粒 水煎

牛蒡子 荊芥 防風 甘草 水煎服

陰毒升麻湯 陰斑 大建中湯尤妙

升麻 當歸 甘草 蜀椒 鱉甲  
雄黃 研 半兩

右為末 每服五錢 水煎

蒸病 治者宜隨各經虛實內外淺深用藥加減可也

古 鍊驗五蒸湯

甘草 茯苓 人參 竹葉 乾地黄  
葛根 知母 黃芩 石膏 粳米

右十味 以水九升 煮取二升半 分為二服 亦可以先煮  
小麥水乃煮藥 忌海藻 菘菜 蕪菜 大醋

實熱 虛熱 黃芩 黃連 黃蘗 大黃

氣也 烏梅 秦艽 柴胡  
血也 青蒿 鱉甲 蛤蚧 小麥 牡丹皮

肺鼻乾 烏梅 天門冬 麥門冬 紫苑  
皮舌白唾血 石膏 桑白皮

膚昏昧嗜睡 牡丹皮



氣遍身氣執端促鼻乾 人參 黃芩 梔子

大腸鼻右孔乾痛 大黃 芒硝

脈唾白浪語脈絡 生地黃 當歸

心舌乾 黃連 生地黃 當歸 桂心 童子小便

血髮焦 地黄 當歸 赤茯苓 木通 生地黃

小腸下唇焦 考藥 木炭 苦參

脾唇焦 考藥 粳米 大黃 芒硝 葛根

肉食无味而嘔 煩躁不安 考藥

胃舌下痛 石膏 粳米 大黃 芒硝 葛根

肝眼黑 川芎 當歸 前胡

筋甲焦 川芎 當歸 柴胡 括萎

膽眼白失色 柴胡 括萎

三焦下熱下寒 石膏 竹葉

腎兩耳焦 生地黃 石膏 知母 寒水石

腦面眩悶熱 地黄 防風 羌活

髓顛沸骨中熱 天門冬 當歸 地黄

骨齒黑腰痛足逆交甜食藏 驚甲 地骨皮

牡丹皮 當歸 生地黃 石膏 黃蘗

肉支細陔腫府藏俱熱 石膏 黃蘗 生地黃 沉香 滑石

胞小便赤黃 澤瀉 茯苓 生地黃 沉香 滑石

膀胱左耳焦 澤瀉 茯苓 滑石

凡此諸症皆熱病後食肉油膩房酒犯之而成又蒸不除變

成疔病即死矣 善後散 治傷毒身熱如火頭痛躁渴咽喉乾痛



葛根劉七 黃芩 大黃醋炒 甘草 山梔子仁

朴硝各半兩 右為末水煎

元戎拾遺

古人敗毒散 大陽證 治傷風濕疫風濕風眩風痰卑濕

羌活 獨活 前胡 柴胡 枳殼

人參 茯苓 桔梗 甘草 川芎分兩隨病加減

右細末生姜水煎或沸湯點亦可大人小兒皆宜瘴煙之地  
濕疫時行或人多風痰或處卑濕脚氣此藥不可闕一方少  
加薄荷同煎

三陽頭痛

羌活 防風 荆芥 升麻 葛根

白芷 柴胡 川芎 芍藥 細辛

葱白連鬚 分兩旋加

若陰證頭痛只用溫中藥足矣乃理中姜附之類也

發黃兼諸雜證治法在前難知內附陰黃治法在後陰證略例內附

小便不利煩躁而渴 加茯苓猪苓滑石當歸官桂

煩躁喘嘔不渴 加陳皮白朮半夏生姜茯苓

四肢遍身冷者 加附子 甘草

茵陳湯加減

肢躄逆冷腰上自汗 加附子 乾姜 甘草

身冷汗不止者 加附子 乾姜

前藥末已脉尚伏 加吳茱萸附子乾姜木通當歸

韓氏立名為茵陳茯苓湯 茵陳橘皮湯 小茵陳湯

茵陳四逆湯 茵陳附子湯 茵陳茱萸湯 大抵只是



仲景除證藥內加茵陳也用者要當識之

**龍腦蘇丸** 治婦人乾血氣

川山甲炮 甘草 苦丁香 川椒 苦葶藶

白附子 草烏頭 猪牙皂角 各二分 巴豆一分全

右通為細末生葱絞汁和丸彈子大每用一九新綿包定內

陰中一日即白二日即赤三日即血神効

**龍腦蘇丸** 上焦熱

除煩解勞去肺熱欬衄心熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱

泣出口苦腎熱神志不定上而酒毒熱消渴下而血滯五

淋血崩等疾

薄荷 一斤 麥門冬 夫心 甘草 半 生乾地黄 六兩各為末

黃耆 新蒲黃 阿膠炒 黃連 人參

木通略 柴胡二兩 別同木通湯半

右為細末好蜜二斤先煉一二沸然後下生地黃末不住手

攪持加木通柴胡汁浸熬成膏勿令火緊焦了然後將全藥

末和丸如豌豆大每服二十九丸白湯下

虛勞煩熱梔子湯下 肺熱黃芩湯下

心熱悸動恍惚人參湯下 唾咯吐血四血去心麥門冬湯下

脾胃熱赤芍藥生甘草湯下 肝熱防風湯下

腎熱黃柏湯下 已上並食後臨卧

治五淋及婦人漏下車前子湯下 痰嗽者生姜湯下

室中痛者蒲黃滑石末一錢調下 氣逆者橘皮湯下

至女虛勞寒熱朝作煎柴胡人參湯下

治 經前



人參

白朮

各壹兩半

柴胡

黃芩

各壹兩

白芷

知母

各半兩

甘草

半兩

驚甲

一升半

大者

酥炙

右為細末黃耆膏子丸桐子大每服二五十九百沸湯下空心右用黃耆半斤鹿末水二斗熬一斗去滓再熬令不住攪成膏至半斤入白蜜一兩錫一兩再熬令蜜錫熟得膏十兩放冷丸藥

**坤骨皮**

治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困夜多盜汗

地骨皮

秦艽

柴胡

枳殼

知母

當歸

驚甲

醋炙黃

右等分為末水一盞桃柳枝頭各七個姜二片烏梅一個每服去滓臨卧

**易簡言歸湯**

治一切去血過多眩暈悶絕傷胎去血產後去血

崩中去血拔牙去血金瘡去血不止者牽頭欲倒悉能治之

芎藭

當歸 各等分

右以咀水煎熱服

若產後眩暈加芍藥

產後腹痛不可忍加官桂 酒小使

若娠子死或不死胎動酒水合煎即下未死者即安

若虛損腹痛少氣頭眩自汗每服加羊肉兩生薑十片水煎

若臨月服之則縮胎易產

若室女婦人心腹疔痛經脈不調水煎服

若娠胎氣不安產後諸疾酒煎服

若難生倒橫子死腹中先用黑豆一大合炒熟水與小便合

煎服

若難產用百草霜香白芷等分童子小便好醋各一合沸湯

浸服甚效有再服已分



若腸風藏毒每服加槐花末半錢二百以下血塊即愈  
若吐血亦宜服此 若血氣上喘下腫空心煎艾湯調下  
若產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生姜自然  
汁煎服 若產後頭痛加荆芥  
若崩中漏下失血不止加香附子炒每兩入甘草一錢沸湯  
點服 若有白帶者加芍藥半兩乾姜等分米飲調下

**奇神速法**

白虎白麵一百斤 青龍青蒿自然汁三升  
勾陳蒼耳汁二升 騰蛇野蓼子汁四升  
玄武杏仁四升 去皮尖看麩乾濕用水  
朱雀赤小豆二升 煮乾去湯研

右一處拌勻稍乾為妙用大盆覆一宿于伏內上寅日踏碎

實為度甲寅戊寅庚寅乃三奇也卧鋪如趨法

**千金種子法**

進火之時當至陰節間而止不尔則過一宮矣予  
問故師曰深則少陰之分肅殺之方何以生化淺則厥陰之  
分融和之方故能發生所以受胎之處在淺而不在深也非  
月經後皆不可用事惟經後一日男二日女三日男此之外  
皆不成胎大風大雨大寒大暑陰晦日月蝕皆不可交接所  
生男女多病疇疇症四射不完矣

**續命香治子宮久冷赤白帶下**

牡蠣煨 紫稍花 韶腦 母桑 黃狗頭骨  
蛇床子 破故布 桂心  
右為細末煉蜜丸如雞頭大臨

海藏編類醫書元成









