

永類鈐方

十二

永類鈴方卷第二十一 陳氏文申家傳經驗疹痘方金錄

○疹痘證治

輕則為疹 重則為瘡 痘者如豆



小兒在胎之時乃母五臟所養也形山海不其禁忌恣意所欲好啖辛辣毒食氣搏於胞胎之中兒受此毒名曰三穢液毒以成瘡疹一者五穢六腑穢液之毒發為水泡之瘡二者皮膚肌肉穢液之毒發膿水泡之瘡三者骨節穢液之毒發膿血水泡之瘡人生無不發疹且者自幼及長必生一少又名曰歲瘡三毒既出發為疹且子母先宜慎食禁食葱韭雞蒜酒醋薑椒薑蔥雞卵大河海魚蟹等物世俗不顯海亦何及

小兒痘瘡已出未出之間有類傷寒之症此皆寒壯熱身體疼痛大便黃稠此正病也若無他證不宜服藥九瘡且瘡先分表裏虛實若四者不分則無所治如表裏俱實者其瘡發出易腐而死表實裏虛其瘡易出而難愈也瘡疹表虛而裏實者毒蓄於臟腑而漸泄於皮膚傷其表裏而裏虛利始以皮重見少傳臟腑所以不同疹脈三部洪數往來大不應指與小兒痘瘡已出未出之間或瀉瀉或腹脹或氣促病在內謂之裏虛速與干一味木香散治之

小兒痘瘡已出其瘡不光澤不起發根不紅或瀉瀉或腹脹或氣促是表裏俱虛速與異功散下肉且冠元小兒痘瘡始出百至百瀉身壯熱大便黃稠是表裏俱實其瘡必光澤起發肥滿易愈也小兒痘瘡乃臟腑穢液之毒發皮膚之間蓋脾土身之肌肉肺手身之皮毛今疹且出是肌肉皮毛受其病治宜重調和脾肺滋養血氣使脾不虛肺不寒表裏沖和自然易出易愈

卷二十一

經云惡病裏和故不治而愈也

小兒痘瘡雖出不快皆因毒氣壅盛要謂其熱用藥宜利解散致令臟腑受令榮衛壅滯則血氣不能充實皮膚肌肉其毒不得起發竟痛結成痂故多痒煩燥喘渴而死小兒痘瘡發熱乾煩渴不止不可瀉水及煎并紅柿西瓜柑橘等物不可妄投清涼消毒散等藥恐冷氣內攻滯損脾胃則腹脹喘悶寒戰咬牙難治矣咬牙者謂腎氣不榮毒見小兒壯熱憎寒鼻鳴無名未明瘡疹之證要作傷風傷食治之或以解藥出汗或食藥宜導因此表虛難出異功散

小兒痘瘡傷風身熱未明是否瘡疹宜發散可服四味升麻湯如痘瘡始出百至百日間雖身熱或腹脹咳嗽耳後有紅筋赤縷者不可服升麻湯或身熱瀉瀉不可服或身熱驚悸不可服或身熱足冷不可服宜服干一味木香散

小兒如瀉水谷或瀉白色或淡黃色者其毒未散送下七味肉豆蔻元瀉止在服不止多服小兒如瀉多津液內耗血氣不榮瘡難起發亦不能瘡如身溫腹脹咬牙喘渴者難治綠水谷去多津液枯竭而欲飲水不止者其氣竭而死速與干一味木香散散不愈速用異功散

小兒如瀉五日大便者可用肥嫩猪脂之油以淡白水煮熟切茹宜大而兒食令臟腑液潤瘡加易落百無滯礙切不可投宜利藥恐內患瘡毒入裏

小兒痘瘡初出三日至七日外恐有寒風寒穢惡之氣觸之瘡即出至五六日身壯熱不大便其脈弦緊者可服三味消毒散微得利便佳服不大便而脈可不限也

輕者 作惡出 赤不尋 頭面稀少 眼中無 根葉紅 肥滿光澤

重者 一齊出 如養種稠密 灰白也 身溫腹脹 頭溫身疼 瀉瀉

輕重 犯房室 不忌口 光黃瀉 飲冷水 服涼藥

重者 避風寒 大便調 不瀉瀉 忌外人

小兒痘三日始見微：方欲出者如粟米如黍米如粟豆大似水珠光澤明淨者佳

小兒痘四日五日其瘡大小不一等根葉紅光澤明淨不必藥稠密隨頂灰白色瀉瀉者宜服十一

味木香散送下七味肉豆蔻元

小兒痘六日其瘡肥紅光澤者輕不必藥如身溫氣促乾腹脹足指冷重平一味木香散加香

小兒痘八日其瘡長足肥滿蒼蠟者輕不必藥若寒戰悶亂腹脹瀉瀉氣急咬牙者至

重宜平一味木香散加丁香肉桂如不效急煎平一味異功散救之

小兒痘十日其瘡當屬瘡如欲落者欲愈不必藥若瘡當屬不屬身或熱或不熱肚

脹煩渴不可與水蜜冷物若與之瀉而犯急煎木香散救之

若豆：欲屬未屬之間頭溫足指冷或腹脹氣促瀉瀉不可與水蜜服之即死急以異功散救

小兒痘十一日其瘡當屬不屬身不紅熱悶亂不安臥則硬氣煩渴咬牙者急煎異功散加

添木香當歸以救陰陽表裏若與水蜜冷物者殺之大速

小兒痘十二日其瘡如既落其癩尤顯或凹或凸肌肉尚嫩不可澡浴不可食炙博五辛

酸辣有毒之物恐熱毒攻肝眼目生翳若不依此必為自患可用三味谷精散救之

小兒痘收靨之後渾身壯熱經日不除別無他證與味柴胡門冬散治之熱退佳服如不愈

卷七

六七

可服七味人參白朮散若身壯熱大便堅實或舌生瘡咽喉腫痛皆是瘡氣餘毒未盡

可用四味射干梔子湯治之如不愈亦可服人參白朮散若風熱咳嗽咽隔不利

三味桔梗甘草防風湯如不愈亦服人參白朮散若涕唾稠粘身熱鼻乾大便如常

便黃赤可用六味人參清膈散如不愈用久參白朮散若痰實壯熱胃中壅悶

便堅實則則喘急可五味前胡枳殼湯治之

小兒痘首尾十三日可保平安首尾不可與水若誤與之瘡靨之後其痂溼落或身生瘡

腫若針之則成疔蝕瘡膿水不絕甚則面黃唇白難愈蓋脾胃王肌肉飲水多濕

脾搏肌脾肌虛則津溢毒表少榮衛滯滯故瘡痂溼落而生瘡也黃帝曰飲有陰陽

向也好飲冷者水雪不知寒好飲熱者沸湯不知熱岐伯曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰

盛陽虛飲熱不知熱故治之陽盛則補陰可用木香散加香肉桂陰盛陽虛可用異功

散加木香當歸治之也

若身熱小渴者可用人參白朮散治之如不愈可用木香散

若身熱大渴者可用人參白朮散治之如不愈可用木香散

若腹脹渴者或瀉瀉者或足指冷渴者或驚悸渴者或寒戰渴不止者或氣急咬

牙渴者或飲水轉渴不已者已上九渴證即此熱也乃脾胃肌肉虛津液裏少故也

可服平一味木香散治之如不愈可加丁香官桂多煎服表裏官桂發表其表裏

俱實則瘡不致痒塌喘渴而死矣

木香散性溫平能和表裏表通行津液清上實下扶陰助陽治小兒腹瀉瀉瀉功如神

異功散能除風濕... 調和則血氣克實... 自然易出易入... 蓋因內常和暖外無冷氣之相干也

小兒豆瘡... 善解瘡毒功效神妙... 為末每用乾貼無時... 攤在席上令兒坐卧... 效一方用蕎麥粉糝之... 或豆豉燒存性作末傳之

小兒豆瘡... 外白結沙蜜隨多少塗瘡上... 其疔易落無紫黑癩痕亦不真穢

又方羊銅骨中髓一兩... 輕粉少許研成白膏... 塗瘡上

小兒豆瘡... 韶粉一兩輕粉一字... 研細入煉了猪油和如膏... 塗瘡癩上

小兒豆瘡已屬未愈之間... 五臟肌肉俱虛血氣未復... 忽被風邪搏於膚膜之間... 故津液滯

遂成疔虫瘡... 宜用雄黃散... 散治之... 不愈潰骨傷筋以致殺人

雄黃散治小兒牙斷生瘡... 疔蝕瘡

雄黃一錢銅綠一錢... 二味研極細... 每用量瘡小乾貼為妙

綿繭散治小兒身體及肢節... 生疔蝕瘡膿水不絕

卷七

出蛾蚕茧隨多少用生白... 研細塞入綿茧內... 令滿用炭火燒令白... 凡汁盡取出... 細每用乾貼瘡肉

豆瘡五不治證... 瘡塌寒戰咬牙... 紫黑色喘渴不寧... 頭溫足冷悶亂飲水

升麻葛根湯... 白芍藥川升麻... 甘草各一兩... 葛根一兩半... 家傳加留君湯名升君湯

吹咀每三錢水... 薑煎六分... 稍熱服無時... 山加糯米參紫草當歸

十一味木香散... 木香當歸... 人參... 淨陳皮... 制厚朴... 丁香... 訶子肉... 人參... 制半夏

十二味異功散... 木香當歸... 人參... 淨陳皮... 制厚朴... 丁香... 訶子肉... 人參... 制半夏

官桂... 白茯苓... 白朮各二錢... 羌活半夏... 附子炮去皮各一錢半

吹咀每三錢水... 薑煎六分... 稍熱服三歲兒作三度服... 五歲兒作五度服... 二歲兒作五度服... 病者大小以意增減

七味肉豆蔻元... 木香砂仁各三錢... 白朮赤石脂各七錢半... 白龍骨肉豆蔻

呵子肉各半兩... 為末糕糊元黍... 米大周歲兒五元... 三歲兒百元... 溫米湯無時

六味人參麥門冬散... 麥門冬去心二兩... 人參甘草炙淨陳皮... 白朮制厚朴各半兩

吹咀每三錢水... 薑煎六分... 熱服無時... 量兒大小加減

六味柴胡麥門冬散... 人參黑參甘草炙柴胡各三錢半... 麥門冬去心三錢

龍膽草一錢半... 吹咀每三錢水... 薑煎六分... 稍熱服量兒大小加減

三味消毒散 生藥子兩抄 荆芥穗三錢半 甘草三錢 煎服 吹咀水煎服
三味桔梗防風湯 桔梗防風 甘草各一兩 湯使同

十六味人參清肺湯 柴胡人參 當歸 芍藥 知母 桑白皮 炒白木 紫苑
地骨皮 黃芪各三錢半 石膏 滑石各二兩半 茯苓 黃芩各半兩 甘草
桔梗二兩 吹咀每三錢 姜一片 水煎六分 稍熱服 服畢小加

五味前胡枳殼湯 前胡一兩 人參 赤茯苓 制枳殼 甘草各二兩 吹咀水煎
七味人參白朮散 人參 白朮 白茯苓 霍香 木香 葛根 甘草各半兩 吹咀水煎
三味谷精草散 谷精草一兩 生熟粉二兩 生黑豆皮二錢

葛根麥門冬湯 治小兒疹出如蚊蚤所咬 頭痛吐熱
葛根 人參 麥門冬 去心 赤芍 升麻 甘草 石膏 枳殼各半兩

吹咀水煎 溫服 無時
生地黄散 治小兒斑疹 身熱 乾咳 嗽心煩

淨生地黄半兩 杏仁及尖炒 款花 淨陳皮 甘草各三錢 麥門冬 志三錢半
吹咀水煎 溫服 無時

惺惺散 治小兒斑疹 風熱 及時氣 頭痛 壯熱 日晡 多睡 咳嗽 喘粗
桔梗 淨細辛 人參 甘草 炙白茯苓 川芎 白朮 各二兩 吹咀 薄荷 荷葉 同煎 熱服

卷六十一

九

秘傳加減丸 兒疹出 臉赤 面黃 眼閉 咳嗽 腹疼 手足 或冷 痺疹 出而 大便 溲瀉 辨冷
熱 若渴 而身 熱 小便 少 必 協 換 未 宜 即 用 熱 藥 且 以 四 君 子 湯 加 豆 蔻 木 香 等 藥
若 疹 出 瀉 而 不 渴 或 熱 或 不 熱 及 小 便 多 者 消 投 木 香 附 子 等 藥 凡 疹 瀉 非 紅 水 瀉
本 色 糞 則 尚 可 用 藥 劑 亦 然 凡 疹 咳 入 拾 入 者 毒 致 也

加減異功散 人參 白朮 白茯苓 京芍 黃芪 當歸 桔梗 厚桂 紫草
粉草 各三錢 初加 南木香 一錢 煨加 肉豆蔻 煨 再加 附子 炮 隨 輕 重 加
疹後咳嗽 最末 易治 加減方 人參 白朮 煨 白茯苓 桔梗 枳殼 防風 淨北細辛
枳實 炒 款花 藥 杏仁 炒 五味子 粉草 炙 制半夏 升麻 各等分 生薑 桑白皮 煎

護目膏 黃藥半兩 菴豆七錢半 甘草二兩 紅花二兩
為末 油調 塗兩眼 外四畔 一方 四味 平等分

調理安斑散 升麻 赤茯苓 黃芪 羌活 人參 制枳殼 桔梗 甘草 吹咀 如少 紫草 薄荷
神仙痘瘡 黑陷 不發 方川山 甲燒 灰 存性 為末 加射香 許一歲 錢三歲 一錢 溫酒
調下 服神效 但日 合無 免者 不可 生矣 直指 加木香 煎湯 調下 或紫草 名獨 聖散

鄭氏四聖散 治疹出不快 及倒壓
紫草茸 木通 甘草 炙 制枳殼 黃芪 各等分 一方 人參 茯苓 去紫草

直指如木香 川芎 枳殼 研糯米 最能 解毒 釀發 之 吹咀 三歲 錢 煎服 無時
紅花湯 治疹出不紅 花子 紫草 茸 各半兩 蟬壳 一分 吹咀 酒中 半煎 溫服 無時
天戟散 治痘疹 紫黑色 陷寒 戰寒 牙裏 齒身 黃紫 腫三服 不愈 即死

有以紅牙大戟為末，毒感兒抄半錢，研脂麻湯調下，此藥治真毒，因甚妙。或感其毒，不敢用，得此證，分明用之，不妨尋常小兒，睡中真毒，困者，腎經風，批其毒，為風，愈此，即效。後與驚藥，更不復作，仍憂寒戰，屬腎水，溫脾土，養肺金，以勝復之。

直指云：痘瘡見胃虧，亦壞耳。反批，疹變紫黑，為逆。治當瀉膀胱，先月桂枝芍藥大戟等分，四末，每一錢，棗湯下。溫脾，瘡若不黑，以非腎證，瀉膀胱，先月桂枝芍藥大戟等分，四末，每一錢，棗湯下。紫草木通湯，治瘡疹出不快，紫草人參木通茯苓糯米等分，甘草減半。到散煎二錢，溫服，內虛大便利者，可入木香去紫草。

調解散治痘已發，或為風冷所折，禁衛不和，或宿食所傷，內氣不運，過以致水硬，落青皮陳皮枳殼制半夏川芎木通乾葛其早紫蘇各等分，人參減半。到散每二錢，姜棗煎。

豆皮飲治斑疹入眼，生翳，白菊花新葦豆皮真谷精草各一分，為末，每一錢，乾柿一不粟米泔，蓋同煎，候米泔盡，只喫柿乾日兩枚。

扁鵲油劑方：小兒方三歲發熱，恐成瘡，豆以此止之。真生麻油童子小便各半盞，右逐旋夾和以柳枝頻撓，令如蜜，每服二蠅殼許。服畢令臥少時，但三四服，亦便利，身體熱退，即不感瘡，豆若形證已露，則奇服。凡小兒病危，天衝有脈，神氣未脫，顙門未陷，顏色指甲未黯黑，猶可用力，且五臟六腑之精，注於目，又必望而知其目中神氣為驗。

卷廿一

無死方：鏡黃金也不消，右以前出物於腸，早晨日未出時，以於銷銀窩內炭火，煅令煙盡，白色為度，但瘡發不快，倒推黑陷，及一切惡瘡，密涉調字，其効如神。

演山口議：瘡疹多證，多端最難分別，發出時有作批，不作批者，有驚掣狂躁自汗，謔語呵悶昏暈，嘔吐咳嗽者，皆五臟虛實不同耳。或謂耳尻反三事，俱屬於腎，故所部獨冷，驗之然，疑似之間，或中或不，若但看耳後有紅腫赤縷，定是疹，候更無可疑。若有批，不可退，批發驚，不可用驚藥，有汗不可汗，或吐不可理，但得汗出，表溫其裏，解其毒，自然發出，或曰首尾不可下，或曰首尾皆可下，眾皆疑之，愚曰：一家所說皆善也。且兒氣脈充實，宜微下之，恐作煩躁，若也氣虛，直不可下，恐瀉身，脫氣，所利下消，毒飲，四頃飲，三服微下之功，不可用也。經下積，藥如有批，煩躁，氣實，天連，翹也。加紫草功效，似咸黃，苓今人但見疹已出，未出便與非麻葛湯，其性頗寒，否太多反壞其表，凡用之，宜用白芍藥，煎糯米參紫草湯，其功甚良，又有如傷寒，致批，經發散，已安，恬七八日無事，忽出疹者，有咳嗽而出疹者，有耳後紅腫，或服發好，眼神昏，面紅，可蘇。

○傷寒證治

傷寒證治無越於張朱格例大人与小兒同辨分劑少異用藥少為中病即行有...
傷寒者之分又有正受傷寒夾食傷寒夾驚傷寒三者之別。正受傷寒或初起...
風為病淺頭眩鼻涕聲重自汗惡風煩喘可解肌正受傷寒為病深面赤鼻乾壯熱身...
痛粟起無汗惡寒或喘嗽小便赤皆屬裏證當微取其汗先用香葛湯表解若壯熱...
嗽頭疼煩渴痰涎入參羌活散表裏蘇飲... 散以有裏夾者有上證而惡熱揚手...
足煩渴燥糞撤衣氣粗屬裏證胃與疎利可用活人方大柴胡湯至若頭額冷手足...
涼口中冷氣面黑便青啼則頭代身曲眼閉肚緊此陰病裏虛溫裏則理中湯活人甘草干...
姜湯溫劑救其裏是汗下溫三者之法可以類推矣。夾食傷寒有前傷寒證加肚熱足...
或肚痛或有吐利先用香葛散惺惺散演山脫甲散後却用揆磨消化脾積藥如前安...
胃和脾散察其克實以紫霜元等散下之即以醒脾之劑調之凡下瀆究問先傷寒後夾食或...
夾食後傷寒然傷寒夾食乃在食時之間惟女竟知其先後若知其理以後受者而先調理之...
若其未明可表解俟有裏證方可下之尤為善也而下藥為表藥不可併行又當詳其表證...
虛實何如。夾驚傷寒有前傷寒證手紋有證額冷脚熱或睡中啼叫先用香葛湯參...
羌活散表解未退審體實者用前柴胡飲子或四順清涼飲悉散蕩滌之不可用下積元...
仍以和劑天麻防風元湯氏抱龍元佐之如上六證又當視其小便或赤或白可以知裏熱之有...
無或清或濁可以知裏熱之輕重孩則看其虎口脈紋童則一指按其人迎氣口之緊盛...
又有傷寒瘟疫長幼傳染此由春夏反清寒秋冬反暄熱所致證同傷寒如香蘇散

卷二二 北一

升麻湯五苓散敗毒散毒散子可隨證施用。又有疹毒似傷寒者小兒之切證...
當於疹毒明考其證治亦有表裏所傳不同時月鄰里傳染之辨。其有脚氣食積...
煩痰飲四證類傷寒者見於前卷傷寒鈴圖中不復贅錄又傷寒咳嗽見本門...
香葛散治傷寒夾食夾驚及四時瘟疫

淨香附子陳紫蘇葉各二兩陳皮二兩直指改淨青皮二兩消食表汗 甘草各半兩
鮮肌加粉葛一兩粗末每服三錢水半盞生姜葱白煎半溫熱服

升麻葛根湯治時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩疼見活人方一方向君湯隨時等分...
集驗香葛湯

乾葛二兩 川升麻 羌活 桔梗微炒 白芍藥 川芎 白茯苓 白芷 甘草各半兩
吹咀每三錢水半盞姜葱煎取半

蘭易辛 從遊附惺惺散之下理感風傷風風熱頭痛壯熱鼻涕咳嗽有痰當先用此
人參 乾葛各三兩 白朮 茯苓 甘草 淨細辛 桔梗炒各一兩 柴胡 升麻各三分
吹咀每三錢水半盞姜葱煎

和劑小柴胡湯治潮熱往來半表半裏脈未愈有裏實證用大柴胡湯或清涼飲洗...
海寮五物湯治感寒多嗽痰涎喘急或素有喘嗽感寒而作和劑華蓋散簡易丸...
和劑人參敗毒散傷寒頭痛壯熱惡寒及風痰咳嗽或心經蘊熱口苦乾燥加黃...

人參羌活散散風邪欲傳急驚風熱方見急驚門

升麻葛根湯黃芩湯加黃芩治傷寒可汗方見活人

錢氏地骨皮散治傷寒壯熱及虛熱潮作方見前諸散
和劑不換金止氣散治傷寒瘟疫發熱或吐瀉下痢

入參養胃湯治感風寒傷生冷憎寒壯熱如瘧或夾食停痰
湯氏加減建中湯治傷寒發熱自汗虛煩

和劑天麻防風元鷲風壯熱及夾鷲傷寒
黃芪二兩白芍藥三兩甘草炙八分熟地黃湯各半兩以咀每服二錢水煎

姜蚕炒全蝎去毒炒天麻根防風人參各二兩朱砂雄黃射香各二錢
牛黃一錢研甘草炙二錢半為末蜜元梧子大每三元薄荷湯化下

湯氏抱龍元痰嗽驚風時作潮熱氣粗及傷寒夾鷲或中暑浴後
牛膽南星二兩天竺黃半兩雄黃辰砂各一分另研射香一錢另研

為末蜜元如芡實大甘草薄荷湯化下
解肌湯治傷寒發熱煩躁渴
麻黃去節半兩冬用三分人參川芎芍藥各半兩前胡一分獨活半兩

以咀每二錢水半盞姜一片薄荷一葉煎服
小兒初生百日內咳嗽肺葉脆弱最為難治平常冷熱邪入肺無能得出又不堪
吐利必明病源消解風寒化痰順氣益肺生胃胃開氣壯嗽即漸減不可強攻
冷嗽則鼻流清涕面白痰薄日輕夜重或微有邪熱熱嗽則面微紅鼻乾熱痰稠

卷六

廿二

脉孩數有胃嗽不因風寒而得以免啼使乳壅結心脾不散即嗽而遲以珍珠元下之
百部元治小兒感寒咳嗽

百部焙乾麻黃去節各一分杏仁四十个去皮尖微炒另研
為末蜜元芡實大熟水化下方加松子肉五十粒同杏仁入砂糖元噙化妙

錢氏麻黃湯治傷風發熱咳嗽喘急
麻黃去節寸剉三錢水煎肉桂去皮一錢甘草一錢杏仁去皮尖炒黃

噉每錢水一盞煎服有汗不可服
瀉肺散治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮炒地骨皮各一兩甘草炒五錢為末每錢水盞粳米同煎食後
補肺散治肺氣不足咳嗽喘急

阿膠炒二兩半牛蒡子甘草各一錢半馬兜零五錢杏仁七个去皮尖
糯米一兩為末每二錢水煎食後

和劑金沸草散三拗湯葶散潤肺散治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕
瀉山大效人參枳實湯治小兒傷寒後氣不和咳嗽胃膈痞塞日夜煩悶神困不食

治虛痰煩滿頭目昏暈但是傷風感冷咳嗽等症用不閉肺虛實可汗可溫可下要藥也
枳實棗仁米泔浸去穢麩炒桑白皮北夏泡洗姜浸甘草炙赤茯苓款冬花
五味子阿膠麩炒淨細辛各半兩金匱分麻黃去節苦梗各半兩

噉每二錢水盞姜三小片棗半个心梅少許煎至半服仍以蓋合藥氣餘服

蘇子散治喘嗽有痰氣急肺動

甜葶藶半兩炒麻黃一分香即甘草貝母杏仁去皮各之錢
為末三歲之錢水煎

〔南湯元治〕凡咳嗽痰涎不通氣急或痰壅成塊宜壯實小兒熱嗽而之吐涎久喘者
銅青末一錢皂用末大末末為末調以水三歲上元肥猪湯下

漢山議時氣咳嗽者天時冷熱不調此虛得之日夜不止或吐或喘痰壅盛至重者利之用
大黃朴消枳實陳皮人參半夏柴胡等以有胃腸煩悶不快宜服無熱去痰亦不可下
〔雜青〕治小兒涎鳴喘急服藥不退者氣實兒可用

只無雜雞子一个取清入輕粉抄拾錢拌和銀器盛湯瓶上頓熟三歲尺食當吐
痰或瀉即差喘或咳有痰可吐如嘔多則可下之用珍珠元等

〔蘇子散治嗽〕上氣因乳哺或風冷傷肺或喘氣未定強乳氣逆不下
紫蘇子訶子炮肉羅蔔子杏仁炒木香人參各三兩青皮甘草炒各半兩
為末三歲之錢水半盞姜三片煎

〔直指紫死湯治喘嗽〕紫死苜貝母真蘇子微炒杏仁去皮煨黃北梗淨陳皮
麻黃去節半夏麩赤茯苓桑白皮炒甘草炙各等分

判細每之錢姜三片紫蘇三葉連嫩梗佳水煎

〔漢山效雄朱化痰定喘元治〕因驚發喘逆觸肺暴急張口虛煩神困
雄黃朱砂各一錢研蠐退全蝎炒地龍淨洗姜蚕南星白附炮各一分

卷六

卅三

輕粉半錢重為末糊元麻子太每三瓦薄何本清食後下

〔雄黃丹治〕胸膈喘痛咳嗽等症傷風觸毒一歲兒五元壯者七元二歲十元

雄黃朱砂各之錢另研杏仁拾四粒炒巴豆七粒豉淡者一拾之粒

五味用米醋半盞乾姜之片指大者各乾研為膏皂用一寸蜜炙後先去子
及皮弦法製牛膝南星之分同雄朱香膏研細加糊元麻子天淡姜湯送下

○諸瘡證治

瘡之論見於餘方傷寒雜病之瘡詳矣小兒瘡證之切有五。傷寒瘡則有傷寒證見
大小便堅赤。食瘡必腹脹眼臉厚壯熱足冷脈擊手紋紫亦先表解調脾而後
下。脾虛生痰其發必有痰證脾脈弱四肢或浮或沉表解中加痰藥。脾寒發瘡
則面色青黃四肢冷大小便或自利亦可養胃湯表之。感暑瘡背寒面垢煩渴小
便赤大便或堅香葛散表後五苓散分之

表解先用二香散蘇葛散 傷寒白晝散紫胡湯食瘡養胃湯後用紫霜元脾虛
用草菓飲四散飲脾寒理中湯加附子草菓半夏茯苓香散香席散五苓散方並見前
張氏草菓飲治發瘡寒多熱少或逆身浮腫

厚朴姜制淨青皮草菓 薑香甘草炙丁皮神曲炒良姜半夏曲各等分
吹咀每錢水半盞姜三片菓一个煎一方加實即紫蔬

〔金果羅瘡散治〕一切瘡紫蘇白芷各半兩草菓淨一兩制半夏一兩陳皮
白茯苓甘草前胡各半兩略姜早占烏梅煎甚效

三因清肺湯因食傷脾胃滯痰飲痰為熱
並見前錄卷癯

濟生清肺湯傷寒或熱多寒少白苔咽乾小便赤澀
知母前胡半夏

保嬰常山飲治一切癰人參常山茯苓草菓
制厚朴甘草等分咀姜早煎脾虛氣弱常山作吐須審

嘔吐證治 鄭氏吞吐不瀉為逆吐而有痰發驚者危治之當斷乳為稀粥
水射吐者吐有物嘔者開口而作逆者心胃上下氣逆鬱築噦者無物可出皆緊

切之證慢驚皆此而作又須詳其冷熱虛痰食傷所因。胃寒即似氣吐面青唇
白清涎夾吐。熱吐即似驚吐有黃涎夾乳食乳成片頭額溫五志熱小便赤少

或乾噦無物夏秋間多有此證。虛吐肌弱神困不思乳食生胃氣藥。痰吐
即風攤吐咳嗽氣急或表熱。傷乳食吐即積滯吐吐作霍氣肚熱。虫吐面白

焦唇紅或紫或昏困不省人事時吐又當於驚風內吊虫痛及疳積門求之
四君子湯參苓白朮散正氣散以正胃氣。陳湯青州白朮子兼佐以化痰理中湯

吞金液丹治冷吐大黃龍元治中暑吐並見前和劑諸方
演山全蝎散因吐後欲傳慢驚方見前慢驚門

八白散治脾虛胃弱瀉有風痰水谷不化悉此噦噦體羸氣乏飲食不化霍亂吐利
白散治脾虛胃弱瀉有風痰水谷不化悉此噦噦體羸氣乏飲食不化霍亂吐利

會虛中脫不和神情恍惚
沉香藿香人參草菓乾姜炮半夏麩白芍實即白豆蔻仁白茯苓

白朮扁豆炒白芷等分末瀉後復吐或後復瀉每錢姜菓煎服無時
調中正氣散治胃熱傷冷證治湯便同上方加木香

霍香白朮人參白茯苓甘草炙淨陳皮山藥扁豆制半夏乾薑炮
豆蔻散治虛吐飲食間便作嘔逆此由脾寒或現無時吐後暈悶胃脘氣逆

肉豆蔻一個煨瀉加木香丁香白朮白茯苓甘草各一錢 霍香葉一錢
為末煎霍香菓于湯調一錢生姜湯亦可

香朴元治食傷瀉冷逆不升降嘔吐不止胃膈留停積滯不化
霍香葉厚朴姜制淨陳皮半夏麩白朮白茯苓各一分 甘草炙二錢

乾姜一錢 三稜炮二錢 為末蜜元指大每元姜菓煎湯化下
半丁元治風壅痰吐 制半夏半兩丁香一錢 為末姜汁元麻子大生姜湯下

湯氏助胃骨治冷氣入胃嘔吐不已 人參 白朮丁香白茯苓 甘草 淨陳皮
霍香各半兩 白豆蔻仁四分木香三錢 山藥一兩砂仁四分肉豆蔻四分

為末煉蜜元元姜實大米湯化下
全嬰清膈飲治伏暑嘔吐 香薷淡以菓各一兩人參白茯苓半夏曲 甘草

檀香 粳米各半兩以咀姜菓煎
和劑枇杷葉散胃暑引飲過度脾胃傷冷飲食不化嘔噦惡心乾煩熱方見前
保嬰異效元消暑生津止吐治渴五苓散加入參米砂如肉桂分兩蜜元
神效治瀉不止痰涎驚風神室既濟丹疔瀉或包作風候二方見後錄門

傷寒吐瀉前發方傷寒嘔吐問求之

鄭氏黃龍元治中暑吐瀉胃悶煩渴身熱有痰即消暑元

半夏四兩醋半升煮乾白茯苓甘草各二兩為末姜汁糊元姜灯心湯下

甘露散治中暑昏迷煩渴不止躁体熱伏熱吐瀉

寒水石煨石膏煨各一兩甘草半兩炒為末湯調入生薑汁少許

陰陽元伏熱吐瀉并諸般吐逆不定

玩黃半兩水銀一錢同研無星如黑煤色姜汁糊元小豆三歲三元冷水下

○泄瀉證治一通見嘔吐門

瀉之證有五者不同瀉泄利洞也瀉者糟粕不聚似瀉非瀉泄者無時而作或不聚

利者直射瀉瀉氣從中脫濟者水谷直過腸胃不化洞者頓然下如桶散瀉不聚

皆脾胃之不調也。熱瀉大便必黃赤或有沫糞射出表走用五苓散分其水谷却平

胃氣。脾虛受冷面青唇白眼輪黑糞或青或白手足冷不溫調其脾必傳後驚。

疝瀉瀉糞臭如腐雞子腹膨時或一瀉手紋紫身熱体實可下之却調胃。傷食瀉瀉

肚痛似蒸瀉糞臭此瀉補不止宜下却補脾若体弱用消積脾察却峻取峻瀉

○瀉瀉糞青夜啼或時驚悸冬冬白泉瀉瀉湯加茯苓神連肉

湯氏訶子湯治瀉寒瀉瀉 訶子炮肉人參 白茯苓白朮各二兩木香炮

半陳皮甘草炙肉豆蔻炮各半兩為末姜煎寒其加附子

六神元治疝瀉肚瀉并聚瀉 肉豆蔻木香炮二兩丁香 訶子肉炮各半兩

卷六

北五

史君子肉二錢半 蘆薈會分半另研為末米飲元聚瀉不止須紫霜元推之

錢氏益黃散治脾胃虛寒嘔吐泄瀉腹痛并治涎唾流頰下常濕多滯頤

丁香巴錢半陳皮二兩甘草炙訶子炮肉半兩青皮各二兩

為不水前食前服直指加木香半兩一方加肉豆蔻香青皮

和劑觀音散小兒感風冷傷脾胃瀉不食一方加 麥蘗香附子各炒二錢

石蓮肉炒去心一分白茯苓一錢半人參一兩白朮木香炮黃芪甘草炙

每豆炒黃牛皮各一錢神麴炒二錢為末每一錢水半盞棗一個麝香二葉

和劑四柱散小兒元臟氣虛泄瀉不止

幼幼方香朴飲主治伏暑吐瀉瀉瀉煩悶亂如發驚狀

人參茯苓甘草紫蘇葉木瓜澤瀉香薷半夏麴 半陳皮扁豆炒

烏梅肉制厚朴各二錢為末每服二錢姜棗煎服

鄭氏消食元治吐瀉傷食腹急可食亦治瀉痢

丁皮砂仁甘草甘松 莪朮 益智仁各二兩 半香附子二兩

為末糊元小豆大粒煎米湯下方加神曲麥蘗

和胃元吐瀉有痰不思飲食困頓致生風

丁香 霍香葉 蝎尾各一錢 白朮切焙 制半夏各二兩

為末姜汁糊元小豆大三歲三元姜湯空下

和劑感應元脾虛累有鼻傷糞白腥臭水谷不分肚腹脹急進退不定方見前

白龍元治瀉瀉不定滑泄注水小便少一方加白昇火

附子炮半兩白石脂煨白龍骨煨一分為末糊元小豆大三歲三錢米飲下

附苓元治瀉洩小便不利即如五苓散加附子

附子炮半兩白茯苓澤瀉滑石各三錢為末糊元小豆大三歲五元燈管

平疏元治洩瀉注下或手足冷者亦治冷嗽

制半夏硫黃各二兩一方加全蠍白附各半兩其妙演加枯白片兩並

為末姜汁糊元小豆大三歲三十元米湯下

人參膏吐瀉脾虛困倦不食腹痛而滿

人參訶子炮肉木香肉豆蔻煨丁香霍香砂仁甘草炙各一錢

為末蜜元雞頭大三歲一元白湯化下空腹滿加沉香

人參散瀉瀉苦寒津液煩渴心躁可食

人參白朮茯苓山藥扁豆炒乾葛霍香丁香甘草炙訶子炮肉各一分

為末三歲一錢水半盞姜三片煎空

醒脾散治瀉脾虛多困不乳欲生風候和劑消風散最治瀉生風多困加

人參白朮白茯苓山藥扁豆白附姜蚕霍香甘草升麻酸早仁

修製為末三歲一錢冬小字三七粒水半盞煎服

保嬰一頁散治瀉初作

杏仁去皮大朱苓澤瀉赤茯苓白朮甘草乾葛

卷六一

北六

人參黃芪散治脾虛冷瀉并疝瀉 人參黃芪白朮白茯苓甘草木香

胡黃連各二分白豆蔻一錢半肉豆蔻二不史厚五不乾姜五錢

演山議論自利有水谷不分者腸胃怯弱者臟腑不和者冷熱相制陰陽不和者

瀉者皆由氣虛得之必平利調須先生其胃氣以養之白朮散加車前

同煎分利緊脾更量加減虛實

不附湯治臟腑虛寒瀉瀉洞利手足厥冷

附子半個炮白朮一分乾姜一錢炮甘草炙一錢噓水煎服手足暖止後服

神勝散治腸胃虛寒久冷洩瀉夏月其瀉尤宜

真鉛粉半兩炒白石脂一錢白凡枯一錢白龍骨一錢

為末每服半錢已大者一錢飯飲調下薄糊作小元亦可

直指沒石子元治疝瀉及熱瀉

白沒石子一個白豆蔻仁五個訶子煨二個取肉木香黃連各一錢

為末粳米糊元格子大每十五元米飲下

震靈丹治小兒腎泄面黧黑齒消脘力弱小腹痛泄多白膿

每用三元為末入鍾乳粉半錢以炒破故紙一錢半生肉豆蔻一錢棄下煎

清汁乘熱調空心服

瀉瀉諸方並見疝疝精門

瀉瀉方六和湯心脾不調嘔吐泄瀉霍亂寒熱交作小便赤澀

腹中澀澀臟腑停寒泄瀉不止

胃苓湯治感暑熱食泄瀉煩渴一藥相半水煎入棗少許末藥單煎湯下

來復丹治伏暑泄瀉

演山曰議云凡泄瀉除非瀉為虛熱瀉餘皆臟腑虛寒法弱得之而有前症者之不同耳凡泄瀉山青色者脾已主受邪之不克勝而山青者由其臟之虛寒亦可填謂風木之驚也又瀉初黃良之亦青乃臟寒之過又瀉藥物自過尤為寒滑生而溫臟調胃不然即傳慢驚又不可以熱藥相投若投熱藥瀉止即作痢或為傷瀉先投豬腸菜却為生胃正氣其虛寒之極四肢厥冷方可施附子干姜等藥

○八痢證治

熱赤

冷白

冷熱相赤白 食酸臭 驚青

脾虛不化

時行有血

痢即膿瀉

八痢有冷熱之分餘證皆同

痢皆由小兒脾胃腐弱不能消化飲食停積于臟又因冷熱時行之氣乘虛客於腸胃而成若熱乘於血滲入腸胃則赤冷氣陰濕搏於腸胃津液凝則白冷熱相交則赤白相雜其則膿與脫肛下如豆汁或熱渴引飲四肢浮腫而喘或積積傷下致虛未可尋補則傷熱或重傷胃氣全不飲食名曰禁口不食至死又食毒母之氣侵於肺胃大見腸頭鮮血頻滴則實大深黑可畏腹痛裏急後重名曰刮腸日夜頻併飲食自過名曰滑腸皆為惡候又有痢後作熱或止瀉後或疳瀉皆同虛熱主治均用寒涼藥並可先與禁却食毒生胃調氣而已痢者利也並當戒緊凝滯藥如水之去濁求清切詳輕重

卷六一

北七

傷寒雜病論痢之證當通者察可通用但分劑小耳今拜舉諸脈之未備者通補之

尖或緊或大為未止可下數瀉有宿食急下之若腹堅熱或諸語不味暴更下之脈散或弱

自愈況該者裏急後重小而浮弦者血氣上結骨發熱不已中瀉數必清膿出血

和劑蘇感元前毒公散噤口散毒胎胎陳倉茶草煎三黃湯加制殼並治熱痢

小柴湯黃連香薷散治中暑毒痢疔氣散暑毒胃瀉下香連元治冷痢

正氣散和黃連香薷散名香散或除濕湯或散治濕痢或霜元治積痢

四君子湯加連肉豆蔻香連元正胃氣消痢毒通瀉胃風瀉瀉風冷乘虛濕瀉下如豆汁

真人養臟湯冷熱不調下痢赤白諸餘他證諸方通見前傷寒雜病痢門輕重通治

幼幼方木香元治下痢赤白 黃連一兩同是朱砂炒去更不用 肉豆蔻兩個木香一分研

同用麩煨為末糊元蒸米大芥一劑粟米飲下白痢制厚朴湯下下如羅參半兩

湯氏雞螺元治休息痢及疳瀉日久不能安者一見前預積門六神元方下

錢氏赤石脂散治因瀉痢後肛門不收

真赤石脂剉末土伏龍肝各等分為末每半錢傳腸頭上頻用

演山生熟飲子治虛積痢腹肚疔痛裏急後重日夜無度分生熟者平治冷熱也

墨粟殼制令內辦淨盡半炙 淨陳皮二片半炙 甘草二十半炙

烏梅二半燥 流東二半燥 生薑二塊指大半燥 木香一錢碎兩片半燥

訶子二大者半炮黑豆六拾粒半炒 黃芪二十半炙 白朮二塊指大半燥

當歸半寸半燥 右件各半生半熟以乳安服三錢水小盞煎內莫去半

健胃與服至多勿慮所有毒黑豆不要打破只同空高煎效

神效雞青元治小兒一切痢疾木香三錢土黃連一分子肉豆寇一个生

三味作粗末以雞子青搜和作餅炙黃令交紅色乾研為末糊元麻子大每透死飯湯下
天葵聖手金飲子小兒脾積虛痢便下五色先由嘔吐復作泄瀉臍腹疔痛肋脇脹滿
受濕虛鳴膿血相雜下如豆汁赤白夜無度

黃芪蜜炙甘草炙 寧陳皮 梔子炮肉 黃連
制枳殼 黑豆炒 烏梅 泊棗 白木 訶子炮肉 黃連
等分咬咀每服二錢水小盞煎至半溫服

天艾煎元治虛痢依渴不止 大艾葉燒灰乾粉葛 胡粉炒 海螵蛸 龍齒
等分作末煉蜜元雞頭大每元元至三元飲飲糜

豆寇散小兒腸胃虛弱糟粕不聚瀉痢不赤白公抗不調日夜頻併愈而又發
肉豆寇一个煨胡粉即龍定光粉也二錢 龍骨生一錢 白九枯一錢
為末每二錢溫飯飲調服不拘時或煮糊元麻子大五六十元治秋間白痢至效
香脯治小兒刮腸下痢禁食不食閉眼合口至重者
品猪肉一两薄批作一片批粉半錢重

右將肉炭火慢炙旋鋪膩粉各一分令成脯每少許與喫如未知喫且放鼻頭
自然食喫治胃口有毒至奇至妙一方烏骨雞修事鼻鼻清汗與服胃開利大便
鄭氏小連元治瀉痢赤白脾胃虛弱糟粕不聚腹脹可食時陣作痛煩渴身熱

卷廿一

黃連三兩乾姜炮一分當歸 阿膠炒為末醋煎成膏各一两半

右三味為末以膠膏為元如小豆大三歲至十元米湯空心下即駐車元

石連散小兒下痢并驚食食以石連肉共炒為末三歲半錢米湯下

桃花元治赤白痢腹痛可食赤石脂乾姜炮等分為末糊元小豆大米湯下

下痢日久急治下部生虫惡肉爛見五藏者死燒艾以管熏肛門金煙加少雄黃尤佳

直指返石子元治疳痢或大便不通方見前泄瀉

秘傳香連元治疳痢大小兒通用良方痢初作先服解散藥便先服此

南木香二兩宣連四兩生薑四兩 右各剉元鋪生艾瓦石鍋底火鋪黃連姜土又

鋪木香在黃連上煎升水三椀煎乾不可攪動候乾取出焙為末醋調陳倉米粉糊

糊元梧子二每七元空陳倉米飲下赤白痢則魚下艾姜元和服

艾姜元治白痢陳北艾葉兩乾姜二兩炮 米醋煮陳倉米糊為元如前法三方神效

首見大全方神斷下元分治大人小兒赤白痢

淨黃連三斤 南木香三斤 右三味大剉田水一斗銀石器內覆乾分焙作三處。只用

黃連為末神麩打糊元各黃連斷下元專治赤痢口只用木香為末神麩糊元各木香斷

下元專治白痢。以木香黃連等分為末神麩糊元各香連斷下元專治赤白痢

大人元梧子大每七元小兒元系米大每五元 煮粥飲下陳倉米湯更佳

六神元治赤白痢 黃連二兩木香 水芽炒 枳實炒 亦茯苓各二兩

細米神麩二兩半打糊元系米大每五元元陳米湯下

善指取和劑升麻葛根湯不感應元治傷者用纏痛亦可下黃連阿膠湯
和劑流氣飲治諸氣痢

姜茶散生薑能助陽茶能助陰以老艾切如豆大與茶等分同井水煎不問赤白痢先煎
阿膠元百粒同艾味道大腸之藥蜜尤治痢。又熱痢以白芍黃芩茶
水各半煎冷痢生薑汁以水各半以木香豆蔻

又方治氣痢血痢黃芪甘草水通車前子炒淨皮淨青皮炒制厚朴
畢葉壳醋炒水煎空心住痛加赤芍白芍制枳壳烏梅

保嬰文葉湯治冷痢肚痛 陳艾葉炒 當歸各乙兩干姜木香 制厚朴肉豆蔻
各半兩為末粟米煎服

便血證治

演山議見生之日之內大便有血出者由胎氣熱盛或母食酒麵多滯醃流念胎兒在腹受
之熱毒亦傳心肺且子之臟其熱即念故小便有之男子之臟其熱即入於肺故大便有之或
坏水或血加鮮又不可謂熱過服涼劑其血愈甚只以生地黃根取研自然汁五七匙酒二匙蜜
匙和勻溫與服移刻安愈或和刺其露飲魚肝男女同

保嬰花散刺芥穗花制枳壳甘草為末蜜湯調治熱便血

胃風湯秋青煎治久新冷便血一方茶若葉或椽子合白梅各燒灰存性米湯下
鄭氏五倍元治遠大便下血如腸風臟毒以五倍子焙為末蜜元小豆米湯化下

卷廿一

腫脹證治 經云諸有水且必微腫又頭面腫曰風脚腫曰水

腫脹二証皆由臟腑怯弱榮衛不順三焦滯滯表裏俱虛三中有積久患失治胃虛不化
化水氣滲泄經絡脾得之氣溢皮膚而腫入臟而為脹最為要急當明其因

受濕腫脾胃受濕水不化氣浮四肢面目皆腫此由脾虛止調胃補脾然後去腫元氣
衰中湯元。傷寒下之平乘虛入腹作腫理中湯加枳實作喘加淡豆豉。食毒傷脾
必積致腫神功救急丹。瀉痢久脾氣虛致腫先正氣調胃却用秘製丹。氣虛腫

石氣蠱。血虛腫亦名血蠱。榮衛俱虛腫亦名血氣蠱先服榮衛飲以分氣飲
已上七証先明所因却用榮衛飲子分氣飲子至穩若是水腫或受濕以利

便為尚切不可利動大腑蓋腫脹已由脾虛奉之愈見脾弱常服和劑觀音散
消疔積氣脹積為疔母虛氣傳受皆漸所致為脹不可重與通利尤加重低

消疔調氣宜得元子常服以泄其氣故也虛氣散而不傷真氣也
由痞癥積氣脹血脾胃不和陰陽交錯冷熱相制皆積所致或寒熱如瘧或下後

不退反加重又作腫脹先與梨漿飲竭氣元然後用扶積之劑。鎖肚脹急由初生
不感觸客忤撮口不乳肚脹青筋精神氣色未變速用紫霜元纔通即安吻乳氣

宜服真珠六麻元不見前積滯急驚風。上膈中脘脹在膈停結在腕痞悶由食傷
脾不化遂成毒滿不與消利必作疔証紫霜元清積元等上膈脾脹真天藥連元

疔重此証與胎氣必積虛積相似但腹肚緊脹天明吐津沫噎塞而則少安即為
疔重則多噎噎飲食不下疔重則肚緊不吊痛冷積則脹聚兩脇攻刺若內積

疔重則多噎噎飲食不下疔重則肚緊不吊痛冷積則脹聚兩脇攻刺若內積

本草元蘇蘇各宜消癰調胃却非其積宜乘沉香煎元芳見前內吊虫痛此藥為獨
服之藥其轉動並宜服比真珠元取積不同只恐不得通利逐虛存實和脾胃長利也
黃芪蜜炙等分細末每分已水小盞煎至半無時服

分氣飲子調理腫脹作喘氣短促急坐臥不任四肢浮腫飲食吐逆神困喜睡
五味子 桔梗 白茯苓 甘草 炙 淨陳皮 桑白皮 草薢仁 大茯苓 白朮 當歸
制枳壳 紫蘇 蘇子 半夏曲

等分少咀每二分已水盞煎至半服兼六味理中元煎服
天效神功救生丹治氣壅喘息四肢浮腫腹肚脹急冲滿脇肋乍寒乍熱或瀉或秘
雄黃另研 朱砂各二分另研 巴豆 二乙粒去壳 乾姜二分

以米醋乙盞以巴姜煮令乾去姜將巴豆油和雄朱雪糕為元麻子大乙歲三元並
用酒浸赤芍藥以少許送下譚氏以治無辜疳証至效能推去惡毒之氣

福元子方見積滯門直指方以此煎紫霜元大治疳脹
大棗連元子飯食過度胸膈膨脹滯滯迷悶喘渴煩躁肢倦急腹脇疼痛
莪朮 三稜 各二分醋煮乾姜炮 制青皮 淨陳皮 巴豆 二十乙粒去殼心膜出油

木香 丁香 各二分 綠細菜 更二分
為末醋糊元麻子大每七元至十元大者加服姜棗湯下

卷廿一

示沉香煎元見前虫痛門

下虫元治蛔虫亦名食虫苗虫亦名疳虫亦名血虫

霍亂吐之方 光粉炒三分 苦練根皮酒煮三分 膩粉三分 已史考子乙更炒
寶印乙分生 綠色貫眾子半如西日株方驗 龍牙根 龍膽根 各二分
細末糊元麻子大每三五十元空甘草湯下或猪羹清汁下尤佳仍以調胃散下

湯氏退腫氣塌元

御院勻氣散治脾肺喘嗽面浮二方見前諸疳門

鄭氏方引千金云後腰以下腫當利大便腰以上腫當發汗愈

三物湯有患氣急積久不差遂成水病攻面目身從腰以上腫發汗而愈
麻黃去節四兩 甘草乙兩 以咀三歲乙分水半盞煎服
狂癲散仲景云大病差後腰以下有水氣者宜服

牡蛎散 澤瀉 蜀漆洗炒 商陸 葶藶 海藻 枳椇根 各等分
為末三歲乙分燈心湯調小便利止
牽牛散 示兒勝脫 實熱腹脹小便赤澀水氣流腫又治結膏傷寒心腹硬痛又治
疳氣攻腎耳聾 右用牽牛生為末三歲乙分青皮湯下空 結膏傷寒白瘡爛

下耳聾陰腫用猪腰子半个薄批葱藥乙大分重令遍仍以少鹽擦之濕紙煨熟
空服又治風疹遍身薄荷蜜湯下大便利立效陰疝核腫糊元小豆大面香湯下

商陸散治浮腫肚脹氣急利小便 澤瀉 商陸 等分

為末三歲之錢紫白皮湯調下商陸龍心為末調塗腫毒醋調并治

五皮散治諸般浮腫氣急可食桑白皮大皮扶本皮姜皮半陳皮等分咬咀三歲之錢紫蘇葉皮水煎服

牽牛先治疳氣頭面浮腫小腫常服自消黑牽牛白牽牛各半半炒取末青皮陳皮等分為末糊元三歲元米湯下

失肚元小兒疳氣腹脹喘粗或腸鳴洩瀉乾姜木香各兩巴豆七粒米醋同味煮乾去豆肉豆冠半兩

為末醋糊元小豆三歲元米湯下空常服消脹木香上用之分去肉豆冠

塌氣元治疳氣腹脹喘急面目浮腫丁香胡椒炒各一分蘿蔔子炒白牽牛生各二分為末糊元小豆三歲元米湯下

塌氣散治腹脹氣粗疳食以面目浮腫木香一分半青心半兩巴豆三粒同炒豆黃色去巴為末三歲半錢米湯調

宣氣元治疳氣腹脹喘急可食木香炮二分黑牽牛生半兩為末糊元小豆三歲元米湯下

宣氣散治腹急氣粗疳風腫氣腫通身腫及疳豆盛出身熱煩渴腹脹泄瀉大小便澀面青悶亂又治久瀉不退脾虛生風止與服後補之

木香一分蜜即淨陳皮甘草各半兩黑牽牛二兩半生半炒炒咀水煎二錢

寬腹元疳氣腹脹不思飲食或面腫者牽牛蘿蔔子半陳皮青皮木香炮各一兩蜜即紫蘇子木瓜各半兩

五疳散治脾虛四肢浮腫五皮散疳疔平胃散疳疔和煎或湯或散皆可

秘方治浮腫緊脾取水甘遂青皮陳皮各一兩蜜即乙不生為末紫蘇木瓜湯點下忌服甘草及甘遂也

丹之多有十六種究其因熱毒與血相搏而屬小之有赤腫而遊走遍体者入腹會則殺入矣亦由乳母酒麵煎炙過度或與兒烘衣未冷即着所致

和劑犀角消毒飲或入參羌活散次用生料四物湯犀角消毒飲打和煎

如戒四物湯生乾地黃赤芍川芎當歸防風各等分黃芩減半咀咀水煎

直指方桔梗天花粉乾葛升麻川芎赤芍獨活柴胡甘草等分咀咀姜煎

截風散治遊赤丹毒如榴自而或自下而上至腹必死初發急以此藥截之

寒水石白芷等分為末醋調或生自然汁亦佳調貼患處一方角白去白芷一方青黛末朱并水入蜜研傳

黃丹朴消各一錢重赤小豆兩頭齊者為末半合井水調以雞子刷

○盜汗

小兒盜汗由食食熱水傷脾者為水傷不能制其津液故成汗自出汗者意之液也或虛驚恐血不余汗先當收斂心氣

圓參湯收斂心氣 羅參 當歸各三錢 一方加黃芪

用雄雞心之小柞三斤每服二錢猪心三斤水煎畢前食前兩次服

一方人參乙兩黃芪三兩甘草半兩

一方羅參 白朮 白茯苓 黃芪 當歸 甘草等分 咀姜三斤加姜煎

一方白朮乙分小麥乙撮水煎乾去麥心白朮為末煎黃芪湯調

○鼻衄證治

血熱不循經絡從鼻出無阻其氣肺主氣外屬鼻故衄也

春夏月坐地黃研取汁入生蒲黃少許沙糖井水浸服

秋夏月用單前草洗研取汁更取姜汁同炙蜜乙匙打和先以澤塞鼻次以

泔水澆汁飲之仍服地黃湯若傷寒證亦柴胡湯煎入生地黄汁服最妙

地黃湯 川芎 生地黄 赤芍 當歸 咀水煎入蒲黃少許散煎溫服

小兒頭縫開解不合腎主髓腦為髓海氣實則合虛則開此泥丸 元氣升降

少如不與根不能十日或得數歲終成廢人須服補理

錢氏地黃元 大熟地黃洗焙四錢 以菜更肉 以藥各二錢 澤瀉二錢 丹皮

卷一

四二

各二錢半為

一錢半為

白芍為

三三

一方細辛 辣桂 生乾姜 等分為 茸 牛膝 虎脰骨 旱子肉 桂 防風 當歸 各一錢 以五家皮浸酒

○脾

脾主肌肉 飽不常或寒或熱乘於脾胃藏府之氣冲故填而脹顛突而高物

堆填汗出毛髮黃短是也若寒氣冲則半鞞 熱氣冲則柔軟 服地黃元

封顛散 蛇退乙兩燒交存性 防風半兩 大黃半兩 性白及

為末生姜汁調傳 或肝盛風熱交攻亦有此證

顛腫為熱必黃柏膏塗足心湧泉穴陷則為公以乙夏末塗手心妙

○滯顛證治

涎者脾之液脾胃虛冷故涎液自流不能收約而清於顛間也法當溫脾

溫脾散 半夏 麩丁 香木香 各兩 乾姜 炮一錢 白朮 炮 白茯苓 人參 粉草 炙

各半兩 為末米飲調勻 方理中元亦妙 一方用東行牛尾 拭其口用

○行是證治

張漢方名溫脾丹 与上散同去人參 茯苓 甘草 青皮 或陳皮 三錢 碎糊元黍米大

則補... 改軟弱不能行治法當用黃元加鹿茸五皮射香... 虎骨酒... 赤生乾地黃... 牛膝為末蜜元... 牛膝為末蜜元... 牛膝為末蜜元...

語遲證治

意者也小兒胎中母卒有驚怖邪氣乘心故兒感受母氣心官未守古本不通四五歲語者當蒲元人參石菖蒲麥門冬志遠志肉桂炒川芎當歸各二分滴乳朱砂各分列研為末煉蜜元... 大食后溫水...

一 方石菖蒲二兩丹參赤石脂各一分天門冬麥門冬各志半兩蜜元。大食后溫水... 髮遲證治 小兒血氣不足不能於髮故生遲或呼為疳非也

一 香薷煎陳香薷式兩猪脂半兩水盞煎香薷取汁二分入猪脂和勻塗頭上... 又椒葉搗汁傅即生又燒鯽魚灰醬汁調仍服煎地黃元佳

一 鶴節證治小兒稟受不足腎虛髓竭膝如雀節地黃元加鹿茸牛膝與服... 龜背龜骨

兒未能護背客風入脊或坐草偃倭背高放龜於荷葉上俟龜頭四顧急以鏡照之其來自出此謂紅內消點其背脊骨節積久自安有灸肺俞穴第三椎骨下兩旁各子半膈俞穴第二椎骨下兩旁各子半以兒中指中節為子灸炷小麥三五壯... 萬骨乃肺受熱氣脹滿... 龜背散大黃三分炒天門冬志遠焙百合杏仁去皮尖炒木通桑白皮蜜炙

卷廿

甜葶藶隔紙炒朴消制枳殼等分為末蜜元食后溫湯化下

林澄 小兒諸淋并小便出血陰莖中痛

右以桃膠一塊如棗大小半盞煎三分服下右子如豆者及止... 一法炒鹽帛包熨臍腹加生葱入少更佳一方琥珀為末燈心湯... 調高

鄭氏治小兒小便淋瀝不通... 為末三歲乙分燈心木通湯調下冬小最治小便不通并渴

五符水散治小便不通莖中淋痛心躁煩渴... 滑石乙兩甘草二分炙為末三歲乙分燈心湯下

和劑二白散小兒膀胱熱風濕相搏陰囊腫脹大小便不利... 牽牛二兩桑白皮白木木通去節... 陳皮各半兩為末姜湯和服

廿卷廿廿...

求類金方風損傷折卷二十二

頭目鼻耳

凡腦骨傷碎輕者用羊搏捺平正若皮不破用黑龍散敷貼皮若破

用風流散填塗瘡口用絹帛包不可見風若水沁成破傷風如冰及風入腦成破傷風必發頭疼則敷治急用玉真散貼服

凡腦骨傷碎在破烈可治若傷太陽穴不可治如在髮際頭刺去髮留藥內又看皮破不破依上法藥敷或填若欲洗只可用熱酒洗腫多用爛肉未擦

凡面目傷青黑用熱酒調一黃散貼如黑不散酒調桂末貼作此用茶調貼

凡腦兩角及後枕或兩角有傷可治眼睛傷不致重不碎可治頭頂有損難治凡鼻兩孔傷者自治有血山無妨

凡耳或破或落上脫下脫粘用封日藥封貼却以線對縛住者脫落所向用鴉翎橫夾定却用竹夾子直上橫夾定鴉翎用藥封其耳後

凡脊口喉齒腮傷凡唇用破用藥兩頭封却以帛片看損橫直加封藥於上存貼牽住所刺藥不令開落仍少言語

凡上下腮口唇齒傷或內外橫直皆破有真膿其出光処少言語或齒傷是元安齒住痛并骨在唇下有損不可束縛只捺金止痛用黑龍散敷貼綿片貼縛兩肋骨必

凡割喉者用鴉翎患人頭項以絲線先縫以喉管却縫外喉皮用封血藥或喉被

人打棄了掌推圓之

不治結下食喉管斷以湯与之得入腸可治若並出不可治封以藥用江也厚蚌壳燒存性入赤石脂國丹油調塗消腫散與呂加噶國丹乾擦

育脚頸骨及手肘腕手盤手指骨傷凡碎進頸骨用手中條繩一並繫在枋上垂下來以手中兒縛頸下繫於後腦殺縛接繩頭却以瓦壘一个五六寸高看極

入淺深斟酌高低令患人端正坐於其壘上令伸脚坐定醫用手採捺平上說話不竟以脚一踢二去壘子而在左用手左也撥出在右功右也撥出又一法令患人卧床

以手捺其頭双足踏兩肩即出凡左右兩肩或後腦失落若骨腦之出在前可用布袋腕繫在前如出在后腕

繫手在背後看左出指向右腕右出指向左腕骨即入接在後骨接骨模在醫凡背七被打傷外帶黑單調肉桂末貼肚用黃散血不出內疼痛者乳香

沒藥酒調一黃散貼却下破血藥凡手肘腕骨裂用指指出醫用一盤手肘腕之患令其腕頭筆定醫用手於頸

項有外按入其骨還却用藥敷貼若手腕失落或在上在下用手拽伸却使手捺住方可貼藥夾縛若手肘骨出用圓大筒橫背向醫用足踏之將病手

在筒橫內按入腕內交書貼定平穩用筒縛縛其肘要手掌上若手盤指骨不可

用衣服內水筒手搏按日三或五用夾縛不用補夾凡手骨出回左則醫以右手按骨出右則右按之使指挪動三次凡手与腦骨皆有兩腫前所說可

皆斷不可治凡手足骨斷者中間坐縛可帶紫兩頭放寬氣流通痰又法難若如
截斷却要高通紫帶中間帶寬使血氣聚斷處 手足盤出向內將掌向上醫用手轉拗動
將掌向外用水向折片長此在掌背後向內折片短在掌按向外小指片長在指曲向外
指片短在高置上度縛却貼藥凡兩骨斷者新骨成時骨斷骨尤碎骨
凡手指打碎用油潤滑薄其傷處定有冷流用黃散或黑龍散貼之

胃腸腸湯 凡胃前跌出不得入食處人靠外處立用兩脚踏患之兩脚却以手控其肩掬
起其胸脯其胃自出藥封縛小在內候應變凡胃滿有拳指傷外有腫內有痛外用貼
藥內服化血藥如刀傷可用安骨疔皮合外用貼藥按口內用藥藥

曾身劫斷先用破血藥用黃玉膏貼胃腸傷作不通用生薑耳生薑自然汁和服以
一壯力在後格住自出此也

凡腸穿必病手搭在醫骨背隨其在右折起以熱油潤滑其整之腹却打噴涕一个却用藥白
皮為線打曲對向皮內縫會後用藥合會藥同濟用藥縛定并貼給上并縛若秋久間有
此証先用新五合之藥后用狗仔隻宮取腹足貼藥若口割喉封藥藥台同用若腸上有損骨
大以燈火照之腸中有氣射燈不可治又一法腸出痛起病全用醋煎山豆根汁服已至三口却以
針於病人頸上刺腸自出 凡腸出有黑紫斑及有曲縫痕者乃腸也如有骨重
黃重更更有膿字內出也腸若出不可割如只是骨不得入可割除須詳下說

腰膝脚腿兩腿膝傷 凡腰骨損斷先用麻片放斜頭令患人覆眼以手捍止用三
人拽伸醫以手按頭三時久却用貼藥病人痛身動作一宿至來日患處無痛却可

針方七二

二二

自便左右番轉仍用通貼藥若前後不便听其地湯更用內外性痛神擦乳香散在右
凡腰膝左右跌出者若在左右用脚踏進如跌左內急人盤脚按其肩頭用麻片入雖
太痛時無妨却用貼藥從緩仰用用手擦機入再加貼藥藥藥患處未可會動後
恐或拍腰腿傷全用酒佐通氣藥 凡腰骨從醫上出者用三入捉定應後伸
仍以膝捺送入如在檔內出者則難整凡脚骨傷也難整 凡兩腿左右或打或跌
者多用葱打斷者不用姜葱以手法醫其骨在立於前在下於后掌拽平拽七公分拽五
分整定用貼藥後以杉皮夾縛一時先縛中坐後縛上下外用副夾竹繩若上下有腫
痛毋慮五日方可解外縛約一七方可轉動解外縛未可換藥仍渾用酒服藥

凡脚盤出用人以脚從腿上一踏一擡雙手一擡搖三次却以藥夾
凡脚盤出用人以脚從腿上一踏一擡雙手一擡搖三次却以藥夾

凡膝蓋或左右損斷用手按直用貼藥夾一月若腫痛瀆用針刀去血去毒敷貼用
夾或外膝踝骨元折左右膝盤用脚踏直或針患處却敷貼與往痛藥不得
令冷若膝頭骨跌出用牽合不可大直不可大曲直則不見其骨稜曲亦然可半直

半 以竹箠二住以帛縛之

陰囊陰疔傷 凡陰囊被人扯脫者用會封貼給袋兜縛 凡陰囊外有青腫紫

惡色不用姜汁可用赤芍藥細末入貼換藥內仍加良薑商桂和用菲葉葉貼同藥貼
如無菲葉及葱亦可仍服生散利水道

凡人服骨出進陰疔不可醫用虎膝藥之移患人在上坐坐患人所用手一縛

在肺筋上其脈自全九示近肺陰陰藥等外不用潤燥得歸不食而勝

筋骨 凡斷筋骨先用手尋探傷處整頓其筋如筋方用藥藥方用正副藥用藥
少副用竹片 凡骨斷皮破者不用良姜肉桂上用葱汁調貼或拍在內可用藥

姜葱生油通氣散服如通氣已過只須順氣止齒藥或余血在腹作脹更進前藥藥
後方用損藥仍將病人虛實若骨斷皮不破整其骨先用藥加良姜肉桂在貼

藥內必意姜汁調塗已上皆郡民良教 凡皮破骨出者及接伸不入搗碎皮相近三分
用快剛刀割開豈捺入骨之洞割肉了骨了可以骨之後用黑龍散敷貼若骨斷

處留舊骨用風流散填之若刺破黑龍散敷貼則風流散破者必有血出用葱汁調塗
快便 凡骨碎者本外平正如何入抵骨低者不當損去若骨高骨定損要接伸平用藥

敷貼束縛要平正捺正了曲處要用二曲轉使活外不強 凡敷貼用板子片就板子
上將皮紙或油單紙抹黑龍散在後有損處皮肉有碎骨後來皮肉爛碎骨自生若破斷

處用風流散填塗用線縫合用黑龍散敷貼 凡接伸止要斲斲物年正仍接伸骨近
在骨損處不得前去一節骨上仍接伸相度左右骨有在接者有斜接者擗捺要手法快便

要皮骨相就平正整接亦要相度骨功或用文之二入一上彭氏良教
束縛敷貼換藥 凡束縛夏兩百冬百或四胃縛處用藥水泡洗去日藥不可誇動

損處洗了仍用黑龍散敷縛束縛要木皮浸軟或加綿或紙纏令軟如手拍大片疎
排周圍以三繩三度縛時相度高下遠近使換續氣血相通有收亦有寬說見前三日次

洗換塗貼 凡損大小使通未可便服損藥蓋藥熱加酒澀秘會甚看患人虛實
者下大承氣湯加木通尚未通加芒硝 凡損不可服草藥服之所生之骨必大不得入日損

月之內可整又則難整 凡損藥熱生血氣血接骨也平正用火灸如治不效服藥亦不效
凡損藥用酒用酒不尚紅白息交酒且重傷不可用酒及承起氣作腹脹胃滿切記大

口功知稍定貼去用酒水煎或湯浸酒 凡腫是血作用熱藥水泡洗黑龍散敷貼
凡用藥酒藥於紙上平兩頭要帶薄捲頭捲得厚不得向平者無高低不勻多慮者

岸高低不勻此便有缺缺者內外生泡出此大之功如接燕不可生脫藥用手巾打濕捲
潤透斤取脫如取脫一片隨手藥少藥片上一片藥不可縛一時便生泡為害此大節

病累遺害功記 仍先換下換藥應手功記 凡用生姜亦有有用良姜解姜
毒故姜有毒常作使正用姜與同以在惡家浴擦不可用姜討姜斤研爛於熱處却

以熱湯泡用冷候冷滑得滑在下却以熱湯調藥此接湯去其熱在去子不必慮其使美
若不用姜為上切記 凡傷重其初腫而不痛應接伸捺或用刀取肉皮二三日後方知

痛且先氣血 凡打傷在兩臂兩腕兩肘去用通氣通血藥又若病人虛實不同
虛者通氣通血補藥實者補藥放緩自用貼藥在通氣在後 凡用通氣及通血

後用順氣藥藥則全無腫脹而得安此為平血作乃是氣閉不通如腫脹果有腫通使
下亦須順氣藥藥煎之庶胸膈腹肚不致緊心氣順後却用損藥藥愈須先順氣故也

人醉臥跌床下脾背疼痛不可屈伸損藥不效服力最數愈且下氣所損輕也 有少兒跌傷
用上用麻白子煎湯愈亦順氣也 散接之法除頭腦不可用藥水洗恐傷風余自用

同藥水避風洗之且与佳痛整則先用熱酒調尋痛藥方整之後氣血通流全愈

熟米醒米里... 可用... 加生...

用藥以第發散邪通氣通而... 川藥先若病有甚重若有破傷未可便

用洗滌恐成破傷風被傷之時宜先外感風寒之証宜先用三四服... 藥却者

患人虛實有何証候輕重若傷重者血潮作昏悶脹痛亦先通氣而後通血蓋血隨

氣行虛弱者兼用溫通壯實者多可峻通或通氣血兼用此則只在此亦通者麻之強弱

如載經云隊厥內傷安小弱堅強之脈可求安... 和劑五積散疎風順氣五莖傷及

傷損頭疼傷風致汗姜葱煎熱服七元有傷可加木通四香蘇木烏茶何首烏弱者无汗

亦可三四服傷重者不省酒調... 蘇香元北者熱宜便更佳... 和劑七氣湯亦勻氣

彭氏勻氣散治同上... 回香青皮制厚朴杜烏藥白芷各半兩陳皮麦芽前胡桔梗

蒼朮不將草各二各二兩以咀姜煎前... 和劑用和劑烏藥順氣散每服加蘇木

桃仁生香附子此貼水煎何末牙仲水捏一分炒茴香一分水煎服停血脈加地麻根生

研... 酒湯各半侵服若心頭痛通氣通血此盛人槐花散槐花黃黃連各

半兩熟薑壳生大黃各五分黃芩五分朴消蘇木各五分以咀不作二服心口百並慮

後加清油二平又姜蜜小使酒入心忘服即通此傷須與氣解心不省白芷二兩大黃

木通各半兩小枝十個百草霜五分細末每茶蘇木湯下血作潮熱大艾煎醋湯調

諸傷氣血脹大便不通腹肚築痛... 雄黃賦粉各一分巴豆十粒五粒去油生用五粒

以油燈燒存性直蒲黃不為末飲元氣大每七元冷茶下過一時未通用水也烏相根研

吞五元即通... 此傷小便不通朱苓滑石車前子各半兩天花粉五分海金沙二分半

細末麥明父煎湯大小便俱不通生大黃各五分當歸五分紅花二分蘇木五分

熟只壳半兩煎熟入大黃末如至便酒煎有潮熱除酒用水

三因雜鳴散治... 內傷血瘀凝積痛不可忍推陳致新... 大黃二兩酒蒸杏仁三七粒去

皮尖右研爛酒一椀煎六分去滓雞鳴時服至曉下痰愈若氣絕不能言先擊閉口以熱

童便灌... 加言... 為蘇南煎更妙... 濟生救命散治... 高墜下木石壓頂及刀傷傷痕

血凝滯心腹脹痛大小便不通欲死... 紅煙石灰慢火炒令干黃色半兩天黃芩三錢牛頭末各

二兩細末每二分熱酒調下約行四五里再飲酒調半生末不催之即下惡血或塊以及為度

邵氏用水蛭四兩各一兩先以回香三兩水蛙炒去四香夏以回香茶微炒共為末用水煎蘇

木加酒和調烏藥順氣散一帖作三服又一法硝砂水蛭竹膜絲頭四味將砂炒去砂

用蛭為末竹絲燒灰和勻酒調服... 和劑花藥石散治証同上

邵氏騙通之法打撲傷損得三五日水食不入口者用生猪肉二大分口中嚼爛或

用刀打爛者以溫水洗去血水又再搗爛用陰陽湯打和去... 用半多入椀中以

雞毛送入喉內閉口以陰陽湯灌下之其食虫出此由香實開瘀血尋上食

食胃中自然開解者用通藥此損血凝聚心間其食血飽病心開他物不

來探故用此法

敷貼藥... 三因集胡氏奪命散又名至真散治打撲金刃傷及破傷風溫如症者至

至... 南星防風各等分細末... 破傷風依上敷貼... 仍以溫酒調服一分牙關緊

角者及張或死恐尚溫者... 溫酒調上... 不聞歐內傷... 壓血酒和童便調

...

...

南星為陽月所制服之麻痺出與水太為度

瑞竹葉治前証又用黃蠟塊煎酒作服立效與玉真散一對連用神效

即氏貼諸傷損生獨活兩草烏牙南星半兩紫荊皮粉葛火垂燉葉各末臘

葉散散血麥菜生者佳此藥能止痛此五味倍用不拘等分細末如打損傷有大紫
赤色未破肉可加良姜山桂皮生薑自然汁調貼煎姜水亦可若紫黑色已退除姜桂

姜汁不用後藥煎湯泡洗上用前藥以為汁蒸清調放溫貼或有痛可用餅酒蒸
調藥不用姜痛腫即除仍喫藥消之若傷損跌踏骨痠痛仍加前姜桂坐熱貼之
藥氣透骨痛止

秘製散點損折筋骨腫痛草烏三個去皮見血者不可用飛燕
面半兩國丹二分貝母半兩天南星半兩細末生薑自然汁調貼加作潮熱茶清調貼

如皮破見血者去草烏恐壞皮肉若輕者血聚以飛白葉煎藥患處常縛之
骨斷者可用肥株去皮炙子膜以童便煮生薑三味打爛入飛燕面加入前獨活公味打和用
紙布糊片却用前後正副夾須字細整須其骨緊縛後看上下腫痛消者方可換藥

腫痛未退不可換藥仍服佳痛藥且貼字以肥株一番便如鐵釘字宜斟酌身者有
無動作方可換藥 諸傷至重但不透膜者以海味中鹹白鹽揀大片色白而有
紅絲者成片鋪在傷處以帛札之血即止如骨脂出不傷肉膜者即刺去患人頭心髮

不令患人知以熱熨斗於頂上一熨骨脂自入以桑白皮線縫合用血結草木槿葉磁石為
未乾按之即合 彭氏黑龍散治諸損傷筋斷骨碎斷若生田先煎葱湯藥水淋
洗整板平正看熱冷用姜汁或地黃汁用紙或帛隨大小裹貼有破留口別用欬藥

如骨斷碎斟酌夾縛三日次淋洗換藥不可去夾以待骨癒如刀箭獸齒或瓦礫壞爛擦
鹽腫痛用姜汁和水調貼有破留口

卷九

川山甲六兩丁皮兩當歸兩百草霜批把藥略用罌子細末姜汁和水調貼

經驗方走馬散治折傷接骨 生栢葉少用生敗荷葉生皂角多用骨碎補去
毛各等分為末熬骨入日平正以姜汁調藥攤紙貼骨斷處却用夾縛不得
搖動三五日後依夾法取開溫葱湯洗并貼并夾七日後如痛加入沒藥

澄紫作打撲折傷手足兼豆粉新鐵銹炒令紫色以井水調敷夾縛

百選活打撲接骨夜合楸即合飲花越人呼為烏雞樹去粗皮炒黑四兩芥菜子炒

一兩為末酒調二三次澄清臨卧服必痊瘡瘡者夾縛之 不用葱白砂糖一味等分

爛研傳痛處立止仍無癢痕 經驗傷損打撲傷筋骨胡蒜姜即骨碎補石生
者補損接骨生者通氣 治風損各用半研爛取汁以酒煎或調服即澤敷傷處

制法去皮毛切片微炒常用黃酒蜜酒七日後飲之 打撲有痕傷瘀血流注半夏末水
調塗傷處一宿不見痕作潮熱者大黃末姜汁調塗一夜次上藥一宿黑者紫一宿紫者白矣

拍八甲傷擊裂用溶火煨熟葱葉刺去皮取其蔥涎傷處仍燒煨煨者痛止
而安續筋金沸草根研和淨汁以助相對塗而封之即續筋見此走多刻其筋更驗

金及打傷血出不落血末五倍于末鏡面而刺下銅末細研等分敷傷處
金及打傷血出不落血末五倍于末鏡面而刺下銅末細研等分敷傷處
金及打傷血出不落血末五倍于末鏡面而刺下銅末細研等分敷傷處
奇不陳紫蘇葉和血搽勻封縛神效五倍亦佳 傷損肉破及及傷處用末酒水

燕白細切炒極熟累傷外以止痛或煎服或晚在城老夫和氣以養氣如痛甚此合口

傷筋肉骨痛甚尋生龜甲入損藥裏龜授方用生地黄厚片藏養瓜旧糖一斤生薑兩赤小

豆半斤研爛同炒熱以帛裹覆傷處夾縛不過三日安醫論 膏膠治骨傷斷筋生骨

木葛蒲炒常用紅肉消如腫加生者兩即何首烏白芷用風加兩赤為生兩痛亦加土

獨活生兩常用為末熱酒調塗土 此損敷則當濕兩白芷兩肉桂兩薑陸香沒藥

各兩為末姜汁調白芷味自佳

歐陽氏貼損 白芷赤芍南星天花粉木蠟葉牡丹皮少許為末姜酒貼

乾粉藥 彭氏風流散名膏上兩泥固濟火煨白片飛兩批批葉少許松脂薑丹

各兩為末傷經久者藥水洗後用麝香用油調敷新破傷忌風濕

邵氏破傷血不苦其血燭三分或用番降節中油代亦可五倍子一兩陳紫蘇葉三牙

白芷藥海沙一兩細末按之軍前急救不可着水至效

非洗藥 彭氏用生葱切京芥杜辛歸等分煎沸湯放溫洗或加建翹防風白芷黃連

邵氏用 南星杜松活葉黃柏生薑煎洗如有除姜麥損而青腫用些一味若由冷

痺痛骨斷而腫不可洗傷已有膿水別用合藥如前風流散 京血酒腫千金草即京芥

山桂皮藥香南藤皂用連根煎之 御藥院林傑頑荆散治諸傷腫傷折

筋骨瘀血結痛淋洗宜避風 兩 兩半蔓荆子白芷細辛防風桂川芎丁皮羌

活各一兩為末每兩加鹽半匙葱連 漿水弄血至沸去滓 手淋痛處冷即再溫

熱 又方桑白皮赤芍白芷烏 經膠臍臍葉金瘡去烏藥加京芥防風如

六一

六

良加薑香如毒加烏柏葉或相根也 華如有膿毒京芥加倍子白芷黃連

風損藥 利劑方花慈石散沒藥 接骨散補損骨痛散男兒前和劑方

御院沒藥乳香散治打撲傷損痛不三日白木炒五兩當州煎 甘草炒白芷沒藥別研

肉桂乳香別研各兩為末每兩溫酒調下不拘時 楊氏家藏紫金散治諸傷內損

肝腫血不止并瘀血停滯心腹脹悶紫金藤皮兩卷降由續斷補骨脂無憂煨酒浸七次

琥珀別研消黃生膠酒洗當歸燒焙桃仁去皮炒各兩大黃煨消別研各兩半為末每二

分沒藥蘇木當歸酒調下并進三服利即安 本方打撲內損筋骨疼痛

沒藥乳香為藥川芎川椒孝子及合者當歸薑兩 自然銅醋淬半兩為末

黃蠟二兩溶用入藥末不住手搖勻元如彈 大每元好酒煎開熱服隨痛處用

片時連進有效 楊氏內托黃芪元治針灸傷經絡流膿不止黃芪兩當州三

兩肉桂木香乳香別研沉香各兩為末薑豆彩四兩姜汁煮糊元倍子大每五元

熱水送下不拘時 百選治老弱腰膝折傷當歸肉桂甘草川椒炒去汗各

三分山參兩半附子炮澤蘭炒各一兩為末酒調忌粘葱冷水等物

經驗應痛元治諸傷損及損後為四氣所侵手足痠痛忌熱食一時生美君木斤破

故芒片半生半炒舶而土兩必骨碎補一斤老毛川山甲去膜藥灰炒脹生草烏

斤劉如麦大石除草烏用生葱三斤連皮生薑五斤福爛將草烏一處渣宿焙干連前藥

煉為末酒浸麪糊丸每丸湯酒任下 經驗治諸折傷乳香沒藥蘇木香降節

川烏去皮尖松明節自然銅醋淬各兩水飛過地龍洗淨半兩香炒水蛭油炒

龍骨各藥酒調膏
龍骨各藥酒調膏
龍骨各藥酒調膏

七

鄒氏諸風損傷折 干姜洗升平益養氣水洗升平木別水浸去壳二升杜仲活三升葉三升
乳香水浸半升浸藥水浸一升二味別研藥本撫多制壳赤多其散並炒結斷酒浸
炒黑牽牛炒川山甲灰炒各二升白芷肉桂杜仲良姜淨細辛當歸酒浸川牛七酒浸各
一升草烏皮大升半羌活半升骨碎補炒三升蒼朮炒半斤海桐皮酒浸炒三升附
子川烏炮各不後二味者虛實加右末每藥末斤用麩三升酒水煮糊元梧子大每七元壯
實者加廿五元有臂脾頭痛生薑酒細嚼吞下兩脇腰腿疼痛香姜酒空下膝膝
痛腫木瓜姜酒下四五月加京芥春日去破故心夏月去牽牛 治損接骨活血往痛虛
弱及經久未安附子余炮澤蘭一升川椒去目及第二重皮炒半升放於甘草半升當歸
川芎細活各半升白芷一升川烏分細末細嚼生薑酒調勿傷不用泛骨斷皮不破加
乳沒浸酒調體弱傷損氣痛回香姜酒調看虛實每服加少草烏末 腦上有傷頭
痛正京芥川芎各半升白芷一升必澄澄加三不為末熱酒調 諸損傷草藥捷徑毛蛇
藤有血瘀多加一升打破大青根半升化氣矮樟根半升熟骨草半升柞赤七十長七葉
住痛多加紫金藤又名山甘草用一兩可加姜三兩拌和牛膝根半兩消血瘀加用過路蜈蚣
過橫楓一升松圓一升左纏接骨草一升右生研酒浸開去滓加重便溫服體弱溫熱服
有瘀血在內用麻油葱同泛後入以澤盒傷處皮破血出者不用貼 凡傷重用姜半
升場口口水各半用前藥搗爛先用豬蹄筒骨熬汁如前藥同煎至半場膏衣服及

二十二卷

七

瘡臥安此法真戈法打損遍身粘貼功更速極尤妙 諸傷損筋折骨先用麩痛散

住痛 川德活川五灵脂乳香別研白芷比回香各一兩防風百草霜沒藥各半兩淨生

地黃二升半赤芍二兩當歸二升杜白芷三升桔梗 三升草烏二升小麦汁煮透去皮尖

焙 為末每茶煨葱頭酒或炒松節姜酒調 接骨散諸傷筋折 腫痛服之

住痛消腫白芎二升故苧二兩自然銅研碎沒藥別研羊脛骨炭各一兩白茯苓骨碎

補老毛各升川烏炮 木別壳壳并油煨各升虎骨也多少醋煮別研右細末每茶依前

湯使調下燒羊脛炭法四五月收麻羊糞用苑一會加薑一層及意燒之存性合煙公依

炭先办姜汁童便候炭成將入汁內淨晒干為末 筋骨散治新旧拍除痛壯筋

骨可常用帶生地黄赤芍當歸石南藤各一升杜白芷骨碎補炒老毛各三

兩五灵脂肉桂山桂皮京芥穗各一升桔梗四升川烏炮草烏制各半兩雄黑豆

煮去皮芎為末姜汁和泛調婦人凡損痺痛煨葱酒調 接骨續筋住痛生血

周竹傳甚神秘之內加生真散二味又勝諸方 乳香沒藥自然銅醋洗七次南木

香生地黃熟地黃川羌活川獨活川 當歸防風南星松嫩心老毛粉草側柏葉

醋煮加倍用草烏數制去皮頭痛甚在个栢木 嗽中煨存性作炭前藥各等分

然側栢栢炭加倍用細末生薑自然調或蜜元 連生薑汁和酒嚼下

應痛乳香元治諸損乳香沒藥信朱別研各半升白 蒼香升同乳香溶草烏制老石南

藤二升骨碎炒老毛桔梗白芍藥各二兩 熟地黃一升川烏京芥穗一兩暗松節燒過存性

一兩細末醋糊在棗子大每升元煨葱頭酒或炒松節 骨斷分加用此藥當膏四

兩獨活二刀乳香白芷各一兩酒過用生熟地黃各二兩白芷酒洗去其側痛藥
燀肉桂半刀石南藤二兩細葉歸來桐神大國丹為衣每服一錢或香降氣湯
服亦可棗子充安先煎藥於松條條煎好去其苦味持梗各刀膠氣骨痛不
起浸法

骨痛後敗血腫血氣疼痛凡勞發動服痰痰子婦勿服青紫灰一斤好醋殺火
大粟間焙骨碎補制焙南星姜汁浸宿焙赤白煎煎牛膝洗焙川烏炮焙黑且各刀
交自然銅醋淬木別子肉切和麩炒赤各八分淨細辛刀焙浸藥四乳香交並別研白
交香豆不龜家或番降即代為末糯米粉醋煮糊元枰干下集手元緩則發裂大丸
重茶濕巾在文濕濕平以涼擦手將刀瓦掛凍為衣收用每生元無灰以磨化漸
煎三五沸溫服無時以紙筒袋收掛準處經久不壞

骨風濕寒拳壯筋骨活絡生血烏何首烏桑木此床子五葉脂白交香赤
豆牛膝當歸各制淨一刀乳香不酒糊元桑且大每五十五元以下

川烏一斤炮南星斤七刀當歸十刀骨碎補製一斤牛膝十刀淨批細辛八刀青桑
亦三斤或不用赤且三升自然銅刀醋淬細末醋糊元枰子大信州末為衣每其溫酒下

牛膝九刀百草霜半刀赤且升 為末酒糊元枰子大湯使同上刀加細辛或白鮮皮
當歸散治諸風損折傷或作瘰癧或因損中風後所損

澤蘭當歸牛膝練斷各刀為茶白芷川芎肉桂細辛各刀桂枝甘草各四刀川烏
椒各三刀白楊皮刀或不用為末酒調下

川芎杜細辛姜黃為藥草烏川烏各四刀骨碎補當歸桑木木別肉各六刀浸藥五刀
首烏四刀桂梗十刀乳香赤且升白且三刀海桐木不用亦可為末酒調

散中散治毒丸傷四時傷寒壯熱骨節煩疼痰嗽痰瘴氣切風症婦人血風
產前產後諸疾並治椒中醋浸交赤白桂枝川芎白芷蒸光羌活當歸干姜
陳皮各四刀烏藥桑木子為藥散胡各刀蒼朮木川烏四木炮桂梗斤半棟半細末每刀
姜三斤烏梅半斤煎服傷寒加葱白荊椒酒

黑虎丹治諸損男女頭風手足麻痺川烏木別肉各一片地龍淨洗去土十刀黑小豆
半斤五灵脂刀為末以五灵脂同麩糊為元○二元至三元溫酒薄荷茶皆可下
首烏元寬筋治風損何首烏十斤生薑且半斤同煎薄荷下刀青木香牛膝各五刀

魚用斤燒存性牽牛刀炒頭末川烏刀炮酒糊元葱湯薄荷茶元
歐陽氏治諸損紅黑散當歸川芎白芷陳皮赤芍牡丹皮回香柳桂各一刀嫩松香
並過去毛杜當歸各兩半地黃二刀胡紅末草烏以醋炒自然銅酒醋浸各一刀蒼朮良姜
骨碎補制各二刀杜細活四刀松木炭松香加倍作黑二藥作末隨病重輕打和即香

湯以姜葱酒調常食和劑石南元煎服
草烏細辛羌活活白牛膝白交香五葉
脂山芎甘草葉本回香藿香各二刀石南藤木小自然銅骨碎補干姜當歸肉桂等分

藥酒調通用如傷重者南藤杜當歸肺傷重加桑木半傷重加別半腰傷重加香

戒姜桂加 百藥煎者南麻 秋糖接骨散 姜黃清黃骨碎補心異煖生地黃

姜各自然汁一兩為末酒調外用生癩蝦蟆不似如泥敷貼癰疽疔瘡腫痛無名異細末搗

還服趕手末留散失血散散治打跌損傷骨節補制生善乳香當歸搗以紙服按骨

加骨酥銅 打傷骨骨補末和黃米粥裹傷處 打跌骨斷只身之味為末酒調服神

效其功不減自然銅與古五銖分 打跌帶腰肋厥故正面香各少辣接等分為末酒

酒調 打跌骨傷腫痛宜當歸煎湯磨大黃通仍用刺刺澤蘭散姜酒調服方

傷風諸風損傷折跌風順氣勻血住痛當歸一兩半 川芎一兩白芷桂烏

藥木瓜牛膝各一兩半 北川皮淨陳皮淨細辛 玄胡索炒川芎斷四香炒

破故布亦 各黃蒲洗炒漸木穿山甲牡粉炒各 兩交趾桂七子桃仁炒去皮半升粉草

一兩五加皮一兩法浸或加皮蜜即似壳制各兩吹咀姜煎酒浸乳沒各半升加皮或

加老林節炒烏豆七老姜煮酒服 自製諸損手足藥健筋骨生氣與養百脈疎

風順氣升降陰陽虛弱當長條川牛膝宣瓜天麻從容當歸川結斷酒浸倍何

首烏送 杜烏藥白芷五加皮酒浸狗脊制海烏姜葱炒骨碎補去毛酒浸而神效

二升治大風烏頭各一升炮乳香沒藥別研嫩首酥炙自然銅醋中川各一升半

兔絲子半兩酒洗去心杜仲一升淨姜炒蒼朮半生半熟三味各品力全竭半升炒破故布三升

酒浸虎骨酥炙其味感靈仙水洗酒浸桑寄生川山甲牡粉炒同香炒淨細辛角版

酥炙各半升細末酒糊元常服即補下元氣破傷水方糯米生用三之三寸草末三之一

用沙糖調搽腫處先自腫赤及外搽起不瘡口水皆自落即安

治諸傷瘀血不散五六月收野苧蘇葉檀榔金槍上如瘀血在腹用順流小檣燭服

通血化水以延猪血試之可驗秋月心無葉早收 傷紫眼紫金皮小便浸之腫

末眼青腫黑紫色用生薑黃姜汁調不腫用葱汁閃 腰痛神效煨紅酒溫服或

醋和胃散最痛或或性神制及藥末酒調

杖菴果問輕重生逐宗即之法搗切不可與酒則寒邪不散生他証不能便愈者若

弱先服香蔬散元有抽服敗毒散三服後服十宣散除桂香南水調膏用

菜豆粉清油白水各半調塗住痛用一黑散赤龍鱗煨存性搽即古松皮退腫

用一黃散煎合齒分亦五分白芷二分天花粉三兩腫其如京芥三三點內消如不

用白芷加能活並用茶調貼瘡口外留口其他瘡如無熱酒調貼如有膿姜汁三

分茶清七分調杖瘡用乳香煎油調敷瘡口內外皆可仍加善應等膏藥貼

肉潰爛用生肉藥搽或腫不消用被髮外針刺去熱血用黃散敷貼一首散熱

調不可調下則不驗如血洗藥中加薑香或殺後被入施毒藥急燒自沸湯候溫以

芒帚按五六寸二百並干淨一橫直為病骨上用二於病處壓出瘀血打於熱水

中淨洗至血為度急毒食行房不淨席臥登廁重觸或拜杖後苦痛只加乳沒二

藥 諸傷瘡封口住痛白芷五倍子炒赤石脂烏賊骨生而封口須研細末未及吹痛

不止或 治諸般惡氣及脚上腫癢蛇頭疔痛 方加乳香桂黃白芷 藥散為不

加管 清油蒸熟去滓用雞毛洗淨口布用京茶按干用油潤

亦心焦更加龍鱗按白芷一味

方第一

方第一

方第一

方第一

方第一

方第一

方第一

方第一

方第一

方第一

方第一

方第一

圖書在版編目(CIP)數據

永類鈴方/[元]李仲南撰.—北京:北京圖書館出版社,
2005.4

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2679-7

I. 永… II. 李… III. 骨損傷—中醫治療法
IV.R274

中國版本圖書館CIP數據核字(2005)第013719號

ISBN 7-5013-2679-7



9 787501 326792 >

書名 永類鈴方(全十二冊)
著者 [元]李仲南 撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail: Btstxb@nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

造紙 華寶齋
印刷 杭州富陽古籍印刷廠

開本 八

印張 一〇三

版次 二〇〇五年四月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇〇

書號 ISBN 7-5013-2679-7 / K·1013
定價 三三〇〇圓

