

重刊孫真人備急千金要方

十六

重刊孫真人備急千金要方卷之十四 小腸腑

小腸腑論第一

論曰小腸腑者主心也舌是其候也心合於小腸小腸者受盛之腑也腎監倉更重一斤十四兩長一丈四尺廣二寸四分難經甲乙云長三丈二尺大後附脊左回疊積耳注於回腸者外傳臍上回運環反十六曲常留水穀一斗四升其一斗二升是水一斗一升是穀應主二十四氣也
難經云十六曲盛谷貳斗四升水六升三合合之太半甲乙云受二斗三合合之太半 腎厚人中長以候小腸

小腸病者小腹痛腰脊控舉而痛時窘之復耳前執若寒甚獨肩^上熱及手小指次指之間執若脉滑者脉經作甲乙同此其候也

小腹控舉引腰脊上衝心邪在小腸者連舉系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則敬逆上衝腸胃動肝肺散於育結臍故取之育原以散之刺太陰以與之取敬陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之

左手關前寸口陽絕者無小腸脉也苦臍痺小腹中有痼瘕王月即冷上搶心刺手心主治陰心主在掌後橫文中入一分

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急熱痺小腸內熱小便赤黃刺手太陽治陽手太陽在手小指外側本節陷中

小腸有寒其心下重便膿血有熱必痔

小腸有宿食常暮發熱明日復止

小腸腑

小腸脹者小腹臌脹引腹痛

心前受病移於小腸心欬不已則氣與欬俱出

鬱氣客於小腸夢聚邑街衢

心應皮皮厚者脈厚脈厚者小腸厚皮薄者脈薄脈薄者

小腸薄皮緩者脈緩脈緩者小腸大而長皮薄而脈沖小

者小腸小而短諸陽經脈皆多紆屈者小腸結

扁鵲云手少陰與太陽為表裏所以表清裏濁清實濁虛

故食下腸實而胃虛故腑實而不滿實則傷熱熱則口張

口為之生瘡虛則傷寒寒則便泄膿血或發果水其根在

小腸先從腹起方見治水篇中

小腸絕不治六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸白

汗不止

金方十四

二

手太陽之脈是動則嗌痛頰腫不可以頰有似按臍似折

是主液所生病者耳聾目黃頰頰腫頸有癭肘臂外後廉

痛經脈支別已見心蕪部中

小腸虛實第一

脈一條灸法二首

方二首

小腸實熱

左手寸口人迎以前脈陽實者手太陽經也病苦身熱來去汗不出心中煩滿身重口中生瘡名曰小腸實熱也

柴胡澤瀉湯治小腸熱脹口瘡方

柴胡

澤瀉

橘皮

旋復花

枳實

升麻

芒消

生地黃

切壹升

右九味以水一斗煮取二升去滓下芒消分二服

大黃圓治小腸熱結瀉不通方

小腸經

大黃

芍藥

葶藶

各貳兩

大戟

朴消

各參兩

杏仁

伍拾枚

巴豆

柒枚

右七味為末蜜和丸如梧子大飲服大人七丸小兒二
三五九日一熱去日一服

灸法

小腸熱滿灸陰都隨年壯穴俠中管兩邊相去一寸

小腸泄痢膿血灸魂舍一百壯小兒減之穴在俠臍兩邊

相去各一寸翼云相去一寸又灸小腸輸七壯

小腸虛寒

左手寸口人迎以前脉陽虛者手太陽經也病苦顛倒偏

頭痛耳頰痛名曰小腸虛寒也

治小腸虛寒痛下赤白腸滑腸中懊懣補之方

乾薑

參兩

當歸

黃蘗

地榆

黃連

阿膠

各貳兩

石榴皮

參枚

右七味以水七升煮取二升五合去滓下膠煮取
膠烱盡分三服

舌論第三

論曰凡舌者心主小腸之候也舌重十兩長七寸廣一寸
半善用機衡能調五味也凡有所啖若多食鹹則舌紫
而變色多食苦則舌皮槁而外毛焦枯多食辛則舌筋急
而爪枯乾多食酸則舌肉肥而脣揭多食甘則舌根痛而
外髮落又曰心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹此五
味內合五臟之氣也若臟熱則舌生瘡引脣揭赤若腑寒
則舌本縮口噤脣青寒宜補之熱宜瀉之不寒不熱

小腸虛寒

附瀉之舌縮口噤腎膏升麻煎主之方見第六卷中

風眩第四

前卷既有頭面風方風眩不帶面赤以餘方相雜故此特立風眩方條專治此病

徐嗣伯曰余少承家業頗習經方名醫要治備聞之矣自謂風眩多途諸家未能必驗至於此術鄙意偏所究也少採用之百無遺策今年將衰暮恐奄忽不追故顯明證論以貽於後云爾

夫風眩之病起於心氣不定腎上蓄實故有高風面熱之所為也痰熱相感而動風風心相亂則悶瞽故謂之風眩大人曰顛小兒則為癩其實則一此方療治萬無不愈但恐證候不審或致差違大都忌食十二屬肉而貴豚為患發多氣急氣急則死不可救故此一湯是輕重之宜勿因

此便謂非患所治風眩湯散丸煎凡有十方凡人初發宜急與續命湯也困急時但度灸穴便火針針之無不瘥者初得針竟便灸最良灸法次列於後余業之以來二十餘年所救活者數十百人無不瘥矣後人能曉此方幸勿參以餘術焉

續命湯治風眩發則煩悶無知口沫出四體角弓反上

竹瀝升

生地黄升 龍齒

生薑

防風

麻黃各肆兩

附子參兩

附子參分

石膏柒兩

桂心貳兩

右十味以水一斗煮取二升分二服有氣加附子作一兩紫蘇子五合橘皮半兩已服續命湯口開即

尚求好定而心中尚不除者紫石湯主之方見下第五篇紫石散是也

紫石湯治氣奔急欲絕者方

吳茱萸各二分石膏 人參 半夏

芍藥各二分桂心 芍藥 生薑各肆分

生葛根 茯苓各拾分當歸肆兩 李根皮壹斤

右十二味咬咀以水七升清酒八升煮取三升分二服

防己地黃湯治言語狂錯眼目霍霍或言見鬼精神昏亂

防己 甘草各貳兩桂心 防風各叁兩

生地黃伍斤別切勿合藥漬疾小輕用貳斤

右五味咬咀以水一升漬一宿絞汁著一面取滓著竹

簍上以地黃著藥滓上於五斗米下蒸之以銅器承取

汁飯熟以前藥汁合絞取之分再服

薯蕷湯治心中驚悸而四肢緩頭面熱心脅痰滿頭目眩

冒如欲搖動者方

薯蕷 麥門冬 人參各肆兩生地黃

前胡 芍藥各捌分枳實 遠志

生薑各叁分茯苓 茯苓各陸分半夏伍分

甘草 黃芩 竹葉各貳分秫米叁合

右十六味咬咀取江水高舉手揚二百九十下量取三

斗煮米減一斗內半復減九升去滓下藥煮取四升

分四服無江水處以千里東流水代之投手令上頭也

秦中無江水涇渭水可用諸葛灌劍由尚取之

防風湯服前湯後四體尚不涼冷頭目眩轉者服之此湯

孫叔和伯用膠

大勝宜長將服但藥中小小消息隨冷暖耳仍不除痰者
依此方

防風

石膏

人參

赤石脂

白石脂

生薑

龍骨

寒水石

茯苓各五分 桂心貳分

紫石英一分

右十一味咬咀以水八升煮取三升分三服凡用井花
水者取清淨也今用江水無泥又無砂穢源泉遠涉順
勢歸海不逆上流用以治頭必歸於下故也

薯蕷丸方

薯蕷貳拾分

甘草拾肆分

澤瀉

人參

黃芩各一分

當歸

白斂

桂心

防風

麥門冬一分

山茱萸

桔梗

芍藥

紫苑

大豆黃卷

乾地黄

白朮

芎藭

乾薑

蜀椒各一分

並用二十味 生地黄拾捌斤

鹿角膠兩 大棗枚拾 麻子人研 蜜各各二分

桑根皮伍升

忌酒上自出上者大毒大忌近
籬室垣牆下溝瀆邊者皆不中用

右二十七味以清酒二斗四升煮桑白皮麻子棗得一
斗去滓次下地黄汁膠髓蜜煎減半內前諸末併煎令
可丸如雞子黃大飲服一枚日三稍加至三九

薯蕷丸

治頭目眩冒心中煩鬱驚悸狂癲方

薯蕷貳拾捌分

甘草貳拾分

鹿角膠

大豆黃卷

桂心各一分

乾地黄

神麴

當歸

人參各一分

麥門冬

防風

黃芩

芍藥

白朮各一分

柴胡

桔梗

茯苓

杏仁

黃芩各一分

白斂

乾薑各五分

大棗 青竹枝取湯

右十二味為末合白蜜棗膏丸如彈丸先食服一九

日三

天雄散 治頭目眩暈至轉旋倒者方

天雄

防風

苦藟

人參

獨活

桂心

葛根

莽草

白朮

遠志

薯蕷

扶神

山茱萸

各四分

右十二味治下篩先食以菊花酒服方寸匕日一漸

至三匕以知為度

九月九日取蘇州甘菊 花暴乾作末以米釀中蒸作酒

人參圓 治心中時恍惚不定者方

上黨人參

鬼臼

鐵精

牛黃

丹砂

雄黃

大黃

昌蒲

防風

各壹兩

赤足蜈蚣

各壹枚

右十一味為末蜜丸如梧子大用前菊花酒服七九日

三夜一稍加之合藥勿用青紙忌見婦人青衣人喪孝

不具足人及濁穢六畜雞犬鼠等

灸法

其法以繩橫度口至兩邊既得口度之寸數便以其繩一

頭更度鼻盡其兩邊兩孔間得鼻度之寸數中屈之取半

合於口之全度中屈之先灸頭上迴髮當迴髮灸之以度

度四邊左右前後當繩端而灸前以面為正並依年壯多

少一年凡二三灸皆須瘡瘻又灸壯數如前若連灸火氣引

上其數處迴髮者則灸其近當鼻也若迴髮近額者亦宜

灸若指面為癩則闕其面處然病重者亦不得計此也

虎兇龍蛇牛馬猪羊雞犬猴鼠

右十二相屬肉物皆不得食及以為藥牛黃龍骨燕用不可廢

嗣伯啓其於方術豈有效益但風眩最是愚衷小雅者常自寶秘誓不出手而為作治亦不令委曲得凡有此病是其所治未有不瘥者若有病此而死不逢其故也伏願問人立知非某之自誇毀下既需此方謹封上呈某鄙志尚存謹自書寫年老目聞多不成字伏願恕亮謹啓

風癩第五論六首 針灸法四十八首 方三十四首

論曰黃帝問曰人生而病癩疾者安所得之岐伯對曰此

得之在腹中時其母數有所大驚也氣上而不下精氣并居故令子發為癩疾病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已而止病癩初發歲一發不治月一發不治四五日一發名曰癩疾刺諸分其脈尤寒者以針補之病已止癩疾始生先不樂頭重直視舉目赤其作極已而煩心候之於頰取手太陽陽明太陰血變而已癩疾始發而反強因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陽血變而已癩疾始作而引口啼呼甲乙作喘者候之手陽明太陽右強者攻其左左強者攻其右血變而止治癩疾者常與之居察其所當取之處病至視之有過者即寫之置其血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動者

二十壯窮骨者尾能也

骨痛疾者領齒諸刺分肉皆滿而血傷強直汗出煩
多涎沫氣下泄不療

助顛疾者身拳攣急脈大刺項大經之本杼嘔多涎沫
下泄不療

脈顛疾者暴仆四肢之脈皆脹而從滿脈盡刺之出血不
滿俠項灸太陽又灸帶脈於腰相去三寸諸分肉本輸
多涎沫氣下泄不療

治顛者病發而狂面皮厚數數者死不療

凡顛發則仆地吐涎沫無知若強掠起如狂及遺糞者
癲疾脈搏大滑又自己脈沈小急實死不療小牢急亦不
可治脈虛可療實則死矣厥成爲癲疾五臟不平六腑
塞之所生也厥成爲癲故附厥於此條也陰衰發熱厥

衰發寒厥

金匱要略

九

論曰黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下
則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥問曰熱厥必起於足下
者何也對曰陽氣起於足三趾之表集於足下而聚於足
心故陽勝則足下熱也問曰寒厥必起於五趾而上於膝
者何對曰陰氣起於五趾之裏集於膝而聚於膝上故陰
氣勝則從五趾至膝上寒其寒也不從外皆從內也厥或
令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人
者何也陰氣盛於上則下虛下虛則腹滿腹滿則下氣重
上而邪氣逆逆則陽氣亂亂則不知人巨陽之厥腫自頭
重足不能行發爲胸仆陽明之厥癲疾欲走呼腹滿不得
臥面赤而熱妄見而妄言少陽之厥暴聾癲腫而熱

經不可以運大陰之厥腹滿臍脹後不利不欲飲食
不得卧少陰之厥舌乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥小腹脹
滿腹脹淫洩不利好卧在膝陰縮腫脰內外一作熱盛則渴
之虛則補之不盛不虛以經取之上寒下熱先刺其項太
陽久留之已則火熨項與肩甲令熱下冷乃止所謂推而
上之者也上熱下寒視其虛脈而陷下於經絡者取之氣
下而止所謂引而下之者也刺熱厥者留針反為寒刺寒
厥者留針反為熱刺熱厥者一陰一陽刺寒厥者一陽一
陰所謂一陰者一刺陰也所謂一陽者一刺陽也
論曰濕病熱入腎中亦為瘞小兒病癩熱盛亦為瘞凡瘞
瘞暴尸厥及鬼魘不寤皆相似宜精察之故經言久厥則
成癩是以知似也

論曰癩病有五 一曰陽癩發時如死人遺溺有頃乃解二
曰陰癩坐初生小時瘡未愈數洗浴因此得之三曰風
癩發時眼目相引牽縱反急強羊鳴食頃方解由執作汗
出當風因以房室過度醉飲飽滿行事令心氣逼迫短氣
脈悸得之四曰濕癩眉頭痛身重坐執沐髮濕結腦汗未
止得之五曰馬癩發時反目口噤手足相引身皆執坐小
時膏氣腦執不和得之
治五癩方

銅青

雄黃

空青

東門上雞頭

水銀各壹兩

茯苓

猪苓

人參

白芷

白欬

白礬

石長生

菴柏

烏頭

硫黃

壹兩半

右十五味為末以青牛膽和著銅器中於甑中五斗六
豆一蒸之藥成丸如麻子先食服二十九日再夜一

治濕癩掣癢口眼張大口出白沫或作聲或死亦
知人方 千金翼方曰大鎮心丸主諸癩所不瘳者

虎睛 春真酒浸一宿炙之 鬼箭羽 露蜂房 分獨活

遠志 細辛 貫衆 麝香 白欬 白欬

升麻 白鮮皮 兩 牛黃 防風 秦艽

防葵 龍齒 黃芩 雄黃 山茱萸

乾地黃 一方二百萬曹 防已 茯苓 鐵精

鬼臼 人參 大黃 銀屑 各肆分 茯神

石膏 天雄 各伍分 寒水石 陸分 蛇蛻 壹尺

右三十一味為末蜜和丸如梧子大酒服十五九日再

稍加至二十五九神方

凡癩發之候其狀多端口邊白沫動無常者治之方

秦艽 人參 防葵 一作防風 茯神 一作

甘草 各貳兩 鉉丹 壹兩 貫衆 壹兩

右七味以水九升煮取三升半分三服

雄雄圓 治風癩失性顛倒欲死五癩驚攔方

雄黃 雌黃 真珠 各壹兩

鉉 貳兩 成骨 丹砂 貳分 水銀 捌分

右六味為末以蜜搗二萬杵丸如胡豆大先食服二九

日二稍加以知為度 古今錄驗云瘡五癩牛顛則牛馬

羊鳴雞顛則雞鳴病五癩狂病者兩藏相引益氣起寒歌不識人氣氣言方吐沫久而得蘇者

續命風引湯 治中風癩眩不知人狂言舌腫出方

礞石 芎藭 石膏 人參 防風

桂心 甘草 獨活 防已 附子

當歸各壹兩 杏人一枚 參三錢 陳薑伍兩 一本無陳薑字

右十二味以酒三升水一斗合煎取四升分四服 日三夜一

石散治大人風引小兒驚癇瘳癩日數十發醫所不瘳

紫石英 滑石 白石脂 凝水石

赤石脂 石膏 甘草 桂心

牡蠣各伍兩 大黃 龍骨 乾薑各肆兩

右十二味治下篩為粗散盛以韋囊懸於高涼處欲用 取二指撮以新汲井水三升煮取一升二合大人頓服 未白日兒服一合未能者綿沾著口中熱多者日四五

服以意消息 深師方曰龍骨黃薑牡蠣滑石白石英各壹兩

治百二十種風癩癇驚狂發即吐沫不識人者四月五月 宜服之方

紫石英 芍藥 龍骨 青石脂

白鮮皮 麻黃 當歸 甘草 枯薑根

桂心 人參 龍骨 牡蠣 參 兩 大黃 伍兩

右十二味治下篩為粗散分作七裹每以大棗十枚水 三升煮取一升半去滓下一裹煎取一升去滓頓服相 去七日一服服訖即瘳

治癩癇厥時發作方

防葵 代赭 人參 鉛丹 白僵蠶

生豬齒 鈞藤 茯神 雷丸 虎骨

遠志 桂心 防風各陸 卷柏 葶苈子

光明砂 升麻 附子 牡丹 龍齒各一

牛黃一分 白蠟一分 蜂房一分 蚱蟬拾肆枚 蛇蛻皮

白馬眼睛各壹具

右二十五味治下飾酒服方寸匕日二亦可為丸良驗

烏窮湯 治風癩引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴方

芎藭 藁本 闍茹各伍兩

右三味咬咀內酒一斗煮取三升頓服之羸者分再服

取大汗

治風癩方 經心錄名鳴頭丸

葶藶子 鈆丹 虎掌 烏頭 栝萐根分

甘遂 天雄 蜀椒 大戟各一分 白木壹分

鐵精 闍茹各壹兩 鳴頭壹枚

右十二味為末蜜丸如梧子湯酒下一丸日二服

又方 地黃各拾斤 天門冬拾斤

右二味搗取汁作煎服之瘥

又方 良苈子二升搗篩酒一斗漬半日絞去滓湯中煎令

可丸先食服如小豆二九加至如梧子二九以知為

度額上手中從文理中赤起是知也無此候更服病

日發者二日愈間日發者十日愈五日發者二十日

愈半歲發者一月愈

治癩癩瘰癧方

鈆州壹斤 飛鳴頭壹枚

右二味為末蜜丸先食服三九日二劇者夜一稍加之

通治五臟六腑大風洞泄虛弱力勞七傷
精氣冷熱諸風癩癧惡疾耳聾頭風四肢拘攣
痿痺退避
病久服延年輕身齒落更生髮白更黑方

天門冬與百部相似天門冬味甘兩頭方百部細長
而味苦令人利搗絞取汁一斗漬麴二升麴發以糯
米一斗准家醞法造酒春夏極冷下飯秋冬溫如人
肌酸之酒熟取清服一盞常令酒氣相接勿至醉吐
慎生冷酢滑雞猪魚蒜特慎鯉魚亦忌油膩此是一
斗汁法餘一石二石亦准此以為大率服藥十日覺
身體癢疹大癢二十日更大癢三十日乃漸止此皆
是風氣出去故也四十日即覺身心朗然大快似有
所得五十日更覺大快當風坐卧覺風不著人身中

金方百一

十四

諸風悉盡用米法先淨淘米曝炕令乾臨欲用時更
別取天門冬汁漬米乾漉炊之餘汁拌飯甚宜密封
取天門冬汁法淨洗天門冬去心皮乾漉去水切去
壓取汁三四遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍
作臭泔腥氣但依式服之又停則香美餘酒皆不及
也封四七日佳凡八月九月即少少合至十月多合
擬到來年五月二十日以來相續服之春三月亦得
合入四月不得合服酒時若得散服得力更倍速散
方如左

散方 天門冬去心皮曝乾搗作末以上件酒服方寸匕日
三加至三七又服長生凡酒亦得服

天法

大人癩小兒驚癩灸背第一椎及下窮骨兩處以繩繫中
拆繩端一處是脊骨上也凡三處毘復斷繩作三折令各
等而參合如么字以一角注中央灸下一角俠脊兩邊便
灸之凡五處也故畫圖注以丹注所灸五處各百壯削竹
皮爲度勝繩也

卒癩灸陰莖上宛宛中三壯得小便通即瘥千金翼云當
系孔上是亦
○又灸陰莖頭三壯○又灸足大趾上聚毛中七壯○又
灸囊下縫二七壯○又灸兩乳頭三壯○又灸督脈三十
壯二報穴在直鼻中上入髮際○又灸天窻百會各漸灸
三百壯炷惟小作○又灸耳上髮際各五十壯

論曰黃帝問曰有病怒狂者此病安生岐伯對曰生於陽
曰陽何以使人狂曰陽氣因暴折如難決故善怒病名曰

陽厥問曰何以知之對曰陽明常動太陽少陽不動不動
而動大疾此其候也曰治之奈何曰衰其食即已夫食入
於陰長氣於陽故奪之食即已使之服以生鐵落爲後飯
夫生鐵落者下氣疾

論曰凡發狂則欲走或自高賢稱神聖皆須備諸火灸乃
得永瘥耳若或悲泣呻吟者此爲邪非狂自依邪方治之
邪入於陽則爲狂邪入於陰則爲血痺邪入於陽傳即爲
癩瘕邪入於陰傳則爲痛瘖陽入於陰病靜陰入於陽病
怒

書治邪氣夢寐寤時涕泣不欲聞人聲體中酸削乍
寒乍熱腰脊強痛腹中拘急不欲飲食或因疾病之後勞
動疲極或觸犯忌諱衆諸不節婦人產後之後月經不利

時下青赤白肌體不生肉虛羸瘦小便不利或頭身發熱
或復解散或一度交接彌日困極皆主之方

龜甲一枚 甘草 白薇一作貝母 黃芩各二兩

麻黃 芍藥 白朮各二兩 防風各二兩 凝水石

桂心 茯苓 知母各肆兩 石膏陸兩

右十四味以水二斗煮取四升溫服一升日三夜

九物半黃圓治男子沾鬼魅欲死所見驚怖欲走時有休
止皆邪氣所為不能自絕方

牛黃十精 一云火精 荆實人精 曾青龍玉屑 龍虎

空青天精 雄黃地精 玄參武精 龍骨水精 赤石脂精

右九味名曰九精上通九天下通九地各一兩治下篩

蜜和丸如小豆先食服一九日二稍加以知為度千金

金方二十四 十六

九邪病當服五
邪湯九精丸

十黃散治五臟六腑血氣少亡魂失魄五臟覺不安忽忽
喜悲心中善恐怖如有鬼物此皆發於大驚及當風從高

墮下落水所致悉主之方

雄黃 人參各伍 黃芩 大黃 黃蘗

黃耆 細辛 桂心各叁 黃連 黃昏

蒲黃 麻黃各壹 黃環 澤瀉 山茱萸貳

右十五味治下篩末食溫酒服方寸匕日三不知加至

一二匕羸劣者更加人參五分合十分一方有生黃二分

崔氏有蜀椒伍
分乾薑肆分

以離散治男女風邪男夢見女女夢見男悲愁憂志怒喜

無常或半年數月一發動者方

桂心

茵芋

天雄

菖蒲

細辛

茜根

附子

乾薑

白朮

桑寄生

右十味治下篩酒服方寸匕日三凡修合易勿令婦人雞

犬及病者病者家人知見令邪氣不去禁之為驗

四物烏頭散治鬼魅方

東海烏頭

黃牙石

良若子

防葵

右四味治下篩酒服方寸匕欲令病人見鬼加防葵一

分欲令知鬼主者復增一分立有驗防葵良若子並令人

迷惑恍惚如狂不可多服

五邪湯治邪氣啼泣或歌或哭方

金方十一

十七

禹餘糧

防風

桂心

芍藥

遠志

獨活

甘草

白朮

人參

石膏

牡蠣

秦朮

防己

菖蒲

茯神

雄黃

深師作黃冊

蛇蛻皮

各壹兩

右十七味以水一斗煮取四升分四服亦可如煮

散法服之

伏神湯治五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸跳

動恍惚不定方

茯神

人參

菖蒲

茯苓

亦小豆

右五味以水一斗煮取一升半分二服

人參湯治風邪鬼氣往來發作有時或無時節者方

人參

防風

烏頭

乾薑

澤瀉

郭泰

枯藁根作枯神 狗脊 遠志 附子

黃芩 獨活各伍分 秦艽 牡蠣 五味子

山茱萸 前胡 細辛 石膏 芍藥

蜀椒 牛膝 甘草 石南 桑根白皮

桂心 麻黃 竹皮 白朮 橘皮各伍分

鬼箭千金翼作漏蘆 茯苓各伍分 大棗拾陸枚

右三十一味咬咀以水六升酒六升合煮取四升分五服日二夜一

虎睛湯 治狂邪發無常被髮大叫喚欲殺人不避水火方

虎睛 露蜂房 鳴頭各壹具 楓上寄生伍分

石長生各伍分 茯苓 桂心 防風各伍分

獨活 甘草 人參 天雄各壹兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升分四服初一

又方 防葵 人參 貫衆各伍分 防風 桂心各壹兩

右五味咬咀以水一斗煮取三升分四服稍服亦可

又方 苦參五斤蜜和丸如酸棗大單服十九

治卒發狂方

令患人著地仰卧以冷水終日淋其面良

治百邪鬼魅方

服頭垢小豆大

治魅方

水服鹿角末方寸匕日二

又方 水服鰓肝末日二

治狐狸諸色精魅作種種異狀令人恐怖狂癩風邪方

雄黃降斤

油膏斗威升

右二味破雄黃如棊子大鍋中以盆合頭作竈微火煎九日九夜不得少時火絕亦不得火冷須火熱微微不絕神驗

治風邪方

商陸根三十斤去皮細切以水八斗東向竈煎減半去滓更煎令可丸如梧子大服一丸合時勿令人見

葭菈方及大豆紫湯皆可服汗出佳葭菈方出此篇前紫湯見A卷

又方燒蝦蟇末水服方寸匕日二

又方燒人屎交酒服慎生火酢滑猪雞魚蒜等

又方以水服伏龍肝方寸匕日二

治諸橫邪癩狂針灸圖訣

卷之十七

十七

論曰九諸自邪之病源起多塗其有種種形相示表癩邪之端而見其病或有默默而不聲或復多言而謾談或歌或哭或吟或笑或眠坐溝渠噉食糞穢或裸形露體或晝夜遊走或噴罵無度或是蜚蠊精靈手亂目急如斯種種癩癩狂之人今針灸與方藥並主治之凡占風之家亦以風為鬼斷

扁鵲曰百邪所病者針有十二穴也凡針之體先從鬼宮起少針鬼信便至鬼壘又至地心未必須併針止五六穴即可知矣若是邪蠱之精便且言談論其由來往驗有實立得精靈未必須盡其命亦去與之男從左起針女從右起針若數處不言便遍穴針也依訣而行針灸等處並備主之仍須依掌訣檢自治之萬不失一黃帝掌訣別是術

邪狂

家秘要縛鬼禁劫五癩四瀆山精鬼魅並悉禁之有目在

人兩手中十指節間第一針人中名鬼宮從左邊下針右

邊出第二針手大指爪甲下名鬼信入肉二分第二針足

大趾爪甲下名鬼壘入肉二分第四針掌後橫文名鬼心

入半寸即大脚也第五針外踝下白肉際足太陽名鬼路火

針七銍銍三下即申脈也第六針大椎上入髮際一寸名鬼

枕火針七銍銍三下第七針耳前髮際宛宛中耳垂下五

分名鬼牀火針七銍銍三下第八針承漿名鬼市從左出

右第九針手橫文上二三寸兩筋間名鬼路即勞宮也第十針

直鼻上入髮際一寸名鬼堂火針七銍銍三下即上星也第

十一針陰下縫灸三壯女人即玉門頭名鬼藏第十二針

又澤橫文外頭接白肉際名鬼臣火針七銍銍三下此即曲也

穴第十一針古頭一寸當舌中下縫刺貫出舌上名鬼封

仍以一板橫口吻安針頭令舌不得動已前若是手足皆

相對針兩穴若是孤穴即單針之

邪鬼妄語灸懸命十四壯穴在口唇裏中央絃絃者是也

鬼名又用剛刀決斷絃絃者乃佳

邪病卧顛顛不自知風府主之一名鬼穴

邪病犬咬罵詈走灸十指端去爪一分一名鬼城

邪病犬咬罵走遠三里主之一名鬼邪

邪病鬼癩四肢重息上主之一名鬼門

邪病四肢重痛諸雜候尺澤主之 尺中動脈一名鬼受

邪病語不止及諸雜候人中主之 凡人中照先細

單下是也

公法狂癩不識人癩病眩亂灸百會九壯

狂走擊癩灸王枕上三寸一法頂後一寸灸百壯

狂走癩疾灸頂後二寸十一壯

狂邪鬼語灸天窻九壯 狂走癩疾灸大幽百壯

狂言恍惚灸天樞百壯 狂走癩癩灸季肋端三十壯

狂癩哭泣灸手逆注三十壯穴在左右手腕後六寸

狂走驚癩灸河口五十壯穴在腕後陷中動脈是明也

狂癩風癩吐舌灸胃管百壯不針

狂邪發無常被髮大喚欲殺人不避水火及狂言妄語

間使二十壯穴在腕後五寸臂上兩骨間亦灸驚現心

狂走喜怒悲泣灸臣覺一節隨年壯穴在脊上甲內側

手所不及者骨芒穴上捻之痛者是也

狂邪鬼語灸伏兔百壯 前使灸大窻九壯

悲泣鬼語灸天府五十壯

悲泣邪語鬼忙歌哭灸慈門五十壯

狂邪驚癩病灸承命三十壯穴在內踝後上行二寸動脈

上亦灸驚狂走

狂癩風驚欬逆心煩灸巨陽五十壯

狂癩鬼語灸足太陽四十壯

狂走驚恍惚灸足陽明二十壯

狂癩癩易疾灸足少陽隨年壯 翼云灸大敦

狂走癩啞如死人灸足大趾三毛中九壯

狂走易罵灸八會百壯穴在陽明下五分

狂癩驚走風 馬笑歌哭鬼語悲灸腦立風地

狂狂針灸法

陽明太陽太陰足陽明陽蹻少陽太陰陰蹻足厥陰

驚怖心忪少力灸大橫五十壯

狂風罵詈擗斫人名為執陽風灸口兩吻邊燕口刺赤白

際各一壯○又灸陰囊縫二十壯令人立以筆正注管

已卧核外上灸之勿令近前中邪核外害陽氣也

狂走刺人或欲自死罵置不息稱神鬼語灸口吻頭赤白

際一壯○又灸兩肘內屈中五壯 又灸背胛中間二壯

報灸之倉公法神效

鬼魅灸入髮一寸百壯○又灸間使手心各五十壯

狐魅合手大指縛指灸合間三七壯當狐鳴即瘥

卒狂言鬼語以旣帶急合縛兩手大指便灸左右脇下

蛋肋頭兩處火俱起各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐

金方

廿二

問之乃解其手

卒中即眩恍惚振慄灸鼻下人中及兩手足大指爪甲木

令艾丸半在爪上半在肉上各七壯不止十四壯炷如雀

屎大

風邪灸間使隨炷壯○又灸承漿七壯○又灸心輸七壯

○又灸三里七壯

卒狂思語斜其足大拇趾爪甲下入少許即止

風虛驚悸第六方二十一至二百

遠志

乾薑

白朮

挂心

黃耆

紫石

防風

當歸

人參

茯苓

甘草

芎藭

扶神

羌活

獨活

半夏各肆兩 大棗拾貳枚 五味子貳合

右十八味以水一斗二升煮取三升半分五服日三夜一

又方治中風心氣不足驚悸言語謬誤恍惚憤憤心煩悶耳鳴方

遠志 黃耆 茯苓 甘草

芍藥 當歸 桂心一方無 麥門冬

人參各貳兩 獨活肆兩 生薑伍兩 附子壹兩

右十二味以水一斗二升煮取四升每服八合人羸服五合日三夜一

茯神湯治風經五臟大虛驚悸安神定志方

茯神 防風各參兩 人參 遠志

二二〇六五 金方下丁 廿三

甘草 龍骨 桂心 活各貳兩

白朮壹兩 細辛 乾薑各陸兩 酸棗壹升

右十二味以水九升煮取二升分三服

又方治風虛滿頸項強心氣不定不能食方

茯神 麥門冬肆兩 人參 羌活 遠志

當歸 甘草 紫石 五味子貳半兩

防風 黃耆各參兩 生薑伍兩 酸棗叁升

右十四味以水一斗二升煮酸棗取一斗去棗內餘藥煎取二升半一服七合日三夜二

補心湯治心氣不足其病苦驚悸汗出心中煩悶短氣善

怒悲憂恐不自知常苦咽喉痛口唇黑嘔吐血舌本強不

通水漿方

風虛驚悸

紫石英

茯苓

人參

遠志

當歸

扶神深師

甘草

紫苑各一兩

麥門冬各一兩

赤小豆各一兩

大棗各一兩

紫苑各一兩

右十一味以水一斗二升煮取二升分三服

又方 治心氣不足多汗心煩喜獨語多夢不自覺咽喉痛時吐血舌本強水漿不通方

紫石英研

茯苓

人參

桂心各一兩

麥門冬各一兩

紫苑

甘草各一兩

大棗各一兩

赤小豆各一兩

紫苑各一兩

右九味以水八升煮取二升半分三服春夏服佳

又方 治奄奄忽忽朝發暮劇驚悸心中憧憧胃滿不下食陰陽氣衰脾胃不磨不欲聞人聲定志下氣方

人參

茯苓

遠志

甘草

枳實

當歸

龍齒

桔梗各一兩

半夏

桂心各一兩

黃耆肆兩

生薑肆兩

扶神貳兩

大棗貳拾枚

右十四味以水一斗二升先煮粳米五合令熟去

滓次內藥煮取四升一服八分日三夜二

又方 治心氣不足心痛驚恐方

遠志

蒲黃一兩

人參

茯苓各一兩

右四味以水一斗煮取三升半分三服

又方 治心氣不足腹背相引痛不能俛仰方或作傷心湯

茯神

黃芩

遠志

乾地黄各一兩

麥門冬各一兩

石膏各一兩

半夏

附子

桂心

生薑各一兩

甘草

阿膠

糖各一兩

大棗各一兩

右十四味以水一斗煮取三升去滓內糖

及膠更煎取一升一合分二服此方治心湯相重分

心湯治虛羸心氣驚悸多驚方

茯苓肆兩 桂心叁兩 甘草 芍藥

乾薑 遠志 人參各貳兩 大棗拾伍枚

右八味以水八升煮取二升分四服日三夜一

大定心湯治心氣虛悸恍惚多忘或夢寐驚悸志少不足

人參 茯苓 茯神 遠志 赤石脂

龍骨 乾薑 當歸 甘草 白朮

芍藥 桂心 紫苑 防風各兩 大棗貳枚

右五味以水一斗二升煮取三升半分五服日

三夜二

治驚勞失志方

金方一〇一 四五

甘草 桂心各兩 龍骨 防風 麥門冬

牡蠣 遠志各壹兩 茯神伍兩 大棗貳拾枚

右九味以水八升煮取二升分二服相去如人行

五里又再進

荆瀝湯治心虛驚悸不定羸瘦病方

荆瀝貳升 茯神 白鮮皮各叁兩

人參貳兩 白銀拾兩以水壹斗煮取叁升

右五味三味以咀以荆瀝銀汁中煮取一升四分三

服相去如人行十里又進一服

又方荆瀝一升緩火煎取一升六合分溫每服四合日三

夜一

心湯治風虛勞心氣不足喜忘恐怖神志不定方

服法如前

防風

當歸

大黃

麥門冬

澤瀉

大豆卷

白斂

芎藭

人參

桔梗

桂心

遠志

薯蕷

石膏

紫苑

乾薑

茯苓

白朮

甘草

粳米

大棗

附子

茯神

秦艽

右二十四味咬咀以水一斗一升先煮粳米令熟去滓

內藥煮取四升分服八合日三夜一千金翼不用

十九九加至

大鎮心散治心虛驚悸夢寤恐畏方

紫石英

茯苓

防風

人參

甘草

澤瀉

黃耆

秦艽

白朮

薯蕷

白斂

麥門冬

當歸

桔梗

大豆卷

柏子人

桂心

遠志

大黃

石膏

蜀椒

芍藥

乾薑

細辛

右二十四味治下篩酒服二方寸匕日三一方無紫石

茯苓澤瀉乾薑有大棗四分蜜丸如梧子酒下十五丸

又方治風虛心氣驚弱恍惚失常忽噴寒悲志意不樂方

紫石英

白石英

乾地黄

朱砂

龍齒

人參

細辛

天雄

附子

遠志

乾薑

茯苓

白朮

桂心

防風

右十五味治下篩酒服兩方寸匕日三

小鎮心散治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心神不定

湯外驚者方

風虛

人參 遠志 白朮 附子 乾地黃

赤小豆 桂心 黃耆 細辛 乾薑

龍齒 防風 葛蒲各別 茯苓肆兩

右十四味治下飾酒服二方寸七日三

鎮心圓治男子婦人虛損夢寤驚悸或失精神婦人赤白

注漏或月水不利風邪鬼注寒熱往來腹中積聚憂恚結

氣諸病方

紫石英 茯苓 葛蒲 茯苓 遠志

麥門冬 大黃 當歸 細辛 卷柏

大豆卷 乾薑各伍 防風 人參 澤瀉

秦艽 丹參各陸 石膏 芍藥 拍子人分

烏頭 桂心 桔梗 甘草 薯蕷各十

白欬 鐵精 銀屑 前胡 牛黃各

乾地黃分 白朮 半夏各別 蜜蠱拾貳 大棗伍

右三十五味為末蜜棗和搗五千杵丸如梧子大酒服

五九日三加至二十九一本無大豆卷大棗

天鎮心圓所治與前方大同凡是心病悉皆主之

乾地黃分 牛黃伍分 一用牛膠 羌活 桂心

麥門冬 秦艽 芎藭 人參 遠志

紫石英 丹砂 阿膠 甘草 大黃

銀屑 白欬 當歸 乾薑 防風各

杏仁 蜀椒各 澤瀉 黃耆 茯苓

大豆卷 薯蕷 茯苓 前胡 鐵精

拍子人伍 大棗肆拾 桑螵蛸拾壹枚

天鎮心圓

石平一...味為求...和九酒服七九日三加...

治心氣少弱驚悸怔忡中逆氣驚夢參...

恍惚方

紫石英 朱砂 茯神 銀屑 雄黃

菖蒲 人參 桔梗 乾薑 遠志

甘草 當歸 桂心各一分 防風 細辛

鐵精 防己各一分 一方用茯苓二分為十八味

右十七味末蜜丸如大豆飲服十九日三加至二十...

定志小圓 治心氣不定五臟不足甚者憂愁悲傷不樂...

忍喜忘朝羞暮劇暮甚朝發狂眩者方

菖蒲 遠志各一分 茯苓 人參各一分

右四味為末蜜丸如梧子大飲服七九日三加茯神為...

金方一

廿

茯神丸散服之亦佳

紫石酒 治久風虛冷心氣不足或時候怖方

紫石英一斤 鍾乳 防風 遠志 桂心略

麻黃 茯苓 白朮 甘草各一分

右九味咬咀以酒三斗春月漬五日每服四合日三亦

可至醉常令有酒氣

好志第七方十六首

孔子大聖知秘中

龜甲 龍骨 遠志 菖蒲

右四味等分治下節酒服方寸匕日三常服令人大健

千金方云 食後水服

治多忘令人不忘方

風濕...

萬蒲實分 茯苓 人參各一分 遠志各一分

右五味治下篩酒服方寸匕日二夜一五日後知神效

又方續斷各一分 遠志 萬蒲 茯苓各一分

右五味治下篩酒服方寸匕日二至老不忘

開心散治好忘方

遠志 人參各一分 萬蒲實分 茯苓實分

右四味治下篩飲服方寸匕日二

萬蒲益智圓治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳

目方

萬蒲 遠志 人參 桔梗

牛膝各一分 附子五分 茯苓一分 桂心一分

右八味為末蜜丸如梧子一服七丸加至二十九日二

金方十卷下 止丸

夜一禁如藥法

養命開心益智方

乾地黃 人參 茯苓各一分 茯苓

菟絲子 遠志各一分 蛇牀子實分

右七味治下篩服方寸匕日二忌兔肉餘無忌

北平太守方

天門冬實分 桂心 茯苓各一分 乾地黃實分

五味子 萬蒲 遠志 石韋各一分

右八味治下篩後食或酒或水服方寸匕三十日力倍

六十日氣力強志意足

治健忘方

天門冬 遠志 茯苓 乾地黃

右四味各等分爲末蜜丸如梧子大酒服二十九日三
加至三十九常服勿絕

治忘父服聰明益智方

龍骨

虎骨

遠志各等分

右三味治下篩食後服方寸匕日二

又方七月七日取葛蒲酒服三方寸匕飲不至醉

又方常以甲子日取石上葛蒲一寸九節者陰乾百日治

合下篩服方寸匕日三耳目聰明不忘出續州北

又方七月七日麻勃一升人參二兩爲末蒸令氣遍臨夜

卧服一刀圭盡知四方之事

又方戊子日取東邊桃枝二七枚縛著卧床中枕之不忘

又方常以五月五日取東向桃枝日未出時作三寸木人

著衣帶中令人不忘

又方丁酉日自往市買遠志裹著衣中角頭還未服之不

復忘

治人心昏塞多忘喜誤方

七月七日取蜘蛛網著衣領中勿令人知不忘

