



虹橋涉川足以為福田乎溱洧濟之不足  
為惠然成者有時而壞也紅粟振飢足以  
為陰德乎醫桑待哺不能家給然利者有  
時而病也人生天地間溥万物為一體參  
大造為全仁盍思所以廣其濟余每見人  
以疾痛為憂財匱者無力召鑿力到者無  
鑿能療雜藥徧嘗付性命於一擲未嘗不  
為之扼腕焉於是竊暇燈函研精脉法上  
稽靈素之書下及湯液之論張長沙鳴於  
漢孫地仙鳴於唐與夫晉宋而下諸賢之  
所撰次者搜覽迨盡將以推廣不忍人之  
仁就是而得三昧竊謂大科傷寒法度為  
甚嚴小科驚風方論為難盡傷寒治法表  
裏陰陽出入傳變若網在綱固不容紊若  
夫嬰兒驚風急轉而慢實俄而虛形似實  
非尤難臆度自非審脉驗證達變知幾鮮  
有不以嬰兒為戲此驚風証治指要之所由  
作也證以言驚風之狀治以言驚風之方  
指者直訣以曉人要者精義以致用王氏  
非無家傳然方粹而證不詳錢氏非無訣

法然義深而方難用是編所作本之前聖  
大賢之方論衆之聞人高士之見聞得之  
先疇已試之効虛實補瀉之辨其証參苓  
桂朮之隨其方覽者歷々可曉惠之方來  
傳之同志使據病可以識證因證可以得  
方為天下揆提回生立命起僊扶衰倘執  
此以登盧扁之門或可為消埃萬分之助  
周流人間衛生救物獨不得如封君達之  
用心乎徑刺諸梓嘉与四方共之庶幾廣  
濟於無窮也或曰子胡不私諸已為家傳  
計余應之曰喜捨方便釋氏書第一義也  
政使學者復之驟之推是以及人之幼百  
善南陽一書余嘗紬繹其說目曰活人經  
捨嗣此以求其傳堂上呼盧喝六作五小  
子則不敢知景定庚申開朔三山郡址后  
曹楊士瀛登父自序



新刊仁齋直指小兒方論目錄

環溪書院刊行



○卷之一



初生

○初生噤風撮口臍風方論

噤風撮口臍風證

風噤方

控痰散

益脾散

辰砂膏

僵蚕方

甘草湯

撮風散

蜈蚣方

蜘蛛方

牛沫方

立聖散

安臍散

傳臍方

臍風鏢口方

千金龍膽湯

朱銀圓

天麻圓

定命丹

○初生不乳證治

茯苓圓

治胎寒腹痛方

治惡穢入腹令兒嘔吐不止方



變蒸

○變蒸方論

變蒸證治

柴胡湯

紫陽黑散

紫圓子

當歸散

調氣散



驚馬

○急風慢風慢脾風總論

虎口三關紋訣法

驚風方論

驚風證治

全蝎散

羌活膏

來復丹

方見暑門

星香散

本事人參散

至寶圓

驅瀉散

雌黃散

消驚圓

壓驚圓

安驚圓

參砂膏

定心圓

○驚熱方論

驚熱證治

犀角湯

銀棗湯

清心圓

伏神圓

膽星圓

羚羊角湯

胎驚

○胎驚方論

胎驚證治

太一散

參蠟散

猪乳膏

全蠟散

朱麝散

獨活湯

朱銀圓

千金龍膽湯

定驚

○通關定驚方論

通關定驚證治

開關散

開牙散

嚏驚散

開關聖散

○截風定搐治法

人參羌活散見瘡門

一字散

陽癇散

擒風湯

定搐散

瀉青圓

木通散

清寧散

阿膠散

定命丹

利驚圓

防風湯

宣風散

枳殼散

小柴胡湯方見發瘧門

○治驚稍重下法

揭風湯

朱砂膏

疎風散

小柴胡湯

○治驚重下法

青金圓

天麻圓

蘆菴散

牛黃涼膈圓

青金丹

王監京墨圓

○和胃助氣治法

生氣散

銀白散

伏苓二陳湯

異功散

天麻蘇合香圓

天麻防風圓

蘇合香圓方見血

參苓白朮散

和中散

醒脾散方見

定志圓

溫膽湯

定心圓

百枝膏

○慢驚

○方傳慢驚證治

太一保生丹

聚寶丹

蟬蝎散

神保既濟丹

來復丹方見血氣類

王氏惺惺散

醒脾散

大醒脾散

温白圓

○已傳慢驚證治

星香全蝎散

定命飲

四聖散

烏蝎四君子湯

南星散

烏沉湯

沉香散

○慢驚下痰證治

天南星圓

蘇合香圓方見血氣類

白圓子方見血氣類

神保既濟丹方見前

礞石散

靈脂圓

七珍圓

○慢脾風生胃回陽治法

黑附湯

川烏散

金液丹方見血氣類

生附四君子湯

蝎附散

陰翳散

靈砂

震靈丹方見血氣類

○急慢脾風

○慢脾風下痰證治

神保既濟丹方見慢驚門

白僵蚕圓

辰砂膏

七寶妙砂丹

○急慢脾風證治

星蘇散

木通湯

神聖圓

虎蝎圓

南星醒神散

鎮心圓

木香湯

乳麝圓

太一萬金丹

香餅子

至聖保命丹

蟾蝎散

快脾湯

助胃膏

沉附湯

鎮痰圓

利痰圓

○客忤

○客忤方論

客忤證治

雄麝散

蘇合香圓

麝香飲

犀角散

安神圓  
馬尾方

伏龍肝方

千金龍膽湯

**驚風證治**

○驚積方論

驚積證治

辰砂膏方見風

青龍圓

朱銀圓

○天癆方論

天癆證治

釣藤飲

保命丹

○驚風內癆方論

附盤腸氣虫痛

驚風內癆證治

乳香圓

木香圓

白豆蔻散

蘿蔔子散

化虫圓

安息香圓

茴香散

芎歸散

養臟湯

**中風**

中風方論

五臟俞穴

中風證治

排風湯

小續命湯

交濟湯

攝生飲

星香飲

附子散

阿膠散

追風毒剉散

肥兒圓

星蘇散方見前

木通湯

通關散方見前

**痙症**

痙症方論

痙症證治

小續命湯方見中

防風溫膽湯

敗毒散

小柴胡湯

大承氣湯

麻黃葛根湯

桂枝葛根湯

理中湯

三生飲

**發癇**

○發癇方論

諸癇不治證候

風癇證治

散風丹

保安圓

獨活湯

細辛大黃湯

牛黃圓

○驚癇證治

比金膏

鎮驚圓

虎脂圓

七寶鎮心圓

清神湯

密陀僧飲

紫霜圓

妙聖丹

天麻圓

方見急心驚重下門

○定癇治法

錢氏五癇圓

南星散

方見已黃漫驚門

猪心湯

本事雌黃圓

蛇黃圓

懸癇圓

當歸大黃湯

蝎虎散

代赭石散

日應丹

地龍散

定癇圓

全蝎五癇圓

金朱丹

千金龍膽湯

見驚門

星朱散

猪膽南星散

肥兒圓

方見中風門

論髮際穴

論腦麝銀粉已硝等不可輕用

論蜈蚣有毒

○卷之三



# 疳

諸疳方論

諸疳證治

集聖圓

噯疳散

黃連肥兒圓

大蘆薈圓

脂連圓

五疳良方

胡黃連圓

至聖圓

通神圓

伏神圓

天麻圓

生熟地黃湯

地黃圓

走馬疳方

清肺飲

化匿圓

靈脂圓

下虫圓

龍膽圓

黃連圓

香冠圓

木香圓

褐圓子

黃耆湯

鱉血煎

蚶蚩圓

又方

十全丹

五珍圓

方見積類

揆癰圓

方見積類

小黃連阿膠圓

龍膽湯

○疳瘡方論

疳瘡證治

猪肚黃連圓



# 積

○積滯方論

木香圓

大異香散方見脹

和劑異香散

和劑流氣飲並腫門下積圓

五珍圓

挨積圓方見

辰砂膏方見風

青龍圓方見驚

朱銀圓方見胎

○痞結證治

聖惠甘遂散

○癖氣證治

木香圓方見

取癖圓

挨癖圓

代赭圓

# 熱

諸熱方論

諸熱證治

加味清涼飲

人參芎歸散

猪膽圓

龍膽草圓

清解散

○卷之四

# 傷寒

○傷寒方論

傷寒證治

桂枝麻黃湯

香蘇散

升麻葛根湯

小柴胡湯方見

理中湯方見

甘露飲

四順飲並見

五苓散方見

參蘇飲方見

人參羌活散方見

人參潤肺湯方見

紫霜圓方見

人參敗毒散

# 寒瘧

寒瘧證治

常山散

# 虛寒

虛寒證治

地黃圓方見

# 虛汗

虛汗證治

團參湯

撲汗方

痰嗽

○痰涎證治

奪命散

風痰證治

青州謝家白圓子

朱砂圓

交泰

○咳嗽喘嗽證治

人參枳實湯

杏仁膏

紫苑湯

脾胃

胃氣虛實證治

和脾胃進飲食證治

吐瀉

○嘔吐證治

半夏散

消乳丹

益胃散

○吐瀉證治

不換金正氣散

方見寒類

雞舌香散

交泰散 又真方

○泄瀉證治

肉蔻散

鍾乳震靈丹 方見木香益黃散

○瀉痢證治

腹痛

沒石子圓

赤痢肚熱方

腹痛證治

蘇合香圓 方見穀門

桔梗枳殼湯 方見氣門

四順清涼飲 見積熱門 指迷七氣湯 方見氣門

腫脹

○腫脹證治

○陰腫證治

母蟻散 又方

葶麻散

分氣飲

桃仁圓

傳藥

大小便證治

○遺尿證治

○尿白證治

雞腸散 又方

伏苓散 又方

○諸淋證治

葵子散

導赤散

尿血方

○大小便不通證

沒藥散

○脫肛證治

龍骨散

# 丹毒

丹毒證治

敗毒散方見類

又方

## 吐血

吐血衄血證治

蒲黃散

地黃汁方

鼻衄方

# 雜證

○顛陷證治

顛填證治

解顛證治

錢氏地黃圓又方

口舌證治

口角瘡爛方

重舌證治

木舌證治

滯頤證治

喉痺證治

喉痺腫痛方

語遲證治

菖蒲圓

夜啼證治

鈎藤散又方

眼病證治

眼睛白膜方

耳病證治

龍骨散

月蝕耳方又方

龜背證治

龜背證治

臍病證治

安臍散

臍瘡方

○鶴節證治

行遲證治

地黃圓方見腎門

虎骨圓

五加皮散

癩疔證治

五苓散方見水

當歸散

川練散

○藜蘆證治

鯽魚方又方

漏瘡方

諸瘡久不瘥方 瘰癧瘡方 魚臍瘡方  
蠟螻瘡方 癬方 前甲散

○卷之五

○瘡疹

瘡疹方論 瘡疹備論 瘡疹證候

壞瘡治法 論升麻葛根湯 瘡疹惡證

瘡疹證治 參蘇飲 惺惺散

升麻葛根湯方見類 人參敗毒散方見類 化毒湯

消風散方見頭 加味四聖湯 紫草飲子又方

紫草木香湯 紫草木通湯 快斑散

絲瓜湯 犀角地黄湯 大連翹湯

人參羌活散方見頭 天麻防風圓 甘露飲方見續

五苓散方見水 小柴胡湯方見類 四順清涼飲方見續

大如聖湯 鼠粘子湯 麻黃黃芩湯

桔梗枳殼湯方見類 二陳湯方見類 甘草散

烏梅湯 木香理中湯 甘草乾薑湯

獨聖散 宣風散 五福化毒丹

加味宣風散 調解散 不換金正氣散

黃柏膏 豆皮飲 螻蛄散

治諸眼昏翳 斑斕方 扁鵲油劑方又方

灌藥服藥法 察小兒眼中神法

新刊仁齋直指小兒方論卷之一

三山名醫仁齋楊

建安儒醫華峯詹

宏中

洪道校定

登文撰次

初生

小兒病證惟驚疳瀉痢四者難治古語有之急慢脾風與夫諸風種類余於驚風證治指要言之詳矣諸疳方論於此又詳備焉所闕者惟瀉痢兩件而已然小兒病狀亦不止乎瀉痢如直指方論前後編集諸病證治小兒類有之但病各有原治各隨證由博而約不過大人方法推之也雖然小兒多熱用藥不可過溫惟小小分劑調而平之母至以藥勝病則得之矣其他嬰幼證類大人所無者併與各方駢集于後

初生噤風撮口臍風方論

小兒初生

初生噤風撮口臍風是三者一種病也噤風者眼閉口禁啼聲

漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中感受熱氣流毒於心脾故形見於喉舌間也抑亦生下復為風邪擊搏致之自滿月至百二十日見此名曰犯風噤依法將護防於未然則無此患○撮口者面目黃赤氣息喘急啼聲不出蓋由胎氣挾熱兼風邪入臍流毒心脾之經故令舌強唇青撮口撮面飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可救藥其或肚脹青筋吊腸疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法貴乎疎利撮口最為惡候一臍內見之尤急○臍風者斷臍之後為水濕風冷所乘風濕之氣入於臍而流於心脾遂令肚脹臍腫身躄重着四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發為風搐若臍邊青黑撮口不問是為內搐不治爪甲黑者即死其或熱在胃堂伸引弩氣亦令臍腫可與千金前臍湯如前三者受病之源非一朝夕大抵裏氣鬱結壅閉不通並用取下胎毒天

定命丹 朱銀圓 量與之 小兒始生其氣也

盛若有微患即須下之若不時下則成大疾疾成則難療矣

**可量用之** **深圓子** 方見亦交蒸明

噤風撮口 膈風證治

**風藥方** 先用**逐痰散**吐風涎次與**益脾散**和胃又用**辰砂膏**利

驚即愈或手捉拳噤口不開者不治

**逐痰散**

蝎尾

銅青 各半錢 朱砂 壹錢

膩粉 壹字

麝 少許

右為末每服壹字臘茶清調下先吐風涎然後和胃或後段

**益脾散** 吐痰隨輕重用

**益脾散**

白茯苓

人參

草果

木香 濕熱畏熱

甘草炒

陳皮

厚朴製

蘇子炒

右等分為末每壹錢薑棗煎服

**辰砂膏**

辰砂 叁錢

鵬砂

馬牙硝 各壹錢半 玄明粉 貳錢

全蝎

真珠 末各壹錢

麝 壹字

右為末和畢用好單包起自然成膏每服壹豆粒許治諸驚

**金銀薄荷湯** 下潮熱 **煎草湯** 下月內用 **乳汁** 調傳妳上令吃下

**僵蚕方** 治撮口

直僵蚕貳枚去茸略炒為末蜜調傳唇口中

**甘草湯** 治撮口取吐

甘草 生壹錢

右剉煎服令吐出痰涎却以**豬乳**點入口中即瘥

**撮風散** 治撮口

赤脚蜈蚣 半條炙

釣藤 壹分 朱砂

直僵蚕 焙

血蝎梢 各壹錢 麝 壹字

右為末每服壹字取 **薄荷** 調下 **竹瀝** 解熱

**治口噤不開不能收乳**

赤足蜈蚣半枚去足炙令焦

右為末入麝香少許以酒一合和之分服酒主小兒口

噤不開最良

**治口噤不開不能吮乳**

蜘蛛壹枚去足及口炙令焦細研

右用酒一合調和為齋服徐徐灌之神妙牙疳亦用蜘蛛

并麝香

**取東行半口末塗兒口及額上即效**

**聖散**治小兒口噤

蝎梢七箇 乾蜘蛛

右同末研極細入酒少許每壹字用乳汁調時時滴入口中

**安胎散**小兒斷臍後便傳之

赤蜈蚣一錢 鈴羊角一錢 亂髮一團 燒令烟散

麝少許 雀籠三枚

右為末斷臍後便傳之

**傳臍方**

瓜蒂 南星 白斂 赤小豆等分

右為末每叁錢用芭蕉日然汁調傳臍四邊

**臍風鏤口方**

金頭蛆五箇 蝎梢五箇 直僵蚕七箇 瞿麥半錢

右為末壹字吹入臍內啼則可醫仍用傳臍方調壹字服

**千金龍腦湯**方見胎驚門

**朱銀圓**方見胎驚門

**天麻圓**定命丸急驚下劑

初生不乳證治

嬰兒初出胞胎其聲未發急以手拭按其口令惡血淨盡不得下咽則無他病若拭口不煎心入腹則腹滿氣短不能飲乳

或產婦取冷過度胎中受寒則令兒腹痛不肯飲乳惡穢入腹  
宜用伏苓圓

赤伏苓

川黃連

去鬚枳殼炒

右等分為末煉蜜圓桐子大每壹圓乳汁調灌下

治胎寒腹痛方

木香

陳橘皮

檳榔各一分辣桂

川白薑生

甘草炙

各半分

右末取壹捻水煎以綿蘸與之

治惡穢入腹令兒嘔吐不止方

木香

乾薑生

伏苓

甘草綿

一分

酸木瓜

丁香

各半分

右薤末壹捻水煎以綿與之

# 變蒸

變蒸方論

變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形軀成就是五臟之變氣而  
七情之所由生也三十二日一變其後三大蒸總五百七十有  
六日變者上氣蒸者躰熱每經一變情態即異輕則發熱微汗  
其狀似驚重則壯熱脉亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕者五  
日解重者七八日解其候與傷寒相若亦有變蒸之餘續感寒  
邪者但變蒸則耳冷尻冷上唇發泡狀如濁珠若寒邪搏之則  
寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲日夜不絕變者易也蒸於肝  
則目昏微赤蒸於肺則嘔嗽毛聳凡五臟六腑筋脉骨節皆循  
環一匝各有證應其陰陽水火之變歟治法和平之劑微表熱  
實者微利之或不治亦自愈

變蒸證治

柴胡湯治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參

甘草微炙

麥門冬

柴胡各二錢



龍膽草

防風 各壹錢

右劉散每服參字煎服

**解利執氣**

麻黃 壹兩 不去節

大黃 半兩

杏仁 去皮

右件同一處搗和並略燒存性再以杏仁少許研膏和之密

器盛每用壹豆許乳汁和咽之

**疎利積氣實執**

代赭 言兩 煎碎

赤石脂 半錢

巴豆 臍上 炒過板

杏仁 伍拾箇

右代赭先搗末和杏仁搗三千杵若硬加蜜少

許更搗圓如粟米大用密器收每服貳圓以乳汁送下如更

有熱不泄明日再與二圓此藥兼治驚積痰癆食癩温壯諸疾

**當歸散** 治變蒸有寒無熱

當歸 貳錢

木香

官桂 辣者

甘草 炙

人參 各壹錢

右劉散每服壹錢薑棗煎服

**調氣散** 治變蒸吐瀉不乳多啼

木香

香附

厚朴 製

人參

橘皮

藿香

甘草 炙

各壹錢

右為末每服參字薑棗煎服

# 驚

急風慢風慢脾風總論

小兒急慢驚風古所謂陰陽痲是爾急者屬陽陽盛而陰虧慢

者屬陰陽虧而陰盛陽動而燥疾陰靜而遲緩其始也皆因臟

腑虛而得之虛能發執執則生風是以風生於肝痰生於脾驚

出於心熱出於肺而心亦主執天官救醫注云肺氣熱於心

之驚風痰熱食為四證四證已具八候生焉搖擗掣顛反引

口八候 凡搭眼搖頭張口出手唇紅臉赤面青眼青唇青

青太陽髮際印堂青筋三關虎口紋紅紫或青者皆驚風狀也

大抵執論虛實證別逆順治有後先蓋實執為急驚虛執為慢

驚慢驚本無執所以發熱者虛使然爾急驚屬陽用藥以寒慢

驚屬陰用藥以溫甚不可以陰陽無別故曰熱論虛實者此也

男搖左視左女搖右視右男眼上竅女眼下竅男握拇指出外

女握拇指入裏男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此

皆順反之則逆亦有先搖左而後雙搖者但搖順則無聲搖逆

則有聲其指紋形勢彎弓入裏者順出外者逆出入相半者難

痊 目屬肝肝受風熱則目直視或上竅或兩皆顛搭若無臉赤

五心煩熱之證却不發搖必挾心熱則肝風心火二者交爭而

發搖也但竅視直視者與瀉青圓更加發搖者以瀉赤散兼之

大抵用風心火乃急驚受病之與瀉青圓去肝風導赤散降心

火幼勿新書以為要藥 故曰證別逆順者此也 陽病陰勝陰病

陽勝亦反 熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搖治搖先於

截風治風先於利驚治驚先於豁痰治痰先於解熱其若四證

俱有又當兼施並理一或有遺必生他證故曰治有先後者此

也綱領如此若析急慢脾風而言之則暴烈者為急驚沉重者

為慢驚而慢脾則重而深矣急驚之候牙關緊急壯熱涎潮竅

視反張搐搦顛動 弱者十指開合 唇口眉眼引頻併口中熱

氣頰赤唇紅大小便黃赤其脈浮數洪緊蓋由內有實熱外挾

風邪心家受熱而積驚肝家生風而發搐肝風心火二臟交爭

血亂氣并痰涎壅塞所以百脈凝滯關竅不通風氣蓄盛而無

所泄故暴烈也治法大要用藥有序通關以後且與截風定搐

痰熱尚作迺下之痰熱一泄又須急與和胃定心之劑如搐定

而痰熱無多則但用輕藥消痰除熱可也然急驚雖當下切不

可過用寒涼及 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉

瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉

瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉

瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉

瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉 瀉瀉

而用或當用而過焉往往由此成慢驚矣下痰熱不可用  
粉巴硝但能困酌大黃可也欲下之法須當審問前人已下未

下或曾經吐瀉否已下及吐瀉者不可再下但驅風化痰消熱  
而已大約痰熱十分且泄其三之二下劑中須以枳殼實

氣通心之類佐之蓋急驚急在一時治之不可寬緩稍緩則證  
候轉深若一時體認未明又不可妄施藥餌○截風定搐先與

**通關**噴驚輩次則又參羌活散**截風圓**一字散散**搐風湯**  
定搐散散**清寧散**散**阿膠散**以意擇用○下劑有三

輕下則用**定命丹**利驚圓**防風湯**宣風散**枳殼散**小柴胡湯輩  
○稍重下則用**揚風湯**朱砂膏散**陳風散**柴胡加大黃湯輩○重

下則用**青金圓**天麻圓散**牛黃涼膈圓**青金丹**玉照驚墨**  
**圓**輩○下後和胃助氣如生氣散**銀白散**茯苓**陳湯**異功散

**天麻蘇合香圓**參苓白朮散和牛散**醒脾散**之類皆可選用○  
定志寧神則以**定志圓**溫膽湯定心圓**百枝膏**與之他如**大**

**保生丹**聚寶丹神湯散不冷不熱祛風鎮驚之劑又當繼此以  
防其再發也下之後諸證猶存者未易痊愈更勿再下當作慢

驚理之○其有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎者未可  
直指以為驚風恐是傷風傷寒傷食成三等證或夾驚而成如

錢氏假搐之說傷風夾驚神困昏降頭夜氣蘇先用人參羌活  
散惺惺散消風散輩微取其表次與**天麻防風圓**傷食夾驚身

熱溫壯或吐不思食大便酸臭先用人參羌活散加青皮紫蘇  
取表消積次用驅風鎮驚之劑凡搐搦者不可把握但扶持之

否則風癇逆入經絡遂使手足拘攣以成廢疾此治急驚之大  
要然也慢驚之候或吐或瀉涎鳴微喘眼開神緩睡則露睛驚

跳搐搦乍發乍靜或身熱或身冷或四肢熱或口鼻冷氣面色  
淡白淡青昏閉辰間或青或紫其脉沉遲散緩蓋由急驚過用

寒涼或轉下太驟傳變成之又有吐利不止而成者有氣虛暴  
吐瀉而成者錢云夏月脾胃伏熱大吐瀉者當解暑熱不可專

吐瀉而成者錢云夏月脾胃伏熱大吐瀉者當解暑熱不可專

固陽有臟腑虛洞油成者此邪入於腸胃故大便不聚而瀉

有久痢氣脫成者有下積取瀉成者有吐血瀉血成者有感風

不解誤藥成者有傷寒傳變陰證成者有得之久嗽作痢者有

得之發癇不已者有得之虫積衝心者有得之如腫心氣腹痛

者其或日夜汗出脾困多睡煩燥引飲四肢浮腫大小便閉丹

瘤腫毒龍帶躐腰走馬急疝並傳慢候惟吐瀉積痢成虛致之

則證變甚速經吐瀉便是慢驚須用溫中扶裏或搐來緊急

乃慢驚初傳尚有陽證不可誤作急驚用藥世言搐慢為慢驚

非也若泥此往往指慢脾為慢驚矣凡慢驚男子以瀉得之為

重女子以吐得之為重治法大要須當審問源流不可槩曰慢

證如吐瀉得之則用中湯加木香以溫其中五苓散以導其水

臟寒洞油得之則先與宋附湯下積取轉得之則先與調氣散

外感寒邪得之則先與桂枝湯董其他可以類推矣然

慢驚雖屬陰亦須準較陰陽虧盛淺深如何不可純用溫藥及

燥烈太熱之劑惟於生胃氣中加以截風定搐如金匱花柳膏

白附天麻南星葷為良。方傳慢候而尚有陽證者八候尚

在不必回陽但與截風調胃可冷可熱均平陰陽而已天一保

生丹聚寶丹神保散濟丹采復丹王氏慢驚散醒脾散

驚無搐掣反引竄視之證而但昏沉者與星香全蝎散定命散

四聖散烏鴉四君子湯天南星散烏沈湯流香散之屬。若手

足冰冷者方可回陽用疏東附子。慢驚下痰身煖者天南星

圓蘇合香白圓子痰盛者神保散濟丹靈石散虛甚而不可下

痰者靈脂圓七珍圓如腦麝銀粉已霜寒涼通關利腸葷一切

禁止麝雖溫然性屬陰能化陽通膈其有陽已傳陰或者不知

但見引搐誤用腦麝銀粉及寒涼葷必為慢脾陰逆若慢驚之

候其眼半開半合則當預作慢脾風調理之於斯時也陰氣易

盛陽氣易微時刻少延則藥力不及類併投藥則勢又不可終

進一二劑須審有無傳變稍定則和平為愈勢篤則以剛劑投之此治慢驚之大要然也。慢脾風之候面青額汗舌短頭低眼合不開困睡中搖頭吐舌煩嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不收或身冷或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若療驚則無驚可療但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯然爾世所謂慢風難療者慢脾風是也然慢脾一名虛風凡小兒或吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因虛而發熱繼此必得慢脾風纔見搖頭斜視以手摸人昏困喜睡額上汗多身亦粘汗其脈沉小而焦即是脾風之證不必皆由急慢風傳次而至又當識之治法大要生胃回陽黑附湯。烏散。金液丹。白圓子。各半。生附四君子湯可斟酌用胃氣漸復則吳功散。葷溫平而調理之如竭附散。陰瀉散。靈砂。震靈等亦可參用。若其眼半開

半合手足不冷證候尚在慢驚則勿用回陽。或已入慢脾而陽氣未甚脫者亦不可用。疏黃。附子。凡服回陽湯劑手足漸煖者仍以醒脾散等繼其後以調之。○慢脾下痰輕者蘇保赤。升。白圓子。重者。辰砂膏。甚則。七寶妙砂。矣。慢驚慢脾逆惡證候諸藥不效者如有太衝脉則取。白會穴。灸之此治慢脾風之大要然也。灸百會穴詳具于後。雖然小兒有病問之則勿不能

言望之則易驚易喜診之則或惕或動自六歲以下黃帝不載其說者以其難也又况驚風一科古無全書則尤為難如前所云固足以知二證之詳矣至於辨析體認通變之際有言而不能盡其蘊者可不深加之意乎驚風一也。痲痲發癇卒中天動撮口亦風之種類焉。○痲者手足冰冷。○痲者舉身僵仆。○痲者

病當以陽剛陰柔別之剛者有汗柔者無汗肢體強直腰身張甚於風癇大抵不治。○痲者目睛涎流神氣鬱勃四體不沉默昏潰似死似生其聲惡叫。身重睛醒有聲者為痲身強

不醒無聲者為逆症凡治驚風過咬不啼叫者須通心行小便

劑癰亦多種錢氏有牛羊雞犬猪之說大抵以風驚食三證別

而治之○**中國**者五臟各有脈證隨五臟俞以施灸法與大科

則同特小小分劑耳○**天**者身體壯熱翻眼擡精手足搐掣

其狀如魚之上釣又內筋腹痛多啼唇黑陰腫福樓反張眼有

紅筋如血乃寒氣壅結兼驚得之○**撮口**者一臟內之篤疾臍

風胎風鎖肚吊腸疝俱至撮口蓋風入心脾故令小兒氣促

口撮如囊而不乳也○其有初生百日頻頻吐乳呵來噴去睡

裏多驚眼翻肚脹手足緩怠煩燥多啼者當作胎驚風理之○

又有變蒸亦發微驚不治自愈○又瘡豆欲發亦或搐掣如風

右臍冷脚冷尻冷耳後有紅脈赤縷者必是瘡豆之證戒不可

以**開**及**轉**下而水壓之是辨析之不可不審

也至若眼陷無光白睛灌人瓜甲青黑四體垂躄一臟氣絕不

可勉強下藥面赤如緋面青背冷頭目仰後足冷目青腹脹胃

高手擊胃膈唇舌鼻黑魚口氣麗顛腫顛坑啼哭無淚冷汗不

止汗出如珠如油眼青瀉黑血悶涎入心肺噓舌出口咬人五

硬五軟五冷五乾皆惡證也○**急驚**眼睛翻轉口中出血兩足

擺跳腹肚搐動或神緩而摸體尋衣或證罷而神昏氣促噴菜

不下通關不噯心中痛絕忽大叫者難愈○**慢驚**四肢厥冷吐

瀉加嗽面黯唇慘胃痛鴉聲兩脇動氣口生白瘡胃閉損也髮

直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎口眼手足一邊牽引者難痊○**慢**

**脾**身冷粘汗直卧如尸喘嗽頭軟大小便不禁背母口噤頭搖

者最難為力○或者慢驚欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸

麗大脉來浮數是謂陰盛強陽錯認以為陽氣已復直與峻藥

下痰痰隨藥下氣隨痰絕人以醫殺咎之此則不識覆燈將絕

之後兩日再發面色變易又三四日定而復發其後淹延必至  
沉重若急驚證候徒知定搐不去驚熱纔見搐定遂指為安未  
幾復搐是為過街候。若慢驚之候藥服已瘥尚虛之數日未  
省者或妄攻之則前功俱廢是體認之不可不精也。其或傷風  
傷寒傷暑傷濕傷食停積疳積勞煩渴燥腸肌弱諸瘡有證皆因  
之而發風須當體認隨其證療其病正病去則風自去矣按錢

氏方小兒發搐身執喘急目斜露睛四肢逆冷李醫藥以定驚  
搐一劑與之殊無主對錢遂別之曰發搐為肝實身執喘急為  
肺虛目斜露睛為肝肺相勝四肢冷為脾虛治法先用益脾補  
肺胃氣稍復然後瀉肝涼驚而安。一證直視而不能食或謂  
神祟使然錢知其為肝旺勝脾與之瀉肺而愈。一證吐瀉或  
利小便過多以致脾虛不食錢用益脾散作效已經數日忽爾  
不語眾醫類以**天音湯**劑主之竟無寸效錢氏用**補腎丸**數劑  
補腎於是能言所以然者前乎清利小便太過遂使脾腎俱虛

雖已補脾而腎尚虛故爾。○至論肺虛痰實治法當下故下之  
必先益脾然後瀉肺。經云欲瀉其子先補其母此錢氏要訣錢  
氏方

白濁丸補五臟藥。○心中驚熱清心而熱

不退則與之助胃胃不虛則熱不生或胃虛不食又且大小便  
難則不為之疏利蓋利之則胃愈虛而身必冷。○其有傷風寒  
而吐瀉者欲止吐瀉不特溫脾須以發散之劑先之風寒散而  
吐瀉自止矣不特此爾小兒平常服藥過多頑玩臟腑調和之  
劑不愈則易之以攻擊固守之劑太過則時乎而疏利主治在  
我不可不問源流不可偏徇病家所欲圓機達變消息輕重而  
應之是通變之不可無法也大槩小兒臟腑柔嫩易實易虛易  
冷易熱兒有大小壯弱病有輕重淺深所貴乎目視指切意度  
心惟醫權藥衡斟酌對治用之得中為上矣

虎口三關訣法

虎口者义手髮是也三關者第二指之三節是也除丹指為第一

一指近虎口第一節為初關亦名風關第二節為中關亦名氣

關近指端第三節為末關亦名命關男以左手女以右手側看

之驚風初得紋出虎口或在初關多是紅色傳至中關色赤而

紫看病又傳過其色紫青病勢深重其色青黑青而紋乱者病

深重若見純黑危惡不治大抵紅者風熱輕赤者風熱盛紫者

驚熱青者驚積青赤相半驚積風熱俱有主急驚風青而淡紫

伸縮來去主慢驚風紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主

慢脾風凡手紋在初關者易治過中關者難治透末關者不治

三關直透大抵不治然紋勢彎曲入裏者病雖重而證順猶可

用力若紋勢弓反出外駁駁靠於指甲者斷不可回其有三關

紋如流珠流米三五點相連或形於面或形於身危惡尤甚○

陽為男陰為女三關虎口紋男以左手女以右手驗之蓋取左

手屬陽男以陽為主右手屬陰女以陰為主耳然男女一身均

具此陰陽左右两手亦當參驗左手之紋病應心肝右手之紋

病應肺脾於此消息又得變而通之之意

驚風方論

驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去其瀉必青漸生風而未至

風也驚邪入心則面紅臉赤惕惕夜啼驚邪入肝則面目俱青

眼睛窳視驚邪入腎則面黑惡叫噤妳咬牙驚邪入肺則面色

淡白喘息氣乏驚邪入脾則嘔吐不食虛汗多睡面色淡黃據

脉觀之虛則散而濡實則數而駛治法鎮驚化痰安神定志亦

須究竟其臟受病之處而調理之然有所謂溫驚有所謂利驚

有所謂涼驚虛者溫之實者利之熱者涼之是為活法睡中驚

啼聲浮者易治聲沉不響者難痊

驚風證治

全蝎散治小兒驚風不語通 豁痰大人通用  
全蝎柒枚各用紫蘇葉 塗蜜灸重包又塗蜜灸



右細末每服壹字薑汁入蜜搜和含化

**赤伏苓** 治小兒驚風痰涎

天麻

赤伏苓各半 羌活

防風各二分半

人參

全蝎

朱砂研

明硫黃

水銀各一分

右流膏水銀同研如泥次以染味末夾和煉蜜圓皂子大每

壹粒薄荷湯調下

**治小兒驚風昏塞**以貳參圓薄荷泡湯研灌

下得泄即愈凡驚風對證用藥已效若覺未甚蘇省可與

**丹圓數酌量用**

**星香散** 治小兒急慢風搐搦窺視涎潮

南星圓白者 木香

橘紅各半 全蝎一枚

右剉細入薑錢肆片慢煎熟灌下大便出涎即愈

**大書人參散** 治慢脾風神昏痰盛

人參半兩

圓白大南星一兩切片以生薑汁并漿水各半陰蒲黃帶性曬

右末每壹錢水壹盞薑參三片冬心仁搗細少許同煎取半盞

作兩叁次灌下

**至寶圓** 治小兒驚風痰熱

螺青半兩

京墨四分

巴豆去油

北五靈脂二分半

輕粉

腦各半

史君子

十四箇連殼煨取肉

麝一字

飛白麵三分

右末并水搜圓桐子大每壹圓水研下

**驅疳散** 治諸疳口眼相引上視涎流手足抽掣頭項反張腰背

強直

朱砂研

雄黃研

蛇皮炙黃

石膏煨通紅出火毒一宿各一分

蜂房炒

遠志取肉薑

細辛去苗土

麻黃去節

直僵蚕炒

川大黃生

川芎

獨活各一分半

右末每壹錢鈞藤入少蜜煎湯溫

調灌大兒增用

抄寫以

又方

雄黃

朱砂 等分

右末每壹錢猪心血夾壅水調下

**雌黃散** 治顛癇方發癩癧嚼舌眼暗聾惡

雌黃

黃丹

微炒 各一兩 麝一分研

右細末用**牛乳**半升撥熬成膏即入上項藥築和杵參伍

伯下圓如麻子大每參肆圓温熟水下日三服

**消驚圓** 治諸驚

人參

天麻

伏苓

朱砂

全蝎 焙

直僵蚕 炒

羚羊角

犀角 各一分

牛膽釀南星 四分

麝 少許

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓昌蒲煎湯調下

**壓驚圓** 治諸驚虛惕定心鎮痰所謂重可去怯之劑

紫石英

代赭石

蛇黃

各燒紅 鐵粉 各一分

朱砂

龍齒

白附 焙

遠志肉 薑汁浸炒

右為末研極細稀麪糊圓桐子大每服壹圓金銀煎湯調下

凡煨石藥以裂為度不拘遍次研十分細

**安驚圓** 治諸驚風癇或大聲異物驚忤打墜不省人事並主之

遠志肉 薑汁

淨鐵粉

朱砂

人參

伏神 各半兩

全蝎 薑汁

南星 中者一箇薑汁

浸一宿切細焙

白附子 各炮二分半

花蛇頭 酒浸

麝 半分

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓昌蒲燈心煎湯調下 **建陽**

劉宗素議方

**參砂膏** 通心氣除膈熱去痰壅

朱砂

人參

南星 炮

伏神

遠志肉 薑汁

天麻

白附子

僵蚕 炮 等分

鵬砂 半倍

麝 少許

右為末煉蜜為膏桐子大每服壹圓冬湯調下

定心圓 溫驚用此

伏神 白附子炮

南星炮 人參

遠志肉薑製 蝎梢各一分半 直僵蚕十個 乳香三字

右為末牛膽汁圓桐子大每壹圓金銀煎湯調下

# 驚馬熱

驚熱方論

驚執著內蘊實熱鬱勃發驚甚則搐掣變而癇耳治法疏導熱氣利驚定心亦有變蒸微驚以其熱成得之但與輕藥或不治亦自愈

驚熱證治

犀角湯 治心驚熱盛

犀角 防風 木通 赤茯苓

桑白皮炒 甘草炙等分

右剉細每參字水煎服

銀葉湯 治驚熱潮熱

麥門冬 地骨皮 遠志肉薑製 人參

伏苓 防風 甘草焙 大黃溫紙煨

右為末每半錢煎服

清心圓 治驚熱煩燥

人參 伏神 防風 朱砂

柴胡各一分 金箔三十片

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓竹瀝調下

伏神圓 治壯熱發驚發瘵直視

南星 胡黃連 天麻 伏神各三分

青黛 牙硝 朱砂各一分 麝一字

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓石膏蒲刺不煎湯調下

瞻星圓 鎮心厭驚利痰解熱

牛膽南星兩半朱砂

防風各二分麝一字

右用臘月黃牛膽汁和南星末作餅子掛當風處四十九日和下項藥末研細浸牛膽皮湯為圓如桐子大每服壹圓并花水調下

**羚羊角湯**治諸驚壯熱

羚羊角

蟬殼

半分

伏神去心

麥門冬

柴胡

地骨皮各一分

黃芩

甘草炒半分

右劉散每壹錢薑棗煎服



# 胎驚

胎驚方論

胎驚

胎驚風以胎婦調適乖常飲酒嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於胎故子乘母氣生下即病也其候月內溫壯翻眼握拳噤口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐掣驚啼腮縮顛開或頰赤或面青眼合胎風眼合不可誤作慢脾妄用溫藥其有着噤撮口之類亦此一種之所發也視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若黯黑青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治紋反出外者不治治法解散風邪利驚化涎調氣貼顛甚則以朱銀圓利之

胎驚證治

**六一散**治胎驚

天漿子去殼

南星

白附子各微

天麻

防風

伏苓各一分

全蠍

朱砂各一分

麝少許

右為末每服半錢乳汁化下

**參蠟散**治胎驚定心神

天漿子

天竺黃

人參

朱砂

全蠍

天麻

蟬殼等分

麝少許

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓金銀湯下

**猪乳膏** 治胎驚最妙

琥珀 防風 一分 朱砂 半分

右為末猪乳調壹字拭入口中

**全蝎散** 治諸驚胎癩

全蝎 箇焙 琥珀 朱砂 各少許

右為末每服壹字麥門冬煎湯調下

**朱麝散** 治胎風心熱痰壅

人參 朱砂 各一分 牛膽南星 天竺黃

牙硝 鐵粉 各半分 麝 少許

右為末每服壹字生薑薄荷湯調下

**獨活湯** 治胎驚發散風邪

羌活 獨活 各一分 檳榔 天麻

麻黃 去節 甘草 炙半分

右剉散每服半錢水煎服於內加**南星**蜜調可貼顛用

**朱銀圓** 治胎風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之毒亦治

驚積但量用之

水銀 一錢 蒸棗肉研如泥 白附子 半分 蝎 一分

南星 朱砂 一分 天漿子 牛黃

蘆薈 各半分 金霜 半分 和腦 一字 麝 半分

直羌蚕 炒七箇

右為末粟米糊圓芥子大每壹圓薄荷湯下如未通利加至

貳圓

**千金龍膽湯** 治胎驚月內氣盛發熱凡臍風撮口壯熱皆可用

龍膽草 釣藤 柴胡 黃芩

北梗 赤芍藥 茯苓 甘草 各半兩

蟋蟀 二枚 去翅足 大黃 紙裹 切 半

右為末每服壹錢**此藥**煎服或加**防風麥門冬**以導心熱黃

卷減半用



# 定驚

通關定驚方論

諸風搐搦關竅不通皆由痰塞中脘留滯百息即所致痰之所為潮寒者氣實使之治風痰雖不出（南星）半真（白礬）數輩亦須先用（蘇合香圓）入（朱砂）少許以薑汁侵薄荷湯調和與之盡使氣下則痰下痰下則關竅自通

通關定驚證治

## 開關散

赤蜈蚣一條 直僵蚕 南星炮各一分  
麝香一字 猪牙皂二錢畧燒存性  
右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥兩三點涎出自開

## 開牙散

華陰細辛 南星 朴消各一分  
麝香半分 蝎梢伍條  
右為末以少許用烏梅肉揉和擦牙兼用（細辛）（皂角）（刺芥末）吹入鼻中

## 嚏馬散

半夏生一分 皂角半分  
右為末用壹豆許用管子吹入鼻立醒

## 開關聖散

赤蜈蚣一條沖分為兩片各全蝎一箇亦中分為兩片各記左  
右各為末左眼翻左手搖以左藥末搐入左鼻孔右眼翻右手搖以右藥末搐入右鼻孔雙眼翻雙手搖兼用之

截風定搐治法

## 人參

方見卷卷門

散風邪除風熱初作急風每服三字

輕者紫蘇薄荷湯調下搗掣緊急者去節麻黃煎湯調下或  
**澤散**加荆芥防風亦可常用免得遠施腦  
**截風圓**治驚風痰搐

天麻 直僵蚕炒 南星炮 麝少許  
赤蜈蚣大者一條酒浸炙 白附子炮 防風  
朱砂 全蝎焙各一分

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓薄荷湯下

**定散**截風定搐

全蝎褐色者 赤蜈蚣一條並新瓦焙  
朱砂半分 腦 麝少許

右為末每服壹字薄荷湯調下先以此少用管子吹入鼻中  
自然通竅

**陽瀉散**治驚風搐痰熱

朱砂 蘆薈  
輕粉一字 胡黃連二分 蝎尾十四個 直僵蚕拾個  
赤蜈蚣一條 金箔十片

右為末每服壹字薄荷荆芥泡湯調下如口不開先吹入鼻中  
**擒風湯**治急風定搐

白附 僵蚕 全蝎各一分 川薑黃  
赤蜈蚣一個去足酒研生葱 南星炮  
麻黃去節 羌活各一分 牙消半分

右為末每服壹字薄荷湯調下

**定搐散**治急風定搐

赤蜈蚣大者一條酒浸炙 麻黃去節 南星炮  
白附子 直僵蚕炒 羌活 代赭石服醋碎  
蝎梢 川薑黃各一分 麝半分 朱砂一分

右為末每服壹字荆芥去蘇煎湯調下如搐不止加烏梅肉

**馮氏圓**治竅視發搐痰熱

龍膽草煨

梔子仁

大黃濕紙煨 羌活

防風各一分 川芎一分半

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓前首葉泡薄荷湯調下

**木通散** 能瀉肝風降心火最利驚熱

山拖二分

大黃濕紙煨 羌活

不通

赤茯苓

甘草各一分

為末每服壹字紫蘇煎湯調下

**清心散** 凡驚熱出於心肺須從小便利之

桑白皮炒

葶藶炒

赤茯苓

車前子

梔子仁手分

甘草

灸減半

右為末每服半錢薑棗煎服

**何膠散** 治風熱涎潮喘促搐掣竄視

透明阿膠炒二分半

紫蘇一分

右為末每服壹錢入**馬肉**少許同煎灌下神效熱出於肺

熱則生風清肺行小便故也肺風用之尤妙

治驚輕下法

**定命丹** 治急驚天吊撮口通利痰熱

全蝎朱箇

天麻

南星炮

白附各二分半

朱砂

青黛絡一分 輕粉

麝各半分

腦一字

右為末粟米糊圓黍豆大每服壹圓荆芥薄荷湯調下先研半圓吹入鼻中

**利驚圓** 利驚下痰消熱

龍膽草

防風

青黛

蘆薈

南星炮

釣藤各二分

牙硝

鐵粉各一分

腦

麝少許

右為末麩糊圓麻子大每服貳圓煎金銀湯下

**防風湯** 治風熱痰壅大便不通

定命



羌活

防風

枳實 各半兩 川芎

甘草炒

大黃濕紙爛 各一分半

右對末每服參字薑棗煎服

**宣風散** 疎導風熱

雞心檳榔个 甘草

橘紅 各半兩 牽牛二兩半生用半炒熟

右為末每服半錢蜜湯調下

**枳殼散** 小兒虛中壅實以此導之

**小柴胡湯** 加枳殼 最能利風熱解血熱免得用銀粉巴硝 薑

治驚稍重下法

**獨風湯** 利下痰熱

青黛 蘆薈

全蝎各一分 南星半兩為末水調

全蝎赤色 朱砂一分半 牙硝

輕粉各二子

右為末每服壹字煎金銀薄荷湯調下

**朱砂膏** 治驚風痰盛

朱砂 馬牙硝一分 川靈脂 蘆薈各一分半

麝半分 腦一字

右研細日厚膏 為圓棗豆大金箔衣每服壹圓薄荷湯調下

**疎風散** 治驚風痰熱俱盛

檳榔 陳皮各二分 牽牛 大黃各三分濕

右為末每服半錢生蜜調下

**小柴胡湯** 最利執實方見從產門 加大黃少許

治驚重下法

**青金圓** 治風痰壅盛

巴霜巴且去油淨盡 青黛 南星各一分

輕粉半分 滑石一分 全蝎一分

右為末稀麪糊圓麻子大每服壹圓薄荷湯點茶清送下

**天麻圓** 利驚下痰九釣腸鎖肚撮口可通用

南星炮一分 白附子炮 牙硝 天麻

川蠶脂

全蠟

輕粉一分

巴霜一字

右為末稀麪糊圓麻子大每服壹圓薄荷薑錢泡湯送下

**盧養**治驚風痰盛發搐

全蠟五个培

巴霜一字

輕粉半分

盧養

南星炮

朱砂各一分

川養各一分

腦

麝各一字

右為末每服壹字煎金銀薄荷湯調下

**牛黃**治熱盛涎潮

馬牙硝

寒水石煨

硬石膏

甘草各半兩

牛膽南星二分半

紫石英一分

牛黃

腦

麝各半分

右為末甘草膏為圓黍豆大每服壹圓橘皮湯調下

**青金丹**疎風利痰

蘆薈

牙硝

青黛各一分

南鵬砂

輕粉半分

蠟上四个

右為末用香墨水圓麻子大每服壹圓薄荷泡湯下

**王監**治痰執驚積

青黛

史君子煨

蘆薈

牛膽南星

川墨各一分

膩粉

麝半分

腦一字

右為末飛白麪糊圓桐子大每服壹圓薄荷湯調下楚州王監賣此藥著名大利痰執驚積疳積

和胃助氣治法

**生氣散**諸風疏利後以此調氣

丁香三字

白朮

青皮各一分

甘草微炙

木香

人參一分

右為末每服半錢沸湯點服或用**調氣散**亦得

**銀白散**助胃祛風嘔吐作慢驚者通用

石蓮肉

白扁豆製

茯苓各一分

人參

天麻

白附炮

全蝎炒

木香

甘草炒

藿香半份

陳米炒香

右為末每服壹錢薑錢壹片入入瓜入末入茶粒同煎或用陳米飲調下

**伏苓一陳湯**和胃助氣加連子四石白補用薑棗煎

**異功散**溫中正氣吐瀉不食用此

人參

伏苓

白朮

甘草炒

橘紅

木香各等分

右為末每服叁字薑棗煎服

**天麻散**治香圓天麻散風圓天麻散香圓天麻散等分薑棗煎湯調下

**參苓白朮散**用酸棗仁石白補煎湯調下

**和中散**和胃氣止吐瀉

伏苓

石蓮肉各一

藿香

人參

天麻

白扁豆製

木香

白朮

甘草炒各半份

右劉散每服叁字煎服

**醒脾散**二方并王氏醒脾散見初傳慢驚門皆和胃助氣

定志寧神治法

**定志圓**驚風已退神志未定以此調之

琥珀

伏神

遠志薑製焙人參

白附子炮

天麻

天門冬

酸棗仁

甘草炙等分

右為末煉蜜圓皂子大宋為衣每服壹圓燈心薄荷湯調下

**溫膽湯**治驚悸煩痰

半夏製

枳實各二

伏苓半兩

橘紅

甘草各一

酸棗仁溫湯浸去

右劉散每服壹錢入神少許用薑棗煎服

**定心圓**治驚悸煩燥

定志寧神

北參

遠志

音製炮

伏神

天麻

犀角各一分防風

朱砂一分

麝一字

右為末煉蜜圓皂子大金箔衣每服壹圓薄荷湯調下

**白附子** 安心寧神

人參

防風

天麻

伏神各秤一分半

白附子

酸棗仁

琥珀

石昌蒲各一分

麝少許

右為末煉蜜圓皂子六麥門冬湯調下壹圓

新刊仁齋小兒直指方論卷之一

定章

※

一

# 慢驚

方傳慢驚證治

**大保生丹** 治慢驚尚有陽證

全蠋青者拾肆箇 白附子生 直僵蚕 牛膽南星

蟬殼 琥珀各真錢 麝半錢 防風 朱砂各壹分

右為末粟米糊圓如桐子金薄衣每服壹圓薄荷湯調下

**發毒丹** 傳慢驚可用

人參 伏神 琥珀 天麻

直僵蚕炒 防風 南星炮 白附子生

蝎炙 烏蛇肉酒浸焙 朱砂半錢 麝少許

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓昌蒲湯調下

**神保丹** 治方傳慢驚

全蠋柴箇去尾尖 蟬殼貳拾壹箇 甘草貳錢半 大天南星壹箇

右為末每服半錢薑棗煎服

**神保丹** 分陰陽平冷熱定吐瀉豁痰涎

硫黃 燄硝 五靈脂 青皮

陳皮 半夏麩炒等分

右硫硝夾研用磁器鎔汁傾出候冷再研細旋入諸藥末拌

和粟米糊圓麻子大每服壹圓食前米飲下

**來復丹** 升降陰陽疎風利痰方見血氣類

**去風丹** 治吐瀉脾困內虛

人參 伏苓 木香煨 天麻

白扁豆製 陳米炒 全蠋煨

右等分為末每服半錢薑棗煎服

**醒脾散** 治吐瀉脾困不食

全蠋煨半錢 白附子炮 天麻煨 甘草炙

人參

白茯苓

石菖蒲細節

木香

石蓮肉

白木各壹錢

右為末每服參字薑棗煎服有熱者去木香

**大醒脾散**

南星

白茯苓

橘紅各壹分 全蝎焙

甘草炒

白附子炮

石蓮子

人參

木香各半分

陳倉米貳升

右為末每服參字薑棗煎服驅風醒脾兩方通用亦可釀乳

小兒胃虛不消乳食尤須節約

**驅風豁痰**

人參

防風

白附子生

直僵蚕

全蝎各壹錢

南星湯洗

天麻各貳錢

右為末飛白麩糊圓桐子大每服壹圓薑湯調下

已傳慢驚證治

慢驚

**星香全蝎湯**

治慢驚風昏迷痰搐

南星紙煨

木香

人參

橘紅各壹錢

全蝎各壹錢

甘草各半錢

右剉細每服壹錢入紫蘇薑棗濃煎旋以匙送下有熱加防風

**定命散**

治慢驚吐瀉困重必傳慢脾通用

圓白半夏生 伏苓

木香

老生薑切

白木

甘草各半分

右為末每服半錢薑棗煎湯調下

**四聖散**

治慢驚痰滯虛熱若有窺視搐搦證狀以少許用管吹

入鼻中

全蝎茶蘆

直僵蚕拾四

大南星各壹錢

真川烏各壹錢

右將前為末水調作餅裹外用濕紙重包慢火

灰中煨令赤色頓地上一伏時為末每服壹字煎金銀湯點

好茶清少許調下

**烏蠟** 治慢驚子湯 加**川烏** 生**全蝎** 煨為末各少許每服  
半錢薑棗煎服如再服即去**川烏**

**驅風豁痰**

**南星** 種八九錢以上者用壹箇就地土作小坑深七八寸  
用炭火於坑內以炭通紅以炭條密蓋之又用  
南星於坑內伏時取出洗淨切磨  
盆蓋其上

右為末入**薄荷** **全蝎** 末各壹錢每服半錢煎生薑防風湯調下

**烏沉湯** 慢驚驅風助胃

天麻 貳錢 人參 真川烏 生 全蝎 煨

南星 炮 木香 沉香 各壹錢 甘草 炒半錢

右判散每服參字薑棗片慢火煎取其半與之

**沉香散** 生胃氣止吐瀉

伏苓 貳錢 沉香 丁香 木香

霍香 川厚朴 製 甘草 炙壹錢

右為末每服壹字米飲調下

慢驚下痰證治

**天南星圓** 治慢驚痰壅惟身執者可服

**南星** 壹斤每重壹兩上下者用溫湯浸洗刮去裏外浮皮  
并洗軟厥令淨用法酒浸壹宿用桑柴煮不住添熱  
湯令金滿瓶內氣猛更不住酒酒常令藥潤余伏時  
滿取出用銅刀子切開壹箇大者隨少許不取舌為  
熟未即再切候熟  
用銅力切細燥乾

麝香 研 丁香 各壹兩 龍腦 研 壹兩半 辰砂 別研水飛貳兩

右為細末入研藥勻煉蜜并酒圓朱砂為衣每服壹豆許生

薑煎湯調下

**蘇合香圓** 一倍方見血氣類 **白圓子** 二倍方見痰飲類 夾和每

服半錢薑湯調下

**神保既濟丹** 治慢驚痰盛 見方傳慢驚馬門

**礞石散** 最能利痰急慢脾風通用

青礞石 搗碎 焰消 半兩 同礞石入甘窩內  
壹兩 壹兩 炭火 煨令通紅 微冷

右為末雪糕薄糊圓綠豆大每服貳圓急風**薄荷** **刺芥** 泡湯

調下慢風慢脾風用**南木香**煎湯調下**礞石****煨硝****古文錢**雖能利痰然其性非胃家所好須以**丁香**佐之

**靈脂圓**治慢驚痰盛搐搦

五靈脂香潤者白附子畧炮木香 直僵蚕炒各壹分  
全蝎焙半分 朱砂壹錢 大南星濕紙炮半兩

右為末米醋煮生半夏糊為圓麻子大每服叁圓薑湯送下

**七珍圓**治諸風頑痰壅盛大小通用

細辛 川靈脂 直僵蚕炒各壹錢半  
白附子壹錢 朱砂半錢 全蝎肆箇焙

右為末用大南星生為末煮糊圓麻子大每服伍圓薑湯送下

慢脾風生胃回陽治法

**黑附湯**治慢脾風盛四肢厥冷

附子炮去皮叁錢 木香壹錢半 白附子壹錢 甘草炙半錢  
右劉散每服叁字薑伍片煎取其半以匙送下若手足煖而

蘇省即止後劑

**川烏散**驅風回陽

真川烏生壹分 全蝎 木香各半分  
右為末每服叁字薑肆片煎取其半旋滴入口中嘔吐者加

**丁香**

**金液丹**

方見血氣類 白圓子等分祛風回陽二藥為末每服半

錢陳米飲調下

**玉附四君子湯**助胃回陽**四君子湯**加**玉附子**末四分之一厥

逆者對加每服半錢薑五片慢火熟煎以匙送下

**蝎節散**回陽氣豁風痰

全蝎柒箇 附子炮 南星炮  
白附子炮 木香壹錢

右為末每服半錢薑肆片慢火熟煎旋服

**陰癩散**祛風豁痰回陽正胃

慢驚



白附子

黑附子

南星

半夏

並生各壹分半

右為末井水浸七日逐日換水浸訖控乾次入全蝎末貳錢每服壹字生薑湯調下

**靈砂** 正胃回陽能止嘔吐溫利痰涎但瀉者勿用為細末以少

許米飲調下或用糕糊圓如粟米大兒兩參圓米飲灌下

**靈丹** 方見血氣類治慢脾風吐瀉不止每服壹圓研細入

**南星** 煎湯乘熱調下。已上諸藥溫熱並乳食前服

# 急慢脾風

慢脾風下痰證治

**神保既濟丸** 見方傳慢驚門

**白僵蚕圓** 方傳慢脾陽氣未甚脫者可用亦能截風

牛膽釀南星 貳錢

直僵蚕 炒

錢子地龍乾

五靈脂

全蝎

煨各壹錢

右為末水煮生半夏糊圓麻子大每服伍圓薑湯下

**辰砂膏** 治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐

黑附子

壹枚捌錢重者去皮臍頂上刻壹孔入辰砂末壹錢重者用酒洗之

南星

炮半兩

白附子

炮

川五靈脂

蝎梢

各壹分

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓生薑汁泡湯調下

**七寶砂丹** 利痰奇效慢驚慢脾通用須以大麥佐之園即通

**寶錢** 背後上下有兩月片者其色淡黑頗小諸錢以一箇放鐵

匙頭於炭火內燒少頃四圍上下各出黃白珠子將出候冷傾

入盞中只作壹服南星煎湯送下人參煎湯亦得

急慢脾風證治

**星蘇散** 治諸風口噤不語

天南星略炮剉散每服叁字薑肆片紫蘇伍葉煎取其半却

入雄雞膽汁少許溫服凡不語者大小便須要調導治慢

風不語只用白僵蚕更以人參石昌蒲為佐

急慢脾風

**木通湯** 治諸風失音

木通

石昌蒲

防風

北梗

桑螵蛸

全蝎焙

直僵蚕

甘草各炒並用壹分

南星

各炮半兩

右劉散每服參字紫蘇參葉薑薑片煎熟與之大便不通更

加

**神聖圓** 治驚風痰盛搐搦口眼牽引

烏蛇肉

米醋浸炙

直僵蚕炒

防風

天麻

南星

牛膽製各半兩

五靈脂

代赭石

煨醋淬各貳錢半

全蝎

焙

朱砂

各壹錢

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓急驚煎茶湯調下慢驚

用生薑湯

**虎蝎圓** 治急驚上視搐搦胎風涎潮

虎睛

壹對酒炙

全蝎炒

天麻

防風

南星

煨

直僵蚕炒

烏蛇肉

酒浸焙各壹錢麝香壹錢

右為末麪糊圓桐子大每服壹圓薄荷湯調下

**南星圓** 治驚風痰熱

天南星

不去皮切片

生薑

切片

右用竹箬壹條以南星并薑相間挿定次用煎茶湯此子摻入

片間風乾為末每服壹字薄荷紫蘇泡湯調下大

人服半錢或吐或汗或下即病氣出也

**鎮心圓** 急驚化痰鎮心

朱砂

龍齒

牛黃

各壹錢鐵粉

琥珀

人參

伏神

防風各貳錢

全蝎

茶酒煎

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓薄荷湯調下如無牛黃以

**牛膽南星** 代之

**木香湯** 治慢風慢脾得效

南星

濕紙煨

白附子焙

天麻

木香

橘皮

白茯苓

石蓮肉各半宣

黃耆

白木

石昌蒲

甘草炙各半分

右為麤末每服半錢薑棗煎服

**乳麝圓**治驚風掣癎反折

赤蜈蚣

全者壹條去  
紫足酒浸焙

花蛇肉

酒浸炙

直僵蚕生

各貳錢

南星

炮參錢

朱砂

蝎梢

各壹錢

乳香

半錢

麝壹字

右為末飛白麪糊圓桐子大每壹圓金銀煎湯泡薄荷調下

○蒲陽趙公施此多所全活

**大**治驚風痰熱

代赭石

煨醋

全蝎焙

朱砂

琥珀各壹錢

南星

濕紙煨

白附子生

防風

烏蛇肉

酒浸炙

天麻

各壹錢

麝壹字

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓急驚薄荷湯調下初傳

慢驚尚有陽證用湯

**香**治慢驚初傳涎潮昏搐

全蝎

拾四箇  
薑汁浸

麻黃

經師慢火炙乾又蘇  
薑汁又炙凡參次

花蛇肉

烏蛇肉

並酒  
浸焙

直僵蚕

炒各  
壹分

白附子焙

人參

天麻

防風

各壹錢

乳香

半錢

麝壹字

右為末用南星末煮糊圓桐子大捏作餅日乾每服壹餅薄

薑湯調下

**至聖保命丹**治驚風搐掣胎驚夜啼

青色全蝎

拾肆箇

防風

天麻

白附子

蝉殼

直僵蚕

炒各貳錢

南星

炮參錢

麝半錢

右為末粳米飯圓桐子大朱砂衣每壹圓薄荷湯調下

**治慢驚身熱痰滯**

大乾蟾壹箇酥塗炙黃

直僵蚕

蝉殼

蝎尾各焙

白附子微炮

五靈脂

蘆薈

琥珀各壹分

朱砂壹錢

麝半錢

右為末每服半錢前湯調下

**快脾湯**治慢驚脾困不食和胃祛風

大南星壹兩到如其苦子用鹽水浸去毒

兩到如其苦子用鹽水浸去毒

白伏苓半兩

木香

人參

天麻各貳錢半

全蝎茶筒焙

右為末每服半錢甘草生薑煎湯調下

**助胃湯**治慢風吐瀉不進乳食

人參

白朮

石蓮肉各貳錢

丁香

檀香

舶上茴香妙

白豆蔻

木香

甘草炙各壹錢

右為末粟米糊圓桐子大每壹圓陳米飲調下脾困不醒用

**天公**前湯

**沉附湯**治慢脾風厥冷吐瀉

沉香

丁香

木香

黑附子炮

白附子焙

全蝎焙

藿香

天麻各等分

右為末每半錢炙甘草生薑煎湯調下身溫則去圓子

**鎮痰圓**治諸風頑痰喉風纏痺

北礬水飛過

直僵蚕米醋浸焙

各壹分

大南星切片濃皂角水浸去毒

右為末稀熬糊圓麻子大每服伍圓姜湯送下喉風用皂角

水研開灌下

**治諸風諸癩痰熱**

圓白半夏生

右為末旋入薑汁略拌鬆次以香潤研細

末各壹錢貳錢夾和研採得所圓如麻子大每

服肆伍圓薄荷生薑泡湯送下隨大小地日減用

慢驚慢脾危惡證候藥力不到者但看兩脚面中間陷處有  
太衝脈即灸(同前)具穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖  
折中在頭之中心端正旋毛處是也如有雙旋及旋毛不正  
者非所捏艾柱約如小麥許但三五壯而止灸後仍與醒脾  
之劑

# 客忤

客忤方論

客忤者小兒神氣微弱外邪客氣獸畜異物暴觸而忤之其候  
口吐青黃白沫水穀鮮雜面色變易喘息腹痛反側痠癢狀似  
驚癇但眼不上竄耳脈來弦急而數視其口中懸癰左右若有  
小小腫核即以竹針刺瀆之或以爪摘之治法辟邪正氣散驚  
定心延久則難為力也 大凡客忤中惡急作醋炭仍以  
皂角燻之

客忤證治

**雞冠散** 治客忤腹痛危急

雄黃 壹錢

乳香 半錢

麝香 壹字

右為細末每壹字刺雞冠血調灌之

**合香散**

方見咳嗽門

用薑湯調灌次用

(同前)參合水濕搗為圓

如雞子大以摩兒顛上及足心各五六遍次摩臍心及上下良  
久摩開自有毛即擲之

**麝香散**

麝香少許研細乳汁調塗口中仍以母衣覆其身即愈

**犀角散** 治客忤驚啼壯熱

天麻

犀角

麥門冬

釣藤

朱砂 各壹錢 鐵粉

雄黃 半錢

麝香 少許

右為末每服半錢以金銀煎湯調下

**安神散**

生犀末

人參

茯苓

菖蒲

朱砂

雄黃等分

右為末研挑仁膏為圓如麻子大每冬圓紫蘇湯下

**伏龍肝方**

竈中黃土和醋搗圓裹子大摩兒頭及五心

**千金龍腦湯**

方見胎驚風門

**馬尾方**

治中馬汗氣臭忤或馬鳴驚忤  
馬尾燒煙熏兒面頻熏以瘥為度

**驚風雜治**

驚積方論

驚積者受驚日久而積成之其狀額上有汗喘息煩渴潮熱往來肚皮有熱睡中覺腹內有物跳動瀉下如白脂豆沙是也治法量輕重而疎導之仍與調氣和胃取愈大凡小兒腹肚或熱或脹或硬皆為內實法當疏利

驚積證治

**辰砂膏**

疎利驚積方見風際門

**青龍圓**

治驚積有熱

青黛

伏神

蘆薈

南星

鹿茸少許

輕粉

巴霜膏字

全蝎各壹錢

右先將巴豆研如泥次入諸藥研令極細圓如粟米大朱砂衣每服壹圓薄荷湯送下

**朱銀圓**

治驚積方見胎驚風門

天癆方論

天癆壯熱驚悸眼目翻騰手足抽掣或啼或笑喜怒不常甚者爪甲皆青如崇之狀蓋由乳母酒肉過度煩毒之氣入乳逆復乳兒遂使心肺生熱痰鬱氣滯加之外挾風邪致有此耳治法解利風熱取愈

新刊仁齋直指小兒方論

天癩證治

釣藤

防風

獨活

白伏苓

右為麤末每服壹錢薑薑煎服

白伏苓各半

朱砂

青皮

大黃逆紙裏煨貳錢半

蟬殼

甘草炙及口貳錢半

天麻

全蝎焙

犀角

青黛

蟬殼

天漿子萌子

朱砂

直僵蚕微炒

白附子

川薑黃各等分

南星炮

右為末雄猪膽汁為圓滾且大先將井水調開壹圓入鼻今嚏次以前湯調服

驚風內藥方論

驚風內藥腹痛多啼唇黑囊腫偃偻反張眼內有紅筋斑血者

是蓋寒氣壅結兼驚風而得之又盤腸氣與虫證亦令腹痛多

啼偃偻相若但盤腸氣痛則腰曲乾啼額上有汗是小腸為令

氣所搏然爾虫痛則嘔吐清沫痛有去來是疳化為蛔臟腑

滯然爾內藥用調氣疎風鎮驚之劑盤腸氣用溫和調氣之劑

虫證用殺虫之劑條列于後請詳審之

乳香

沒藥

蝟稍者肆箇 雞心檳榔壹錢半

右為末蜜圓桐子大每服貳圓前湯調下

木香

沒藥

全蝎

木香

乳香各半

舶上茴香炒 釣藤等分

右先將別研次入諸藥末和畢取大餅小許研細



和圓桐子大日乾每貳圓（藥）湯下

**白豆蔻**治盤腸氣痛

白豆蔻仁 縮砂仁 青皮 陳皮

甘草炙 香附子 蓬莪木各等分

右為末每服壹錢紫蘇煎湯調下

**羅漢果**治盤腸氣痛

羅漢子炒黃不拘多少

右為末每服半錢（藥）煎湯調下或只入**（藥）**則用薑

湯調下

**化虫圓**治虫痛

蕪荑 川鶴虱 雞心檳榔

乾蝦蟇多焦各壹分 蘆薈半分

右為末（藥）為圓麻子大每服伍圓陳米飲下或**（史）**

子煎湯送下九虫月首則頭向上凌晨可服藥

**安息香圓**治內疝盤腸氣痛虫痛通用

安息香 桃仁去皮炒 蓬莪木炮 史君子肉各半兩

阿魏壹錢 茴香炒 全蝎各壹分

右**（藥）**并**（藥）**以酒少許就湯瓶口上以盞盛蒸透去沙

旋入**（藥）**同研次入諸藥末煉蜜圓桐子大每壹圓生薑湯

調下

**白豆蔻**治小兒臍下氣塊疝痛

芸臺子炒 蓬莪木 茴香炒 青皮

甘草各壹分 辣桂 木香各半分

右為末每服半錢薑湯調下

**青歸散**治內疝胎寒腹痛嘔嘔

官桂 當歸 川芎 香附各壹分

川白薑 木香 甘草炒各半分

右為末每半錢白米煎乳食前服

治內癰腫疔挾冷作痛內癰一名癰腸

當歸

沉香

木香

桂

川芎各半兩丁香貳錢

石為末每壹錢用薑煎食前服

# 中風

## 中風方論

小兒中風者以其血氣未定寒溫失調內則盛熱蘊蓄外則腠理虛開故風邪乘其外虛而暴中之其狀昏不知人壯熱狂燥搐掣氣籠口噤涎潮是也心中風則偃卧不能傾側發熱失音其舌焦赤若汗流唇赤者可治灸心俞或唇間白黑青黃乃心壞為水或面目亭亭時時悚動者並不治肝中風則踞坐不得低頭左脇疼痛諸筋攣急頭目瞤動上視多怒其目青若遠兩目連額微青唇青面黃者可治灸肝俞或大段青黑其目一黃

石心丸

十一

一白者不治腎中風則踞坐面浮腰脊痛引小腹其耳黑若兩

脇左右未有黃色起者可治灸腎俞或脇間如黃土鬢髮垂而

齒黃赤者不治肺中風則偃卧曾滿喘息咳嗽燥悶汗出其鼻

白若目下至鼻四圍及口間白色者可治灸肺俞或色帶黃乃

肺壞為血併手尋衣縫者不治脾中風則踞坐腹滿皮肉瞤動

四肢不收其唇黃若一身通黃口吐鹹汁者可治灸脾俞或手

足青而厥冷者不治凡人為風邪所中皆從背上五臟俞入之

風入於頷頰之筋則口喎而牙噤風塞於咽喉聲音之閉則語

不出而失音風與氣搏氣以痰隔則喉間如軒轅之響是風也

始入於腠膚次達於經絡而搏於筋脈筋得寒則拘急攣痛得

熱則緩弛不道風挾寒邪即攣急也風挾熱氣即緩弛也挾寒

而拘攣脈必浮緊挾熱而緩弛脈必浮洪寒者與心俞熱

者與心俞之類大抵脈浮者病在表脈實者病在裏脈

促者病在上在表則發散之在裏則疏導之促於上而留於下

汗者湧吐之若虛寒證候則（前）又不可闕古人治法雖以灼艾爲本亦須消息權度而投劑焉此法自大人方論演觸而得之若遇大人中風即以此推也雖然風寒暑濕皆能中人况又有因氣而中者人之驟病莫若中風一時倉卒若未能精審且先與下氣豁痰蓋諸中皆因痰鬱氣滯而作通關以還急以（前）南星（前）南星心卒中下氣豁痰（前）煎湯和（前）下牙緊者（前）末之入（前）點擦自開進藥之後痰消氣下病勢稍蘇即子細體認五臟外證而調理之至若口開手散噓氣麓大喉間軒軀瞪眼合眼瀉血遺尿或面色如緋或面色黯慘或汗出如珠如油皆惡候也又一證小兒多因傷風咳嗽不能發散遂成肺風其候喘促涎潮面色青黃目能認人口不能言如此者當以（前）主之仍灸（前）取愈○大人小兒凡病頭面冷如按瓜或鼻冷不回或汗出髮潤其身如洗皆不可救

五臟俞穴

（心）二穴在背上第五推骨下兩傍各一寸半（肝）二穴在背上第玖推骨下兩傍各一寸半（脾）二穴在背上第拾肆推骨下兩傍各一寸半（肺）二穴在背上第參推骨下兩傍各一寸半（腎）二穴在背上第拾壹推骨下兩傍各一寸半  
小兒艾柱如小麥許但三五壯而止取分寸法大人小兒男取左手女取右手比量中指第壹節爲壹寸見千金翼方第壹節者指根是也

中風證治

（非）治中風昏暈或狂語或失音

白鮮皮

白朮

芍藥

官桂去麋皮

川芎

當歸

杏仁炒微炒防風

甘草炙

麻黃去節

川獨活

白茯苓各錢半

古細劉每服壹錢壹錢貳片煎

治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃 去節

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草 炒

杏仁 去皮炒

防己

官桂 去粗皮各半兩

防風 去粗皮

附子 炮去皮臍

附子 炮去皮臍

附子 炮去皮臍

右除...外並搗為麩末次入貳味夾和每壹錢薑參

片煎食前服

治中風肢體緩弱筋節疼痛...二藥夾和

入...煎服次以...繼之

治中風

南星 炮用貳錢

半夏 潤白者

南木香 又只壹錢

細辛

石昌蒲

蒼朮 各炒

甘草 炒各半錢

右剉散每服壹錢薑參片慢火煎取其半調...壹粒

灌下痰盛者又加...  
二十

治中風

南星 炮用貳錢

木香

橘皮 各壹錢

全蝎 貳箇焙

甘草 炒半錢

右剉細每服壹錢薑參片慢火煎熟與之虛冷者加...  
二十

少許添...  
二十

治中風厥冷

生附子 壹分

木香 半分

右剉細每服半錢薑肆片煎服

專治小兒肺風喘促涎潮竄眼斜視

透明阿膠剉細炒如珠

右用紫蘇烏梅肉焙乾末之為衣煎...湯送下或以...  
二十

炒為末和...同煎亦得...育神凡驚風後眼

中瞳人不正可以...半倍煎與之

治中風內外皆熱

大黃 壹分

檳榔

桑白皮 各半兩炒 羌活 壹兩

防風半兩

郁李仁

壹分炒

右劉散每服壹錢黑豆叁拾粒同煎乳食後服

治風後瘖不能言

蕪荑

神麴

麥蘖各炒

黃連等分

右為末治中風圓麻子大每服伍圓用治中風能去心竅惡血故爾

治中風不語方見急慢驚門

治中風不語方見急慢驚門

治中風不語方見急慢驚門

# 痙症

痙症方論音翹字異義同

發痙證候先傷於風又感寒濕致之此虛極生熱熱極生風之甚者也傷風發熱頭痛汗出又自嘔逆汗之必發痙濕家發汗稍多亦發痙婦人新產血虛汗出傷風發痙無疑矣項背強直

痙症方論

痙症方論

腹身反張搖頭掣筋噤口不語發熱腹痛鎮日不醒其狀可畏

病在足太陽經剛痙無汗柔痙有汗其面紅眼赤牙緊手張痰涎壅盛昏潰煩渴小便赤澀先識語而發者此剛痙也其大便

澀泄不渴不語先手足冷而發者此柔痙也剛柔二痙亦如陰

陽陽隔陰之類剛痙為之發汗柔痙為之解肌並以

加減剛痙去用柔痙去用大便利而

厥逆者則以佐之其間一證身體壯熱識語口乾手足反

微寒大便反滑泄此為剛柔不分之痙可用

要之得病以來無汗則按方有汗則謹勿用也其若

痰塞氣盛則以消其痰以順其

氣痰消則風止氣順則神醒治療之法先與消痰順氣為上嗣

是病勢稍止然後審其熱之輕重而解利之熱輕者與

熱盛者與壯熱曾滿口噤咬齒而大便秘結者是為

內實大便秘下之又法剛痙柔痙

下之又法剛痙柔痙

痲疹最難痊十救其一過三日不治請早圖之餘見傷寒類書活人總括

痲疹證治

方見中風門

消痰順氣疎風

半夏製

枳殼炒

伏苓各半兩

橘皮

防風各錢半

甘草炒

右劉散每服壹錢入生薑錢半蘇錢半煎服

收錄

人參

伏苓

甘草炒

芎藭

前胡

羌活

獨活

柴胡

北梗

枳殼

右加防風等分為麗末每服壹錢薄荷少許煎服

治剛痲有熱

柴胡壹兩

黃芩

人參

半夏製

生薑各錢半

甘草炒

右劉散每服叁字入棗煎服

治剛痲骨滿內實口噤咬齒

大黃

芒硝各半兩厚朴壹兩

枳殼真枚

右劉散每服叁字薑叁片煎服

治剛痲無汗

麻黃去節

赤芍藥各壹兩半乾葛半兩

葱白叁莖

豉半合

右劉散每服叁字煎服

治家痲有汗

桂枝

芍藥

甘草炒

葛根壹兩

生薑壹兩

大棗肆枚

右劉散每服叁字煎服

治柔痊厥冷自汗

人參 川白薑 甘草 白朮 等分

右剉散每服參字煎服

治柔痊自汗肢體厥冷

天南星 附子 各半兩 木香 壹分

右剉散每服壹錢生薑伍片慢火煎取其半通口與之

# 發癇

發癇方論

癇者小兒之惡病也小兒血脈不斂氣骨不聚為風邪所傷為驚怪所觸為乳哺失節停滯結癖而得之其候神氣怫鬱瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚澎緊手足搐掣似死似生以聲或嘿或項背反張或腰脊強直但四體柔軟發而時醒者為癇若一身強硬終日不醒則為瘖瘖矣癇曰癇病關五臟而赤

目瞪吐舌齒心下煩燥氣短息數者曰心癇面青唇青甘眼

上窺手足拳攣抽掣反折者曰肝癇面黑而晦振目視人甘吐

清沫不動如尸者曰腎癇面如枯骨目白反視驚跳搖動亦吐

涎沫者曰肺癇面色痿黃眼睛直視腹滿自利四肢不收者曰

脾癇此五臟之證然也調理之法惟以三種陰陽二證

別而治之風癇者汗出解脫風邪乘虛其初屈指如計數有熱

生痰是也驚癇者震駭懷怖打墜積驚其初驚叫大啼恍惚神

魂是也食癇者食時得驚停宿結滯其初吐乳不哺大便酸臭

或結成乳癖先寒後熱是也別之以陰陽則始者身體有熱抽

掣啼叫是為陽癇陽病脈浮面色光澤病在六腑肌膚此猶易

愈始者身體無執手足清冷不抽掣不啼叫是為陰癇陰病脈沉面色黯晦病在五臟骨髓此最難痊或以仰卧屬陽覆卧屬陰亦可參驗蓋陽證不可用溫陰證不可用寒風癇則先為之散風癇則先為之利驚癇則先為之消積積以

主之若臟若腑一陰一陽是固不可無別大熱血滯心竅邪氣  
在心積鬱成癩通行心經調平心血順氣證變又其要也經入  
小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癩之漸  
即以**羌活獨活**導之時間量與**羌活獨活**減其盛氣則無驚風癩病  
之患癩證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之急為爪  
破須令血出啼叫尤得氣通解滯兒衣不可露天恐為純堆意  
羽所汚染觸其間未有不為癩也扶邪以去者而色變易下者見  
人羞怕諸癩瘡不能言者蓋咽喉為氣之道路風傷其氣以壅  
聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致耳**南星**炮為末  
**黃連**煎湯調下**白芷**以和**蘇合香圓**皆治癩之要藥也  
故表而出之

諸癩不治證候

目直無聲 目睛不轉 眼生白障 眼慢唇黑 瞳人瞬動  
眉間色青黑 面青拍黑 口中涎沫如白膿 口噤肚脹不  
乳 喉如鋸聲多睡不乳 身熱下血不食 身體痿軟不醒  
腹痛虛鳴 嘔逆而痛 吐利不止 汗出壯熱不止 臥  
久不寐 癩瘡身體反張大人脊下空側手小兒脊下空二指  
並不治 諸癩僵仆搗掣但扶持之謹勿把捉

風癩證治

**散風丸**治風癩先用此

黃牛膽貳錢 羌活

獨活

防風

天麻 人參

荆芥穗

川芎

細辛各壹錢

右為末煉蜜圓桐子大每服貳圓薄荷紫蘇泡湯調下

**保嬰圓**治諸風癩久遠亦驗

川烏生去皮尖貳錢

五靈脂指半兩

右為末猪心血圓如桐子大每壹圓薑汁以酒調下



獨活 治風痲解表通裏

獨活

麻黃去節

川芎各壹錢

大黃焙

甘草少各半錢

右劉散每服參字薑貳片煎服

天麻 治風痲內熱

天麻

防風各半兩 細辛

大黃焙

川芎各壹分 甘草各壹錢半

右劉散每服參字入薑少許煎服

牛膽汁和南星末風乾 治風痲迷悶抽掣延潮

牛膽汁和南星末風乾

全蝎焙

蟬殼各貳錢半

防風 白附子生

天麻

直僵蚕各壹錢半

麩半錢

右為末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥末和圓如豆大每服壹圓荆芥生薑湯下

聖藥證治

此金膏 癩先用此

人參

琥珀

白茯苓

遠志肉薑製焙

朱砂

大麻

石昌蒲細節

川芎

南星薑汁浸 麩壹字

青黛壹錢

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓金銀煎湯泡薄荷調下

紫石英燒研 鐵粉

人參 琥珀

遠志肉薑製 伏神

蛇黃煨醋分 龍齒

滑石

南星炮

右為細末煉蜜圓朱砂衣桐子大每壹圓金銀湯調下或用

調拭入口中

治驚癇邪氣入心

虎睛細研

遠志薑製焙

犀角

大黃濕紙煨

石昌蒲 麥門冬冬各壹分 蜷蝦去足翅  
右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓竹葉煎湯調下或金銀  
煎湯下

**七寶丹** 治驚癇心熱  
遠志肉鹽製 雄黃 絨粉 琥珀各壹分  
朱砂壹分 金銀箔煎湯

右為末棗肉圓桐子大每服壹圓去心煎湯下

**前煎湯** 治驚癇  
犀角 遠志肉鹽製 白鮮皮 石昌蒲  
半夏製 伏神半兩 大黃壹分 人參 甘草壹分半

右為末每服參字去心煎湯調下

**蜜陀僧** 治驚癇入心不語神效諸驚失音大人通用  
蜜陀僧為細末

右每服壹字米醋湯調下大人用貳錢熱酒調下  
食癩證治

**治食癩** 先用此取積  
代赭石煨研 赤石脂末各壹兩 巴豆去殼 杏仁去尖  
右件合研細湯浸蒸飯圓麻子大每服壹圓米飲下

**食癩通利**  
代赭石煨研 雄黃 蝎梢 朱砂各壹分  
輕粉 麝香各壹字 巴豆去殼 杏仁去尖

右為末蒸棗肉圓桐子大每服壹圓煎湯調下

**天麻圓** 治食癩方見急驚重下門

定癩治法

**朱砂** 半兩 水銀壹分 鈆二兩 錫開水  
雄黃壹兩 真珠壹兩 水銀結沙

右為末煉蜜圓麻子大每服貳圓金銀煎湯下

南聖散

方見已傳慢驚風 如大便取下惡物急與和胃之劑

猪心湯

治五癩頭癩及心風血迷神双

甘遂末壹錢

右用帶性猪心壹箇取空管頭血參條和... 隨藥未得中和之將... 用線縛定外以濕紙包慢火內煨熟米可過度取出去紙取... 細研次入... 半錢和之分作肆圓每服壹圓以所... 煎湯調下後別用猪心煎湯重者只守本方輕者加... 壹粒准過半日不動又進壹服如大便已下惡物... 止後劑急與... 以助胃氣

治諸癩

治諸癩搗製惡聲嚼舌

雌黃

黃丹 各半兩 麝香 半分

右為末拌和用牛乳汁炙吞熬成膏入藥末拌炙直下圓如... 糜子大每服貳圓溫熱水下

治諸癩

蛇黃

青礬石

鬱金

雄黃 各壹分

鐵粉

青礬石

朱砂 各壹分

右末粳米飯圓桐子大每壹圓... 煎湯調下

治諸癩痰盛

皂角

白礬 假枯研細

南星

蠟梢

僵蚕

雄黃 別研

朱砂

白附子

麝香 別研

烏蛇

乾炒壹分

赤蜈蚣

右為末用水煮... 糊和前... 膏為圓桐子大每服壹

圓生薑湯調下

治諸癩壯熱利下心中惡血

大黃

甘草

當歸

赤芍藥 各壹分

半夏

川芎

各壹分

右為末每服必三字薑棗煎服

**獨步散**治驚癇屢效

褐色生蝎壹圓連血細研

右入**朱砂末**并少紅同研薄荷湯調作壹服數年顛癇亦作效蓋癇疾皆心血虛滯**白濁**可以官守其血繼是即以**白濁**與之若無**白濁**當取帶性**雞子心**代用入于**代赭石**散中亦作效

**代赭石**陰陽癇通用

代赭石散開碎研為末

右每服半錢以金銀煎湯和金銀箔調下連進貳服及久小兒脚脛上自有赤班即邪氣發出其病隨瘳若無赤班則難治也

**日耀丹**治顛癇連年不瘳

黑錫 水銀研 鐵粉研

金銀箔各壹拾片

右水銀鐵粉夾和壹處先將**黑錫**於銚內鎔開次入鐵粉不住手就銚內研攪候**鐵粉**煙氣欲息次入餘藥就火上同攪少頃時傾出在地壹宿出火毒再研細粳米飯團麻子大**朱砂**衣每服壹圓食後**人參**煎湯下

**治諸癇發歇無時**

乾地龍半兩 虎睛壹對炙 人參壹斤 金銀箔壹拾片

天竺黃 朱砂 代赭石散 鐵粉各壹分

雄黃壹錢半 輕粉半錢

右為末每服半錢紫蘇湯調下

**空補丸**治小兒五癇

赤蜈蚣壹兩去頭足 蝎梢 白附子生

烏蛇肉酒炙 大南星末 圓白半夏末用薑汁和

熊膽 白礬新瓦上煨各半分

右為末稀麪糊圓桐子大朱砂衣每服壹圓薄荷泡湯調下

**赤蜈蚣**青條去頭足酒浸炙

**南星**泡熟洗淨半 麝香字

**全蝎** 防風

**朱砂**研細 遠志肉薑汁浸炒

白附子生 蘆薈

延胡索各青 金銀箔各冬松片

右為末入麝香糊圓桐子大每服壹圓白朮煎湯調下

**金來母定一切癩**

赤蜈蚣大者青條去頭足酒浸炙

烏蛇頭酒浸炙 延胡索生各青

白附子 遠志薑汁浸炒 鐵粉

透明防風

全蝎焙

天麻各壹錢

金銀箔各冬松片 大南星青條半末

右為末以白朮為糊入黃芩煎湯調下

桐子大朱砂衣每服貳圓金銀器煎湯泡薄荷調下

**千金龍膽湯**治諸癩壯熱方見九龍驚風門

**星來母定癩利痰**

南星濕紙炮香熟壹兩

朱砂壹錢

右為末用帶性猪心血為圓桐子大每服壹圓煎防風湯調下

**猪膽南星散**治癩後瘡不能言

大天南星濕紙煨香

右為末每服壹字猪膽汁調下

**肥兒圓**治小兒心竅有惡血瘡不能言木杏陳皮煎湯吞

**肥兒圓**方見中風門 蓋肥兒圓內有黃連能去惡血精者是

**驚啼方**油髮燒灰存性每服壹字米湯調下

論髮際穴

小兒初誕收生者多於頭額前髮際中間灸之蓋取其可以截風路也諸風篤證藥力不及或昏迷沉絕嘿然無聲於此灸艾每有扶危之功然亦顧其善後之劑何如耳前集所載百會一穴在頂心端正髮毛間亦濟危困者以是哉

論腦麝銀粉巴硝等不可輕用

小兒急驚風古人以其內外熱熾風氣暴烈而無所泄故用  
**驚風散**以通其關**銀粉巴**以下其痰熱蓋不得已而用之  
其實為風熱盛實者設也世俗無見不權輕重每見發熱發搐  
輒用腦麝蟾酥鈔霜水銀輕粉巴豆芒硝等劑視之以為常惟  
其不當用而輕用或當用而過用之是以急驚轉為慢驚吐瀉  
胃虛在再時月驚風之所為難療者正坐此也萬一發熱驚搐  
本為傷風傷寒傷食瘡豆而作誤藥至此其為害豈淺淺哉以  
理觀之能曰**通利**之類以為發散勝如腦  
麝能通利之類以為通利勝如銀粉膏  
硝設或當用而不可無之亦須酌量勿過可劑此幼幼書所謂  
藥者勸

論蜈蚣有毒

蜈蚣有毒惟風氣暴烈者可以當之然其風氣暴烈非蜈蚣能  
截能治亦不 止但用之 其平藥病相當弗容固執或半字或  
壹字或桐子半圓或桐子壹圓尤在酌量而作劑也設或過焉  
當以**通利**為解

凡幼兒欲發驚風先神志不定恍惚懼人搭眼上視左顧右  
眦伸手握拳悶鬱怒氣情態不若尋常如此者有驚即散驚  
有熱即退熱雍實即去雍實熱退則不生痰驚散則不生風  
壅滯通則氣得其平病無由作是固當以小劑治之若夫患  
在痰熱全未有風癇搐搦顛引之狀則只與退熱化痰如參  
蘇飲之類也謹勿妄投通關利膝等劑惡或透其熱流入經  
絡反成風痰此又小兒無病不可服藥之戒

世俗玩習以為小兒體熱或遇澡浴即與久坐湯水之中風  
冷外傷水濕內滲頃刻間遽成風搐或惡叫頻吐或昏迷失  
音或洩泄不已勢如暴風疾雨難以支吾不可不戒



# 疳

疳

積

熱

## 諸疳方論

兒童二十歲以下其病為疳二十歲以上其病為勞疳與勞皆氣血虛憊腸胃受傷致之同出而異名也何者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆乳食不調甘肥無節而作之或嬰幼闕乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根生或三兩時後乳食稍多過飽無度則疳以傷得或恣食甘肥粘膩生冷鹹酸以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食乖常喜怒勞勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不能調適之過乎疳皆脾胃受病內無津液而作也有因吐瀉之後妄施吐下津液虛竭得之者有因潮熱大下利無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裏證冷飲太過渴引水漿變而生熱熱

氣未散復下他邪得之者又有病疳寒熱脇下痛硬或者不能漸與消磨遂以礪巴峻決津液暴傷得之者此非醫家輕藥壞病之過乎疳之為候頭皮光急毛髮焦稀顛縮臍乾口嚙唇白兩眼昏爛淚暈搏眉脊登體黃闕牙咬甲焦渴自汗尿白瀉酸肚脹腸鳴癰結潮熱酷嗜瓜果鹹酸炭米泥上而飲水占飲者皆其候也疳曰五疳病關五臟以臟別之  
 一疳即驚疳由乳食不調心臟受熱所致也蓋其血氣未定乳哺有傷易生壅滯內有滯熱未得疏通故心神驚悸而作驚疳之候外證身體壯熱臉赤唇紅口舌生瘡胃膈煩悶小便赤澀五心皆熱盜汗發渴齟齒虛驚夫是之謂心疳  
 二疳即風疳由乳食不調肝臟受熱所致也若乳母寒暄不調滋味不節或外感風寒內傷喜怒邪氣未撤遽爾乳兒多成風疳肝者眼之候上膈伏熱痰涎壅滯以致肝風入眼赤腫翳生睛淚滿眼疳癢揉擦昏暗雀盲甚至經月眼合亦名疳眼外證眼目白膜渡睛眼青淚為頭揉

髮立筋青腦熱甲癢筋變渴汗多下痢瘡癩大是之謂肝疳  
 即急疳由乳食不調脾胃伏熱所致也凡甘味入於脾而  
 動虫虫動則侵蝕臟腑遂使孩提心下擾悶若上蝕齒斷則口  
 瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢肛爛濕癢生瘡瘰癧下蚤  
 精髓消耗難以有瘰癧者屢也目為濕爛多因疳傷久痢腸胃  
 受濕得之狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬為喻初作口氣名  
 腎主虛緩受熱邪疳氣直奔上焦故以走馬為喻初作口氣名  
 曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則齒爛名曰潰槽熱血并出名  
 曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐根其根既腐縱得全活齒不復  
 生外證腦熱肌削手足如水寒熱時來滑泄肚痛口臭乾渴齒  
 斷生瘡爪黑面蠶身多瘡疥夫是之謂腎疳即氣疳由乳  
 食不調壅熱傷肺所致也肺主乎氣鼻乃肺氣所通其氣不和  
 則風濕乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍赤癢瘡濕是為  
 鼻疳其瘡不痛汁所流處隨即成瘡亦名疳蠶外證欬喘逆

壯熱惡寒皮膚粟生鼻癢流涕咽喉不利頰爛唾紅氣脹毛焦  
 泄利頻併夫是之謂肺疳即食疳由乳食不節脾胃受傷  
 所致也或乳母恣食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致使  
 吐乳多眠久則變為乳癖腹脇結塊亦名炒疳外證面黃身黃  
 肚大脚細吐逆中滿乏力酷嗜水穀不消泄下酸臭合面困睡  
 減食喫泥夫是之謂脾疳五臟疳傷大抵然爾折而論之曰五  
 疳出虫曰蛔疳曰脊疳曰腦疳曰乾疳曰疳渴曰疳瀉曰疳痢  
 曰疳腫脹曰疳勞曰無辜疳曰丁奚曰哺露證狀非一可不舉  
 宏掃要而條析之乎五疳出虫者疳傷之源雖起於乳舖不調  
 然臟腑停積已久莫不化而為虫其虫或如絲髮或如馬尾多  
 出於頭項腹背之間黃白或赤者可醫青黑則難療也蛔疳者  
 失乳飯早食肉太早或腸胃停蓄甜膩化為蛔虫皺眉多啼嘔  
 吐清沫腹中下痛肚腹青筋唇口紫黑腸頭齒癢是也  
 蛔雖食

養疳者虫蝕脊骨身熱羸黃積



中生熱煩溫下痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡頭嘔  
爪甲是也腦疳者胎中素挾風熱生下乳舖越常頭皮光急滿  
頭餅瘡腦熱如火髮結如穗遍身多汗顯腫顛高是也臨產多  
然亦然易損兒眼乾疳者瘦悴少血舌乾多啼其病在心目不

轉睛乾啼少淚其病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎聲焦  
皮燥大便乾結其病在肺搭口癡眠胃腕乾渴其病在脾總為

五乾疳是也疳渴者臟中夙有疳氣加之乳母恣食五辛酒麪  
炙博使小兒心肺壅熱日則煩渴引水乳食不進夜則渴止是

爾疳瀉者毛乾唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下糟粕是爾勿用  
熱藥止之疳痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水

穀不聚頰下惡物是爾疳腫脹者虛中有積其毒與氣交并故  
令腹肚緊脹由是脾復受濕故令頭面脚手虛浮是爾法當磨  
積調氣疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胃前熱而發瘡

盜汗骨蒸咳嗽枯悴是爾或渴而復瀉飲水惡食肚硬如石面  
色如銀斷不可活無辜疳者腦後項邊有核如彈按之轉動軟

而不疼其間有虫如米粉不速破之則虫隨熱氣流散淫蝕臟  
腑以致肢體癱瘓便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是爾針刺破  
膏藥貼或淋濯兒衣露於簷下為雌鳥落羽所汚兒着此衣虫

入皮毛亦致無辜之疾兒衣之曬須微火烘之其若手足極細  
項小骨高尻削體痿緩大臍突號哭胃陷或生穀癥是為丁奚

虛熱來往頭骨分開翻食吐虫煩渴嘔噦是為哺露丁奚哺露  
皆因脾胃久虛不能化水穀以榮血氣故肌肉消鑠腎氣不足

復為風冷所傷使柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此  
皆無辜種類之疾病而至此不幾殆哉又有小兒久患腎疳內

虛不食甚者天柱骨倒治法當用錢氏此黃圓加驅疳等劑仍  
與貼項強筋若不識證謂之玉軟非也天柱骨倒凡有二種有

吐瀉日久羸弱成者有肝膽伏熱面赤唇紅忽變此者有傷寒  
不及發表成者是皆風邪入肝以致筋絡舒弛吐瀉者為誤胃

氣肝熱者隨輕重以涼肝並與強筋貼項惟傷寒天柱骨倒者  
 難療故併及之雖然疳之為說亦畧盡矣調治之法將何擇焉  
 錢氏曰治疳當辨冷熱肥瘦初病為肥熱疳久病為瘦冷疳熱  
 者涼之冷者溫之冷熱者溫涼之此其要也熱疳病多在外羣  
 下赤爛頭瘡濕癢五心煩熱披衣氣籠渴引冷水心煩臥地肚  
 熱脚冷潮熱往來皆熱疳也冷疳病多在內利色無常其沫青  
 白肢體軟弱目腫面黃又壹證燥渴臥地似有熱狀惟飲食不  
 進滑泄無已亦冷疳也其有瀉多膿血日加瘦弱此則謂之冷  
 熱疳大抵疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之冷  
 治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補故錢氏又曰小兒易  
 為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此而勿  
 誤是果非幼幼之綱領乎上醫處此消積和胃滋血調氣隨順  
 藥餌以扶之淡薄飲食以養之榮衛調和臟腑自然充實一或  
 過焉君子未保其往也取積之法又當權衡積者疳之母由積  
 而虛謂之疳極諸有積者無不肚熱脚冷須酌量虛實而取之  
 若積而虛甚則先與扶胃使胃氣內充然後為之微利若積勝  
 平虛則先與和導緩得一泄急以和胃之劑為之扶虛然取積  
 雖當疎利如**白朮散****消積丸****消積散**亦不可無脇  
 間疼痛亦虛中之積也先寒後熱飲水不食或因飲水以致喘  
 嗽錢氏有癖為潮熱之說治法解散寒熱即與下癖合是而觀  
 發作不同療治不一又可無權度於此哉若夫諸疳惡證心疳  
 飲水不已食則驚啼耳邊紋多舌上黯黑者不治肝疳左脇結  
 硬頻數吐涎目睛青筋眼角黑氣者不治腎疳飲水好鹹小便  
 如乳耳焦有聲牙寒骨枯者不治肺疳效逆逆氣促頻瀉白沫身  
 上粟生其色斑黑者不治脾疳喫泥泔水穀不消厚白腹高  
 人中平滿者不治其或滑泄不休脫肛吃逆抱起昏沉手足垂  
 軟視及脚心全不知覺項筋舒展身體變冷且則為五絕證候  
 甚者曾見喘喘乳食自瀉腫滿腹脹皮破發熱

光...與夫疳勞渴渴而槁色夭骨盡蓋張肚硬不食者皆危篤矣抑有聞焉右韞玉而山輝水懷珠而川媚人受父母之氣以生精血不榮胞胎有損如草木萌芽之受傷望其華實之不俟編者難矣丁奚哺露腦疳瘡爛非胎中已受之病乎不特此爾兒方週晬母復有孕乳汁成毒飲釀小兒神氣亦致骨立疔羸是謂之噎病音奇凡此等類盧扁復生難施其巧余於終篇所以為之抽關啓鑰云

諸疳證治

大醫圖諸疳通用

蘆薈

北五靈脂

好夜明砂煨縮砂

橘皮

青皮去白

蓬莪木煨木香

史君子各取錢

鷹爪黃連

蝦蟇日乾焦

右末雄豬膽貳枚取汁和藥入糕糊圓麻子大每拾伍圓米飲下疳勞瘦弱本方加白壹錢半川壹錢

大醫圖

蘆薈

黃連各壹錢瓜蒂

猪牙皂角

蝦蟇炙麝心麝

右末吹入鼻嚏則可療

大醫圖治一切疳及疳眼赤腫痛癢昏暗雀盲或經月合眼

鷹爪黃連

蕪荑煨

麥牙炒

神麴各半兩

青皮去白

史君子肉各取錢半

右末雄豬膽汁浸糕圓麻子大每柒圓米湯下疳熱眼山疳仁煎湯下

大醫圖治諸疳

蘆薈

蕪荑

木香

青黛散

檳榔

川黃連散胡黃連半兩

胡黃連半兩

麝心麝

右末猪膽貳錢取汁和藥圓麻子大每貳拾圓米飲下

**五疳** 治五疳潮熱肚脹髮焦

胡黃連 半兩

香潤五靈脂 壹兩

右末獺猪膽汁圓麻子大每服拾伍圓米飲下五疳潮熱謹  
勿用 **大黃黃芩**

**五疳**

川黃連 去骨 無莖 取仁

神麩 炒

麥蘖 炒

橘紅

木香

蝦蟇 燒存性

史君子 各壹錢

肉豆蔻 生

雞心檳榔 醋 麝香 研

右細末雄猪膽貳枚取汁入好酒打清麩為圓芥子大每服

拾伍圓米飲下

**胡黃連** 治熱疳

胡黃連

川黃連 各半 朱砂 壹錢 研

右貳連為末和 **朱砂** 入猪膽內繫定虛懸於銚中煮壹炊久

取出研 **麝香** 各壹錢 半去足 **蝦蟇灰** 貳錢 麝 少許 搜

米飯圓麻子大每每拾圓食後米飲下

**至聖** 治冷疳疳瀉

丁香

丁香 各壹錢

木香

紫厚朴 製

史君子肉 生

肉豆蔻 各壹錢 橘紅 各壹錢

右末神麩糊圓麻子大每柒圓食前米飲下

**通神** 治冷熱疳

胡黃連

川黃連 各壹錢

木香

無莖 各壹錢

丁香

肉豆蔻 生

史君子 各壹錢

大蝦蟇乾 壹錢 研

右末膏和圓麻子大每拾圓米飲下

**伏神** 治心疳驚疳

伏神

薑黃

琥珀

川黃連 研

赤茯苓 各壹錢

釣藤皮

遠志肉 各壹錢

蝦蟇灰 各壹錢

細節石 各壹錢

麝香 研

粟米糊圓麻子大每拾圓薄荷湯下

**大麻圓** 治肝疳風疳疳眼

青黛 散 川黃連 天麻 北五靈脂

夜明砂 微炒 川芎 蘆薈 各貳錢 龍膽草

防風 蟬殼 去足各半 全蝎 煎成 麝香 小許

乾蟾頭 炙焦各半

右末猪膽汁浸糕圓麻子大每拾圓薄荷湯下

**生熟地黃湯** 治疳眼閉合不開內有朦霧

生乾地黃 熟地黃 各半 川芎 半赤伏苓

枳殼 製 杏仁 水浸去皮 川黃連 半 半夏 麩

天麻 地骨皮 甘草 各貳錢半

右剉每服貳錢薑參片黑豆拾伍粒水煎臨卧服

**地黃圓** 治腎疳

大熟地黃 淨洗切半 赤伏苓 山茱萸 肉焙

當歸 川芎 川練子肉 焙 牡丹皮

山藥 焙 史君子 各貳錢

右末煉蜜圓桐子大每參圓空心溫湯化下

**走馬疳方** 治口齒出血臭氣

銅綠 半錢 生蜘蛛 壹枚

右研細入麝少許夾和擦齒如無蜘蛛即用殼貳箇

**清肺散** 治肺熱疳匿蝕為穿孔汁臭或生息肉

桑白皮 兩炒半 紫蘇 北前胡 黃芩

當歸 天門冬 去心 連翹 防風

赤伏苓 北梗 生乾地黃 甘草 各壹分

右剉每服貳錢井水煎食後服次用 **化嬰圓**

**化嬰圓**

蕪荑 蘆薈 青黛 散 川芎

白芷梢 胡黃連 川黃連 蝦蟇灰 等分

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每服貳拾圓食後臨卧煎湯下其蟲常用赤小豆泡湯小筆蘸洗俟前藥各進數服却末入韋欒末

**靈脂**治脾疔食疔

北五靈脂 縮砂仁 白豆蔻仁 麥牙  
蓬朮 青皮 橘紅 史君子肉

各貳錢

右末米糊圓麻子大每拾圓米湯下

**山豆**治疔諸虫

新白苦練根皮 綠色貫衆 木香

桃仁 燕美 雞心檳榔

鶴虱 輕粉 乾蝦蟇 史君子

右末飛麩糊圓麻子大每貳拾圓天明清肉汁下内加

**川黃連**各貳錢半治脊疔兼疔勞方可擇用

**龍膽草**治腦疔腦熱餅瘡

龍膽草 川升麻 苦練根皮 防風

赤伏神 蘆薈 油髮灰 青黛

各參錢

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每貳拾圓薄荷紫蘇泡湯下食後仍以

**黃連**治疔渴

黃連 瓜蒌根

烏梅肉 杏仁 石蓮肉

右末牛膽汁浸糕為糊圓麻子大每拾伍圓煎烏梅薑蜜湯

下又察虫後附

**香薷**治疔瀉

黃連 肉豆蔻 木香 訶子

縮砂仁 伏苓 各壹兩  
右末粳飯圓麻子大每拾伍圓食前米飲下

**木香圓** 治疳痢

黃連 各壹兩 木香 紫厚朴 各壹兩 縮砂仁  
夜明砂 各壹兩 訶子肉 炒壹錢

右末粳飯圓麻子大每拾伍圓乾艾葉生薑煎湯食前溫下

**楊圓子** 治疳腫脹

蘿蔔子 壹兩 陳皮 青皮 去白 好檳榔  
黑牽牛 炒壹兩 北五靈脂 赤伏苓

蓬莪木 各壹兩 木香 壹錢半

右末飛麩糊圓黍豆大每拾伍圓煎湯下又

**疳積散** 治疳積 未煎紫蘇湯調下少吞

**疳積散** 治疳脹肚皮緊

黃耆 壹兩 當歸 川芎 白芍藥  
生乾地黄 蝦蟇 去足 鱉甲 炙焦 人參  
白伏苓 橘皮 半夏麩 柴胡

史君子 各壹兩 甘草 各壹錢

右鹿末每貳錢薑棗煎食前服之

史君子 各壹兩 甘草 各壹錢

右鹿末每貳錢薑棗煎食前服之

**疳積丸** 治疳勞

人參 半兩 川芎 蕪荑 柴胡 各壹兩  
史君子 各壹兩 胡黃連 川黃連 各壹兩

右用 **疳積丸** 壹錢益 **疳積丸** 壹兩拌和貳 **疳積丸** 壹兩宿次早炒乾

透去 **疳積丸** 并血口用貳連夾餘藥杵末粟米粉糊圓麻子大

每貳拾圓食前熱水下

**疳積丸** 治無辜疳諸疳壹服虛熱退貳服煩渴止參服瀉痢住

蟾除 壹兩 黃連 壹兩 胡黃連 壹兩 川黃連 壹兩

右取 **疳積丸** 壹杓置漏中以尿浸之候上更乾不與虫走

**打殺頓**在虫中恁與虫食壹日夜次以新布作袋盡也  
繫定置之急流壹宿取出瓦上焙為末入**壹**字梗飯搥圓  
麻子大每貳叁拾圓米飲下

**又方**治無辜疳

夜明砂炒為末入諸飲食中與之

**十全丹**治丁美哺露

青皮

陳皮 各去白蓬朮

川芎

北五靈脂

白豆蔻仁

雞心檳榔

蘆薈 各半兩

木香

史君子肉

蝦蟇灰

各三錢

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每貳拾圓米飲下有熱則薄  
荷湯下

**五珍圓**

治疳傷肚大

**快癖圓**

治疳積

方並見積類

**和劑方小黃連回膠圓**最治小兒諸疳疳熱疳瀉每服貳拾圓

米飲下

**疳啞不能發聲方**

前黃連肥兒圓每服拾伍圓用**蘇合香圓壹**

粒入**朱砂五靈脂**末各少許以**石昌蒲**煎湯乘熱調開送下

**龍膽湯**治眼病

龍膽草

歲炒

釣藤皮

柴胡

北梗

苦藥

川芎

茯苓

甘草 各錢

人參

大黃 煎錢半濕紙裹煨

右剉散每貳錢井水煎服仍以紅紗袋**夜明砂**與兒帶

**疳瘡方論**

凡人自孩提以至弱冠潮熱發瘡只是疳氣使然蓋疳虫耗其  
精髓蝕其肌膚體虛膚燥疳熱流注遂致遍身熱瘡發歇無已  
須用**疳疔****疳疔**主治仍以**大腹皮****白芷**煎湯浴之

**疳疔**

藥夾和佐之可也

**疳疔**

**疳疔**



雄猪肚 青貝 煎淨

鷹爪黃連 去毛 煎淨 水煎

右剉作小截少水和濕納猪肚中用線縫密頭在伍升粳米上蒸十分爛取放臼中入此蒸飯搗千餘杵粘實得所衆手捏圓如小桐子每服貳拾圓米飲下童子倍之冠者又倍之  
行以 調血清心熱多者間服  
藥同前凡兒童諸病不出於疳則出於熱熱則生痰常須識此矣



# 積

積滯方論

小兒有積面目黃腫肚熱脹痛覆睡多困酷啼不食或大腸閉澁小便如油或便利無禁糞白而酸此等皆積證也然有積者要當明辨吐乳瀉乳其氣酸臭此由啼叫未已

以乳與兒停滯不化得之是為乳積肚硬帶熱瀉瀉或嘔此由飲食無度多餐過飽飽後即睡得之是為食積腹痛啼叫利如解勃此由觸忤其氣榮衛不和淹延日久得之是為氣積合用  
推此可見 雖然積有虛有實虛積渾身微熱不思飲食昏昧神緩抱起如睡實積肚熱糞閉顯腫喉塞壅盛涎鳴熱毒發瘡  
身體熱者惟腹肚之熱為甚人知傷積肚熱糞酸極臭而夜間有熱傷積之明驗人所未識也其或變證面黑瀉黑又瀉不止腹肚脹滿氣出鹿六手心生瘡瘦弱柔軟皆不可療。小兒消積多用 最能發汗有汗者勿與之

積滯證治

木香圓 治乳積食積氣積

木香

蓬莪朮

縮砂仁

青皮 去白

朱砂 煎

小兒疳石 煎

大丁香 煎

川巴豆肉 煎

右細末和勻飛白麩糊圓麻子大風乾每服貳冬圓乳傷乳  
汁下食傷米飲下後與大異香散方見脹滿門或

**散**亦得氣積橘皮煎湯下下後與**下積圓**治乳食傷腹脹滿氣逆壯熱或瀉或嘔

丁香

縮砂仁

史君子

烏梅肉

川巴豆肉

各各三圓不去油

右末研細和勻爛飯圓麻子大每冬圓橘皮煎湯下

**散**治酒食積通用

青皮入去白乾薑燒帶生

北五靈脂

蓬莪木各各兩

右為末夾和秤藥末壹兩用**肥巴豆肉**以石壓准去半油秤  
壹錢研細拌和粳米飯圓麻子大每服冬伍圓米湯下不飢  
飽時服

**散**治疳積

方見

**散**治驚積

方見

方見

**散**治驚積有熱

方見

方見

**散**治驚積

方見

方見

痞結證治

痞者塞也結者實也熱氣蘊於胃腸之間留飲聚於腹脇之內  
於是榮衛不得流行腑臟不得宣通由脹滿而至痞結勢使然  
耳此熱實之證也時或發為壯熱**聖藥白散**主之

**聖藥白散**

甘遂青分

青皮浸去

白芷

黃芩

川大黃

各各半兩

右麓末每服壹錢水小盞煎去滓溫和服量大小增減用得  
通利則止後服利後以糜粥放冷補之

瘴氣證治

瘴者血膜包水僻側於脇傍時時而作痛也惟瘴為能發潮熱  
惟瘴為能生寒熱故瘴家中脫多畜黃水日久而後結瘴寒熱  
之不已者以此小兒臍腹和平榮衛諸陽則津液自然流通縱  
使多飲水漿不能為病惟夫乳哺失調二焦開隔以致水漿停  
滯腸胃不能宣行冷氣搏之於是結聚而成瘴輕者用積滯

木香圓重者用取辟風

取辟風

甘遂微炒 芫花炒

牽牛半炒半生

辣桂 蓬朮

青皮去白

木香

桃仁去皮

五靈脂各等分

右細末入去油巴豆壹錢研和十分細飛麩糊圓麻子大風乾每服壹貳圓食後擦薑泡湯下泄後冷粥補仍和胃

淡墨圓治乳癖殺癥腹中塊痛

代赭石火服研細

青皮去白

木香

蓬朮

五靈脂

北大黃各等分

巴豆壓去油

右末醋麩糊圓麻子大每服貳圓食後擦薑泡湯下

代赭圓治小兒腹中結癖塊痛

代赭石

川大黃各等分

木香

五靈脂

朱砂

桃仁去皮

辣桂各壹分

巴豆肉

右細末糕糊圓麻子大風乾每服伍圓薑湯下



熱

諸熱方論

小兒有病惟熱者多夫熱有虛有實實則面赤濃黃氣麤口熱燥渴唇腫大小便難撤揭露衣煩啼暴叫虛則面色青白恍惚神緩口中清冷噓氣軟弱泄瀉多尿夜出虛汗其或乍清乍溫佛鬱悸惕上盛下泄水穀不分此則冷熱不調之證虛熱者

實熱者四順消渴加... 冷熱不調則取毒散

參圓薄荷湯研下。小兒表裏俱熱面黃頰赤唇燥口乾小便赤澀大便焦黃先以四順消渴散

復熱者裏已消而表未解也當用... 少加... 以取

復熱者裏已消而表未解也當用... 少加... 以取

復熱者裏已消而表未解也當用... 少加... 以取

癰氣

微汗則表熱盡除其或表裏已解而熱又時來此則表裏俱虛  
氣不歸元而陽浮於外不可再用涼藥毒與解表當為和其胃  
氣使陽斂而歸內身體自涼矣方見虛勞門 薑棗略  
煎服

諸熱證治

如法治小兒頭熱身熱口中熱氣大便黃赤清涼散方

加則曰此散最妙

人參白朮散治兒童虛勞關熱潮熱或遍身瘡

北參

當歸

遠志浸取肉

北前胡

紫胡

地骨皮

防風

北梗

枳殼

半夏各等

川芎

伏苓

赤芍藥

麥門冬

各等

甘草冬三錢

右判細每服貳錢水小盞薑冬片紫蘇冬肆葉煎服發瘡者  
兼服清涼散別作小圓不惟治瘡治渴其發

潮熱而肚脹者米飲常服貳拾圓

諸證治小兒每日早飯後發熱夜則身涼此血熱也

胡黃連

宣黃連

赤芍藥

右末續猪膽汁和成劑入膽皮中虛掛以漿水煮熱取藥研  
圓麻子大每貳拾圓米飲常服

龍膽草

黃連

史君子肉

青皮等分

右末猪膽汁圓麻子大每拾圓食後熱水下

清解散治感風發熱頭疼鼻塞涕流及溫壯悉主之

北參

防風

天麻

北前胡

伏苓

北梗

枳殼

甘草各等錢

細辛

柴胡各等

川芎各等

右末每壹錢水小盞薄荷乾參葉略煎溫和服

新刊仁齋直指小兒論卷之二

# 傷寒

## 傷寒方論

或問小兒傷寒可得聞乎曰小兒傷寒與大人法度則同但分劑少異用藥少冷已略陳於前矣然而驚風瘡豆亦嘗贅布此尤不可闕請發明藥證而條析之惡風惡寒者必隈人藏身引衣密隱是為表證可微取其汗也惡熱內實者必出頭露面揚手擲足煩渴燥糞垢衣氣籠是為裏證可略與疎利也至若頭額冷手足涼口中冷氣面色黯淡大便瀉青此則陰病裏虛當以溫藥救其裏也舉是二者汗下溫之法可以類推矣發汗用桂枝麻黃各半湯加黃芩解肌用香蘇散加葛湯通利四順清涼飲微利人參敗毒散溫裏理中湯散冷甘豆乾薑湯尋常感冒陰陰散或香蘇散傷風發熱人參羌活散或天麻防風圓壯

傷寒  
熱者升麻葛根湯潮熱者白厚散小兒驚風湯加大黃小便不通者五苓散五苓散由發散表裏俱熱如表裏俱見之證麻黃散主之咳嗽則人參潤肺散加除痰散夾食則異香散除積圓葦然亦視其小便或赤或白可以知裏熱之有無或清或濁可以知裏熱之輕重幼而嬰孩則以虎口指紋之紅色驗之長而童孺則以一指按其三關據左手人迎之緊盛者斷之所謂七十二證其證其方皆無越張朱格例特不過小小分劑而中病則止也不然幼幼新書駢集小兒傷寒雖略舉集源一二而終篇以活人書為法果何意哉故附于卷末以備學者之觀覽云

## 傷寒證治

### 桂枝麻黃各半湯

桂枝 字分青皮為藥

生薑 半兩 甘草 半兩

麻黃 法廣計

杏仁 法廣計

大棗 貳枚

**香蘇散** 治四時瘟疫傷寒

香附子去毛 紫蘇葉略 青橘皮去白 甘草各兩

右為籠末每服參錢水壹盞煎柒分去滓熱服不拘時日參服解肌加**防高**前若作細末只服貳錢入鹽點服

**升麻葛根湯** 治小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩疼 方見傷類

**小柴胡湯** 方見暑門 **理中湯** 方見傷類 **甘露飲** **四順飲** 方見積熱門

**五苓散** 方見水瀉門 **參蘇飲** 方見善疹門 **人參羌活散** 方見眼目門

**人參瀉肺湯** 方見咳嗽門 **紫霜圓** 方見食積類

**人參救急散** 方見寒類

# 寒瘧

寒瘧證治

**常山散** 治小兒發瘧痰壅煩悶

川常山 川大黃 甘草各半兩

桂心 烏梅肉各壹分

右剉細每服壹錢井水小盞煎半候冷未發前與之

# 虛寒

虛寒證治

惟腎主虛亦惟腎受寒小兒骨氣未就雖虛而不容補但以**地**

**黃圓**與之 方見腎門 厥冷者以**生乾薑**灸之**甘草**煎湯調下洞

泄者却專用**木香****白朮****生乾薑**各壹分**辣桂**灸之**白豆**各半分到

細量大小作劑入陳米煎服

# 虛汗

虛汗證治

**養心湯** 治小兒虛汗盜汗或心血虛盛以致發為汗此藥收斂心氣

新羅人參 川當歸 各五錢

右剉細用雄猪心壹箇切穿片每服貳錢猪心壹片并水壹盞半煎至壹盞食前兩次服

又撰方

黃連

母蟻粉

貝母 各半兩 米粉 壹斤 末傳



# 痰涎

痰涎證治

痰涎方論直指講之詳矣但小兒受病多生於熱熱則生痰痰者諸病之根也故申言之用藥白圓子方見身疼類加朱砂同

研細薄荷泡湯入薑汁少許調下風痰蘇合香圓并天麻防風

圓方見身疼類加朱砂末薑汁泡湯調下餘方見直指方痰飲類

擇焉

風痰證治

朱砂圓 鎮心厭驚驅風墜痰

朱砂研十分直僵蚕洗焙大南星炮製白附子濕紙煨乾

全蝎氣燄麝香字

右末飛白麪糊圓麻子大每服伍圓薄荷湯溫服

奪命散 控下風痰全活危急

青礞石青兩煅消青兩和入磁石內煨火煨細

右末每服壹錢匕急風薄荷汁入蜜調下延藥自大便出狀

如稠涕次服退熱截驚等劑慢風木香入少蜜煎湯調下涎

即墜入腹中次服

育州謝家白圓子

圓白大半夏湯浸藥炙

圓白天南星洗皂角

真川烏去白附子洗皂角

天麻各半兩全蝎壹分

右細末生薑汁黃飛麪糊圓麻子大每拾圓熱水下諸癇

圓子研入朱砂

嗽白圓子末紫蘇烏梅煎湯入薑汁調下寒瘧白圓子金兩  
丹等分為末米飲調下大抵小兒諸病非熱則痰治痰惟用  
夏為上上藥

# 喘咳

咳嗽喘嗽諸治

杏仁膏治小兒久患咳嗽

杏仁去皮兩半伏苓青兩

紫苑茸

皂角去皮各半兩

右末每半錢生蜜調入薄荷湯泡開服

紫苑湯治小兒喘嗽

紫苑茸

貝母

真蘇子微炒

杏仁水浸去

北梗

陳皮

麻黃去節

半夏麩

赤伏苓

桑白皮

甘草微炙

右剉細每服壹錢薑參片紫蘇參葉并嫩梗准水煎服

人參枳實湯治感冒咳嗽喘胃滿痰滯

人參三分

枳實炒

桑白皮炒

半夏製

赤伏苓

五味子

細辛淨

北梗

麻黃去節

阿膠炒

甘草炙各半兩

右剉散每壹錢薑參片紫蘇參葉水煎服凡治喘嗽不論肺  
實肺虛可汗可溫可下藥中須用阿膠便得安肺潤肺其性

和平肺經要藥

# 脾胃

胃氣虛實證治

凡人以胃氣為本惟治病亦然胃氣有虛有實虛則有嘔吐不  
食之證實則有痞滿內熱之證虛者益之實者損之欲得其平  
則可矣胃虛用木香等劑胃實用北梗等劑又不可開  
木香等劑若夫胃中停寒則



貴在酌量但以小小與之夫是之為平胃

驚惕不食

心者脾之母進食不止於和脾蓋火能生土當以心藥入於脾  
胃藥之中庶幾兩得古人進食方劑多用**益智**者此也

益智仁

石昌蒲

白茯苓

蓮子肉

陳皮

縮砂仁

半夏麴

木香

厚朴各煎

甘草

各書錢壹字

右剉細每服壹錢薑叁片棗壹枚水壹盞煎不飢飽服

# 吐瀉

嘔吐證治

**消乳丹**治乳哺不化停滯中脘或作嘔惡

丁香

木香

青皮

生肉蔻

三稜

蓬木等分

右細末稀麩糊圓麻子大每服伍圓米飲下日貳服

**益胃散**快膈益脾止嘔進食

木香

丁香

藿香

陳皮

縮砂

白豆蔻仁

各壹分

甘草

各壹錢

右細末每服叁字煎薑棗湯乘熱調下或加**益智**

**半真散**治小兒胃虛嘔吐水穀不能入

圓白半夏

湯浸洗米泔水

陳梗米

各壹錢

右剉細每服壹錢水大盞薑伍片北棗壹枚煎半溫服

吐瀉證治

**維舌香散**治小兒吐瀉

良薑

香附

天公烏藥

辣桂各貳錢

甘草

加陳皮

藿香各壹錢

右細剉每服壹錢水煎灌下仍別煎與乳母服

**艾香散**治霍亂吐瀉

藿香葉

陳皮

肉豆蔻生

半夏製

青皮

酸木瓜

甘草微炙

石昌蒲或錢

右細剉每壹錢薑叁片紫蘇參果水煎服暑月加**香薷**

又方

藿香

肉寇生

甘草生

右為麤末每服壹錢新水煎服

不換金正氣散

加**木香****大苓**治嘔瀉

油瀉證治

鍾乳震靈丹

治小兒腎泄面顰黑齒消脫骨力弱小腹痛泄多

白膿震靈丹

治小兒瀉類參圓為末入**鍾乳**半錢以炒成散

壹錢半

治胃虛腹痛泄利

木香益黃散

治胃虛腹痛泄利

陳皮

青皮

苛子肉

丁香

木香

甘草

右細末每服壹錢陳米少許水煎服

肉豆蔻散

治小兒腹痛大瀉

肉豆蔻

治小兒冷熱不調上盛下泄

木香

當歸

川芎

北前胡

柴胡

青皮

北梗

甘草

半赤色伏苓

等分

右剉散每服壹錢薑棗煎不飢飽服

瀉痢證治

沒石子圓

治疳積或大便瀉

白沒石子

白豆蔻仁離訶子肉爛

木香

黃連

右末粳米糊圓麻子大每服拾伍圓米飲下

亦列

藍青精汁每服半盞與之

# 腹痛

腹痛證治

腹痛多因邪正交爭與臟氣相擊而作也挾熱作痛者以面赤或壯熱四肢煩手足心熱見之挾冷作痛者以面色或白或青見之冷甚而證變則面色黯黑唇口爪甲皆青矣熱證四逆清

**寒水**

加青皮

方見續熱川

冷證消迷七氣湯

方見果明加

**寒桂**

調寒合香圓

方見喉門

若乃邪正交爭冷熱不調則括梗

**救急湯**

方見氣門

加青皮陳皮木香當歸為妙

# 腫脹

腫脹證治

**葶藶散**

治小兒水氣腫滿

甘草

薤白

紫牽牛

桑白皮

炒

雞心檳榔

川大黃

判若等分

**氣飲**

研青木香圓

灌下

右為末每半錢水半盞置煎片蜜半匙煎湯調下或煎大流

北梗

赤茯苓

陳皮

桑白皮

炒

大腹皮

枳殼

半夏

真蘇子

湯炒

紫蘇

甘草

各真錢

厚果仁

宜錢

右劉每壹錢半水小盞置煎片蜜壹枚煎半服

陰腫證治

人有常言天生地長多與小兒近地然兒有大小壯弱起止中節可也夫苟腎經氣虛或坐石不起冷氣凝之或近地經久風邪濕氣傷之不為陰腫淺希矣間有啼叫怒氣閉擊於下結聚不散加以水竇不行亦能發為此疾治法用

桃仁

長夫皮

煉桂

牽牛

炒

白痰梨

炒香搗去刺

牡丹皮

北黃

各取錢二

右末煉蜜圓麻子大每服伍圓或柒圓青皮末通入葷  
少許煎湯灌下或煎天流氣飲研青木香圓灌下水飲門

**傳藥**

母蠟灰

貳分

乾地龍

壹分

右細末津唾調傳外腎熱者雞子清調傳

**母蠟**

治小兒外腎腫大莖物漏明

母蠟粉

研十分細先以津唾塗腫處次以母蠟粉摻傳

**又方**

卵腫研白唾調傳

# 大小便諸證

遺尿證治

小便者津液之餘也腎主水膀胱為津液之腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能約制其水出而不禁謂之遺尿睡裏自出

謂之尿床此皆腎與膀胱俱虛而挾冷所致也用雞腸

**雞腸**

雞腸

牡礪灰

白伏苓

真桑螵蛸

微炒

辣桂

龍骨

各貳錢半

右龍末每服壹錢薑棗煎服

**又方**

雞肫脰

壹具

雞腸

燒存性

右為末每壹錢酒調下男用雞肫脰女用雞腸

尿白證治

小兒尿如白米泔狀由乳哺失節有傷於脾致使清濁不分而色白也久則成疳亦心膈伏熱兼而得之用伏苓

**伏苓**

京三稜

蓬莪木

縮砂仁

赤伏苓

各半兩

青皮

陳皮

滑石

甘草

微炙 各貳錢半

右末每服壹錢

煎湯調下

**又方** 大甘草頭煎湯服

諸淋證治

**葵子散** 治小兒諸淋

葵子 車前子 木通 蘧麥

桑白皮 赤茯苓 山梔仁 甘草 各等分

右剉每壹錢井水小盞葱白貳寸煎柒分食前温服

**通赤散** 治小兒血淋

生乾地黄 木通 黃芩 甘草 各壹錢

右為末每服壹錢井水入燈心煎服仍以米飲調 **通赤散** 空  
心灌下

**承血方**

生蒲黃 生地黄 赤茯苓 甘草 各等分

右剉每壹錢水小盞煎柒分調服 **承血方** 食前服

大便不通證治

**沒藥散** 治小兒風與滯血留蓄上焦胃膈高起大便不通

沒藥 大黃 枳殼 北梗 各別錢

木香 甘草 各壹錢

右剉每壹錢薑貳片水煎服

脫肛證治

**龍骨散** 治小兒大腸虛肛門出

龍骨 訶子肉 沒石子 大者

嬰粟殼 去穢 赤石脂 各貳錢

右末每服壹錢米飲調下

**丹毒**

丹毒證治

熱毒與血相擊而風乘之所以赤腫遊走而偏體也此由乳母  
酒麪煎灸過度與夫烘衣與兒不候冷而即著多成此候或發

於手足或發於頭面胃背令兒燥悶腹脹其熱如火痛不可言  
纔有入腹入腎之證便不可救藥通用

**真方** 外用 井水入蜜研傳

北梗 天花粉 乾葛 川升麻

川芎 赤芍藥 獨活 柴胡 甘草 等分

右劉散每壹錢薑貳片井水煎服餘見丹疹門

# 吐衄

吐衄證治

治小兒吐血咯血

生蒲黃 油髮灰 等分

右研細每壹錢煖酒調下或米飲亦得

治小兒吐血衄血

生地黄汁取壹合調髮灰半錢分作兩服食後少頃灌下

生羅苜搗汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

# 雜證

顛陷證治

始因臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血氣虛弱不能上充  
腦髓故顛陷如坑不得平滿

顛填證治

顛填者顛門腫起也脾主肌肉乳哺不常飢飽無度或寒或熱  
乘於脾家致使脾臟不調其氣上衝為之填脹顛突而高如物  
堆聚毛髮短黃自汗是兩若寒氣上衝則牢勒熱氣上衝則柔  
軟寒者溫之熱者涼之劑量宜輕兼與調氣小兒肝盛風熱交  
攻亦然未易良瘥

解顛證治

小兒年大頭縫開解而不合也腎上髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足所以頭顱開而不能合九腦髓入少如木無根不過十日終成廢人姑與

大熟地黃 洗焙厚切

山茱萸

乾山藥 各貳錢

澤瀉 青錢

牡丹皮

白茯苓 各壹錢半

右末煉蜜圓桐子大每壹貳圓溫熱水空心調服仍用

微炮為末米醋調傳於緋帛烘熱貼之

又方

華陰細辛 去苗土

辣桂 去麋皮 乾薑生

右等分為末乳汁調傳

口舌證治

口舌證治

髮灰細末猪脂和傳

重舌證治

重舌者心脾俱有熱也心候於舌所主者血脾之絡脉出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附舌根而重生壹物形如舌而短小是也有著頰裏及上腭者曰重腭有著齒齦者曰重齦皆當刺去其血也用

木舌證治

舌者心之候脾之脉絡於舌也臟腑壅滯心脾積熱熱氣上衝故令舌腫漸漸脹大塞滿口中是為木舌若不急療必至室人

壹字研細調下○又方黃蜀黍研細壹分同研點柒次○又方

滯願證治

小兒滯願涎流出而漬於頰間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎液自流不能收約法當溫脾

半夏

木香

丁香各口壹錢

川白薑生

白朮

青皮

陳皮各口壹錢

右細末糕糊圓蘇子大壹歲拾圓貳歲貳拾圓米湯灌下

喉痺證治

喉痛證治

蛇退存性為末

右每半錢乳汁調下或用燒存性為末每半錢乳汁調下

語遲證治

言心聲也小兒受胎其母卒有驚怖邪氣乘心故兒感受母氣心官不守舌本不通四五歲長大而不能言也

驚風

人參

石昌蒲

麥門冬去心遠志取肉薑製

川芎

當歸各壹錢滴乳香

朱砂各壹錢別研

右末煉蜜圓蘇子大每服拾圓糝米飲下

夜啼證治

夜啼小兒臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則為陰極發燥寒盛作疾所以夜啼而不歇也

釣藤

伏神

伏苓

川芎

當歸

木香各壹錢甘草炙

右末每服壹錢薑棗略煎服其或心熱而煩啼必有臉紅舌白小便赤澀之證加朱砂末壹錢研和每服壹錢煎湯調下又有觸犯禁忌而夜啼者醋炭重服

又方燈心燒灰存性塗傳乳上與之

眼病證治

眼痛

明目藥分并小兒口

右入大匙以綿裹過點於子許



耳病證治

耳者腎之候小兒腎氣素實其熱上衝於耳遂使津液壅滯為稠膿為清汁者此也亦有沐浴水入耳中水濕停留傳於血氣溫熱成熱亦令耳膿久不瘥變成聾耳

龍骨

明礬龍骨各等分黃丹黃丹明脂明脂少許

右細末先以綿杖拭去水次以鵝毛管吹藥入耳本方加

亦好

胡粉和東方壁土為末傳

又方

蝦蟇燒灰存性搗為末和猪膏傳

胃高脹滿其狀如龜此肺經受熱所致也乳母酒麪無度或夏

月熱煩熱乳與兒得之或乳母多食五辛亦成此候

川大黃分天門冬去心杏仁去皮百合

木通 桑白皮炒 甘草麩炒 爛石膏各半兩

右末煉蜜圓綠豆大每伍圓食後臨卧熱水化下

龜背證治

嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓致之或小兒坐早亦

致偃偻背高如龜背矣然此多成痼疾間有灼艾收功

第三椎骨下兩傍各壹寸半膈俞穴第柒椎骨下兩傍各壹寸

半以小兒中指中節為壹寸艾柱如小麥大但參伍壯而止

臍病證治

安胎散治臍中汁出或赤腫

白石脂末焙出火氣傳之日參度或油髮灰傳或當歸末傳

當歸末傳亦好

鶴節證治

小兒稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露如鶴之膝抑

亦腎虛得之腎虛則精髓內耗虛羸不榮易為邪氣所籠百就

枯槁其殆鶴脚之節平前項... 伍圓

行遲證治

骨者髓之所養小兒氣血不充則髓不滿骨故軟弱而不能行

又方(虎骨圓)

虎膠酒炙 生乾地黄 酸棗仁酒浸去皮炒香

白茯苓 辣桂 防風 當歸

川芎 牛膝等分

右末煉蜜圓麻子大每伍圓酒調下或煎木瓜湯下

五加皮酒

治小兒參歲不能行 真五加皮 牛膝 酸木瓜乾各半分

右末每服壹錢半以粥飲調次入好酒貳點再調食前服

日貳劑

癩疝證治

癩疝者陰核氣結腫大而吊痛也多因小兒啼怒不止傷動陰氣故陰氣下擊結聚不散而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉亦變此候惟是陰氣不得流行加以風冷入焉血水聚焉故水氣上乘於肺先喘急而後疝痛其狀有如李者亦有稀軟者亦有并腎腫大者亦有木硬者臍下痛楚皆不能忍用藥行心氣逐腎邪利其大小二便更無補法

木通入少鹽煎湯調下以利小便

當歸散

辣桂

牽牛各半兩

當歸

比大黃

桃仁各半兩

全蝎壹錢半

右細剉每壹錢水入蜜煎服以利大便利後青皮陳皮伏火

**木香** 和胃惡證厚青不治

**小兒散** 治小兒疝氣小腹引腰脊彎出身不能直

木香 檳榔 三棱 蓬朮炮

青皮去白 陳皮 川練肉 羌活米醋浸炒

辣桂 牽牛生取仁 川巴豆肉不火油

右細末飛麩糊圓罌子大每冬圓空心壹服午前壹服薑湯送下

瘡癬證治

**鯽魚** 治小兒白禿瘡

鯽魚言尾重安手背兩者去腸肚以 雄黃 黃蠟

右同末生酥油調傅先以蠶水洗拭後用藥

**又方** 桑榆白皮為末醋調傅

**又方** 練模枝皮燒猪膏調傅

**又方** 蛇皮燒存性為末猪膏調傅

**漏方** 鍊成松脂末并髮灰生號丹填傅

**黃方** 白膠香半兩礞末礞石 貳錢研和猪脂調傅或

猪筒骨髓調白膠 亦治大風即是白膠 露煉投冷水中為末

水調空心常服

**瘡方** 治卒得瘰癧 赤爛牛糞燒灰研細傅

**瘡方** 瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿

蛇退皮燒存性細研雞子清調傅

**瘡方** 燕窠土研細猪脂調傅

**瘡方** 水銀壹分 胡粉貳分水研入雞冠血傅

**前甲散** 治小兒眉叢中生瘡各曰鍊銀癬

穿山甲前膊鱗炙焦為細末麻油輕粉調傅

# 瘡疹

## 瘡疹方論

小兒瘡疹大抵與傷寒相類發熱煩燥臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴噴呵欠嗽喘痰涎傷寒證候類有之始發之時有因傷風傷寒而得者有因時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得者有因跌撲驚怒蓄血而得者或為鼠眼禁牙驚搐如風之證或為口舌咽喉腹肚疼痛之狀瘡從口腹中出故痛或為煩燥

狂悶昏睡譫語之形或自汗或下利或發熱或不發熱證候多端卒未易辨方論所載以耳冷翕冷足冷驗之蓋謂瘡疹屬陽腎臟無證耳與翕足俱屬於腎故腎之所部獨冷然疑似之間或中或否不若視其耳後有紅脈赤縷為真於此可以稽驗矣調護之法首尾俱不可汗下但溫涼之劑兼而濟之解毒和中

安表而已如欲解肌葛湯或蘇可也其或小兒氣實煩燥熱熾大便秘結則與犀角地黄湯人參敗毒散或紫雪膏飲多服亦能利之小便赤少者分利小便則熱氣有所滲而出凡熱不可驟過但輕解之若無熱則瘡又不能發也已發未發並與參蘇為當虛者益之實者損之冷者溫之熱者平之是為權度借

喻而言亦如痘人籠蒸之法但欲其鬆耳如苟妄汗則榮衛既開轉增瘡爛如苟妄下則正氣內脫變而歸腎身體振寒耳翕反熱眼合肚脹其瘡重壞十無一生舌黑者九難療何者瘡隨五臟有證未發則五臟之證悉具已發則歸於一臟受毒多者見之故肝臟水疱淡出如水小而色青肺臟膿疱其涕稠濁色白而大心臟發斑血瘡色赤而小脾臟發疹色黃濇赤又小兒

瘡疹屬陽本無腎證腎在膈之而不受毒或無毒陽取火也腎取水也以火用事為水所

制寧不治哉然則欲救黑瘡將何如曰先瀉腸胃而後急溫脾

是爾。錢氏云黑陷青紫者，百濟圓下之，不黑者謹勿下。余知其  
所下者，瀉膀胱之邪也。小兒腎主虛，不可瀉。但瀉膀胱以虛其  
府，則腎邪去矣。又云下後身熱氣溫，欲飲水者可治水，穀不消  
或寒戰者為逆。余知其脾強者，土可以制水也。百濟圓太峻，當  
以百濟圓代之。瀉後溫脾，則人參、茯苓、白朮等分厚朴、芍藥、  
甘草各半為妙。蓋瘡發肌肉，陽明主之。脾土一溫，胃氣隨暢，獨不  
可消勝已泄之腎水平。此錢氏不刊之秘旨也。雖然，瘡黑本為  
惡證，治之有方，猶有幸而生者。至於調衛之際，乳母不能謹口，  
流毒於小兒，或粥乳不時，使之飢虛，或衣被不週，致傷風冷，以  
至閨房有觸，外邪有忤，則亦冰硬變壞而歸於腎。自我致寇，又  
誰咎耶？能調衛者，以溫散湯劑，釀乳陰之，謹護風寒，使之氣體  
和適，其於粥餌則勿令飽而氣實，飢而內虛，斯得矣。此尤在瘡  
家垂意焉。

瘡疹備論

瘡疹之論，秦漢以來其詳可得聞也。粵自扁鵲倉公作古，以為  
嬰孩湯散當先和節陰陽，調治榮衛，方利臟腑，即熱氣漸解而  
董汲張漢初虞世，栖真子諸醫，認贅為嫡，每曰瘡疹證候初覺，  
即疎利之以宣其毒。又曰已出者不可疎利，瘡出已定却用利  
之，余竊惑焉。蓋嘗深索古書之意，見其諄復持重，不直曰利臟  
腑而必以和陰陽調榮衛先之，則知古人所謂利者，暢達流行  
之謂，而非勇決峻下者比也。如曰已患之後，俗多禁餌，大小便  
不通，不能調湯藥以和臟腑，遂停敗熱於其間，是古人之利大  
小便，不過調劑以和之而已。如曰已出者可服平和湯藥，察其  
肝臟解其敗熱，以防執毒攻眼，是其解熱又曷嘗不用和平之  
劑乎？然則破諸家似是之非，開後世未明之惑，惟錢氏直訣朱  
氏活人書其說為甚正。錢氏察瘡疹證候，惟用溫涼藥治之，不  
可妄下。及妄攻，發朱氏曰瘡疹已發未發，但不可疎轉，此為大  
戒。又曰瘡疹首尾皆不可下，藥用利藥即毒氣入裏殺人，以此

觀之瘡疹證狀雖與傷寒相似而瘡疹治法實與傷寒不同傷寒所傳從表入裏瘡疹所發從裏出表蓋毒根於裏若下之則內氣一虛毒不能出而返入焉由是土不勝水黑陷者有之毒發於表若汗之則榮衛一虛重令開泄轉增瘡爛由是風邪乘間變證者有之汗下二說古人所深戒也調解之法將何如曰活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑二者得兼而已溫如當歸黃耆木香輩涼如前胡藜蘆升麻輩佐之以山茱萸麥冬穀類活潑木通紫草甘草之屬則可以調適矣繼自今小兒凡覺身熱證似傷寒但未經瘡豆疑似未明且先與溫涼散蘇飲或人參羌活散輩熱甚則與升麻葛根湯人參敗毒散瘡豆已出則少與化毒湯出不快者加味四聖散紫葳散子瘡草木香湯紫葳木通湯或快疫散紫葳湯出太盛者人參敗毒散犀角地黃湯小便赤澀者大連翹湯白露散麥門冬五苓散大便便秘結內煩外熱者小承氣湯加枳殼湯或大小承氣湯喉痛者大如聖湯黃芩湯喘滿氣壅者麻黃黃芩湯胃腹脹滿者承氣湯枳實湯陳加枳殼湯煩渴者甘草散烏梅湯下利嘔逆者木香理中湯甘草乾薑湯如兒泄利積聚米泔用罌粟下未可與乳陰入者加味四聖散更以胡荽酒薄傳其身厚傳其足噴其衣服併以厚綿蓋之若猶未也獨聖散入麝香老酒調劑或不用酒則六香煎湯若其瘡已黑乃可用錢氏宣風散加黃芩主之然而瘡疹用藥固有權度大便小便不可不通其有大便自調所下黃黑則毒氣已減不必多與湯劑但少用化毒湯可也大小二腑一或閉焉則腸胃壅塞脈絡凝滯毒氣無從而發泄眼閉聲啞肌肉驚然不旋踵而告變矣凡小兒先發搐而後發瘡者生瘡已瘥而後發風或吐或瀉者死先發熱自利而後發瘡出者存瘡已發而後泄不止者亡瘡黑而忽瀉膿血痂皮者順腦中有毒也瀉血而水穀不消者逆脾胃虛也或瀉血而瘡壞無膿者亦不可救胃燥也嬰之陽明主肌肉胃氣不

可一日而不強也。世俗無知，每見瘡疹，不論男女，稟受虛實，藥用**萌麥酒**以傳其身，酒麪毒物，以充其腹，猥曰使瘡出快，其間兒氣素怯，或遇天時陰寒，猶可扶之，而無恙。設若春夏之間，陽氣發越，或兒氣素強，酒麪助毒，則以火濟火，胃中熱熾，毒蓄血聚，瘡出愈難，亦或為之黑陷。當此之時，能用**聖藥**前湯入**生豬尾血**和**腦子**少許以解之，猶可措手。或者更與熱毒之物，遂使咽喉結閉，耳目口鼻腫滿，悉平，大便秘堅，小便出血而死矣。又或妄施**巴豆**取積之劑，則臟氣暴脫，執又不除，邪氣愈甚，變為喘滿，便血癰爛，破裂而死矣。吁！自詒伊阻，如是其可畏哉！雖然，瘡亦有再發者，特間有之。瘡皮厚而色頑濁者，發於臟，其候重，瘡皮薄而色精明者，發於腑，其候輕。臟熱則為豆瘡，腑熱則為細疹。執重者，瘡亦重，執輕者，瘡亦輕。平復以還，消解餘毒，**百藥**亦令凹者再發，或癩黑而不變，猶更飼之以毒，必致發癩患痢。腮腫鼻衄，眼翳之患，瘡爛成片者，**黃連**乾傳，膿多痛甚者，乾**淨黃土**為末，傳之。瘡遍口中，痛不能食者，**五福化毒丹**或生蜜浸漬**黃白**取汁，啖之為愈。九瘡欲成痂，頻以**面油****乳酪****清酒**潤之，可揭即揭，血出無害。若乾硬已久，必成癩痕，如茶如醋，如猪肝猪血之屬，妄與食之，則已脫之迹，必為之黯慘。然而瘡痂已脫，肌肉猶嫩，不可盥洗太早，亦不可以手加之也。**藥**能辟惡氣，左右所不可無。或**蒼米****降真**用之，亦可。瘡曰聖瘡，七日熱而發，七日泡而乾，又七日則平復如舊矣。大抵調順血氣，溫和脾胃，均平冷熱，則瘡出為甚。若實實虛虛，損不足而益有餘，則瘡出為甚難調解之法，無以逾此。故備論之以解世俗之惑。云脉證于後。

瘡疹證候

瘡疹證候：面色燥，臉唇赤，眼睛黃，目胞赤，四肢亦赤，手足冷耳。此法：飲心，鼻冷，身熱，或下涼，上熱，頭痛，腰脊痛，咳嗽，噴嚏，呵欠。

煩悶。搗跳驚悸。昏昏多睡。小便赤少。大便不通。不惡寒。惟惡熱。方其身熱未即發瘡。迨其身涼然後發出。三部脈洪數。往來大小不應指而疾。

### 壞瘡治法

一曰內虛泄瀉。二曰外傷風冷。三曰變黑歸腎。蓋內虛泄瀉者或因臟腑虛怯。其證已逆。初發以來自然作瀉。或未發之前誤服涼藥。以致泄下。凡此者其瘡不發。每形見小點淡紅而白。或白而微黃。如水泡之狀。治之當用**參苓白朮散**。**白朮散**煎湯調下。先與止瀉。然後以溫和之劑發之。外傷風冷者。或因煩燥惡熱。出頭露面。點點方萌。遽為風冷所折。或瘡出如珠。妄與解脫。以取涼快。而風冷襲之。凡此者輕則其狀如蚊。色紅而不發。重則陷如石。巨脚色白。而冰籠治之。當溫血散寒。邪用**不發金**。**不發金**加**川芎**。若惡寒畏人。更加**白芷**。然後與發瘡之劑。或內虛泄瀉。或外傷風冷。在并經日。胃氣虧損。由是而變壞焉。故今耳熱反熱。其瘡青紫變黑。此則腎證。曉然矣。蓋腎屬北方水。是以其色黑。其證逆。治法先瀉膀胱之府。而後急與溫脾。若其瘡不黑。則斷非腎證。謹不可下。請詳審之。瀉膀胱法。先用**瀉**。**瀉**加**芍藥**。**芍藥**等分為末。每服一錢。棗湯調下。次用**宣風散**。一錢加**宣風**煎服。若瀉下惡物。急以**溫脾湯**劑繼之。瘡且為陰邪。穢氣所傷。亦令變壞。可用**醋炭**。**蘇合香圓**解之。

### 論升麻葛根湯

**升麻葛根湯**按和劑方瘡且已發未發者皆可服。世俗習為常談。不問小兒虛實冷熱。自直至尾。率多用之。甚者方發而不快。既發而復陷。亦以**升麻湯**為常用之劑。其為害可勝嘆哉。何者**宣風**解表。**升麻**差寒。小兒氣盛熱多。服之猶可以消毒。萬一內虛胃弱。則以水濟水。寧不虧損胃氣。水凝血脈。而瘡疹轉為之。逆陷乎。夫古人所謂未發者。乃身熱尚疑似之時也。所謂已發者。既透徹欲成痂之候也。烏嘗以發而不快。與發而復陷為可。



用(知)哉若不辨明殆恐世俗相傳枉死者半矣又况人之齒  
牙大熱大毒或者相習變陷不透者不問虛實一藥用之其害  
又有甚於(知)之不審也蓋瘡且變陷有因外感風寒而  
壓之者治法則當解散寒邪有內氣大實榮衛不得調暢而出  
不快者治法則當流行氣脉安可藥白水冷直用(人)遂使小  
兒服之鬱悶聲啞迨其發出稠膿異常往往治此而不救矣曷  
不用(知)哉

瘡疹惡證

瘡疹屬陽春夏為順秋冬為逆冬月寒盛腎水得時多歸於腎  
或先如癰後發渴其瘡色如黯血此腎證也不治。春膿起為  
金尅木夏黑陷為水尅火秋斑子為火尅金冬疹子為土尅水  
並逆。舌黑或鼻有黑氣並不治。瘡已出而謔語者為惡證  
。燥渴小便澀泄瀉不入食不治。瘡成餅搭黯慘不發其聲  
焦啞不治。兩眼閉而黑睛濛昧無塊不治。面腫鼻陷目閉  
頰齒齒者不治。頭面腫大瘡盡爪破或臭不可近或腳冷至  
膝並不治。瘡小黑而焦風攻頤頰唇項腫硬或習高而突並  
不治

小兒諸病但見兩眼無精光黑睛無運轉目睫無鋒芒如魚眼  
猫眼之狀箇箇不治或神藏於內但外若昏困者無妨其有病  
篤而眼中神氣不脫者猶可以活眼者五臟六腑神氣之所萃  
神氣已脫脉雖僅存亦未能保

瘡疹證治

前胡 去土 人參 去土

紫蘇葉 乾薑 洗

半夏 湯洗七次薑汁製炒

茯苓 去皮 各一分枳殼 去心炒

陳皮 去白 甘草 炙

桔梗 去芦

右咬咀每服肆錢水盪上薑茶上薑茶片棗壹箇煎取八分去滓微熱  
服不拘時

得...治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓去皮 細辛去葉

桔梗

瓜蒌根

人參去芦

甘草炙

白木

川芎各等分

右為末每服壹錢水小盞薄荷葉同煎詳分溫服如要和氣入生薑煎服不拘時

升麻湯治大人小兒瘡疹已發及未發疑氣之間並宜服之方見瀉類 人參散方見寒類

此毒瘡豆已發以此消毒

紫草半兩 川升麻

甘草炙 各錢分半

右剉散每服貳錢糯米伍拾粒同煎旋服

消風散方見頭風門 加...未治小兒疹豆或發透或未透忽面青暴乳是為風邪所傷用此主之疹豆證以耳冷尻冷足下冷及耳後有紅縷驗之然須見心胃間細點如粟起則為真其

加味四寶散治瘡豆出不快及變陷者

紫草壹兩

木通

南木香

黃耆湯炒

川芎

甘草等分

右薤末煎壹錢不時服大便秘加...少許大便如常加...百粒糯米解毒能釀而發之

紫草散

紫草壹兩

右剉細百沸湯大碗沃之蓋定勿令氣出逐旋溫服...能導大便發出亦輕

又方

紫草壹分

陳皮半分

右薤末新汲水煎服

紫草散治瘡出不快大便泄利

紫草

木香

茯苓

白木等分

甘草少許

右入糯米於蓋能利大便木香白朮所以佐之也

**紫草** 人參 木通

伏苓

紫草

右劉散煎貳錢溫服內虛大便利者可入南木香去紫草

**快**治瘡豆出不快

木通

甘草

右劉散煎貳錢溫服

**絲瓜湯**發瘡疹最妙

絲瓜連皮燒灰存性百沸湯調下

**犀角地黄湯**治瘡出得大盛以此解之方見醫書音門

**大連翹湯**治瘡疹壯熱小便不通

連翹

車前子

柴胡

山捲仁

右劉散每服壹錢加煎溫服

**人參**治小兒疹豆因服熱藥多發而不透

身體頭面兩目皆腫連日風搖奮身硬直治小兒疹豆因服熱藥多發而不透

**圓煎**調服

**耳露**方見積熱門

**小柴胡湯**方見寒類

**大如聖湯**方見積熱門

**二陳湯**方見痰飲

**甘草煎**瘡豆略出煩渴不止

粉草微炙

右為末煎服壹錢通血脈發瘡豆

枯蕁根等分

木通

糯米等分

南木香

紫草

人參

甘草炙半錢

木通壹錢

紫草

絲瓜連皮燒灰存性百沸湯調下

犀角地黄湯治瘡出得大盛以此解之方見醫書音門

大連翹湯治瘡疹壯熱小便不通

連翹

車前子

柴胡

山捲仁

黃芩各半錢

右劉散每服壹錢加煎溫服

人參治小兒疹豆因服熱藥多發而不透

身體頭面兩目皆腫連日風搖奮身硬直治小兒疹豆因服熱藥多發而不透

耳露方見積熱門

小柴胡湯方見寒類

大如聖湯方見積熱門

二陳湯方見痰飲

甘草煎瘡豆略出煩渴不止

粉草微炙

右為末煎服壹錢通血脈發瘡豆

枯蕁根等分

**烏梅湯** 瘡豆熱渴

小黑豆 藜豆 各一合 烏梅 貳箇

右以咀新汲水壹椀煎取清汁旋服

**木香理中湯** 即和劑理中加木香甘草乾薑湯 方見活人書

**加味四聖散** 方在前 胡安酒 或用酒煎或用熱酒澆亦得

**獨聖散**

穿山甲 湯洗淨炒令焦黃

右末每服半錢入麝香少許南木香煎湯調下 或紫草煎湯入

紅酒少許調下

**宣風散**

檳榔 一箇 陳皮 甘草 炙 各一分 黑牽牛 貳兩半生

右細末幼者半錢壯者壹錢蜜湯調食前服

**甘露飲** 五福化毒丹 方見和劑方

**加味宣風散** 治腎證瘡豆亦重黑即宣風散加青皮壹分氣怯者

外加南木香壹錢每服壹錢蜜湯調下先下黑糞次下褐糞然

後以和胃藥加黃芩與之良久糞黃瘡自微出又以竹園茶草

煎酒傳其身即得發起

**調解散** 治瘡豆已發或為風冷所折榮衛不和或為宿食所傷

內氣壅遏以致水硬並主之

青皮 陳皮 桔梗 枳殼製

半夏製 川芎 木通 乾葛

甘草炒 紫蘇 等分 人參 煨半

右剉散每服壹錢煎服

**不換金正氣散** 方見寒類

**黃柏膏** 瘡疹初萌急以此防眼

黃柏 去蘆皮 新葦豆 紅花 各一分 甘草 生

右為末麻油調為膏薄塗眼眶四圍頻用為妙或鹽酒傳之

亦可若用鹽酒尤先護目

人參黃連湯治瘡豆執毒攻眼赤腫用當歸皮煎湯調下

長庚散治斑瘡入眼生翳

白菊花 新葦豆皮 真穀精草 各壹分

右末每服壹錢乾柿一枚粟米泔壹盞同煎候米泔盡只喫柿乾日兩枚

爛疔斑瘡翳眼

真桑螵蛸 壹分 真焦研

右細末入鹽少許每服壹錢米泔溫調臨睡服

治諸眼昏翳風痒方

真杏仁 叁伍柴卷水浸去皮尖

右細嚼和津液吞五更端坐常服杏仁潤肝去塵滓也

又斑瘡方

生鱔魚以針刺其血破器盛之點入翳上自愈

扁鵲油劑方 小兒方一二歲發熱恐成瘡豆以此止之

生麻油 童子小便 各半盞

右逐旋夾和以柳枝頻攪令如蜜每服貳規殼許服畢令卧少時但參肆服大小使利身體熱退即不成瘡豆之證若形跡已露則不可服也

以手蘸麻油摩其背脊中間亦驗

灌藥服藥法

小兒煎藥以銀盞為水半盞藥多又加多焉其或不能灌藥則以匙送下服藥未盡旋旋與之藥性溫熱乳食前服藥性寒涼乳食後少頃服和平之劑隨意無拘

察小兒眼中神法

凡小兒病證雖可畏而太衝有脈神氣未脫顛門未陷顏色指甲未至黯黑者猶可着力雖然五臟六腑之精氣皆上注於目望而知之當先以目中神氣為驗

新刊仁齋直指小兒方論卷之五





