

永類鈐方

二

本類錄方卷第二

豐山李

仲
壽

集成

東垣先生內傷外傷辨

碧山先生集

卷之二

校定

元氣者身中真氣也。人身之氣皆百氣之氣也。每東垣以人之百病皆根於中氣之不足。而謂人身上下具形體。以肺胃爲主。其月則謹於內外。有餘不足之際。窮其補瀉升浮。一擇而詳。加指之方。此醫家先所當明者。故首出於傷寒雜病之前。是亦推其本者。舉清氣而衛氣之所生發。即腎氣之異名。肺胃有傷。中氣不足。臟腑陽氣皆經於外。或急或緩。或寒。或以舒。焦心肺爲之蒸養。乃下流而乘肝腎。腎受脾。胃下濟之濕。閉塞其下。致聚間。必火土。少陰。心肺者天之氣。是無形之元氣。又病故飲食勞役。久留爲內傷。不足之言也。風邪傷人。猶骨風也。上受之者。傷肺筋。寒傷腎骨。肝腎繫。集筋骨者。其之氣。蓋有形質之物。受病故希。希為遘。有餘之證。本乎言醫。汗發食勞役所傷。中氣不足。當補之證。認作外感風寒。有餘客邪之病。毒也。其表裏。而傷之氣。有餘者。之病。當求。治在衛。有餘者。不當補。不當瀉。不當溫。不當寒。病來潮作之特病。氣精神增減者。是病氣有變。爲外傷。若病來潮作之時。神氣困弱。是病氣不足。爲內傷。但於氣盛氣少。無之氣。有變者。氣盛者。萬變。原酸甘之劑。真氣不足者。急補之。辛甘溫熱之劑。即泻寒之藥也。

卷之二

卷之三
古人以筋肉內外傷於人迎氣口人迎脉大於氣口爲外傷以外感風寒皆有餘之證
見於手足主裏乃行陽二十五度氣口脉大於人迎爲內傷以飲食不節勞役而傷皆不足之病
見於右手主裏乃行陰二十五度外感風寒則獨在手足人迎脈浮緊按之洪大者名急甚故
號是足太陽寒水之脉接之疾而有力中見手少陰心之脉與舌苔內顯洪大乃陽寒脉也又病
風邪則人迎脉緩而大或大氣口倍或弱僅倍內傷飲食拿心熱手背不熱有氣吳於命
一倍傷之重者過在於陰則兩倍太陰則三倍若宿食不消則獨在陽脉沉而滑矣

辨寒外傷寒邪與飲食勞役之病皆有寒或勞傷飲食勞役之證作外傷寒邪有踰表實之証反爲其表遂成虛疾皆由不能細別寒熱耳外傷寒邪發熱惡寒寒熱并作無有間斷者傷寒則面赤壅而乾渴風則鼻流清涕內傷飲食勞役手熱背楚熱呴參亦有頭痛項強腰疼與大陽表証微似但內傷不足之病表無陽惡風惡寒常有之若不發風却不惡風則愈添衣送暖即不惡寒亦有久感寒雖重衣烈火不能禦也若其熱也乃脾胃不足而之虛氣據陰之冲溝寒爲躁熱裏更而過或粗衣涼處即止或躁而汗出矣或表虛無陽不任風寒者常有之其躁熱前有二著不善作躁作寒已寒作躁已病者當自覺先發熱惡寒之熱及躁作寒之寒可准矣

甘草半錢水煎三味除躁熱助虛之聖藥

卷之三

分麻三分升胃氣

草三分生用必得
中推知之

紅花不作丸散，煎服本方，諸症可除。

脾

中央生濕氣生土土生甘甘生脾脾生肉肉脾主土在天爲濕在地爲土在體爲肉在藏爲脾在色爲黃在聲爲歌在響動爲噦在筋爲筋爲耳在志爲意在目爲心在氣在音爲宮在火爲躁在火爲信其華在氣其充在肌其在神意在智而力憶謂之意物是形謂之音意音謂之智意音謂之用火勝脾者土也勝於仲夏及立夏各二寸足大陰耳其經運胃足陽明胃爲消主表脾爲藏主心爲母實邪自愈肺爲子虛邪易發腎爲母本勝相合肝爲主臟邪逆濕風風木火之風勝濕主諸濕氣病則應見於脅口舌本頤頭面肌肉齒牙齒面浮涎好食爲脾不化脾未濕苦燥之病發食早暮之苦甚渴之甚走肉傷腎宜半湯酸穀養脾宜豆棗糞牛

脉病證

宜沉緩緩浮濡而驚節有病

同胃熱藥濟生瀉黃散枳壳元

宜沉緩

實熱身休眠易起而腹寒熱如瘡瘍營口漱滯生瘧

通見脾胃門

肺

西方生燥燥生金金生辛辛生肺肺生皮毛毛生腎腎主鼻在天爲燥在地爲金在藏爲肺在色爲白在音爲商在聲爲堅在變動爲吸在氣爲鼻在味爲辛在志爲憂在臭爲腥在液爲涕在色爲外在性爲義其華在毛其克在皮其在神爲魄並精出謂之魄者神之別是精氣之所輔佐也故肺者金之脏於秋季太陰是其經與六腑半陽明合大腸爲肺主表肺爲藏主脾爲母肺爲子爲主爲五藏華蓋蒙天布清氣於空氣之用苦渴少辛散之辛又則走肺肝宜飴傷焦苦養肺宜麻桃核雞

考二

脉病證

肺

實熱石煩赤四肢煩疼氣壅喘息

治肺則通見嗽喘肺痿而大腸則通見泄熱而

大便不利皮膚不仁不知香臭

濟生寶印元

皮膚搔痒疥癬

濟生訶黎勒元

虛寒感寒邪風搊寒嗽鼻燥咽乾咳嗽

濟生寶印元

乾咳少氣面白風則多汗而畏風咳嗽

濟生訶黎勒元

西赤石煩毛折肺死

濟生訶黎勒元

寒寒陽氣引氣以微出咽字氣大咽干細咽干澀勿出口亦勿過也去諸寒又重以手

擦地縮身舉臂向上三舉去風邪積勞又反舉撓臂左右各三五度去肺中風毒畢則頭

目無淚常以秋三月朔而西吹西方白氣七點之以補咽氣

導引法調息鼻微引氣以微出咽字氣大咽干細咽干澀勿出口亦勿過也去諸寒又重以手

脉病證

肺

宜沉緩緩浮濡而驚節有病

實熱身休眠易起而腹寒熱如瘡瘍營口漱滯生瘧

通見脾胃門

脉病證

肺

宜沉緩緩浮濡而驚節有病

實熱身休眠易起而腹寒熱如瘡瘍營口漱滯生瘧

通見脾胃門

臂

北方生寒寒生水水生鹹鹹生腎腎生骨髓髓生肝腎主耳其在天爲寒在
地爲水在體爲骨在藏爲腎在色爲黑在音爲羽在聲爲呻在變動爲慄在竅爲
耳在味爲鹹在志爲恐在臭爲腐在液爲唾在虫爲鱗在性爲智其華在髮其兌
在口其在神情與志骨髓之液謂之精意之所存謂之志生性之本元氣之根神精所
舍故曰精志夫腎水也明於冬少陰是其經與膀胱足太陽經合膀胱爲腑主表腎而
臟主裏肺爲母肝爲子心爲少陽爲火心爲火燥長濕主諸寒收引病則應見於精體骨
髓齒齦脣耳前後二陰脾腹腫滿足跟足心爲溼液腎燥食辛以潤之腎堅苦以弱之
鴻之鹹矣轉舌之補之鹹多則走血傷心宜酸傷甘甜養助黍栗蕷蕷

脉
症

卷之三

引葛公言道
腎寒陽痿腰冷小腹急重心氣腰骨
痛厥逆口渴齒痛可熊腹大身重

喘吸急促而多呻吟者

如彈石聲然也
勝胱
實熱膀胱使淋暎舌燥咽喉不利
虛寒小便濁滑數
導引法調息鼻微引氣以口微出咬字氣大於
三五葉或以手前後觸左右各十數次諸疾

常以筋手相摩手冷熱以拭面三度周摩身冷通熱名曰乾浴當有玉澤金光見也

庚

東方生風屬生木木生酸酸生肝肝生筋筋生志志生心心在天為玄在人為道在地為龜龜生五味道生智玄生神神在天為風在地為水在体為筋在臟為肝在色為蒼在音為呼在變動為搖在竅為鼻在味為酸在志為懲在火為躁在液為決在虫為毛在性為仁其華在爪其充在筋其在神為魄兩精相搏謂之神隨神往來謂之魂魂老也乘之輔弼也又人臍血屬於肝肝受血而能視故肝者木也旺於春足厥陰是其經肝膽足少陽合膽為腑主表肝為臟主表腎為母心為子脾為母肺為主惡風主諸風眩掉病則面浮見於目赤脣指爪筋血好食酸者肝不足也肝若急食酸以緩之病發散食辛以散之濕之氣病酸叢之酸多走筋傷脾宜苦傷辛辣藜藜麥李葵六

脉

100

宜弦長
春深酒

因只克考之散於寶、散濟其事、肝精散桂枝散因之而

真志好
張弓接

生橘子仁湯五勞虛寒，濟生無斷絕。

噴噴然

因鴻臚湯添生酸早丸

不澤死

因溫腊湯濟生扶脾湯
入鑊三寸細鹽半邊勿令過也令自耳不得聞

除
卷之二

左若各三五度、又兩手掩相以反復
初陽青氣九點之以補虛陽氣

南方至熱熱走火生苦生心生血生脾心主舌其在天爲熱在地爲蒸往來爲雨
臟爲心在色爲赤在音爲徵在聲爲笑在變動爲憂在竅爲舌在味爲苦在志爲喜
在臭爲焦在虫爲羽在液爲汗在性爲神其華在面其充在血脉其汗臟爲神兩精爲
掉謂之神神者精氣之化成也故心者火也旺於夏半少陰是其經矣小腸手陽明大
腸爲腑主表心爲臟主裏所爲母脾爲子肺爲次腎爲主惡熱喜諸痛痒發瘍之
應見於口舌血脉鬚髮心之液爲汗好食苦心不足也若緩食酸以收之病緩食咸以潤之
甘瀉之苦以補之虛之苦多走骨傷肺宜甘瀉鹹鹹養助小小黎麻主之

脉病證

心主火而
散於浮陽
而領前曲
後蹠如捺
帶鉤色赤
黑木澤者
心死也

心
繒不語

靈寒血靈憊恐亡強音不語
耳黃自汗腰疼恍惚

寒熱面赤多汗小便不利
漏頭皮耳聾

小腸

導引法調息令和營氣微引氣以口微出阿字氣大呵三遍呵半遍易出口亦勿過速徐勞手煩時
又正坐以兩掌作舉用力左右互相摩各五度度又以一手按脰上手向下拓空如重物又以兩手互摩
以腳踏手中各五六度志意會風邪諸疾又閉氣瞑目三吸齒三呼津當以夏二月朔旦
兩面吸南方赤色三吸之以補呼吸氣

卷二

四

三垂堂

金之精水之氣金旁陰之氣多是主水
心有邪氣伏氣憂恚故膽虛不得眠也
法調息鼻微引氣皆微出嗜字氣以爲膽實
仰頭右手挽脚腕起搖動三五度又六坐兩手
神強正著必伏冥神豈非神氣之用哉
而腎爲命門其腑為三焦三焦有脂膜如手太陽
別使也主諸氣方位無形可見既決瀆之官小

膽胃為平府中焦合之在胃中院主虛熱水谷勝所為府下焦合之在膀胱當膀胱上二節取兩側氣主出而不納男藏精女藏經胎是有形可見叔和云無狀有名周與權難經下正改無形作形氣與靈樞合無疑矣又扁鵲說主與三焦為表裏何也主者胞絡也真心安得受神是心主不著正藏而三焦亦非正附但坐焦之經屬乎少陽心胞之經屬乎厥陰二經是屬乎陰陽相配合耳故和命門與三焦為表裏者腎為精之舍三焦為精之府命門雖係一臟外別無經脈散俱足足少陰之經與足太陽膀胱為表裏腎有左右膀胱無二故用左腎合膀胱右腎合三焦以此推三焦之氣與命門通三焦之經不與命門合出扁鵲之論為正三焦之氣但各隨其部位分而為之應耳三焦之氣分布不同其本源發於不動精氣散在三焦榮百脉然火藏則翕攝三焦精氣並命門輸滿而者矣

右腎實益身熱腸痛小便黃赤足冷便白卒痛

二焦實熱目昏痛腰痺熱煩熱頭面汗渴遺泄

三因清體湯

三因開焦湯

三因益智湯

三因安中散

治 通見心疾門

三因補心元丹酸早二湯
濟生補心元丹酸早二湯
五蟲蠶寒濟生錢志飲子
濟生冰茶水湯
氣
濟生旅附元
高辛氣大呵三十細呵十遍易出口亦勿過過陰陽而易
度又以一手按腫上手向下拓空如雲穴以兩手急
疾又閉氣瞑目三吸三呼三轉當以夏二月湖豆
腎實熱冬青柳北吸黑氣三吸以補之盡一正至谷子
两手拓地舉身騰渡谷三五度備渴非常之急
手大與膀胱相對有二白脉自中出夾脊是腎之脈
官小大腸為正府上焦合之在下而居胃右之內
熱水谷膀胱為府下焦合之在腰下當膀胱上而即取而
可見叔和無狀有名周興權難經下正改難形作為榮
為表裏何也主烹胞絡也真心安得受邪是心主不若
少陽心胞之經屬手厥陰三經也屬平陰陽相配合耳叔
和為精府命門雖係一臟外別無經脉故俱足少陰不
脫無二故用左督合膀胱右督合三焦以止推三焦之無
之輪為正三焦之氣但各隨其部分而為之應耳三焦之
在三焦藥百脉終之識則翕攝三焦精氣並命門輸滿而者矣
人冷便血坐痛
面汗溺遺瀝
三因支中後
三因益智湯

傷寒頭痛

三陽經受風寒伏留不去所致然傷寒頭痛雖屬三陽惟太陽經獨多蓋太陽爲病雋表而頭痛專爲表裏雖有傷寒六七日頭痛不大便有熱者而與承氣湯下之若小便清者知熱不在裏仍在表是知頭痛屬於表者明矣太陰少陰二經之脉從足至首而還不循頭故無頭痛簡易少陰亦有頭痛連齒之證以取肝自生也若厥陰頭痛甚或痛甚入連於腦而手足寒者又爲其病矣太陽頭痛汗出惡風爲中風頭痛無汗惡寒爲傷寒內因頭痛作止有時外感頭痛常常有之首須傳入裏實方能



浮緩

太陽證

傷風頭痛汗出發熱惡風不惡寒

桂枝湯解肌

輕者柴胡桂枝湯敗毒散

獨活散

浮緊

太陽證

傷寒頭疼無汗發熱惡寒不惡風

麻黃湯發汗

輕者桂枝麻黃半湯

麻黃葛根湯參順氣散

浮

太陽證

自汗服桂枝茶黑病桂枝病當在表頭疼

桂枝湯

効後脉已微不可用桂枝湯

尺寸俱浮

太陽證

甚致頭痛而脉尚浮者

連頭熱自汗不止者葛根葱白湯

浮而沉

太陽證

若已發汗或未汗頭痛如破者

桂枝湯

汗出身熱頭痛

或緊

太陽證

中風利口逆表裏不寒身熱頭疼下

十棗湯表裏解慎不可用又當用

尺寸俱浮

太陽證

痟滿脹脹乾嘔短氣汗出裏未和也

大柴胡湯

浮細

太陽證

風溫證頭疼身熱自汗身重息喘其形

宜姜桂湯若身灼熱者知母石膏湯渴

浮

太陽證

不仁喫哩欲眠治在少陰厥陰可汗者死

其括樓根湯脉浮身重汗出漢防已湯

浮細

太陽證

僵硬頭項痛無汗翕翕發熱小便不利

桂枝湯去桂加茯苓白朮

浮

太陽證

頭項強痛惡寒手足脉浮細而嗜眠此

宜桂枝湯去桂加茯苓白朮

沉細

太陽證

太陽證解表頭痛腹痛者柴胡湯

四逆湯若身重惡寒夜不能寐散之

沉

太陽證

太陽頭疼有熱不大便舌苔裏證可

宜桂枝湯之若頭痛効尚屬桂枝湯

虛

太陽證

下便却頭疼是可下不可汗

桂枝湯

沉伏按之而滑爲裏有熱

潮熱肢冷飲水煩躁不眠大便秘小便赤外

調胃承氣湯

一日

太陽頭痛戴帽子乍冷乍熱氣塞脣塞

惡寒明耳聾用竹葉石膏湯輕輕暖

虛

太陽頭痛戴帽子乍冷乍熱氣塞脣塞

因鬲通陽得汗淋下自正道不得

連長

浮大而長

太陽陽明頭疼身熱燥渴或欲飲水
若表證無寒熱腹瀉燥渴水有瘀血必發狂顰角黃湯甚則抵當湯
傷陽明合病半利其頭疼腰痛肌熱耳升麻湯汗之不蒸寒反而熱大便不秘
痛葛根湯鼻乾不得眠尚取寒當以
而發熱柴葛病未詳轉入少陽葛根頭疼
太陽少陽合病半利頭疼胸滿或寒熱往来黃芩湯嘔加半夏生姜
頭不疼身不熱

若寒惡寒反恐驚而秘或讖語此

胃實也調胃承氣湯下之

弦細少陽經

浮大或緊

浮大而長

少陰經

浮弦

微緩厥陰經

浮弦

少陰經

太陽陽明頭疼身熱燥渴或欲飲水
若表證無寒熱腹瀉燥渴水有瘀血必發狂顰角黃湯甚則抵當湯
傷陽明合病半利其頭疼腰痛肌熱耳升麻湯汗之不蒸寒反而熱大便不秘
痛葛根湯鼻乾不得眠尚取寒當以
而發熱柴葛病未詳轉入少陽葛根頭疼
太陽少陽合病半利頭疼胸滿或寒熱往来黃芩湯嘔加半夏生姜
頭不疼身不熱

若寒惡寒反恐驚而秘或讖語此

胃實也調胃承氣湯下之

弦細少陽經

浮大或緊

浮大而長

少陰經

浮弦

少陰經

傷寒一日太陽少陰合病頭痛乾煩渴而渴
有頭疼而无發熱若頭疼乾嘔吐涎沫
霍亂頭痛發熱身疼欲飲水

五苓散

非麻湯解肌湯柴胡桂枝最良熱多半
胡湯不渴微熱小柴胡加桂枝喉嚨黃芩
加知母石膏二兩或加升麻半兩善桂枝
麻黃性热南方地暖井向北方之北

夏至前桂枝加黃芩半兩夏至后三味各
加知母石膏二兩或加升麻半兩善桂枝
麻黃性热南方地暖井向北方之北

治法見風溫脚氣門
瓜蒂末冬桑叶許擣其鼻出黃水愈
炙氣海闢元用葱薑法白果散
附子散正陽散等藥

治法見風溫

傷寒頸項強附項背強

太陽脉起於內背，上額交顳，腦還別下，項循肩臂內，伏脊抵腰。太陽經絡感受風寒，則項強急者，表證也。

脉病證

沉遲 太陽病項背強，凡有音，殊汗出，惡風發熱，為表虛，可解肌。

桂枝加葛根湯，繫黃。

太陽病項背強，凡無汗，惡寒，為表實，可發汗。

桂枝湯加葛根麻黃。

太陽中風，項強，疎背，反張，發熱，有汗出，惡寒，半硬痛，為

柔痉，小續命湯，去麻黃。

太陽病頭項強，惡寒，嗜眠，口鮮，骨脛滿舞。

柴胡湯，葛根湯。

傷寒無汗，翕翕發熱，頭項強痛，小便不利。

桂枝加葛根湯。

陰毒，手足冷，牙齦痛，腹痛，短氣，四肢吐嘔，利身痛。

桂枝加葛根湯。

身重，背強，腰痛，咽不利，或汗後，身痛，亦陰毒。

桂枝加葛根湯。

太陽病項背強，凡然，為癰，雖有項強，然太陽病表證，宜葛根

下之，則和大陷胸湯。

雜病頭痛

頭痛多屬太陽經，上連風府，眉角痛，或至風府陷于泥丸，為真頭疼，難治。法當詳辨，風邪則驅散之，瘀飲則溫散之，腎虛則補，緩之，因頭痛時作時止，故因頭痛，常二有之，直傳入裏，實方罷。

脉病證

治

外

浮緩

偏頭疼，脈緩，裏赤，而痛，或生瘡，焮。

小柴胡加芎芷，集成，牽正散，仁、蕎、芎、芷散，經驗，言，立膏湯，楊氏防風散，獨活散，兼瘀，甘菊丸，百退散，都梁丸，活血散，葛根散，桂枝散，大夜砂元，扶其防風通聖散。

三因苦渴湯，局方，三五七散，如蜜餅子，人參頭氣散。

濟生小青半夏湯，一字散，楊氏必勝散，荆芥元，灸百會，活人參須氣散，煎，易天香散，羚羊角散。

天蔴散，即孩兒散，桂木乙丙酒，調如膏，傅頂，玄太陽丸，聖惠，蟾膏，用言，兩炒香，研末，為末，茶清調服。

浮繁

偏頭疼，脈急，脣紫，清渴，瞳瞼赤，頭疼。

風囊，偏頭疼，脉急，流清涎，瞳瞼赤，頭疼。

外

背

卷二

七

翳緊

溫有眩暉重痛

三國吳木湯添溫湯虛用木附湯加乾姜
簡易加減三五七散扶熱小便少五苓散加川芎

皆外因

時伏時見癲厥助滿吐嘔咳嗽

局方陳湯下八味青白半李濟生三生元二旨餅子
簡易集祐風散定風丸子天香散三用芎辛湯藿瞿不散
本草糴甫散皂角芷附散集成秘方玄胡紫末出涎方

沉澑

皆丙

氣虛

芎辛湯涼生葱附元治察芎附散本草附島元
集成葫蘆散因蘿蕷散膏服可熏無風虛本草前藤散
集成效散用本草膏惠真煙可熏膏馬齒葛根散
真黑熟蒜煎蘇子降氣湯下沉附湯木附湯柴辛

寒瘈

皆丙

腎虛直鳴面黑便多

簡易集本草真元三才濟芳六虛寒基姜石膏加鐘乳粉
經驗用苦酒外雄黃厚為末吹鼻中

短滴

皆丙

腎厥
因
真痛

大門真痛上引
沈丸不治

灸百會儘進參沉烏附或可生

卷二

八

酒後酒盜生有動頭痛者
不内外新沐中風名風腦鬚頭
因蓀菜水銀丹所致

酒不醒麻湯姜茶加葱豉葛花黃連元耆芩砂陳湯
瓜蒂為藥患食泉苔末吹鼻即止黃水愈

金銀走盤火溫熨之

煅石膏過紅矣取膏為食後茶調又生石膏荆芥紗等分為末茶清調下
雄黃細辛姜分為末亨許又生羅蜀竹白壁鼻中皆瘡痛鼻孔痛左鼻又裏瘻未患食茶
風寒偏痛扇子燒一兩麻黃去節川烏南星姜各燒半兩全蝎五不至毒朱砂水飛射干各半兩為末酒調
一字服之素枕仰卧本草偏正痛用猪牙皂角素筋骨附子皂等分為末食後茶调左鼻痛仰卧
又華佗果扇子斤炒烏頭兩炒甘草兩為末煉蜜彈子大元葱茶嚼下
大金頭風散附子不鹽附子大頭煎洗頭竟以方寸匕摩項可去或生烏頭末和葱薑酒貼頭
芥根皂角子麻子漬水作湯沐藥末內鼻九月取菊花作枕良京芥亦可依訖席

傷寒眩暉

傷寒頭眩者或謂眩運或謂眩冒或謂昏冒即頭眩也少陽與太陽併病頭項強痛或眩冒者責其虛也皆發汗吐下後所證是知其陽虛也經云上虛則眩下虛則厥眩雖為虛而風家亦有眩風主運動故也少陽為病舌咽乾目眩以少陽居表裏之間表邪所傳漸行於裏表中陽虛故時時目眩也陽明中風但頭眩不惡寒者故能食而飲其必咽痛是風亦三頭眩而脉逆也逆則發汗劇者言亂目眩者死矣

脉病證

傷寒發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤為逆

諸嘔嘔半堅痞高有氣脹眩悸

頭疼眩暉鼻塞而煩此頭中寒溫

太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身瞤動欲擗地者

或虛弱入微汗或過汗即身瞤動搖

若寒熱藥或有熱證真武湯去附子依本方加減

真武湯弱甚去芍藥少與之

治

防風宋桔梗湯次服建中湯

小柴葛芩令湯赤茯苓湯

瓜蒂散

桂枝桂枝甘草湯

雜病眩暉

卷二 九

脉

病

證

風 有汗強項不仁

局方消風散青州白元子濟生丸附湯
本事川芎散甚則羚羊角散

寒 無汗筋掣掣痛

不換金正氣散加菖蒲薄荷甚則姜附湯薄生三五七散

暑 煩悶

黃連香薷散牛膝香薷散消暑元濟朱附湯三因黃龙元

濕 沈董氏迎延末

參溫湯木附湯淡生芎芩散

虛 耳鳴目汗頭疼

二陳湯瀉生王液湯通宣痰飲門
人參正氣散姜附湯順元散三五七散芎歸湯

脾 膏肓肺外傷風邪

上盛下虛須氣沉附湯正養黑錫丹濟生沉香礦石丸
人參正氣散陳湯加丁香木香

失血去瘀益瘡跡便利

芎歸湯加入參黃芪酸草仁湯又見各病所因門

後崩中肝風虛風三陽經

芎歸湯虛甚加參附兼風徵則消風散甚則芎辛湯

傷寒自瘳

自決其面者爲允此屬少陽近鼻上爲外皆屬太陽下爲內此一禹陽明赤脉從上下者太陽病從下上陽明病從外走內者少陽病此三陽病不可混也



太陽陽明病頭疼腰痛明熱目疾鼻乾尚惡寒

不惡寒反兼熱大便不秘白毫湯鮮利大便若秘譜語者

陽明病身熱目疼鼻乾不得眠溫瀝病頭痛

目連心煩骨節疼煩惡寒食即吐先服大橘多湯

目瞑發過必衄及脅直視不能瞬不得眠而衄

不利頭疼腰痛肌熱口渴

少陽病兩耳聾暴亦胸滿而煩為中風若咽幹眩為傷寒

少陰病鼻能聞嘔嘔欲眠甚聲喫或呴氣為痰虫證

頭疼腰重腹痛眼睛疼四肢冷汗不煩渴

眼中生花身熱頭暉重惡小腹滿手足拳名陰陽易

升麻湯

調胃承氣湯

二證見頭痛門

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

三因燒羨散等

雜病眼目

人有兩目如火之有月五藏六府之精華宗脈之所聚洞視萬花肝之外候者也

屬腎目風輪 為黑睛筋之精

屬火目輪 為正血脉之精

屬脾土輪 在眼 為下胞肉之精上屬脾

屬肺金氣輪 為白睛氣之精

屬腎水泉輪 為瞳子腎之精

膽為清淨廓

亦名前則晴浮後觀梁真天鄖熱則瞞霽障

小腸為闢廓

亦名前則曉陽水鄖

膀胱為衆廊

亦名前則曉陽水鄖

大腸為傳道廊

亦名前則曉陽水鄖

心為傳道廊

亦名前則曉陽水鄖

腎為會陰廊

亦名前則曉陽水鄖

肝為藏血廊

亦名前則曉陽水鄖

卷二十一

十

沉綿羨

少陽病兩耳聾暴亦胸滿而煩為中風若咽幹眩為傷寒

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

少陰病鼻能聞嘔嘔欲眠甚聲喫或呴氣為痰虫證

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

頭疼腰重腹痛眼睛疼四肢冷汗不煩渴

三因燒羨散等

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

見頭痛門

眼中生花身熱頭暉重惡小腹滿手足拳名陰陽易

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

少陰病鼻能聞嘔嘔欲眠甚聲喫或呴氣為痰虫證

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

頭疼腰重腹痛眼睛疼四肢冷汗不煩渴

三因燒羨散等

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

見頭痛門

眼中生花身熱頭暉重惡小腹滿手足拳名陰陽易

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

少陰病鼻能聞嘔嘔欲眠甚聲喫或呴氣為痰虫證

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

頭疼腰重腹痛眼睛疼四肢冷汗不煩渴

三因燒羨散等

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

見頭痛門

眼中生花身熱頭暉重惡小腹滿手足拳名陰陽易

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

少陰病鼻能聞嘔嘔欲眠甚聲喫或呴氣為痰虫證

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

頭疼腰重腹痛眼睛疼四肢冷汗不煩渴

三因燒羨散等

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

見頭痛門

眼中生花身熱頭暉重惡小腹滿手足拳名陰陽易

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

少陰病鼻能聞嘔嘔欲眠甚聲喫或呴氣為痰虫證

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

頭疼腰重腹痛眼睛疼四肢冷汗不煩渴

三因燒羨散等

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

見頭痛門

眼中生花身熱頭暉重惡小腹滿手足拳名陰陽易

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

少陰病鼻能聞嘔嘔欲眠甚聲喫或呴氣為痰虫證

吐後服小建中湯

二證見鼻鼽門

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

頭疼腰重腹痛眼睛疼四肢冷汗不煩渴

三因燒羨散等

見頭痛門

見活人一百問

宜辛熱之藥見頭疼門

見頭痛門

見鼻鼽門

見頭痛門

眼中生花身

眼科十二證石人坪曾氏以眼疾皆始於風熱

小筋赤脉清肺

暴赤生翳洗

風熱風明目流氣飲慈散羌荳菊花散

浮翳內障針

痛如銅割宣針

曾氏川芎散後羊角散透明元清肺湯

赤膜下陷鑑針

旋螺突起射

失明散紫胡散口順散

天行赤眼宣鍼

而灌童人洞

寶熟石方洗散蒙散橘梗散軍花散

熱撞狗生翳點

被物打撞針

晴終瘻摘

二弩肉侵精第點

突起睛高斜

白睛子散大麻仁慈石元四物五子元

十五膾生風葉針洗

雞冠黃肉鑑

氣急不可制害躁風碧氣少用京華白先

證混睛外障鑑針

肝藏積熱宣針

白睛子散元神田元

神坐疼痛摘灸

暴風客熱針

局方菊晴元地黃元腎風四牛散平事川芎元

逆順生翳逆並下順生上宣黑針

肝虛雀目洗

濟生補腎元前易駐景元千全神田元

虛風內障白附散

坐起生花白附散

曾氏柴胡散黃芩散地黃散

六證綠風內障白附散

衝風淚出洗

初發用乾烟脂蜜水調涂眼眶文黃柏元仲

十一熱漏睛膜出洗

黃翳上衛點

曾氏黑眼方金絲菖蒲砂煎姜蓬散治暴赤

圓翳內障

痒溢難任洗

洗眼方秦玄散青金散桔梗散梔子散

證傷寒後張昏

膜入水輸點

貼眼方紫蘇金散梔子散

風倒睇拳毛火點

烏風內障

薰晶散甘草子紅花半兩仲為末調金眼

暴赤眼以雞子清剉宣運浸置地下稍冷濾過用雞毛蘸滴眼內又宣運一兩熬濃汁好

明淨亦消之乃火熬乾研細入白鵝羊膽半匙之管頭用紙袋不放冤家龍之喉不消滲出

膽成霜稀以爲末研細入射少許入角筒中又生姜自然汁濾過器中澄令細嫩用宣運

剉浸七日令透用繩綯瀝所澄移日乾點眼諸藥皆宜又苦杏西頭留節頭開小孔出宣

連半兩紙塞孔置井中浸宿次早山竹節中水洗加小腦子七妙白良民黑龍膏見本方尤妙

爛孩風痛痒有串毒後穿子葉膏留淬汁以皂紗蒙眼取清茶於沙上滴茶汁浸眼

弦虫如紅線出該肉自煮出美堅密或以華白乾搗爛入粉綿裹男孩乳汁浸點或以根洗搗如泥溼日乾用蜜和點又香白交泰散宣運三文爲末砂蜜素地出金毒青花水化用點并治

小兒疳眼又五位子蔓籽炒淨煎湯洗眼未當內門自良父却用水洗面名洞視千里清明目堅齒極有妙法

又炒白足之兩箇青參錢研細敷湯泡食清半小點洗

互口內點蓋津洗毋眼未當內門自良父却用水洗面名洞視千里清明目堅齒極有妙法

養鼻不可具湯治者忌用湯泡足湯駢中熟併壅於瞑目喪明必矣

傷寒耳聾

耳者腎之所候。腎氣實則精氣上通。聞五音而聽矣。精氣虛則風寒暑濕等發入。喜怒憂思得以內傷。候其觀頰色黑者知其耳聾也。方有手少陽脉動。而腎者。其申。脾二生三也。手太陽脉動。而聾者。耳內氣滞也。熟薑加生川而出。農則成停耳底。耳氣廢耳聾。尚易治。精形耳聾不易。藥治之。

脉病證

大陽病。不答。惡風。反發汗。氣虛耳聾。陰陽俱虛。

無熟人用甘草大棗附子湯。素有熟人黃芪建中湯。

少陽病。兩耳聾。目赤。胸滿而煩。為中風。

少陽證。耳聾。裏壅繩帶散。少陽感證。

少陽與厥陰俱病。耳聾。裏壅繩帶散。不知人危矣。

承氣湯。

陽滿。溫溫証。治在太陰。不可汗。汗則不能言。耳聾不知病處。

白虎湯加薑末。

陰急。身青面色赤。名曰重陽。

承氣湯。

雜病耳

忌塞井及壅下溝渠不通。并常食韭菜葵。令人耳聾。

脉病證

卷二

十二

治

風虛

聾塞不聞或如風水鑑聲舌。

簡易全蝎生姜服局方。蘇子降氣湯。參消風散。

風熱

上壅脣腫制等。痛腮出。

三因補腎丸。本草黃芪元濟生。俊容元簡易蝎姜湯。

腎虛

勞損傷氣腎氣升而不降。

濟生犀角飲子。七劑直指耳熱出汗。

耳聾

氣升而不降。

本草綿散。東皮燒灰末。不入射小許。蟬退榮多。繫吹。

停耳底

耳出膜不止。

白凡射或燒白凡末。或五倍子金蝎燒灰存性。為末。可吹入。

耳聾瘻或成癰

諸虫入耳。

柳枝上蟲糞。化取清汁。調白凡末滴耳中。出膏龍膏。或

風毒耳聾

耳聾。耳卒腫起出血。

清油調雄黃末灌之。或清油味亦可。

用甘遂半寸綿裹。入耳中。中繫甘草自然通曉。極妙。暴聾用桑葉杵。自然灌之。差。

用桔梗。白豆蔻。葛蒲根。松脂。少腹和為筒子。納耳中。抽出。腎中虛氣。日易之。神效。

又金蝎不去。毒在鼻孔。子巴豆。不煮。為末。葱涎和如棗核。服裏。入耳中。

又懶不火煅。防風羌活。黃芪。桑白皮。通白芍。肉桂。各二兩。㕮咀。每服半錢。羊腎双玄脂同煮。空心服。

傷寒舌

舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒三日已後舌上有膜白滑如胎甚者或燥黑或黃或黑是數者也氣有淺深不同邪氣在表舌上即無胎在裏則津液結而厚者或邪在半表半裏或邪客胃中舌胎白而滑者經云此丹田有熱胃有寒邪初博入裏者也

寒舌

少陽明病惡寒、脹滿大便而嘔逆而渴

太陽病若下之則胃中虛寒氣動膈而寒氣結寒者可下若虛上胎滑未可攻此邪未全成故猶帶表寒及邪傳爲寒則舌胎不滑而溢經云傷寒七八日不鮮然始在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌燥而煩欲飲水數升者是熱耗津液而滑者既滲矣

若熱聚於胃則舌黃是熱已深金匱曰舌黃末下者之黃自去若舌上並黑者又熱之極經曰無病口乾舌黑者死恐君開竅於舌黑為腎水見火之部也

小柴胡湯邪半表半裏也
柴子豉湯邪客胃中也
藏結證詳見心下緊痛門

淘虎加人參湯

陽浮關
小兒急

凡舌機焦黑內外結於鼻中如煙煤
舌盡白底黑有瘡齒無色重喜眠名瘡病

見鼻衄門

桃仁湯黃連牽牛湯加黃芩丸

雜病舌

舌主嘗五味以榮養於身資於脾以分布津液於五臟怒之本脉係於舌根脾之脉係於舌旁肝脉循陰器絡於舌本心脾虛風熱乘之則爲病

卷二

十四

寒舌

風寒濕留 卷縮不能言

七情所搏 舌腫滿不得息

破壞主嘔木舌裏舌

心熱心脾雍熱

肝壅舌硬腫出如沸

舌長腫強有聲如卧蚕有頭尾其頭少白燒鉢灸頭上使熱日消不急治能殺人

舌瘻不語尾桂心末傳之硬腫悶塞益底上焰煤和鹽等分爲末塗之亦宜末臘調敷

重舌亦可以鉗刃刺益出愈虛弱人非風熱所致制半夏不姜半夏分爲末炒之又晚服皮燒火艾小兒瘻後舌瘻多不收心先絕也熱坐瘻升麻湯加桔梗末用黃連黃柏黃芩本爲末水酒服之明早口苦即效新生儿有皮膜裹舌或遍舌根以指刺出血燒白凡末點之不妄令兒吐

黑膏藥裹咽中妨觸白凡乙兩燒灰鹽花乙兩細研以筋點藥在上

癰病咽喉 附咽中骨硬

大喉以候采咽以嚥物則通於谷接腕以通胃喉有節通於藏以系肺並行而與氣合於金門
九則壅塞不開閉塞則猶如瘡物當以簫聲發其聲使氣得宣發亦然當先去風寒次解熱毒

病證
治

脉病證

風熱之症

卷之三

利劑甘桔湯保和丸分利肺胃清三焦散如理所全
京黃湯御院射香朱砂元本利膈湯濟生降雪散
澹雅小方子湯蕭牧牛急證咽喉科

簡易鳥舉高濟生聖散同鑿散御院如望
集成巴江煙薰法并花火研雄黃灌之

局方五香散二錢蜜附子一錢半射半元

| | | |
|-----|----------|------|
| 於肺寒 | 吸氣不言 | 父鐘候風 |
| 有闔陰 | | |
| 陽與寒 | | |
| 沉為陰 | | |
| 浮為陽 | | |
| 晦寒 | 咽喉閉不能嚥 | |
| 晦感 | 胸中晦悶喉嚨中有 | |

喉也梅核破也

增如本移破繫

穀氣尚溫者

卷之三

清生明砂散燒尾一錢鹽花兩分爲末黑綿裹筋頭熬熟，指之
用右手背揩打三下即下，夷堅志

十六

不見風鬟一握截去兩頭絞汁服

白頸地龍十四條搗爛塗之亦小有爲
荆柴木燒取灰止消消癰之差

真者生艾尾研井花水朴消食

杜烏藥等醋嘴噙之痰又脹且極佳難得真者生艾葉研并花水朴消食
川豆板磨醋嘴噙之
早雨未發生為未助點肚外以醋調末敷頭下自破出血線穿去壳已用綿裹曲竹送入喉中
年一二次勿出禁不食鹽同草本一不食之則甲子之謂也

炒烏龍茶研末水調灌之則無食此則坐不可食
炒烏龍茶死人喉痺扁竹根如射干新取研汁吞下大腦通自解或以醋研噙引涎更加并花
水研山豆根噙下苦汁佳又白及三子巴豆三个去壳同炒候风枯去巴豆研凡考求水調灌或取
喉中又朴消貞丹草分研作粉紅末或吹或點入喉中即破涎出安亦治重舌

咽喉腫硬剪刀草如野艾蒿生於離瀝間其根白研之則始膠用順本卷下即吐聲不遇舌頭
研草根順水下亦佳朴消研對入雞蘇元圓如彈子大念化一箇三四丸日然化一兩明砂半錢
洗滌含化軟骨又背火與農煎熬半分三服連進此時咯咯自出角骨食被燒即下咽
用其根為末順流水下斷骨繁蒙芽水下良又桑枝去骨醋煎灌漱下

傷寒而赤
附面瘡而青

難經云面惄能耐寒者以諸陽之脉上至頭黃帝於面長髮陷獨隱明不漏
陽者蓋陽明之脉維絡於面也

恙實發

太陽證小發汗面色赤者許出不徹也

麻黃湯

陽毒證發躁往來面赤胸痛鼻塞不利糞黃

亭摩若酒湯陽毒亦麻湯推仁湯鑿之藥

惡熱而遲

身微熱煩躁面赤自微熱者裏寒也須

躁者陰盛也面赤戴湯下服也

四逆加葱白

惡熱而遲

中暑背寒面垢如蠶面着塵土足微冷

白虎湯

西赤角痒有熱

煩渴溫燥而皮倦怠却不重渴

桂枝麻黃各半湯

微弱

沉疾而細面青薄青黑或鄭舌陰毒證

新井花水漬布洗之

惡熱而遲

面赤角痒有熱

桂枝麻黃各半湯

雜病面

風邪入腠理發於肌藏則面黑增脾惡風而面黑增風濕搏而爲瘡瘍故聖瘡

洗面藥七散白斂果皇牽牛白附子皇白芍蒸白姜黃

面細瘡常出黃水桃花陰乾加薑歸或杏花作末洗面

面瘡瘍用鹽湯綿浸搗瘡直敷度易差

面瘡瘍或瘡瘍或瘡瘍皆細末夜以乳汁調行之有效

面上手體黑瘡瘍及效刺用水調石灰一錢納舍襦米置衣中半在火鍼宿於中米色如

水晶光用針挑動瘡瘍少許加水晶粉其半日許瘡行出却剔去藥三日愈

面瘡瘍併皇牽牛三百桃花陰乾爲末食後熟水下方寸匕日三良

面瘡瘍刺破先絞子汁塗之

斗門方黑點人面色好白姜黃牽牛細辛粗芥作湯早示兒胎穢

面瘡瘍痛何首烏末姜汁調成膏付之帛蓋以火炙鞋底熱熨之

傷寒鼻乾

附鼻衄出血通見傷寒蓄門

鼻衄者鼻中出血是也雜病衄者青鼻在裏傷寒衄者青鼻在表何以言病源曰心主血所藏血肺主鼻鼻於鼻血得熱則散隨氣從鼻中出爲衄是雜病者貴在裏熱也經當傷寒脉汗緊不發汗因致衄者宜麻黃湯傷寒不大使六呂頭痛有熱與少氣不得發散擇逼經血以致衄矣即非桂枝麻黃湯專治衄也半金翼曰里中有三種曰肺而曰陽而曰內四吐血家既系衄則鼻中出四可謂外衄是經絡之血妄行也然衄者由陽盛而經少陰病但厥無汗而發汗之必動其衆或從鼻目中出鼻多汗上渴為誰治衄家雖為邪在經而又不可發汗者須曉出自半金翼又汗出不足者死

浮大

陽明中風短腹瀉脇痛鼻乾不得汗喜臥身黃

小便難潮迫而喘

桂枝湯

小柴胡湯

浮大

太陽三合病心利頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾

桂枝湯

新井花水漬布洗之

脉症

浮大

桂枝湯

小柴胡湯

浮緊

太陽病發衄者欲解其脹緊先汗服麻黃湯不中病發煩自眴者必熱而脉當浮緊者

若脉浮自汗服桂枝湯不中病必頭疼甚而致衄小効而脉尚浮者

脉呴微者黃芩芍藥湯鼻角地黃湯與止者

若衄而渴心煩飲則吐水

血家法不可汗而微攻也第第解之汗則鎮相見

浮緊 隨陽俱浮風溫病自汗身重多睡鼻脣如鼾

浮緊

宜再桂枝湯與後脉微不可服

不得眠但當柴胡和解之

姜雞湯

先服芍藥散次服竹葉湯

不得眠但當柴胡和解之

而花湯

雜病失血

通見腸風下血

雜病失血

寒氣衛升降循環前宣失宣血不循經流注妄行然全有不因熱之所發蓋導熱則淖溢氣氣俱熱而肺氣上方吐衄也出一升斗者皆外所因血本心所主肝所藏然

脾亦為之統過思傷脾不令吐衄河間論或言嘔吐氣凝血為寒者設此寒然甚

金鍊以爲禍濁而火甚則水制之故赤無黑而為紫也吐而不咳易治唾中帶紅線

難治為其有所損也

脉病證

寒氣衛升降循環前宣失宣血不循經流注妄行然全有不因熱之所發蓋導熱則淖溢氣氣俱熱而肺氣上方吐衄也出一升斗者皆外所因血本心所主肝所藏然

脾亦為之統過思傷脾不令吐衄河間論或言嘔吐氣凝血為寒者設此寒然甚

金鍊以爲禍濁而火甚則水制之故赤無黑而為紫也吐而不咳易治唾中帶紅線

難治為其有所損也

脉病證

寒氣衛升降循環前宣失宣血不循經流注妄行然全有不因熱之所發蓋導熱則淖溢氣氣俱熱而肺氣上方吐衄也出一升斗者皆外所因血本心所主肝所藏然

脾亦為之統過思傷脾不令吐衄河間論或言嘔吐氣凝血為寒者設此寒然甚

金鍊以爲禍濁而火甚則水制之故赤無黑而為紫也吐而不咳易治唾中帶紅線

難治為其有所損也

卷二

一十八

三因龍骨散吹之高燒湯加葛根公瑾筒前空心服隨受衄出左右以新汲井水洗足效耳鼻口出血不止燒赤馬糞火溫酒調工錢

形
朱膏疼
氣浮浮
大而平誰
沉細者
生
更著太衝
脉在否
咳而亡氣
脉數者
不得點
治
活出若効
脉滑生
太虛死

雞蘇元用砂石勝散御院射查散本裏西梅元
濟生犀角地黃湯赤根散天門湯病飲查墨汁
三國龍骨散查集或施朱活人素方藥湯陽湯加
柏半全良水生元醫說中是散益中積陳歸元信乾
調服清荷茶前動用帛包塞鼻中濃鹽水熏鼻薰
塞鼻外項後裹際而筋間空占三指研細貼手足心

傷胃吐血
飲食負累過度色鮮
傷吐衄大過并積熱
肺瘍咯血飲啖熱燥所傷
傷損監打撲觸物所跌內損
九竅出血

商易是齋宋散濟生地黃湯加味理中湯加味
赤芍藥湯咳煙荷葉末米飲調和商易散理平湯
雞蘇元黃元商易心用大阿膠元濟生大劑散雞蘇
散本草大劑冬元清肺湯加橘梗即桔梗生地黃
肺瘍咯血等商易散黃芪散扁豆散
澤蘭散是奇生地黃元濟生奪命散商易散三因加
味言歸湯雞鳴散

三因

商易散

醋湯

京裏散

矣

乳香

汗盜表裏極汗出如効
心肺受熱咳血

大阿胶元必勝散是齋宋散傷寒散重陽散散如生
此黃白者每帖把葉散

頭身或燒丹而妙

舌燒存性

熱中出以東陽茶酒，降地氣，用於火症。

之頭身白扁豆生姜半兩，加水去皮制半夏人參三錢，白芍根三分，甘草一錢，生血寶肺及血行神，用前半斤半水，生蜜一斤半，水，嚼力，蒸山藥五錢，五更起東面坐不得，露水出匙良，功用桑飲，服之，咳不妄行，只吃本草，詳。

肺癰咳血 肺熱口臭通見敷咬明

肺為五藏華蓋，其位象候於皮毛，氣之所主，傷寒風寒之客，則生疾，症亦生，其証咳而胸滿隱痛，兩脚腫滿，潤乾口燥，燒肉多渴，吐酸，腰痛，久。

寸一脉而美
無聲五脈而美

可治

嘔膿自者愈
其色白者當活

無聲五脈而美

不治

吐膿如糲米粥有
膿而嘔止色多亦

無聲五脈而美

齒牙

愚公自是金丹服食之水能治小神許古人多喜湯藥服之亦無害也。而人之安人罕知之仙經云：「物含真精永作仙」，補言其偏五行之英華總二脉之交會。玄者，陰也。故金經言「陽明之脉入上齒縫中，手陽明之脉入下齒縫中」，是以胃氣虛則上齒寒，天賜生則下齒涼。津膏有流注則齒腫大，歸歸則齦宣經之脉伏術子齒故病如是。

口舌

冷怕熱水

熱怕冷水

風不怕冷熱或眼腫

虛指刺小便數耳鳴

弱成有虫竈

人參敗毒散根三因金沸草散御院定痛散
人參消風散御院定痛散

安胃丸黑錫丹退乳散聖先生交感耳指牙散

赴延散板橋黃炭冰糖散、蓼葉散等中燒藥

大黃末和消風散後通散姜汁調敷貼

牙齒急長至齶溢銀帛愈難禁。牙疳飢瘍腫取雄酥點敷牙宣。高竹來當局高華萬
滿有荷杞根為末湯調敷後服之。兼治吐血、齒痛不可忍附子及天麻尖全蝎七个作末點痛藥。
黃華蜜仙為末沙糖丸貼痛處。牙頭疼、腫等症。黃連苦蘿辛煎。禽服痛加川麻桔梗或生薑子
敗毒、升麻湯取效。不齒縫出血枯白凡或露露蜂房炒火柏水燉燙。葛根或葛根散。四
至痛割裂皮肉捲如指入嘴於痛處或柳枝一搘剉盒蓋。水煎噙水前噙噙又杜元祐等分
四至痛割裂皮肉捲如指入嘴於痛處或柳枝一搘剉盒蓋。水煎噙水前噙噙又杜元祐等分

卷二

鈎吻水煎噙水之法於唇上不得落地三遍痛即止。早用香附益同燒作膏。不棄去口氣

齒瘡宣煙喉瘡并治走馬瘖。退紙燒灰為末蜜丸。噙漱一二番加昇香。

灸法。兩旁所生有尖微近後骨。健中小坐臂取之。當胃經脉也。灸五壯。灸必太痛良矣。

指爪

誤傷指頭痛砍絕壞葱擣爛包之效

治指結膿指小中脫者。先消湯淋洗。治指甲沾凡末貼之。

甲疽膿丙火燭煙尽。繒熟之三四次愈。別中湯風或用。長傷肌成瘡腫。輕生傷筋。

腫熱黃芩浸淫牽引。跌肉爛如火瘻青尾打碎掉如琉璃翠明者聚在鉄枳木。生火浴。

沸流如金色者。洗定。作末如黃丹色。盐湯沖洗拭乾。用藥封之。

掌足破裂極二兩。桑根煮清半升。以火燭復浸之。乾却塗猪羊脂。擦腫。撓黑蠍粉。

五倍子白及阿膠等分。為末。津調得。以桑葉髓調布佳。又用銀作鈆。糖加清油研入燒糊。

一撮灰和用冰淨洗却。入鼻。燒縫內。

水類方卷第三

碧山李仲南集成
青原孫允賢校定

傷寒四肢疼

附逆冷拘急厥逆手足逆冷手足牽掣拳

淋病證

治

太陽病發汗多而微急難以屈伸惡風便難見
厥陰病大汗出或腹痛咽痛復吐利甚不亦內拘急
四肢疼不利厥逆惡寒

桂枝加附子湯桂枝湯
桂枝加附子湯桂枝湯

陰毒中人厥逆腹脅痛身如被杖或臂挛急脉下
陰證四肢厥逆額上身臂冷汗出者亡期也

丸欲服門
真武湯

四肢逆冷或黑或瘡或如傷寒四肢沉重忍之善眠
少陰証四肢寒痛微略小便不利或自下利而咳

四逆湯
姜漿湯

四支拘急臂冷汗出發逆惡寒手足厥逆
風溫証四肢不收嘿黑欲眠頭疼身熱自汗体重而喘

四逆散加五味子干姜
姜漿湯

四肢厥逆腹中痛或泄利而寒氣停或小便不利
手足逆冷或熱多厥逆或厥寒甚小

丸多寒少門
真武湯

微細沉遲

卷三

手足寒小便利鄭声
表裏寒手微軟不利清谷

白通湯
白通湯

手足逆冷利煩躁欲絕
下後額生汗手足逆冷或宜汗

白通湯
白通湯

少陰病手足厥冷食冷則心中溫緩不能食
兩腎逆冷腸腹滿多汗頭目痛苦甚

甘草湯桔梗湯通脈散寒丸
甘草湯桔梗湯散寒丸

少陰病手足寒欲食或吐利而咽中痛
兩腎逆冷腸腹滿多汗頭目痛苦甚

白虎加人参湯
白虎加人参湯

少陰病手足寒欲食或吐利而咽中痛
兩腎逆冷腸腹滿多汗頭目痛苦甚

白虎加人参湯
白虎加人参湯

驚

四肢逆冷足寒惡寒
身挺直目明寒氣牽引四肢拘急小腹痛手足拳
筋惕肉瞤發汗後頭眩汗出

見頭汗門
真武湯

下証悉具而失下血氣不通口支便厥
氣滯發熱爲熱畏熱扶蘇水揚手撒足摩摩

見頭汗門
真武湯

得眠大便和小便赤多寒積爲關脉
關通三經脉手足厥冷面不澤

白虎加承氣湯
白虎加承氣湯

脉散不和經胃中心滿而煩飢不能食
已身冷名藏寒難治

二二二

傷寒四逆者四肢逆而不溫逆於厥爲轉精而成寒積溫分或非朝夕之故傷寒

始在皮膚當太陽陽明受邪之時則百身無熱當陽太陰受邪之時則百足自溫是表邪也緩而次傳裏至邪傳少陰爲表證已深雖未大厥而手足又加之不溫若至陰則手足吸冷矣經曰少陰病四逆或欬悸或小便不利或腹痛或泄利下重者四逆始生之运用寒冷之藥以主四逆之疾是知而逆非虛寒之証也又有四逆湯亦治四逆手足寒方同此與寒有旨哉皆手足自溫從四逆而至無者傳經之邪也而四肢生之若始停之手足俱候而不溫皆是食糲受邪陽氣不足可用四逆湯溫之無識此勿多誤也四逆與厥相近而罪也四逆而吐利煩躁者死

傷寒厥者手足逆冷甚於四逆厥有陰陽氣不順按陽氣內陷則氣逆伏也經曰傷寒三日至四五日厥者必發於前熱者後必厥厥深熱亦深厥微者為厥矣心陰病位厥也而強熱亦必動其血也心氣自中出是名下厥上渴亦是言厥者其熱也先於後厥首發於內也先厥後渴者厥甚而陽氣得復也若始得之傷厥者則是陽氣不足而陰氣勝也大抵厥逆爲陰所主寒者多矣又有進退之別經曰病厥音厥亦吾至矣當復以不懶者自愈發於四日厥發三日厥少熱多病亦自愈乎四日厥久言復厥五日寒多抗少陽氣逆其病為進病至厥陰傳經盡也當其之時厥少熱多陽復厥陰則愈若厥多熱少陰勝而寒不復則逆至於下利元厥後立者利自止見厥復利厥未復爲之亦易氣乖利亦自止者復爲厥是陰氣越厥舊不利矣少陰病寒逆而利手足厥死者死

傷寒腰痛

卷三

二

素問云腰者腎之府轉搖不能勝將憊矣雖屬腎虛亦涉三陽半太陰因之自太陰傳得之補引項脊尻肉如重中寒所致陽明經得之痛不可顧顧則如有所見善悲虛燥熱陽經得之痛如針刺不可俯仰中風執大陰經得之煩熱腰下如方橫木居其中甚則遺溺口噤濕少陰經得之痛引脊內多因中寒所陰經得之腰脊強急如張弓弦之急

(治)

見頭疼門

葛根湯

牡蠣膠鴻散

見頭疼門

麻黃湯桂枝麻黃湯

脉病腰痛

李公長

李公長

六湯病發熱惡寒則夜腰痛傷風傷寒者亦無汗
太陽陽明合病必下利而頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾
病差後腰脊有水氣者
腰脊強發熱惡寒頭疼
腰脊疼痛頭疼身體拘急惡寒腰汗寒多熱少

面色黃手足指末微厥不頑燥

脉病說一痛腫引牽脇謂之脇脰病

腰脊帶五千錢謂之帶者腰痛

(治)

巢氏云長伸而足以兩手舉足之指

沉鬱門

風熱傷風屬太陽厥陰經腰中隱急

寒藥順氣散魚腥草散澤瀉散

附大陽厥陰經腰中隱急

附大陽厥陰經腰中隱急

附大陽厥陰經腰中隱急

簡易體痛作風治用十味剉散

二年丙辰夏五月白疕脾至筋脉亦痛而不省人事作痰氣犯心火湯愈傷寒第陽肉消腫由寒入寒發汗過多亡陽津液枯少陽氣火虛而引寒

而跳動也。太陽病脉微弱汗出惡風者不可服大青龍湯服之必厥逆。傷寒
此為逆也。太陽病發汗不詳仍然發汗頭暉身濶動振振欲躡地者直取湯主之。發
汗而後渴表證治以溫經益陽可也或吐下後汗後表裏俱虛有此證者大承若但
發汗後所可忌也。經曰傷寒吐後發汗虛煩脈微急心痞脹目痛氣冲咽氣
熱冒筋脉動惕者久而成痿此為逆之甚者太陽病汗下之後表裏俱虛復加
瘧針因當導而表裏俱虛者難治。

莫伯治急其致麻疹

太陽之性，陰寒在裏，內痛，當以直腸分辨之。

卷之三

若只勝溼不可汗蓋血少榮氣不足

卷之三

頭疼身熱心惡寒無汗寒多少而發
腰脊痛手足指末發麻不煩

一

三陽合濟，則身無難病。品不生穢，則語清氣不可汗。若自汗

卷之六

太陽中濕。一身盡癰。潮發熱。身黃小便不利。而易國風。虛相傳。一身羸而重。

若風寒火熱形寒而走極者少麻黃葛根不加

沉

大毒身重者強度中止痛痼疾不利身如被疽
或脉之升支之亥前

霍乱吐利者或有寒热不休者

卷

身熱雖自汗痛不可醫汗出作癰

詩言

詩言

加數

夏月身發黃斑白毫鱗可用然活中暑者為後一解表藥耳未能服逐寒邪涼夏月陰氣杜內或寒熱病而氣虛人妄投白毫遂成結膿以其性寒非傷寒藥也

中暑作熱病治之而發黃細出邪氣未入藏者

春初肌肉發癢疹如鈎紋或咳嘔心悶清汁

葛根橘皮湯

不可用姜棗薑桂之類

溫毒熱病發斑俗謂之麁瘡素問謂之脉

葛根橘皮湯

不可用姜棗薑桂之類

狂躁妄言身瘡亦咽乾陽毒証或利赤黃

見面赤頭瘡

不可用姜棗薑桂之類

雜病斑疹

班瘡巢氏名之蓋立瘡寒多則色赤風多則色白瘡謂之經及仲景皆云瘡自魏朝有頭白而根脚赤者谷呼豌豆即班瘡也此證多於藏故裏水互發於川經細粟如麻俗呼牀子即瘡疹也有大者俗謂之辛謂之汗輕重不齊故命名亦甚苦學病寒百胡六慎不可轉利以傷寒則表实而裏虛而裏寒實傷寒之和瘡也瘡久傳藏而瘡久之毒蓄於藏府而漏泄於外膚理傷寒宜解表治疹先解毒若無別毒兼之黑

傷寒發斑不可下而下之熱茶虛胃當而天下胃熱不行泄者最能發斑

或極躁語脈閉腫痛

瘡疹出得大盛活人牽角此瘡湯無犀角以升麻代鮮之療溫毒發斑

至參水麻湯

瘡疹熱病一日已汗利後雖不除身斑出

治人舍石

疹證患人發熱溫三不止大便難溏所謂瘡似疹似瘡宜瘡則撲而渴則利而泄

治人舍石

脾經受毒采則多喜閉目

活人二十米論小兒瘡疹近世孫治中論小兒疹極可驗

活人方中用大青山物湯大青草解毒在山中葉長而尖似馬齒

溫毒陽氣上斑以冬月冒寒氣至春而發表裏實不可汗虛當解毒有陰毒瘡

管強硬痛腹冷厥逆口干黑咽喉不利或吐脓細疏山赤斑者可治若出黑瘡不治

傷寒發黃

經云溫熱相火合黃病解二者黃是陽與陰也傷寒發黃為熱已甚內有寒復者亦發黃陽明病被火額汗而小便不利者必發黃內有寒被火而致陽明病無汗小便不利者必發黃此由陽明熱盛所致傷寒發汗已身目為黃此寒溫在裏衣不解不可下當於寒濕中水之溫家是黃身以熏黃雖黃而色暗不明甚而致黃身黃如橘子色甚苦寒者表正黃如臭藥色此溫与熱以熱相火經云治溫不利小便壯其治也大抵黃屬太陰脾主經寒濕主則也見於外若內熱亦而已自汗出小便利則不發黃不必頭汗身無汗小便不利渴引水冷此熱在裏則心復黃者古近山藥脉專氣出令形体之腫重頭項僵急環口嘔惡大汗發黃為脾絕不必寒溫在裏熱薰於脾蒸熱之宿食相搏脾蒸不消故發黃與於外下腹脉相似但小便不利者較老小便日利為甚不然發黃恐脾虛精發無可飲脉必平滑而赤若瘀血證即知大便不利為異

脉病證

身體發熱而汗出身熱汗利頭面渴利水寒

治

曾居相
陽寒不聚滿按著硬而頭章故惡結竟熱計為寒实

會証

枳實理中元及良丸理升氣

若胃煩躁而懷高燥渴脉尤滑下抵穴証

大陷骨月

無与逆瀉

若轉未成結竇以理下丸解之若大轉抑有服証

承氣湯下之

若傷寒未退可下利門

小陷骨月

若按而痛脇連脣腹自硬或潮熱色大結竇

本附子桂枝湯或其陽合即解

若按志下痛此為小結竇脉溝

大陷骨月

除毒漸深也候冷腹痛半滿然經躁渴

本附子桂枝湯或其陽合即解

虛汗不止而嘔不利脉沉細而疾

小陷骨月

藏結証湯或其陽合即解

本附子桂枝湯或其陽合即解

脈搏下甚止其陽合即解

本附子桂枝湯或其陽合即解

可下

本附子桂枝湯或其陽合即解

糞下急之

本附子桂枝湯或其陽合即解

有大有小

本附子桂枝湯或其陽合即解

有虛有實

本附子桂枝湯或其陽合即解

未全入府者大病久堅有燥屎寸陰下者

本附子桂枝湯或其陽合即解

未可与承氣湯若服太泄不與等与小承氣湯發汗不泄腹滿者

本附子桂枝湯或其陽合即解

未可與承氣湯若服太泄不與等与小承氣湯發汗不泄腹滿者

本附子桂枝湯或其陽合即解

沉鬱而微

本附子桂枝湯或其陽合即解

滑而微

本附子桂枝湯或其陽合即解

浮而微

本附子桂枝湯或其陽合即解

若致

本附子桂枝湯或其陽合即解

沉鬱

本附子桂枝湯或其陽合即解

滑而微

本附子桂枝湯或其陽合即解

浮而微

本附子桂枝湯或其陽合即解

卷三

十六

傷寒寒而腹滿視其大小便何如不利

後世謂之承氣湯前却朱苓湯

腹痛發汗不勝腹滿痛甚急之

大柴胡湯大承氣湯

關突腹滿大便秘按焉痛实痛也

桂枝大黃湯或連湯合承氣湯

陰陽渴

小柴胡去藜本加人此治鞏病

陽鳴泄利腹中急痛光与小導湯先守藥餘瀉利差

桂枝大黃湯

太陰病腹痛咽乾舌苔濕或自利不渴或腹滿時痛

桂枝加黃湯

腹滿脉浮可用桂枝腹痛桂枝加藥痛甚

桂枝加黃湯

腹滿脈大多熱小蒂施鍼等之脉大而芤

桂枝加黃湯

大便病腹滿發汗後汗不止為漏風

桂枝加黃湯

太陰家腹滿快腹下利者不可投食藥

桂枝加黃湯

少陰病卒然燒爛蒸潮熱腹滿而喘或譫語妄言

桂枝加黃湯

少陰病水下利清谷逆瀉

桂枝加黃湯

少陰腎傷寒言燥舌乾渴圓掌大抵腎傷寒亦多虛裏無熱

桂枝加黃湯

但苦渴微寒有時腹痛其脉沉細率利是冷

桂枝加黃湯

裏證有心腎連脣脉亦躁則腹痛喘急坐卧不安

桂枝加黃湯

陰毒証卒然燒脣蒸蒸咽疼嘔吐利身如被秋冷汗

桂枝加黃湯

煩渴又頭脹暈睛夜休慙半服結額身背冷汗不止

桂枝加黃湯

陰証腹痛小便不利

桂枝加黃湯

脾胃不和又有積聚腹痛

桂枝加黃湯

沉鬱而疾

桂枝加黃湯

或瘧疾

桂枝加黃湯

少陰家

桂枝加黃湯

可下

桂枝加黃湯

鴻臚

桂枝加黃湯

陽滿弱

桂枝加黃湯

發小急

桂枝加黃湯

鴻臚

桂枝加黃湯

少陰家

桂枝加黃湯

可下

桂枝加黃湯

少陰家

桂枝加黃湯

脉

病

證

桂枝加黃湯

太陽病熱與膀胱小腹滿、便反利無表証者下血証

桂枝加黃湯

發汗後發熱飲水小腹滿咳喘小便不利

桂枝加黃湯

脚氣之小腹不令人嘔吐不治

桂枝加黃湯

見腹滿門

見腹滿門

五苓散

雜病脹滿

附腹病道盡心肝有病憲脾經黃光氣出呼氣散之

脾實走州太脅足厥候也。脾胃多病後失調因并傷委藏傳克陰陽不升降瘀滯於中
積聚之証。胃脹滿而胎有水痘水氣脚氣皆令脹滿各類求之。經有數脈大素作谷脉

脉病證

(治)

三焦氣痞若脾肺实者更虛又發為脉痞為寒客即為壅塞半身先以愈氣口分其內外大汗大勞者壅

寒張証先寒下虛食水溼違弱熱脈証腹滿後小便不利脉滿瀉脈証腸鳴堅腰寒感肺溼寒張脹氣急結聚寒鬱推其虛寒感寒氣脹憂結聚寒鬱推其虛寒感寒飲食脹飽寒氣聚解渴滿悶

寒張消生朴附湯強平湯太正氣散內參姜湯溫寒寒朴木橘皮荊氣針元導氣元附子橘平湯三因七物學朴易吐生姜大黃專賾大黃龍虎溫服一生清涼溫湯加厚朴木附湯加桔梗桂枝去氣散氣蒸水香調氣散沉香降氣易木香氣飲分心氣飲脾積元御院分氣元氣不木香喚氣不賓散氣溫氣溫冷生藥蘇子湯同易涼氣散燒氣湯加元氣寒元氣加甲殼元紅平勝元積脈通見五精門葉脈洛生薑元獨活湯麥張羅葛汁竹子前湯脈血脈瀉平肝飲子抑氣湯琥珀散肺紫蘇飲病後清平天正氣散加皂角木香木附子朴甘草毒

腹痛證多同其憲寒濕冷瀉痢腳氣寒氣藏血氣攻積聚而癆溼飲食冷忤寒痛少審因

卷之二

十一

沉澱差浮大長未差本克也

明虛實公之熱為冷其見各門聖惠方。陽氣外虛陰氣內積陰邪与脾氣相搏。脾鬱則脹而痛。用吳茱萸散附子理中洋湯加吳茱萸續易簡服中冷氣切痛。關人脉弦遲長。姜根小建中湯加白芍藥連心痛加遠志半兩。腸鸣泄利而痛。吾積散。吳茱萸加吳茱萸下桂香丸。脉緩滿於熱使赤闕尺脉散。公為熱痛小柴胡湯。赤朮合加吳茱萸大便不通而痛甚者。余氣氣湯下之。若虛氣弱飲食停積重按愈痛而堅者。脉弦緊而滿。氣積附以整生丹枳殼散或加飲。胃中痞塞大便於华林沉豆蔻丸。寒者保安丸。若性寒不行。病腹中煩熱口苦清水脉榮空而滑者。蛔動也。禁丸元。婦人腹疼痛脉沉而緩者。此血刺也。牡丹元。斷口弦散若心腹卒痛脉滑或長短大小齊為客忤。蘇合香丸備急丸。瘡珍候亦先服痛。

五積六聚

五積生於五臟。寒氣其始終有常。迫其痛不離其部。六聚成於六府之陽。氣其始終無根本。下無所留。其痛無常。迫陰陽不利。藏在臟腑。別之毫善東之。傷寒藏。逆歸財。而為積聚。至藏。微寒成塊。散者假物成形。半肉龍精髮。參。桃仁。為。傷食。散。黑。黑。黑。精。寒。情。傷。勝。復。傳。火。不。行。遠。傷。本。藏。財。因。於。三。因。方。中。

脉病證

(治)

弦緊兼浮細而寒積洞聚脉擴芤者腸下有

肝

肥氣

盛也。筋肉有墮足色青而膚下痛牽引。三因肥氣元本草綱目元

御院助氣元

因肥氣元局方漏白元

一

心

伏梁

尖也。起於膈大抵腎上至心。氣聚之橫架股

三因伏梁元局方漏白元

一

津積聚也

肺

脾積

寒氣客留於中脘痞滿不通也更病飢則減飽則增或食右胁下如杯喘息氣逆肺痛不能食

三因治寒氣客留於中脘痞滿通利水氣

大來沉实胃毛堅強急急者生虛弱

月

息貴

日晡更定时痛如繩針刺寒不消能食見飽則減小腹裏急腰痛、軀目昏冷

三因治寒氣客留於中脘痞滿通利水氣

浮中可轉聚沉者死虛弱

市

腎

奔豚動發於腹上心下時如豚走也黑糞則神曲麥蘖雞內金砂仁之茶飲

三因治元散聚湯氣奔脈搏無外

急者生虛弱

急

體虛人不宜攻宜以懷麝栗煥腸中能粘

米谷一神曲麥蘖雞內金砂仁之茶飲

三因治元散聚湯氣奔脈搏無外

諸根火因積聚肉瘤

肉瘤

一香射香桂木

神曲麥蘖砂雄黃桔梗子水飲辨

三因治元散聚湯氣奔脈搏無外

酒癰米菜

米菜

一不細砂阿魏

一六畜膽

一帶白薄皮煎汁早晚和姜十服之

宿食粉麵

宿食

蘿蔔丁姜酒

一乾漆桃仁蠻甲大黃川牛膝

一九虫

一椎黃錫灰薑末雷丸石榴根榧子實

瘀血宿食

瘀血宿食

一桂枝

一桂枝加桂枝神保元生半夏小理半元餘見寒飲辨

一桂枝加桂枝神保元生半夏小理半元餘見寒飲辨

瘀血宿食

瘀血宿食

一桂枝

一桂枝加桂枝神保元生半夏小理半元餘見寒飲辨

卷三

十二

