

三因極一病證方論

十一

三因秘一病證方論卷之十七

婦人論

夫天地造端於夫婦乾坤配合於陰陽雖清濁動靜之不同而成象効法之有類源流源流之病與男子不同者亦有數焉古方以婦人病比男子十倍難治亦言之深乎但三六病產後一門男子無之其如外傷風暑寒濕內積喜怒憂思飲食房勞虛實寒熱悉與丈夫一同也依源治療可得而知之

求子論

夫有夫婦則有父子婚姻之後必求嗣續故聖人謂不孝有三無後為大者言嗣續之至重也凡欲求子當先察夫妻有無勞傷虛實之屬依方調治後內外和平則婦人樂有子矣

補消

牡丹皮

當歸

大黃

桃仁湯去皮尖

細辛去苗

厚朴切子

赤芍藥

桔梗

人參

茯苓

桂去皮

甘草炙

牛膝酒浸

橘皮各冬錢

附子湯去皮

虻虫去毒

水蛭切細

右為劉散每服肆大錢水酒合壹錢半煎取陸分去滓空腹服日叁夜壹溫覆得少汗必下積血及冷赤膿如小豆汁斟酌下盡若力弱大困不堪者只壹貳服止然恐惡物不盡不得藥力能盡服儘好不尔着坐導藥

皂角去皮子

當歸各壹兩

細辛去苗

五味子

乾薑各壹兩

大黃炙

礬石石花

戎鹽

蜀椒各半兩

右為細末以絹袋盛大如指長參寸餘盛藥令滿縛定
納婦人陰中坐卧任意如行是小便時去之更安壹日
壹度易新者必清黃冷汁汁盡止若未見病出可十
日安之本為子宮有冷惡物故令無子值大陰冷則發
痲痛須候病出盡方已不可中輟每日早晚用苦菜
煎湯薰洗

秦桂圓活婦人無子昔金城范守進此方見經驗

秦艽去盡 桂心不見火 杜仲去白皮 防風二分

厚朴去皮 附子去皮 茯苓各兩半 白薇

乾薑炮 牛膝酒浸 沙參 半身細切

人參壹兩 細辛兩壹分

右為細末煉密為丸如赤豆大每服五十丸食前温酒
醋湯任下如未効更加圓數丸有則止神効並如彼說

不復繫引

聖明湯 斷經三月不知是胎驗之方

川芎不拘多少

右為末濃煎艾湯調貳錢空腹服微動則有胎

脈例

經云陰搏陽別謂之有子搏者近也陰脈逼近於下陽脈別
出於上陰中見陽乃知陽施陰化法當有子又少陰脈動甚
者娠子也手少陰屬心足少陰屬腎心主血腎主精精血交
會識投于其間則有娠又三部脈浮沉正絕無病者有娠也
餘並如脉經說

惡阻

婦人中脘宿有風冷痰飲凝滯不行飲湯血薄多喜病阻其
狀顏色如故脉理順時不知病之所在但竟四肢沉重頭目

眩暈惡聞食臭喜噯鹹酸至三四月則大劇吐逆不自勝持
多卧少起此由經血既閉水漬於臟二氣不得宣通而清悶
經脉祕凝故使四肢沉重挾風則頭目眩暈齒齦則吐元時
前胡湯治妊娠擇食嘔吐頭疼顛倒疾逆四肢不和煩悶

人參 橘皮 白朮 麥門冬去心各
甘草炙一分 白茯苓 厚朴去心各

右為劉散每服四大錢水一盞半姜五片入竹茹一塊
如拍大同煎至七分去滓空心服

半夏散治妊娠惡阻心中潰悶頭目眩暈四肢怠墮百
節煩疼痰逆嘔吐嫌聞食氣好噯鹹酸多卧少起不進飲食

半夏湯洗 茯苓 乾地黄各一兩 橘皮
細辛 人參 芍藥 川芎
紫蘇葉 桔梗 甘草炙各一

右為劉散每服四大錢水一盞姜七片煎七分去滓空心
腹脹有客熱煩渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知母

腹冷下利者去地黄入桂心炒胃中虛熱大便閉小便
澀加大黃一兩八分去地黄加黃芩六分

茯苓丸治妊娠阻病心中煩悶頭暈重憎聞飲食氣便嘔逆
吐悶顛倒四肢重弱不自勝持服之即效要先服半夏茯苓
湯兩劑後可服此方

茯苓 人參 桂心炒 乾姜炮 半夏湯洗
橘皮略 白朮 葛根 甘草炙 枳實各一兩

右為末蜜丸如梧子大每服三五丸米飲下日二服

小地黃丸治妊娠酸心吐清水腹痛不能食
人參 乾姜炮各等分
右為末用生地黄汁丸如梧子大每服五十九米湯下

養胎大論

夫養胎須分能所母為能養者為所養各義既殊致養亦別故謂之重身父母交會之初子假父思精血投識於其間此後成妊元氣質始之謂也一月血聚謂之始胎二月精凝謂之始膏三月成形謂之始胎此亦九次第中次第也道生一一生二二生三三生万物況以三而成故不得不數月而分也成形之後陰陽施化男女始分故隨見外象而有感於內四月始受少陰君火氣以養精五月受太陰濕土氣以養肉六月受少陽相火氣以養氣七月受陽明金氣以養骨八月受太陽水氣以養血九月受厥陰木氣以養筋十月胎成俱備神明已全俟時而生此皆所養胎息之所成始成終也若能養者准在乃母依經所載而時養之无妄服食針灸勞逸等不特傷胎亦乃自傷不可不備孝也為保傳母尤宜熟識之謹備列母之能養避忌諸法以繼諸後

避忌法

一月足厥陰脉養內屬於肝肝臟血不可縱怒及疲極筋力胃觸邪風亦不可妄針灸其經二月足少陽脉養內屬於膽膽合於肝共榮於血不可驚動及針灸其經三月手心主脉養內屬右腎二主精不可縱怒及悲哀觸冒寒冷亦不得針灸其經四月手少陽脉養內屬三焦二二精府合腎以養精不可勞逸及針灸其經五月足太陰脉養內屬於脾二養肉不可妄思及飢飽觸冒卑濕亦不可針灸其經六月足陽明脉養內屬於胃二為臟腑海合於脾以養肉不得雜食及針灸其經七月手太陰脉養內屬於肺二以養皮毛不可憂鬱及叫呼觸冒煩躁亦不得針灸其經八月手陽明脉養內屬

於大腸合肺以養氣血食燥物致氣滯及針灸其經九月足少陰脈養內屬於腎以養骨不可懷恐及房勞觸冒生冷亦不得針灸其經十月足太陽脈養內屬於膀胱以合腎太陽為諸陽生氣故使兒脈續緩皆成六府通暢與母分氣神氣各全俟辰而生唯不說手少陰心養者蓋心為五臟大主如帝王不可有為也若將理得宜無傷胎臟更能知轉男胎教之法斯為及善叙例于后

轉女為男法

論曰陽施陰化所以有娠遇三陰所會多生女子但懷娠三個月名曰始胎血脈不流象形而變是時男女未定故今於未滿三月間服藥方術轉令生男也其法以斧置妊婦床下繫刃向下勿令人知恐不信者令待雞抱卵時依此置案下一窠尺出雄雞此蛋未試亦不可不知凡受胎三月逐物變化故古人立胎教能令生子良善長壽忠孝仁義聰明无疾蓋須十月之內常見好境界无近邪僻真良教也如有觸忤傷胎治各有法據徐之才逐月養胎傷胎等方備則備矣事煩少用故不服錄識者當自閱今出安胎方如后

安胎散 治妊娘胎空腹痛或胎熱多驚至重腰痛腹滿胞急卒有所下或頻仆閉胸飲食毒物或感時疾兵執往來致傷胎臟

川芎

枳殼切焙 熟地黃二兩 糯米二合

右為散每服四大錢水一盞半姜五片棗一枚金銀

少許同煎至七分食前服

白朮散 治妊娘宿有風冷胎痿不長或失於將理動傷胎氣多致損胎常服保護胎臟

白朮

川芎各四兩 川椒去目者 牡礪二兩

右為末每服二錢溫酒米湯任調下腹痛加白芍藥心
下毒痛加川芎心煩嘔吐加細辛一两半夏二十粒湯
洗入若渴者以大麥汁調服病愈服勿置味惡多
阻久宜作丸服亦治室女帶下諸疾

聖胎散治妊娘傷寒大熱胸乳燥渴恐傷胎臟

捲荷葉數者始 蚌粉花半兩

右為末每服二錢入蜜少許新汲水調下食前服

漏阻例

懷妊全假經血以養胎忽因事驚奔或從高墜下頓仆失據
或冒涉風寒觸忤邪祟致暴下血胎乾不動奔上捨心腹中
急逼或血從口出皆傷胎證也

膠艾湯治妊娘不問月數深淺因頓仆胎動不安腰腹痛或
有所下或胎奔上刺心短氣安胎

熟地黃 二兩 艾葉 炒 當歸 甘草 炙

芍藥 川芎 何膠 炙 黃芪 一兩

右為劉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前溫服
留中逆冷加生姜五片棗二枚同煎

行血湯治胎无故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如小豆
汁者

野苧根 二兩 剉炒 金銀各 一兩

右為一劑水酒各一盞煎至一盞去滓分二服不以膠

桂枝散治婦人宿有癥瘕妊娘經斷未及三月即動此
癥也經斷三月而得漏下不止胎動在臍上者為癥瘕害
當去其癥又論妊娘六月動者前三月經水利時胎下血
者後斷三月也所以血不止者其癥不去故也當下其癥

桂心 不燥 茯苓 牡丹皮 桃仁 炒 芍藥 各 等分

右為末煉蜜丸如彈子太母服一丸嚼細溫酒米湯任下食前服

養胎益血安胎子臟治妊娠將理失其或因勞
後胎動不安腰腹痛重胞阻滿胎惡露時下子臟按淡久
不戒胎或受妊不能固養後墮不長胎中不產日月盈滿
轉動无力或致損墜及瘕疝血通乘引驚動太早產時未
至惡露先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛極悶亂連
日不產子死腹中腹上冰冷口唇青紫山出冷沫新產惡
血上衝運悶不省喘促汗出及瘀血未入臍腹巧產不挽
往來或因產勞損虛羸未復面黃體瘦心怔血少飲食不
進漸成瘦勞入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易產二
後常服滋養血氣和調陰陽各膝理之附屬治寒陰瘧冷
甘草炙 貝母 秦椒 附子 乾姜 炮
挂心 黃芩 石斛 去根 紅膏 散
糯米炒 大豆卷 炒 當歸 酒浸 一兩 麻子 仁 兩半
右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸並用溫酒或棗
湯任下細嚼空心服

子煩證治

治妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六
月受少陰相火氣以養氣若母心驚膽寒多煩悶名子煩
防風 去叉 黃芩 麥門冬 去心 白茯苓 四兩
右為散每服四大錢水一盞半竹葉十數片煎七分
去滓溫服

腹痛下利治法

治妊娠腹中絞痛心下急滿及產後血暈內虛
氣逆之崩山又痢常服通暢血脉不生癰瘍消痰養胃調和

白芍藥八兩當歸

茯苓

白朮各二兩

澤瀉四兩

川芎四兩 一法

右為末每服二錢溫酒調下食前服元和紀用經云本六氣經緯丸能祛風補勞養真湯浪邪祛緩中安和神志潤澤容色散邪宗溫瘴時疫安期先生賜李少君父顏之藥後仲景增戒為婦人懷妊腹痛方用芍藥四兩澤瀉茯苓川芎各當歸白朮一兩亦可以蜜為丸服

雞子 治懷身下痢赤白絞刺拔痛

雞子一個

鳥者尤妙

黃丹

一分 治痢疾

右為末每服二錢米飲調下一服愈者是男兩服愈者是女。凡冷熱利漸下門中選无毒者皆可

小便病證治

凡妊娠胎滿逼胞多致小便不利者或心腎氣不足不能使胞分清濁相干為諸淋病或胞系了戾小便不通名曰轉胞又胎滿尿出不知時名遺溺治之各有方

當歸 治妊娠小便難飲食如故

當歸

貝母炒

苦參各二兩滑石半兩

右為細末蜜丸小豆大米飲下一十九丸不拘時服

葵子 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水腫者

葵子五兩

茯苓二兩

右為末每服二錢米飲調下小水利則愈又方入榆白皮一兩

八味丸 治婦人病食飲如故煩熱不得卧而反倚息以胞系了戾不得溺故致此病名轉胞但利小便則愈以八味丸中有茯苓故也方見少陰脚氣門

白藏方藥治妊娠遺尿不知出時

白藏 芍藥各等分

右為末酒服方寸匕日二三服

胎水證治

凡婦人宿有風寒冷濕妊娠喜脚腫俗呼為鰲脚亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水

鯉魚湯治妊娠腹大心閉有水氣

白木白兩 芍藥 當歸略二 茯苓四兩

右劉散以鯉魚一頭修事如食法煮取以去魚不用每服藥四錢入魚汁一匙半姜七片陳皮少許煎七分去滓空心服

黃國赤小豆湯治妊娠手脚腫滿坐急

赤小豆 黃陸乾各等分

右為劉散每一兩水一椀煎至七分去滓清服

腎黃湯治妊娠腰脚腫痛

茯苓 白木略四 乾姜炮 甘草略一 杏仁去皮炙

右為劉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食煎服

滑胎例

凡懷妊已滿十月形體成就神識咸備分氣趨產宜服滑胎湯藥

枳殼散瘦胎易產胡陽公主服効

枳殼剉碎 甘草二兩

右為末每服一錢空心佛湯點服至七月方可服臨月忌登高廁

榆白皮散治臨產預服滑胎

榆白皮 槐枝 嬰麥 木通 大麻仁各等分

右為判散每服五大錢水二匙煎七分去滓日二服
產難證治

婦人懷憂无諭難產頃刻之間便至大害故以陣面健兒為比下亦危矣凡欲生產勿不得喧鬧選一年高性善老娘并純謹家人扶持不可揮霍致令產婦憂恐如腹中痛甚且令扶行或痛多陣眼中出火方是兒轉至行不得方好上層產自有時痛不甚者名曰弄痛須且熟忍時至自產莫妄費力定是難產切忌使孝穢汙家人來產訖亦不可見恐傷子須依產書方位无致觸犯禁忌為佳產畜見太醫局方

〔羅漢湯〕治產婦陣暎難產經三兩日不生或胎死腹中或產母氣之安頓產道乾澀燒艾真陣痛破水便可投之

蒼朮一两 桔梗一两 陳皮六分 白芷
桂心 甘草各三分 當歸 川烏頭各一分

乾姜一分 厚朴製 芍藥 半夏湯洗
茯苓 附子炮去 南星炮各 川芎一分

枳殼炮 南木香一分 杏仁炒去 阿膠炙
右為末每一大錢溫酒下查梳悶用煎滾水調白蜜服

〔催生及難產橫逆〕

水銀二分 黑鉛一分
右用熟絹巾紐出水銀細研以汗衫角紐做丸子莖且

大煖坐草時香水吞一二丸立效仍須敬仰
產科論序

世傳產書甚多千金外臺會皇產玉馬氏王氏崔氏皆有產書巢安世有衛生玉集子母秘錄羊備則備矣但倉卒之間未易歷試惟李師聖序鄭籍中產科經驗保慶集二十一篇凡十八方用之頗刻但其間余論未為至當始用料理簡辨

於諸方之下以備識者非敢好辨也

產科二十一論評

第一論曰此病胎死腹中者何答曰因母患熱病至六七日以後臟腑極熱熏蒸其胎是以致死緣兒身死冷不能自出但服黑神散暖其胎須臾胎氣暖即自出何以知其胎之已死但看產婦舌色青者是其候也

黑神散

桂心

當歸

芍藥

甘草炙

生乾地黄

乾姜

烏梅

黑豆

附子

神效

右為末每服二錢空心溫酒調下法无附子有蒲黃

評曰夫妊娠謂之重身一命係焉將理失宜皆能損胎不特病薰者所致或因頓仆驚恐出入胸膈及素有癥瘕積聚壞胎最多候其舌青即知子死養胎論云面青舌赤亦母死之生

唇青吐涎子母俱斃又有双懷二胎或一死一活其候之難

知自非臨歧觀變未易預述不可不備也然以黑神散溫

胎未若補助產母使其氣正免致虛乏困頓胎自下矣催生

湯殊勝黑神散

治胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澀方見產難門

第二論曰難產者何答曰胎側有成形塊為兒枕子欲生時

枕破與敗血裹其子故難產但服勝金散逐其敗血即自生

若逆生橫生並皆治之

勝金散

麝香一另

雄黃

今紅急以乳提研細

右為末取秤一另燒紅以酒淬之調下一錢

評曰產難不只胎側有塊枕破與敗血裹凝隨其胎息因緣自有難易其如橫逆多因坐草太早努力過多兒轉未速或

已破水其血必乾致胎難轉若先露胎謂之逆先露手謂之橫法當以微針刺之使自縮入即服神應黑散以固其血必自轉生養生方云君皇之間兩命所係不可不廣傳蓋養黑散之功也或以菹塗兒脚底抓搔之

神應黑散 治產後血暈生逆生難產

百草霜

香白芷 各等分

右為細末每服二錢童子小便好醋各一茶脚許調勻更以沸湯浸四五分服止一服見功甚者再服已分免矣一名烏金散

第二論曰胎衣不下者何答曰母生子訖血流入衣中衣為血所脹見故不得下治之稍緩脹滿腹中以次上衝心曾疼痛喘急者但服奪命丹以逐去衣中之血血散脹消胎衣自下而无所患更有牛膝湯用之其效錄以附行

奪命丹

附子 半兩

牡丹皮 一兩

乾漆 一分

右為末醋醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥梧子大溫酒下五七丸不以時服

牛膝酒浸 產後血暈者何答曰產後血暈氣虛未得安靜血中不得出

牛膝酒浸

霍麥粉 四兩

滑石 八兩

當歸酒浸

木通 略

葵子 五兩

右為判散每服三錢水兩盞煎七分去滓不以時服

第四論曰產後血暈者何答曰產後血暈氣虛未得安靜血隨氣上逆亂心袖故眼前生花極其甚者令人悶絕不知入口噤神昏氣絕醫者不識呼為暗風若作此治之病必難愈但服清魄散自差

服清魄散自差

清魂散

澤蘭葉一分 人參一分 荆芥穗一兩 川芎半兩

右為末溫酒執湯各半盞調一錢急灌之下啣即開眼
氣定省人事

評曰產後眩暈頃刻害人須量虛實為治若胃中宿有痰飲
阻病不除產後多致眩暈又血盛氣弱氣不使血逆而上攻
此等皆非清魂可療痰暈仍用半夏茯苓湯血壅須用牡丹
散但駛藥尤難輕用當識輕重所謂擾乎可擾二亦无擾若
氣血平人因去血多致暈者宜窮湯尤佳

治產後血暈

治產後血暈悶絕狼狽若口噤則拗開灌之必效

牡丹皮 大黃 芒硝 冬瓜子 杏仁

右為剉散每服五錢水三盞煎至盡去滓入芒硝又

煎分二服欲產先煎下以備緩急金匱以此治腸癰但
分兩少異

方見眩暈門

第五論曰產後口乾痞悶者何答曰產後茶衛大虛血氣未
定食麪太厚胃不能消化麪毒結聚於胃脘上薰膈中是以
口乾燥渴心下痞悶醫者不識認為胃膈壅滯以藥下之乃
不待一但服見現圓

見現圓

姜黃 京三稜 蘇澄茄 陳皮

人參 高良姜 蓬大

右為末用羅百慢火煮爛研細將汁煮麪糊丸如梧子
大用羅百湯下二十九

評曰產後口乾痞悶未必止因食麪或產母內積憂煩外傷

燥熱飲食甘辛使口乾唇悶當隨其所因調之可也煩心宜
四物湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱看傷何經當隨
經爲治難以條條飲食所傷見現圓却能效

四物湯 方見下第六論

第六論曰產後下寒下熱者何答曰陰陽不和敗血不散能
令下寒下熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則下寒陽勝則
下熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞臟腑血弱不得宣越
故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人若誤作瘧疾
治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹
又問二者何以別之答曰時有刺痛者敗血但寒熱无它證
者陰陽不和增損四物湯不一皆隨病加減

增損四物湯

當歸

人參

芍藥

川芎

乾姜

炮

甘草 炙四分

右劉散每服四錢水一盞姜三片煎六分去滓熱服不
以時候

評曰下寒下熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止入
脾肺二臟耶大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故
熱只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與
衛氣解則休遇又會而復作大調經散五積散入醋煎

大明

治產後血虛惡露未消氣爲敗濁凝滯榮衛不調

陰陽相乘滯滯致熱或自汗或腫滿皆氣血未平之所爲也

大日

妙法

茯神 一两

真琥珀 一分

右爲末濃煎烏豆紫蘇湯調下

產後

方見傷氣太陰經入關前妙

第七論曰產後四肢浮腫者何答曰產後敗血乘虛停積於

五臟循經流入四肢留滯日深却還不得腐壞如水故令四肢面目浮腫醫人不識便作小氣治之凡治水氣多用導水藥如虛入大產後所虛又以藥虛之是謂重虛往二因致天枉也服調經散血行腫消即愈

調經散

沒藥別明 琥珀別明 桂心 赤芍藥

當歸各 細辛 麝香各半分

右為末每服半錢上生姜汁溫酒各少許調勻服

產後浮腫多端有自懷妊腫至產後不退者亦有產後失於將理外感寒暑風濕內作喜怒憂怒驚血與氣將滯經絡氣分血分不可不辨要當隨所因脈證治之宜得其法調經散治血分固効但力淺難進不若吳茱萸湯枳朮湯奪魂散大調經散比自要藥也

治婦人臍氣本虛消快風冷胃弱滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食少身由虛浮惡寒戰慄或泄利不止

少氣羸困及因生產臍氣暴虛邪冷心勝宿疾轉甚

吳茱萸湯 枳朮 桔梗 乾姜炮 甘草炙

麥門冬去心 半夏湯 防風 細辛

右為麤末每服四錢水 盞半前七分去滓食前煎服

治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實湯 白朮三兩

右剉散每服四錢水盞半前七分去滓溫服腹中軟即

當散也

治婦人產後虛腫喘促利小便則愈

生姜三兩 白朮三兩 半夏七個湯洗

右以生薑汁搜麩裹半夏為七餅子炙佳熟為末熟水調一錢小便利為效

天調經散 最治產後腫痛喘急煩渴小便不利方見第六論
第八論曰產後乍見鬼神者何答曰心主身之血脈因虛傷耗血脈心氣則虛敗血停積上干於心心不受觸遂致心中煩躁臥起不安乍見鬼神言語顛倒醫工不識呼為血邪如此治之必不得愈但服調經散母服加龍腦一錢得睡即安方見第七論每服加龍腦一錢

調經散 第九論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服七珠散

人參

石菖蒲

川芎

生乾地黃各一

細辛一分 防風

朱砂各半兩

右為末每服一錢薄荷湯調下不以時服

第十論曰產後腰痛又瀉痢者何答曰產後腸胃虛弱易侵於未滿月飲冷當風果產蘊留於育膜散於腹脇故腰痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水谷不化洞泄腸鳴或下赤白眩暈腫脹或疰痛不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯服之月拖不旋踵謹之謹之

調中湯

高良姜

當歸

桂心

芍藥

附子炮

川芎各一

甘草炙半兩

右為剉散每服三錢匕水二盞煎至一盞去滓批服

評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之况云飲冷當風何所不去寒熱風濕木屬外因喜怒憂思還從自性况勞逆

飢飽皆能致病若其洞泄可服調中赤白散非此能愈各
隨門類別有正方今錄桃膠散白頭翁湯以備用餘從滯下
門選用之

桃膠散 治產後利下赤白重急後重疔刺疼痛等證

桃膠煨 沉香 蒲黃細隔炒

右為末每服二錢陳米飲調下食前服

白頭翁湯 治產後下利虛極

白頭翁 甘草炙 阿膠略 黃連

藥皮去籠 秦皮去籠皮

右為劉散每服四錢水一盞半煎七分去滓空心服

第十一論曰產後身發痛者何咎曰產後百節開張血脈
流走遇氣弱則絡絡分肉之間血多留滯累月不散則骨節
不利筋脉急引故腰背不得轉側手脚不能動搖身熱頭痛
也若醫以為傷寒治之則汗出而筋脉動搖手足厥冷變生
它病但服越痛散以默除之

越痛散

牛膝酒浸甘草炙 薤白略 當歸 桂心

白朮 黃芪略 獨活半兩 生薑半兩

右劉散每服半兩水五盞煎至二盞去滓食前分二次
熱服

評曰越痛散不特治產後氣弱血滯兼能治太陽經感風頭
疼腰背痛自汗發熱若其感寒傷食憂恐驚怒皆致身疼發
熱頭痛况有辱勞諸證尤甚越痛散皆不能療不若五積散
入醋煎用却不妨

五積散 方見傷寒太陰經

第十一論曰產後大便秘澀者何咎曰產卧水血俱下腸胃

虛竭津液不足是以大便燥澁不通也若過五六日腹中悶脹者此有燥糞在臍間以甘乾澁未能出耳宜服麻仁丸以津潤之若誤以為有熱而投以寒藥則陽消陰長變動百出性命危矣

麻仁丸

麻仁研 枳殼 麸炒 人參 大黃 各等分

右為末蜜丸如梧子大空心溫酒下二十九丸未通又加丸數

評曰產後不得利二者百无一生去血過多藏燥大便秘澁澁則固當滑之大黃似難輕用唯葱涎調臘茶為丸復以葱茶下之必通

阿膠 治產後虛羸大便秘澁

阿膠 炒 散 黍 炒 去 分

右為末蜜丸如梧子大別研滑石為衣溫水下二十九丸 半日來未通又服

第十三論曰產後血崩者何答曰產卽傷耗經脈未得平復而勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因鹹酸不節傷蠱榮衛氣衰血弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急服

固經丸 以止之

艾葉 赤石脂 煨 補骨脂 炒 木賊 各半兩

附子 一个 炮 去 皮 膽

右為末陳米飲和丸梧子大食前溫酒米湯下二十九丸 評曰血崩不是輕病况產後有此是謂重傷然不止鹹酸不節而能致之多因憂驚素怒藏氣不平或產後服斷血藥早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中固經丸似難責効不若大料黃芩窮當歸加芍藥湯候延續以隨證合諸藥治之為得

第十四論曰產後腹脹悶嘔吐不定者何答曰敗血散於脾

胃脾受之不能運化精微而成腹脹胃受之則不得受納水

谷而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥療之病與藥不相干轉更傷動止氣快愈難治但取抵聖湯

抵聖湯

赤芍藥 半夏 陳皮 甘草 枳實 人參

陳皮 甘草

右為劑藥等份二劑用水二碗煎至藥味盡去

第十五論曰產後口鼻逆氣起及鼻衄者何答曰陽明者經脈之海起於鼻中還出俠口六之中左之右右之左產後氣消而致鼻衄不理致血入於諸經却遠不得故令口鼻

黑起及鼻衄此緣產後氣逆也變生此證其疾不可治名胃絕肺敗此證不可治不出方

第十六論曰產後喉中氣急喘者何答曰榮者血也衛者氣也榮行脈中衛行脈外相隨上下謂之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣尤主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡露不挾敗血得數上薰於肺亦令喘急但服奪命丹血去喘息自定

奪命丹 方見前論

評曰產後喘急固可畏若是敗血上薰於肺猶可責効奪命丹若感風寒或因憂怒飲食鹹冷等傷命丹未可均濟此孤陽絕陰乎若榮血暴絕宜大料養命奪命湯亦自可救傷風水宜旋覆花湯性理醫發宜小調經散用桑白皮杏仁煎湯調下傷食宜見現丸五積散

方見胎前

方見胎前

治產後傷風感六喜身熱喘滿成涎壅塞坐臥不安

旋覆花

赤芍藥

半夏麩

前胡

荆芥穗

五味子

甘草炙

茯苓

麻黃去毒

杏仁各等

右為散每服四大錢水一盞半姜五片棗一枚煎七分去滓食前服

大調經散

方見第七論

五寶散

方見傷寒大論卷八

身痛散

方見第五論

第十七論曰產後中風者何答曰產後五七日內強力下床或一月之內傷於房室或擗墜受驚熱發身中或因着艾傷艾傷動勞將得病之初眼口赤或身熱結毒至腰脊筋急強直者不可治此乃人作非能也

評曰調經散治風二足外邪血虛調經散有中之者宜合以人作不可治問者云如何調經散使人止論之雖有如此者若身中風者以蘇合香丸治之強去下床月內房室憂怒者非比中風者其病易治氣火邪治各有法非產後病不暇論也

第十八論曰產後心者何答曰心者血之主人有伏宿寒因產大虛心於血而凝不得消散其氣遂上衝擊於心之絡脉故心身恒以大石者治之定去其血脈溫而絡通心痛自止其誤以為心傷治之則虛極矣其矣心絡寒甚憊心之正經則寒甚真心痛朝發夕死夕發朝死藥不可輕用如此

大黃散湯

乾熟地黃 當歸 獨活 吳茱萸湯

乾姜 芍藥 桂心 甘草炙

小甘草 細辛 半兩

右剉散每服半兩用水三大匙煎至一盞去滓微熱服
評曰產後心痛由非產後常病痛或有之九痛未必便是血
痛設是若石蜜湯豈可用熟地黃熟地黃泥血安能去痛此方
本出千金用生乾地黃耳茱萸一升合准五兩乾姜三兩細
辛治陳天在下佳方本一兩却戒作半兩制奇制耦量病淺
深自有品數不可妄意加減然以若石蜜湯治血痛不若失笑
散用之有效

失笑散治心腹疼痛欲死百藥不效服此頓愈

五靈脂 蒲黃 各

右末先用醱醋調二錢熬成膏入水一盞煎七八分食前

熱服

第十九論曰產後熱悶氣上轉為喘氣苦何也合曰產時血虛
生逆接以春夏取涼過多地之氣逆因足履後之所以者而為
脚氣其狀熱悶掣攣驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也可服小
續命湯兩三劑必愈若醫者誤以逐散血藥攻之則血去而
疾益增劇

小續命湯 古醫中國門

評曰脚氣固是常病未聞產後能轉為者往二讀千金見有
產婦多此疾之語便出是證文雖善意可然見矣設是熱悶
氣上如何令服續命湯此藥本主少陽經中風非均治諸經
脚氣要須依脚氣方論陰陽經絡調之此涉專門未易輕論
况非產後要病更不繁引

第二十論曰產後汗出多而變症者何答曰產後血虛肉理不密故多汗因遇風邪搏之則變症也症者口噤不開也強而直如發癲狀搖頭馬鳴身反折頤中一發氣息如絕宜速斡口洋小續命湯稍緩則汗出如兩手拭不及者不可治

續命湯

方見中風門

評曰產後汗出多變症亦令服續命湯此又難信况汗多如何更服麻黃官桂防已黃芩葶藶不若大豆紫湯為佳太醫局方大聖散亦良藥也

大豆紫湯

方見中風門

第二十一論曰產後所下過多虛極生風者何答曰婦人以禁血為主因產血下太多氣元所主唇青肉冷汗出目瞤神昏命在頃刻此但虛極生風也如此則急服濟危上丹若以藥治之則誤矣

濟危上丹

乳香 太陰玄精 五靈脂 硫黃

陳皮 桑上寄生 阿膠炙 卷柏等分

右將上四味同研勻石臼內微火炒勿令焦了又研極細復入餘藥為末用生地黃汁和丸梧子大溫酒或當歸酒下一十九食前服

評曰所下過多傷損虛竭少氣辰青肉冷汗出神昏此皆虛脫證何以謂之生風 是外淫必因感冒中傷絡結然後發動臟腑豈能自生風也虛之說蓋因脉經云浮為風為虛此乃兩病合說在八逆則為風在氣口則為虛後季元識便謂風虛是一病謬滋之甚幸者當知

保慶集二十一論人用况多因証其說仍將得効方附行外有產科諸證併叙于后

三因極一病證方論第十七



