

衛生家寶產科備要

三

卷四二十九葉 卷五十七葉 通四十六葉



衛生家寶產科備要卷第四

鳴鶴齋



產育保慶集方余收產論二十一篇議
論精確無所不究蓋國醫博極方書所
得之妙惜乎有其說而無其方郭君稽
中爲時良醫尤長於治產故其切脉用
藥屢取竒功一日願以所收家方附於諸
論之末遂編爲一集真濟衆之異書也
古人謂爲人子而不學醫者爲不孝則
有方論而不傳於世者其可謂之仁哉

二五五

產方四

大觀三年九月五日濮陽李師聖述

二十一論并增入十八論

李師聖編論郭稽中附方

第一論曰熱疾胎死腹中者何

荅曰因母患熱疾至六七日以後臟腑
熱極薰蒸其胎是以致死緣兒死身冷
不能自出但服黑神散煖其胎須臾胎
氣溫煖即自出何以知其胎之已死但
看產婦舌色青者是其驗黑神散

貳方

黑神散

桂去麤皮不見火剉碎

當歸洗去薑須切焙

芍藥洗剉

甘草炙剉

生乾地黄温湯洗淨剉焙忌冷水

乾薑宜用炒生薑代之 各壹兩

附子半兩炮去皮臍 雄黑豆貳兩小者是炒焦去皮

右為末每服壹錢匕空心温酒調下

蒲黃黑神散此方十八論云產前產後一切疾皆治之

雄黑豆貳兩小者是炒去皮秤

當歸洗去蘆須切焙 并 芍藥洗剉

甘草炙剉 乾薑炮剉

肉桂去皮剉不見火 生乾地黄温湯洗剉焙忌冷水

蒲黃銀石器內微炒令赤或以紙襯銚子內炒紙黃為度 各壹兩

右為末每服貳錢空心温酒調下若

三十已下及生產少婦人不用桂乾

薑入炒生薑紅花代之生薑紅花各

用貳兩經洗者並焙乾

第二論曰胎衣不下者何

荅曰母生子訖血流入衣中衣為血所
脹是故不得下治之稍緩脹滿腹中漸
次上衝心膏疼痛喘急者難治但服奪
命丹以速去衣中之血血散脹消胎衣
自下而無所患

奪命丹

附子半兩

炮

去皮

牡丹皮壹兩

洗

乾漆壹分

搗

碎炒

右為末釀醋壹升大黃末壹兩同熬

產方四

三

成膏和藥如桐子大溫酒下伍茶圓

不以時候

又十論云但服蒲黃黑神散逐去衣中
血即胎下或帶斷亦同

第三論曰難產者何

荅曰胎側有成形塊呼為兒枕子欲生
時枕破與敗血裹其子故難產但服勝
金散逐其敗血即自生成若逆生橫生
並皆主之

第二論後又十論云句脫一八字

麝香壹錢

丸研為末

鹽豉壹兩

用舊青布裹了燒令通紅急以乳搥研為末

右為末取秤搥燒紅以酒淬之調下

藥壹錢已

又十八論云但服蒲黃黑神散解其敗血即自生也或橫生逆生胎衣不下此藥悉治

第四論曰產後血運者何

產方四

四

答曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此治之病必難愈但服清魂散自瘥

清魂散

澤蘭葉

揀淨

人參

去蘆

各壹分

荆芥穗壹兩

照

芎半兩

洗

剉

甘草貳錢

炙剉

勝金散

麝香壹錢

先研為末

鹽豉壹兩

用舊青布裹了燒令通紅急以乳搥研為末

右為末取秤搥燒紅以酒淬之調下

藥壹錢匕

又十八論云但服蒲黃黑神散解其敗血即自生也或橫生逆生胎衣不下此藥悉治

第四論曰產後血運者何

產方四

四

答曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此治之病必難愈但服清魂散自瘥

清魂散

澤蘭葉

揀淨

人參

去蘆

各壹分

荆芥穗壹兩

照

芎半兩

洗

甘草貳錢

炙

右為細末每服壹錢匕熱湯溫酒各
小半盞調勻急灌之下咽喉即開眼
氣定省人事

又十八論云但服蒲黃黑神散自瘥
第五論曰產後口乾痞悶者何

荅曰產後宮胃大虛血氣未定食麵太
早胃不能消化麵毒結聚於胃脘上薰
膏中是以口乾煩渴心下痞悶醫者不
識認為膏膈壅滯以藥下之萬不得一

但服見現圓自瘥

見現圓

薑黃

片子剉

荆三稜

煨乘熱斫碎焙乾用

革澄茄

不得用炒

陳皮

去白

高良薑

剉碎炒

人參

去蘆切片

蓬莪茂

煨乘熱斫剉焙乾用

右柒味等分為末用細切蘿蔔慢火
煮令爛研細將汁煮糊元梧桐子大
每服叁拾圓蘿蔔湯下不以時候

見現圓似當作見現
別三稜蓬莪莪弱質非宜

小蒲黃黑神散自瘥

小寒乍熱者何

荅曰陰陽不和敗血不散皆令乍寒乍
熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍
寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱
若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令
血敗不散入於肺則熱入於脾則寒醫
人若誤作瘧疾治之則繆矣陰陽不和
宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹

二九小六

產四

六

文

又問二者何以別之

荅曰時有刺痛者敗血也但寒熱無它
證者陰陽不和也

增損四物湯

當歸

洗去土并
蘆須切焙

芍藥

洗剉

人參

去蘆
切片

川芎

洗剉

各二兩

甘草肆錢

炙

乾薑壹兩

宜用生
薑代之

右為末每服貳錢匕水壹盞益生薑伍
片同煎陸分去滓微熱服不以時候

又十八論云但服蒲黃黑神散自瘥
第六論曰產後乍寒乍熱者何

荅曰陰陽不和敗血不散皆令乍寒乍
熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍
寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱
若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令
血敗不散入於肺則熱入於脾則寒醫
人若誤作瘧疾治之則繆矣陰陽不和
宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹
又問二者何以別之
荅曰時有刺痛者敗血也但寒熱無它
證者陰陽不和也

增損四物湯

當歸

洗去土并
蘆須切焙

芍藥

洗剉

人參

去蘆
切片

川芎

洗剉

各半兩

甘草肆錢

炙

乾薑壹兩

宜用生
薑代之

右為末每服貳錢匕水壹盞盞生薑伍
片同煎陸分去滓微熱服不以時候

奪命丹見第二論

又十八論云但服蒲黃黑神散自瘥

第七論曰產後四肢虛腫者何

荅曰產後敗血乘虛停積於五臟循經流入於四肢留滯淫日深却還不得腐壞如水故令四肢面目浮腫醫人不識便作水氣治之血氣與水氣不同凡治水氣多用導水藥極虛之夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往因致夭枉但

又論三

產四

七

文

服調經散血行腫消即愈

調經散

沒藥令研

琥珀研 各壹錢

桂去麋皮不見火剉

芍藥赤者洗剉

當歸去蘆須切 各壹錢細辛去葉剉

麝香研 各半錢

右為末每服半錢匕生薑汁溫酒各

少許調勻服之

又十八論云但服蒲黃黑神散後服

藥瀉下惡物自瘥轉藥是黑神圓在第十二論後

第八論曰產後乍見鬼神者何

荅曰心主身之血脉因產傷耗血脉心氣則虛敗血停積上干於心心不受觸遂致心中煩躁卧起不安乍見鬼神言語顛倒醫工不識呼為風邪如此治之必不得愈但服調經散每服加生龍腦壹捻得睡即安方見第七論

二十六十六

產四

文

又十八論云但服蒲黃黑神散自安

第九論曰產後月內不語者何

荅曰人心有七孔三毛產後血虛氣弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服七珍散即瘥

七珍散

人參

去蘆切片

石菖蒲

節密者剉

川芎

洗剉焙

熟乾地黄各壹兩

細辛壹錢去葉 防風去苗

朱砂研 各半兩

右為末每服壹錢薄荷湯調下不以時候

又十八論云但服蒲黃黑神散便安

第十論曰產後腹痛又瀉痢者何

荅曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿

月飲冷當風則寒邪乘虛進襲留於

育膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀

六八五

產四

九

文

所刺流入大腸水穀不化洞泄腸鳴或下赤白腹脇膜脹或走痛不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯取之則禍不旋踵謹之謹之

調中湯

高良薑剉油炒

當歸洗去蘆須切焙

桂去皮剉

白芍藥洗剉

附子炮去皮臍

川芎洗 各壹兩

甘草半兩炙剉

右為麤末每服參錢用水參盞煎至壹盞去滓熱服

又十八論云急服蒲黃黑神散後服調中湯

第十一論曰產後遍身疼痛者何

荅曰產後百節開張血脉流走遇氣弱則經絡肉分之間血多留滯累日不

散則骨節不利筋脉引急故腰背不得轉側手脚不能動搖身熱頭痛若醫以

為傷寒治之則汗出而筋脉動踢手足

厥冷變生他病但服趁痛散以嘿除之

趁痛散

牛膝切酒浸壹宿控乾慢火炒焙乾

當歸去蘆須洗切焙白木劉碎焙乾

黃耆蜜炙劉桂去皮不見火劉

獨活去蘆劉川中者尤佳生薑切各半兩

薤白洗切劉甘草炙劉各壹分

右為麤末每服半兩水伍盞煎至兩

盞去滓執服壹盞次壹盞續後再煖服不拘時候

又十八論云但服蒲黃黑神散即愈

第十二論曰產後大便秘澁者何

荅曰產卧水血俱下腸胃虛竭津液不

足是以大便秘澁不通也若過五六日

腹中悶脹者此有燥糞在臟腑以其乾

澁未能出耳宜服麻仁圓以津潤之若

誤以為有熱而投之以寒藥則陽消陰

長變動百出性命危矣

十九

產卷四

十一

胡

麻仁圓

麻仁

研碎

枳殼

去穰剉麩炒微黃

人參

去蘆切片

大黃

煨剉

各半兩

右為末煉蜜圓桐子大空心溫湯下

貳拾圓未通加圓數

又十八論云產後小便出血大便澁痛

者何

荅曰敗血流入大小腸大小腸澁滯致

小便澁塞大便艱難人多不識作五淋治之不愈但服蒲黃黑神散後服黑神圓取下惡物即安

八黑神圓

巴豆

去皮以水貳枚煮盡為度去心膜細研去油

黑附子

炮去皮臍切片 肉桂 去皮不見火剉

白乾薑

炮剉 各半兩

右為末麵糊圓如蘿蔔子大每服參圓至伍圓熱茶下再以熱茶投之即

行前第七論中云轉藥者即是此方切不可服尋常取積藥

第十三論曰產後血崩者何

答曰產卧傷耗經脉未得平復而勞役損動致血暴崩下淋瀝不止或因鹹酸不節傷蠹榮衛氣衰血弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急服固經圓以止之

八固經圓

艾葉揀淨剉

示二脂

既宜固經固矣豈宜轉藥

去根

各半兩

附子壹枚炮去皮臍切片

右為末陳米飲和圓桐子大食前温酒下貳拾圓米飲亦得如陳米飲難圓即入雪糕少許搜和即易圓也

又十八論云但服蒲黃黑神散及黑神圓立瘥

第十四論曰產後腹脹悶滿嘔吐不定者何

荅曰敗血散於脾胃脾受之不能運化精微而成腹脹胃受之則不得受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥療之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治但服巨勝湯必瘥

巨勝湯

赤芍藥洗剉

半夏湯洗七次切片

澤蘭葉洗燉

人參去蘆切片

艾葉

揀淨剉碎炒黃

赤石脂

補骨脂

香略炒

木賊

去根節

各半兩

附子壹枚

炮去皮臍切片

右為末陳米飲和圓桐子大食前溫酒下貳拾圓米飲亦得如陳米飲難圓即入雪糕少許搜和即易圓也

又十八論云但服蒲黃黑神散及黑神圓立瘥

第十四論曰產後腹脹悶滿嘔吐不定者何

荅曰敗血散於脾胃脾受之不能運化精微而成腹脹胃受之則不得受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥療之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治但服巨勝湯必瘥

巨勝湯

赤芍藥

洗剉

半夏

湯洗七次切碎

澤蘭葉

洗燉

人參

去蘆切片

陳皮 去白

甘草 炙剉

各壹錢

生薑半兩

右爲麤末用水壹椀同煎至兩盞去滓微熱分叁服

又十八論云急服蒲黃黑神散次服黑神圓吐出惡物即安

第十五論曰產後口鼻黑氣起及鼻衄者何

荅曰陽明者經脉之海起於鼻交額中

二十九

五方四

十四

从

還出決口交人中左之右右之左產後氣消血散榮衛不理散亂入於諸經却還不得故令口鼻黑起及變鼻衄此緣產後虛熱變生此疾其疾不可治名曰胃絕肺敗遇有此疾急取緋線壹條并產婦頂心髮兩條繫兩中指上節即止無藥可療亦厭禳之一端也

又十八論曰產後口鼻黑氣起者何

荅曰產後敗血入臟腑既滿衝於頭目

却還不得口乾舌焦鼻衄黑氣是產後
熱變作此候不可治也名曰敗肺

第十六論曰產後喉中氣急喘者何

荅曰榮者血也衛者氣也榮行脉中衛
行脉外相隨上下謂之榮衛因產所下
過多榮血暴竭衛氣無所主獨聚於肺
中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若
惡露不快敗血停凝上薰於肺亦令喘
急如此但服奪命丹血去喘息自止奪

產四

十五

命丹方見第二論

又十八論曰產後喉中氣急喘者何
荅曰產後敗血過於心轉於喉中此不
可治也

第十七論曰產後中風者何

荅曰產後五七日內強力下床或壹月
之內百日之中傷於房室或懷憂發怒
擾蕩冲和或因灼艾傷動臟腑得病之
初眼澁口噤肌肉攣搐以漸腰脊筋急

強直者不可治此乃人作非偶爾中風所得也

第十八論曰產後心痛者何

荅曰心者血之主人有伏宿寒因產大虛寒搏於血血凝不得消散其氣逆上衝擊於心之絡脉故心痛但以大巖蜜湯治之寒去則血脉温而經絡通心痛自止若誤以為有所傷療之則虛極寒益甚矣心絡寒甚傳心之正經則變為真心痛真心痛者朝發夕死夕發朝死藥不可輕用如此

大巖蜜湯方

熟乾地黄

洗酒浸壹宿焙剉用

當歸

洗去蘆須切焙

吳茱萸

揀去枝梗

獨活

洗蜀中者尤佳

芍藥

洗剉

乾薑

炮剉

甘草

炙剉

桂

去皮不見火剉

小草

遠志葉

冬壹兩

細辛半兩

去葉馬蹄香勿用

右為麤末每服半兩用水參大盞煎壹盞去滓再入蜜壹匙又同煎參兩沸微熱服食前

第十九論曰產後熱悶氣上轉為脚氣者何

荅曰產卧血虛生熱復因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之所以着而為脚氣之疾其狀熱悶制手癢驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也服小續命湯兩參劑必愈若醫者誤以逐敗血藥攻之則血去而疾益增劇

小續命湯

方五七四

方四

十七

人參去蘆切片

黃芩尖如錐者

桂去麤皮不見火

麻黃去節

防已剉碎

川芎洗剉

芍藥洗

甘草炙

白朮剉 各壹兩 附子壹箇去臍

防風壹兩半去苗 生薑伍兩洗去文切

右爲麤散每服半兩用水參大盞煎
至壹盞去滓溫服

第二十論產後汗出多而變瘧風者何
荅曰產後血虛肉理不密故多汗因遇
風邪搏之則變瘧風也瘧者口噤不開
背強而直如發癎狀搖頭馬鳴身反折
須臾十發氣息如絕宜速斡口灌小續
命湯稍緩即汗出如兩手拭不及者不
可治此方不特治產婦凡男女偶中此

二〇二五

產方四

十八

疾急以此藥灌之無不愈也或服它藥
則不及矣
第二十一論曰產後所下過多虛極生風
者何

荅曰婦人以榮血爲主因產血下太多
氣無所主唇青肉冷汗出目瞑神昏命
在須臾此但虛極生風也如此急服濟
危上丹神良以風藥治之則誤矣

濟危上丹

乳香

以竹葉盛又以竹葉覆上
熨斗略熨過即研成末

五苓脂

不夾石
者研

硫黃

研如
粉

太陰玄精石

研

陳皮

去穢
剉碎

桑寄生

剉

阿膠

剉碎同蛤粉炒泡
起篩去蛤粉用

卷栢

生用

各壹兩

右將上肆味同研勻石器內微用火炒動勿令焦炒了再研極細後入餘藥末用地黃汁打糊圓桐子大產後溫酒下貳拾圓當歸酒亦得

百八十五

產四

九

下

又十八論曰產後血氣逼肺上氣咳嗽多縱睡者何

荅曰產後滿月血脉未通好食熱麵壅結成痰或有氣塊發時衝心心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾背膊痠疼睡夢驚馬狂體虛無力時有汗出心痛月候不來名曰敗癥腹痛遶臍面色微赤因此不療縱然得較三兩日又發急服黑神散立愈

論臨月將息

凡產婦合要備急湯藥並須預先修合題號恐臨時倉卒難致臨月忌勿多飲酒即依產圖方位擇深靜房室入月一日即用借地法於房內北壁薰令香潔

論新生小兒

凡新生小兒急以綿裹指頭拭兒口中惡物不爾流入腹中後生諸疾斷臍可長參寸臍中若有蟲急撥去恐入腹內

細了取生甘草寸餘搥碎水壹合煎濃汁以綿包子點兒口中當吐出惡汁盡半合無妨又取細研朱砂末壹字許以熟蜜調置兒口中令嘔之去驚邪參日湯煎虎頭骨少許豬膽汁少許和湯浴兒少驚無瘡令無惡疾每日頻就無風明處看兒上腭若有壹點白泡如竹膜起處速以指甲刮破更生更去之除灸臍帶外則勿加火艾恐成驚癇若有冷

熱夜啼臍瘡不乾變蒸諸疾自別有方
治之今錄廬江劉寶助教經効小兒名
方肆道

注唇膏治初生孩兒衆疾療胎風病

朱砂 研細 坯子 臘脂 各壹錢

白殭蚕 茱萸 炒去
絲

牛黃半錢 研 蝎梢半箇

右白殭蚕蝎梢用薄荷汁壹合重湯
煮汁盡為度焙乾為細末研入坯子

朱砂等生蜜和為膏逐日頻與孩兒

注唇令自嘔嚥取効

豆蔻散治小兒夏月滑瀉冷痢不已
腹痛瘦瘁食下即噁

肉豆蔻壹箇用餠餅麵壹塊如杏
大果豆蔻灰火中煨不住攪轉候
色赤透熟取出剉焙乾

右為細末每服半大錢茶搗歲至拾
歲者壹錢用溫米飲調下日叁服一

兩日間愈

○ 蝎梢散治小兒胎風及百晬孩兒臍風撮口無能救療者先用生腦子壹字填入臍心上用艾炷灸壹朶壯如不覺灸貳朶壯再添腦子大妙候定服蝎梢散

蝎梢肆拾玖箇用薄荷葉逐箇捲以絲扎定於砂銚中衮轉炒令薄荷乾蘇爲度

白殭蚕肆拾玖箇生薑汁浸炒乾去紫

右貳味爲末入生腦子抄半錢麝香少許研勻用紫色雄鷄肝煎湯調下末半錢許併叁兩服愈

○ 治小兒諸般勦喘疾

烏雞卵壹箇

輕粉少許

右將雞卵於尖小壹頭打小穴子入輕粉在內用杖子攪轉令勻坐雞卵

於飯上蒸熟訖將與患者小兒喫只壹枚取効

累用經効方 隆興府學諭張世臣方

大聖澤蘭散治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血衝心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾生下便得無恙并治胎墮腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣不下血運血癖血滯血崩血入四肢應血臟有患及諸種風氣或傷寒吐噦咳嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡氣胎臟虛冷數曾墮胎崩中不止因此成疾及室女經脉不通並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏色退風冷消除萬病兼療五勞七傷虛損等病

澤蘭葉

去根曬乾

石膏

研

各貳兩

生乾地黄壹兩半

到用溫湯浴過浪乾焙用

桂肉壹兩壹分

到不見火用

三十三

產四

二十三

吳茱萸

湯洗七次炒

厚朴

去蘆皮剉碎用

白茯苓

去皮剉焙

春栝

去根剉

細辛

去苗并葉焙

栝子仁

揀去殼別研細

防風

去苗剉

桔梗

去蘆剉焙

白燕莖

各壹兩

白朮

切片焙

白芷

去稍剉

丹參

洗剉焙

乾薑

炮烈剉焙

五味子

去枝梗剉

藁本

去蘆頭洗

人參

去蘆頭切

川烏頭

炮去皮臍

川椒

去目及閉口者微炒出汗

三三九

產四

二十四

十

黃耆

剉去蘆頭

各叁分

阿膠

剉碎蛤粉炒泡起去粉用

白薇

剉焙

各半兩

當歸

去蘆須洗切片焙乾

白芍藥

剉

甘草

炙剉

川芎各壹兩叁分

右為細末每服貳錢空心臨卧熱酒

調下若急疾有患不拘時候

奪命褐散子姪娘四五月己上忽然

仆地手足抽掣咽中涎聲衮衮口眼不

開如小兒瘈瘲之狀名曰胎癇

甜葶藶

紙上微炒

芫花

醋煮乾焙燥

各半兩

郁李仁

湯浸去皮

地榆

剉 各壹分

右為細末每服壹字煎沉香人參鈞藤鈎子防風湯調下如牙噤者用物斡開灌下調藥汁不過壹匙不拘時候沉香但磨藥汁尤妙如醒時只用防風煎湯調四君子湯服蘇合香圓及大聖澤蘭散半月餘其病脫然恐目昏不能視物不必疑慮氣血凝靜

三四六

產四

二十五

下

自然光明謹勿服眼藥有三四婦人皆患此證寸口脉伏自關而下脉弦蓋伏者氣不上外弦者有飲在內此必因胎肥流飲不化注入胎宮與血相搏子不安靜故氣不上升乃胎觸心絡遂有胎癩之證先是醫者用安胎養血之藥未効遂以此藥緣此證雖是產前之疾却當作產後治療迺是血不循經氣不升降氣閉血壅其

狀如癩當導氣而逐其飲氣通飲消
則血循經入養胎安氣則子安靜矣
累用經驗

地榆降血飲子治妊娠入月臨草之
時血出三日而子未下手足不收昏瞶
如醉不省人事此迺漏血過多血不養
胎心氣逆上胎氣留連此名胎乾此藥
治之神効甚速

蘇子降氣湯壹貼

乃捌味者是

只作壹

一六一

卷四

六

十

服加地榆壹錢半洗淨麥門冬拾
粒去心水壹盞半生薑貳片煎茶
分去滓入乳香少許透明者鎔開
溫服不能自飲者扶起灌之

大安胎飲子治妊娠胎氣不安腹脇
刺痛經脉適來氣急上喘等疾

當歸

洗去蘆須切片焙乾

乾地黄

剉洗浪乾再焙用

川芎

洗剉

赤芍藥

剉

地榆

各壹兩

阿膠

剉碎蛤粉炒起去粉用

熟艾各半兩

黃芩壹分

剉

右為麤末分作拾伍服每服水貳盞煎至陸分去滓通口服不拘時候

吳白朮散安胎養氣常服十月中胎氣安定無諸疾苦

白朮

去蘆切片子焙

人參

去蘆切片子焙

白茯苓

去黑皮剉焙

甘草

炙剉

阿膠

剉碎蛤粉炒起去粉用

已上各等分

右為呔咀每服參大錢水壹盞半煎

千金小田

卷四

二十七

文

至柒分去滓溫服不拘時候

一滑胎榆白皮為細末每服壹錢空心

白湯調下自入月每日參服令易產

兒生下藥皆塗身上

一催生并死胎不下草麻子參箇巴豆

肆箇研細入麝香少許貼臍心上須

史間便下

一難產參兩日不生以蚕種紙半張燒

灰熟水調下

係已出蚕種紙亦名馬明脫

一治橫生逆生灸產婦右腳小指尖頭
如麥大參壯立產

又方蛇退皮燒灰酒調貳錢面東服
又方鹽塗兒足底急去之

又方車前子末酒服貳錢

一姪娘煩悶胎熱睡卧不得并腹中痛
及難產知母新白者焙乾爲末煉蜜
圓如小彈子大每服壹圓温酒化下
一姪娘偶因所觸或墜高傷折致胎動

下三八

產四

二十八

文

不安腹中痛不可忍者縮砂不以多
少和皮炒令熱透去皮爲細末每服
貳錢熱酒調下胎即安神効

一胎動日夜叫呼口噤唇青及下痢不
止者熟艾壹兩酒伍盞煮肆盞去滓
再煎至貳盞服口閉者灌之亦治腰
痛下血

一胎動及下血心腹脹者當歸貳兩川
芎壹兩爲籠末水肆盞酒伍盞煎至

伍盞分參服若胎未死即安已死即便下

一產後血暈五靈脂炒令煙盡爲細末溫酒調下壹錢童子小便尤佳

又方乾荷葉爲細末每服壹錢溫酒調下

又方生半夏爲末壹大豆許吹鼻中又方紅花或蘇枋木酒水濃煮汁飲一產後中風眼上視四肢搐搦荆芥穗

二十九

產

二十九

文

爲末每服貳錢溫酒調下如不飲酒只濃煎湯服

一產後發狂每用大香附子去鬚皮淨爲細末每用貳錢入研極細好辰砂末壹錢以燒通紅秤搥侵好酒調服一產前傷寒不問陰陽身熱頭疼白朮貳錢黃芩壹錢鹿末水壹盞煎陸分去滓熱服不計時候

衛生家寶產科備要卷第四

衛生家寶產科備要卷第五

產科雜方



催生如聖散此壹方廬江劉寶助教
經効名方

黃蜀葵花不拘多少

右壹味焙乾為細末每服貳錢熟湯
放溫調下神妙或有漏血胎臟乾澁
難產痛劇者併進參服良久腹中氣
寬胎滑即時產下如無花只用黃蜀
葵子爛研小半合以酒調濾去滓溫
飲尤佳

救生散安胎益氣易產

人參

去蘆切片

訶子

濕紙裹煨熟去核

白朮

剉炒黃

陳橘皮

去白炒

大麥蘖

炒黃

神麴

細剉炒黃色

各半兩

右為細末每服貳錢水壹盞煎陸分
溫服入月加壹倍用水貳盞煎壹盞
溫溫空心服之能令兒緊小乳母無慮

○單胎散治婦人妊娠傷寒遍身大熱
悶亂躁渴痰甚則蒸損胎臟廬江劉寶
助教名方

捲荷葉壹兩

嫩者焙
乾者秤

蚌粉花半兩

好細白
者秤

右為細末入粉研勻每服貳錢以新
汲水用蜜調下日進兩服

○二聖散產前安胎產後治惡血不盡及
胎衣不下

羌活

洗去
苗剉

川芎

洗剉

右等分為細末每服貳大錢酒少許
水柒分煎柒沸溫服

○羌活散治妊娠患時疾

羌活

去苗
剉碎

荆芥穗

不見
火熬

赤茯苓

去皮
剉碎

川芎

洗剉
焙

宣州乾葛

剉焙

陳皮

去穰
剉

甘草

炙剉

川升麻

剉各壹兩

右為細末每服參錢水壹盞半入生

薑伍片薄荷拾葉同煎至壹盞稍熱服不以時候

黃金散治姙娠患時疾

黃芩

尖如錐者

鬱金

判各壹兩

右為末每服壹錢板藍根地黃水調下汗出効未得汗再服即瘥又用鷄卵墜井至泥隔宿取出吞之必無虞矣
薑粉散纔產服此藥蕩盡兒枕除百病源

三三五五

產方五

三

當歸

洗去蘆須切焙

官桂

去皮不見火

人參

去蘆切片

茯苓

白者去黑皮

甘草

芍藥

洗淨

知母

潤者切炒

川芎

洗

大黃

略炒

黃耆

蜜炙

木香

不見火

草豆蔻

去殼

白朮

剉焙

訶子

煨熟去核

高良薑

剉炒

青橘皮

去穢

熟乾地黄

洗酒浸焙

右除地黄外各等分剉焙乾次用附子壹箇結實半兩者炮裂去皮臍切生薑壹斤研取自然汁於椀器中停留壹食久傾去清汁取下面粉脚攤在蒟葉中入焙籠焙乾同衆藥擣羅爲末纔產後用藥末參錢水壹盞薑參片棗子壹箇擘開同煎至茶分乘熱喫如喫藥之後自然產母睡着半日以來睡覺再服全除却腹痛壹日

產五

四

只可參服至致服不可服恐肚中冷也
香蓮散治產後咳逆

石蓮拾箇

炒熟

丁香拾箇

右爲末用水參合煎拾沸溫服
地黄散治產後血痛如刀刺

熟乾地黄

洗酒浸

橘皮

去白剉焙

右件等分爲末每服壹錢粥飲調下
尋常痛發可常服

香脂散治產後吐逆不止

狗膽壹箇

硃砂

丁香

五靈脂各少許

右爲末以狗膽圓如白豆大每服壹圓生薑水磨下

血竭散治產後百疾廬江劉寶助教名方

血竭

沒藥

剪碎

右等分輕手研細頻羅再研取盡爲度每服貳錢用小便合和細酒半大

九九四一

產方五

五

盞煎壹貳沸溫調下纔產下壹服上床良久再服其惡血自循下行更不衝上免生百疾

產後發熱名曰褥勞用猪腰子作粥治之猪腰子壹隻去白膜薄切作柳葉片子少鹽酒拌之先用粳米壹合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪椀底用熱粥蓋之如作盞生粥狀喫之每日空心做喫極妙

十八論中治產前後患蒲黃黑神
散功效

第一產因熱疾胎死腹中胎死身即冷
口角沫出爪甲青黑色四肢逆冷但
服此藥煖其死胎須臾自出

第二難產或橫生逆生胎衣不下此藥
並治

第三產後衣不下但服此藥逐出衣中
血遂自出如衣帶斷亦同

三

產五

六

下

第四血暈醫人不識呼為暗風但服此
藥立瘥

第五口乾心悶醫人呼為膏膈不利此
名血結但服此藥立瘥

第六乍寒乍熱醫人不識呼為瘥疾但
服此藥立瘥

第七產後四肢虛腫醫人不識呼為水
氣蓋血氣隔四肢寒但先服此藥立
瘥後服轉藥瀉了惡物轉藥謂之黑

神圓

第八產後乍見神鬼醫人不識呼為風邪但服此藥即瘥

第九產後月內不語但服此藥即瘥

第十產後腹痛兼瀉痢急服此藥後服

調中湯

調中湯是止瀉石
灰散出產乳經中

第十一產後遍身疼痛但服此藥瘥

第十二產後小便出血大便祕澀人多

作五淋治不愈但服此藥瘥

三十一

產五

七

下

第十三產後血崩謂惡露未盡久不治之及食鹹酸所致若腹似痛時稍難治肝家熱背筋急急服此藥後服黑

神圓瘥

第十四產後血氣不通上氣喘嗽多睡

謂滿月後月脉未通食熱麵壅結成

疾或有氣塊發時衝心心痛氣急咳

嗽四肢無力乍汗出心痛月候不來

名曰敗癥腹痛逆臍面赤宜服此藥

即瘥

第十五產後心腹脹滿嘔逆不定醫呼
為翻胃不愈急服此藥吐出胃中惡
物即瘥

第十六產後口鼻黑色氣起及鼻衄
不治

第十七產後喉中氣急喘不治

第十八產後中風為無故下床百日之內
傷房室或因著灸有驚臑腑中風之
時眼澁腰背筋急角弓反張牙關閉
定不可治也

產卷五

八

胡

蒲黃黑神散方已見第一論末

黑神圓方已見第十二論末

產前後十八論烏金散

婦人萬病皆因血氣而生就中產後乖
違誠難救療百日之內變證尤多或坐
即運絕卧即口乾經日多言還應心悶
或傷熱食變作崩中飲冷服涼便成腰

痛敗血入腹則脅脹虛鳴惡露上衝乃成嘔逆脾之受血發則傷寒肝氣有邪即多嗔怒肺之被撓氣悶喘麓胃藏未安多爲腹脹敗血流走百節酸疼留滯四肢皮膚俱腫失音不語還因敗血入心散爲淋瀝亦是血之入腹大抵虛弱積血所爲三焦不調衆疾皆起每尋方卷多不會解就中產前產後之圖難全真訣當貧困之輩或居村中念其急難

方當思慮竟勞神悶不知所裁忽見一形兒非常乃言曰余有秘術子其知乎不覺惕然瞻敬之際復曰子請存於誠信心欲救人事當甚喜吾有產後一術名曰烏金方受於子宜保惜之余即跪受要旨頓覺精神爽易事理照覺在寤中神授乃依方修合普諧神願遂成產後十八方如後

第一論問胎死腹中者何

荅曰緣母患染熱疾經六七日間臟腑極熱薰薰其胎是以子死何以知之身死便冷不居子宮乃墜臍下冷痛口角沫出腹冷爪甲青四肢逆冷命在須臾但以此三服令胎熱須臾自下

第二論問產難者何

荅曰兒已成形每食母之血候十月當足月血有餘乃結成塊俗呼爲兒

二十七

產五

十

文

枕子欲生時兒枕先破爲敗血散裹子身上固當難產但服此散三服敗血即散須臾自產或逆產其躰不同悉皆治之

第三論問胎衣不下者何

荅曰產訖敗血流入胞衣中被血脹固當難下但服此散衣中血散須臾自出若胞衣帶斷亦宜服此散即下

第四論問血暈產後三日起止不得眼

前自見鬼神或悶絕不識人者何
荅曰產後三日血氣未安運走五臟
奔於肺上時人不識呼爲暗風以此
治之萬無一瘥但服此藥立可安瘥
第五論問口乾心悶及煩渴者何

荅曰產後七日以來血氣未定蓋爲
食於熱麵與血結在心即渴時人呼
爲心膈壅悶若以此治萬無一瘥但服
此散立瘥

第六論問產後乍寒乍熱及渴者何
荅曰產後虛羸敗血入於肺則熱入
於脾則寒乃渴時人不識呼爲瘧疾
若以此治萬無一瘥服此散立瘥

第七論問產後四肢浮腫及寒熱者何
荅曰敗血流入五臟將滿即四肢停
留日夕却還不得乃欲爲腫時人不
識呼爲水腫且如水腫與血腫不同
何以明之水氣喘而小便澁血氣渴

而四肢寒先服此散次服宣元瀉下惡物自瘥宣元是黑神圓

第八論問言語顛狂無度若見鬼神或寒熱及渴者何

荅曰產後敗血衝心心不受邪觸被敗血薰薰心悶蒸熱煩渴至躁言語顛狂時人不識以為風及神邪所致若以此治之萬無一痊但服此散愈

第九論問產後不語者何

三二四

產五

十二

又

荅曰夫人心有七孔三毛產後敗血上行流入心孔之中被血閉之即使不語時人不先去心孔敗血其病不除但服此藥當漸語也

第十論問產後腹痛及痢者何

荅曰產後未滿月間誤飲冷水水與血相和流入大腸大腸受之血遂成痛水穀不化或泄或脹膿血不定急服此散次服調中湯立効

第十一論問產後遍身疼痛者何

荅曰產後百節開張敗血流入四肢
留滯日久不散結聚虛脹是致疼痛
但服此散逐去百節間敗血須臾自定
第十二論問產後瘀血及小便赤澁大
腸痛者何

荅曰敗血流入小腸閉却水道即小
便艱澁流入大腸閉却肛門是致大
小便俱難醫人不識呼為五淋治之

二二三

產方五

一三

萬無一痊但服此散次服黑神圓聚結

物出其病立愈

或用洪氏方中排膿
內補散依方服立効

第十三論問產後崩中者何

荅曰敗血惡露未止日久或食鹹酸
之物遂變崩中血結變黑狀似鷄肝
或時寒熱背膊拘急煩悶名曰崩中
宜先服此散次服黑神圓即安

第十四論問產後血氣不調道路閉塞
兼咳嗽多驚者何

荅曰產後滿月後月經未還不能謹
忌好食熱麵遂即成疾積聚結塊發
即氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾背
膊拘急煩躁夜夢驚悸體全無力
多汗心疼月經不來名爲血癥腹痛
多睡面色多赤因茲不療遂成骨蒸
治須子細看此疾狀或服別藥十無
一應終不得瘥只服此藥其患自退

第十五論問腹肚脹滿吐逆者何

二七三七

產才五

十四

八

荅曰產後敗血停於脾胃之間氣遂
相衝不定即留滯嘔逆宵脇俱脹時
人不識呼爲蠱胃以此治之萬無一存
急服此藥吐出胃中惡物即便喫粥
第十六論問產後口鼻黑色及鼻衄
者何

荅曰敗血傳入臟腑臟腑既滿衝於
頭面却還不得焦乾白黑見於面色
衝於鼻即鼻衄黑起綠產後虛熱

甚變成此狀若別治之萬不得一此名
心肺敗血宜服此藥

第十七論問產後喘急喉中如猫兒聲
者何

荅曰敗血衝入心肺氣與血併遂結
為塊入於喉中如有此狀急服此藥
第十八論問產後中風兼有黑血點者何
荅曰產後七日內下床衝風百日內傷
房勞或有灸瘡中風取性慢易即中

風也初中之狀氣澁腰痛筋急如角
弓反張牙關緊急若有此狀即是風
邪所入或面色黑遍身赤黑敗血流
入臟腑臟腑皆滿流入皮膚退反不
得變成血點或得此變急服此藥無
有不瘥

宣經圓

巴豆拾伍粒

去皮心膜用生絹袋
子盛以灰汁煮十餘

沸取出研紙
壓油了重研

右件先用烏金散參錢以無灰酒調似糖入瓷瓶中於重湯內熬成膏入巴豆末同和為圓如菜豆大熟水下拾伍圓宣了冷粥補之忌毒物

烏金散

頭髮灰男子者不須洗燒灰

鯉魚鱗燒灰 當歸焙去盡須

延胡索生用 好墨煨過

肉桂不見火去麋皮 麒麟竭

九一三

赤芍藥剉 百草霜是鍋底刮下者煉

右件玖味等分杵羅為末每服貳錢溫酒調下又用童子小便半盞生薑壹塊同煎調下入麝香少許更妙

產前所忌藥物盧醫周鼎集以為歌

玃斑水蛭地膽蟲 烏頭附子配天雄
躑躅野葛螻蛄類 烏喙側子及蝱蟲
牛黃水銀并巴豆 大戟蛇退共蜈蚣
牛膝藜蘆加意忌 金石錫粉對雌雄

牙朴芒硝牡丹桂 蝻蝎飛生更麈蟲
代赭蚱蟬胡粉麝 芫花薇銜草三稜
槐子牽牛并皂角 桃子鱗螬和茅根
樅根硃砂與乾漆 亭長溲疏茵草中
瞿麥藺茹蟹爪甲 蝟皮鬼箭赤頭紅
馬刀石虺蟲衣魚等 半夏天南南通草同
乾薑蒜鷄及鴨子 驢馬兔肉不須供
切忌婦人產前用 此歌宜記在心宵

衛生家寶產科備要卷第五



