

衛生家寶產科備要

五

衛生家秘傳 婦科傳要 卷第七

胎孕方

人參 白朮 白芍 甘草 治婦人經候不來 身如病
而無病 胎動不安 而六部俱勻 必在孕也
精神如故 惡聞食臭 或但嗜一物 或大
吐或嘔 吐清水 此名惡阻 切勿作他疾
治之

白朮 壹兩 人參 半兩 以酒

丁香 壹兩 甘草 壹兩 各壹分

衛生家寶產科備要卷第七

胎孕方

人參白朮散治婦人經候不來身如病而無病脉滑大而六部俱勻必有孕也精神如故惡聞食臭或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作他疾治之

白朮壹兩

去蘆切焙

人參半兩

去蘆切焙

丁香

油者剉碎懷乾

甘草

炙

各壹分

廿九

產卷七

右為末每服參錢水壹盞生薑參片同煎柒分盞去滓溫服食前嘗驗之清晨意味佳自午後漸惡者是有孕無疑也

千金半夏茯苓湯治妊娠惡阻病其證心中憤悶虛煩吐逆惡聞食氣頭眩四肢百節煩疼沉重多卧少起惡寒汗出疲極瘦悴

半夏

湯泡七遍

茯苓

去皮剉碎



熟乾地黄 水略洗熬乾 各壹兩貳錢

橘皮 去白 細辛 去華

人參 去蘆切 白芍藥 剉

旋覆花 揀淨 芎藭 洗剉

桔梗 去蘆 甘草 剉 各捌錢

右拾壹味為麤末每服肆大錢水壹

盞半生薑伍片煎至柒分盞去滓微

熱服 方有隨病加減及相繼合服茯苓圓並見千金本方

枳殼散 妊娠至五月以後能順氣瘦胎

易產

枳殼 剉兩 甘草 肆兩

右為細末湯點貳錢空心晚食前日

兩服入月參服

陳逍遙水酒散能治妊娠百疾安養胎

氣自任陸箇月以後常服至產時草蓐

之間痛當減半

當歸 洗去蘆須 槐角 擇淨

枳殼 去穢 川芎 洗剉

貝母

去心薑汁製
壹宿焙乾

右五味等分為細末每服貳錢水酒各半盞同煎至柒分盞食空時服臨月日進兩參服

檳榔散治姙娠常若肯腹脹滿兩脇

妨悶飲食不下四肢無力頻服能滑胎

益氣

檳榔

剉碎

赤茯苓

剉去皮

前胡

去蘆

各壹兩

三二

差七

三

余

人參

去蘆切
片子焙

白朮

去蘆切
片子焙

芎各半兩

陳皮

去白

枳殼

去穰
麩炒

各叁分

甘草壹分

炙剉

右玳味為細末每服貳錢水壹盞薑

叁片棗子貳箇煎至柒分盞溫服日

兩服

治胎不穩坐卧不得安方

木賊

去節

川芎

洗剉

右貳味等分爲細末每服肆錢水壹盞入金銀同煎至陸分盞去滓空腹溫服日參服取効

六治姙娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍方

縮砂不以多少熨斗中慢火炒令熱透去皮取仁

右爲細末每服貳錢熱酒調下須臾腹中胎動處覺極熱即胎已安

二百七

產十

四

下

六治胎動若胎已死即下未死即安及治血下心腹滿者如湯沃雪方即用聖功川芎湯用大劑酒水各半煎連參服取効本方在後

六千金蟹爪湯治姙娠閃撲僵仆失據胎動轉上搶心甚者血從口出逆不得息或注下血壹斗胎死不出母氣欲絕服此母即安血亦止當產者立下未產者胎再安

蟹爪半盞

以多為佳

甘草

炙剉

桂

去皮剉不見火

各壹兩

阿膠壹兩

剉碎用蚌粉炒炮起篩去蚌粉用

右以東流水拾盞煮前參味至伍盞去滓入阿膠再煮至膠洋盡頓服為佳不能者分減服一時辰間取盡劑已不能飲者斡開口灌之

又方治胎動及難產子死腹中若姪兩子壹子已死壹子尚生服之能

フ七六小四三

五

五

令死者出生者安與前千金蟹爪湯方同唯不用桂耳

葱白湯治姪娠傷寒頭疼發熱不可同常法治之用此藥最穩

大蔥白拾莖

去青連鬚用或小者加至貳叁拾莖切碎

生薑貳兩

切碎

右用水貳碗煮至壹碗去滓分兩叁服熱服之取效快

白朮散治姪娠傷寒

白朮

去蘆切
片子焙

黃芩

剉碎

右等分剉用新瓦上炒香為細末每服參錢水壹盞生薑叁片棗子壹枚同煎至陸分盞熱服唯四肢逆冷陰證見者未可服

治妊娠傷寒大熱甚胎不安者方

阿膠壹兩

洗剉碎以蛤粉末同炒
起篩去粉候冷入碾

右為細末每服貳錢竹瀝調下卒無竹瀝用小麥竹葉同煎湯調亦可

卷二十七

產七

六

十

治妊娠傷寒大熱令胎不落方

竈底黃土為末

右用新水調塗臍下周迴伍陸寸乾即復塗頻頻為之熱退乃止方或用酒及泔清調皆可

治妊娠小便卒不通方

累茶葉壹兩

燒灰研

滑石半兩

研細

右同研勻每服壹貳錢用藹茶清調

入生油貳叁點服只沸湯調亦得

又方

赤連珠甘遂

右為末每服壹字至半錢湯調下

如喫

了藥且不得服有甘草藥半日或壹日緣二藥相反故也

產前方

榆皮滑胎散妊娠入月宜服之多往往坐蓐不覺胎下如未入月不可先服

榆白皮貳兩

切焙

五小語

產七

七

文

右為細末每服貳錢煎糯米飲調下

空心食前服

黑神散催生及治橫逆生服之即順

百草霜

右為細末每服貳錢用米醋童子小便

各少許調成稀膏沸湯侵至陸分盪溫服

催生桂散有三五日不能產者只壹

服再服神驗

官桂

去皮曬乾不得見火

右為細末每服貳平錢沸湯或童子小便調下

治難產或橫倒生或胎死不出母氣欲絕方

半夏湯泡柒 遍焙乾 白欬

右等分為細末每服貳錢酒調下不能酒者湯調小難壹服橫生貳服倒生叁服胎死肆服加瞿麥壹倍充良

又方治應下難產胎衣不下只叁服

十三

產卷七

八

胡

以蛇皮燒過或以銚子炒微黑

右研細入麝香少許用熟湯調通口服之每服壹錢

又方

車前子不以多少

右為細末用熟湯或小便調服貳錢

又方

雲母粉半兩

右以酒調貳錢即產不順者即順下

易產方

當歸壹兩半

去蘆須切片焙

桑寄生半兩

揀淨

川芎壹兩

剉碎

右為麤末每服肆錢水酒各半盞煎至陸分去滓通口服不許時

小琥珀散安胎氣調血脈應是產前產後血氣諸疾俱能療治神効

川芎陸兩

揀顆顆如核桃肉者生剉

川當歸去尖梢蘆頭淨肆兩

好酒浸壹

小六

產七

九

文

宿慢火灸令黃色不得焦候冷切細

桑寄生貳兩

右焙乾搗羅為末每服貳錢水捌分盞煎至陸分却入好酒貳分更煎參兩沸溫服孕婦臨月空心壹服至臥蓐時胎滑易生惡物亦少新血便生臟腑自然不痛

下死胎方

朴消壹兩

右為末每服貳錢溫童子小便調下

嘗因產試之極驗

六下鬼胎方婦人稱孕坐產乃不下有經三五日者乃鬼胎也

蜀椒貳兩去目微炒葱貳握

桃頭枝拾肆枚

右用水壹斗煮熟乘熱傾盆器中令婦人坐上薰蒸之當自散

六治草蓐或產後血暈悶絕兼治魘死卒死溺死縊死等謂之五絕卒中風牙

關緊氣不通用之亦驗

生半夏壹兩

右為細末用壹豆許蘆管吹入鼻竅中即甦

產後方

六牛膝湯治胞衣不出令胞自爛

牛膝酒浸壹宿控乾切碎焙乾瞿麥剉各壹兩

滑石貳兩槌碎當歸叁分去蘆須切片焙

通草壹兩半切葵子貳合半

右陸味用水玖盞煎取參三盞分作參肆服

六當歸建中湯治產後虛羸不足腹中痲痛吸吸短氣或小腹拘急痛引腰背不能飲食凡產後壹月內服參肆劑為善令人丁壯古方云產前安胎四物湯產後補益建中湯者謂此也

當歸貳兩

剉去蘆秤

官桂壹兩半

剉去皮秤

白芍藥叁兩

甘草壹兩

炙

三九

產七

十一

十

右為麤末每服肆錢水壹盞半生薑伍片棗貳箇同煎柒分盞去滓入錫少許再煎微熱服空心食前日叁服如喜嘔人不用入錫

六聖功川芎湯治產後血虛迷悶旋運耳鳴不省人事背膈不快惡心嘔逆化惡血生好血尤治血崩血噤亦治頭疼發熱如傷寒證者治病甚多此產家之要藥也

大芎半兩

當歸壹分

去蘆

右貳味細剉作壹劑用水壹盞半好酒壹盞同煎至壹盞半分貳服如新產血未定及平常飲酒少人但只用水貳盞煎兩箇陸分盞却將童子小便添成兩箇捌分盞服之

琥珀黑神散治產婦十八惡證凡臨產宜進壹貳服能安神順胎產後雖無疾

柒日內亦日進壹貳服能去諸疾厭驚若

九七三三

五五七

偶被驚恐或變證當連服取効

琥珀

別研如

辰砂

別研

各貳錢

麝香

別研

好墨

燒過

白殭蚕

炒

各壹錢

當歸末

鯉魚鱗灰

百草霜

白附子末

黑衣

即竈額上倒掛黑塵無即以蠶衣燒灰代

各叁錢

右拾味研勻每服貳平錢炒生薑酒和童子小便調湯盪溫服如產後崩

中狀似雞肝寒熱閉悶或產後四肢浮腫及寒熱當先服此散次服通宣圓

通宣圓

巴豆壹拾伍粒去心膜生絹袋盛於醃灰汁中煮拾沸取出用紙厚裹壓於重物下出油研成霜却取黑散參錢匕無灰酒調成稀膏入瓷器中於鑊內重湯煮令稠入巴豆霜和令可圓

產七 十三 余

右圓如菉豆大每服伍圓熟水下

有村婦用

毒藥落胎不能下子爛於腹中臍穿時出小此骨病極朱子東遂用此圓下枯骨一具而愈

圓頗難用須審之

八味黑神散治產後百疾唯瀉而加喘者本方不治凡產後雖無疾日進貳服能調血順氣去諸疾服七日止

當歸

去蘆頭酒浸焙乾

白芍藥

剉

乾薑

炮烈剉

桂

去皮不見火剉

熟乾地黄

剉焙

蒲黃

紙襯銚炒香用

甘草對炙各半兩 黑豆壹兩炒

右為細末每服貳錢溫酒米飲童子小便任意調服之

烏金散治產後胞衣不下或惡露不快敗血衝心血運狂語不省人事心煩躁渴臍腹疼痛嘔吐發熱增寒腫滿或攻皮膚刺痛凡產後半月內雖無疾宜日服之有疾加進

黑豆肆兩淨擇黃連半兩去須剉碎

三十四

產七

十四

余

生薑肆兩切作錢子當歸去蘆頭

蓬莪茂對各壹兩

椶皮貳兩撕開

右先下生薑黑豆炒直候薑將乾次下黃連當歸同炒更候豆心透紫色即以椶皮點火入藥鑊中與所炒藥同燃至椶皮成燼即傾淨地上盆覆之少頃取為細末每服貳錢童子小便調下

劉寄奴飲治產後惡露不快敗血上攻
心胃煩躁大渴悶乱眼黑旋運或見鬼
神臍腹疼痛嘔噦惡心不進飲食

劉寄奴貳兩

擇去梗
草秤

當歸壹兩

去蘆頭
切焙

甘草貳錢

炙剉

右為麤末每服貳錢水壹盞半生薑
柴片煎至柴分盡去滓熱服凡治血
暈藥須乘開煎下以備急用

當歸一味散治產後諸疾調養血氣

王子

九四六四

產七

十五

文

亭指迷論言產後不必
服他藥唯此壹散足矣

當歸參兩

去蘆須
切片焙

右為細末每服貳錢童子小便或酒
調下日參服從產下便服之

荆芥一味散治血噤中風等疾取効為
快無疾服之能順氣益血清神

荆芥穗

曬乾不
見火

右為細末每服貳錢童子小便調下
七日後沸湯調以當飲茶甚佳

秤槌酒治產後疾最多尤治兒枕不散作痛

鐵秤槌燒通赤

右淬壹升醇酒中候酒再溫可飲飲之調當歸末服尤効

豆淋紫酒治產後中風身癱直或如角弓反張

黑豆揀緊小者淨篩壹升炒令煙出以好酒叁升浸即漉出豆不用

フセカ

生七

十六

明

右每服壹小盞能飲者加之

產婦勿心患寒熱如傷寒時氣狀切不可用麻黃藥發其汗以亡津液多故也宜服四物湯加桂服之

四物湯方在後

治產後傷寒惡露不行腹脹煩悶欲死方

朴消生

大黃生

右等分爲細末每服貳錢取桃仁去

皮尖及雙仁者碎之濃煎湯調下以通為度樊彥取妻熱病小產後惡露為熱所搏不行苦腹脹煩悶枯竭舌上如生針刺鑿以朴消煎湯令漱口得稍潤用大黃煮醋調服壹大錢得通快而愈與此略同

傷寒產後惡露為熱搏不行煩悶脹喘狂言宜服抵當湯及桃仁承氣湯龐安常用之驗指迷論亦云龐論云若服之十病十瘥

二五

產卷七

十七

胡

桂心牡礪湯治產後頭疼身躰壯熱兼治腹內急痛

桂心壹兩半

略去皮不見火

牡礪

燒通赤

白芍藥

剉碎

熟乾地黄切焙各貳兩半

黃芩壹兩

剉碎

右件剉如麻豆每服抄肆伍大錢水壹盞半煎至柒分盞去滓溫服

增損柴胡湯治產後虛羸發熱飲食不進少腹脹等疾

柴胡

去苗水洗過
控乾剉焙

人參

去蘆切
片子焙

半夏

湯泡七遍
切片子

甘草

炙

白芍藥

剉

陳皮

去白

芎

洗剉

右柒味等分為分麤末每服肆伍錢水

壹盞半生薑伍片東東貳箇煎至柒分

盞去滓溫服日兩參服不拘時

人參散治產後虛羸脾胃怯弱四肢

無力不思飲食心腹氣脹

三五小十八

產七

十八

文

人參

去蘆切
片子焙

黃耆

剉碎用蜜湯拌銚
內慢火炒次微焙

草豆蔻

略煨去
皮剉

附子

炮裂去皮
臍切片子

厚朴

剉去麤皮薑製一宿
取出照焙乾

各半兩

白朮

去蘆切
片子焙

當歸

洗去蘆須
切片子焙

木香

剉懷
乾

川芎

洗剉

白芍藥

剉

桂

去麤皮
不見火

白茯苓

去黑
皮剉

甘草

炙剉
各壹兩

訶子皮

陳橘皮

去白

高良薑

剉碎用
少許炒透

各壹分半

右拾陸味為麤末每服肆錢水壹盞生薑伍片棗子貳枚煎至陸分盞去滓温服

治產後惡露不絕方

牡礪

煨通赤

龜甲

好醋浸炙黃

右等分為細末每服貳錢酒調下

治產後洞泄不禁下青黑惡物神驗

方

泄瀉者惡露必不行蓋血滲入大腸為瀉也分過則愈

荆芥肆伍穗大者烘乾

產七

十九

余

右於乾盞中燒成灰

不得犯油火

入研了麝

香壹米粒許用沸湯壹兩呷調下藥微而能愈大病奇効不可言

治產後下痢赤白膿血方

白芍藥

剉

熟乾地黄

焙切

各貳兩

阿膠

剉用蛤粉末同炒泡起篩去粉

艾葉

揀淨剉碎

當歸

去蘆頭切片子

甘草

剉

各壹兩

右為麤末每服陸錢水貳盞煎至捌分盞去滓温服

若產後大便頻腹疼如痢狀者傷於

食也宜服食藥感應圓為佳他亦可

用產前飲食不着未久而產後亦成痢狀不必推求產後食飲多少也

治吹妳腫硬須急用手忍疼毒揉之可

散不尔當成乳癰宜服此藥

皂莢燒存性 蛤粉

右等分研勻温酒調下半錢未散稍加服藥次仍以手揉之

治吹妳或兒絕妳後腫痛不可忍方

二三七

產七

余

括萋壹箇去皮先取子研破

右以酒漬同熬數沸去滓浸冷酒和令可飲隨量飲之令微醉睡醒痛當頓除去

萬金散治妳癰已破兼治發背腦疽

瓜萋壹箇去皮 生甘草半兩

沒藥壹分令研

右同研用酒致盞石器中熬至參盞分參服疾輕者只壹服効本注云已

救活數百人

八通用四物湯治婦人女子月事或多或少或少或前或後妊娠腹痛胎氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不行凡婦人之疾無不主治本方及加減法如後

當歸

去蘆須
切片焙

川芎

洗剉

熟乾地黄

切焙

雪白芍藥

剉

右等分爲分麤末每服肆錢水壹盞半煎至捌分盞澄取陸分清汁帶熱服

三八三

卷七

三

下

平常產乳服至參臈虛弱人服至壹月。妊娠下血加艾伍柒葉阿膠末抄壹錢此每服也若疾勢重大小料未効當以肆味各半兩細剉不搗以水肆盞煎取貳盞半去滓分肆服壹日之中令盡爲度未効再服隨疾加減用藥。因虛致熱熱與血搏口舌乾渴加括萋壹兩麥門冬參分。腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥各壹分。血崩

加地黃蒲黃各壹兩。因熱生風加
芎壹分柴胡去苗半兩。身熱脉燥
頭昏項強加柴胡去苗并黃芩各半
兩。秘澁加大黃半兩桃仁壹分去皮尖炒
。泄瀉加桂附子壹分。嘔加白朮人
參各半兩。腹脹加厚朴枳實各壹
分。發寒熱加乾薑牡丹皮芍藥各
壹分。虛煩不得眠加竹葉人參各
壹分。煩躁大渴加知母石膏各半
兩。水停心下微吐噎加豬苓茯苓防
已各壹分。虛寒狀類傷寒加人參柴
胡防風各叁分

三四

產七

二十二

下

此活人書加減法也大抵四物湯
為婦女要藥無所不治稍知藥性
者皆可隨病加減治血方未有不
本此湯因而增損以成者近時名
醫有加香附子功用殊勝又有加
蓬莪朮官桂各半兩名六合湯治

經血凝滯潮熱腹中癖塊疼痛尤快皆以意加之也

六追命散治婦女血癥積聚疼痛漸致經候隔絕稍失醫治便成勞瘵又治產婦危惡變證胎死上衝悶運欲絕及產後血運他藥所不能救者又治打撲傷損筋斷骨折及破傷風凡此等疾證候危惡醫工縮手無藥可治此能治之有起死返魂之功雖其人氣已死但心頭

三三小全

產七

三三

文

尚暖者灌之藥下咽可以再生

先用前
半夏吹

鼻法然
後下藥神功異効不可具述

半兩錢肆伍拾文多尤佳

乃古文錢
中上作半

兩字者錢有大小皆
可用錢中常有之

火煨通赤淬釀醋

中不計次數於醋底淘取淬下碎銅末研之麓礪乳鎚者去之別以水淘澄取如粉者紙上滲乾秤貳

錢壹字

煨錢之法取小鐵鎖莖貫錢
入爐生炭擁之候通赤以二

鐵手鉗用一錢出火一鉗夾鎖莖腦倒
錢入醋中鐵物勿着醋恐淬下鐵屑也

再取錢水洗過上鎖莖再煨之如是數
次錢色如銀即無可煨矣本方用銅線
穿煨入火便斷
極費力不可用

巴豆去皮殼心膜秤參錢半用酸漿水

壹盞煮至水欲盡焙乾研如泥

大黃錦紋緊實者取捌錢用小便浸柒日

每日壹換日足濕紙裹煨熟薄切焙乾為末秤取參錢半

羊脛炭即炭中圓細緊實如羊脛骨者取參肆寸却作拾餘段別以着炭同燒通紅淬入醇酒中如是

フ八二小八六

差方七

六四

七遍烘乾為末秤取半兩

右肆味合和搗數千杵乾菴罐子實築臍紙密封收高燥處每壹服壹字至半錢濃煎當歸酒和小便調下消詳之傷折即全用酒多飲不妨若產婦血未定及素飲酒少人即姑少借酒力行藥多以童子小便下之可也此藥累立竒効治者數人皆垂死而復活已折而復續轉以與人所濟又

不知數難產悶絕而復蘇者余今妻
是也故知此藥為最審傳者幸勿疑
其瞑眩蓋不如此則不足以當奔敗
之血且疾勢既危固非平劑之所能
愈也服藥後或如霍亂狀勿恠少選
當自定下利甚者用前燒荆芥法止
之此皆手試而親驗者故併錄以傳

大抵此藥性緊非
大危急不可妄服

此藥難成非素備不

可得也每遇有姪娘將產必合宜料

十四

卷六

廿五

胡

以備用往往常有餘劑藥成或轉
以與親識之喜蓄藥者故此藥所
濟為多陸子正題

婦人免蓐命如垂縷臨時濟急全
藉藥石之功方書所載雖已詳備
倉猝之際非唯泛濫難於檢尋且
莫知其孰為効驗者妄投一藥則
不可復療余得此本皆撮諸家精
要之方累試累驗乃廬倅陸子正

手抄之書也唯親舊間可以傳之他人不可得而見余雖不欲秘藏而傳本未免訛繆其為害豈淺耶今重校證庶幾危急之時閱此方如指諸掌也嘉禾寓菴周澂題

衛生家寶產科備要卷第七



