

永類鈐方

十



永類鈐方卷第十七

醫經圖

一風寒勞冷

公勞

婦人體虛勞而受於冷也風寒乘虛客於經絡則氣血凝滯不能溫於肌膚又於腹內則脾胃氣弱不能消於飲食大腸虛者則更不利入於手臟則胞冷無子搏於前滯壅令經水不利斷絕不通也

參全方澤蘭散婦人風虛勞冷氣寒心腹疼痛肢節拘挛體瘦無力經候不調  
附子炮牛膝川芎桃仁干漆炒琥珀沒藥木香各三分細末每一分溫酒調下

桃仁散婦人冷勞氣滯經脉不通腰脅妙懶羸瘦阻食

木香四分乾姜桃仁人參各半兩陳皮琥珀桂心各二兩赤芍延胡索赤茯苓半斤

當帰白朮各二分㕮咀每空心姜三片水一盞煎空心溫服

木香元婦人冷勞經候不調臟腑氣滯四肢疼痛飲食無味漸加羸瘦

延胡索各三分干姜人參桂心各半兩北柴胡白朮鱉甲醋煮炙

厚朴熟地黃淨陳皮各二兩為末蜜元梧子大每三十元空心溫酒下

熟地黃元婦人冷勞虛損肌體消瘦痿黃無力月候不調少食

干熟地黃鱉甲陳皮各一兩五味子當帰川芎桂心各半兩

卷十七

川牛膝人參白芍白朮附子白茯苓黃芪三分甘草一分

細末蜜元梧子大空心溫酒下二分

黃肝散婦人冷勞脾胃虛寒入腸轉泄水滯化羸瘦不食口內生瘡

北柴胡砂仁蔴蘿草機各一分白朮白芷胡椒白姜人參陳皮

山茵陳蕪荑仁木香紫苑白芍細辛桂心各半兩

細末積猪肝一具去脂膜切如柳葉以新水洗過入葱白三寸細切入藥末半

兩鉢內新水二大盞入鹽醋少許以箋枕令水盡空心以意食之嗽利飲茶

食後足少陰酒一盞為妙晚食前再服

熟勞客熱寒熱寡婦寒熱如瘧熱入血室血風煩悶

婦人心肺壅熱傷於氣血其候神煩躁顛赤頭疼眼澁夜乾壯熱煩渴口舌生瘡脣

沉多臥飲食無味牽体酸疼或心性盜汗肌膚消瘦

天全方黃芪散婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲飲食

人參黃芩當帰各三分北柴胡兩半黃芪地骨皮赤茯苓麥門冬

生地黃赤芍各一兩甘草一分㕮咀四分姜五片水煎溫服無時

半夏散治熱勞煩渴口乾体瘦無力腹疼痛或寒熱痰逆嘔吐不食

蘇甲醋炙北柴胡黃芪各二兩大伏皮三刀甘草一分

粗末每四分姜三片水盞半煎溫服無時

猪肚光澤婦人熱病癩癪

北柴胡 赤芍參 人參 黃芩各兩 黃連兩 地骨皮 水香各半兩

桃仁 納魚甲各兩半 紬豬肚不淨洗入藥蒸爛研膏元倍李益心粥飲下三元

秦艽散治血經有熱月脈凝滯五心煩倦

麥門冬 秦艽各二兩 生地黃 當歸各半兩 地骨皮 鐘金 人蘇木各一分

細末每一分半水盞紅花少許同煎溫服若經脉調不用紅花忌酒及熱物

麥門冬散治婦人客熱者體虛外熱加大桂藏附自生其証上薰蒸甚煩躁四肢疼痛

麥門冬北柴胡 赤芍各一兩 羚羊角屑 赤芍桑白皮 黃芪各三分

生乾地黃 茄草各半兩 㕮咀每四分 姜三片水煎溫服無時

犀角散治証同上 犀角屑 赤芍皮 地骨皮 紅花 甘草各半兩 北柴胡一兩

黃芪散治婦人客熱心壅悶悶肢節煩疼不思飲食

生乾地黃 黃芪各一兩 犀角屑 甘草 小麥子仁 黃芩各半兩 人參 枳殼

各三分 㕮咀每二錢 清竹葉五片水煎溫服無時

地骨皮散治婦人血風氣体虛發歇寒熱如瘡經陰陽不足則先寒后熱陰不足則先熱

後寒陰陽交革虛实不調 北柴胡 地骨皮各一兩 桑白皮 枳壳 前胡 黃芪各

三分 白朮各一兩 加皮 人參 甘草 桂心 白芍各半兩

㕮咀每半兩姜三片水盞半煎溫服無時

卷十

二

生地黃散治血氣不調或時寒熱体痛不食 生地黃 北柴胡各二兩 差活 木香

桔梗 防風各半兩 酸早仁 羚羊角屑 白芍 白朮 黃芪 牛膝 白芍參

當帰 枳殼各三分 㕮咀每三分水一盞 姜三片空心溫服

熙胡散治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲食

桑白皮 赤芍各三分 繫草各二兩 麥門冬三兩 甘草半兩

㕮咀四分 姜三片水盞半煎溫服無時

荆芥散治時氣風寒熱癰瘍往來潮熱

陳皮 麻黃 香附子 甘草各二兩 荆芥穗 厚朴各二兩 草薢仁三个 白芷

桂心各半兩 㕮咀每三分姜三片棗三枚水一盞煎溫服無時

生地黃元治寡婦寒熱如瘡欲男子而不得許李士云有師尼寒熱惡風體倦面

赤心煩或時自汗証之三部無寒邪脉但厥陰肝脉弦長而上魚際宜服抑陰等草

北柴胡 秦艽 黃芩各半兩 生地黃二兩 赤芍一兩

細木香元桔子大烏梅煎湯下三十元

小柴胡湯婦人傷寒發熱經水通斷昏靜夜劇為熱入血室方見活人書加生地

黃又局方血熱湯不用熟地黃只用生地黃加北柴胡等分治証同上家期明

乾姜柴胡湯婦人經血方來初断寒熱如瘡狂言是鬼狀

柴胡四兩 桂枝兩半 桔萎根二兩 牡蛎 千姜 甘草各一兩

喘嗽方水毒半煎溫服初服微噴再服平喘而愈

赤芍藥散血氣不和風邪乘之而生熱心竒煩悶肢節煩疼四肢少不思食

牡丹皮 白茯苓 赤芍 白芷 甘草各二兩 柴胡兩半

細末每二錢 姜三片棗一个水煎溫服食後

酸棗仁湯婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁

酸旱仁 赤芍 當歸 羚羊角屑 赤茯苓 紅花生地黃各三分 防風 茉活

牛膝 麦門冬 桂心 川芎 地骨皮 甘草各半兩

㕮咀每四分 姜三片薄荷少許水煎溫服

當歸散婦人血風潮熱 當歸二兩為藥延胡索 不灰木 黑地黃各一兩

大黃三分蒸桂心半兩 甘草一分

細末每二分水一盞烟脂小角子煎如躁時放冷服細呷清者

草豆蔻散婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不納食

人參一兩 草豆蔻仁 麻裏根 白茯苓 半夏各三分 良姜 白朮 砂仁

枇杷葉去毛炙 桂心 木香 青皮 甘草各半兩

粗末每三分水煎溫服無時

神曲元婦人血風攻脾胃脹脇氣滿不思飲食

白朮 附子炮 制枳壳 調子 桂心 人參 木香 食茱萸泡陳皮各二兩

良姜 白豆蔻仁 丁香各半兩 射香一分

細末酒煮糊元梧子大窓溫酒下三十元

進食散治脾胃虛寒不思不納飲食方中有川烏治血風攻脾不食良驗

青皮 陳皮 粉草 良姜 桂心各一分 川烏炮 草豆蔻仁各三个 調子五個

細末每一分姜三片水一盞煎溫服

### 喉嗽用溫藥

經云微寒為寒甚為腸澼古人立方治嗽未有不本於溫藥如干姜桂心細辛之屬以寒氣入裏非辛甘不能發散又曰熱在上焦因咳為肺痿又寒則為肺瘡虛則為肺痿此人其始或寒足或酒色滋味大過或服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪熱數發熱咳較膿血証亦多矣古人立方亦用溫藥如建中湯之類令人但見發熱咳嗽率用紫胡鱉甲 麦門冬 莖歷等藥不知其非就使難用溫藥亦須審處調治

全方黃芪散治虛中有熱咳嗽膿血口苦舌乾 黃芪四兩 甘草二兩

細末蜜元櫻桃大食後夜卧含化一元

金花元有婦人患肺熱久嗽身如火肌瘦將成肺勞良效

枇杷葉牽牛桑白皮 款冬花 木通 紫菀 杏仁各等分 大黃喊半

制貝母湯治諸嗽久不差 茄子姜汁浸半日 五味子 黃芩 干姜熟蜜水

陳皮各二兩 半夏桑白皮桂心北柴胡枳者加一半各半兩 木香 甘草各等分

粗末每五分水煎半杏仁去皮尖打碎七个姜三片煎熱服

定喘湯又夫婦人遠年日近肺氣咳嗽喘急痰壅宵滿氣逆及寒和咳嗽鼻塞声重

半夏曲炒阿膠炒甘草各錢半 雞頭粟殼制半兩 北五味桑白皮麻黃各節

人參各一分 咬咀每三天分作三片烏梅半个水煎漸溫服食後

橘皮湯治久傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中作苦喘急頭痛

陳皮紫苑麻黃各節制杏仁當歸桂心甘草黃芩各等分

咬咀每半兩水煎熱服

四滿元治五嗽一氣嗽一癰嗽三瓣嗽四邪嗽五冷嗽

蜈蚣二枚炙芫花根五分熬躑躅花炒乾姜川芎桂心各四分

人參

細辛各三分為末煉蜜元梧子大末飲下十元加至十五元忌生葱生菜

喘滿

喘之証治見於鉉方傷寒雜病二門詳矣姑并卒其六略諸臟相乘而喘者宜杏子散感寒伏熱而喘者以華蓋散九室湯若暴寒向火覆蓋過當傷熱肺实而喘促者真狀多有抵拒之洗心散冷水調氣不調痰盛喘促四湯兼官局桔梗湯姜煎涎多而喘宜單繩過橘皮半夏湯若不得卧即喘者東氣乘肺肺沉大宜神秘湯肺之積名息貴在右脅下大如杯塞熱喘咳發瘧痘宜棗膏元上氣喘者神授湯上盛下弱

卷十七

四

喘促薑蘇子降氣湯黑錫丹若尊年而稟賦厚不任熱藥者但秘傳降氣湯分心氣飲有脚氣而喘有骨蒸芳喘又於各門求之有服丹石脉洪實老人服華蓋散得效

大全方神秘湯治水氣乘肺而喘兼治支飲而喘

爭陳皮紫蘇葉人參桑白皮生姜等分咬咀每半兩水煎溫服

杏子散治諸藏相乘喘急 杏仁制麸炒黃細研如膏 麻黃根細末等分

右和煎陳皮湯調下二分無時

千緝湯治痰喘不得卧 齊州半夏七个炮裂四片破之皂角去皮炙一寸

甘草炙一寸生姜如指大右水一椀同煮取半椀服神效

棗膏元治費息 草歷研細陳皮苦梗各等分

許季士云患停飲水積肺經食已必嘔漸喘竟肺系急服之良效

神授湯治上氣喘急不得卧 爭陳皮苦梗紫蘇人參北五味等分

咬咀每四分水一盞煎六分食後服

不可服方見鉉方咳嗽門

風痰 心育嘈雜亦痰証

經云清則運為精華濁則凝為痰飲然有痰涎飲沫種相類又當詳辨因風生痰者當生飲墨香飲青州白元子花茶元因寒冷者宜降氣湯黑錫丹養正散因熱

少金沸草散  
治寒熱虛實之症  
在上以不寐散而在下以擗利又須審其虛實也方見前和劑中

大全旋覆花湯婦人風痰幅逆不下食食頭目昏悶

旋覆花  
川柏葉毛炙川芎  
細辛 霍香 桂心 制枳殼 前胡

人參 茛活 半夏各半兩 甘草 乾羊角屑 赤茯苓各三分

粗末每三錢姜三片水一盞煎溫服

天南星元治風寒心膈壅滯

南星 半夏各二兩

肥皂莢五錢剉

生姜三兩以石器水五升同煮水尽去皂莢生姜只用南星半夏倍乾為末

酒黃芩半夏湯活寒熱頭疼利口

余煩肢節拘痕嗜卧減食五味

紫胡

半夏湯活寒熱頭疼利口

余煩肢節拘痕嗜卧減食五味

柴胡兩半夏三兩半人參 甘草 黃芩 麦門冬各二兩 白朮二兩

咬咀每半兩姜五片裹一个小水盞半煎服

金沸草散傷寒中脘有痰壯熱頭痛筋急寒熱似傷風

荆芥穗兩半夏 甘草 細辛各二兩 赤茯苓二兩 前胡 旋覆花各二兩

細末每三錢姜五片裹一个水煎熱服局方有赤芍麻黃無細辛茯苓

天半夏湯治痰飲及脾胃不和

制半夏 白茯苓 生姜各一分

哎咀作一服每遇膈間有寒痰以水二盞煎一盞卧时溫呷如有熱痰

欲食此胃氣虛冷脉沉遲弦細 旋覆花 細辛 淨陳皮桂心人參 甘草

此以血逆于心而耳此湯治中脘心腹冷痰半噏雜口中清水自出脇肋急脈滿痛不

欲食此胃氣虛冷脉沉遲弦細 旋覆花 細辛 淨陳皮桂心人參 甘草

橘梗 白芍 半夏各半兩 赤茯苓三分咬咀每四錢姜七片水煎溫服

一方高半夏人茯苓湯亦妙治惡阻

### (○) 嘔吐(霍乱)血膈

嘔吐之證治見於四逆、傷寒、雜病嘔吐分列詳矣婦人之證雖同有痰盛而嘔亦有血弱而嘔者食已下咽而復者嘔者水未下咽而出也

(全方益智子散婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐空下食而服無力

益智二兩附子炮砂仁丁香厚朴黃茋 仁术 大苓 淨陳皮 川芎

良姜 霍香葉 當歸各三分 人參 桂心各半兩

㕮咀每錢姜三片裹一个水煎溫服無討

(丁香散婦人藏府虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水谷不消

丁香 白朮 砂仁 草果仁各三分 人參一兩 當歸 白朮桂仁 霍香葉

甘草各半兩 淨陳皮三分 神曲 藥子各半兩

細末熟藥鐵姜棗湯調下

荆芥湯治胃熱衄吐或手足熱方見繫之溫臂

詞子散治老幼霍亂吐利及九種嘔心脾冷痛不可忍

詞子甘草草朴乾姜草梟仁陳皮良姜茯苓神曲麥芽各等分

細末每錢候發刺痛不可忍用小盞煎火鹽服急則鹽點

白芷散婦人翻胃吐食以白芷兩切作片瓦上炒令黃為末用猪血三十文切

片沸湯泡七次將血蘸藥喫七片如餘藥未留後次用

牡丹煎治婦人血膈 牡丹皮苦參貝母志玄胡索白芍等分

細末蜜元桔子大每十五元米飲下無別

○鼻衄吐血

鼻衄吐血見二卷傷寒雜病本門其原本於熱婦多因怒氣而得者座後見衄者不可治有婦人衄不止先用蘇合香元四分用五分散濃煎白茅花湯調即止用玄婦湯調之服丹藥多脉洪數而衄三黃湯而愈

(大金方伏龍肝散男子婦人五藏結熱吐血衄血

伏龍肝生地黃各一斤竹茹一升芍藥當帰黃芩川芎桂心

甘草各兩㕮咀水一斗三分黃竹茹減三升內藥煮取三升分三服半金方無桂

又用葱薑塞鼻或因刺著血不止立住

(雞蘇散婦人吐血煩昏悶 雞蘇葉兩阿膠刺薑生地黃各一兩

卷十七

黃芪羚羊角茜根甘草各半兩麥門冬黃芩當帰伏龍肝各三分

粗末每錢姜三片竹茹半雞子大水煎溫服

(雞蘇散婦人虛損氣逆吐血不止 雞蘇葉黃芩各二兩當帰

赤芍各半兩伏龍肝阿膠各二兩粗末每錢水煎溫服

(四汁飲)婦人熱毒上攻吐血不止 生薑汁刺薑汁生地黃汁各三兩

生姜汁半合白蜜一合和煎三兩沸無時以一小盞調炒麴塵一錢服

(一方生地黃汁調大黃末方寸匕治熱毒吐血

(又方蘇合香元和雞蘇元服治怒氣吐血肝脉弦

(養生必用方云凡吐血須煎乾姜甘草湯或四物理中湯與服此陰乘於陽天

寒地凍宜溫藥乾姜肉桂是也如陽乘於陰血得熱沸溢宜涼藥大黃薑汁止

(四生元治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

生荷葉生艾葉生柏葉生地黃等分爛研元如雞子大每元水煎溫服

(石韋散治小便卒淋瀝 石韋黃芩木通榆白皮葵子瞿麥穗甘草

等分粗末每半兩姜三片水煎空心熱服

(玉液真經細不拘多少研射香白酒調下

(金匱人血淋及尿血澀痛 生乾地黃禹蕡金蒲黃各二兩

細末每服一錢前子藥煎調下蜜劑為度

桃仁前子有血瘕似淋小便不通脇腹脹滿痛方見前血瘕門

火府丹治經熱小便澀及治五淋

生地黃二兩木通 黃芩各一兩 細末蜜一倍子六木通煎湯下三十元

一方加甘草㕮咀煎名導赤散有病渴一飲水引服此三日渴止進食亦熟也

一方治婦人諸般淋苦棗根浴呑為

多取淨洗碎之以一合水五盞煎三盞用

射香乳香調下有患砂石淋十三年每發痛楚不可忍服之一夕愈本草卒

脈治卒中痛又行血

滑石散治男女脬轉不得小便 滑石二兩寒水石二兩葵子一合

阿末水一斗葱五升川附服一升即利否不局方人味元亦佳

又方治癥同上亂髮燒灰 菓子車冬子等分為末茶湯調亦治血淋尿血

三方同治石草玄毛車冬子水煎又滑石二兩亂髮灰一兩桃白皮一斤搗汁調溫服

小便數（遺尿失禁

鹿茸散腎與膀胱二經俱虛而有熱乘之則小便澀虛則小便數

鹿茸 烏賊骨桑寄生 龍骨各二兩 白芍當帰 附子各三分 双螺旋三十枚

細末空心溫酒調二枚

桑螵蛸散婦人虛冷小便數 双螺旋三十枚炒 鹿茸 牡蛎粉 甘草各二兩

黃芪半兩 細末食前姜湯調二枚

鹿茸元婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁

鹿茸 檀紅桂心附子 牡蛎 骨碎補石斛 蔭客 雜腔腫 沉香各二兩

双螺旋三分 細末酒煮麯糊元楂子大空心溫酒下三十元

平金方治婦人遺尿不知出財

白薇 白芍等分為末酒服方才止空心

大便不通

蜀方益物湯加青皮煎服仲景云婦人經水過多則亡津液亦大便難也

大三院散又名三和散七宣元麻仁丸並見和劑方

通神散婦人大便不通心腹脹痛煩悶脉沉滑而实

大黃芒硝 寶印桃花 郁李仁湯皮微炒各二兩 木香半兩

細末空心米飲調二枚

大麻仁丸婦人腸胃風結大常松

大麻仁玄殼秤別研如膏 黃各二兩炒 寶印木香 拆殼各二兩

細末和膏蜜元桔子大空心溫水下二十元

老人虛人風人大便秘

卷之引古人用通藥率用通氣等藥蓋肺氣不降則大腸不能傳送以杏仁  
枳殼調子等藥是也老人虛人風人津液少大便秘經云泄者滑之用胡麻杏仁  
膏等是也今人不師古人即用軟藥萬能既津液氣血大使隨手而通

相濕氣寒便病亦有風溼未疾之次則利氣散肺瘀客懷風寒之陽而或寒或利壅有  
至春溫於風寒必發洲蓋木氣升土也土不能勝水則木氣勝故洲氣所津安  
故松即不可專以松燥為風也張公度母年七十口下利數十行又苦腰肺拘挛百方不瘳  
度以蒺藜酸棗仁治拘挛而利頭黃山谷母苦欬結復以此藥投之而大便利故知  
與利皆出於風也

○  
蒺藜湯 梅藥隨多少炒至赤 烟色去刺取淨三兩以酸棗仁兩炒令香同為末每三  
水一盞煎溫服下二元 藥

皂莢丸 治風入脚氣入大使或秘或利虛人尤宜

皂莢子三百枚破作兩片慢火少燥甚即入酥一秉大又炒至燥又入酥一秉大又炒至焦黑  
為末煉蜜元梧子大盤下元用煎蒺藜湯空心未利再服加至百元以通鶴

火柔元主臟氣不調大使不通榮衛利九竅進飲食

大黃藜殼枳殼制白芍 茜草別研 蔴蓉酒浸焙牛脂去筋膜熬油  
同梔杏仁杵各二兩 桃仁百枚 杏仁四十個制炒黃別研

除有油藥並為末煉蜜元牛脂桃杏梔梗杵千下元梧子大盤飲下三元窓坐之為度

○  
蜜丸法至要宜兼用之方見鈐方秘結門

○  
(泄瀉)

桂香丸 治藏府為風濕寒所搏冷滑注下不禁老人虛人危篤效

附子肉豆蔻並炮白茯苓各一兩 桂心 木香炮乾姜炮各半兩 丁香一分

細末米糊元梧子大空心米飲下半元

○  
豆蔻分氣丸 治藏府虛寒瀉瀉無度瘦極及產後洞瀉甚危篤

藿香葉 草豆蔻仁炮淨青皮各四兩 甘草 丁香各半兩 烏梅五十个

肉豆蔻十个炮咬咀每半水二盞糯米一撮煎溫服

○  
(五香散) 治食魚傷瀉不止氣刺婦人產前後血氣腹痛等以溫酒下產後敗血沖  
心敗蒲薑湯不安胎糯米飲下孕婦脾瀉瀉痢前陳米飲下空心

烏藥 白芷炒制枳殼白朮炒良姜炒甘草 義木有孕減半

各等分為末每二分溫酒調下

○  
(人參豆蔻散) 久瀉不止諸藥不效果 人參肉豆蔻 乾姜 草朴 甘草半錢皮

各兩 川芎 桂心 蘿子 北茴香各半兩 咬咀每三分姜棗煎

○  
(木香散) 冷極下瀉瘧米谷不化瘦庠慎恚婦人產後冷瀉及一切水瀉冷痢  
木香 破故芷炒各一兩 良姜 紗仁製厚朴各三分 赤芍 净陳皮 桂心

白朮各半兩 胡椒吳茱萸炮七枚一分 肉豆蔻四個蜜印一个

為散每三枚用不經水滌肝四兩去筋膜切片重重捲藥置鼎中入蜜水一椀

醋一茶腳許蓋覆煮肝熟入鹽一枚葱白三莖細切生姜彈子許拍破同薑根  
欲盡空心為服冷食之初服微瀉不妨亦是逐下冷氣少時自止經年令病得瀉只  
是一眼渴即飲粥渴忘生冷油膩不能食冷即添少許水服或以此方之藥以用  
蜜水煮餅子大盤下五十元甚效若果瀉利不快

有泄濁不止服豆附諸丹不能診之用。腎脈虛弱或營脾腎冷溫所致而氣虛亦能為泄濁。經曰：洩利前後不正，腎虛也。又曰：諸利固滯皆屬於下。謂之肝腎之氣虛而不行故也。不能禁固而泄腎為胃閑門不束，要故翁羸不藏也。若病泄利其原出於此，小者散之效以止。

○味阿膠元治協熱下利 黃連 赤芍各二兩 茜草三兩 阿膠炒燥二兩

右先以三味為末，却以好醋熬阿膠成稀膏，元桔子大半錢，水三元。

○痢附痢後嘔噦

赤白痢古人名之漏下是也。見於前四卷中詳矣。經云：春傷於風，夏生飧泄，蓋風喜傷肝。然春時肝木正旺而不受邪，反移氣犯於脾土。脾既受邪，又傷於食生冷，粘下因此成積。夏秋之間再感暑濕，風冷之氣而成痢。其證必先脾腹痛，膍洞泄裏急，後重或赤或白或黑，相雜日夜無度，不問冷熱，霍霍先服。神木散可以驅散風冷，寒溫之氣，次用五苓散分利水谷，兼用蘇元溫脾胃去積滯。或六神元末，有不安，然古人雖有無積不成痢之說，豈一歲之內獨見於夏秋之間？人皆有積，春多無之。蓋風邪入胃，本不勝。用神木散直要桑李矣。又有《鄉隣里一家長幼相傳染，或猶同而證異》，亦有證異而治同，或以溫劑或以涼藥收效。此毒疫痢也。當察其虛實，令辨先以敗毒散多加人參甘草、陳倉米、姜棗煎服，及黃熟艾湯。至春散，黃連丸選用之。痢脉逕实或緊或大為末，止數滑為有宿食，宜下。不止更下之。若腹堅或譖語有燥屎，宜下。痢脉散而渴欲自愈，下熱汗出，愈脉沉弦者，下重也。脉小浮弦者，與承上橘皮丸。

膏脈弱者，欲自愈也。藏絕下不禁，半足不仁，半足無脉，委之不溫，微喘者，皆不治。

天全方神木散治春傷於風，夏生飧泄，大治傷風頭痛，項背拘急，口鼻流清涕。

蒼术二斤

藁本川芎各二兩

羌活四兩

粉草一兩

細辛二兩

粗末每三錢，姜三分，水煎，欲出汗，加葱，热服，無時。

○六神元治赤白痢 麥芽 核芩 枳殼 木香煨 白芍倍之 黃連赤芍倍之

神曲別作末，右細末以神曲作糊，元桔子大半錢，元赤芍甘草湯下。白芍乾

姜湯下。赤白痢，甘草乾姜湯下。黃連可以解暑，毒清藏府，厚腸胃。

木香以溫脾胃，逐邪氣，枳殼以寬腸胃，核芩利水道，麥芽消滯，真要藥也。

○四順附子湯 生附子素皮，白芍炮甘草 入參各二兩

父咀每四錢水煎空心服，鴻臚腹痛加桂半兩，小便不利加茯苓半兩，凡痢雖休。

寒手足逆，冷冷汗自出，六脉沉伏，不宜輕用附子。多因伏暑得疾，亦有冷汗。

自出六脉虛弱，四肢逆冷者，但背寒面垢，齒乾燥渴為伏暑證也。

○支方禁口痢 石連肉隨多少，不炒去殼，剝肉并心，研末，陳倉米飲下。

又乾山藥不必多少，半生半炒，黃為末，陳米湯調，此證乃痢毒，亦可作元吞下。

涌故禁口，不食服些味，氣通利當頓下。一方，君子湯加味陳倉米煎服。

耳元吞下，痢危固方見前。

卷一七

卷一七

活人書橘皮散  
湯等各藥以爲主  
獨寒竹絲湯  
姜橘皮湯  
金姜橘皮湯  
退陰散本治傷寒  
陰毒訛以治癆  
喉嚨不勝沉弱諸藥  
不能服愈見活人  
猪苓湯治肺中咳  
渴心煩不得眠  
木苓 赤茯苓 澤瀉  
渭石各半兩  
噙每三錢水煎候膠消盡服

○大便下血

防風如神散治婦人風虛大便後時時下血

防風 枳殼等分㕮咀每三錢水煎空心服

木香烏荳元治腸風酒炒 木香三分 荆芥穗 川烏炮各二兩

爲末酒糊元梧子大每二十元濃煎粟根白皮酒吞下忌羊血

腸風黑散治風邪入臟或食毒積熱大便鮮紅疼痛肛門出或久患酒痢

敗棕燒木餳頭燒烏梅肉粉草木各等分

細末每錢水煎空心溫服

二方婦人便血不止用黃附元加五靈脂效方見月水不調門

○陰腫或痒(陰挺下流)

菖蒲散婦人月水滯滯陰陽腫痛 菖蒲 當歸各二兩炒 秦艽三分

吳茱萸製半兩粗末每錢葱白半寸水煎空心溫服

(麻黃湯治婦人陰腫或瘡爛者 麻黃 黃連 蛇床子各二兩 北艾葉一束

烏梅十個 細剉水一斗煮伍升去滓熱洗避風冷

卷十一

十

(大黃散治陰痒 大黃微炒 黃芩 黃芪各二兩 赤芍 玄參 丹參

山茱萸 蛇床子各半兩 細末食前溫酒調一錢亦可煎洗

(又方野紫蘇或蒜或枸杞根煎湯洗

半金當歸散治婦人陰挺下脫 當歸炒 黃芩各二兩 牡蠣一罋 赤芍二兩

蝦皮炙焦二兩 細末每錢空心溫酒調

(又方蛇床子五兩烏梅十四個水五升煮三升熱洗日五次

集驗婦人陰中痛生瘡羊脂二斤 當歸 杏仁 白芷 川芎各二兩

(黃芩湯治同上 雄黃 當歸 黃芩 川芎 大黃 磬石各三分 黃連二分

七味切水五升煮昇洗瘡日三次

(雄黃散治同上 雄黃 川芎 石砂 梨蘆 細辛 當歸 川椒等分

為末綿裹納陰中并傳外瘡忌如常法

集驗方治女人傷丈夫四體沉重噓吸頭痛 生地黃半斤 芍藥五兩 香豉二升

葱白升 生姜四兩 茱萸二升六味切水七升煮一升半作三服

(子金治女人交接輒血出 桂心 伏龍肝各一分為末酒調方子 差止

集驗女人交接陽道違理及他物傷血不止取金底墨斷葫蘆塗藥納之

又燒髮并青布末為粉塗內之

烏雞煎治婦人百病

足葉更良姜白姜當歸赤芍延胡索破故芷川椒生乾地黃劉寄奴義木陳皮青皮川芎各二兩荷葉灰四兩熟艾二兩

為末醋糊元梧子大安三五元月經不通紅花蘇木酒下白帶牡蠣粉調酒下子宮久冷白氣芩煎湯赤帶建茶清下血崩豆淋調綿灰下胎不安蜜和酒腸風陳米飲調百草霜下心疼菖蒲煎酒下漏胎下血烏梅溫酒下耳聾蟬點茶下胎死不動班猶三十个煎酒下腰脚痛當帰酒下胎衣不下姜桂研水下頭風薄荷點茶下血風眼暈甘草湯下生瘡地黃湯下身體疼痛黃芪末調酒下腹腫射香湯下喘滿咳嗽杏仁桑白皮湯下腹痛芍藥調酒下產前後痢白者乾姜湯下赤者甘草湯下赤白者宜湯下常服溫酒醋湯任下並空心服

固真丹元臟久虛及小腸腎餘膀胱疝氣五般淋疾精滑精漏小便白濁及婦人白帶下漏下血崩子宮血海虛冷等疾

蒼术米泔洗浸春五夏三秋七冬十日切焙乾秤乙斤分四廩每四兩用茴香鹽各一兩同炒令木黃四兩用炮川烏并川練子肉各一兩炒令木黃四兩用川椒耆并合另破故芷各二兩炒令木黃四兩用好醋好酒各升廩同煮二三十沸取木焙乾右同為末用煮藥酒醋打麯糊元梧草薢四兩牛膝五家皮白朮各二兩川烏炮枳實丹參各二兩細末蜜元梧子大溫酒下子元心

# 水類鈎方卷第十八

## 胎前

夫婦猶天地也。天地之道陰陽和而萬物生焉。夫婦之道陰陽而男女生焉。婦人先須調經百病。自不生百病。不生孕者成美。然當知氣盛血衰則無孕。血盛氣衰乃有体須以抑氣益為先。若有肝脾性。當安胎順氣。若外感風氣。內傷七情。以及他病治法。而男子無異。當於各證類中求之。但胎前治他證者。動胎之劑。切須審詳。

### ○妊娠惡阻。痰逆不思食。

惡阻者。以婦人怯弱。或有風氣。或有痰飲。妊娠後便有此病。其頤狀如故。嘔息和順。但覺目暉頭暉。聞食氣好食酸鹹。甚或作寒熱。痰滿胸悶。恍惚初娠。有此輕者。不服藥亦可。重者隨上證用下藥。

和劑半夏苓公湯。治妊娠惡阻。聞食氣嘔。胸膈痰逆。嘔吐恶心。

旋覆花半錢。陳皮麸炒。桔梗。白芍。人参。甘草。炙川芎。各半兩。

熟地黃三分。赤茯苓三分。制半夏倍之。两分。或炒羌動胎氣。

哎咀每三錢。姜四片。水一盞。煎空心。熱服。鄭氏無旋覆加細辛紫蘇葉。有客蒸煩渴。足瘡去陳皮。細辛加前胡。知母。腹冷下利去地黃。加桂心。胃中虛熱。大便秘小便澁。去地黃。加黃芩六分。大黃二錢。三分炮。濟生依馬加。宿歸生。乾姜。地黃各半兩。

## 卷十八

### 一

赤苓元湯。治同上。前赤苓湯兼服。葛根。桔梗。制麸炒。白芍。甘草。參各三兩。

赤茯苓。人參。乾姜。肉桂。淨陳皮。制半夏。各一兩。肘後忌桂傷胎半金匱。

〔安胎飲。治惡阻。嘔吐。不食。胎動不安。或時下。〕

地榆。甘草。赤苓。熟地黃。當歸。川芎。白芍。制半夏。炒阿膠。炒

黃芩。白芍。各等分。蜜三錢水一盞。煎溫服。無時。一方無半夏。地榆有。參桑寄生。

一方無白芍。黃芪半夏地榆有。艾葉。是膠艾湯。

〔阿茹湯。妊娠嘔吐。頭疼眩暉。煩惱。虛惡阻。集驗無。〕赤苓。麥門冬。甘草。

半陳皮。人參。白芍。麥門冬。各之兩。甘草之分。白茯苓。制草。朴各半兩。

〔哎咀每三分水一盞。姜五分。竹茹。彈大茴。溫服。無時。即濟生參橘散。無人參。〕

〔小地黃元。妊娠惡心嘔吐。清水腹痛。不食。一方用生半姜。〕

〔人參。干姜炮。為末。生地黃汁。元極子大。每五十元米湯下。濟生加制半夏等分。〕

〔大全方。白朮散。治惡阻。胃寒。嘔逆。翻胃。養心。腹利。痛。〕

〔人參半兩。丁香。霍香葉各一分。甘草一分。細末。每三分水煎。溫服。無時。〕

〔又方。治同上。人參。丁香。柿蒂各兩。甘草。良姜各半兩。細末。三分。熱湯調。鹽漬。〕

〔雞肝飲子。治惡阻。嘔逆。不食。其者。中滿。中無柴。或作寒熱。〕

草豆蔻細鹽裹蜜酒煎制。制半錢。乾薑三分。甘草三分。

細末每服錢水一盞。姜三片。棗不煎。呷服。輕者只三服便能蘇醒。有病紅。兩治寒熱。僵荆不食。後人去僵。以乾生姜代乾姜治之。氣運大便。

秘少津液引飲。有奇效。產科用乾生姜治胎病極驗。

保生湯治婦人經候不行。身無病而似病。脉滑大。六部俱無。乃孕脉也。精神如蟬。聞食氣或啞。嗜物或大吐。或時清小此惡阻也。勿作寒病治之。宜服。

人參三分。甘草二分。白朮。香附子。烏藥。橘紅各半兩。

哎咀每錢。姜五片。水一盞。前溫服。無時。或作末調或惡心嘔吐。加丁香生姜前香散治妊娠胎氣。不妄氣。升升降。嘔止。食坐凳。劑量重。

一方治惡阻嘔吐。不止頭痛。全不食。服葉不如。用此理歸原。人參。甘草。川芎。當歸。京芍。丁香各半兩。白朮。白朮。陳皮各兩半。

苦梗炒制枳殼各三分。制半夏切炒黃。各兩。

哎咀每錢。姜五片。棗三個。水煎。

張氏半夏茯苓湯治證。馬前半夏湯同。制半夏半錢。淨陳皮各二兩半。

白朮。苓。兩砂仁。各一兩。甘草。兩哎咀。每錢。姜十片。川芎。各半錢。橘半個。煎空。溫服。

二方治妊娠。晉文淵閣。連不患。飲食赤。扶養。前胡。白朮。紫蘇葉。各二兩。半夏炒制。麥門冬。人參。太伏皮。各半兩。哎咀。每錢。姜五片。水一盞。前溫服。

一方無大伏皮。人參。有大伏子。賓郎。

錄驗治惡阻嘔吐。不食。青竹茹。陳皮。各三兩。生姜。茯苓。各四兩。

制半夏。五分。細切水。升。芩。各一升。半分。服。不差。頓服。忌羊肉。鷄。酢等物。

○胎動不安。跌蹠。預卦。子懸。孕。長胎。胎動不得安。須下者。

和劑白朮散。治妊娠宿有風冷。胎癆不長。或失將理。動傷胎氣。多致損陷。當服壯氣益血。保護胎臟。牡蠣殼五錢。白朮。川芎。各二兩。

蜀椒。炒七錢半。為末。每錢。空心。溫酒調下。腹痛加。白芍。亦治帶下。

安胎飲。見前惡阻門。

大全方治妊娠。三月上至九月。胎動不安。腹痛。已有所見者。

艾葉。阿膠。當帰。川芎。各三兩。甘草。兩水。升。芩。各一升。入膠令烊。分作三服。

產室。治妊娠無故胎動。不安。腹內絞痛。煩悶。

集驗。無寄生。政有續。斷三分銀。各少。先煎。後入藥。

當帰。桑寄生。各四分。川芎。三分。政八合。阿膠。三分。葱。拾四莖。

右水二升。煮八合。膠空心溫。分二服。一方無政。用銀器煎。

養生。角方。治妊娠急胎動。去血。腰腹痛。阿膠。川芎。當帰。竹茹。各二錢。

紫。土。盡。入。銀。石。焚。五。盞。去。銀。不。件。熟。三。味。煮。取。上。盞。半。入。膠。煎。溶。滌。當。繼。之。

空心。一日。盡。未。效。再。作。胎。動。叫。呼。只。藥。存。青。熟。丈。三。味。酒。滌。當。繼。之。

寄生湯治胎氣常不安落五月已後胎不安

桑寄生洗秦艽阿膠各半兩糯米半兩作粉蜜酒醋二五日

以新汲水三升先以寄生秦艽煮二升去滓入阿膠糯米再煮約一升分三服

順氣飲子產前服之安胎紫蘇葉木香炮人參草豆蔻桂苓各一兩

甘草半兩大伏子一兩如氣弱者不用

咬咀每三分水一盞芋根三寸糯米少許煎溫服丹用川芎葱白煮服佳

安胎寄生湯治血流下方桑寄生白朮各五分茯苓四分甘草十分

以水五升煮二升半分三服若人壯者加芍藥八分若胎不安腹痛加干生姜四分

蘭易川芎散治姪婦從高墜下胎氣不和轉動不能腹脇疼痛

川芎為末每三分溫酒調下鄭氏名探胎湯姪婦三月經不行以此驗之濃煎艾

湯下腹中微動則有胎若在脐下動者乃血癥也若不動為衆不行有痛癆也

白朮散治胎氣不和飲食不進白朮炒紫蘇各一兩白芷炒人參各二兩

淨青皮川芎各三分甘草炙一分咬咀每三分姜三片水一盞煎

和劑保生丸治胎動不安或跌躡傷動胎上湊心惡血聚下或覆出子死橫逆悶亂腹

冷瘡青瘡因大麻仁去殼兩半貝母黃芩大豆黃卷梗米秦椒甘草干姜

肉桂石斛石膏各二兩當帰半兩炒為末蜜元彈丸一元溫酒化下空心

兼服濟生補手散紫蘇飲一方當帰人參各兩半阿膠一兩甘草二兩芍薦一握煎服

濟生紫蘇飲治胎氣不和捫心腹脹滿疼痛謂之子懸治臨產驚氣李杲紫蘇散

大棗皮荆川芎白芍淨陳皮紫蘇葉當歸酒洗各二兩人參甘草

各半兩咬咀每三分姜五片葱白七寸水一盞煎空心溫服

佛手散治姪娠胎動不安血氣冲心欲絕及臨產二後隨意加減

當歸酒洗川芎各一兩咬咀每三分酒一盞煎干入水一盞再煎三沸溫服

(膠艾湯姪娠或因預作胎動不安腰腹疼痛方見前安胎飲下連根葱白煎服

(安胎散治姪娠自高墜下或為重物所壓觸動胎氣腹痛下血治子胥名乎瘤一

砂仁不拘多少熨斗內炒令熟去皮研末每三分熱酒調艾鹽湯亦可胃虛嘔吐更妙

全養胎白朮散梟川芎各四分川椒炒出汗三分牡蛎煅二分

細末酒調一分服后若渴大麦粥服之惡阻作元子服并治室女帶下与梨膏

白朮元益血保胎白朮川芎阿膠炒地黃炒焦當歸頭炒各一兩牡蛎煅粉五分

川椒炒三分為末蜜元桔子大空心米飲下三寸元酒醋湯亦可

黃芪散治胎不長和氣思食利四肢

桂心散治姪娠安因疚病胎不能安湏下者一方加蟹爪為末酒調

桂心爪姜牛膝瞿麥各二兩當帰一兩咬咀每三分煎空心服

小柴治姪娠得病湏去胎者麥蘖一升為末和煮二升服之即下神效或酒煮

支仲療姪娠以病去胎雞子一个以姜酒燉置雞子中服之

卷十八

三

常宜救生散治胎氣不弱不宜複胎服此安胎順氣易產

人參 訶子 煙肉 麦芽 神曲 白朮 陳皮 各炒等分為末每二分水煎空腹服

(杜仲元治姪娘三兩月胎動不安防其欲墮宜熟服之

杜仲 姜制炒續斷酒浸各三兩為末煮棗肉杵元倍子大每七十元米飲下

■姪娘漏胎卒然下血

全方治姪娘三四月腹痛時二下血 繢斷八分艾葉 當帰 乾地黃六兩

竹茹 阿膠 雞蘇各四分水一升煎取六合少心再服

(廣濟安胎胎病漏血腹痛 當帰 川芎 阿膠炙 人參各一兩大棗二十个

切以水三升酒界煮二升半分三服五日一劑頻服三四劑無妙

簡易榆白皮散治漏胎去血恐其難產宜常服 榆白皮 葵根瞿麥各一两

火麻仁去殼 木通半兩牛膝三分酒浸咬咀每三分水煎溫服

續易簡治漏血 野苧根二兩剉炒 金銀各一兩許為一劑酒水平煎耗半溫服若閉

攢胎動欲漏砂仁皮炒令熱透為末二分酒或鹽湯下

濟生如聖湯治胎動腹痛或為漏胎 鯉魚皮 當帰酒浸熟地黃酒蒸白芍

阿膠鮮粉炒川芎 繢斷酒浸甘草炙各等分一方有干姜竹茹

哎咀多水一盞苧根少許姜五片煎溫服濟生有續斷無干姜竹茹

(桑寄生散治胎漏經血妄行淋瀝不已膠艾湯亦可選用

桑寄生當帰酒浸續斷酒浸川芎 香附子炒阿膠炒 茯神

卷十八

四

白朮各一兩 人參半兩 甘草炙半兩 咬咀每四分姜五片水煎溫服無時

(芎窮補中湯姪娘血氣虛弱不能保養以致數月而墮名曰半產

干姜炮 阿膠炒 川芎 五味子各一兩 黃芪蜜炙 當帰酒浸 白朮

赤芍各兩半 木香 人參 杜仲炒 甘草各半兩 咬咀每四分水煎無時服

鄭氏人參散治漏胎敗血瘀心日漸胎干子母危困忌生冷雞鴨魚麪

人參 黃芪炙 阿膠炒 竹茹 木香 甘草炙 附子炮 各半分 川芎一分

生地黃湯治經血妄行及鼻衄不止 生地黃酒搗取汁半兩 薄荷三分

甘草一分 二味為末新汲水含地黃汁調食后服

方四物湯加阿膠北艾外烏梅少許同煎熱服

野苧湯治漏胎下腹痛不可忍或下黃汁如漆如豆汁

野苧根二兩剉炒家種亦可酒水各一碗或加金銀同煎一椀服

地黃湯治經血妄行及鼻衄不止 生地黃酒搗取汁半兩 薄荷三分

牡丹皮 白朮 紫桂心 桃仁制 赤芍各等分細末蜜元彈丸一元細嚼淡醋

湯送下速進兩元至胎癟腹中危甚者立可取下至神效

(又補遺方治服草藥墮胎眼痛曰病豆生去皮為細末米飲調服方之)

俾濃煎服亦可。并解調中丸。毒藥多婦人赤白帶下。要炒黃為家常藥。

尤捨心短氣熱。地黃二兩。白芍。艾葉。當歸。甘草。阿膠。黃芪各一兩。

㕮咀每半兩。姜三片。棗一个。水煎溫服。無叶一方。有川芎。

■ 婕娘心痛。心腹痛。心腹脹痛。中惡心腹疼痛。

產宝治妊娠卒心痛氣欲絕。川芎。當歸。茯苓。制厚子朴等分。

水六升煮取二升分二服。炮炙論云心痛欲死急煎延胡。

白木湯治妊娠遍身痛或沖心痛欲死緣胎有水致痛。豆蔻。桃李。雀肉。

白木五兩。黃芩二兩。赤芍四兩。水六升煮取分三服半日。微下水令易生。

當歸芍藥散妊娠心腹絞痛心下急痛及產後血晕氣乏崩中久痢出三因方。

白芍半斤。當歸。茯苓。白木各三兩。澤瀉。川芎各四兩。川芎只兩半。

細末每三升空心溫酒調服。此安期先生賜李少君父解之藥。後仲景增蜜爲

婦人妊娠腹痛方。本方用芍藥四兩。澤瀉。茯苓。川芎各一兩。當歸。白木各三兩。可蜜丸。

一方。治妊娠先患冷氣忽中心腹痛如刀刺。川芎。人參。茯苓。吳茱萸。苦梗。

當歸各三兩。制厚朴。芍藥各三兩。㕮咀水九升煎三升分三服。氣下即安。

香木散治妊娠胃腹滿痛腸鳴。嘔逆由喜怒憂思飲食失調。

義米根一兩。丁香半兩。粉草一分。細末空心益湯點服。

草豆蔻散妊娠心腹常痛四肢不和。減食。草果仁。忍冬豆。蔻。淨陳皮。

乾地黃。白木各一兩。川芎三分。當歸炒。桂。乾姜。木香各半兩。

細末每四分。東不下水煎熱服。

當歸散妊娠中惡心腹疼痛。當歸。丁香。川芎各三兩。掌青皮二兩。

吳茱萸泡炒黑半兩。細末溫酒調無時。

又方。生乾地黃一兩。枳殼。木香各三分。細末酒調。

紫蘇飲妊娠心腹脹滿疼痛方。見前胎動門。

金匱散妊娠腰痛攻腰痛不可忍。兼治腹痛。

當歸三兩。阿膠。甘草各二兩。葱白一斤。水七升煮三升分温五服。

(通氣散)治妊娠腰痛不可忍。神妙破故紙隨多少。炒作末。嚼胡桃肉空心酒調。

又方。妊娠腰痛不可忍。或連脇痛。杜仲四兩。五加皮。阿膠炙。防風。川芎。

狗脊。細辛。白芍。草薢各三兩。杏仁八十個去皮尖炒。

㕮咀水九升煮二升下膠。作三服。一方加當歸。

鄭氏腎着湯妊娠腰肺腫痛。白荻苓。白朮。乾姜。甘草炙各二兩。

杏仁制炒五錢。㕮咀每三錢水煎近心服。

寒客散如蠍而脣刺痛則清喉吐喘急 生姜三分 本香二分半 乾姜三分  
川芎半分 地黃一升半 甘草炙四分 制厚朴三分 净陳皮三分  
咬咀每三分水一盞入燒鹽一捻煎服

■ 蘭胎後血下不止 鹿角

■ 離龍骨散治損娘下惡血不止 龍骨 當歸 地黃各八分 艾葉炒過分  
地榆 阿膠 炙藥 乾姜各六分 滑黃五分 牛角腮炙焦十分  
細末空心粥飲調下益氣布英丸

■ 金治隨胎下血不止 以生地黃汁一小盞調代赭末一日三服

■ 小呂方治婦人斷產故蚕紙方圓

尺燒末酒調服終身不復懷孕也

■ 又方妊娠羸乏欲去之并斷產

枯萎桂心各二兩豉一升三味切水四升煎一升半分服之

■ 又方治証同上 粉草 乾姜 人參 川芎 生姜 肉桂 蟹爪 黃芩 等分

細功水七升煮二升分三服忌酒早菘菜生葱

■ 金斷產油煎水銀一日方息空心服如棗大一元永斷不損人

■ 娘娘咳嗽

■ 大全欵冬花散妊娠心膈痰毒壅滯肺氣不順咳嗽頭疼

款花 麻黃 貝母 墓前胡 桑白皮 紫苑各半兩 旋覆花 白朮

甘草各三分 石膏一兩 咬咀每三分水煎食後溫服

卷十八

六

■ 桔梗散妊娠肺壅咳嗽喘急不食 天門冬去心一兩 桑白皮 苦梗  
紫蘇各半兩 赤茯苓一兩 麻黃去節三分 人參 貝母 甘草各半兩  
咬咀每三分水煎無時

■ 馬兜鈴散妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴 苦梗 人參 甘草 貝母各半兩 清陳皮 大伏皮 紫蘇

双白皮各一兩 五味子三分 咬咀每三分水煎溫服無時

■ 麻黃散妊娠外傷風寒發逆咳嗽不食

麻黃 陳皮 前胡各一兩 半夏 人參 白朮 枳殼 貝母 甘草各半兩

咬咀每三分水煎溫服

■ 百合散妊娠咳嗽心脅不利煩悶不食 濟生百合散不同

川百合 紫苑 麦門冬 苦梗 双白皮各一兩 茯草半兩

咬咀每三分水煎去滓入蜜半匙再煎三沸溫服

■ 紫苑湯妊娠咳嗽不止胎不安 甘草 杏仁各一分 紫苑一兩 天門冬去心

桑白皮各一兩 苦梗三分 咬咀湯使同上

■ 烏方華蓋散妊娠咳嗽不止此藥穩重 有効

■ 子煩 煩躁口乾

■ 全方散 治子煩 防風 黃芩 麦門冬各二兩 白芍各四兩

咬咀每三分竹葉數片水煎溫服

一方散 治子煩 防風 黃芩 麦門冬各二兩 白芍各四兩

咬咀每三分竹葉數片水煎溫服

麥門冬散妊娠心煩虛躁吐逆頭暈身熱或流黃涕

麥門冬子參 赤茯苓各二兩 前胡 亦名陳皮 金匱苦梗 双耆生

甘草 旋覆花各半兩 生地黃二兩 粗末每四分 姜半分水煎溫服無時

柴胡散妊娠心煩頭目暈重不食或嘔

柴胡兩半 赤茯苓 麥門冬各一兩 桔梗葉牽牛人參 清陳皮 甘草各半兩

㕮咀桑白皮三片水煎溫服

人參散妊娠心煩氣乘心脾津液枯少煩躁壅熱口舌乾渴

人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 家葛黃芩 星角屑各三分

甘草半兩 咀咀每三分水煎溫服

升麻散妊娠熱壅心神煩躁口乾渴逆已下諸方添煩躁口乾

升麻 黃芩 人參 麥門冬 山梔仁 前胡 茯神瓜萎根 犀角屑各一兩

知母 甘草各半兩 咀咀每四分水煎溫服

知母散妊娠熱壅心神煩躁口乾及胎臟快 知母 麥門冬 甘草各半兩 黃芩

子芩 赤茯苓各三分 咀咀每四分水煎去滓入竹瀝一合再煎二沸溫服

葛根散妊娠數月膏肓煩躁乾渴四肢壯熱少食

家葛黃芩 人參 咸蕤 黃芪 麥門冬 甘草等分

㕮咀四分竹茹一塊水煎溫服無時

人參黃芪散治證同上 人參 黃芪 家葛根 泰公丸 麥門冬各二兩 知母三分

## 卷十八

### 七

甘草半兩 赤茯苓一兩 咀咀每四分姜三片淡竹葉二七片水煎溫服

妊娠寧風(症瘕)

(太乙)防風散妊娠中風卒倒心神亂悶口噤不能言四肢強急

防風 双寄生 葛根各兩 菊花防己 細辛 秦艽當帰 桂心 茶神

甘草 純羊角各半兩 相末蜜分姜三片水煎去滓入竹瀝半合溫服

(太乙)妊娠中風口眼不正手足顛僻 防風羌活防己各二兩 麻黃去節半兩

桂心桑白皮各半兩 桂心京芥穗 純羊角桑寄生 甘草 意苡仁各半兩

㕮咀每三分水煎溫服

(太乙)妊娠中風角弓反張 噎語澁此風症候名子癇 亦名子冒

麻黃去節 防風 独活各二兩 羚羊角桂心升麻 酸旱仁炒 甘草

秦艽各半兩 川芎 當帰 杏仁制各三分 咀咀每三分水煎去滓入竹瀝半合溫服

(太乙)妊娠中風腰背強直附復反張 防風 葛根川芎 生乾地黃各二兩 杏仁制

桂心桑白皮各半兩 独活石膏 人參各二兩

細銀朱乳膏全朴分 二服貝母令人易生瘡瘍未臨期者以蘇麻丸之

若有竹瀆先作汁滾酒湯竹遠則先服此湯竹瀆偏療瘡起頭

治妊娠產婦絳死者、火或癟瘍金瘻發瘻治亦效忌薄暮葛米

生羚羊角散治妊娠中足頭項強直筋脉拘牽言語謇澁痰不止或時發搐不省

人事名曰子痫 羚羊角 川獨活 酸旱仁炒去殼 五加皮各半分 薑苡仁炒

防風 寶歸酒浸 川芎 陳仲 杏仁去皮尖各四分 木香 甘草各一分半

㕮咀薑五片水煎無時服時賢胎前論無益神杏仁木香有草麻炒

去棗海桐皮蔓京子等分

財賢胎前論防已湯治妊娠中風口噤四肢強直反張

防風五分羌活二分半 細末以黑豆一合炒焦大煙出慢無灰酒候沸定以酒

調藥灌下稍甦再灌未熟活人書剛柔三症遲藥救之

妊娠傷寒時氣蒸病熱病胎死腹中

妊娠傷寒仲景無治法用藥宜有避忌不可与尋常婦人一槩治之  
天全方阿膠湯凡妊娠傷寒瘟疫時氣先服此以安胎宜此湯亦以治病藥間服

阿膠炒白朮 双寄生人參 白茯苓各等分

細末煮糯米飲調服方才已日三服 大全有四物湯加減

葱白湯妊娠傷寒憎寒發熱當發其汗

葱白十莖 生姜三兩細切水二盞黃芩一盞連進得汗愈

箭胡湯妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏十二分 前胡六分 甜竹茹三分外臺無 黃芩 大青各五分 知母

梔子仁各四分 㕮咀五分葱白三寸水煎溫服

蘇木湯妊娠傷寒或中時行酒漸作寒振栗而悸加囁者

赤芍淨陳皮 黃芩 黃連 甘草 蘇木等分

黃龍湯妊娠寒熱頭疼不食脇痛嘔逆痰氣及產後傷風熱變胞宮寒熱

瘡并經水通來適斷或病後勞復餘熱不解

柴胡一兩 黃芩 人參 甘草各一分半 小柴胡湯去半夏

㕮咀每分水盡半煎半溫服

柴胡石膏湯妊娠傷暑頭痛惡寒身熱煩躁四肢疼痛項背拘急口乾燥

旋覆湯妊娠傷寒頭目旋疼壯熱心躁

旋覆花 赤芍 甘草各半兩 前胡 石膏各一兩

黃芩各三分 㕮咀四分姜半分水煎溫服

麥門冬湯妊娠傷寒壯熱喉逆頭疼不食胎氣不安

人參 石膏各一兩 前胡 姜各三分 家葛根 麥門冬各半兩

㕮咀每分水姜四片棗不炎竹茹一分水煎溫服

萬藥湯散婦人傷寒五个月已前嘗用此方

黃芩當歸芍藥各四分川芎十六分白朮八分

細末溫酒調方寸心日二服產後百病悉皆主之常服則易產無苦

當歸茯苓散治婦人傷寒腹中隱痛

當歸茯苓白朮各二兩白芍半斤澤鴻川芎各四兩

細末酒調方寸心日三服

白朮散姪娘傷寒煩熱頭疼胎氣不安或時吐逆

白朮橘紅麥門冬人參前胡赤茯苓川芎各一兩甘草

半夏各半兩哎咀每三分姜四片淡竹茹一分水煎溫服無時

麻黃散姪娘五六月傷寒頭疼壯熱服煩疼或口乾心躁

麻黃桂心柴胡赤芍各一兩甘草半兩

哎咀每三分姜三片水煎溫服無時鄭氏加葛根一两去桂心

秦艽散姪娘肺氣五六日不得汗口乾多製冷水狂語吐逆

秦艽紫胡各一兩石膏二兩赤茯苓前胡甘草犀角屑家葛根

升麻黃芩各半兩哎咀每三分姜半分淡竹茹一分水煎溫服無時

梔子仁飲子治姪娘熱病斑出黑色小便如血氣急欲絕胎欲落

梔子仁升麻石膏生地黃各二兩黃芩大青各一兩或遠志苗亦可

哎咀每半兩葱白七寸豉四十九粒水一盞煎溫服無時一方有杏仁無地黃

卷十八

九

石膏一方加青黛無大青爻方兼艾如雞子大酒煮服救姪娘危困

大黃飲子姪病熱病六七日熱入腹中大小便秘澁煩熱

川大黃微炒石膏各一兩知母前胡赤茯苓各三分梔子仁甘草

黃芩各半兩哎咀每半兩生地黃一分水煎溫服無時

黑神散治姪娘熱病六七日后胎死腹中產母舌青者是其候方見和劑

(催生湯)治胎死腹中或產母氣乏委頓產道干澀用此又勝黑神散

制蒼朮二兩苦梗一兩陳皮六分白芷桂心甘草各三分川烏

當歸乾姜炮制厚朴芍藥茯苓制半夏附子炮南星炮各三分

川芎分半制枳殼四分木香一分杏仁制炒阿膠炒各一分

細末每一大分溫酒調下竈熱悶加白蜜新汲水調即加減五積散

蘇生帰涼節命散姪娘面赤口苦煩脹脹

川芎芩根白芍麥門冬去心當歸酒浸白朮各一兩糯米半合

甘草炙半兩哎咀每四分水一盞煎至半溫服無時

大聖散治姪娘忪悸腹中多驚腹脹坐卧不寧

白茯苓川芎麥門冬去心黃芪蜜炙當歸酒浸各兩木香人參甘草

各半兩哎咀每四分水一盞姜五片煎溫服無時

首蘇散駐婦外感風寒渾身壯熱眼暈旋心胸煩悶

紫蘇葉川芎白芍白朮麥門冬去心淨陳皮葛葛各一兩

參米酒 咳嗽虛寒者用此藥水煎服

百合散姪婦風寒咳嗽多喘滿

百合蒸紫苑貝母杏白芍前胡赤茯苓桔梗各一兩甘草

炙半兩咬咀每四分水一盞姜五片煎溫服無時 而眼失明

消風散姪婦外感風毒上攻太陽火鬱腸壅頭旋目暈或腮頸腫核

石膏淨菊花防風京芥德羌活羚羊角川芎大黃豆卷炒

當帰酒浸白芷各一兩甘草炙半兩一方四物湯加荆芥防風

咬咀每四分水煎入好茶半分煎溫服頭微汗瘥兼服天門冬飲子

天門冬去心知母竟蔚子各二兩防風半兩五味子茯苓人參羌活

各三分咬咀每四分姜三片水煎食后溫服忌燒燙辛辣毒食

鄭氏大安散姪婦傷寒渾身壯熱眼暈頭旋先解其表次調其裏

麻黃去節乾姜炮山茵陳甘草炙各一分石膏炒二分干葛川芎

白芍各半分入參三分半咬咀作三服葱白三寸水煎服

又治姪婦熱病葱白一把三兩水一升爛煮啜尽取汁主安胎若胎死亦即下

又鯉魚燒交酒調下

又時氣傷寒大熱護胎不落伏龍肝即竈心土作末酒水調塗脐下三寸

五寸干丹塗又取井底泥傅心下乾則易差則止

卷十八 十

裹胎散姪婦傷寒大熱煩舌燥渴忍傷胎臍

嫩捲荷葉焙半兩乾小者亦可蚌粉細者一分

細末挑三分新汲水同蜜調空服多合塗腹上尤妙

姪娘瘡疾

瘡証之由詳見鈴方五卷之中婦人則有產前產後熱入血室之異並見于后

人全集簡易七宝散治男子婦人瘡瘕無問寒熱多少及山嵐瘴氣姪

二用

方見前三卷瘡門嘗治姪婦六七月而瘡先寒后熱脉浮緊用藥

以此劑而

愈黃帝問曰婦人重身毒之柰何岐伯曰有故無損帝問其故伯曰大

精大聚其可犯也衰其大半而止此審藥之性味明治療之方處以中庸

疾適好於半而止勿過而余則何疑於政治哉此狀常不能愈也

又方治姪婦患瘡寒熱頭痛心煩

黃芩麥門冬去心各一兩石膏二兩甘草半兩烏梅十四個

咬咀每四分水煎六分溫服

濟生驅邪散姪娘停食感冷發為瘡疾

良姜炒白朮草果淨陳皮霍香葉砂仁白茯苓各一兩

甘草炙半兩咬咀每四分姜五片棗一个水煎服無時

蘇氏驅邪散姪娘傷寒後變成瘡

良姜三分細剉以價猪膽汁浸一宿用東邊鹽上炒黑去霜把鹽

五味寒核味同燒為赤氣水毒前遇發熱則變神氣

妊娠霍亂吐利 汗濶下痢赤白及苦水

霍亂諸証治並見前四卷中又前婦人濟陰門各條下通審擇用  
太乙人參散治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參 制厚朴 清陳皮各兩當歸炒 乾姜炮 甘草炙各半兩

㕮咀各三個水煎溫服無川

白木散妊娠霍亂腹痛吐逆不止

白术炒 益智仁 枳殼制 清陳皮各三分 草豆蔻梗去皮 良姜炒  
各半兩 咖咀每三錢半分水煎溫服無川

(局方理中元理中湯) 五苓散香薷散夏月複合以防霍亂皆須冷服  
(厚朴元) 妊婦洞泄寒中 乾姜制厚朴等分杵爛拌同炒令乾井為大棗麪糊元桔子大蜜五十元食前米飲下

(妊娠下痢腹血狀如魚膾小腹絞痛難忍

阿膠炙二兩 地榆酸石榴皮各三兩 雜白切一升 黃連三兩角黃蘖皮

並剉以水七升煎取二升溫分三服忌生冷肥膾

(妊娠腹痛下痢腹血不止 黃連八分 制厚朴阿膠炙當歸各六分 艾葉

黃蘖各分 乾姜半分 紬末空心米飲調下方寸匕日三服

(妊娠痢黃水不絕 姜制厚朴三兩 黃連三兩 肉豆蔻五個連皮

## 卷十八

### 十一

右剉水三升煮取一升損服忌箭前已上三方集產寶方

(妊娠藏府氣素弱下痢頻腹時痛羸瘦萎黃不差數日

制厚朴兩半 白朮 川芎 白芍 當歸炒 熟地黃各一兩 乾姜 人參各半兩

阿子三分 甘草一分 附子蜜各一錢水煎溫服

(三因方治妊娠下痢赤白絞刺疼痛 烏雞子一個頭上開穴傾玄清口留黃以黃

丹一粒入穴內攏之以厚紙裹黃泥固濟搘乾為末每服二分米飲調下一服

愈者是男而服愈者是女

生姜姜黃連元妊娠下痢赤白谷道腫痛冷熱皆可服

乾姜炮黃連砂仁炒川芎 阿膠鮮粉炒 白朮各一兩 乳香三分不別研

制枳殼半兩為末用鹽梅二个取肉少蘸同杵元桔子大蜜四十元白朮乾姜湯

下赤痢甘草湯下赤白痢乾姜甘草湯下財賢胎前論中有阿子一兩龍骨  
半兩無砂仁阿膠枳殼

(當歸芍藥湯妊娠腹痛下利 白芍白朮各一兩 白朮

兩半為末每三錢空心溫酒米飲住下能祛風補勞養氣退邪熱止癥瘕

安胎和氣飲治胎冷腹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

阿子肉鷄懷白朮各兩 陳皮良姜炒 木香 白芍 陳米炒 甘草各半兩

㕮咀各五片水煎服忌生冷

妊娠小便不通

十四

齊便不通請治此見前卷本

條中又前婦人癥陰門各條小消醫門之要略

亦便不通者多因藏病傳經氣实生熱也

舍今錄驗葵子湯妊娠病六七日以身熱心臟大小便不利安胎除熱

葵子二升滑石四兩碎水五升煎一升分服須臾當而愈

(大)妊娠大小便不通心腹脹悶不飲食半足煩熱

實即赤茯苓大伏皮小通郁李仁去皮尖北五味各兩桑寄生甘草苦梗

各半兩粗末每三升水煎溫服

(又方)治證同上大黃水通實即各一兩枳殼三分大伏子三升 蘿子四半生半生根

為末以童便一盞葱白三十煎六分調下二升

(當歸散)治前諸疾或中氣或腹脹急腰腹時疼可食四肢浮腫氣喘大小便

各用桂枝門心腫當帰一两赤茯苓制枳殼白芍川芎各二兩乾姜炮

木香枳殼粉草各半兩㕮咀鹽三升姜三片水煎溫服無時如羸受氣弱及南人

枳殼減半氣实及北人可加分兩或大便連日枳殼加蜜煎

(初虞世治妊娠)大使秘滯枳殼三兩防風二兩甘草炙一兩為末并湯調下二升

(又方)妊娠虛羸大使秘滯枳殼制阿膠炒為末蜜杵元倍子大滑石末為膏溫水下半

元末通再三十元止於五十元

隣生大伏皮散治妊娠大小便赤澁枳殼炒 大伏皮姜製甘草炙各二升赤茯苓

三升並為末每三升濃煎葱白湯調下無時

(全)治妊娠卒然小便不利滑石末 杏仁等分先搗杏仁令爛次入滑石以軟

食杵元小豆大每二十元白湯下

(又方)妊娠小便不通膝下妨悶心神煩亂  
葵子研榆白皮切各一兩葱白七莖水二盞煎半空心服

(苦參)元妊娠小便難飲食如故當帰貝母志炒 苦參各三兩

滑石半兩為末蜜元小豆大米飲下二十元無時

(全)葵子散妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水腫者

小便利即住服如不通忍是轉胞加髮夾少許極妙轉胞者大腸與膀胱水不出入淋瀝急數尿時痛大便亦裏急如廁以手摸胃間至脐方可出不然小便逆上出而不禁甚者浮腫先以涼藥疏利却用止藥

(和劑)八味元治妊娠小便不通名曰轉胞方見前和剤

錢氏地黃元即朱元除少桂附子附治妊娠不語蓋腎虛不納氣歸元陽

產乾腎為虛當散寒氣為胃閑則婦家諸病皆可解而產後自愈。

附生鯉魚湯妊娠胎水不利胸滿腹脹小便不通遍身浮腫或胎死腹中

白朮五兩茯苓四兩當帰 白芍各三兩

火咀每四分用鯉魚之尾不拘大小破洗鱗腸白水煮熟去魚肉服用魚子

鹽半姜七片陳皮少許煎鹽空服如胎水去未尽再合服

安胎和氣飲治小便不通見前霍亂洲利內

安榮散妊娠小便澁少遂成淋瀝

麥門冬志通草滑石各一分當帰酒浸燈心甘草各半兩人參細辛

各一个細末每二分煎麥門冬湯調服無時

產地膏大黃湯治妊娠患子淋者由腎虛膀胱熱則小便行澁而數不宣心中煩悶

八黃地膏草各三兩知母黃芩朱苓赤芍通草升麻枳實

甘草各二兩㕮咀每四分水煎溫服

又妊娠患淋小便澁不利小腹水道熱痛冬葵子一升芍藥二兩黃芩

赤茯苓車前子各三兩火咀水七升煎一升溫分三服

又妊娠數月小便澀瀝疼痛煩悶亂不思食

聖惠方赤茯苓桑白皮木通葵子各一兩黃芩芍藥枳殼

車前子各半兩粗末每四分水煎溫服

百穢散治妊娠遺尿不知出時胎滿故也

## 卷十八

### 十三

白薇芍藥各一兩細末溫酒調桑螵蛸三克米飯調

妊娠胎水腫滿

妊娠腫滿由臟氣本弱因產重虛未克水血散四肢遂腹脹手足面目浮腫凡婦人宿有風寒冷濕妊娠喜肺腫俗云皺脚亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水蓋體藏水血多出於外故現微腫則易生也亦有泄痢損脾或因瘧渴引飲太過漬脾等使頭面手足浮腫有足腫引脈行步艱辛以至喘悶肺指間出黃水亦名子氣分既後方消

全杏附散治妊娠子氣 天仙藤洗畧炒香附子炒淨陳皮 甘草

烏藥不必天台烏但得軟白香辣者佳各等分

細末每三分姜三片木瓜三片紫蘇數葉煎空溫服小便利腫消氣順

金產室治妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

火苓四兩杏仁棗仁各三兩旋覆花二兩杏仁黃芩各三兩

粗末水六升煮二升溫分三服小便通瘥

崔氏治妊娠体腫有水氣心腹急滿

旋覆花四兩白朮各四兩火苓三兩

細功水七升煮二升半分溫三服忌桃李雀肉醣物

東方澤鴻草麻各三兩旋苓枳殼白朮各六兩

細功水六升煮三升分溫兩服小便利甚

澤鴻散姪娘氣壅身憊腹脹浮腫喘急瘧氣漸利

澤鴻桑白皮木通枳殼賓白赤茯苓等分

㕮咀每四分姜四片水煎空心溫服

防己湯姪娘脾虛通身浮腫腹脹滿喘促小便不利

粗末每四分姜四片水煎空心溫服

干金鱈魚湯治胎水不利見前小便不通方中

腎着湯治姪娘腰膝腫疾芩白朮各四兩干姜甘草各二兩

否仁三兩㕮咀每四分水煎空心服

指迷方五皮散治胎水及尋常脾虛腫滿

大伏皮桑白皮生姜皮茯苓皮淨陳皮各等分

㕮咀每半兩水玉盞磨木香水同煎空心溫服一方無桑白皮有白朮倍之

■姪娘傷食

大金木香丸治姪娘傷食

木香二分三棱人參白茯苓各三分細末糊元米豆熟水下三十元

百木散姪娘氣不和飲食易傷

白朮紫蘇各一兩人參白芷各三分炒川芎阿子肉青皮各

半兩甘草一分粗末每三分姜三片水煎溫服

高方小七香元見和劑保氣散見坐月門二方治傷食良効

## 卷十八

十四

鄭氏勝金散治姪婦因食傷胎停於脾胃氣虛冷逼小腹脹痛或腰重大使秘

吳茱萸酒浸淨陳皮川芎干姜炮生姜切焙各一分半甘草炙

厚朴姜制炒各三分細末每三分陳米飯下入鹽煎丸妙濟生加砂仁

■姪娘臘燥

太羹棗湯治姪婦五月無故悲泣不止數父如有祟憑此為臘燥

甘草三兩小麦一升大棗十個

噙水六升煮三升分溫三服亦補脾氣專治婦人亦名甘草湯

■姪娘傷胎半產

孫生芎藭補中湯治姪娘血氣虛弱不能衛養數月而墮名曰半產

乾姜炮阿膠蟬粉炒芎藭五味子各一兩黃芪蜜炙當帰酒浸

白朮赤芍各一兩半木香人參杜仲制炒甘草各半兩

㕮咀每四分水煎無時

鄭氏安宮散治証同上附子炮阿膠炒五味子山藥黃芪炙當帰

熟地黃赤芍木香甘草各一分生姜半兩炒黑糯米一勺炒焦

剉末每半兩苧根子水煎通口服与前方相出入

終

# 水類鉢方卷第十九

## 坐月門

全滑胎枳殼散瘦胎易產六七个月已上可服

綠色厚枳殼去白以糯米同炒赤枳殼性涼得糯米佐之去米取淨二两

粉草一两細末百沸湯調空口三服一方單用糯米洗淨炒熟米飲調者

一方二味加香附子去毛同枳殼等分尤好

內補元姪婦衝任脉虛補血安胎

熟地黃二兩當歸一兩微炒細末蜜元桔子大溫酒下三十元

許李士云姪婦惟在抑陽助陰他藥群隊南山道士枳殼散抑陽四物湯助

陰之劑然枳殼散差寒單服之或致胎寒腹痛內補元佐之陰陽調矣

又立滑胎易產藥性滑利小便車前子即詩云柰官能令婦人樂有子矣

已上二味為末酒調方才止不能飲湯調

神寢元瘦胎滑利易產入月服之神効并治產難

通明乳香半兩別研枳殼制一兩為末蜜元桔子大溫酒空心下三十元

榆白皮散姪娘滑胎易產

榆白皮甘草各二兩葵子一兩粗末每一分水煎溫服一方無榆皮

保氣散安胎寬氣進食瘦胎易產

香附子四兩山藥二兩砂仁一兩木香四分粉草一分益智仁紫蔬各半兩

細末白湯調常服

鄭氏無憂散治胎肥臨產難生者此由不預服滑瘦胎藥入月詳審可服

當歸川芎白芍各三分木香一分半甘草炙一分乳香三分研

礪砂醋煮飛過細研三分髮余燒灰一分半以犧豬心血和之

細末每三分水煎服濟生無礪砂有制枳殼

## 產難門

楊子建十產者正產傷產催產凍產熱產橫產倒產偏產礙產坐產各有據腸產又有小產即半產

產室方佛手散治產前產後諸疾臨產分明生血助氣又名芎帰湯

川芎二兩當歸三兩剉半水半酒煎臨盆急用之兼服下藥

太乙催生柞木飲子治產難既橫或倒胎死諸証神效

生大柞木枝一大根長尺洗剉大甘草五寸剉作五段

新汲東流水三升半同入新絲綿紙三重密封支武火煎一升半令香俟產渴

腹痛腰重可坐草時溫飲一小盞竟不開解如渴再飲至三四盞竟不復渴

不可坐草亦草此上藥張子思秘傳

鄭神散治逆產橫生瘦胎兼產前產後益損月經不調崩漏

百草霜 香白芷不見火等分為末每一分臨產幕時童便并少采醋打散

膏沸湯調下不過再服効血得黑則止此藥大能固血免致裏生

如聖散黃芩抱隨多少倍大熟湯調二分神效或漏血胎乾痛甚三服氣宣

胎滑如無花用子欄州小半合酒調溫過頓服打撲傷損胎死煎紅花酒下子用四十九粒一方研墨或朱砂為衣每四十九粒酒下濟生兼服紫蘇散佳

催生丹治產難十二月鬼腦髓去皮膜研如泥通明乳香一分細研

母子香一分末射香一字細研 右以鬼髓和研元雞頭核大陰乾油紙密封

每二元溫水下隨男左女右握出可驗

指迷方治橫生倒出或先手足者或以鹽涂足脚底抓搔之

如意散催生腰痛方服 人參末 乳香各一分良砂半分

明阿膠炒或用酥滑石末各兩 葵子二合水盡半煎一盞分二服

三朱臨產時以難子清一个調末

以姜汁調開令服如橫倒生即時平順

七聖散治訣同上 延胡索 没藥 白凡 白芷 姜黃 當帰 桂心

各半分細末臨產陣痛時燒鱗刃鉄即犁頭令通赤淬酒調神效

勝金散治胎側有成形塊為兒枕子生枕破敗囊裹其子難產及橫逆生者

射香一分研鹽豉一两以旧青布裹了燒令赤急研細

為末以秤錢燒紅淬酒調下一大分一方時為產母作噴嚏易生

## 卷十九

## 二十

又立產經數日不出子死腹中母氣欲絕

瞿麥穗六兩通草桂心各三兩牛膝四兩榆白皮一升

㕮咀水九升煮三升分溫三服

又立產經三五月胎死不出 大伏子 赤芍藥 榆白皮各三兩當帰一两炒

瞿麥穗六兩通草桂心各三兩牛膝四兩榆白皮一升

㕮咀水九升煮三升分溫三服

飛生毛半分燒灰腋下毛尤佳 公母羊糞燒灰無病女人髮燒灰各半分

竈心土一分朱砂半分別研黑鉢二分用銚子火上溶投水銀半分急攪結成

砂子傾出朱砂研極細右為末粽子角為元公豆大遇難產以倒流水吞之

催生散治同上 以黑鉢一分水銀二分依上方結砂子傾出角熟綿衫角綫作元公

葵豆大臨產時香水吞二元立生

香桂散下死胎射香半分別研 桂心三分為末和勻作一服溫酒調即下

來甦散治臨產用力大過氣暈血悶不省人事

木香 神曲炒 陳皮 麦芽炒 黃芪 生姜炒黑阿膠蛤粉炒

白芍各一分糯米一合半 等根洗淨三分 甘草炙三分

哎咀每四分水煎幹開口灌連進為愈

無藥散治胎氣虛寒藥非產

當歸酒浸川芎 白芍各三分 木香甘草各一分半 制枳殼乳奮別研

各三分 血余灰一分半以豮猪血和之以臘每三分水煎溫服無時

(露壁奪命丹) 暈產忽然氣痿目翻紫面黑舌青沫出口中子母俱殞兩腮微紅

子死母活修合時勿令婦妾難大見

蛇退一條入虎鉗內煅 金銀箔各七片 千里馬路上方勝草枝隻洗燒灰一分

馬鳴退癰退瘻灰一分乳香半分別研麝灰一分黑鉛白半水銀二分半

依前法修治右為末以豮猪血元梅子大倒流水灌三元化開亦可

(秘方益母元) 治產毒橫逆並安胎順氣益母草其葉類火麻葉莖方花紫色白者不

是五月可採其葉莖陰干不見日忌鐵器以石磨為末蜜元彈大每元暗產用童

便溫酒送下若氣不順木香參湯并艾醋湯下此草俗呼作豬麻

(郭稽中) 產後二十訛中黑神散治胎死腹中但看始婦舌脣青黑舌冷沫出母子俱死

乾姜炮桂心當帰芍藥甘草炙生半地黃黑豆炒去皮各一分

細末作四服溫酒調尤心暖胎活自出而赤舌青子死母活舌青沫出而死子活

(奪命丹) 胎衣不下血脹中心胸痛或胎死腹中為孤陽絕陰難治之証

大黃四分醋熬膏子附子炮二分牡丹皮四分干漆一分炒大煙出尽以雞

子白制腸胃生薑為末同膏子入雞子清杵勻元梅子大溫酒急下五元如失

下用前瞿麥滑石二湯如神知聖三方併進洪氏方益胎衣不下血脹心或產前失

血胎乾過用破血藥血轉澁不行用苧麻或根煎湯喫得嘔吐衣即下又法令人

寸口澁疾不調死沉細附骨不絕生

卷十九

三

(上) 婦后以兩手抱挾心前防胞湊心後口出仍以草麻子七粒去殼研塗兩脚心下

了即洗去草麻甚効仍以鞋底炙熱熨小腹上次進奪命丹

(大全脉去新產之脉) 即離經實大弦急死分明若得緩活沉少吉忽若堅牢命不傷

寸口澁疾不調死沉細附骨不絕生

立產後門

(大全集黑神散) 治產後惡露不尽胞衣不下攻心胸痞滿或腹脇堅脹撮痛

及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾濟生方除蒲黃加附子

熟地黃蒲黃炒當帰乾姜炮桂心芍藥甘草各四兩黑豆炒去皮半升

細末每二分酒半盞童便半盞同煎調服前郭稽中方無蒲黃

(四味湯) 產後一切諸疾方分晚與一服尤妙

當歸心膈煩加半分延胡索氣悶急加半分血竭惡露不快加半分

沒藥心腹撮痛加半分各等分為末每一分童便盡前六分通口服

全露散產後乳脈行身體壯熱疼痛頭目昏疼大便澀涼膈壓熱下乳

人參白茯苓川芎各半兩苦梗炒川芎白芷各一兩當帰一分芍藥三分

為末每三分水煎溫服如煩熱甚大便祕加大黃二分半

(理中丸) 治新產血傷臟腑腹瘦氣乏多汗氣血不調常服補虛養氣除余疾

甘草二兩一方三兩白朮人參干姜各一兩為末蜜元梧子八米欽製蜜丸

繞產則必以童便打開調服七日內三服產后月內通行紅絡人有功歸不靈  
益多藏府燥當倍用甘草用蜜潤姜木當當歸元煎服之名順理生元  
黑龍丹治產難胎衣不下產後血暈不省人事惡露不尽腹中刺痛與心經語言  
恍惚危急死者甚少見十三卷癲癇門神效無不全活

傷寒括要當歸散產後氣血俱虛慎勿大補恐增客熱致他疾常令惡露快利  
當歸芍藥川芎黃芩各兩白朮半兩細末童便或酒調二分

琥珀散治產後一切危急之疾琥珀朱砂麝香香墨醋炙姜蜜當歸各一分  
鱗魚鱗炒焦桂心百草霜白附子肉桂炒金燈草篩淨各半兩

細末炒生姜熱酒調二分奇效

許仁卿方治產後雖甚通利但腹滿悶脹咳嗽不便不通眼澁行坐腹時痛  
白不當歸桑白皮大黃各三兩細辛桂心各一兩生姜四兩

咬噴水二升煎一升分三服當得利微即止大黃產後不可輕用此緣病熱不得已也  
花藥石散治產後惡露不及產量氣絕胎衣不下胎死腹中心頭尚暖兼治金瘡打馬  
花藥石一斤上色硫黃四兩二味拌勻細筋和鹽泥固濟瓦罐子一個干入藥密泥  
封口候乾安在四方磚上書八卦五行字以炭一秤籠疊周匝自己午時後下窖  
漸上徹直至經宿火冷炭尽又放經宿罐必取出細研給羅至細末合收各  
金瘡打傷體出血者急以繆之其血自化為黃水血入臟府熱煎童便瀉  
婦人產後敗血諸証並用童便調下

卷十九

四

牛膝散妊娠五六月墮胎胞衣不出牛膝川芎朴消蒲黃各三分

桂心半兩當歸兩半粗末每四分姜三片生地黃一分煎溫服

和劑芎帰湯加減治產後去血過多量煩不醒

當歸洗焙川芎各等分腹中刺痛加白芍藥煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加姜  
白芍藥水停心下微有嘔逆加茯苓生姜虛煩不眠加入參竹葉大便閉塞  
熟地黃陳皮杏仁小便不利加車前子腹脹加制厚朴血崩不止加禹  
香附子峻寒多加柴苑半夏生姜腰脹痛加半胱心下疼痛加玄胡索  
惡露不下腰腹重痛加牡丹皮

產後惡露不下惡露不絕惡露未尽兒枕

大金治產後三四日惡露不下吐逆壯熱此風冷乘虛搏血血滯不宣也

芍藥十分知母八分生姜當歸蒲黃各四分紅花二分生地黃汁二合

荷葉中心蒂七个細切水二升煎七合入蒲黃煎而沸分溫三服空心

和劑生料五積散產後惡露不快腹痛或有塊及發寒熱加醋少許煎通口  
服亦治

沒藥元治產後惡露不行忽絕并作寒熱脅腹百脉皆痛甚如錐刺

當歸一两桂心芍藥各半兩桃仁去皮尖炒碎研沒藥研各一分水蛭炒

蜜虫去足翅炒為末醋糊元碗豆大醋湯下三元

紅物散產後惡露淋漓不絕羸弱心悶頭目昏重五心煩熱面赤體瘦不思食

精病 川芎 熟地黃 白芍苓 龍骨各一兩 繡斷 當歸炒 生薑酒燉

人參 五味子 地榆各半兩 甘草一分

細末每二分 姜三片東一个水煎空心服仍先服黑神散推陳生新

溫隱居澤蘭湯治產後惡露不尽腹痛性來無腎滿少氣

澤蘭熬 生乾地黃 當歸各三分 芳藥 生姜細切罐頭大料卷上炒令焦各十分 甘草六分 大棗十四個 細切水九升煮三升分三服欲死塗身得差

(又方)產後下血不尽腹內堅痛不可忍

當歸 芳藥 桂心各三兩 桃仁一百千個制水六升煮二升分溫二服未差加大黃

(又方)產後血結不盡腹中絞痛不止 大黃別浸 生乾地黃 當歸各十分 川芎

芳藥 桂心各八分 甘草 黃芩各六分 桃仁四十九粒製

細切水七升煮二升半入大黃更三沸分溫三服

(又產後血下不尽腹中痛無計 青水香 當歸 牛膝 川芎 黃芪 芳藥各八分 大黃十三分浸芒硝十二分細切水七升煮二升入大黃更三沸分三服

(又產後惡露不尽 結聚小腹疼痛 當歸三分 制香附子一兩 瓔珀 没藥

青皮 赤芍 木香 桂心各半兩 細末以烏豆淋酒調二分

(產室)產後餘血作疼痛兼塊者

桂心 姜黃等分 細末酒調方可止血下尽炒

(產乳方)玄臺散 產後惡露不尽 血結刺痛名血母塊及心腹諸疾

## 卷十九

### 五

芸薹子紙炒 當歸 桂心 赤芍等分 細末酒調三分 產後可常服  
延胡索散 治產後胎中宿血凝結名曰兒枕疼痛不止久則變成疝瘕

延胡索 當歸 各一兩 瓔珀 蒲黃各一分炒 赤芍半兩 桂心三分

紅藍花二分 細末童便和酒溫調三分空心服

(又方)惡露敗血走刺心腹兒枕痛坐卧不得

乾姜三分燒蓋餅中存性附子半个炮細末童便調痛止血下

(產後餘血捲心痛 腹痛 腸脹痛 身痛 腰痛 腳氣

濟生大山石蜜湯 產後氣虛宿冷搏血逆上沖心絡止真心痛也

熟乾地黃 當歸 川獨活 吳茱萸 白芍 乾姜炮 甘草灸 桂心 小草各二兩

淨細辛半兩 吻咀半兩水煎熱服大急用生乾地黃能去痛熟者泥血甚良

和劑失笑散 治產後心腹絞痛欲絕百藥不效亦可以膏肓作元

五更脂酒研淘去沙土蒲黃炒等分為末醋調三分服熬成膏水盞熱服

慈心蠶蛾湯 產後心痛此太寒所致

蜀椒二合 芳藥三兩半夏 當歸 桂心 人參 甘草 茯苓各二兩

生姜汁五合蜜一升

水九升煮糊令沸下各藥煮取二升半下姜汁蜜更煎取三升每服五合至太冷

治新產後七八日腹並兩脇痛 當歸 刘寄奴 苦梗各十二分 延胡索散剝鰣

陳皮四分 茯苓為藥各分咬咀水煎煮合調延胡索末空心服

又立治先患冷氣因產後發腹痛 川芎 桂心 當帰 吴茱萸 薑

芍藥 白草各六分 桃仁酒十分 咬咀水半升煎二升分三服

全金桃仁芍藥湯 治產後腹痛 相半朴 芍藥 川芎 當帰 桂心  
乾漆碎熬 白草各二兩細切水入朴煎二升半分三服

(子)全治產後餘疾腹中絞痛瘦之不食

當帰 黃芪 芍藥各六分 乾地黃 白朮各八分 桂心 甘草各四分

大棗十四個 咬咀水二升煎六合空心三服忌生葱

(子)全茱萸酒治心腹內外痛 吳茱萸一升酒三升煎一升空心分三服

(姜)黃散 治產後腹痛沒藥一分 姜黃末三分水同量便各半煎通口服立止  
延胡散產後小腹脇下痛 延胡索 桂心各半兩 當帰一兩細末熱酒調

(經效)產後血氣脹痛

當帰十二分 芍藥 苦梗 賓郎 制枳殼各八分 桂心 青朮 香柴 胡各六分  
咬咀水二升煎六合空心溫分二服

(和)剖當帰養血丸 治惡露不尽 發熱 身痛 經閉

肉桂一兩 當帰 牡丹皮赤芍 延胡索炒各三兩

烏末蜜元桔子 天空心溫酒下五升元一方加川芎 義木 乾姜可作咬咀

(和)剖四神散 產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

當帰 川芎 乾姜赤芍等分 細末溫酒調二升

## 卷十九

### 六

濟生增損物湯 產後陰陽不和作寒乍熱惡露停滯亦令寒熱但看  
小腹急痛為異 當帰酒浸白芍 川芎 人參各二兩 甘草炙半兩

乾姜一兩 咬咀每四分 姜三片水煎無時

(又)方 小烏沉湯燒荔枝核灰研和服

黑龍丹 產後惡露不尽 腹中刺痛 方見十三卷癩瘤門

(當)歸羊肉湯 發熱自汗肢體疼痛名曰蓐勞 猪腰子粳米葱根鹽醋作粥佳  
當帰酒浸人參各七分 黃芪一兩 生姜半兩

咬咀用羊肉一斤 蒸清汁五大盞去肉入前藥煎四盞作六服頻進

(趁)痛散 產後百節間張血脉流散遇氣弱則經絡肉分間血多流滯累  
日不散則骨節不利筋脉急引故腰背手足不能轉動疼痛身熱頭痛多  
作傷寒治之則汗出而筋肉潤動手足厥冷變生他証 濟生加姜或桑寄生  
牛膝半兩 甘草 蔴白各一分 當帰 桂心 白朮 黃芪 独活 生姜

各半兩 咬咀每半兩水煎空心三服評曰趁痛散不特治產後氣弱血滯  
兼治大陽經感風 頭疼腰背痛自汗發熱若其感寒傷食憂恐驚  
怒皆致身疼發熱頭痛況有蓐勞諸証本甚趁痛散皆不能療不若

(和)剖五積散 入醋煎用却不妨

(又)方 治產後風冷腰痛者 腎繫於胞脉腎主腰也

桂活 川芎 芍藥 桂心 繢斷 生姜 桑寄生各分 當帰 防風各分

喉水三升 煎取空分二服

(如神湯治男子婦人腰痛 延胡索 當帰 桂各等分一方無當帰者

杜仲細末溫酒調二升空兼服生料五積散加桃仁亦炒逐服血去風濕

(五香連翹湯治產後心虛露方行忽淋腰中重痛下注所服刺痛如錐入骨此鹽瀉

經絡不即通之有大痛處必作癰疽宜預服之

木香沉香一升乳香射香半麻獨活桑寄生連翹木通各一兩

㕮咀每半兩加竹瀝少許水煎溫服

小續命湯治產後熱渴嘔吐驚悸心煩嘔氣上為肺氣之証宜服之加本瓜前或畏

附子去甘服獨活寄生湯濟生若嘔者去地黃倍加生姜

產後中風者訛

中風証治具見鉢大第卷等於產後血氣俱虛所下過多虛極生風有暴虛冒

悶汗出不省或呴聲皆滯以故眉狀搖頭罵鳴用弓反張汗出如雨不勞而成產者

有心血不統諸臟俱虛心驚叫喚狂言語語如見鬼神眩暈昏悶不語者治法不同

(參集小續命湯治中風剛柔二產方見卷中和剂中風門又引二因方云產後汗

出多變產服此湯有麝薰桂防已黃芩不若大豆湯然涉人書言尼剛柔症

小續命並可加減若痓症自汗者有去麻黃加葛根之說古人之意當詳於此

(大豆紫湯治產後中風汗出多變產頭眩惡風噤皆強直視爛闊

川獨活黃芩羌活各一兩半 大豆黑大者半斤 酒三升煎強活十沸次炒黑

豆煙出急投酒中密封候冷去豆每服一合得少汗愈日服能去風

消血結如姪姪折傷胎死腹中服此得愈一方無独活以豆淋酒調荆芥等

活人桂枝加葛根湯治自汗口噤角弓反張名剛痓名葛根湯三方見前活人書

愈風散治產後中風口噤緊急角弓反張或血暈不省立渴欲死

荊芥穗炒焙為末每三升豆淋酒或童便調下或古老分煎湯調口噤者灌齒

斷藥者吹鼻中一名舉卿古拜散蓋功肺隱語古人秘重以有神効

當歸荆芥穗等分細末酒水同煎灌下但下咽即有生理不可以尋常藥味忽之

(參集產後中風口噤四肢強痙不仁角弓反張

羌活防風各三兩黑豆一升炒令煙出細剉酒量湯內浸肘溫飲當汗出瘥

(經效治產後中風腰背強直肘或反張名風癇

防風葛根川芎地黃各一兩麻黃大節甘草 桂心獨活防己各六兩

杏仁制炒五個細剉水八升煮麻黃去沫後下諸藥煎取二升分溫三服有汗者勿服

(參集產後中風口噤不能言身體強直羌活防風秦艽桂心粉草

葛根各三分生姜一分附子炮一个 制杏仁十八枚麻黃十分大節湯使同上

卷十八

七

麝香研五灵脂糖蜜潤者水潤去沙生硫黃別研玄精石別研極細而炒器微炒再研阿膠炒生卷柏焙桑寄生無以續斷代淨陳皮各等分後四味細末和前藥生地黃汁和元悟子大每半元空心當歸酒下

麻黃根散治產後虛汗不止此陰血裏虛陽氣表實陽加於陰二虛不復遇風則變為癆或虛之羸瘦者空心燥經水斷絕津液竭也

當歸黃芪麻黃根牡蛎煅為粉人參粉草各等分

㕮咀每西分水煎溫服

千金治產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸

甘草炙一兩附子炮半个桂考藥各一两半

㕮咀每三分姜四片棗不水煎空心溫服忌猪肉  
水生葱

經效產後汗出不止黃芪十二分白朮牡蛎茯苓防風麥門冬去心

牛地黃各八分大棗七个㕮咀水二升煎七合空心分溫三服

入參湯產後諸虛不足發熱盜汗入參當歸等分為末以豬腰子一隻去脂膜切小片以水三升糯米半合葱白一條粳米熟取清汁入藥一分煎溫服無時

正汗散產後盜汗不止應多汗者皆可服牡蛎煅研細小麦麸炒全黃為末

右等分研細煮生豬肉汁調下一分無時

又方產後忽冒悶汗出不識人暴虛也破雞子三枚吞之便醒若未醒與童便一升

甚驗亦可作竹瀝汗五合不醒再与三五服瘥

清菟散治產後血氣暴虛血隨氣下眩暉悶絕口噤神昏氣冷若作暗風治誤矣

澤蘭葉人參各一分荆芥一兩川芎半兩菖蒲湯可煎服仍用潔煙醋炭薰

為末溫酒熱湯各半盞調急灌之咽即眼開氣定一本有甘草二分

又方產後血暉狂言煩渴不止

生香附子去毛為末每一分姜三片棗一个溫服

又產後血暉危困生地黃汁一大盞當歸一分赤芍一分

剉水煎三五沸溫服如齊煩熱去當歸入童便服尤佳

和劑大聖澤蘭散治產後因驚敗血中心昏悶發狂如有鬼祟凡產前後諸病通治

澤蘭葉石膏研各二兩白朮芩卷柏柏子微炒別研防風制厚朴細辛淨

桔梗吳茱萸泡炒各一兩人參藁本干姜炮五味子白芷川椒閉口者炒出汗

白朮黃芪川烏炮丹參各三分當歸制蕷夷微炒赤甘草炙川芎芍藥各一兩三分生地黃一兩半肉桂一兩一分白朮半兩阿膠炒半兩

細末每二分空心臨卧熱酒調下加辰砂末一字前酸早仁湯調一服安

琥珀地黃元治產後惡露不行增寒發熱如瘧日明了暮則譖言當作熱入血室

琥珀別研延胡索橘米炒米當歸各一兩蒲黃四兩炒香生地黃梨汁留滓

生姜各二斤研汁同沖以姜汁入器內炒地黃澤以地黃汁炒姜澤各令汁干為末

鮮杏仁當歸湯化下兼服四物湯只用生地黃加北柴胡煎未退小柴胡加箭頭散

又力壯後服此常心發熱狂等症者

乾荷葉生地黃牡丹皮各等分三味同煎湯調生蒲黃二升服定

調經散產後血虛心無所主煩躁不安乍見鬼神言語顛錯

沒藥 琥珀並細研桂枝各一分 炙藥 當歸各一分 蜈蚣研細各半分

為末每半分姜汁同溫酒調下

稻子仁散產後血虛挾邪攻心狂言亂語

稻子仁遠志志人參桑寄生防風琥珀別研當歸炒生地黃焙甘草等分粗末先用白羊心一个切片水一盞煮九分去羊心入藥末五分煎無時

扶神散產後血邪心神恍惚言語失度睡卧不安

扶神一兩人參龍齒研琥珀研赤芍黃芪牛膝各三分生地黃一两半桂心半兩為末每三分水煎溫服無時

七宝散初產後調和血氣補虛安神厥驚悸

辰砂研桂當歸川芎人參茯苓羚羊角燒存性各二分乾姜一分為末每分用羌活豆淋酒調心煩熱悶加麥門冬志更加痛重便調

心胃煩熱即減姜桂苓即加之腹痛加當歸心悶加羚羊角心虛氣怯加桂不食或恶心加入參虛顫加茯苓

二方產後心虛驚悸神思不安龍齒黃芪白薇生地黃各二兩人參茯神遠志肉桂各三分甘草桂防風各半两一方無黃芪有京芥與銀

卷十九

九

粗末每三分姜三片棗一个水煎服無時

三方產後藏府虛心怔驚悸言語錯亂麥門冬志人參各八分生黃研

白薇各二分扶神獨活遠志生地黃朱砂飛防風天竺黃甘草龍齒研各四分龍腦射香並細研各一分為末薄荷酒調二分

二方治血虛多驚及產後敗血諸疾

辰砂琥珀沒藥並細研當歸為末等分每三分空白湯日三服

三方產後心氣虛搐牽驚狂語歌哭嗔笑不定生銀一斤桂心甘草各六分全參

生姜遠志扶神各八分細辛四分生地黃二十分龍骨三分棗子一个

咬咀水八升煮銀至一升半入藥煎一升分溫三服

水六升煮三升下竹瀝再煎取二升溫分三服

二方產後心驚中風防風當歸茯苓防己麻黃各八分秦艽人參

水七升先煮麻黃掠去沫下諸藥入竹瀝煎二升半溫分三服急松葉猪肉塞

大益散治產後狂言精神昏亂心氣虛外邪所攻茯苓生地黃各三分遠志白芍

龍齒各十分防風人參獨活各八分同作末茶一斗五升煮銀一斤取七升井鹽煎取三升溫分三服忌同上方產後風邪挾心神恍惚加京朴八分甘草各

生金湯產後心虛怯慄不定亂言恍惚

參草芍藥當帰生姜

八分遠志茯苓各半分桂枝分麥門冬大棗各十二分

為散水八升煮三升分溫三服

七珍散產後敗血閉心氣通於志氣閉塞古強不語地黃赤芍藥當帰代

人參石菖蒲牛膝地黃川芎各一兩細辛一錢防風辰砂別研半兩  
細末每一分薄荷湯調無時清茶炙甘草半兩名七珍散

胡氏疏風散治產後閉目不語白凡研細一分熟水調下

經效治產後風虛頭目痛語言邪僻防風乾葛茯苓各三分芍藥黃芩各六分

方產後中風心神忪悸恍惚言亂人參六分羚羊角屑麥門冬茯神各八分  
黃芩白鮮皮甘草各四分石膏十二分竹瀝兩大合水二升煮七拿竹瀝分三服

二方治產後中風身背拘急如束井渴川芎羌活羚羊角屑酸旱仁  
芍藥各四兩桑白皮六分防風五分㕮咀水四升煎二升分溫三服

三方治產後中風四肢拘束筋節掣痛不得轉反如角弓反張

麻黃八分去根節生姜桂枝白朮各三分防風芍藥各六分川芎五分  
竹瀝二合右剉水三升煮麻黃去沫下諸藥煎七拿竹瀝再三沸分服

獨活酒產後中風睡卧不安筋脈四肢牽急或強直  
獨活天麻防風各二兩桂心當帰荆芥川芎蔓京子各半兩麻黃赤芍

附子炮羚羊角屑赤芍各三分㕮咀每分水酒各半煎溫服取微汗

二方產後中風四肢牽急疼痛難項強直心神煩悶

羌活防風附子炮羚羊角屑麻黃赤芍各二兩地黃桂心各三分黃芩

酸旱仁炒當帰牛膝川芎草薢各半兩細末蜜元楂子大溫酒下三十元  
蘇生逐痛散產後血量不省血入心經語言恍惚

黑龍丹產後血量不省血入心經語言恍惚

一產後虛煩口乾痞悶血渴

全薤白湯治產後胃中煩熱逆氣薤白半夏甘草人參各二兩

桔梗根三兩麥門冬半升㕮咀水半升煮四分五服熱甚加知母一兩  
人參當帰湯產後煩悶不安人參當帰麥門冬桂心乾地黃各一兩

大棗二個粳米一升淡竹葉三升芍藥四兩

㕮咀水斗二升先煮竹葉及米取八升入藥煮三升分三服若煩悶不安取豉一升  
水三升煮一升盡服之良

甘竹湯產後內虛煩熱短氣甘竹茹一升人參茯苓甘草各二兩

生姜三兩大棗十二個細切水半升煮竹葉小麥取八升入藥煮三升溫服  
若虛悸加入參二兩少氣力加粳米五合一方更加茯苓

和剂人參當歸散治產後大血過多血虛則陰虛二生內熱心煩煩滿氣鬱

亂暯時輒甚與太病後虛煩相類

生半地黃人參當歸肉桂麥門冬去心各一兩白芍二兩

哎咀每四分水二盞先以粳米一合添竹葉一片煎米藥并棗三不煎過

服血熱甚者加生地黃

見現元產後血氣虛耗口乾煩悶心下痞滿飲食難傷

姜黃三棱草澄加淨陳皮良姜人參義木等分

細末以蘿蔔浸煮爛研以汁煎熟元祐子大蘿白湯下三十元

產室治產後大渴不止芦根切一升桔梗人參甘草茯苓各三兩棗二十个

麥門冬去心四兩水九升煮人參三分服頓服忌菘菜

並以醋浸一宿焙干為末每一分冷陳皮湯調下

楊氏黃芩散產後血渴飲水不止黃芩麥門冬等分水煎溫服無時

延胡散產後血渴不止延胡索蔚金干葛桂心青皮枳殼制等分

熟地黃酒蒸焙人參麥門冬去心各二兩甘草炙半兩桔梗根四兩

哎咀每四分水盡半粳米一合姜三片棗三个煎服

產後乍寒乍熱成瘡疾若敗衆散所致增損四物湯薰奪命丹

天全增損四物湯產後陰陽不和乍寒乍熱或惡露未盡入肺則熱入脾則寒但小便

急痛為異方見前產後腹痛門評曰敗血未可止言入肺脾二藏大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可言敗血循經流入閉諸陰陽

寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休再會則復作天調經散五積散等

天調經散產後血虛寒壯熱一夜三五次發惡語口中生瘡時干嘔因之悶絕

大豆一兩半炒去皮茯神一兩琥珀一分細末濃煎烏豆紫蘇湯調

產室治產後惡寒壯熱人參獨活白鮮皮葛根防風竹茹遠志各六分茯神八分白芍十分

玄參十二分竹瀝二升半右銀一斤水一斗五升煎七升入諸藥取三升分三服

知母湯治產後乍寒乍熱涼膈散溫壯心肾煩悶

知母兩分桑黃芩各二兩甘草各一兩

父祖水五升煮二升半分一服一方除桂心加生地黃

草菓飲子治產後癰瘍多寒者肉豆蔻草菓仁厚朴生半夏陳皮

制半夏赤茯苓甘草炙草菓炮川芎陳皮白芷各三分淨青皮

良姜紫蘇各一分乾葛芩

哎咀每三片姜三片棗二個水煎當發日侵早連服三服

生熟飲子治產後癰瘍多寒者肉豆蔻草菓仁厚朴生半夏陳皮

甘草大棗去核生姜八味等分剉和一半生一半用濕紙裹煨令香熟

打和平生者每服半兩水二盞煎服與西獸飲相似半生半熟亦有法

產後蓐勞

不全論婦人因產理不順痰極筋力更勞思慮致令虛羸喘乏寒熱如癲頭痛自汗咳嗽痰逆腹中病刺名曰蓐勞

呂子湯產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢瘦弱面色痿黃為蓐勞

猪腎一双去脂膜四破香豉一方無此有知者葱白粳米當帰芍藥各二兩

㕮咀分作三劑水三升煮一小时去滓分三服方無芳藥有人參

許仁則治產後日淺起居勞動大過頭脣肢節皮肉痛乍寒乍熱

猪腎制依忘當帰芍藥生姜各二兩葱白切桂心各二兩

水八升煮腎取六升下藥煎取二升分溫三服

胡氏人參薑甲散治同上兼咳嗽頭目昏痛盜汗寒熱背膊拘急沉困在床

人參桂心當帰桑寄生白茯苓白芍桃仁熟地黃甘草麥門冬各半兩續斷一分牛膝三分薑甲丸黃芪二兩

㕮咀先以猪腎一双去筋膜水二大盞姜半分裹三不煎一盞去滓姜裹入藥末

一茶三十烏梅一個荆芥五穗煎七分空心溫服神妙

孫太保增損榮胡湯產後虛羸發寒熱飲食少腹脹

北柴胡人參甘草半夏陳皮川芎白芍各等分㕮咀姜五片裹不食后溫服

卷十九

十二

熟地黃散治蓐勞體虛氣乏四肢煩疼時作寒熱不思飲食

熟地黃人參白芍白茯苓白朮各一兩續斷黃芪桂心五味子

當帰麥門冬川芎各三分㕮咀姜三片裹不水煎溫服無時

一方產後大虛心腹急痛氣壅心氣息乏黃芪白朮當帰甘草人參

各二兩生姜四兩先以白羊肉三斤去膜水斗九升煮汁五升下藥煎三升分溫三服

二產後嘔逆霍亂

天全抵牾散產後敗血散於脾胃腹脹滿悶致生嘔逆洛生素赤芍澤蘭倍加生姜陳皮

赤芍半夏澤蘭葉人參陳皮各一分甘草炙一两生姜半兩培水煎熱服

丁香散產後脾胃氣寒痛悶吐逆丁香人參蜜即白朮桂心當帰厚朴

前胡各三分甘草半兩良姜一兩㕮咀姜三片每四分水煎空心服

白朮散產後霍亂吐利腹痛煩渴手足逆冷

白朮淨陳皮麥門冬人參乾姜各一兩甘草半兩

粗末每四分生姜五片水煎溫服

附子散治証同上附子白朮當帰吳茱萸桂心人參丁香淨陳皮甘草

各半兩細末米飲調即理中元散加減虛冷甚者兼來復丹妙

良姜散產後霍亂吐利腹中疼痛良姜當帰草豆蔻仁等分為末米飲下

產後傷寒

全論產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之多是血虛或敗血作梗

無虛督陰虛也。蓋盛陽以湊故發熱，宜以平和藥，與服必效。如玉露散，龍虎丸。  
前產後諸疾方內，或溫物湯用生地黃加北柴胡等分煎服，或人參當歸散，或  
羌鰐甲散，參輕骨散（人參百斛散，道遇散選用，近見產後發熱，不退，需  
少少胡湯，稱葉名膏湯者多不效，又有見崩漏失用溫劑，其熱愈盛而悞者，不詳。  
產後去血過多而陰虛發熱，亦有寒極生熱者，若陰陽不和，且增益四物湯，如敗  
氣不散，宜奪命丹，調經散五積散加醋煎，却效方見前。

〔矣。當歸散。產後陰虛生熱，心腎煩惱，頭痛短氣，骨節疼痛，晡時輒甚，與大  
病虛煩相似。人參、當歸、牛干地黃、桂心、麥門冬各一兩。

白芍二兩，㕮咀每半兩水二盞，先以梗米一合，淡竹葉十片煎一盞，藥去米，華加棗

二个，前溫服，虛甚者用熟地黃。

增損柴胡湯。產後發寒熱方見前。參勞中。

〔陽旦湯。產後傷風，十數日不解，頭微痛，惡寒時有熱心下堅，乾嘔汗出。  
方見活人書。有汗者去桂加附子炮一个，渴者去桂加爪姜根三兩下痢者去

芍藥加乾姜三兩心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者去桂陽

旦湯主之前時入膠飲為佳。若脈浮緊無汗發熱者，莫与也。

〔芍藥湯。

產後虛熱，頭痛，身體發熱，兼治腹中拘急疼痛。  
桂心三兩，牡蛎、白芍各五兩，黃芩二兩，牛干地黃五兩。

㕮咀每半兩水煎溫服，千金云：若通身發熱，方加黃芩。

## 卷十九

十三

〔產後喉中氣急喘促咳嗽。

夫全論產後所下過多，榮血暴竭，衛氣無生，獨聚肺中，故令喘也。此名孤陽絕陰，  
為難治。若惡露不快，敗血上薰於肺，亦喘急，但服奪命丹方見前。產後中血，  
去而自定。

〔旋覆花湯。產後傷風，感寒暑，溫喎嗽，喘急，痰壅盛，坐卧不安。

旋覆花、赤芍、前胡、半夏、荆芥穗、甘草、茯苓、五味子、杏仁。

麻黃各等分，㕮咀每半分，姜五片裹一个水煎溫服，有汗者勿服。

〔參蘇散。產後血於肺，咬穀宜服。如傷風寒，則旋覆湯等主治。

人參一兩，別為末，蘇木二兩，槌碎，濃煎，調參末，灌神效不可言。  
〔三母散。產後敗血，入於肺，咬穀宜服。如傷風寒，則旋覆湯等主治。  
知母、貝母、白朮、杏仁各半兩，桃仁、杏仁並生去皮尖各一分。

細末每三分水煎溫服，無時如腹痛併服之。

〔產後咳癆。

〔丁香散。產後心煩，咳癆不止，脾胃虛寒，衛氣犯逆。

丁香、白豆蔻、仁各半兩，伏龍肝一兩，細末，煎桃仁、吳茱萸湯調下，一勺。

石蓮散。治氣吃噫，又治嘔逆。

蓮肉炒一兩半，白朮苓一兩，丁香半兩，細末每三分，米醋調下，無時。

羌活散。治欬逆。

羌活附子炮，茜草炒各半兩，木香、白姜炮各一分。

卷之三十一

產後月水方 調 血崩

曉珀散 產後經脈不調四肢煩疼瘦弱感食

曉珀 牛膝 生乾地黃 當歸 各一兩 桃仁 赤芍 各半兩 以蜜煎 三片水煎溫服

姜黃元 產後虛心膏短氣腹內緊急腰背疼痛月水不調

姜黃 當歸 熟地黃 牡丹皮 厚朴 桂心 川芎 繢斷 桃仁 白朮 各二兩

赤芍 木香 各三分 羚羊角屑 一分 細末 藝元 楠子 大心 快溫酒下三十丸

固經元 產後所過多勞役傷損致血暴崩或鹹酸不節所致此謂重傷

文葉赤石脂 櫻桃膏 脂肪木賊 各半兩 附之 不炮一方裹附子用十枚元

為末陳米糊元梧子大煎 蒼歸湯加藥下二十元或溫酒下

熟地黃散 產後崩中頭眩神昏四肢煩亂不知人事

熟干地黃 伏龍肝 黃芪 赤石脂 各一兩 阿膠 甘草 白朮 艾葉炒

川芎 人參 各半兩 當歸 三分 㕮咀 三分 姜三片水煎溫服

二方治証同上 熟地黃 赤石脂 各一兩 鹿茸 牡蛎 當歸 各半兩 細末米飲調

一產後四肢浮腫

大全方 產後敗血乘虛停積五臟循經流入四肢浮腫若作水氣用導水藥解

虛人產後失治是謂重虛矣

小調經散 治產後面目四肢浮腫血行則腫消濟生有甘草三分 麝香 加生龍膽薰

滯經絡氣分血分不可不辨 小調經散 治血分固變但力淺不若吳茱萸湯

枳木湯 六調經散皆要藥也

加減吳茱萸湯 治產後臘氣暴虛邪為勝宿疾轉增并治婦人諸疾

吳茱萸一两半 苦梗 千姜 甘草 麦門冬 防風 半夏 細辛 當歸

赤茯苓 牡丹皮 桂心 各半兩 粗末每四分水煎空心熱服

枳木湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實一兩半 白芍三兩 吻咀每四分水煎溫服中軒即當散也

經驗治產後遍身青腫疼痛產後血小疾

乾漆 大麥蘖等分為末新瓦罐中鋪一重麥蘖一重干漆如此填滿用繩繩

固濟火煅通赤放冷研為散但產後諸疾熱酒調下二分

張氏治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉 防己等分為末每三錢溫酒調不飲者醋湯調

產後腹痛及癲癇

且詳六通七清冷熱兩圓赤帶下有名曰通審

全調中散產後腸胃虛怯寒邪所乘洞泄不利腹脹腹痛消生有

人參半兩

良姜當歸桂心芍藥附子炮川芎各一兩甘草半兩

哎咀煎熱服

黃連元產後冷熱痢黃連六兩烏梅三兩乾姜二兩

細末蜜元桔子大米飲空心下半元忌猪肉

救急方產後赤白痢腹中絞痛芍藥阿膠艾葉各二兩乾地黃四兩生

當歸甘草各一兩水二升煮八合分二服憲

必效方新產後赤白痢心腹刺痛薤白切一升當歸二兩酸梅皮三兩

地榆四兩粳米五合阿膠人參甘草黃連各兩半

水六升煮一升一方有厚朴一千金只有前五味

廣濟產後腹痛氣脹肋下妨滿不食燕微痢

茯苓人參厚朴各八分甘草半陳皮當歸黃芩各六分一方無黃芩有

生姜細末米飲調

赤石脂元產後下痢大治冷痢青色鷺溏

赤石脂三兩甘草當歸白朮黃連乾姜秦皮各一兩川椒附子各一兩

細末蜜元桔子大酒下二元忌猪肉冷水菘菜

平金桂枝湯產後餘寒下痢腹血赤白日數十行腹痛時二六血

桂心乾姜甘草各三兩赤石脂十兩當歸三兩附子一兩炮蜜一升

卷十九

十五

細功水七升煮三升入蜜再煎三沸分服一升

逐効產後人痢津液竭渴不止龍骨土一分厚朴茯苓黃芪

麥門冬人參各八分生姜六分大棗十四個

水一大升煮七合空心分二服

產後六便秘滯

全方云產後腸胃虛竭津液不遺大便遂秘若過五六日腹中悶脹此有癰

屎宜麻仁元

麻黃枳殼人參各四分大黃二分煨

為末蜜元桔子大空心溫酒下二十元未通漸加元數不可大過

阿膠枳殼元產後虛羸大便秘滯

蘇麻油產後脾胃多汗汗則大便秘津液竭致此老人諸虛風秘更効

紫蘇子大麻仁子二味各三合洗淨研細用水再研取汁一盞分三次煮粥啜之

橘杏元產後体弱大便虛秘方見前卷秘結方中

產後大小便不通小便痛滯血淋小便不禁遺尿出血

驥驗產後津液燥竭大小便不通一方用甘草山楂仁

考藥

大黃枳殼麻仁等分細末蜜元桔子大空心熱水下二十升

集驗治產後患淋小便漏此藥屬瘀血者虛前當安靜產後當思透血

通草三兩 大棗半個 茼蒿子一升 白朮一兩 榆白皮五兩 石韋

黃芩各二兩水一升煮至半升空心溫服千金有甘草生姜

滑石散治產後淋 滑石五分研通草車前子 茼蒿子各四分

細末以鹽水水調方寸匕

二方產後小便澁痛或血淋者

瞿麥 黃芩 冬葵子各一兩 通草三兩 大棗十二不水七升煮三升分二服

二方產後血淋 車前子 瞿麥各四兩 黃芩三兩 磬金末一兩

水六升煮三升分三服

木通散產後小便不通 木通 大麻仁 茼蒿子 滑石 賓郎 枳實 甘草

各半兩粗末每三升水煎溫服

(桑螵蛸散產後小便數及遺尿 桑螵蛸三十個炒 鹿茸酥炙 黃芪各三兩

杜蛎煅人參厚朴赤芍脂各三兩為末空心粥飲調外臺無厚朴脂有生熟

(桔梗湯)產後小便數兼渴桑螵蛸甘草並炙 黃連生姜各三兩

桔梗根 人參各三兩大棗五個水七升煮二升半分三服忌猪肉冷水

(二方)產後小便不禁桑螵蛸半兩炒龍骨一兩細末食前粥飲調二升

(三方)產後小便出血亂髮淨洗燒灰為末米飲調方寸匕方有滑石等分

(二方)產後大小便不利下血 車前子 黃芩 蒲黃 生地黃 牡蛎 茼蒿子

各六分為末空心米飲服方寸匕心麪蒜

(崔氏)治產後血滲入大小腸 車前子草汁一升 密一合 和煎一沸分二服

一產後乳汁或行或不行

三國論產後乳脉不行有氣血盛壅閉不行者有血少氣弱澁而不行盛者以通草

漏芦土瓜根虛者鍾乳猪蹄鯉魚之屬是也

(漏芦散)乳婦氣脉壅盛乳脉不行及經絡凝滯而致脹痛作塊

漏芦一兩半 蛇蛻十條炙 爪婁十個急火燒令焦存性

為末酒調牙一方有牡蛎並燒存性一方只用牡蛎煅為末酒調

(一方)治同上 蔊菜子炒香砂仁各等分細末熱酒調

產室治產後乳無汁 土瓜根漏芦各三兩 甘草二兩 通草四兩

水八升煎二升分溫三服一方加桂心 一方以猪蹄健通草五兩同煮取汁飲之

平金治乳無汁漏芦 通草各八分鍾乳四分蒸米一升粥

右米漬一宿研汁三升煮藥三兩沸服二方以赤小豆作粥 炙常服之

(桔梗散)治產後吹肺硬疼欲結瘡轉則為哎奶奶乳

重則為乳癰 乳香一分研桔梗根末一兩溫酒調二分又以南星末

莫角詩婦人吹肺意如何 皂角燒灰蛤粉和熱酒一杯調半湯 吏搽散笑阿二

通翹湯治奶奶乳癰 連翹子升麻苦硝各半分 破參

芍藥白欵 防己

射干各一分 大黃十五分 茄草六分 杏仁八十個皮尖水九升 黃

肖黃蜜水

又立以地生黃汁塗服前藥以有熱証當詳鑑

一方治乳瘡及癰腫四肢虛熱大渴

生地黃六兩黃芩芍藥人參知母甘草各二兩朴麻黃芪麥門冬  
桔梗各三兩大棗十二不以竹葉切三升水一斗二升煮九升去竹葉入藥煮三升渴則飲之

二方治婦人發乳丈夫發背生膿血後虛成氣疾

黃芪麥門冬地黃人參升麻菝葜各三兩當歸芍藥遠志甘草  
各二兩大棗十個水二升煎一升分溫三服又高方十宣散亦妙

產乳方治婦人乳瘡已穿或未穿出膿大止痛散瘡口

以芙蓉花研如膏若無花只取根上皮以竹刀刮粗皮用內中嫩白皮研如膏  
却入蜜少許調停如膏未穿即留中孔如已穿即塞其孔其膿眼自然湧出  
仍頻換藥此方大治一切瘧疽發背立見効膿出尽用後藥傳

乾膿散斂瘡口烏賊骨黃丹天竺黃各一兩輕粉二升射香一字

老降真骨三分細末干糲瘡口又乳香沒藥黃丹各一分龍骨二分

真壞子三分血竭半分射香一分降真節一分細末乾糲

神效瓜萎散治婦人乳疽妙勞

瓜萎一个去皮焙為末如急用只爛研子多者有力生粉草半兩當歸焙半兩  
乳香一分沒藥一分並別研以無灰酒三升同於銀石器內熬一升清汁分三  
服食後服可絕病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即於大小便中  
翹湯去大黃煎服熟此劑輒作效

卷十九

十七

齊林



