

新編婦人大全良方

十

新編婦人大全良方卷之十九

產後乍見鬼神方論第一

凡三方

論曰產後乍見鬼神者何答曰心主身之血脉因產傷耗
血脉心氣虛則敗血停積上干於心心不受觸遂致心中
煩躁卧起不安乍見鬼神言語顛錯醫人不識呼為風邪
如此治之必不得愈但服調經散每服加龍腦壹捻得睡
即安

調經散方

沒藥

琥珀

並細研

桂心

各一錢

芍藥

當歸

各一錢

麝香

研

細辛

各半錢

右爲末每服半錢生薑汁溫酒各少許調服

狂言散治產後狂言亂語皆由內虛敗血挾邪氣攻心

柏子仁

遠志

去心

人參

桑寄生

防風

琥珀

別研

當歸炒

生地黃

焙

甘草

等分

右爲粗末先用白羊心壹箇切片以水壹大碗半先煮
全取分去羊心入藥末五錢煎至陸分去滓無時服
散治產後血邪心神恍惚言語失度睡卧不安

茯神

去皮

人參

龍齒

研

赤芍藥

半兩

黃耆

牛膝

各三錢

生地黃

二錢

桂心

半兩

右爲末每服參錢水壹錢煎至七分不拘時去滓溫服

產後臘虛心神驚悸方論第二

凡七方

夫產後藏虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經爲風

邪所乘也或恐懼憂迫令心氣受於風邪風邪搏於心則驚不自安若驚不已則悸動不安其狀目睛不轉而不能呼診其脉動而弱者驚悸也動則爲驚弱則爲悸矣

產乳七寶散療初產後服之調和血氣補虛安神壓驚悸

辰砂

研

桂心

當歸

川芎

人參

白茯苓

羚羊角

燒存性已
各一錢

乾薑

青錢半分

古方末每服壹錢用羌活豆淋酒調下婦人之將養至如不飲酒用清米飲調下婦人之將養至如覺心煩熱悶以麥門冬去心煎水調下若心下煩悶而痛用童子小便調下若覺心胃煩熱即減薑桂冷即加之腹痛加當歸心悶加羚羊角心虛氣怯加桂心不下食或惡心加人參虛顫加茯苓以意斟酌日貳夜壹服

治產後藏虛心中驚悸志意不安言語錯亂不自覺知

茯神

遠志

人參

麥門冬

桂心

白芍藥

羚羊角

等分

右爲粗末每服參錢水壹錢、薑三片棗壹箇煎至陸分去滓溫服無時候

治產後心虛驚悸神思不安

龍齒

黃耆

生地黃

各一錢

人參

茯神

遠志

各半分

甘草

桂心

防風

各半兩

荆芥、銀

右爲粗末每服參錢水壹錢、薑三片棗壹箇煎至陸分

去滓無時服

治產後藏府虛心怔驚悸言語錯亂

麥門冬去心

各一錢

人參各一錢

研末

牛黃研

白薇各二錢

各研末

茯神

研末

獨活

遠志

朱砂飛

龍齒研各一錢

龍腦

防風

天竺黃

甘草

生地黃

療血虛多驚及產後敗血諸疾

辰砂

研末

琥珀

沒藥並細研

當歸

爲末

當歸

研細

當歸

當歸

當歸

右爲末用薄荷酒調下貳錢

產後驚風亂道言語如見鬼狀精神不定者研好朱砂酒

調下局方

蜜丸作

壹服兼

蜜丸

蜜丸

蜜丸

蜜丸

琥珀

辰砂

琥珀

琥珀

琥珀

琥珀

琥珀

琥珀

琥珀

琥珀

南番琥珀

研末

胡索

糯米同炒

研末

研末

研末

蒲黃

研末

生地黃

研末

當歸

研末

當歸

研末

當歸

研末

當歸

右爲末

煉蜜貯

丸作

圓服

當歸

研末

當歸

研末

當歸

研末

當歸

產後心驚半風方

論第三

凡五方

論曰產後心悶氣絕眼張口噤遍身強直腰背反偃狀如癇疾心忪驚悸言語錯亂皆是宿有風毒因產心氣虛弱發成風症

療產後心氣虛損卒驚狂語或歌哭噴笑性氣不定

上等銀

壹斤

桂心

甘草

各一錢

細辛

各一錢

茯神

各一錢

人參

生薑

遠志

茯神

各一錢

生地黃貳拾分

龍骨參分

棗子壹箇

右咬咀以水捌升煮銀壺至半入藥煎至壹升分作參服溫性

療產後多虛羸弱若大汗利皆至於死此重虛故也若患中風語謬昏悶不知人者

人參

淡芩

竹瀝壹升

桂心

大棗

遠志各拾分

竹瀝壹升

桂心

瘡產後心驚中風

防風

當歸

茯苓

防已

麻黃各一分

秦艽

人參

川芎

獨活

白鮮皮

甘草

白薇各一錢

石膏拾分

竹瀝貳升

人參

獨活各一錢

右水柒升先煮麻黃掠去沫下諸藥入竹瀝煎取貳升半去滓溫分參服忌菘菜猪肉生冷

療產後狂語志意不定精神昏亂心氣虛風邪致心神散

茯苓一方使

生地黃拾貳分

遠志

白薇

龍齒各拾分

防風

人參

獨活各一錢

右以銀壹大斤水壹斗伍升煎取柒升下諸藥煎取叁升溫分參服忘如前

一方治產後風邪所干心神恍惚志意不定加荆芥捌分甘草伍分

療產後心虛忪悸不定亂語錯謬精神恍惚不主當由心虛所致

人參

甘草

芍藥

當歸

生薑各一兩

遠志

茯苓各一兩

桂心一兩

麥門冬

大棗五枚

茯苓各一兩

右爲散以水捌升煮取參升去滓溫分參服

產後中風恍惚方論

參四

凡三方

夫產後中風恍惚者由心主血氣通於榮衛藏府遍循經絡產則血氣俱傷府藏皆虛心不能統於諸藏榮衛不足即爲風邪所乘則令心神恍惚不定也

千金療產後暴苦心悸不定

言語錯亂恍惚

心虛所致

茯苓

參二兩

芍藥三兩

甘草

桂心

當歸

芍藥一兩

生薑一兩

麥門冬

大棗三枚

麥門冬

大棗一枚

右爲散水參升煎取壹升去滓分作兩服食後

經効療產後心虛忪悸志意不定煩躁恍惚

茯苓

參一兩

當歸

黃芩

麥門冬

去心

甘草

人參

芍藥

酸棗仁

白鮮皮

芍藥參

大棗六個

朱砂

防風

羌活一兩

桂心

右爲粗末水貳升煮取柒升去滓溫服

療產後中風恍惚語澁四肢不利

利天麻元

天麻

朱砂

防風

羌活

桂心

殭蚕

炒參三分

乾蝎

炒

白附子

炮裂五靈脂

一兩

右爲末糯米軟飯爲元如梧桐子大以薄苛酒研拾伍元服之

產後所下過多虛極生風

方論第五

凡一方

論曰產後所下過多虛極生風者何答曰婦人以榮血爲

主因產血下太多氣無所主。昏青內冷汗出目眩神昏命在須臾此但虛極生風也。如此則急服瀉危上丹若以風藥治之則誤矣。

鴻臚子

方

乳香

剉

五靈脂

硫黃

玄精石

石網

阿膠

卷柏

牛

桑寄生

陳皮

各分

右將上四味同研停於鉢
極細復入餘藥爲末用小
服貳拾元食前溫酒或當

產後虛汗不止方論

第六

凡八方

夫虛汗不止者。由陰氣虛而
發於外故汗出也。血爲陰。

陽宜氣實者。陽加於陰故人汗出不止也。凡產後血氣虛故多汗也。因之遇風則變爲瘧。縱不成瘧則虛乏短氣。身體柴瘦唇口乾燥久則經水斷絕。由津液竭故也。

治產後虛汗不止

大金匱方卷之十六

論中求之

當歸

黃耆

麻黃根

牡蠣

粉爲

人參

粉草各等分

當歸

黃耆

兩

右咬咀每服肆錢水壹錢煎至三分去滓溫服

又方

右咬咀每服參錢水壹錢煎至三分去滓溫服

千金療產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸

甘草

蜜煎

附子

半個

桂心

芍藥

各壹半

右咬咀每服參錢水壹錢生薑肆片棗三枚煎至柒分去滓空心溫服忌猪肉冷水牛葱等物

經効療產後汗出不止

黃耆

拾貳分

白朮

牡蠣

茯苓

防風

麥門冬去心生地黃

各捌分

大棗紫箇

右咬咀水貳升煎取柒合去滓空心分溫兩服又療產後血氣暴虛汗出

淡竹葉煎湯叁合微溫服之須臾再服

又方

馬齒莧研取汁參大合

折無毒首亦可

右黃壹沸投蜜壹匙令停頓服

治產後盜汗不止應多汗者皆可服

牡蠣

細研

小麥麴

細研

甘草

右等分研細黃生豬肉調下貳錢無時候

人參治產後諸虛不足發熱盜汗二方出胡氏

人參

當歸

等分

右爲末以猪腰子壹隻去脂膜切小片子以水參升擣米半合葱白兩條煮米熟取清汁壹錢入藥貳錢煎至捌分溫服不拘時候

產後冒悶汗出不識人方論第七

凡一方

凡產後忽冒悶汗出不識人者暴虛故也

破雞子參一枚吞之便醒若未醒可與童子小便壹升甚驗文夫小便亦得切不得用病人者久若久不識人或時復發者此爲有風因產血氣暴虛風行脉中故也若產後去血多者又增此疾與雞子不醒者可急作竹

瀝汁壹服五合須臾不定再與五合頻與參伍服瘥

產後汗出多而變瘡方論第八 張仲景

角附

論曰產後汗出多而變瘡者何答曰產後血虛肉理不密故多汗因遇風邪搏之則變瘡瘡者口噤不開背強而直如發癟狀搖頭馬鳴身反折須臾拾發氣息如絕宜速幹口灌小續命湯稍緩即汗出如兩手拭不及者不可治也

續命湯治中風及剛柔二瘡及脚氣痺弱不能轉側兼治小兒驚風

麻黃

葛根

桂心

甘草

半

防風

參

芍藥

白朮

黃芩

各壹分

川芎

人參

附子

防己

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓取剝分清汁入生薑十片煎壹貳沸溫服日參服夜貳服若柔瘡自汗者去麻黃夏間及病有熱者去附子減桂壹半冬及初春去黃芩第參卷無有其名中有杏仁細白朮雖然陳無擇評曰產後汗出多變瘡亦令服續命湯此又難信既汗多如何更服麻黃官桂防己黃芩輩不若大豆紫湯爲佳太醫局方大聖散亦良藥也愚觀朱奉議云凡剛柔二瘡小續命湯並可加減與之若柔瘡自汗者有去麻黃加葛根之說朱奉議必有所據雖大豆紫湯大聖散良亦不可偏見曲說有妨古人之意

大聖散

治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百病或

中風癱瘓背強口噤直視煩熱脉緊大者不治

小品方主產後中風困篤背強口噤或但煩躁或頭身皆

重或身重痺劇嘔吐直視者獨活湯

川獨活四半大豆半升 酒參升

右先以酒浸獨活煎壹貳沸別炒大豆極焦煙出急投酒中蜜封候冷去豆每服壹貳合許得少汗則愈日拾服此藥能去風消血結妊娠折傷胎死腹中服此得差凡產後口噤腰背強直角弓反張皆名曰痙又名曰痙古人察有汗無汗以分剛柔陰陽而治今產寶諸書有中風口噤一門又有角弓反張一門其實一也如增寒發熱有類傷寒皆不論及豈可只以一二藥治之愚今取百問中方論已詳備前篇觀卷二十七幾覽者如指

諸掌

中風口噤角弓反張方論附

凡產後中風口噤是其血氣虛而風入於頤頰夾口之筋也手三陽之筋結入於頤產則勞損府藏傷於筋脉風若乘之其三陽之筋脉則偏搏之筋得風冷則急故令口噤也若角弓反張者是體虛受風風入於諸陽之經也人陰陽經絡周環於身風邪乘虛入於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀也

療產後中風口噤牙閼緊急手足瘦癰如角弓狀愈風散○亦治血暈四肢強直不省人事或築心眼倒吐瀉欲死

出華佗方 百問經驗產寶陳氏本草同

荆芥畧傳爲末

右每服參錢豆淋酒調下用童子小便亦可其效如神口噤者灌齒斷噤者吹鼻中皆妙

一方川古老錢煎湯調服名一捻金散

一方云用舉卿古拜貳味蓋切脚隱詰以祕方也此藥委有奇効神聖之功大抵產室但無風爲佳不可衣被帳褥太暖暖即汗出則腠理開易於中風便昏冒

指迷方也爲
相未濃煎服

醒則昏昏如醉

不省人事

其家驚惶醫用此藥佐以交加

散祝之即睡醒矣果效其言

手搔頭瘡亦可

以交加

交加散

方見第貳卷第伍論

又名交解散

見產後

專治婦人方治產後中風不省人事口吐涎手足瘓癰

當歸

荆芥穗

等分

右爲細末每服貳錢水壹錢酒少許煎至柒分灌之如牙關緊急用匙幹微微灌下但下咽即有生理不問多少便服不可以藥味尋常忽之屢用救人有効

小品療產後中風虛人不可服他藥者一物獨活湯主之及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煮之

川獨活參兩細切

右水參升羹取壹升分服奈酒者亦可酒水羹

一方用白鮮皮亦依此法

產後中風痉口噤而青手足急強者

以竹瀝貳升分爲伍服溫頻服大効

治產後中風口噤四肢頑痺不仁身體如角弓反張羨活酒

羌活

防風

兩

黑豆

去皮炒

右細剉以好酒壹升於瓶中攪動密封經半日許又於鍋中重湯煮瓶至半日候瓶冷取出每服暖壹中殘飲之日可參肆服度之當汗出即差

治產後中風身如角弓反張口噤不語方

川烏

附兩劑
大

右取黑豆半升同炒半黑以酒參升瀉於鑄內急攢以絹瀝取酒微溫服壹小淺取汗若口不開者拗開口灌之未効加烏雞糞壹合炒內酒中服之以瘥為度

寶方療產後腹中堅硬兩脇脹脹手足冷心中煩熱欲飲水乾嘔關節勞痙中風之疾

羚羊角

貳分

防風

拾貳

羌活

大黃

浸過各半分

柴胡

大黃

浸過各

右水貳升煎取捌合空心兩服服了吐即良久更服了。喫地黃酒用地黃切壹升炒令黑糞瓶中下熟酒參升密封口煮令減半任意服之

千金雞屎醴療產後中風及男子諸風并產後百疾神効

方又治產後中風口噤拘急困篤腰背強直時時反折

烏雞屎

參半升

大豆

貳升

右先炒豆令聲絕次炒雞屎令黃以酒壹升先淋雞屎取汁淋大豆每服壹升重者凡四五服之極妙深師療產後中風口噤不任大小

獨活

捌分

乾葛

陸分

甘草

貳分

生薑

伍分

右㕮咀以水貳升煮取壹大升分爲兩服

張文仲療產後中風風痙通脊冷直口噤不識人方

白朮

肆兩細切

右以酒參升煮取壹升頓服効經效療產後中風腰背強直時時反張名曰風痙

防風

葛根

川芎

地黃各二分

麻黃

去節

甘草

桂心

川獨活

防已

各一兩

杏仁

皮尖炒去核

桂心

川獨活

右細切以水捌升煮麻黃二

溫參服有汗者不可服

末後下諸藥煎取參升分

治產後中風

口噤潰悶不能言身體強直

羌活

防風

秦艽

桂心

粉草

葛根

各參分

生薑

捌分

附子

炮一箇

杏仁

搗拾枝去皮尖

麻黃

拾分去節

右㕮咀水攻升

煮麻黃去沫

後下諸藥煎取貳升分爲

參服

不可服汗者

產後中風方論第九

凡七方

論曰產後中風由產傷動血氣勞損藏府未平復起早勞動氣虛而風邪氣乘虛傷之故中風風邪冷氣客於皮膚經絡但疼痺羸乏不任少氣若筋脉挾寒則攣急喝僻挾溫則緩弱若入諸臟恍惚驚悸隨其所傷藏府經絡而生病焉

郭稽中產後中風方論

論曰產後中風者何答曰產後五七日內強力下床或一月之內傷於房室或懷憂怒擾盪冲和或因着艾傷動藏府得病之初眼澁口噤脈肉瞤搐漸至腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶爾中風所得也陳無擇評曰問產後中風風是外形血虛則或有中之者真答以人作不可治問答不相顧解如何開示後人立論

之難有如此者若是中風當以脉辨首在何藏依經調之
強力下床月內房室憂怒着多非中風類蒸勞性氣火邪
治各有法非產後病不暇繫引學者識之

經効療產後風虛頭目痛語時僻

防風

乾葛

茯苓

各四分

麥門冬

八分

肺分

芍藥

黃芩

各四分

犀角

肆分

甘草

參分

右咬咀以水貳升煎取茶合分爲兩服

療產後中風心忪悸忘意不定恍惚語言錯亂方

人參

陸分

羚羊角

脣

麥門冬

八分

茯苓

各四分

桂心

分

黃芩

白鮮皮

甘草

各四分

石膏

各四分

防風

淡竹瀝

酒大

右咬咀水貳升煎至茶合下竹瀝分參服

療產後中風身背拘急如束并渴

川芎

羌活

羚羊角

脣

桂心

酸棗仁

各四分

芍藥

各四分

桑白皮

陸分

防風

伍分

右咬咀水肆升煎取貳升分溫參服

療產後中風四肢拘束筋節掣痛不得轉側如角弓反張

麻根

分去

生薑

桂心

白术

各四分

防風

芍藥

各四分

川芎

伍分

竹瀝

貳合

右細剉以水參升先煮麻黃掠去沫下諸藥煎取茶合

下竹瀝再煎參沸分參服取微汗爲度

治產後納涼太過中風者或成喘急唇青鼻黑調六德續

以局方小續命湯連進三服即愈

療產後中風煩渴

紅花子

山合炒微
熱研碎

右以水壹升煎取柒合每壹匙頭徐呷

治產後中風半身手足不遂言訛蹇澁恍惚多忘精神不

定一川獨活

當歸

芍藥

防風

川芎

玄參

名貞

桂心

分半

右細剉以水捌升煮取貳升半分爲參服覺効又更作壹劑漸瘥須滴水溫將息如不差即以此方作元每服貳拾元有熱加乾葛伍兩有冷加白朮伍兩有氣加生薑陸分手足不穩加牛膝伍分草薢參兩黃耆肆兩腹痛加當歸芍藥各參分不食加人參貳分玄參肆分

產後中風筋脉四肢攣急方論第十

凡四方

夫產後中風筋脉攣急者是氣血不足藏府俱虛日月未滿而起早勞役動傷府藏虛損未復爲風邪冷氣初客於皮膚經絡則令人頑痺不仁羸乏少氣風氣入於筋脉挾寒則攣急也

治產後中風四肢筋脉攣急疼、痛背項強直

防風

壹兩

赤芍藥

桂心

各半

羚羊角

骨

牛蒡子

炒各分

右咬咀每服肆錢水壹錢煎至陸分去滓溫服

療產後中風睡卧不安筋肢四肢攣急或強直

獨活

川芎

防風

名壹

桂心

當歸

荆芥

炮

川芎

蔓荆子

各半

麻黃

去節

附子

炮

羌羊角

赤芍藥

各半

參

右咬咀每服肆錢水酒各半煎前主陸分去滓溫服

諸草

療產後中風四肢筋脉攣急疼痛

羌活

天麻

酸棗仁

川牛膝

防風

當歸

薏苡仁

柏子仁

鹿角膠

炒各半
宣肺

蔓荆子

桂心

各半
內

羚羊角

脣

附子

炮

川芎

各半
分

麝香

研

右爲細末無時以豆淋酒調貳錢服

羌活

防風

附子

炮去皮

羚羊角

脣

麻黃

各半
節

地黃

桂心

各半
分

酸棗仁

炒

黃蓍

當歸

川牛膝

川芎

草薢

各半
附子

當歸

川牛膝

川芎

右爲細末煉蜜元如梧桐子大每服參拾元溫酒吞下
產後熱悶氣上轉爲脚氣方論第十一凡一方

論曰產後熱悶氣上轉爲脚氣者何答曰產卧血虛生熱復因春夏取涼過多地之蒸濕因足復之所以着爲脚氣其狀熱悶掣癰驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也可服小續命湯方見本卷
別論兩三劑必愈若醫者誤以逐敗血藥攻之則血去而疾益增矣陳無擇評曰脚氣固是常病未聞產後能轉爲者往往讀千金見產婦多有此疾之語便出是證文辭害意槩可見矣設是熱悶氣上如何便服續命湯此藥本主少陽經中風非均治諸經脚氣要須依脚氣方論陰陽經絡調之此涉專門未易輕諭既非產後要病更

不繫引 陳無擇雖有此評然小續命湯加減與之用無
不效故百問云寒中二陽所患必冷小續命湯主之勸生
快暑中三陰所患必熱小續命湯主之
子城半大煩躁者紫
雪最良廣取百問加減然後人助得益如無紫雪用真氣薄荷煎冷水
嚼下

新編婦人大全良方卷之十九

新編婦人大全良方卷之二十

產後遍身疼痛方論第一

凡二方

論曰產後遍身疼痛者何答曰產後百節開張血脉流散遇氣弱則經絡內分之間而多流泄累日不散則骨節不利筋脉急引致腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也若醫以爲傷寒治之則汗出而筋脉動惕手足厥冷變生他病但服趨痛散除之

趨痛散方

牛膝半兩 甘草 桂心 白术 薑白各半兩 當歸

生薑名半兩

黃耆

獨活

右咬咀每服半兩水參盞煎至盞半去滓食前服陳無擇評曰趨痛散不特治產後氣弱血滯兼能治太陽經感風頭疼腰背痛自汗發熱若其感寒傷食憂恐驚怒皆致身疼發熱頭痛况有瘀血諸證尤甚趨痛散皆不能療不若五積散入醋煎用却不妨

五積散

方見和劑局

產後腰痛方論第二

凡十方

論曰腎主腰脚產後腰痛者爲女人腎位繫於胞產則勞傷腎氣損動胞絡虛未平復而風冷客之冷氣乘腰故令腰痛也若寒冷邪氣運滯背脊則痛久未已後忽有娠必致損動蓋胸絡屬腎腎主腰故也

療產後風冷腰痛不可轉

獨活

川芎

芍藥

桂心

續斷

生薑

桑寄生各一錢
當歸

防風

各一錢

右咬咀以水參升煎取壹升去滓空心分貳服
廣濟療產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉

敗醬

當歸

各一錢

川芎

芍藥

桂心

各一錢

右咬咀水貳升煎取捌合空心分溫貳服並已葱
救急療婦人產後餘血不盡血流入腰脚疼痛胃滿氣急
兩脇痛方

生薑

眉片

淡竹葉

切

升

右貢味以水貳升煎取壹升去滓分溫貳服

千金療產後中風腰背強痛中風煩熱苦渴頭身皆重此
因風冷所致及傷寒大豆酒方

大豆

研細炒出

以酒壹升投之密蓋令溫去豆服壹升

日夜數服

卧取微汗避風

亦有加酒者

亦佳

廣濟療產後三日患腰疼腹中餘血未盡并手脚疼不下
食生地黃湯方

生地黃汁

升火藥

甘草

各一錢

丹參

肆兩

蜜

壹合

生薑汁

半合

右切以水參升煎取壹升去滓內也黃汁蜜姜汁微火
煎一二沸壹服參合日貳夜參利壹兩行中間進食與
藥更進服

陳氏如神湯亦効

方見第四卷卷末

右生料五積散加桃仁煎亦妙此藥逐敗血去風濕

產後惡露方行忽然漸少斷絕不來腰中重痛下注兩股痛如錐刀刺痛入骨中此由血滯於經絡不即通之有大痛處必作癰疽宜桃仁湯恐作癰者預服五香連翹湯

桃仁湯方

桃仁去皮

蘇木

生地黃

酌半錢虫

去足

水蛭

炒各等分

生地黃

一錢

桑寄生

酌半錢

去足

去足

右爲粗末每服參錢水壹盞煎至陸分去滓溫服無時候惡露下即住服

五香連翹湯方

一方有大黃壹兩

木香

沉香

丁香

乳香

麝香

升麻

獨活

桑寄生

連翹

木通

附子

桑寄生

右爲粗散每服伍錢水貳盞煎至壹盞入竹瀝少許攬停去滓溫服

產後惡露不絕方論第三

凡九方

夫產後惡露不絕者由產後傷於經血虛損不足或分解之時惡血不盡在於腹中而藏腑挾於宿冷致氣血不調故令惡露淋瀝不絕也

廣濟療婦人產後惡血不絕崩血不可禁腹中絞痛氣息急療專中三十六疾

亂髮

燒着

阿膠

貳兩

代赭

乾薑

各等分

馬蹄

燒着

乾地黃

肆兩

牛角鵝

伍兩

驥名

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下參肆拾圓日兩服

文仲葛氏療惡露不絕方

右以鋸截桑木取屑五指撮酒服日參差

療產後泄血不止無禁度及治腹痛胃鬲悶

乾黃末酒服方寸匕日參肆服胡氏方云葛黃治惡露不止

療產後血不止虛羸迨死亦治血氣三才通串

蒲黃水貳升煎取捌合頓服

獨門遺療產後亡血過多心腹徹痛然後血下久而不止

亦治赤白帶下年深諸藥不能療者良驗此京師祝景助

教方

貴衆

狀如米粒細如米鹽金用不
就大半升薑用之

右用好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷爲細末用米飲調

下貳錢空心食前服

療產後七八日惡露不止

敗醬

分陸

當歸

各一錢

芍藥

分

續斷

各捌

川芎

分

竹茹

各一錢

生地黃

炒乾拾

右細剉以水貳升煮取捌合空心頓服

當歸

分

白芍藥

各一錢

甘草

分

乾薑

分

桂心

分

熟地黃

各半

蒲黃

各半

黑豆

炒兩

右爲細末溫酒調下貳錢食前服米飲亦可似黑神散
治產後惡露淋漓不絕心悶短氣四肢乏弱不思飲食頭
目昏重五心煩熱面黃體瘦王氏遺傳

牡蠣

分

川芎

分

熟地黃

各半

白芍藥

各半

龍骨

各壹分

續斷

分

當歸

炒

艾葉

酒炒

人參

五味子

地榆

半

甘草

貢分

右爲末每服貳錢水壹中殘生薑叁片棗壹枚煎至陸
分去滓食前服

產後惡露不下方論第四

凡六方

夫惡露不下者由產後臍脉傷氣血虛損或胞絡挾於
宿冷或產後當風取涼風冷乘虛而搏於血則壅滯不
宣積蓄在內故令惡露不下也

療產後三四日惡露不下嘔逆壯熱

芍藥拾分

知母捌分

生薑

當歸

蒲黃拾分

紅花貳分

荷葉

中心蒂茶生地黃汁

右細切以水貳升煎至柒合去滓下蒲黃煎四沸分溫
空心參服

尤全良方卷之九

五

治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊等備急丹出產乳
右以錦紋大黃壹兩杵爲細末用釀醋半升同熬成膏
元如梧桐子大患者用醋柒分盞化伍元至柒元服之
須臾血下即愈亦治墮馬內損惡血不出神効

此藥難用大段虛弱不可服仍調藥醋不宜太酸便損

肺藏全在醫者斟酌

療產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶荷葉散

乾荷葉

鳳西

鬼箭羽

桃仁

劉寄奴

蒲黃

拾分

右爲粗末每服參大錢以童子小便壹大盞薑錢叁片
生地黃壹分搗碎同煎至陸分去滓無時熟服

廣濟療產後惡露不多下方

川牛膝

大黃

各割

牡丹皮

當歸

芍藥

蒲黃

桂心

當歸

右爲末以生地黃汁調酒服方寸匕日貳服血下愈
生料五積散局方治產後寒露不快腹中疼痛或腹有塊
及癰寒熱並加醋少許煎通口服亦能療血崩易簡不復重錄
產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脉皆痛如
以雖刺殊當此由冷熱不調或思慮動作氣所擁遏血畜
經絡宜

當歸

芍藥

桃仁

沒藥

水蛭

䗪虫

右爲末醋糊元如豌豆大醋湯下參元

產後餘血上搶心痛方論第五

凡三方

論曰夫產後血上搶心由產後氣虛挾宿冷冷搏於血則
凝結不消氣逆上者則血隨上衝擊而心痛也凡產後餘
血不盡得冷則留結與氣相搏則痛困重遇寒結血尤甚
則變成血瘕亦令月水否瀝不通也

論曰產後心痛者何答曰心者血之主人有伏宿寒因產
大虛寒搏於血血凝不得消散其氣遂上衝擊於心之絡
脈故心痛但以大岩靈湯治之寒去則血脉溫而經絡通
心痛自止若誤以爲所傷治之則虛極寒益甚矣心絡寒
甚傳心之正經則變爲真心痛朝發夕死夕發朝死藥不
可輕用如此

大岩靈湯方

生地黃

當歸

獨活

吳茱萸

芍藥

小草各壹兩

細辛半兩

甘草

乾薑半兩

桂心

右爲散每服半兩水參錢煎至壹錢去滓稍熱服評曰產後心痛雖非產蓐常疾庸或有九痛未必便是血痛設是岩蜜湯豈可用熟地黃熟地黃泥血安能去痛此方本出千金用生乾地黃耳茱萸壹升合準伍兩乾薑參兩細辛治陳寒在下焦方本壹兩却減半兩制奇偶量病淺深自有品數不可妄意加減然以岩蜜湯治血痛不若失笑散用之有効

治心腹痛欲死一百藥不効服此頓愈與第八論紫金元大同小異見本卷割論

五靈脂

蒲黃等分

右爲末先用釀醋調貳錢熬膏入水壹錢煎至三分食前熱服是驗

經心錄

療產後心痛

此大寒所爲方

蜀椒

貳合

芍藥參兩

半夏

當歸

桂心

人參

甘草

茯苓

芍藥略貳

生薑汁

伍合

蜜壹升

右切以水玖升煮椒令沸下諸藥羹取貳升去滓下薑汁蜜等更煎取參升壹服伍合至陸合升金

產後惡露不盡腹痛方論第六

凡十二方

論曰產後惡露不盡腹痛者何答曰產後惡血雖常通行或因外感五邪內傷七氣致令斬然而止餘血停積壅滯不行所下不盡故令腹痛 產寶云皆因妊娠當風取涼

則胞絡有冷至於產時其血必少或新產時而取風涼皆令風冷搏於血血則壅滯不得宣通蓄積在內有時惡露不盡故令腹痛

溫隱居

湯

療產後寒露不盡腹痛往來兼腎滿少氣

澤蘭

嫩

生乾地黃

當歸

當歸

各參

芍藥

各一錢

生薑

各拾

甘草

各分

大棗

各肆

右細切以水玖升煮取叁升分爲參服欲死塗身得瘥救急療惡露不盡腹脹痛

取亂髮如雞子大灰汁洗盡淨燒爲末酒調服貳錢

又療產後血不盡而痛悶方

取荷葉燒作灰暖水和服煮取汁亦良

又方 以鐵秤錘壹枚燒赤投酒伍升中用此酒煮當歸

參兩取貳升去滓分溫再服千金同一方無當歸

療產後下血不盡腹內堅痛不可忍

當歸

芍藥

桂心

各參

桃仁

各一錢

白芍

療產後血結下不盡腹中絞痛不止

大黃

別浸

生乾地黃

當歸

當歸

各拾

川芎

參兩

右細切以水柒升煮取貳升半下大黃更煎參沸分溫

參服

右細切以水柒升煮取貳升半下大黃更煎參沸分溫

療產後血下不盡腹中痛無計

青木香

當歸

牛膝

川芎

黃耆

芍藥各兩

大黃拾參分浸

芒硝拾貳分

右細功以水柒升煮取貳升入大黃更煎參沸分參服
療產後惡露不盡結聚小腹疼痛

當歸參分

香附子壹兩

琥珀

沒藥

青皮

赤芍藥

木香

桂心略半兩

右爲細末以豆淋酒調下壹錢
產實療產後餘血作瘀痛兼塊者

桂心

薑黃等分

右爲細末酒服方寸匕血下盡妙

地黃炒治產後惡物不盡腹內疔痛產後常服甚妙

生乾地黃

當歸並零分兩

生薑細切如蠅頭大半兩

新瓦妙令鱗黑半兩

右爲細末炒薑酒調下大錢服

卷荷炒治產後血上衝心血刺血暈血氣腹痛惡露不快

初出卷荷

紅花

當歸拾壹分

蒲黃紙炒

牡丹皮焰半

右爲細末每服貳平錢空心溫酒調下一觴內只使童
子小便調如纔產後便服此藥即諸疾不出婦人方
芸臺散治療產後惡露不下血結不散衝心刺痛將來纔冒
寒踳冷其血必往來心腹間刺痛有不可忍謂之血母塊
但產後心腹諸疾並宜服之此產乳

芸臺子

紙炒

當歸

桂心

赤芍藥名等分

右爲細末溫酒調服貳平錢趕下惡物產後參日不可
無此

產後兒枕心腹刺痛方論第七

凡十八方

夫兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血破散與兒俱下則無患也若產婦臟腑風冷使血凝滯在於小腹不能流通則令結聚疼痛名曰兒枕也

產寶論產後心腹痛者由產後氣血俱虛遇風寒乘之與血氣相搏隨氣上衝於心或下攻於腹故令心腹痛若久痛不止則變成疝瘕也

治產後兒枕腹痛得効出經驗婦人方

延胡索

當歸各一錢半兩

真琥珀

蒲黃各一錢半分

赤芍藥

桂心各一分

紅藍花

貳錢

右爲細末以童子小便合細酒溫溫調參錢食前服

治產後兒枕亦治赤白痢

丁香

參錢

聖稟殼

去殼

香白芷

各一錢半

百草霜

壓鐵

出經驗

產後兒枕痛不可忍

五靈脂慢火熬爲細末每服貳錢溫酒調下

天靈散

治產後腹痛不止及一切血氣腹痛

出經驗

右爲細末每服貳錢童子小便調下如痢疾米飲調下

天靈散

治產後腹痛用炒生薑小便和細酒調下常患血氣用溫酒調服效

產後腹中有塊上下時動痛發不可忍此由妊娠聚血產後氣羸延露未盡新血與故血相搏而痛俗謂之兒枕乃血瘕也宜

真蒲黃研飲調服貳錢如燥渴者新水調

黑神散療產後血塊痛經脉行後腹疼并經脈不調

熟地黃壹斤陳生薑半斤

右拌同炒乾爲末每服貳錢產前烏梅湯調下常服酒

調經脈不通烏梅荊芥酒調下

療新產後腹痛惡血不盡行黑神散方見局方

療新產後七八日腹痛兩脇痛

當歸

劉寄奴

苦梗各拾分

延胡索別爲末

桂心

陳皮各肆分

芍藥

芍藥各捌分

右咬咀以水貳升煮取捌合調延胡索末空心服

療先患冷氣因產後發腹痛

芎藭

桂心

當歸

吳茱萸

茯苓

芍藥

甘草各伍分

桃仁拾分

千金療產後腹痛方見芍藥湯

桃仁半升

芍藥

當歸

川芎

乾漆碎熬

桂心

甘草

各兩

右細功以水捌升煮取貳升半去滓分參服
廣濟療腹中絞痛不可忍

當歸

白芍藥

川芎

乾薑

右等分爲末每服貳錢溫酒調下一方加延胡索妙

必効方療產後腹痛方

羌活肆兩

以酒貳升煮取壹升分服

千金治產後餘疾腹中絞痛不下食瘦乏方

當歸

黃耆

芍藥各陸分

乾薑各肆分

白朮各捌分

桂心

甘草各肆分

棗子拾肆分

右㕮咀水貳升煮取捌合去滓空心作兩大服忌生葱
子金茱萸酒治心腹內外痛

吳茱萸壹升酒參升煮取壹升空心分貳服

聖惠療同前

生地黃汁

藕汁

童子小便絡三

右同前參貳沸分溫參服

臺薹散治產後腹疼

沒藥

壹分

川薑黃

末三

右以水童子小便各壹盞入藥煎至壹盞半分作參服
通口服約行五十里再進壹服即止不過參服便安
療血氣痛欲死

鵝雞半兩爲末酒濃煎頻服立愈

獨聖散療產後腹痛

當歸爲末每服貳錢水壹盞煎至柒分溫服
又局方臺薹散亦治產後腹痛不錄

外臺療新產後腹中如弦常堅發痛無聊方

白蜜

壹升

當歸

壹兩

右當歸爲末入蜜中煎融貳沸適寒溫服

產後小腹疼痛方論第八

凡六方

夫產後小腹痛者此由產時寒露下少胞絡之間有餘血
與氣相擊搏令小腹痛也因重遇於冷則血結變成血瘕
亦令月水不利也

延胡索散治產後臍下痛

延胡索

桂心

各半

當歸

壹兩

右爲細末熱酒調下貳錢

治產後臍下疼痛不止

香桂散

川芎

當歸

各四分

桂心半兩

右爲細末分爲參服每服酒壹錢煎三五沸更入小便少許煎至柒分溫服甚者不過再服即差

出博濟

又方

金底墨

謂炒令乾

延胡索

劉寄奴

桂心

荳蔻子

右等分爲末熱酒調下貳錢

紫金圓治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱頭痛不思飲食亦治久有瘀血月水不調黃瘦不思飲食並能治之亦可療心痛與失禁

同出產乳

五靈脂

水淘乾秤炒爲末

菖蒲黃

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃末搜和圓如櫻桃大每服壹元水與童子小便各半盞煎至柒分令藥化溫服之少須再壹服惡露即下久有瘀血成塊月信不利者並用酒磨下

產後六七日忽然臍腹痛皆由呼吸之間冷氣乘虛而入宜服當歸建中湯和四順理中元共研再元作小元飯飲吞下極妙

產後寒疝方第九

凡三方

王子亨云產後臍腹大痛由呼吸冷氣侵入客於血宜局

方當歸建中湯

全蜀王氏醫案卷之二

治療虛及產婦腹中痛虛眩不能支持兩脅當臍急

痛氣上衝前後相引痛治之如神

精羊肉肆兩當歸

川芎各半

生薑壹兩

右細切以水拾盞煎至三盞掠去沫去渣分肆服空心熱服壹日來日再作兩日滓合為壹日前當一劑服千金當歸湯療婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛其方無川芎有芍藥 陳無擇云仲景羊肉湯治寒疝右用生薑羊肉湯服之無不驗有一人產當寒月寒氣入產門脣下脹滿手不得犯此寒疝也醫將治之以抵當湯謂有瘀血或曰非其治也可服仲景羊肉湯少減水貳服遂愈

外臺養生後內虛寒氣入腹腹中絞痛下赤白痢譏語見

鬼胎內湯

肥羊肉壹斤當歸

甘草

芍藥各一分生薑各一兩

右㕮咀以水壹升先煮羊肉取柒升入藥更煮取貳升去滓分服

產後心腹切痛不能飲食之氣忽然往來寒熱

當歸

川芎

黃芩

人參

甘草

芍藥

防風

生薑各三分

大黃

枳殼

桃仁

各一兩

右水柒升煮取貳升下大黃更煎參沸分作參服

千金

內經

無大黃人參桃仁有羊肉煮汁煎藥崔氏同

產後兩脇脹滿氣痛方論第十

凡六方

論曰產後兩脇脹滿氣痛由膀胱有停水因產後惡露下不盡水壅脅與氣相搏積在膀胱故令脇脹滿氣與

水相激故令痛也

經効療產後血氣脇脹痛

當歸各二錢

芍藥

青木香

檳榔

柴胡各一錢

枳殼各二錢

桂心

生地黃汁參入口

當歸各二錢

右咬咀以水貳升煎取捌合去滓空心分溫貳服
療產後惡露不下血氣壅痞脹痛不下食

蘇木

紫葛各一錢

芍藥

當歸各二錢

桂心

蒲黃各二錢

生地黃汁參入口

右咬咀以水貳升煎取柒合下蒲黃分兩服
當歸能治產後腹痛脇脹痛

當歸

乾薑等分

生地黃汁參入口

右炙茱每服參錢水壹錢煎捌分入鹽醋少許食前熱

經効理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥

蒲黃

延胡索各二錢

當歸各二錢

荷葉蒂

各二錢

蒲黃

延胡索各二錢

當歸各二錢

右水貳升煎取柒合後入蒲黃空心分作兩服
廣濟療產後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微利

茯苓

人參

當歸

甘草各一錢

生薑

陳皮

厚朴各一錢

右咬咀以水貳升煎取捌合去滓分溫服

產後積聚癰塊方論第十

凡三方

夫積者陰氣也五藏所生聚者陽氣也六府所成皆由飲食不節寒熱不調致五藏之氣積六府之氣聚積者痛不

離其部聚者其痛無有常處所以然者積爲陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚爲陽氣陽性浮動故痛無常處產後血氣傷於臟腑臟腑虛弱爲風冷所乘搏於藏府與血氣相結故成積聚癥塊也

治產後餘血不散結成癥塊疼痛宜服桃仁散

桃仁

鱉甲

名石膏

當歸

鬼箭羽

大黃

名洛參

川芎

桂心

名洛參

延胡索

琥珀

名參

右爲粗末每服參大錢水壹盞薑叁片煎至柒分去滓溫服

治產後積血不散結聚成塊或時寒熱不思飲食京三稜散

京三稜

熟地黃

鱉甲

名石膏

桂心

當歸

川芎

牡丹皮

劉寄奴

名參

赤芍藥

名洛參

大黃

炒

桃仁

牛膝

名參

右爲粗末每服參錢水壹大錢薑叁片煎至柒分去滓溫服

治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四肢羸瘦煩疼不思飲食症心元

青皮

名煙燼

乾漆

名參

沒藥

檳榔

當歸

名石膏

桂心

名參

赤芍藥

牡丹皮

名洛參

大黃

炒

桃仁

名石膏

鱉甲

厚朴

三棱

名石膏

延胡索

名參

右爲細末煉蜜元如梧桐大溫酒下參拾元

產後血瘕方論第十二

凡八方

夫新產後有血與氣相搏而痛者謂之癥瘕之言假也。謂其痛浮假無定處也。此由夙有風冷血氣不治至產血下則少故致此病也。不急治則多成積結妨害月水輕則否濫重則不通也。

治產後惡露不盡結成血癥。乍寒乍熱心腹脹痛不能飲食四肢羸瘦或時口乾。

靈犀元

當歸

大黃

壹兩

牛膝

白朮

各半兩

鱉甲

壹兩

鱉甲

元

木香

各半兩

牡丹皮

桂心

各半兩

鬼箭羽

半兩

鬼箭羽

元

右爲細末

煉蜜

元如梧桐子

大桃仁

湯吞下

貳拾元

食

前服可加

加

加

加

治產後血氣不調腹中生癥結而不散。

生地黃

煎元

一名

童便

參升

生地黃

煎元

生薑汁

各半兩

生薑汁

參升

生薑汁

參升

生薑汁

童寶療血瘕

分

桂心

桂心

芍藥

桂心

桂心

桂心

桂心

桂心

桂心

右先煎前參味約參分減貳次下

薑汁慢火煎如稀餳

每取壹合暖酒調下

療血瘕痛臍下脹不下食

當歸

分

桂心

桂心

芍藥

桂心

桂心

桂心

桂心

桂心

桂心

右爲細末空心溫酒調貳錢匕

千金療血瘕

生乾地黃

一兩

烏賊骨

貳兩

葛根

三兩

甘草

二兩

桂心

一兩

桂心

右爲細末空心溫酒調貳錢匕

甘草

二兩

桂心

一兩

葛根

三兩

桂心

一兩

桂心

一兩

散治血癥血塊及產後穢露不盡兒枕急痛應子
積聚疼痛漸成勞瘦悉皆治之

凌霄花

壳分

牡丹皮

山梔子仁

赤芍藥

紫荷草

血竭

沒藥

調砂

地骨皮

五加皮

甘草

各貳兩

紅娘子

各壹錢

桃仁

紅花

桂心

延胡索

當歸

各半兩

葛氏方療腹中瘕痛

桂心爲末溫酒調貳錢

產後血癆腹痛及喉痺熱塞本人呼血癆爲兒枕產後即

起痛不可忍

鐵秤鍊煅令通赤淬酒中候溫飲之用斧亦得

治產後血海氣虛腹臍疼痛心胃注悶每遇紅脉行或多
或少及有塊積者蓬莪藾散出博濟

義艾

桃仁

去皮尖

大黃

膿熱

當歸

各半兩

延胡索

炒

赤芍藥

各半兩

右爲細末溫酒調壹錢空心臨卧服

產後瘀血奔心煩悶方論第十三

附于此

論曰餘血奔心蓋是分解了不便與童子小便并摶心下
及卧太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不可
療產後餘血不盡奔衝煩悶腹痛

川芎

生乾地黃

枳殼

芍藥

等分

右爲末酒服方寸匕日貳服

廣濟療血氣煩悶方

生藕汁飲貳升甚效 竹瀝亦得千金同
集驗療產後血氣煩方千金同

生地黃汁 清酒各壹升

右相和煎壹沸分爲兩服

療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉

薩分

延胡索

別分

地黃汁

貳合

右水貳升煮貳味取捌合下延胡索空心參服忌肉食

壹日

療產後鬱血攻心或下血不止心悶高青冷氣欲絕

羊血壹錢頓服如不定更服立效

經效療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝一腹脹滿

當歸

桂心

川芎

吳茱萸

橘皮

生薑

各四分

芍藥

參三分

治產後餘血奔心

右用陳白梅搗碎濃煎湯喫

治產後惡血衝心時發躁

出博濟

延胡索壹兩蒲黃半兩

桂心壹分

右爲細末烏梅煎湯冷調下壹錢

治產後心胷煩躁惡血不快

沒藥元

博濟

沒藥

研

蠻薑

延胡索

乾漆炒

當歸

桂心

牛膝

牡丹皮

乾醫等分

右爲細末醋煮麪糊元如梧桐子大煎麵湯下拾元至拾伍元

產後虛煩方第十四

凡七方

雞白湯治產後胃中煩熱逆氣方

薤白

半夏

甘草

人參各貳

桔梗根參兩麥門冬半升

右陸味咬咀以水壹升參升煮取肆升去滓分伍服日參夜煎熱甚即加知母壹兩

竹茹湯治產後虛煩方

甘竹根細切壹升伍升水貳升煮取柒升去滓內小麥貳升大棗貳拾枚後煮熟參肆沸內甘草壹兩麥門冬壹升湯成去滓服伍合不差更服取差短氣亦服之

人參當歸湯治產後煩悶不安方

人參

當歸

麥門冬

桂心

乾地黃

葛根

大棗拾

粳米壹升

淡竹葉參升

芍藥

肆兩

右玖味咬咀以水壹升貳升先煮竹葉及米取捌升去滓內藥煮取參升去滓分參服若煩悶不安者當取貳壹升以水參升煮取壹升盡服之甚良

甘竹茹湯

治產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹

壹升

人參

葵苓

甘草各壹

右伍味咬咀以水陸升煮取貳升去滓分參服日參

黃芩

參兩

千金療婦人產後短氣欲絕心中煩悶不解必效方

竹葉切

麥門冬

小麥稻臺

甘草壹兩

生薑貳兩

大棗拾肆

竹根七

附

湯

大

異

右陸味細切以水壹升煮竹葉小麥取捌升去滓內餘藥煮取叁升去滓溫服若虛浮加入參貳兩少氣力加粳米伍合

壹方用竹皮若胃中氣逆加半夏貳兩忌如常法

附竹根

治產後煩悶不能食虛瀉方

赤小豆參柴枝燒作末以冷水和頻服之

治產後煩悶蒲黃散

蒲黃以東流水和服方寸匕極良

尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫服殊不知產後與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必死

