

重刊孫真人備急千金要方

十九

重刊孫真人備急千金要方卷之十七肺藏

肺臟脈論第一

論曰肺主魄魄藏者任物之精也為上將軍使在上行所以肺為五臟之華蓋並精出入謂之魄魄者肺之藏也鼻者肺之官肺氣通於鼻鼻和則能知香臭矣循環紫宮上出於頰候於鼻下迴肺中榮華於髮外主氣內主胃與乳相當左乳庚右乳辛肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉有十四童子七女子守之神名鴻鴻主藏魄號為魄藏隨節應會故云肺藏氣氣舍魄在氣為欬在液為涕肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喝胃憑仰息肺氣虛則夢見白物見人斬血藉藉得其時則夢見兵戰氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客於肺則夢飛揚見金鐵之器及奇物

凡肺藏象金與大腸合為腑其經手太陰與陽明為表裏其脈浮相於季夏王於秋秋時萬物之所終宿葉落柯萎萋枝條杌然獨在其脈為微浮衛氣遲榮氣數數則在上遲則在下故名曰毛陽當陷而不陷陰當昇而不昇為邪所中二氣感濕故陽中邪則捲陰中邪則緊捲則惡寒緊則為慄寒慄相薄故名曰瘧弱則發熱浮乃來出日中日發暮中暮發藏有遠近脈有遲疾周有度數行有漏刻遲在上傷毛采數在下傷下焦中焦有惡則見有善則匿陽氣下陷陰氣則溫陽反在下陰反在顛故名曰長而且留秋脈如浮秋脈肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣來輕虛而浮來急去散故曰浮反此者病何如而反其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而

微此謂不及病在中太過則令人氣逆而背痛愠愠

及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音

肺脈來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣為本肺脈

來不上不下如循雞羽曰肺病巢源無不字

真肺脈至大而虛如以毛羽中人膚色白赤不澤毛折

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有

弦曰春病弦甚曰今病

肺藏氣氣舍魄喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不

人皮革焦毛悴色夭死于夏

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫皮毛者也氣弗營

則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷者

則爪皮一作枯毛折者則氣先死丙篤丁死火勝金也

肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死秋金肺王其

卷之十七

二

脈微澀而短曰平反得大而緩者是脾之乘肺母之歸子

為虛邪雖病易治反得沈濡而滑者是腎之乘肺子之乘

母為實邪雖病自愈反得浮大而洪者是心之乘肺火之

尅金為賊邪大逆十死不治反得弦細而長者是肝之乘

肺木之陵金為微邪雖病即瘥肝乘肺必作虛

右手關前寸口陰絕者無肺脈也若短氣欬逆喉中塞噎

逆刺手陽明治陽

右手關前寸口陰實者肺實也若少氣留中滿膨脹與肩

相引刺手太陰治陰

肺脈來泛泛輕如微風吹鳥背上毛再至曰平三至曰

經病四至脫精五至死六至命盡手太陰脉也

肺脉急甚為癩疾微急為肺寒熱急情欬唾血引腰背

若鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿漏風偏頭已下

汗出不可止大甚為脛腫微大為肺痺引胃背起腰內小

甚為飧泄微小為消痺滑甚為息賁上氣微滑為上下出

血澹甚為嘔血微澹為鼠瘦在頸腋腋之間下不勝其上

其能喜酸

肺脉搏堅而長當病唾血其濡而散者當病漏灌一作汗至

今不復發散

白脉之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胃中喘而虛

名曰肺痺寒熱得之醉而使內也

黃帝問曰經脉十二而手太陰之脉獨動不休何也陰本

岐伯對曰足陽明胃脉也胃者五臟六腑之海在足

跌上大趾間是行其精氣上清注於肺肺氣從太陰而行

之其行之也以息往來故人一呼脉再動一吸脉亦再動

呼吸不已脉動不止

黃帝問曰氣口何以獨為五藏主岐伯曰胃者水穀之海

六腑胃居其大五味入於口藏於胃以養五藏氣氣口者

太陰是也藏腑之氣味皆出於胃變見於氣口氣口屬肺

藏主即呼寸口者也

扁鵲曰肺有病則鼻口張實熱則喘逆胃滿仰息其陽氣

壯則夢恐懼等虛寒則欬息下利少氣其陰氣壯則夢涉

水等肺在聲為哭在變動為欬在志為憂憂傷肺精氣片

於肺則悲

藏

味主秋結滿而血者病在胃及以飲食不節得病者取之
合故命曰味主合

病先發於肺喘效三日之肝脅痛支滿一日之脾閉寒不
通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬日入夏日出
病在肺下晡熱日中甚夜半靜

假令肺病南行若食馬肉及麋肉得之不者當以夏時發
得病以丙丁日也宜赤藥

凡肺病之狀必喘欬逆氣有息背痛汗出尻陰股膝攣解
胝胫足皆痛虛則少氣不能報息耳聾啞乾取其經手太
陰足太陽之外厥陰內少陰血者

肺脈沈之而數浮之而喘苦洗洗寒熱腹滿腸中熱小便
赤有背痛從腰已上汗出得之房內汗出當風

五方一七

肺病其色白身躰但寒無熱時時欬其脈微遲為可治宜
服五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉
之季夏刺大淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸臑中
百壯背第三椎二十五壯

邪在肺則皮膚痛發寒壯上氣氣喘汗出欬動肩背取之
膺中外輸背第三椎之傍以手痛按之快然乃刺之取之
銖盆中以越之

形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上
行肺傷其人勞倦則欬唾血其脈細緊浮數皆吐血此為
躁擾嗔怒得之肺傷氣擁所致也

肺中風者口燥而喘身運而重胃而腫脹
肺中寒者其人吐濁涕

肺水者其人身體腫而小便難時時大便鴨溏

肺脹者虛而滿喘欬目如脫狀其脈浮大

跌陽脈浮緩少陽脈微緊微為血虛緊為微寒此為鼠乳
診得肺積脈浮而毛按之辟易脅下時時痛逆背相引痛
少氣善忘目瞑結癱皮膚寒秋愈夏劇主皮中時痛如蝨
緣之狀甚者如針刺之狀時癢色白也

肺之積名曰息賁在右脅下覆大如杯久久不愈病洒洒
寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也心病傳肺
肺當傳肝肝適以春王王者不受邪肺復欲還心心不肯
受因留結為積故知息賁以春得之

肺病身當有熱欬短氣唾出膿血其脈當短濇今反浮
大其色當白而反赤者此是火之剋金為大逆十死不治

金方十七

五

商音人者主肺聲也肺聲哭其音磬其志樂其經手太陰
厥逆陽明則榮衛不通陰陽反祚陽氣內擊陰氣外傷傷
則寒寒則虛虛則厲風所中嗑吸戰掉語聲嘶塞而散下
氣息短懣四肢僻弱面色青葩遺失便利甚則不可治依
源麻黃續命湯主之方見第八卷中

又言音喘急短氣好唾此為火剋金陽擊陰陰氣沈陽氣
昇昇則實實則熱熱則狂狂則閉眼悸言非常所說口赤
而張飲無時度此熱傷肺肺化為血不治若面赤而鼻不
歌可治也

肺病為瘥者令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有所見者

栢山湯主之方見卷中若其人本來語聲壯烈忽爾不亮拖

氣用力方得出言而反於常人呼共語直視不應雖曰

瘥

病辨當 又此則肺病聲之候也察觀疾病表裏相應
源審治乃不失也

白為肺肺合皮白如豕膏者吉肺主鼻鼻是肺之餘其人
金形相比於上商白色小頭方面小肩背小腹小手足發
動身輕精廉急心靜悍性喜為吏耐秋冬不耐春夏春夏
感而生病主手太陰廉廉然肩膺厚薄正竦則肺應之正
白色小理者則肺小小則少飲不病喘喝粗理者則肺大
大則虛虛則寒喘鳴多飲善病曾喉痺逆氣巨肩反膺陷
喉者則肺高高則實實則熱上氣肩息效逆合腋張脅者
則肺下下則逼貫迫肝善脅下痛鼻塞或壅而涕生息肉
好肩背厚者則肺堅堅則不病效上氣肩背薄者則肺脆
脆則易傷於熱喘息鼻衄肩膺好者則肺端正端正則和

利難傷膺偏欹者則肺偏傾偏傾則病曾偏痛鼻亦偏疾
凡人分部陷起者必有病生大腸陽明為肺之部而藏氣
通於内外部亦隨而應之沈濁為内浮清為外若外病内
入則所部起内病裏出則所部陷外入前治陽後治陰内
出前治陰後治陽實瀉虛補陽主外陰主内凡人死生休
否則藏神前變形于外人肺前病鼻則為之孔開焦枯若
肺前死鼻則為之梁折孔閉青黑色若天中等分墓色應
之必死不治看色深淺斟酌賒促遠不出一年促不延時
月肺疾少愈而卒死何以知之曰赤黑如拇指鬣點見顏
頰上此必卒死肺絕三日死何以知之口張但氣出而不
還面白目青是謂亂經飲酒當風風入肺經膽氣妄泄目
則為青雖有天救不可復生面黃目白死枯骨死吉凶之

色在於分部順順而見赤白入鼻必病不出其年若年不應三年之中禍必應也

秋金肺脉色白主手太陰脉也秋取經輸秋者金始治肺將收殺金將勝火陽氣在合陰氣初勝濕氣及躰陰氣未盛未能深入故取輸以瀉陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰故取於合其脉本在寸口之中掌後兩筋間二寸中應在腋下動脉其脉根于太倉大倉在臍上三寸一夫是也其筋起於手大指之上循指上行結於魚後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下上出缺盆結肩髃前上結缺盆下結臑裏散貫貫下抵季脅

其脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下肘中後循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直次指內廉出其端合手陽明爲表裏陽明之本在肘骨中同會于手太陰

太陰之別名列缺起於腋下分間並太陰之經直入掌中散入於魚際別走手陽明主肺生病病實則大腸熱熱則手兌掌起起則陽病陽脉反逆大於寸口三倍病則效上氣喘渴煩心脅滿臑臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則有背痛風汗出中風虛則大腸寒寒則欠效小便遺數數則陰病陰脉反小於寸口一倍病則肩背寒痛少氣不足以息季脅空痛尿色變卒遺失無度

秋三月者主肺大腸白氣狸病也其源從太陽擊手太陰太陰受淫邪之氣則經絡壅滯毛皮緊腎發泄邪生則

肺傷溫隨秋受癘其病相反若肺虛則為陰邪所傷乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆若藏實則為陽毒所損身熱生斑氣喘引飲故曰白氣狸病也

扁鵲云炙心肺二輸主治丹毒白狸病當依源為療調其陽理其陰則臟腑之病不生矣

肺虛實第二 脈四條 方十首 灸法三首

肺實熱

右手寸口氣口以前肺陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀名曰肺實熱也

治肺實熱曾憑仰息泄氣除熱方

石膏 捌兩

白前

杏仁

各參兩

橘皮

白木 各伍兩

赤蜜 柒合

枸杞根皮

切貳升

右七味以水七升煮取二升去滓下蜜煮三沸分三服

治肺熱言音喘息短氣好唾膿血方

生地黄 切貳升

石膏 捌兩

麻黃 伍兩

杏仁 肆兩

升麻

羚羊角

芒消 各參兩

赤蜜 壹升

淡竹茹 雞子大壹枚

右九味以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三服

治肺熱悶不止曾中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥泄胃中喘氣方

桃皮

芫花 各壹升

右二味以水四斗煮取一斗五升去滓以散和之

巾内汁中薄膏温四肢不盈數日即歇

橘皮湯 治肺熱氣上效息奔喘方

橘皮

麻黃 各參兩

乾紫蘇 剛繁作乾藍

柴胡 各貳兩 宿薑

杏人 各肆兩 石膏 捌兩

右七味以水九升煮麻黃兩沸去沫下諸藥煮取三升去滓分三服不瘥與兩劑

治肺熱喘息鼻衄血方

羚羊角

玄參

射干

雞蘇

芍藥

升麻

拍皮

各參兩 生地黄 切壹升

梔子人

肆兩

淡竹茹

雞子大壹枚

右十味以水九升煮取三升分三服須利者下芒消三兩更煮三沸

金方一七一

九

治肺熱飲酒當風風入肺膽氣妄泄目青氣喘方

麻黃

肆兩

甘草

五味子 各參兩

杏人

伍拾枚

母薑

伍兩

淡竹葉

切壹升

右六味以水七升先煮麻黃去沫下諸藥煮取三升去滓分三服

馮師散 治酒客勞倦或出當風喜怒氣舍於肺面目黃腫

起即頭眩效逆上氣時忽忽欲絕心下弦急不能飲食或

吐膿血胃痛引背支滿欲嘔方

五味子

百部

各貳兩

茯苓

附子

茯苓

當歸

石斛

遠志

續斷

各壹兩

細辛

甘草

防風

蜀椒

紫苑

桂心

款冬花

乾薑

各半兩

桃人

伍拾枚

杏人

參拾枚

右十九味治下篩以酒服方寸匕日三後稍加至二匕

灸法 肺脹氣搶脅下熱痛灸陰都隨年壯穴在俠胃管兩邊

去一寸胃管在心下三寸 肺脹脅滿嘔吐上氣等病灸大椎并兩乳上第二肋間

止七壯 肺與大腸俱實

右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲脣吻不收名曰

肺與大腸俱實也

治肺與大腸俱實令人氣逆滿黃散方

茯苓

麻黃各陸分

大青

桂心各陸分

細辛

杏仁各伍分

石膏貳兩丹參半兩五味子

甘草

貝母

橘皮

芎藭各壹兩枳實參枚

右十五味治下篩為粗散帛裹一方寸匕半并花冰一升五合煮取七合為一服日再

肺虛冷

右手寸口以前

肺陰虛者手太陰經也病苦少氣不

治肺虛冷聲嘶傷語言用力戰地緩弱虛瘠風入肺方

天

獨汗

芎藭

秦椒

乾薑

黃耆

各肆拾貳銖

天雄

麻黃

五味子

山茱萸

甘草

各參拾陸銖

秦朮

桂心

薯蕷

杜仲

人參

細辛

防己各三

甘菊花

紫苑

各貳拾肆銖

貫衆

附子參枚

右二十一味治下節以酒服方寸匕日二分有石而高

止氣嗽通聲方 治肺虛寒厲風所傷語聲嘶寒氣息喘憊效唾

酥

崖蜜

生百部汁

棗肉

杏仁酪

甘草伍具末

右八味合和微火煎常攪三上三下約一炊久取薑汁

等各減半止溫酒一升服方寸匕細細咽之日二夜一

又方 猪脰叁具 大棗百枚

右二味以酒五升漬之秋冬七日春夏五日出布絞去

滓七日服盡二七日忌鹽羊脰亦得治效嗽曾脅支痛

多喘上氣尤良肘後方云久嗽上氣

治肺寒損傷氣嗽及涕唾鼻塞方

棗肉貳斤 研 杏仁壹升 熬 酥

白糖 白蜜 生百部汁各壹升

右七味合和微火煎常攪約一炊久下之細細溫清酒

服二合日二

補肺湯 治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起

口中如含霜雪言語失聲甚者吐血方

五味子叁兩 乾薑 桂心 款冬花貳斤

麥門冬壹升 大棗壹百枚 粳米貳合 桑根白皮壹斤

右八味以水一斗先煮桑白皮五沸下藥煮取三

升分三服

又方

黃耆伍兩 甘草 鍾乳 人參各壹兩 乾地黄

桂心 茯苓 白石英 桑白皮 厚朴

紫苑 橘皮 當歸 五味子
麥門冬 各參兩 大棗 貳拾枚

右十八味 咀咀以水一斗四升 煮取四升 分五服 日三夜二

又方 治肺氣不足 效逆上 氣牽繩而坐 吐沫唾血不能飲 食方

蘇子 壹升 桑白皮 兩五 陸兩 紫苑 人參

甘草 五味子 杏仁 貳兩 款冬花 射干 各壹兩

麻黃 乾薑 桂心 貳兩 細辛 壹兩半

右十四味 咀咀以水一斗二升 煮取三升半 分五服 日三夜二

又方 治肺氣不足 效逆上 氣從背起 口中如含霜 舌語

無音聲而渴 舌本乾燥方

五味子 蘇子 各壹升 白石英 鍾乳 各參兩

款冬花 竹葉 橘皮 桂心

桑白皮 茯苓 紫苑 各貳兩 粳米 貳合

麥門冬 肆兩 生薑 伍兩 杏仁 伍拾枚 大棗 拾枚

右十六味 咀咀以水一斗三升 先煮桑白皮 粳米 大棗 米熟去滓 內諸藥 煮取五升 分六服 日三

又方 治肺氣不足 心腹支滿 效嗽喘逆上 氣唾膿血 骨痛 手足煩熱 惕然自驚 皮毛起 或哭或歌 或怒 乾嘔 心煩 耳中間風雨聲 面色白方

款冬花 桂心 貳兩 桑白皮 陸兩 生薑 伍兩 五味子

鍾乳 兩 粳米 伍合 大棗 拾枚 麥門冬 肆兩

右九味以咀以水一斗二升先煮粳米麥令熟去其
藥煎取二升分三服温服之一方用白石英二兩用
苑人參各一兩名紫苑湯

治肺氣不足欬唾膿血氣短不得卧方

麻子壹升 桑白皮 錫各壹斤 桂心 人參略

阿膠 紫苑略 薑叁兩 乾地黄肆兩

右九味以咀以酒一斗五升水一斗五升合煮取四升
分五服

治肺氣不足咽喉苦乾方

作錫任多少取乾棗一升去核熟搗水五升和使相
得絞去滓澄去上清取濁者內鉛中攪火上煎勿令
堅令連連服如雞子金方 之日二夜二

治肺風氣痿絕四肢

灸肺輸各二壯肺經 度之在第三椎下兩
傍相去各一寸五分

肺與大腸俱虛

右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱
虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或如恐怖名
曰肺與大腸俱虛也

建中湯 治肺與大腸俱不足虛寒之氣小腹拘急腰痛

羸瘠百病

大棗拾貳 生薑 桂心略 甘草貳兩 芍藥陸兩

右五味以咀以水八升煮取三升去滓內糖八兩煮二
沸分三服用後用黃耆人參各貳兩名黃耆建中湯

肺勞第二論一首 方二首 灸法一首

論曰凡肺勞病者補腎氣以益之腎王則感於肺矣人逆秋氣則手太陰不收肺氣焦滿順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂閉格病則生矣

麻黃引氣湯治肺勞實氣喘鼻張面目苦腫方

麻黃 杏仁 生薑 半夏 各伍分

紫蘇 肆分 白前 細辛 桂心 各叁分

橘皮 貳分 石膏 捌兩 竹葉 切壹升

右十一味以水一斗煮取三升去滓分三服

半夏湯治肺勞虛寒心腹冷氣逆遊氣胃脅氣滿從胃達

背痛憂氣往來嘔逆飲食即吐虛之不足方

半夏 壹升 生薑 壹斤 桂心 肆兩 甘草

厚朴 各貳兩 人參 橘皮 麥門冬 貳兩

右八味以水一斗煮取四升分四服腹痛加當歸

二兩

厚朴湯治肺勞風虛冷痰澀水氣晝夜不得卧頭不得近

枕上氣胃滿喘息氣絕此痰水盛溢方

厚朴 麻黃 桂心 黃芩

石膏 大戟 橘皮 各貳兩 枳實

甘草 秦艽 杏仁 茯苓 各叁兩

細辛 壹兩 半夏 壹升 生薑 拾兩 大棗 拾五枚

右十六味以水一斗三升煮取四升分五服

治喉痺氣逆欬口中涎唾方

灸肺輸七壯亦可隨年壯至百壯

論曰凡氣極者主肺也肺應氣氣與肺合又曰以秋渴病為皮痺皮痺不已復感於邪內舍於肺則寒濕之氣客於六腑也若肺有病則先發氣氣上衝胃常欲自恚以秋庚辛日傷風邪之氣為肺風肺風之狀多汗若陰傷則寒寒則虛虛則氣逆欬欬則短氣暮則甚陰氣至溫氣生故甚陰畏陽氣晝日則瘥若陽傷則熱熱則實實則氣喘息上曾臆甚則唾血然陽病治陰陰是其裏陰病治陽陽是其表是以陰陽表裏衰王之源故知以陽調陰以陰調陽陽氣實則決陰氣虛則引善治病者初入皮毛肌膚筋脈則治之若至六腑五臟半死矣

扁鵲曰氣絕不治喘奔一作奔而冷汗出二日死氣應手太陰太陰氣絕則皮毛焦氣先死矣

鍾乳散治氣極虛寒陰畏陽氣晝瘥暮甚其氣短息寒亦治百病令人力強能飲食去風冷方

鍾乳別研 乾薑 桔梗 茯苓

細辛 桂心 附子各壹兩 人參各壹兩

白木壹兩 防風 栝婁根 牡蠣各貳兩半

右十二味治下篩酒服方寸匕日三漸加至二匕五十以上可數服得力乃止千金翼云有冷加椒有熱加黃芩各二兩

黃耆湯治氣極虛寒皮毛焦津液不通虛勞百病氣力損乏方

黃耆肆兩 人參 白木 桂心各二兩
生薑捌兩 大棗拾枚 附子叁拾銖一方不用

右七味以水八升煮取三升去滓分四服

大營宿圓治氣極虛寒皮痺不已內舍於肺寒氣入客於六腑腹脹虛滿寒冷積聚百病方

礬石附後作礬石

乾薑

桂心

皂莢

桔梗

附子

各參兩

右六味為末蜜丸梧子大酒服十九日三漸加之慎熱及近火等

食方
大黃圓治氣極虛寒游飲胃中痰滿心腹痛氣急不下飲

硫黃

礬石

乾薑

附子

烏頭

桂心

細辛

白朮

桔梗

茯苓

右十味為末蜜丸如梧子酒服十九日三漸加之金方十七方

為度

附後無自木桂枝茯苓用吳茱萸更蜀椒人參當歸十一種為丸用冷夏月溫飲食下

大前胡湯治氣極傷熱喘息常欲自悲心腹滿痛內

外有熱煩嘔不安方

前胡搗兩

半夏

麻黃

芍藥各兩

生薑伍兩

黃芩參兩

枳實四枚

大棗拾貳枚

右八味以水九升煮取三升去滓分三服温

竹葉湯治氣極傷熱氣喘甚則唾血氣短之不欲食口燥咽乾方

竹葉貳升

麥門冬

小麥

生地黄各壹升

生薑

石膏各陸兩

麻黃參兩

甘草壹兩

大棗拾枚

右九味以水一斗煮取三升去滓分三服

灸法

嘔吐上氣灸尺澤不三則七壯尺澤者在腕後肘中橫文
腹中雷鳴相逐食不化逆氣灸上管下一寸名太倉七壯

積氣第五 論一首 灸法一首 九首 五十一首

論曰七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣凡七種
氣積聚堅大如杯若絆在心下腹中疼痛不能飲食時來
時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣即嘔逆惡
心熱氣即說物不竟而迫怒氣即上氣不可忍熱痛上搶
心短氣欲死不得息恚氣即積聚在心下不得飲食喜氣
即不可疾行不能久立憂氣即不可劇作暮卧不安愁氣
即喜忘不識人語置物四方還取不得去處若聞急即四
肢肘腫手足筋攣捉不能舉如得病此是七氣所生男子
卒得飲食不時所致婦人即產後中風諸疾也

七氣圓方

烏頭	大黃 <small>各一分</small>	紫苑	半夏	前胡
細辛	丹參	茯苓	芎藭	桃人 <small>胡合作</small>
菖蒲 <small>一作藥</small>	石膏	吳茱萸	桂心	桔梗 <small>各二分</small>
人參	甘草	防葵 <small>各壹兩</small>	乾薑	蜀椒 <small>各半兩</small>

右二十味為末蜜丸梧子大酒服三九日三加至十九
方去半夏加甘遂三分 胡合無丹參甘草

七氣圓

主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁
氣此之為病皆生積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時
去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩暈
失精怒氣狀不可當執痛上澀心短氣欲絕不得息恚氣

狀積聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作卧不安席愁氣狀平故如怒喜忘四肢附腫不舉止亦治產後中風餘疾方

大黃貳兩 人參 半夏 吳茱萸 柴胡

乾薑 細辛 桔梗 葛蒲各貳分 茯苓

芍藥 甘草 蜀椒挂一用 石膏 桃人各三

右十五味為末蜜丸如梧子大每服酒下三九日三服漸加至十九千金翼十味無茯苓芍藥甘草石膏樹人

七氣湯治寒氣執氣憂氣勞氣愁氣或飲食為膈氣或勞氣內傷五臟不調氣衰少力方

乾薑 黃芩 厚朴深師作桂心 半夏

甘草 括萎根深師作橘皮 乾地黄 芍藥各貳

金方十七 十八

蜀椒冬兩深師 枳實伍枚 人參壹兩 吳茱萸合

又方治虛冷上氣勞氣等方
右十二味呔咀以水一斗煮取三升分三服日三

半夏壹升 人參 生薑 桂心 甘草各壹

右五味呔咀以水一斗煮取三升分三服日三

五膈圓治憂膈氣膈食膈飲膈勞膈五病同藥服以憂恚思慮食飲得之若冷食及生菜便發其病苦心滿不得氣息引背痛如刺之狀食即心下堅大如粉絮大痛欲吐吐即差飲食不得下甚者及手足冷上氣欬逆喘息短氣方

麥門冬 甘草各伍兩 蜀椒 遠志 桂心

細辛兩 附子壹兩 人參壹兩 乾薑貳兩

右九味為末蜜和丸散使薄先食含如彈丸一枚細細

咽之喉中曾中當執藥力稍盡復含一九日二夜一服
藥七日愈延年方云若不能含者可分一大丸作七小
云亦可梧子大十九丸酒服之經心錄以吳茱萸代桂心
酒服如梧子五丸空腹服之治如寒冷則心痛咽中有物
吐之不出咽之
不入食飲少者

治結氣冷癥積在脅下及脚氣上入小腹腹中脹滿百病
大蒜去心皮三升擣令極熟以水三升和令調絞取汁更擣
汁更擣餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁合得九升所
得滓可桃顆大棄却以微火煎取三升下牛乳三升
合煎取三升日起空腹一頓温服令盡至申時食三
日服一劑三十日服十劑止

大蒜煎 治疝瘕積聚冷癖痰飲心腹脹滿上氣欬刺鼠

風癩偏風半身不隨腰疼膝冷氣息不塞百病方

蒜陸斤肆兩去皮切水 酥壹升內牛乳 貳升

萹撥 胡椒 乾薑各叁兩 石蜜 阿魏

戎鹽各貳兩 石菖蒲 木香各壹兩 乾蒲桃肆兩

右十二味為末合內蒜汁中以銅器微火煎取一斗空
腹酒下一兩五日已上稍加至三兩二十日覺四體安
和更加至六兩此治一切冷氣甚良

桔梗破氣圓 治氣上下不塞不能息方

桔梗 橘皮 乾薑 厚朴 枳實

細辛 葶藶各叁兩 吳茱萸 白木各陸分 胡椒

蜀椒 烏頭各壹分 萹撥拾分 人參 桂心

附子 茯苓 前胡 防葵 芎藭各伍分

甘草

大黃

檳榔

當歸各別分

右二十四味為末蜜丸如梧子大每服酒下十九丸日三服有熱者空腹服之

積聚湯

治氣實若積聚不得食息方

檳榔

冬三茶枚

附子

青枚

半夏

青升

細辛

青兩

生薑

捌兩

大黃

紫苑

柴胡

各三兩

橘皮

甘草

紫蘇

冬用子

茯苓

各別分

右十二味以水一斗煮取三升分三服相去如人行十里久若有積結堅實如石加鼈甲一二兩防葵一二兩氣上加桑白皮切二升枳實厚朴各二兩消息氣力為弱進二劑後隔十日更服前桔梗破氣圓

治積年患氣發作有時心腹絞痛忽然氣絕腹中堅實醫

所不治復謂是蠱方

檳榔

大者肆枚

附子

青枚

半夏

青升

柴胡

冬三兩

生薑

捌兩

橘皮

甘草

桂心

當歸

枳實

各貳兩

右十二味以水一斗煮取三升分三服五日一劑服三劑永除根本

半夏湯

治逆氣心腹滿氣上胃脇痛寒冷心腹痛嘔逆及

吐不下食憂氣結聚方

半夏

青升

生薑

桂心

各伍兩

橘皮

肆兩

右四味以水七升煮取三升分四服日三夜一人強者作三服亦治霍亂後吐逆腹痛

治逆氣

心中煩滿氣悶不理氣上方

貝母湯治上氣咽喉窒塞短氣不得卧腰背痛胃滿不得食面色萎黃方

貝母 壹兩

生薑 伍兩

桂心

麻黃

石膏

甘草 各貳兩

杏仁 叁拾枚

半夏 伍合

右八味以水一斗煮取三升分為三服日三

麻黃湯治上氣肺浮欬逆喉中水雞聲喘息不通呼吸欲死方

麻黃 捌兩

甘草 肆兩

大棗 叁拾枚

射干 如博棊子貳枚

右四味以井花水一斗煮麻黃二沸去沫內藥煮取四升分四服日三夜一

奔氣湯治大氣上奔胃膈中諸病發時迫滿短氣不得卧劇者便溺欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結氣方

生薑 壹斤

半夏

吳茱萸 各壹升

桂心 伍兩

人參

甘草 各叁兩

右六味以水一斗煮取三升分四服

枳實湯下氣治胃中滿悶方

枳實 叁枚

附子 貳枚

大棗 拾肆枚

半夏 伍兩

人參

甘草

白朮

乾薑

厚朴 各貳兩

右九味以水七升煮取三升半每服八合日三下氣治氣滿腹脹方

半夏 壹升

生薑 壹斤

人參 壹兩半

橘皮 叁兩

右四味以水七升煮取三升去滓分三服日三方無人參止三味

治氣兩脅滿急風冷方

杏人

茯苓

防葵

各別分

吳茱萸

橘皮

桂心

防風

澤瀉

各伍分

白木

射干

芍藥

蘇子

桔梗

枳實

各陸分

右十四味為末蜜丸梧子大酒服十九日一加至三十

治氣滿閉塞不能食喘息方

訶梨勒十枚為末蜜丸如梧子食後服三丸不忌得

利即止

治上氣效逆方

蘇子壹升

五味子伍合麻黃

細辛

紫苑

人參

黃芩

甘草各貳兩

桂心

當歸

各壹兩

生薑

伍兩

半夏

叁兩

右十二味以水一斗煮取三升分二服

金方十七

廿二

治氣上不得卧神秘方

橘皮

生薑

紫蘇

人參

五味子各伍兩一方作桔梗

右五味以水七升煮取三升分二服

治熱發氣上衝不得息欲死不得卧方

桂心半兩

白石英

麥門冬

枳實

白鮮皮

貝母

茯苓

檳榔人

天門冬

各貳兩半

車前子

貳兩人參

前胡

橘皮

白薇

杏仁

各壹兩半

郁李人

叁兩

桃人

伍分

右十七味為末蜜和丸如梧子大以竹葉飲服十九日

二加至二十九

竹葉飲法

竹葉

紫蘇子各壹升 紫苑

白前各壹兩

百部

甘草

生薑各壹兩

右七味以水八升煮取三升溫下前九藥盡更合

湯安食下氣理胃脅并治客熱方

人參

麥門冬

乾薑

當歸

茯苓

甘草

五味子

黃耆

芍藥

枳實各壹兩

桂心各兩

半夏壹升

大棗拾伍枚

右十二味以水九升煮取三升去滓每服九合從

日三至晡令盡皆熱服慎勿冷

海藻橘皮圓

下氣治風虛支滿膀胱虛冷氣上衝肺息奔

令咽喉氣悶往來方

海藻

橘皮

白前各壹兩

杏仁

茯苓

金方十七

十三

芍藥

桂心各伍分

蘇子伍合

棗肉

桑根白皮

昆布各貳兩

吳茱萸

人參

白木

葶藶各壹兩

右十五味為末蜜丸如梧子大飲服十丸日一加至十

五丸以利小便為度

治氣上方

礪砂

細辛

牛膝各等分

右三味末氣發酒服方寸匕後二日忌酒餘禁如藥法

治上氣方

上酥壹升

獨頭蒜伍頭

右二味先以酥煎蒜蒜黃出之用生薑汁一合并煎令

熟空腹溫服一方寸匕

治上氣嘔吐方

芥子二升為末蜜丸寅時并花水服如梧子七丸日
二亦可作散空腹服之及有酒浸服并治臍下絞痛
治勞氣方

小芥子三升搗末絹袋盛酒二斗浸之密封七日去
滓溫服半升漸至一升半得方更合忌如藥法

治上氣三十年不瘥方

大棗 杏人各壹伯枚 豉壹伯貳拾粒 蜀椒貳伯枚

右四味先搗杏人豉人熟後內棗椒更搗為丸如棗核
大含稍稍咽之日二夜一

治積年上氣不瘥垂死者方

葇若子熟令色變 熟羊肝薄切曝乾

右二味各搗等分以七月七日神酢拌令相著夜不食
空腹服一方寸匕須拾針兩食間以冷漿白粥二匕止

之隔日一服永瘥四十日內得煮飯汁作蕪菁羹食之
已外一切禁斷

下氣方

生薑伍兩 小麥壹升

右二味以水七升煮取一升頓服

又方 大棗貳柒枚 紫蘇葉切壹升

右二味以酒三升煮取一升半分再服水煮亦得一方
加橘皮半兩肘後方無棗用橘皮

治氣方

桃皮二斤去黃者以咀以水五升煮取二升每服一

又方 酒服鹽脂二合日一瘥止

又方 黃牛乳二升煎取一升和生乳一升空腹服之
又方 驢乳初服三合二日後日別五合後至七合七日後至一升忌葵菜猪魚油等

方 尿充腹服百日止治一切病

方 烏牛尿空腹服日再至三升止

補氣虛逆方

大棗 冬升 甘皮 去脈拾具 乾薑 貳兩 乾地黄 兩

右四味治下篩酒四升漬棗二宿漉出棗取酒為炊汁將棗內甑中微火蒸令棗膏入釜中煎酒令餘二升許候甑中棗只留皮核在乃止火貯器中將前散及熟下攪令調大畧與糖相似以酒服二合日再此方非止補氣亦通治一切短氣并形羸瘦甚良

金方十七

廿五

大補氣方

乾地黄 兩 甘草 兩 秦椒 又曰薑 乾薑 兩 昆布

地骨皮 兩 白朮 桂心 人參 厚朴

海藻 略 羊腎 壹具去膏肆枚 羊肚 壹具治如食法去膏骨

右十二味治下篩內羊肚中合腎縫塞肚口蒸極熟為度及熟木臼合搗取肚腎與藥為一家曝乾更搗為散酒服方寸匕日二

白石散 明目利小便治氣及補五勞七傷無所不治方

鍊成白石 十兩 白石 無多少以錐子碾上細研

取白淨者為佳搗細下之藥罈中研令極細熟以絹袋於銅器中水飛之如作粉法如此二度研乾者去之取中央好者在下有粗惡者亦去之更用者使動白絹袋子盛著藥罈中以錐子碾之使乾更以公熬之

後氣

之為

石斛

茯苓 各陸分 澤瀉

茯苓

橘皮

各壹兩

菟絲子

各二兩

右七味治下篩總於甕器中研令相得重篩酒服方寸七日一不得過之猪魚鵝鴨蒜冷酢滑

補傷散治肺傷善泄欬善驚恐不能動筋不可遠行膝不可

可父立汗出鼻乾少氣喜悲心下急痛痛引胃中卧不安

天門冬 精防風

澤瀉

人參

阿膠 各壹兩

括蕒根 前胡

芍藥

石膏

乾薑

大豆卷 醋紫苑

白飲 各壹兩

桂心

白木 各壹兩

乾地黄 甘草

薯蕷

當歸 各壹兩半

右十九味治下篩食上酒服方寸七日一

白石英圓補養肺氣方

白石英 一作白石脂

陽起石

礞石

菟絲子

茯苓

乾地黄 醋精 石斛

括蕒根

白木

五味子 醋 防風

巴戟天 各伍

桂心

人參 各壹兩

蛇牀子 半兩

右十五味為末蜜丸如梧子酒下十五丸加至三十丸

理氣圓治氣不足方

杏仁

桂心 各壹兩

乾薑

益智子 各壹兩

右四味為末蜜丸如梧子未食服二丸以知為度

治冷氣氣短方

蜀椒五兩絹袋盛酒一斗浸一七日服之任意多

治讀誦勞極疲乏困頓方

酥 油 糖 酒 白蜜

右五味合於銅器中微火煎二十沸下之為準七日七夜服令盡宜慎生冷

灸方 人參 甘草 茯苓 當歸各兩 地骨皮

芎藭 芍藥 乾地黄 黃耆各兩 大棗實

右十味以水一斗煮取三升分三服一方用桂心各兩

治卒短氣方

得韭汁服一升方瘥肘後方治卒上氣喘息便欲絕

治之氣方

生薑 栝子各兩

右二味以水一升煮取一升頓服

治少年房多短氣方

鼓 栝子各兩

右二味以水一升煮取一升半去鼓內栝子煮取八合服半升不瘥更服

灸法

凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食灸太衝不限壯數從痛至不痛從不痛至痛止○上氣欬逆灸胃堂百壯穴在兩乳間

胃膈中氣灸闕輸隨年壯闕輸在第四椎下兩傍各一寸半名闕輸

心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不

消腸鳴泄利灸太倉百壯太倉穴一名胃募在心下四寸乃胃管下一寸○結氣

囊裏針藥所不及灸盲募隨年壯育募一穴從乳頭下度

至臍中去半從乳下行度頭是穴

凡臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣灸關元百壯穴

在臍下三寸

短氣不得語灸天井百壯穴在肘後兩筋間○又灸大椎
隨年壯○又灸肺輸百壯○又灸肝輸百壯○又灸尺澤
百壯○又灸小指第四指間交脈上七壯○又灸手十指
頭合十壯○少年房多短氣灸鳩尾頭五十壯○又臍灸
臍孔中二十七壯

之氣灸第五椎下隨年壯

論曰心卒厥逆上氣氣攻兩脅心下痛滿奄奄欲絕此為
奔也氣即急作湯以浸兩手足數數易之

奔豚灸氣海百壯穴在臍下一寸半○又灸關元百壯穴
在臍下三寸○奔補
傍一寸五分

奔豚腹腫灸章門百壯章門一名長平一穴在大橫外直
臍季肋端○奔豚捨心不得息灸中極五十壯中極一名
玉泉在臍下四寸

奔豚上下腹中與腰相引痛灸中府百壯穴在乳上二肋
間○奔豚上下灸四滿二十七壯穴候丹田兩傍相去二寸
即心下八寸臍下橫文是也

肺痿第六論一首方五首

論曰寸口脈數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師
曰此為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺
痿或從汗出或從嘔吐或從瀉瀉小便利數或從便難數

以飲藥下重亡津液故得肺痿又寸口脈不出而反發
脈卑索陰脈不澀二焦踟躕入而不出陰脈不澀身熱
反冷其內反煩多唾脣燥小便反難此為肺痿傷於津液
便如爛瓜下如豚腦但坐發汗故也其病欲效不得效效
出乾沫久久小便不利其脈平弱肺痿吐涎沫而不效者
其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也
此為肺中冷必眩師曰肺痿效唾咽燥欲飲者自愈自張
口者短氣也

甘草湯 溫臟治肺痿多涎唾小便數肺中冷必眩不
渴不效若渴者屬上虛下不能制溲服此湯已小溫覆之

甘草 肆兩
右二味以水三升煮取一升半去滓分二服

甘草湯 治肺痿涎唾多出血心中溫溫液液方千金翼名

甘草 二兩 以水二升煮取一升半去滓分三服

生薑 伍兩 甘草 肆兩 人參 參兩 大棗 拾貳枚

右四味以水七升煮取二升去滓分三服

桂枝皂莢湯 治肺痿吐涎沫不止方去皂莢加皂莢

桂枝 生薑 各參兩 甘草 貳兩 皂莢 壹兩 大棗 拾伍枚

右五味以水七升煮取二升去滓分二服

麻黃湯 治肺脹欬而上氣咽燥而喘脈浮者心下有水方

麻黃 芍藥 生薑 仲景用 細辛

桂心 各參兩 半夏 五味子 拾半 石膏 肆兩

右八味以水一斗煮取二升分二服仲景名此

膏湯用甘草
六兩為九味

肺癰第七論一首 方五首

論曰病欬唾膿血其脈數實者為肺癰虛者為肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿若口中辟辟燥欬即胃中隱隱痛脈反滑數此為肺癰也問曰病者欬逆師脈之何以知為肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脈何類何以別之師曰寸口脈微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脈數跌陽脈緊寒熱相搏故振寒而欬跌陽脈浮緩胃氣如經此為肺癰師曰振寒發熱寸口脈滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之不應愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胃中者為肺癰其脈數欬唾有膿血設膿未成其脈自緊數緊去但數膿為已成也

桔梗湯治欬胃中滿而振寒脈數咽乾而不渴時時出濁唾腥臭又吐膿如粳米粥是為肺癰者方

桔梗 參兩集驗用貳兩 甘草 貳兩

右二味以水二升煮取一升去滓分二服必吐膿血也 一方有欬冬花壹兩半

葶藶湯治肺癰喘不得卧方

葶藶 參兩為末 大棗 貳拾枚

細辛

鬼臼

當歸

桂心

乾薑

黃芩

麝香各半兩

附子肆枚

右十二味以水一斗煮取二升去滓下牛黃麝香

末分二服

治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛尸遁尸發作無時捨心曾滿脅痛如刀刺口噤者方

甘草

乾薑

茯苓

乾地黄

羊脂

當歸

細辛各壹兩芍藥

吳茱萸

桂心各貳兩

梔子人拾伍枚

右十一味以水八升煮取二升去滓內脂烱盡分三服欲利者加大黃二兩

治卒中惡風角弓反張或飛尸遁尸心腹絞痛者方

金匱要略

卷一

急者此尸疰病也宜先服甘草汁一升消息少時服瞿麥湯盡一劑得下便覺稍寬并暴癆堅結宿食及女人血堅痛發作無定者神良

五疰湯治卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛大脹急方

大黃

甘草各叁兩

當歸

芍藥各貳兩

烏頭拾枚

生薑

蜜各壹斤

桂心肆兩

右八味以別漬大黃以水九升煮取三升烏頭別內蜜中煎令得一升拌湯中去滓分服二合如人行三里久更進一服日三不知加至四合

蜈蚣湯治惡疰邪氣往來心痛徹背或走入皮膚移動不定苦熱四肢煩疼羸乏短氣方

蜈蚣壹枚牛黃壹分大黃貳兩丹砂人參

細辛

鬼臼

當歸

桂心

乾薑

黃芩

麝香各半兩

附子肆枚

右十二味以水一斗煮取二升去滓下牛黃麝香末分二服

治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛尸遁尸發作無時捨心曾滿脅痛如刀刺口噤者方

甘草

乾薑

茯苓

乾地黃

羊脂

當歸

細辛各壹兩芍藥

吳茱萸

桂心各貳兩梔子人拾伍枚

右十一味以水八升煮取二升去滓內脂烱盡分

三服欲利者加大黃二兩

治卒中惡風角弓反張或飛尸遁尸心腹絞痛者方

乾地黃

茯苓

芎藭

當歸

甘草各壹兩

吳茱萸

桂心

乾薑

芍藥各貳兩梔子人拾伍枚

右十味以水八升煮取二升分三服痛甚者加羊

脂二兩當歸人參芍藥各一兩心腹堅急加大黃二兩

桃皮湯治中惡氣心腹痛胃脇脹滿短氣方

桃白皮壹握

真珠

附子各壹兩梔子人拾肆枚

當歸叁兩

吳茱萸

豉各伍合桂心貳兩

右八味以水五升煮取一升去滓內真珠末分作

二服一方無當歸以下四味

桃奴湯治中惡諸尸蠱疰心腹卒絞痛方

桃奴

當歸

人參

乾薑各壹兩

芎藭

甘草各叁兩丹砂

麝香

茯苓

犀角

鬼箭羽

桂心 各二兩

右十二味以水九升煮取一升半去滓分一服未

食服大便不通腹滿者加大黃二兩芒消二兩 胡洽治

兩無用 砂芍藥

治卒中風寒冷溫氣入腹虛脹急滿捨心留脇又痛氣息

不通脈弦緊汗不出及得傷寒方

吳茱萸

當歸

麻黃

獨活

甘草

桔梗

茯苓

各貳兩 桂心

青木香

石膏

大黃

犀角 各二兩

右十二味以水九升煮取二升分三服日三

治風冷氣入腹忽絞痛堅急如吹大小便閉小腹有氣結

如斗大脹滿起其脈弦老者沈遲方

卷之十七

卅三

瞿麥

當歸

猪苓

鬼箭羽

桔梗

防己

海藻

吳茱萸

芎藭 各貳兩

桂心

大黃 各二兩

一用犀角

右十一味以水九升煮取二升分三服

治諸雜症相連續死亦治二十年瘰疬方

桃根白皮一片以水二斗煮取一斗去滓分八

九服須令三日服盡 崔氏用桃根白皮治瘰疬 在心腹不可忍者

又方 搗桃人二十七枚研酒服 **又方** 小芥子末雞子白和傅

尸疰鬼疰者即立尸之中尸疰又挾諸鬼邪為害者也其

變動乃有二十六種至九十九種大畧令人寒熱淋瀝沈

沈默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頹滯

以至於死死後復注易傍人乃至滅門覺如此候者宜急

之方

獾肝一具陰乾治下篩水服一方寸匕日三如一具
不瘥更作

小附者散治飛尸賊風發時急痛不在一處針則移發一
日半日乃瘥須更復發者方

細辛 甘草一作莽草天雄各壹分桂心各三分附子
烏頭 乾薑各壹兩雄黃 真珠各半兩

右九味治下篩酒服方寸匕不知稍增以知為度胡
椒肆分不用 桂心附子

大附者散治五尸疰忤與前狀同者方

黃芩 由跋 椒目 細辛 雄黃
乾薑 黃連各壹兩 金牙 犀角 麝香

牛黃各壹分 天雄 桂心各半兩 真珠各三分 蜈蚣壹兩

右十五味治下篩酒服一錢匕日三以知為度

大金牙散治一切疰病方見第十一卷中

金牙散治鬼疰風邪鬼語尸疰或在腰脊胃脇流無常
不喜見人志意不定面脫色目赤鼻張唇乾甲黃者方

金牙 雄黃 鐵精 野葛 露蜂房
芎藭 大黃 甘草 曾青 蛇蛻皮

真珠 丹砂 簡茹 乾漆各壹分 石長生
狸骨一作鸛骨 桔梗 鬼臼 鬼箭羽 鬼督郵

椒目 烏頭 狼毒 蕪荑 藜蘆
雷丸 鼈甲 滑石各壹分 毒公

胡燕屎 牛黃各壹分 人參 狼牙 寒水石

桂心各一分 石膏五分 蜈蚣 蜥蜴 附子各一分

蜣螂 亭長各一分 元青 徐長卿 斑猫各一分

貝母貳枚

右四十五味治下篩先食以酒服一斗圭日再不知漸加之蟲隨大小便出崔氏各蜀金牙散

治風入臟腑悶絕常自躁痛或風疰入身冷疰鬼疰飛尸惡氣腫起或左或右或前或後或內或外針灸流移無有常處驚悸腹脹氣滿心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或進或退陰下濕癢或大便有血小便赤黃夜中勞極

白木拾肆枚 附子 秦艽 人參

牡蠣 蜀椒 細辛 黃芩 芍藥

牛膝各一分 乾薑 桂心 防風各五分 茯苓

桔梗 當歸 獨活 柴胡各肆分 烏頭

甘草 麻黃 石南 莽草 括萎根

天雄 杜仲各貳分

右二十六味治下篩平日酒服五分匕訖如人行七里久勢欲解更飲酒五合為佳

大乙備急散 治卒中惡客忤尸入腹鬼刺鬼疰及中惡

疰吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病六七日方

雄黃 桂心 芫花各貳分 丹砂 蜀椒

藜蘆 巴豆各一分 野葛各三分 附子五分

右九味巴豆別治如脂餘合治下篩以巴豆合和更搗合和調置銅器中密貯之勿泄有急跌水服錢五匕可加至半錢匕老小半之病在頭心胃腹在膈上吐在

下利在四肢當汗出此之所為如湯沃雪手下皆冷方
宜秘之非賢不傳

龍牙散治百疰邪鬼飛尸萬病方

龍牙 茯苓各一分 雄黃 藜蘆各五分

乾地黄 石斛 胡燕菜各三分 鬼箭羽

烏頭 羌活 露蜂房 曾青 真珠

桂心 杏仁 防風 桃奴 鬼臼

鶴骨各壹兩 人參 大黃各壹兩 白木貳兩 蘇子肆合

銅鏡鼻 甘草 橘皮 芎藭 鬼督郵

遠志 鼈甲貳半 狸陰貳具 蜈蚣壹枚

右三十二味治下篩酒服一斗圭以知為度當有蟲從
大便出

治鬼疰蠱疰毒氣變化無常者方

犀角 麝香 丹砂 雄黃 蜈蚣

鮫魚皮 丁香 鹿角 龍骨 蘘荷根

蜀椒 乾薑各壹分 貝子拾枚

右十二味治下篩酒服方寸匕加至二七日三

備急散治卒中惡風氣忤迷絕不知人方見第十一卷

治暴心痛面無顏色欲死者方

以布裹鹽如彈丸大燒令赤置酒中消服之利即愈

治蠱疰方

燒猫兒屎灰水服之用雄雞兒

墨奴散治卒得惡疰腹脹方

金下墨壹合 鹽貳合

右一味合治以水一升半煮取八合一服令盡須臾吐下即瘥

治哭疰方

流齒間刮取垢水服之

又方

亂髮煮兩

臘月猪脂壹合

右二味取猪脂煎髮令消烱服之蟲死矣

又方 熬大豆帛裹熨之

治一切病食疰方

凡食上得病各為食疰

取金下土雞子大為末酢泔清一升和服之行五十

步吐即瘥

又方

還取本食種數多少相似各少許和合布裹燒灰如

杏人大水服之

鸛骨圓

治遁尸飛尸積聚骨痛連背走無常處或在臟或

腫在腹或奄奄然而痛者方

鸛骨炙寸

丹砂一作參

牡蠣一作丹

雄黃

莽草各肆分

藜蘆

桂心

野葛各貳分

斑猫

芫青各拾

巴豆肆拾枚

蜈蚣壹枚

右十二味為末蜜丸如小豆每服二九日三以知為度

鵝腸圓

治癥堅水腫飛尸遁尸寒尸喪尸尸注骨血相注

惡氣鬼忤蛇毒邪氣往來夢寤存亡流飲結積虎狼所齧

爛犬所咋鴆毒入人五臟服藥以殺其毒毒即消婦人邪

氣鬼忤亦能遣之方

方與積聚皆用重

蜥蜴

蜈蚣各貳

蚤蟲

杏仁各叁

地膽伍拾

蠶蟲肆拾

蜈蚣拾

朴消

巴豆各壹

澤漆

鬼督郵 桑赤雞 桃奴 犀角各貳分 乾薑肆分

虎骨陸分 甘草壹兩 芍藥 甘遂各伍分 款冬花叁分

右二十味別治巴豆杏人如膏內諸藥末研調下蜜搗

一萬杵丸如麻子大食前服三九日一不下加之不取

吐下者一丸日服有人風冷注癖堅二十年得愈

桔梗圓治毒疰鬼疰食疰冷疰痰飲宿食不消酒癖諸病

桔梗 藜蘆 皂莢 巴豆 附子各貳兩

右五味為末蜜和搗萬杵丸如梧子宿不食平旦飲服

二丸仰卧服勿眠至食時膈上吐膈下下去惡物如科

斗蝦蟇子或長一二尺下後當大虛口乾可作雞羹飲

五合太極飲食粥一升三四日病未盡更服忌如藥法

十種圓治十種疰氣疰勞疰鬼疰冷疰生人疰死人疰尸

疰食疰水疰土疰等方

雄黃 巴豆各貳兩 人參 甘草 麥門冬

細辛一作藜蘆本 桔梗 附子 皂莢 蜀椒各壹兩

右十味末蜜丸如梧子空腹服五九日再稍加以知度

大乙神明散治諸病破積聚心下支滿寒熱鬼疰長

病效逆唾噎辟除衆惡鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡胃中結

氣咽中閉塞有進有退繞臍絞痛惻惻隨上下按之挑手

心中溫溫如有蟲狀毒注相染甚至滅門者方

雄黃 桂心 丹砂 礬石一作礬蘆

大黃各貳兩 元青伍枚 真珠 附子各壹兩半 麝香

人參 犀角 鬼臼 射罔 牛黃各壹兩

蜈蚣 蜥蜴各壹枚 烏頭捌枚 杏人各拾枚 斑蝥

標雞

地膽各五分

當歸各二兩

巴豆青豆分

右二十四味為末蜜和搗二萬杵丸如小豆先食服二

丸日再不知稍增以藥二丸著門上令雞邪不近傷寒

服之無不愈若至病家及視病人夜行獨宿服二丸雞

邪不能近也胡洽無二青桂心真珠麝香人參犀牛角

積聚篇重

大度世圓

治萬病癥結積聚伏尸長病寒熱疰氣流行

皮中久病著牀肌肉消盡四肢煩熱嘔逆不食傷寒時氣

惡症汗出口噤不開心痛方

蜀椒各二兩

人參

細辛

甘草各一分

茯苓

真珠

大黃

乾薑

丹砂

野葛

桂心

雄黃

麝香

鬼臼各五分

烏頭

牛黃各一分

附子

紫苑各一分

巴豆陸拾

蜈蚣貳枚

右二十味為末蜜丸如小豆飲服二丸加至四九日二

加獺肝一具尤良

大度世圓

治萬病與前狀同者方

牛黃

大黃

雄黃

細辛

附子

真珠

甘草

人參

射罔

丹砂

鬼臼

莽草各五分

蜀椒

麝香

鬼箭羽

茯苓

桂心

紫苑各一分

乾薑各二兩

野葛壹尺

蜥蜴

蜈蚣各壹

地膽伍拾

元青貳拾

標雞參拾

巴豆人

捌拾枚

右二十六味末蜜丸如小豆飲服二九日一先食服之

治疰病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病方

懶肝 壹員

蜈蚣 壹枚

麝香

貳分

雄黃

莽草

丹砂

鬼臼

犀角

巴豆

大黃

牛黃

各壹兩

右十一味末蜜丸如麻子空腹服二九至三九以知度

雷氏千金圓 治行諸氣宿食不消飲食中惡心腹痛如刺

及瘧方

消石

叁分

大黃

伍分

桂心

乾薑

貳兩

巴豆

人枚

右五味為末搗二千杵蜜丸如大豆服二九神驗無比

已死者折齒灌之

治卒得尸疰毒痛往來方

杏仁

亂髮灰

各等分

右二味研如脂丸如梧子每服酒下三九日二姚氏指膏和丸

治遁尸尸疰心腹刺痛不可忍者方

桂心

乾薑 各壹兩

巴豆

貳兩

右三味治下篩以上酥和如泥傅病上乾即易之

治遁尸尸疰心腹及身有痛處不得近者方

取艾小按令碎著痛上厚一寸餘熱湯和灰令強熱

置艾上冷即易不過二二度瘥

治遁尸飛尸又治暴風毒腫流入四肢頭面方

白芥子一升蒸熟搗以黃丹二兩攪和分作兩分用

踈布袋盛更蒸使熱以薄痛上當更迭蒸袋常使熱

薄之如此三五度即定

治皮膚中痛名曰癢疰方

醋和燕窠土傅之

治五疔方

燒車釘令熱暫入水以濕布裹熨病上

治二十年氣疔方

豉心半升 生椒壹合

右一味以水二升煮取半升適寒温用竹筒縮取汁令病者側卧手擎大孔射灌之少時當出惡物此法垂死悉治得瘥百千不可具說

灸法

凡五尸者飛尸遁尸風尸沈尸尸疔也今皆取一方兼治之其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胃傍攻兩脅或累塊踊起或攣引腰背治之之法灸乳後二寸男左女右可二七壯不止者多其壯數取愈止○又灸兩手大拇指頭各

七壯○又灸心下三寸十壯○又灸乳下一寸隨病左右多其壯數○又以細繩量患人兩乳頭內即裁斷中屈之又從乳頭向外量使當肋鍔於繩頭灸三壯或七壯男左女右卒疔忤攻心胃灸第七椎隨年壯○又灸心下一寸三壯○又灸手肘文隨年壯

一切病食疔灸手小指頭隨年壯男左女右

五毒疔不能飲食百病灸心下三寸胃管十壯

水疔中經云肺來乘腎食後吐水灸肺輸○又灸三陰

交○又灸期門穴在乳下一二肋間瀉肺補腎也各隨年壯

一切疔無新久先仰卧灸兩乳邊邪下三寸第二肋間隨

年壯可至二百壯又治諸氣神良一名注市

重刊孫真人備急千金要方卷之十七

灸尸鬼疔

