




傷寒論注解

四





仲景述

王叔和撰次

成無己註解

辨太陰病證并治第十



太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚行腹自痛若下之必

胃下結便太陰與病陽也太陰之脾布胃中邪氣壅而

利益甚時腹自痛陰寒在內而為腹痛者則為常痛此陽邪干

裏難痛而亦不常痛但時時腹自痛也若下之則陰邪留於胃

下為結鞭經曰病發於太陰中風四肢煩疼陽微陰澀而長者

陰而反下之因作痞太陰中風四肢煩疼者風溼未去

為欲愈也表邪少則微裏向和則澀而長長者陽也陰病見陽

則解故云欲愈太陰病欲解時從亥至丑上脾為陰王王於

時云解六陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯裏曰浮為在表邪在

經也故當自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服

四逆輩屬太陰為寒在中焦與四逆等湯以溫其藏傷寒脈

浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者

不可攻黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實

腐穢去故也太陰病至七八日大便難者為太陰入府傳於

實府腐穢去也下利煩燥者死此以脾氣和遂和也本太陽病醫反

下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之表邪未

之邪因乘虛傳於太陰裏氣不和故腹痛太實痛者桂枝加大

黃湯主之故加大黃以加大實太陰為病脈弱其人續自便

利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也腹痛

大陰病也肺弱其人續自便則和雖在裏未成大實故去

大黃芍藥攻滿痛者宜少去之以胃氣易動動利也

辨少陰病證并治第十一  
少陰之為病脈微細但欲寐也少陰為病脈微細者邪氣傳

則寐邪傳少陰則氣行於少陰病欲吐不止心煩但欲寐五

陰而不行於陽故但欲寐少陰病欲吐不止心煩但欲寐五

自利而渴其屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰

病形悉具小便白者以下焦虛有寒能制水故令色白也

六日邪傳少陰之時自利不渴者病在中焦屬大陰此自

而渴為實在下焦屬少陰腎虛水燥渴欲引水自救下焦虛寒

不能制水小便色白也經曰下利欲飲水者熱有熱故也此下

利雖渴然以小便色白病人肺陰陽俱堅反汗出者亡陽也此

屬少陰法當咽痛而復吐利反汗出者陽虛不固也故云亡陽

以无陽陰虛是屬少陰內經曰客邪少陰之然令人少陰病欬

而下利譏諸者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也而

者津液內竭加火氣煩之故譏語小便難也少陰病脈細沉

數病在裏不可發汗少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛及

脈弱瀉者復不可下之弱瀉為亡陽復不可下少陰病

至七八日自下利脈暴微手足反冷脈緊反去者為欲解

也煩下利必自愈欲解之時自下利脈暴微者氣得通也

治小陰病小利惡寒者則手足暖而脈緊不去者則手足反

時自煩欲去衣被者可治惡寒而脈陰氣得復故云可治少

陰中風脈陽微陰浮者為欲愈者表邪緩也陰脈當沉而陽脈

浮者裏氣和也陽中有陰少陰病欲解時從子至寅上

少陰解於此者陰得陽則解也少陰病吐利手足不逆冷反

熱者不死欲去衣被者少陰七壯者死吐利手足不逆冷者則

少陰病至

少陰病至

少陰病至

太陽陽氣多血... 少陰病

但厥無汗而惡寒之必動其血未知從何道出或從口鼻或從

目以是名下厥上竭為難治

惡寒身踈而利手足逆冷者不治

少陰病上利下重者死

少陰病下利止而頭眩時自冒者死

少陰病四逆惡寒而身踈脈不至不煩而躁者死

少陰病六七日息高者死

少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日利復煩躁不得臥寐者死

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子

麻黃附子細辛湯方

麻黃二兩去節甘熱

細辛二兩

附子一枚炮去皮

去滓溫服壹升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無

微汗也則可也

麻黃附子甘草湯方

麻黃二兩

附子一枚

甘草二兩

麻黃附子甘草湯方

右參朮以水漿升半 芩朮各兩 兩沸去上沫 內諸藥 煎之 服

小病得之二三日以上 心中煩不得臥 黃連阿膠湯主之 厥陰病身重 骨節痛 煩渴 欲飲水 當與之 時熱煩於內 心煩不得臥也 與黃連阿膠湯 扶元散熱

苦連阿膠湯方

黃連 四兩 黃芩 兩 芍藥 兩 阿膠 三兩

雞子黃 二枚 甘溫 阿膠 甘溫

陽有餘以苦除之 黃芩黃連之品 以除熱陰不足以甘補之 雞子黃阿膠之甘 以補血酸收也 芍藥之酸 收陰氣而泄

右五味以水伍斗 先煮芩朮物取貳升 去滓內膠 滓去 小冷內雞子黃 攪令相得 溫服 藥合日三服

少陰病得之一二日 口中不和 其背惡寒者 當灸之 附子湯主之

少陰客熱則口燥舌乾而渴 口中不和者 不苦不燥 是未熱也 為陽背惡寒者 陽氣弱陰氣勝也 經曰 无熱惡寒者 發於陰也 灸之助陽消陰 與附子湯 溫經散寒

附子湯方

附子 二枚 破八片 茯苓 三兩 白朮 四兩 芍藥 三兩 甘草 二兩

辛以散之 附子之辛 以散寒甘以緩之 茯苓令人參白朮之甘 以補陽酸以收之 芍藥之酸 以收陰 所以然者 偏陰偏陽 則為病 火欲熾而水當平之 不欲熾而勝也

右五味以水捌升 煮取叁升 去滓 溫服 宜升日叁服

少陰病身體痛 手足重 骨節痛 脈沉者 附子湯主之 少陰病 身體痛 手足重 骨節痛 脈沉者 附子湯主之

少陰病下利 血者 桃花白朮之 少陰病下利 血者 桃花白朮之

下焦不固 而血不固 桃花白朮之 下焦不固 而血不固 桃花白朮之

桃花湯

赤石脂一斤半全用 粳米一石熱糲米

去脂赤石脂以散重米之甘以散之

右參味以水染之必令熱去滓 溫服令內赤一二升末

方寸匕日參服若壹服愈餘勿服

少陰病二三日至四五日腹滿小使不利下利不止便膿血者

桃花湯主之二三日以至四五日定邪入裏深也腹滿裏寒也

胃馬弱下焦不固也 少陰病下利便膿血者可刺下焦血者

利下焦血通氣以少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸

湯主之吐利手足厥冷則必死 少陰病下利

痛者滿心煩者猪膚湯主之猪膚其支別者從肺出絡

注胃中邪自腸經傳於少陰之 猪膚湯

利咽言平市心煩也與猪膚湯 猪膚湯

猪膚湯

猪膚一斤

猪水畜也其氣先入腎少陰也 解之加白蜜以潤腸除其燥以益氣斷利

右壹味以水壹斗煮取伍升去滓加白蜜壹升白粉伍合

香和相得溫分陸服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯陽邪傳

邪熱為咽痛服甘草湯 甘草湯

甘草湯方

甘草二兩

右末以水三升煮取壹升半去滓溫服未合白蜜

桔梗湯

桔梗二兩

甘草二兩



有貳味以水參升以關其取真刀去滓分溫再服

少陰咽中傷生瘡言聲不出者言溫湯主之

酒湯方

半夏洗如棗核雞子一枚去內上苦

辛甘散之半夏之辛以發音聲甘以緩之雞子之甘以緩咽痛發以收之苦酒之酸以飲咽瘡

右貳味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀鏤中安火上令三沸去滓少二含嚥之不差更作三劑

少陰病咽中痛半夏散及湯主之少陰客熱咽痛

半夏散及湯方

半夏溫桂枝去皮甘草炙

內經曰寒濕所勝平以辛以甘以緩正氣

已上參味各別搗篩已合治之和服方寸匕日三服

不能散服者以水壹升煎七沸內散兩方寸匕更煎三沸

火令小冷少二嚥之

白通湯方

葱白四莖乾姜一斤附子一枚生用去皮

少陰病下利白通湯主之少陰上水少陰客寒不能制水故自利也白通湯溫裏散寒

右參味以水二升煮之壹升去滓分溫再服

陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者與豬肝湯主之服湯後暴出者死微瀉者生少陰病脈微瀉者生

白通湯者，復陽散寒，湯利不止，脈逆無脈，乾嘔煩渴，身重下利，此為陰盛陽虛，故死。脈微續者，生。湯也。

白通加豬膽汁方

葱白四莖

乾姜二兩

附子一枚生去皮破八片

人尿五合

豬膽汁一合

內經曰：若調寒熱之逆，冷熱必行，則熱物冷服，下益之，冷熱既消，熱性便發，由是病多難愈。嘔噦皆除，情且不違，而致大益。此和人尿，猪膽汁，鹹苦寒物，於白通湯，熱劑中要其氣相從，則可以去格拒之寒也。

已上參味以水參升，煮取壹升，去滓，內膽汁，人尿，和令相得。分溫再服。若無膽，亦可用。

少陰病二三日不已，至四五，嘔，瀉，小便不利，四肢沉重疼痛。利者，此為有水氣。其人或浮或沉，或小便不利，或嘔噦。

真武湯方  
正湯主之。主水腎病。二三日則邪氣猶淺，至四五則邪氣入深。甚也。四肢沉重，疼痛，痲痺，身重，不能轉側，水氣腹脹，痛者，寒濕水谷不別也。內邪曰濕，勝則濡泄，與水氣同。武湯益陽氣，散寒濕。

茯苓三兩

芍藥三兩

生姜二兩切

白朮二兩

附子一枚炮去皮

脾惡濕，甘先入脾。茯苓，白朮，甘以益脾，逐水。芍藥，辛以濕。以辛熱濕淫所勝，佐以酸平。附子為藥，生姜之酸，辛以濕。

右五味以水八升，煮取三升，去滓，溫服，七合，日三服。後加減法。

若數者，加五味子半升。日辛乾姜各壹兩。氣逆數者，五成子之。

博則效。辛乾姜，辛乾姜，辛乾姜。若小便不利者，去茯苓。若心下利者，去附子。若心下利者，去附子。

前成半斤通則西附補氣生美散氣千金少陰病

清穀寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤

或腹痛或乾嘔或吐痛且利止脉不出者通脉四逆湯主之

清谷手足厥逆通脉微絕身反不惡寒面色赤者外熱此陰甚於內格陽於外不相通也與通脉四逆湯散陰通陽

通脉四逆湯

甘草二兩

附子大者一枚生用

乾姜三兩強人

右三味以水三升煮取壹升真合去滓分温再服其脉即出

者愈

面色赤者加葱玖莖通陽氣腹中痛者去葱加芍藥貳兩

之酸通氣利腹中痛者加生薑貳兩咽痛者去葱

藥加桔梗壹兩咽中如結加桔梗止脉不出者去桔梗加人參

貳兩利止脉不出者人參以補之咽痛者去葱

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利

重者四逆散主之四逆者四肢不温也傷寒邪在二陽則手足

厥冷又其於逆四逆散傳陰之熱也

四逆散方

甘草

炙甘草

枳實

破水積灸

柴胡

苦

芍藥

酸微

內經曰熱淫於內左以甘苦以酸收之右以苦發之枳實甘草之苦以散裏熱芍藥之酸以收陰氣柴胡之苦以發表

右四味各加分搗篩以散和服方寸匕日三服

效者加五味下乾姜各任分并主下痢肺寒氣逆則效五味子

散肺寒并主下痢者肺大腸悸者加桂枝伍分不能通行心

為表裏下動也桂枝主小便利者加茯苓伍分而淡用

也引導陽泄腹中痛者加附子壹枚炮令坼裏虛遇加補虛泄利下重

先以火伍升煮薤白二升取三升以散三方寸匕



一二三四五日而厥者必發熱前熱者後必發熱厥者

熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷燥赤

引熱上行必口傷燥赤傷寒病厥五日熱亦五日設六日當

復厥不厥者自前厥終不過五日以熱五日故知自愈

則熱先厥五日陰勝至六日陽復勝熱亦五日後復厥者陰

復勝若不厥者陽金勝故曰愈經曰發熱四日厥反三日復熱

是其病為愈是厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆

傷寒脈微而厥至七八日其人躁無暫安時者山為藏厥

非為虻厥也虻厥者其人當一虻令病者靜而復時煩此為

寒虻入膈故煩煩更復止得食而嘔又煩者虻聞食臭出

人當日吐虻虻厥者烏梅圓主之又主久利方

且日夜半愈後三日脈之而脈數其熱不罷者此為熱氣有餘

必發瘧膿也瘧而利厥反五日瘧寒氣多不能食而反能食

者思為除中除去也中胃氣也言邪氣大甚除去胃氣胃欲

食自救故暴能食此欲勝也必發熱若不發熱者胃氣

復去使之能食非除中也思之必發熱後三日脈之其熱續在者陽氣勝也

夜半愈若日不愈後三日脈數而熱不罷者為熱氣有餘必

遲為寒今與參湯復以其熱腹中應冷當不能食今反能食

此名除中必死傷寒時過六七日為完氣已深反与黃芩湯寒

能食者除中絕時必死傷寒先厥後發熱下利必自止而

又汗出咽中痛者其喉不痺熱無汗而利必自止不止必

便膿血膿血者其喉不痺變熱後發熱下利必自止而

出咽中痛者其喉不痺變熱後發熱下利必自止而

一四日五日而厥者必發熱前熱者後必無熱厥者

熱亦寒厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷燥赤

復厥不厥者自前厥終不過五日以熱五日故知自愈陰勝則

則熱先厥五日陰勝至六日陽復勝熱亦五日後復厥者陰

復勝若不厥者陽金勝故曰愈經曰發熱四日厥反二日復熱

是也十日陽氣內陷陽不與陰相續故手足為之冷也

傷寒脈微而厥至七八日冷其人躁無暫安時者山為藏厥

非為虻厥也虻厥者其人當蛇令病者靜而復時煩此為瘧

寒虻入肺故煩渴更復止得食而嘔又煩者虻聞食臭出

人當日吐虻虻厥者烏梅圓主之又主利方

烏梅圓方藏厥者死陽氣絕也虻厥雖

而頂吐虻日則靜不若藏厥而躁無暫安時也病人藏寒

胃虛虻動上膈聞食臭出因而吐虻與烏梅真溫藏寒

烏梅味甘酸溫細辛陸兩薑拾兩黃連苦寒當歸辛溫

附子陸兩炮蜀椒四兩桂枝陸兩人參陸兩黃蘗陸兩

肺主氣肺欲收急食酸以中之烏梅之酸以收氣脾欲

急食甘以緩之人參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之

苦堅之當歸桂枝細辛之辛以潤內寒寒淫於內以辛潤之

薑附之辛熱以勝寒也得甘則動得苦則安黃連黃蘗

以安

右拾味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅壹宿七核蒸之伍升

米下飯孰搗成泥和藥令相得內臼中與蜜研貳千下真如

梧桐子六先食飲服拾圓日叁服稍加至貳拾圓禁生公滑

物臭食等

寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日便利色

此熱除也欲得食其病為愈若惡心嘔胃腸百者其後必復

血指頭寒者見厥微熱少也默默不欲食煩躁者邪熱已和其病愈

便致病者手足厥冷言我不結胃小腹滿按之痛者此冷結在

三日復熱四日厥少熱名其病當愈四日至七日熱不除者其

後必便膿也先熱後厥者陽氣邪傳裏也發熱為邪氣在裏

愈熱不除者為熱氣有餘內搏腸陰之血其後必大便膿血

寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣也

為進也傷寒陰勝者先厥至四日邪傳裏重陰必陽却熱三日

則當復熱若不復熱至五日厥傷寒六七日脈微手足厥冷

燥炎厥陰厥不還者死傷寒六七日則正氣當復邪氣當罷

躁不得臥者死傷寒六七日則正氣當復邪氣當罷

至其厥止者死傷寒六七日則正氣當復邪氣當罷

止者死有陰無陽故也傷寒至七日為邪正爭之特正勝則生

下此為亡血下之死傷寒五六日不利腹濡脈虛復厥者不可

為難治當汗出而脈微者不可下下之為重傷寒而厥七日下利者

脈促手足厥逆者不可灸之為陽虛不相接灸之以助陽氣

脈滑而厥者裏熱也白虎湯主之滑為陽厥氣內陷是裏熱

手足厥寒脈細欲絕者當四逆湯主之手足厥寒脈細欲絕者

手足厥寒脈細欲絕者當四逆湯主之手足厥寒脈細欲絕者

手足厥寒脈細欲絕者當四逆湯主之手足厥寒脈細欲絕者

手足厥寒脈細欲絕者當四逆湯主之手足厥寒脈細欲絕者

手足厥寒脈細欲絕者當四逆湯主之手足厥寒脈細欲絕者

手足厥寒脈細欲絕者當四逆湯主之手足厥寒脈細欲絕者

手足厥寒脈細欲絕者當四逆湯主之手足厥寒脈細欲絕者

手足厥寒脈細欲絕者當四逆湯主之手足厥寒脈細欲絕者

陰血逆陽... 陽生陰... 行不...

桂枝 參兩 芍藥 參兩 細辛 參兩

大棗 貳拾五 甘草 貳兩 通草 貳兩

內經曰脈者血之府也... 當歸之味甘以助心... 血必苦緩急食甘以緩也

右柒味以水捌升煮取叁升去滓分服壹升日叁服

若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之

惡寒者四逆湯主之... 拘急下利者甚於裏四肢厥逆而

緊者邪結在胃中心中滿而煩飢不能食者病在胃中當瀉吐

之宜瓜蒂散... 傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不

部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者為難治麻黃升麻湯

主之... 傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥者

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩

麻黃升麻湯方... 麻黃 貳兩 升麻 壹兩 石膏 貳兩 知母 壹兩



黃芩苦寒

羌活辛平

石膏辛寒

白朮辛平

乾薑辛熱

芍藥酸平

天門冬甘平

茯苓甘平

茯苓甘平

甘草甘平

玉函曰大氣寒以取之其熱之氣以汗發之麻黃升麻之甘以發汗熱正氣重者以辛潤之當歸洋蔥之辛以散寒上熱者以苦泄之知母黃芩之苦涼心去熱津液少者以潤之茯苓之甘以緩肝生津加燥氣熱以酸收之以耳酸之芍藥之酸以斂逆氣委蛇門冬石膏甘平之甘潤味除熱

右拾肆味以水壹斗先煮麻黃去上沫內諸藥者以參升去滓分溫參服相去如炊參斗米頃令盡汗出愈

寒因五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也傷寒邪自傳表為本自寒下醫反吐下損傷正氣寒氣內為格拒經曰格則吐逆食入口即吐謂之寒格更極吐下則重虛而

之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯主之

張方

十四

乾薑黃連黃芩人參湯方

乾薑辛熱

黃連苦寒

黃芩苦寒

人參甘溫

辛以散之甘以緩之乾姜人參之甘辛以補正氣苦以泄之黃連黃芩之苦以通寒格右肆味以水陸升煮取貳升去滓分溫再服

下利有微熱而渴脈弱者人自愈下利脈數有微熱汗出今自愈設復緊為未解數陽脈也陰脈者

脈者生微汗出陽氣得通也利必自下利手足厥冷者脈者不還反微喘者死陰氣獨勝陽氣大虛也

溫脈下逆者陽已絕也反微喘者陽氣不足也少陰負趺跗者為順也脾水不勝土則為微利故為順也下利寸脈反浮者

自瀉者必清膿血也瀉者為無血尺中自瀉者陽氣微也

下必便膿血清者則者下利清穀不可攻表汗出必脹滿者

胃虛也胃為津液之主發汗下利脈必沉者下重也脈大者為

未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不死裏氣不足是主下者

其人面少赤自有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必

微厥所以然者其面戴眼下虛故也下利清穀脈沉而遲者必

者今自愈設不差必清膿血以有熱故也經曰脈數不解而下

也下利後脈絕手足厥冷時時脈還手足溫者生脈不還者死

下利後脈絕手足厥冷者無陽也時時脈還手足溫者為陽氣絕則見死也

傷寒下利日十餘行脈反實者死下利者裏虛也脈當微弱

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯

主之則未當厥其汗出而厥者陽氣大虛也與通脈四逆湯以

固陽熱利下重者白頭翁湯主之不利則津液少熱則傷氣氣

散熱厚腸

白頭翁湯方

白頭翁 苦寒 黃連 苦寒 黃柏 苦寒 秦皮 苦寒

右肆味以水柒升煮取貳升去滓溫服壹升不愈更服壹升

下利腹脹滿身熱疼痛者心溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯攻

表桂枝湯下利腹滿者裏有馬寒先與四逆湯下利飲

飲水者以有熱故也白頭翁湯主之湯以溫藏下利飲水者

下利瀝語者有燥屎也宜下承氣湯經曰實則

下利後重宜下承氣湯按之心下濡者為虛煩也

下利後重宜下承氣湯按之心下濡者為虛煩也

下利後重宜下承氣湯按之心下濡者為虛煩也

下利後重宜下承氣湯按之心下濡者為虛煩也

施子鼓湯下利後不煩為欲解若更煩而心下堅者恐為心下  
與施子鼓湯此順下而心下者是邪熱乘虛客於中為虛也  
吐之則愈嘔家有癰膿者不可治也膿盡自愈嘔而吐者  
可治嘔得膿而吐者脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四  
尺嘔亦自愈而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四  
湯主之嘔而吐者脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四  
逆嘔助湯乾嘔吐涎沫頭眩者吳茱萸湯主之裏實也嘔沫者  
寒氣上攻也與吳嘔而發熱者小柴胡湯主之經曰嘔而發熱  
柴黃湯溫裏散寒嘔而發熱者小柴胡湯主之經曰嘔而發熱  
傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外氣拂鬱後與  
外以發其汗因得熾所以然者胃中寒故也在大吐大下用  
水以發其汗胃中寒得水則胃氣和熾與之傷寒噦而腹滿視其  
前後知何部不利利之則愈後而腹滿氣上而不下也胃中  
前部小便便也

傷寒論正解卷之六

釋音

蹠音拳不憤扶物也 蹠音上烏路切撞它如切  
伸也 憤音也 蹠音也 撞音也



內經曰... 甘以緩脾... 右肆味... 碎溫服... 湯法以肆... 日三服加減法

若臍上築者... 欲得水者... 參足前成... 身微自溫... 止而身痛... 和之身痛... 急手足厥... 外熱脉微... 出而厥四... 吐而厥四... 其者後之... 故也

吐而厥四... 其者後之... 故也... 新虛... 吐利... 汗脈... 平小煩... 以新虛... 不勝... 穀氣

辨陰陽易... 證并治第十

傷寒陰陽各多之為病其人身體寒氣少腹重者為陰也  
平復男子下利之交得病名曰陰易以陰陽相感動其餘毒相染  
者亦易易其病身軀重少者損動也熱上衝者頭重不効也  
大病新差者下復而婦人與之交得病名曰陽易婦人新病差末  
病新差者下復而婦人與之交得病名曰陽易婦人新病差末  
平復男子下利之交得病名曰陰易以陰陽相感動其餘毒相染  
者亦易易其病身軀重少者損動也熱上衝者頭重不効也  
中者感動之毒所傷之也重蒸於上也與燒裨散以道法生  
燒裨散方

右取婦人中裨近隱處身燒灸以水和服方寸匕日三服  
便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子裨當燒灸

六病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加大黃如博  
棗子大五六枚病有勞復有食復傷寒新差血氣未平余熱未  
之熱有所裁因其谷氣留博兩陽相合而病者名曰食復勞復  
則熱氣浮越與枳實梔子湯以解之食復則胃有宿積加大  
黃以

枳實梔子豉湯方

枳實三枚炙

梔子十四枚

豉一升綿裹

枳實梔子豉湯則應吐劑此云覆令微似汗出者以其熱熾  
於上苦則吐之熱散於表者苦則發之內經曰火淫所勝以  
苦發之此之謂也

右三味以清漿水柒升空煮取肆升內枳實梔子豉取貳升  
下豉更煮任陸沸去滓過分再服覆令微似汗

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解之脈沉

者以下解之差後餘熱未更更發熱者与小柴胡湯以和  
也故以下解之脈浮者表在表也故以汗解脈沉者表在裏  
下解之大疝之後從胃已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之大  
脾胃氣虛不能制約腎水二益下注腰背以下為腫也金匱要  
略曰胃以下腫當利小便與牡蠣澤瀉散

牡蠣澤瀉散方

牡蠣

澤瀉

蜀椒

黃芩

平

藥盛

商陸根

熱性... 治... 各等分

平以... 治... 辛以苦... 氣內... 汗... 胃... 傷... 解... 虛... 氣... 欲... 吐... 與... 竹... 葉... 石... 膏... 湯... 主... 之... 傷... 寒... 解... 後... 津... 液... 不... 足... 而... 虛... 餘... 熱... 未... 盡... 熱... 則... 傷... 氣... 故... 少... 氣... 氣... 中... 欲... 吐... 與... 竹... 葉... 石... 膏... 湯... 主... 之... 傷... 寒... 解... 後... 津... 液... 不... 足... 而... 虛... 餘... 熱... 未... 盡... 熱... 則... 傷... 氣... 故... 少... 氣... 氣... 中... 欲... 吐... 與... 竹... 葉... 石... 膏... 湯... 主... 之...

右采味... 下... 篩... 為... 散... 更... 入... 白... 中... 治... 之... 白... 飲... 和... 服... 方... 寸... 匕... 小... 便... 利... 止... 後... 服... 日... 參...

大病差後喜噦又不了了者胃上有寒當以九逆溫之宜理中丸

欲吐者竹葉石膏湯主之

竹葉石膏湯方

竹葉 一把 石膏 一斤 半夏 半升 洗 麥門冬 一升 甘 人參 二兩 甘 粳米 半升 甘

辛甘發散而除熱竹葉石膏甘... 脾而益氣麥門冬人參粳米之... 以補不足辛者散也... 者欲其散半夏之辛以散氣逆

右采味以水壹斗煮取陸升去滓內粳米煮米熟湯成去... 溫服壹升日參服

病人脉已解而日暮微煩以病新差人強穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

天以為疾病至急倉卒尋按要者難得故重集諸口與不可... 治比之三陰二陽篇中此易見也又時有不止是三陰二陽

在諸可與不可中也

微則陽氣不足瀉則無血陽氣盈口風汗出而又躁煩瀉

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈

汗則氣上衝正在心端痛諸症曰心內證脈



下利後身疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯發汗則愈  
病汗則愈

辨發汗後病脈證并治第十七

發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津  
液後自愈  
胃為水穀之海津液之主發汗多亡津液胃中燥必發譫語此非實熱則不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈

此一卷第十七篇凡三十一證前有詳說

辨不可吐第十八

合四證已具太陽篇中

辨可吐第十九

大法春宜吐春時陽氣在上故宜吐凡用吐湯中病即止不必盡劑也  
要在通當也病在上諸實皆宜蠱蠱而痛不能食欲使人按之

而反有涎唾下利日十餘行身脈及遲寸口脈微滑此可吐之

利則止欲使人按之反有涎唾者知邪在胃中經曰下利脈遲而滑者內有食積也

也今下利日十餘行其脈反遲寸口脈微滑是上實也故可吐

之玉函曰上盛宿食在上脘者當吐之宿食在中下脘者則當吐

內經曰其高者因而越之病人手足厥冷脈下結以奪氣在胃中

心下滿而煩欲食不能食者病在胃中當吐之此與第六

同被云脈下系此云脈下結惟此有異緊為內實下緊則實未深是邪在胃中結為結實下結則結未深是邪在胃中所以謹治俱同也

經言

拒音臣也音臣承音承也音承眩音亮也音亮腕音腕也音腕竭音竭也音竭

帶音帶也音帶

傷寒論註解卷第七之八

仲景述 王叔和撰次 成無已注釋

辨不可下病脉證并治第二十一

脉濡而弱弱反在關濡反在顛微反在上溢反在下微則陽氣不足澁則無血陽氣反從中風汗出而反躁煩澁則無血厥而

且寒陽微不可下下之則心下痞澁陽微下之澁氣已虛陰動

氣在右不可下下之則津液亡竭喘燥鼻乾頭眩心悸也動氣

肺之動也下之傷胃動肺津液竭之竭燥鼻乾動氣在左不可

下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱則欲蹇動

在左肝之動也下之損脾而肝氣益勝復行於脾故腹內拘急

急食不下動氣更劇也雖有身熱以裏氣不足故則欲蹇

氣在上不可下下之則掌握熱所身上浮冷熱汗自泄欲得水

自灌動氣在上心之動也下之則助胃力動心氣心為

針經曰心所生病者掌中熱肝為藏中之陰病則熱

熱則則欲蹇作表熱裏寒也心為藏中之陽病則身上浮以熱

汗自泄欲得水自灌作表寒裏熱也二藏陰陽寒熱明可

動氣在下不可下下之則腹脹滿坐起頭眩食則下清穀心下

痞也動氣在下腎之動也下之則傷脾腎氣則動咽中閉塞

不可下下之則上輕下重水漿不可下則欲蹇身急痛下利日

數十行咽中閉塞胃已不和也下之則閉塞之邪為上控後傷

諸外實者不可下下之則發微熱亡脉厥者當臍握熱

外實者表熱也汗之則愈下之為逆下後裏虛表熱內陷故發

諸虛者不可下下之則大渴求水者易愈惡水者劇金匱玉

者小補勿一瀉之虛家下之為重虛內竭津液故令大渴脉濡

而弱弱反在關濡反在顛微反在上微反在下弦為陽運微為

陰寒上實下虛意欲得溫微弦為虛虛者不可下也虛家下之

難經曰實心火虛損不足益微則為欬欬則吐涎下之則欬

餘此者見工所害也

困不休利不休則胃中如蟲蟄粥入則出小便不利兩  
指急喘息為難頸背相引臂則不仁極寒反汗出身冷若冰眼  
睛不慧語言不休而穀氣多入此為除中口雖欲言舌不得前

內經曰感寒則受病微則為效甚則為壯為痛肺感微寒為  
效則脈亦微也下之氣下效雖止而因利不休利不休則奪止  
為難者裏氣損也頸背相引臂為不仁極寒反汗出身冷如水  
者表氣損也表裏損極至陰陽俱脫眼晴不慧語言不休難經  
曰脫陽者見鬼脫陰者目盲陰陽脫者應不能食而穀多入者  
此為除中是胃氣除去也口雖欲言舌不得前也

言舌不得前氣已衰脫不能運也脈濡而弱弱反在關濡反在  
巔浮反在上數反在下浮為陽虛數為無血浮為虛數為熱淫  
為虛自汗出而惡寒數為痛振寒而慄微弱在關胃下為急喘

汗而不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相搏形如瘧狀醫反  
下之故令脈數發熱狂走見鬼心下為痞小便淋瀝小腹硬  
小便則尿血也弱在關則陰氣內弱濡在巔則陽氣外弱浮為

虛浮在上則陰氣內弱濡在巔則陽氣外弱浮為  
虛遇邪未解醫反下之急喘而汗出脇下引痛振寒如瘧此裏邪未安  
表邪未解醫反下之急喘而汗出脇下引痛振寒如瘧此裏邪未安  
鬼心下為痞此熱陷於中焦者也若熱氣深陷則脈濡而緊

則胃氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊胃氣冷  
微嘔心內煩醫為有大熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞

堅表裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚悵快不得眠不知胃  
氣冷緊寒在關元技巧無所治汲水灌其身客熱應時罷慄慄

而振寒重被而覆之汗出而冒顛體惕而又振小便為微難寒  
氣因水發青穀不容間嘔變反腸出顛倒不得安手足為微汗  
身冷而內煩逆欲從後救不可復追還胃冷禁食陽微中

溫胃反為有熱解肌發汗則表虛亡陽煩躁心下痞  
足發汗反為有熱解肌發汗則表虛亡陽煩躁心下痞  
明醫不救重被覆之表裏逆汗出愈使陽氣虛也

病勢已過，脈浮而大，浮為氣實，大為血虛。血虛為無陰，孤陽得命，將難全。下陰部者，小便當赤而難，中當虛全反，小便利而大，汗出法。

應衛家當得全反，更實津液四射，榮竭血盡，乾煩而不得眠。血薄肉消而成，暴液醫復以毒藥攻其胃，此為重虛。客陽去有期，必下如汚塗而死。

當小便赤而難，全反小便利而大，汗出者陰氣內弱也。經曰：陰虛則汗自出，是以衛家可微而反更實。榮竭血盡，乾煩而不眠。此重虛則由消而成，暴液者津液四射也。醫反下之，又虛其裏，且必死。脈數者久，數不止，則邪結正氣，不能復正氣，却結於表。

故邪氣浮之與皮毛相得，脈數者不可下，下之則必煩利不止。數為熱，止則邪氣結於經絡之間，止氣不得復行於表，則如經於表，利邪氣，抽浮於皮毛下之，虛其裏，邪熱乘虛而入，裏虛不可下。利脈浮大，應發汗，醫反下之，此為大逆。下病欲吐者不可下。

下嘔多，雖有陽明證，不可攻之。胃中不和，大便硬，下之則嘔。太陽病外證未解，不可下，下之為逆。表未解者，雖有裏證，亦不可下。當先解外，與陽

汗逆也。若先發夫病陽多者，熱下之則鞭。陽多者，熱下之則鞭。下之雖除，然其裏虛，必清。無陽陰強，大便鞭者，下之則必清。

短氣，小便難，頭痛背強，加溫下則愈。短氣，小便難，頭痛背強，加溫下則愈。汗出者，定邪也。汗發熱，頭痛微

共候也。如此者，惡寒甚者，前汗出，喉中痛，多者，目赤，脈多。

睛不慧，醫者按之咽中，則傷。若發下之，則兩目閉，寒多者，便溲。

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

者可救之小便難者為危殆

下病脈證并治第二十一

大法秋宜下

不必盡劑也

血氣水

鳴者屬當歸四逆湯主之

利脈大者虛也以其強下之故也

設疎浮革固爾

下病脈證并治第二十一

下病脈證并治第二十一

下病脈證并治第二十一

下利三部脈皆平按之以下韌之也宜大承氣湯

脈今反和方此為內實也下利三部脈皆平者為實下利脈遲

而滑者內實則未欲止當下之宜大承氣湯

要畧曰胃氣實下利者宜下利者宜下利者宜下利者宜下

而大按之反溢亦微而滑者宿食當下之宜大承氣湯

可以候外天以候內浮以候裏沉以候裏寸口脈浮人者氣實

以下宿食下利不欲食者以有宿食故也當宜下之宜大承氣

湯以病不盡故也當下之宜大承氣湯

胃之氣秋則肺先受之假令春時受病氣必復動而痛也

有不盡者至春時元受月日內外相氣必復動而痛也

為腸胃宿積不積不積不積不積不積不積不積不積不積不積

下利脈反滑當有所去下之乃愈宜大承氣湯

傷寒後脈沉者內實也下解之宜大承氣湯

傷寒後脈沉者內實也下解之宜大承氣湯

傷寒後脈沉者內實也下解之宜大承氣湯

傷寒後脈沉者內實也下解之宜大承氣湯

傷寒後脈沉者內實也下解之宜大承氣湯

傷寒後脈沉者內實也下解之宜大承氣湯

傷寒後脈沉者內實也下解之宜大承氣湯

傷寒後脈沉者內實也下解之宜大承氣湯

傷寒後脈沉者內實也下解之宜大承氣湯

傷寒後脈沉者內實也下解之宜大承氣湯

傷寒後脈沉者內實也下解之宜大承氣湯

傷寒論卷之九

醫 盥 悵 快 下 於 也 音 貴 注 也

釋音

仲景述

王和撰次

成無已註解

此篇下卷第二十二篇凡四十八證并治第二十三

載之 卷內音釋上卷已有

已下諸方於隨卷本證下雖已有緣止以加減言之未甚明

白以於覽者檢閱未便今後校勘備列于後

葛根 四兩

芍藥 貳兩

甘草 貳兩

二錢 三兩

大棗 拾枚

桂枝 貳兩

右分味以水壹斗先煮麻黃葛根湯以并去上沫內諸藥

枝加厚朴杏子湯方 於桂枝湯方內加厚朴二兩杏

枝加附子湯方 於桂枝湯方內加附子一枚炮去皮破八

白木四兩 依前法

桂枝去芍藥湯方 於桂枝湯方內去

桂枝芍藥加附子湯方 於桂枝湯方內去芍藥加附子

桂枝麻黃各半湯方

桂枝 兩十六

芍藥

生薑 切

甘草 炙

麻黃 各乙兩 去節

大棗 四枚

杏仁 貳十四個 湯浸去

右藥以水伍升先煮麻黃去上沫內諸藥更取壹

升捌合去 溫服陸合

桂枝麻黃一湯方

桂枝湯方兩十七

芍藥湯方兩六

麻黃湯方兩六

生薑兩六

本拾六

甘草兩二

杏仁五枚

去皮尖

右藥味以水伍升先煮麻黃宣氣沖上沫內諸藥煮取

升去溫服壹升日再

虎加人參湯方於白虎湯方內加人參

桂枝加茯苓白朮湯方於桂枝湯方內去芍藥加茯苓白朮

上球方病證並在第二卷內

麻加半夏湯方於葛根湯方內加入半夏

桂枝湯方於第一卷桂枝湯方內更加芍藥生薑

生薑散湯方於桂枝湯方內加入生薑

芍藥湯方於桂枝湯方內加入芍藥

桂湯方於桂枝湯方內加入桂枝

上陸方病證並在第三卷內

胡桂枝湯方

桂枝去皮

黃芩

人參各乙

甘草兩

半夏二合

芍藥兩

生薑兩

生薑半切

柴胡四兩

以水柒升煮取叁升去滓溫服

附子瀉心

大黃二兩

黃連

黃芩各一兩

附子一枚

切參味以麻沸湯貳升漬之須臾絞去滓內附



圖書在版編目(CIP)數據

傷寒論注解/[金]成無己撰.—北京:北京圖書館出版社,2005.12

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-3024-7

I. 傷… II. 成… III. 傷寒論—注釋 IV. R222.22

中國版本圖書館CIP數據核字(2005)第136353號

ISBN 7-5013-3024-7



9 787501 330249 >

書名 傷寒論注解(全四冊)  
著者 [金]成無己 撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)

Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail:Bstfb@nlc.gov.cn

Website:www.nlcpress.com

造紙 華寶齋

印刷 杭州富陽古籍印刷廠

開本 八

印張 三二·七五

版次 二〇〇五年十二月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-3024-7 / K·1301

定價 一〇五〇圓



9 787501 330249 >

ISBN 7-5013-3024-7

北京圖書館出版社  
Tel: (010) 66151313 Fax: (010) 66174391  
E-mail: Bstfb@nlc.gov.cn  
Website: www.nlcpress.com

