

三因極一病證方論

十二

三因極一病證方論卷之十八

產勞證治

婦人因產理不順疲極筋力衰勞心虛發熱喘急喘之寒熱如瘧頭痛自汗肢軟倦怠咳嗽痰逆腹中絞刺名曰產勞

石字湯治產勞

石字湯治產勞

香豉 葱白

粳米

當歸

芍藥各二

右為剉散分兩劑每一劑用水三升煮取一小碗去滓分三服任意服

陰脫證治

婦人起產勞力勞過致陰下脫若脫肛狀及陰下涎出遍身腫痛至重房勞皆能發作清心瀉火小便淋瀝

治產後勞陰脫

硫黃

烏賊魚骨各半

五安子一分

右為末煮患處

當歸散治陰下脫

當歸

黃芩各二

芍藥一分

蠟皮一分

牡蠣各二

右為末每服一錢溫酒米湯任意調下忌登高至重

灸法

草炒蛇床子透熟布裹射患處亦治產後陰痛

桃仁膏治產後陰腫妨悶

桃仁去皮

枯礬石

五倍子各等分

右以下味為末研桃仁膏拌勻傅之

硫黃湯治產勞玉門開而不閉

硫黃四兩

吳茱萸

兔絲子各半

蛇床子



右為對散每服四錢水一椀煎數沸濾滓洗玉門日晡

下乳治法

產婦有二種乳脈不行有氣血盛而壅閉不行者有血少氣弱溢而不行者虛勞補之盛者導之盛者當用通草滿若土

芥根量虛者當用成煉乳粉猪蹄鯉魚之尾煎亦可見矣
瀉乳之乳治乳婦氣味辛 通乳汁不行及經絡凝滯乳內脹痛
留毒邪毒或作難產此藥服之自然內消乳汁通行

偏若二

蛇蛻

芥菜二十枚急

右為末每服二錢溫酒調下不以時仍與熱羹湯助之

成煉乳粉治乳婦氣少血衰脈盛不行乳汁絕少

成煉乳粉

右研細每抄二錢滾煎湯若湯調下

母猪蹄湯治女前

母猪蹄

食法

通草四兩

右以水一斗浸煮取得四五升取汁飲不下更作

青乳石治乳石作痛

嫩桑葉 右

右米飲調攤紙花貼病處千金云凡患乳癰四十已下

可治五十已上不可治之則死不治自得終其天年

惡露證治

產後見枕不散乃血癥堅聚之機羊白脯增劇疼痛淋瀝不快上攻心胃困頓狼狽宜服黑龍丹當歸湯奪命丹治之
黑龍丹治產後一切血疾垂死者但灌藥无有不効者神驗不可言

當歸

五靈脂

川芎

高良姜

乾地黄

並細剉入一椀頭沙合內赤石脂泥縛紙筋益泥固濟

封合炭火十斤收通紅去火候冷開取合子者成黑糟
以取出細研入後

百豆霜別稱 確黃 乳香各錢 花乳石
琥珀各錢

右為細末米醋煮糊丸如彈子大每服一圓炭火燒通
紅生薑自然汁与无灰酒各一合小便半盞研開頓服
立效

備用 治產後敗血不散兒枕硬痛或發或止及新產乘虛
風寒內搏惡露不盡小腹堅脹

當歸焙炒 虛前取并用 紅藍花各一兩
右為劑散每服二錢酒一大盞煎七分去滓食前溫服
方見前第一論

虛煩證治

虛煩最難調理所以 問男女及不許見穢惡者皆古人預
防其妄念也每日 以得男則喜得女則憂 一喜太早致
心虛煩悶多自此始蓋去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱
內熱曰煩其證心會遠痛吸二短氣頭痛悶亂骨節疼痛喘
時時甚与大病後虛煩相類

人參當歸湯 治產後煩悶不安

人參 當歸 麥門冬去心 乾地黄
桂心略乙 芍藥二兩

右為劑散每服四大錢水二盞先將粳米一合淡竹葉
十片煎至一盞去米葉入藥并棗二枚煎七分去滓食
前服地黄宜用生乾者虛甚則用熟

蒲黃散 治產後虛煩心効

蒲黃不以多炒

右一味每服一錢匕東流水調下不以時候

虛渴證治

產後去血過多津液不固腎氣虛弱多使人煩渴引飲无度
雖非二消其證頗同治之當養血通氣回津補口方效

熟地黃湯治產後虛渴不止少氣脚弱眼昏頭眩飲食无味

熟地黃一兩 人參三兩 麥門冬二兩

括樓根四兩 甘草半兩

右為劉散每服四錢水二盞糯米一撮生姜三片棗三

枚煎七分去滓食別服

氣經通治同前方見前妊娠腹痛門

淋閉證治

諸治產前產後淋閉其法不同產前當安胎產後當去血如其
冷熱實石氣淋等為治則一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃

最為宜產後更藥唯當審其所因則不失機變矣

治產後諸淋元問冷熱膏石結氣悉主之

白茅根八兩 瞿麥穗 白茯苓各四兩 蒲黃

桃膠 滑石 甘草各二兩 子貝十個

葵子 人參各二兩 石首魚腦骨十斤

右為劉散每服四大錢水一盞半薑三片灯心二十莖

煎七分去滓溫服亦可為末煎水通湯調下二錢如氣

塞閉不通橫痃皮肉爛調下

產後諸病治法

當歸養血湯治產後惡血不散發渴疼痛及惡露不快脘腹

堅脹兼室女經候不勻赤白帶下心腹腰脚疼痛

當歸 赤芍藥 牡丹皮 延胡索各二兩 桂心一兩

右為末蜜丸如梧子大溫酒米飲下三五丸食前溫服

痛甚細時因下

四神散 治產後留血不消積聚作塊急切皮肩猶如道尸及心腹絞痛下利

當歸 芍藥 川芎 乾姜炮各

右為末每服方寸匕溫酒調下

丁香散 治產後咳逆

石蓮肉十枚 丁香十枚

右為末水半盞煎數沸服

當歸散 治產後腰脚疼痛不可轉側壯熱自汗身熱強氣短

黃芪二兩 當歸三兩 芍藥二兩

右剉散每服四大錢水一盞半姜五片煎七分去滓食前溫服

刺麻湯 治產後傷風發熱面正赤喘而頭痛

乾葛三分 防風 桔梗 桂心

人參 甘草炙各 附子炮去皮臍

右為剉散每服四錢水一盞半姜五片棗二個竹葉十片煎七分去滓空腹服嘔者加半夏

神效散 治婦人產後一切疾病不問大小以至危篤不能者

牡丹皮 白芍藥 桂心 陳皮 青皮各半

當歸 百合炙 川芎 甘草炙 乾姜炮各

人參 神麴 麥蘖炮各 紅花一分

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空腹服孕婦不得服

調補法

產後氣血既衰五臟俱損唯得將補不可轉利雖惡血未盡

亦不可便服補藥須候七日外臍下塊散方可投之若痛甚切者或崩傷血利虛羸喘乏別生它疾帶起宿患宜尋閱諸方悉詳調理不必拘以日數也如黑神散却不妨

黑神散 治產後諸疾

當歸 白芍藥 甘草 白薑炮

桂心 黑豉妙去 蒲黃 熟地黄各等分

右為末溫酒或小便任意調下空心服忘如常一法去

蒲黃加附子

四順理中湯 治新產血氣俱傷五臟暴虛肢躄羸乏少氣多

汗然漉直至百晷每日常服壯氣補虛調養臟氣蠲除餘

疾消穀皆食兼治產後臟虛嘔吐不止

甘草 人參 白朮 乾姜炮各

右不煉蜜丸如梧子大每服二十丸溫米飲下空心食

前服

當歸理中湯 治產後勞傷虛羸不足腹中疝痛吸二少氣小

腹拘急痛連腰背時自汗出不思飲食產訖直至滿月每

日三服令人丁壯強健

當歸四兩 桂心三兩 白芍藥六兩 甘草炙一分

右剉散每服四大錢水一盞半姜三片棗二枚煎七分

去滓入飴糖一塊再煎消服崩傷內衄加阿膠地黃煎

伏龍肝 治產後百疾百日内常服除宿血養新血方見後

人參養血圓 治產後出月羸瘦不復常方見後

羊肉湯 治產後腹中疼痛虛勞不足裏急胸痛并治寒疝

當歸三分 生姜一兩 精羊肉四兩 橘皮半兩

右剉散水三椀酒少許煎至一椀去滓分二服或少加

葱鹽亦佳

婦人女子衆病論證治法

婦人三十六病未論所述各品不同或云七癥八瘕九痛十
二帶下共三十六雖有各數不見證狀又論云十二癥者是
所下之物不同一如清血二黑血三紫汁四赤肉五膿痂六
豆汁七葵羹八凝血九清血十米泔十一如月流十二經不
應期九痛者熱傷痛冷位痛淋瀝痛小便時痛經來時痛脇
脹痛汗出如虫噬痛脇下分痛腰膝折痛七害者衄乳不利
陰中寒熱小腹急堅臍內不仁子門揭開洞泄惡吐五傷者
兩脇支痛心引脇痛氣結不通邪思洩利前後痼寒三瘕者
羸瘦不生肌斷緒不乳逆經水閉塞亦名二十六病各品雖
殊無非血病多因經脈夫於有逆產薄不善調護內作七情
外感六淫陰陽勞逸飲食生冷遂致榮衛不輸新陳不化隨
經敗濁瘀露凝滯之為癥為瘕流溢積惡痛害傷痼記時微若
秋是伏病重如山岳古人所謂婦人之病十倍男子雖言之
太過亦明戒約之功也

治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡風怯寒
或逆項痛拘急短氣心脇腰背腹吐与子藏相引痛崩下
五色心常恐懼遇寒怒憂勞即發皆是內傷所致

白芷

白石脂

禹餘糧

烏賊魚骨

牡蠣

龍骨

細辛

當歸

芍藥

黃連

白茯苓

乾姜

桂心

人參

石韋

瞿麥

白芷

附子

白斂

甘草

右為末蜜丸梧子大空心酒下二十九至五十九

治婦人久冷无子及數經墮胎皆因衝任之脈虛損
胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後

經崩中漏下三十六疾積聚癰瘕將下冷痛小便白濁以
上疾證皆令孕者不成以至絕嗣此藥治產後百病百日
內常服除宿血生新血令人有孕及生子充實亦治男子
亡血諸疾

木香煨 茯苓 京墨鹿 桃仁炒上 秦艽

甘草炙 人參 桔梗炒 石斛燉 蚕布燒

藁本各二 當歸 桂心 乾姜炮 細辛

牡丹皮 川芎各半 川椒炒 山藥各二 澤蘭

熟地黃 香附各四 蒼朮八兩 大豆卷炒 糯米炒

右為末蜜丸每兩作六丸每一丸嚼細食前溫酒醋湯
任下

聖藥前治婦人百病

吳茱萸炒 白薑炮 當歸

赤芍藥 延胡索炒 破故紙炒 川椒炒

生乾地黃 劉寄奴 蓬蘽木 橘皮

青皮 川芎各一 荷葉反 白紙文 糯米炒

右為末醋糊丸如梧子大每服三五十圓且湯使如后

月經不通紅花蘇木酒下 白帶牡蠣粉調酒下

子宮又冷白茯苓煎湯下 赤帶建茶清下

血崩且淋酒調縮皮下 胎不安蜜和酒下

腸風陳米飲調百草霜下 心疾官蒲煎酒下

漏阻下血烏梅溫酒下 耳聾蟬點茶湯下

胎死不動斑猫二十个煎酒下 腰脚痛當歸酒下

胞衣不下益薑研水下 頭風薄荷煎茶下

血風眼黑且甘草湯下 十瘡地黃湯下

身軀疼痛黃芪末調酒下 四肢浮腫麝香湯下

咳嗽宜推杏仁桑白皮湯下 腹痛為藥調酒下

產前後劇白者白姜湯下 赤者甘草湯下 雜者二宜

湯下 常服溫酒醋湯任下 並空心食前服

治婦人衆病无所不治

熟地黄 川芎 防風 檳榔 蕪荑

蟬蛻 柏子仁 馬牙消 黃芪

白薇 川椒 鱗鱗 晚蚕沙 當歸

木香 附子 石膏 澤蘭 藁本

厚朴 甘草 白姜 吳茱萸 枳殼

右為末煉蜜為丸和許數千下丸如彈子大每服一九具

湯便如后

血痕塊痛綿綿及酒下 催生溫酒細嚼下

血勞血虛壯硬酒下 血崩極瀉及酒下

血氣痛妙白姜酒下 血風荆芥酒下

血暈悶絕胎死腹中胞衣不下並用生地黄汁童子小

便酒各一盞煎二沸調下常服醋湯溫酒化下並空心

食前服

治婦人產前產後眼見黑花或即發狂如見

鬼狀胞衣不下失音不語心腹脹滿水穀不化口乾煩渴

寒熱往來口内生瘡咽中腫痛心虛忪悸夜不得眠產後

中風角弓反張面赤牙關緊急胸中下血如豚肝狀胸腹

疔瘡血多血少結為癥瘕恍惚昏迷四肢腫痛產前胎不

安產後血刺痛

生地黄 二斤 當歸 一斤 延胡索 一斤

生薑 二斤 枳殼 一斤 芍藥 一斤 黃芪 一斤

蒲黃 四兩 南薤瑇瑁 一兩

右為末蜜為丸彈子大當歸湯化下一丸食前服

調血圓 調補衝任溫暖血海治胞絡傷損宿瘀乾血不散受

胎不牢多致損胎常服去風冷益血

當歸

牛膝

北胡索

芍藥

茴香

蒲黃

香附

澤木

菊花

熟地黃

桂心

烏豆

右用醋煮烏豆乾取豆為末再入二椀煮至一椀留在

作糊為丸如梧子大酒飲任下五十九

人參調血圓 治女人稟受怯弱血氣虛損常服補衝任調血

氣散惡寒治婦人懷身腹中絞痛口乾不食崩傷眩暈及

產出月意瘦不復常者

人參

赤芍藥

川芎

黃芩

熟地黃

烏梅肉

當歸

熟地黃

烏梅肉

右為末蜜搜汗數干下丸如梧子大每服五十九至百

丸溫酒米湯任下食前服

四物湯 調血養氣血治衝任虛損月水不調胎腹痛

痛崩中漏下血痕塊不聚或疾痛妊娠宿冷將理失宜胎

動不安血下不止及產後乘虛濕寒內搏惡露不結生

痕聚小腹堅痛時作寒熱又治血氣虛冷崩中去血

熟地黃

當歸

川芎

白芍藥

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓空心服忌

葱薑芩

溫經湯 治衝任虛損月候不勻或來多不斷或過期不來或

崩中去血過多不止及治曾經損道損妊娠瘀血停留小

腹中痛發熱下利手心煩熱唇口乾燥治小腹有寒又不

受胎

半夏去滑 川芎 人參

白芍藥 牡丹皮 桂心 阿膠蛤粉

甘草炙 吳茱萸炒 麥門冬去心

右為散每服三錢水一盞半生薑五片煎八分去滓
挑服空心食前

牡丹散

治血虛勞倦五心煩熱肢麻疼痛頭目昏重心忪煩
赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不利
臍腹脹痛氣熱如癢又治室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽
潮熱肌熱漸成骨蒸

牡丹皮 芍藥 甘草炙 桂心

沒藥別研 延胡索 紅花 當歸 烏藥各一

陳皮 蘇木 鬼箭 蓬朮各一 乾薑各一

右為末每服二錢白水煎七分忌生冷

伏龍肝散

治氣血勞傷衝任脉虛經血非時或崩下或如
豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久
未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸使人
无子

伏龍肝 赤石脂煨 牡蠣煨

烏賊骨煨 禹餘糧煨 桂心各等分

右為細末空腹酒飲任調下二錢白多者加牡蠣烏賊
骨赤多者加赤石脂禹餘糧黃多者加伏龍肝桂心隨
病加之有龍骨

艾煎丸

治崩漏淋瀝小腹痛痛常服補榮衛固經脉
食茱萸湯洗 當歸各一 熟地黃 白芍藥各一
石菖蒲 川芎 人參 熟艾各一

右為末煮酒黃糊為丸梧子大每服五十九酒飲任下
艾血湯治婦人血風血熱血虛經候時常經脈不通四肢麻
木肌躄渾身疼痛倦怠將成勞瘵

馬鞭草 各四 荆芥穗 各四 佳心 當歸

枳殼 各四 赤芍藥 川芎 各四 牡丹皮 一兩

右藥為末每服四大錢水一盞半烏梅一錢煎七分去
滓空心服

抵當湯治婦人經水不利

水蛭 各四 虻虫 各四 桃仁 各三 大黃 各三

右為末每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服血未
利更服亦治男子有瘀血膀胱痛

万病丸治室女月經不通臍下堅結人如杯身瘦遠往來下
刺痛瘕疝此為血瘕若生肉瘕不可為也

乾漆 各四 牛膝 各四 牛黃 各四 牛黃 各四

右以地黃汁入下二味為末燻火熬俟可方即丸如梧
子大空心米飲或溫酒下二九日再勿妄加病去止熱
婦人氣血虛經不行若服破血行經藥是殺之也謹之

聖石心治婦人經水閉不利藏堅癆不止中有乾血下白物

礬石 各三 杏仁 各一

右研杏仁細入礬石加少蜜煮如棗大綿裹內陰中未
知再作

三稜散治婦人血癥血瘕食積痰滯

三稜 各四 蓬朮 各四 青皮 半夏 各三

右用好醋六升煮乾焙為末醋糊丸梧子大醋湯下三
四十九痰積去湯下

烏金散治婦人血氣血癥血風勞心煩躁筋骨疼痛四肢

好黑豆拾兩

沒藥

當歸各半兩

右先將黑豆不犯水淨拭用沙瓶一隻入豆在內以瓦片蓋盛水固濟留蒸通氣炭火二斤煨煙存性以塩泥塞瓶嘴退火次日取出豆如鷄翼研細入後水研勻不拘時候温酒調下二錢重者不過三五服之鯉魚毒由水母之類

治腸胃病因寒氣客於腸外与胃氣相薄正氣不榮

繫於內着惡氣乃起其生也始如雞知久久成狀如懷胎按之堅推即移月事時下故曰腸覃亦治乳癰大小便不利并含有伏虫臙脹腫疽毒腫久寒邪氣

烏蒙去皮半夏煨附子石膏腹鼓薑薑炒 乾薑炒 桂心

茯苓西 蠶各 桂心 乾薑炒 巴豆炒 小

右不蜜丸如棗且大每服三五丸食後酒飲下治男

子細痛

木香治婦人脾氣血氣血虫水虫石虫

木香 沉香 乳香研 甘草炙 川芎

胡椒 陳皮 人參 晉鑿各半 桂心

乾薑炒 縮砂略 茴香炒 天茄各兩 乾小

右洗焙為末空心日午温陳米飲調下二錢心羊皮

石治婦人血結胞明或為癥瘕在腹脇間心腹脹滿腫

急如石水狀俗謂之血虫

石莖一兩 當歸尾 馬鞭草各半 紅花炒 聖

烏梅肉各半 蓬茂也 三稜也 蘇木節

沒藥 琥珀別研 各 甘草絡

右為末濃煎蘇木酒調下二錢不飲酒薑棗煎湯

大棗皮煎治婦人血癭單二腹腫

大腹皮 防己 木通 厚朴

枳殼 黃芪 枳殼 桑白皮

大黃 陳皮 青皮 五味子

古劉散每服秤一兩水一碗煎至六分盡去滓入酒一分温服不以時候

大黃 治婦人小腹滿如敦二狀小便微難而不渴產後者為水与血并結在血室也

大黃 甘草 阿膠

右劉散每服三錢水一盞煎七分去滓温服其血當下

小柴胡湯 治婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適

斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時

方見心陽經傷風傷寒門云傷風必須有汗宜加桂心

小麥湯 治婦人驚躁喜悲傷欲哭狀若神靈所作數呻欠

小麥一升 甘草三兩

右為劉散每服半兩水一盞煎四枚煎至六分去滓空

心温服亦補脾氣

桂枝湯 治婦人月病血刺疼痛方見前氣門

桂枝湯 治婦人血痺方見前門

竹茹 熟地黄 人參 白芍藥 桔梗

川芎 當歸 甘草 桂心 各一兩

右為劉散每服四錢水一盞煎七分去滓不以時候

黃芩湯 治婦人穀氣衰胃氣下泄陰吹而正噎

頭髮灰 猪脂

右調勻綿裹如棗核大納陰中

蠶脂證治

凡婦人少陰脉數而滑者陰中必生瘡名曰蠱瘡或痛或痒如虫行狀淋漓膿汁陰蝕幾尺皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血留滯故經云諸痛痒瘡皆屬心又云陽明主肌肉痛痒皆屬心治之當補心養胃外以薑洗坐導藥治之乃可

補心湯

方見心藏虛實門

狼牙湯治婦人陰中蝕瘡爛潰膿水淋漓臭穢

狼牙一味剉濃煎汁以綿纏筋頭大如蛋浸濃汁陰

中日數次

准黃丸

方見狐惑門凡蝕於肛者單燒藥糞不熏之蝕於下部則因乾糞參湯洗

養胃湯

方見五變門

小兒論

凡小兒病与大人不殊唯回氣脐風夜啼重舌變蒸客忤積熱驚癇疳積惡病疳疔不行數證大人无之其如傷風傷寒疳瘡下痢用藥則一但多少異耳諸方前已類編可披而得故不重引然養小之書隋唐間猶未甚該博 宋則有錢氏要方張氏妙選胡王備錄幼幼新書及單行小集方論證狀動詩七百不勝備矣今畧取保生要方具前數證以防緩急之需博推君子不妨廣覽

小兒初生回氣法

小兒初生氣欲絕不能啼者必是難產或冒寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷脐帶且將胞衣置炭火中燒之仍懸大紙摺煎油點灯於脐帶上往來偏帶燎之蓋脐帶連兒脐得火氣由脐入腹更以熱醋湯盪洗脐帶須臾氣回啼哭如常方可浴洗了即斷脐帶

小兒初生所服藥法

小兒初生急以綿裹指拭其口中惡血若不急拭啼聲一出即入腹成百病矣亦未須与乳且先与拍破黃連浸湯取濃汁調米粉細末抹兒口中打尺之腹中舊屎方可与乳兒若多睡聽之勿強与乳則自然長而少病

小兒初生通大小便法

小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水先嗽口了吸咂兒前後心并臍下手足心共七处每一处凡三五次嗽口吸咂取紅赤為度須臾自通不尔所生意有此證遇此方可謂再生

小兒脐風撮口證

小兒初生一七日內忽患脐風撮口百無一活坐視其斃者皆是良可憫有一法極驗出罕有知者凡患此兒齒齦上有小泡子如粟米狀以溫水蘸熟烏果手拍輕擦破即口開便安不用服藥神效

千金變蒸論

凡小兒有生三十一日一變再變為一蒸十變而五小蒸受三蒸者其蒸者其血脉改其五臟變者上氣蒸者其轉者本熱而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如魚目珠子微汗出其重者休壯熱而脉亂或汗或不汗不欲食二輒吐眼目白睛微赤黑睛微白變蒸畢自明矣此其證也單變小微兼蒸小變凡蒸畢者五日而衰遠者十日而衰先期五日後之五日為十日之中熱乃除耳或違日數不除切不可妄治及多刺但少与紫丸微下之熱歇便止若身熱耳熱尻亦熱此乃他病可作別治

治小兒變蒸發熱不解并發傷寒溫壯汗後熱不歇及

腹中有痰癖哺乳不進乳則吐哕食積先寒後熱者

代赭石 赤石脂各一四 杏仁五 杏仁去皮尖

右以上二味為末別研四豆杏仁為膏相和更搗一二
千杵當自相得若硬入少蜜同杵之蜜器中收三十日
兒服如麻子大一粒与少乳汁令下食頃後与少乳勿
令多至日中當小下熱除若未全除明日更与一粒百
日兒服如小豆一粒以此準定增減夏月多熱喜令發
疹二三十日輒一服桂紫丸无所不治雖下不虛人

夜啼四證

小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重舌口瘡四曰客忤
寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲腰而啼此寒證
也熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹暖啼時或有汗仰
身而啼此熱證也若重舌口瘡則要乳不得口到乳上即啼
身額昏微熱急取燈照口若无瘡舌必腫也客忤者見生人
氣忤犯而啼也

治冷證腹痛夜啼

大蒜一 煨火 煨香 煨取 煨出 煨細 煨切 煨研 煨乳 煨香 煨研 煨粉

右研勻丸如芥子大每服七粒乳空時乳頭以乳汁送

治熱證人躁夜啼

燈花三 燈花兩

右研細用灯心煎湯調塗口中以乳汁送下日三服

治小兒重舌

真蒲黃三 真蒲黃兩

右研細每抄些小捺舌下時心捺之愈更以溫水蘸
熟帛裹指輕按捺之按罷換藥

壯疳散治小兒口瘡

牡蠣煅通每斤取土中七日以火五三甘草炙末
右和勻時抄少許捲口中或無亦吐皆无害

用本家厨下火柴頭一个火滅者以朱書曰吾是天上
五雷公將來作神將能收夜啼鬼一縛永不放急如
律令柴頭以火燒焦頭為上書了勿令兒知立在床下
倚床前脚裏男左女右

黃土 治小兒卒客忤

竈中黃土 蚯蚓屎 各等分

右研勻和水塗兒頭上及玉心良

積熱證治

小兒積熱者表裏俱熱遍身皆熱煩赤口乾小便赤大便焦
黃先以四順清涼飮子利動臟腑熱則去或既去復熱者內
托已解而表熱未解也當用澤瀉散紅紫散加麻黃微發汗
表熱迺去表熱去後又發熱者何也此證當到此尺不能曉或
再用涼藥或再解表或以謂不可醫誤致天傷者甚多此表
裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再發也非托證也只用
六神散入粳米煎和其胃氣則收陽氣歸內身體便涼托重
者用銀白散

四順湯子 治小兒頭昏煩赤口內熱小便赤大便少此裏熱

大黃 當歸 赤芍藥 甘草 各等分

右為末三歲上小兒每服一大錢水一盞煎至七分作
二服

法用芍藥欲利小便則用赤者虛熱
者加甘草下利者減大黃胃風邪加麻黃去節中風身
本強戴服者加獨活並於一兩中加減半錢

桂枝散

活裡 細辛 人參 甘草炙

白茯苓 瓜蒌根 白朮

右等分爲末每服一錢水一小盞薄荷二葉同煎四分溫服不拘時候

紅綿散

殭蚕炒白朮 天麻 天南星 蘇木節

右爲末每服一錢水一小盞入紅綿少許同煎至六分溫服凡小兒風抽頭目不清並宜服之若傷寒有表證發熱者每服入去節麻黃末半錢以下有裏熱心躁渴者入滑石末半錢以下同煎服之

六神散

人參 白茯苓 乾山藥 白朮

白扁豆 甘草炙

右爲末每服一大錢水一小盞棗一個生薑二片同煎至五分通口服此藥用丸甚多治胃冷加附子治風證加天麻治利加嬰粟殼

銀白散

乾山藥 白朮 白茯苓 人參

白扁豆 知母 甘草炙 升麻

右等分爲末一錢水一小盞棗一個煎七分溫服不拘時候

急慢驚風證治

小兒發癇俗云驚風有陰陽二證身熱面赤而發搐搦上視牙關緊硬者陽證也因吐瀉或只吐不瀉日漸困面色白脾虛或冷而發驚者不其搐搦微人目上視手足微動者陰證也陽證用涼藥陰證用溫藥不可一經作驚風治也又有一證

欲發瘡疹先身拉驚跳或發搐搦此非驚風當服發散藥

驚風

朱砂一分 膩粉 麝香路半 蘆薈
白附子 甘草絡二 胡黃連各 蝎梢七个
殭蚕十條 金箔七片 赤脚蜈蚣一條
右為末二歲以上服半錢匕以金銀薄荷湯調下二錢
以上服半錢如口不開灌入鼻中

雲荷

黑附子姓 主天南星 半夏絡一 白附子一分
右研細并花水浸七日每日換水浸訖控乾入朱砂二錢麝一錢拌勻每服一字薄荷湯調下量兒加減一方用附子生去皮脐為末每服一錢以水一盞半生薑一片同煎至半盞分三服量兒加減吐者入丁香五分同煎乳空時服或用水浸炒餅為丸如粟米大每服二十粒亦可○餘方見藥類賦

解顛治法

三寶散 治小兒頭骨應合而不合頭骨開解名曰解顛

細辛 桂心各半 乾薑七分半
右為末以乳汁和薄顯上乾復傳之兒面赤即愈

又方

宛蛻炒焦為末
用猪頰車中骨髀傳頂上日三四度曾有人作頭巾裹頭遮護之久而合良法也

魛病證治

千金論小兒有魛病者是娘婦被惡神道首腹中令兒病也魛亦小兒也其證微下利寒熱去來皇毛鬚髮髮不怡

者是也宜服龍膽湯婦人先有小兒未能行而母更育娠使兒飲此作魃也假令兒黃瘦骨立發熱髮落

龍膽湯治小兒出腹血脈未盛實寒熱温壯四肢驚悸以治若若能進哺中食實不消壯熱及寒熱小解中客入鬼氣并諸癩驚

龍膽草 柴胡 黃芩 桔梗 釣藤皮

芍藥 炙草 茯苓 蜈蚣 大黃 一兩

右剉散以水一升煮取五合為一劑十歲以下小兒可服若兒生一日至七日分一合為二服八日至十五日為二服或三服生十六日至二十日分二合為三服小兒生二十日四十日及以五合為二服皆以得下即止此為出腹嬰兒所作若日月長大者以次日例為其有客忤及有鬼氣可加入參當歸各一錢半百日者加一錢如一字二百日見加二錢半一歲見者加五錢餘皆准此

疳病證治

小兒疳病多因缺乳其食太早所致或因父母康臟脾胃虛蟲動日漸羸瘦足不能行髮墜發熱无精神肥兒丸主之

肥兒丸

川連 神曲 大麥蘖 木香 一子

肉果 麩 檳榔 各五錢 肉苳蔻 各一錢

右為末神曲糊丸如梧桐子大每服三二十九量見歲開水送下

六神丸

史君子 訶子 肉苳蔻 各一錢

肉果 各用麩果火煨熟為度

諸藥 各一錢

右爲末煮棗肉和丸如麻子大每服五丸至七丸溫米飲湯下

龍膽丸 治病發熱

龍膽草 川連 史君子肉 青蠅各等

右爲末猪膽汁和丸如梧桐子大每服二十粒以意加減臨卧時滾水送下

五加皮散

治小兒生三歲不能行者由受氣不足體力虛怯腰脊腿膝脚筋骨軟不能行

五加皮

右味以粥飲調用酒少許每服一粟殼許日三服

鹿茸地黄丸

治小兒足軟不能行

鹿茸鮮者一隻 熟地

丹皮三兩 茯苓

山藥 萸肉各四兩

澤瀉各二兩

右爲末熟蜜和丸如梧子大每服三錢青鹽湯下

三因極一病證方論第十八





少賞樓藏



少賞樓藏



圖書在版編目(CIP)數據

三因極一病證方論/[宋]陳言撰.—北京:北京圖書館出版社,2005.12

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-3025-5

I. 三… II. 陳… III. 中醫學臨床—中國—南宋
IV. R24

中國版本圖書館CIP數據核字(2005)第136347號

ISBN 7-5013-3025-5



9 787501 330256 >

書名 三因極一病證方論(全十二冊)
著者 [宋]陳言 撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)

發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail: Btstxb@nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

造紙 華寶齋

印刷 杭州富陽古藉印刷廠

開本 八

印張 八七·七五

版次 二〇〇五年十二月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-3025-5 / K·1302

定價 二八一〇圓



9 787501 330256 >

ISBN 7-5013-3025-5 / K·1302
定價 二八一〇圓
印張 八七·七五
版次 二〇〇五年十二月第一版第一次印刷
印數 一—二〇〇
書號 ISBN 7-5013-3025-5 / K·1302
定價 二八一〇圓

E-mail: Btstxb@nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

Tel: (010) 66151313 Fax: (010) 66174391

北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)

華寶齋

杭州富陽古藉印刷廠

