

黃帝內經素問

三

卷十五

皮部論

經絡論

卷十六 氣穴論

水熱穴論

骨空論

四時刺逆從論

調經論

標本病傳論

繆刺論

標本病傳論

黃帝內經素問卷第十五

啓亨次註林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

皮部論

經絡論

氣穴論

氣府論

皮部論篇第五十六

新校正云按金元起本在第二卷

黃帝問曰余聞皮有分部脉有經紀筋有綴絡骨有度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之始終願聞其道歧伯對曰欲知皮部以逕脉為紀者諸經皆然

循經脉行止所主則皮部可知諸經謂十二經脉也十二經脉皆同

陽明之陽名曰

手太陽之脈也

害殺

日害蟲生化弭故

上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也

上謂

手陽明之脈也

明下謂足

其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒

五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內

陽謂陽經

陰謂陰絡此通言之也手足身分所見經絡皆然

少陽之陽名曰樞持

樞謂樞要持謂執持

上下同法

視其部中有浮絡者皆少陽之絡也

名曰少陽之脈也

無故

在陽者主內在陰者主出以滲於內諸經皆然太陽之陽

名曰開樞如樞之運動則氣和平也

上下同法視其部中有浮絡者皆少

者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞儒

樞儒順也守要而順陰陽開闔之用也

上下同法視其部中有浮絡者皆少

陰之絡也絡盛則入客於經其入於陽部注於經其

運上校正云按甲乙經儒作孺

出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩

心主脉入腋下氣不和則妨害肩腋之動

部皆謂本經絡之所

凡十二經絡脉者皮之部也

列陰陽位部主於皮散曰皮之

同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於

入客於經太陰之陰名曰開蟄

開閉蟄類使順行藏校正云按甲乙經蟄作執

上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則

部是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開閉則入客於絡脉留而不去傳入於經留而不去傳入於府壅於腸胃壅積也邪之始入於皮也泝然起毫毛開腠理泝然惡寒也

也腠理皆謂皮空及文理也

其入於絡也則絡脉盛色變謂易其常也

其入客於經也則感虛乃陷下經虛邪入故曰感虛

脉虛氣少故陷下也

其留於筋骨之間

寒多則筋癶骨痛熱多則筋弛骨消肉燥脈破毛直而敗

革急也弛緩也消樂也鍼經曰寒則筋急熱則筋緩寒勝爲痛熱勝爲氣消脈者內之標故肉消則脈破毛直而敗也

帝曰夫子言皮

之十二部其生病皆何如歧伯曰皮者脉之部也

脉氣流行各有陰陽

氣隨經所過而部主之故云脉之部邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脉絡脉

滿則注於經脉經脉滿則入舍於府藏也故皮者有分部不

與而生大病也

脉行皮中各有部分脉受邪

与元起云言不与經脉和調則氣傷於外邪流入於內必生大病

帝曰善

經絡論篇第五十七

新校正云按全元起本在皮部論末王氏分篇

黃帝問曰夫絡脉之見也其五色各異青黃赤白黑不同

其故何也歧伯對曰經有常色而絡無常變也

經行氣故色見常應於持

絡主血故受邪則亦而不一矣

帝曰經之常色何如歧伯曰

二十六市

言脾

黃腎里皆亦應其經脉之色也帝曰絡之陰陽亦應其經

乎歧伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行

順四時氣化之行止

寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則

黃赤此皆常色謂之無病五色具見者謂之寒熱

淖澤也謂潤液也

微溫帝曰善

氣穴論篇第五十八

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒聞之歧伯稽首再拜對曰竊乎哉問也其非聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處孰誰也帝捧手逡巡而却曰夫子之開余道也目未見其處耳未聞其數而目以明耳以

聰矣

目以明耳以聰言心志通明迥如意也

此伯曰此所謂聖人易語良馬易御也

真數發蒙解惑未足以論也

問氣穴真數漁將解彼蒙昧之意也疑惑不足以論述深微之意也

然余願聞夫子溢志盡言其處令解其意請藏之金匱不敢復

出言其處謂穴俞處所

此伯再拜而起曰臣請言之背與心相控而痛所

治天突與十椎及上紀

天突在頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脉之會低鍼取之刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯按今甲乙經經脉流注孔穴圖經當脊十椎下並無穴目恐是七椎也此則督脈氣所主之上紀之處次如下說

新校正云按甲乙經云任脉之會也

甲乙經天突在上紀者謂中脘也中脘者胃募也在上脘下同身結喉下五寸

陽足陽明三脉所生在脉氣所發也刺可入同身寸之一寸二分若灸者可灸七壯

新校正云按甲乙經云任脉之會也

也開元者小腸募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脉之會刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者可灸七壯

下紀者開元

陽左右如此其病前後痛濇皆脇痛不不外也

氣短氣偏痛

新校正云按別本偏一作滿

脉滿起斜出尻脉絡脣脇支心貫

鬲上有加天突斜下有交十椎下

尋此支絡脉流注病形證悉是督脈支絡自尾骶出各上行斜

陽左右如此其病前後痛濇皆脇痛不不外也

新校正云按甲乙經流作留餘別流並作留刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三壯太衝在足大指本節後同身寸之二寸陷者中動脈應手足厥陰脉之所注也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯中封在足內踝前同身寸之一寸半

新校正云按甲乙經云一寸陷者中仰足而足厥陰脉之所注也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯心包之井者中衝也

榮勞宮也俞太陵也經間使也合曲澤也中衝在手中指之端去爪甲角如韭葉陷者中手心主脉之所出也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸一

足厥陰脉之所注也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯中封在足內踝前同身寸之一寸半

足厥陰脉之所注也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯心包之井者中衝也

足厥陰脉之所注也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯中封在足內踝前同身寸之一寸半

榮勞宮也俞太陵也經間使也合曲澤也中衝在手中指之端去爪甲角如韭葉陷者中手心主脉之所出也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三

壯大都在足大指本節後陷者中足太陰脉之所流也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯太白在足內側核骨下陷者中足太陰脉之所注也

刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯商丘在足内踝下微前陷者中足太陰脉之所行也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯陰陵泉在膝下内侧輔骨下陷者中仰足乃得之是太陰脉之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯肺之井者少商也榮魚際也俞太淵也經渠也合尺澤也少商在手大指之端內側去爪甲角如韭葉手太陰脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經作一壯魚際在手大指本節後內側散脉手太陰脉之所流也刺入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯太淵在掌後陷者中手太陰脉之所行也刺可入同身寸之三分留三呼不可灸傷人神明尺澤在肘中約上動脈手太陰脉之所入也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯腎之井者涌泉也榮然谷也俞太淵也經復溜也

新校正云按甲乙經溜作留餘復溜字並同合陰谷也涌泉任足心陷者中屈足擦指宛穴中足少陰脉之所出也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯然谷在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脉之所流也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯復溜在足內踝上之所注也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯

新校正云按刺腰痛篇注云在內踝後上二寸動脈同身寸之二寸陷者中足少陰脉之所行也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯陰谷在膝下內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手出膝而尋之足少陰脉之所入也刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯如早俞藏各五穴則二十五俞以左右脉具而言之則五十穴也

新校正云按甲乙經作二分府謂六府非兼九形府也俞亦謂井榮俞原經合非背俞也肝之府膽膽之井者竅陰也榮俠谿也俞臨泣也原丘虛也經陽輔也合陽陵泉也竅陰在足小指次指之端去爪甲角如韭葉足少陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼

新校正云按甲乙經作三呼若灸者可灸三壯俠谿在足小指次指

歧骨間本節前陷者中足少陽脉之所流刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯臨泣在足小指次指本節後間陷者中去俠谿同身寸之一寸半足少陽脉之所注也刺可入同身寸之三分留五呼若灸者可灸三壯丘虛在足外踝下如前陷者中去臨泣同身寸之三寸足少陽脉之所過也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸在足外踝上

新校正云按甲乙經云外踝上四寸之端及前同

身寸之三分所去丘虛同身寸之七寸足少陽脉之所行也刺可入同身寸之一寸半五分留七呼若灸者可灸三壯陽陵泉在膝下同身寸之一寸所外廉陷者中足大指次指之端去爪甲角如韭葉足陽明脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯內庭在足大指次指外間本節後陷者中去內庭同身寸之三寸足陽明脉之所過也刺可入同身寸之三分留十呼

新校正云按甲乙經作二十呼若灸者可灸三壯衝陽在足跗上同身寸之五寸骨間動脉上去陷谷同身寸之三寸足陽明脉之所過也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯解谿在衝陽後同身寸之二寸半

新校正云按甲乙經作一寸半刺瘻注作三寸半素問二注不同當從甲乙經之說

腕上陷者中足陽明脉之所行也刺可入同身寸之五分留五呼若灸者可灸三壯商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉手陽明脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯二間在手大指次指本節前內側陷者中手陽明脉之所流也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯三間在手大指次指本節後內側陷者中手陽明脉之所注也刺可入同身寸之三分留

椎上兩傍各一凡二穴
推上傍無穴大
故王氏云未詳
目瞳子浮
三脉之會刺可入同身寸之二
寸之一寸足太陽少陽二脉之
兩髀厭分中二穴
謂

今甲乙經脈流注孔穴圖經並不載未詳何
穴去眥同身寸之三分苦炎者可灸三壯浮
水之會刺可入同身寸之三謂環跳穴也在髀樞後足
少陽太陽二脉之會刺同

水熱論中
新校正云頭上五行行五五二十五穴

此亦數俞之
五十九穴也

三十六俞
七十二穴熱俞五十九穴水俞五

十七
並具

入同身寸之一寸留二十呼若灸者可灸三壯

新校正云按王氏云贊鼻

齧宮

二穴

發刺可入同身寸之六分若灸者可灸三壯

在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽三脉之會刺可入同身

穴

攢竹穴也在眉頭陷者中足太陽脈氣所

寸之一分若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經云刺可入三分

耳

在耳後入髮

耳中多所聞二穴

穴也

眉本二

穴

可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經云刺可入三分

眉

在耳後入髮

枕骨二穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在耳前上廉起骨

枕骨二穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在耳前上廉起骨

上關二穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在耳前上廉起骨

下關二穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在耳前上廉起骨

大迎二穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在耳前上廉起骨

巨虛上下廉四穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在腋下同身寸

曲牙二穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在腋下同身寸

扶突二穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在腋下同身寸

解二穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在腋下同身寸

開元一穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在腋下同身寸

天窓二穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在腋下同身寸

瘡門一穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在腋下同身寸

肩貞二穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在腋下同身寸

背俞二穴

穴也

瘡

穴

可入同身寸之三分留七呼若灸

新校正云按甲乙經云刺可入三分

瘡

在腋下同身寸

在脊第一椎下兩傍相去各同身寸之一寸半陷者中督脉別絡手足

太陽三脈氣之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸七壯

膺俞

十二穴

謂雲門中府周榮背卿天谿食竇左右則十二穴也

新校正云按

雲門

在巨胥下夾任脉傍橫去任脉各同身

寸

六分

陷者中動脈應手雲門中府相去同身寸之一

寸

餘五穴透相去同身寸之一

寸

餘

並仰而取之

雲門

刺可入同身寸之七分太深令人逆息中府刺可入同身寸之三分留五呼餘

刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯

新校正云詳王氏以此十二穴并

手太陰按甲乙經雲門乃手太陰中府乃手足太陰中府乃手足太陰之會周榮已下乃足太陰

非十一穴並

手太陰也

分肉二穴

在足外踝上

筋肉分間

陽維脉氣所發刺可入

同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經無分肉穴詳

處所疑是陽輔在足外踝上輔骨前絕骨端如前三分所又按刺腰痛注作絕

骨之端如後二分刺入五

分留十呼與此注小異

踝上橫二穴

內踝上者交信穴也交信去內踝

附陽穴也附陽去外踝上同身寸之三寸太陽前少陽後筋骨間陽蹻之郄刺

可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經附陽作什陽

陰陽蹻四穴

陰蹻穴在足內踝

所生在外踝下陷者中

新校正云按刺腰痛篇注作在外踝下五分

刺論

注云外踝下半寸容爪甲刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可

灸三壯

新校正云按甲乙經留七呼作六呼刺腰痛篇注作十呼

水俞

在諸分

分謂肉之分理

熱俞在氣穴

寫熱則取之

寒熱俞在兩骸

厭中二穴

骸厭謂膝外俠膝之骨厭中也

謂五里穴也所以謂

之大禁者謂其禁不可刺也鍼經曰迎之五里中道而止五至而已五往而藏之氣盡矣故五五二十五而竭其俞矣蓋謂此也又日五里者及澤之後五里與此文同并重複共得三百六十穴通前天穴十五椎上紀下紀共三百六十五穴除重複實有三百一十三穴

帝曰余已知氣穴之孫絡小絡也謂

新校正云詳自

孫絡小絡也謂

絡之支別者

此

處遊鍼之居願聞孫絡谿谷亦有所應乎

新校正云詳自

孫絡小絡也謂

絡之支別者

此

伯曰孫絡三百六十五穴會亦以應一歲以溢奇邪以通榮衛榮衛稽留衛散榮溢氣竭血著外爲發熱內爲

少氣疾寫無怠以通榮衛見而寫之無問所會榮積膚留

者見其血絡當即寫之

亦無問其脉之俞會

新校正云按甲乙經作以舍大氣

邪溢氣壅脉熱肉敗榮衛不行

新校正云

留於節湊必將爲敗

必將爲膿內銷骨髓外破大臍熱過故

新校正云按甲乙經作以舍大氣

留於節湊必將爲敗

髓液皆潰爲膿故必敗爛筋骨而不竊屈伸矣

若留於骨節之間津液所湊之處則骨節之間積寒留舍榮衛不居

新校正云按甲乙經作以舍大氣

留於節湊必將爲敗

髓液皆潰爲膿故必敗

爛筋骨而不竊屈伸矣

卷內縮筋

新校正云按全元力時不得伸內爲骨彈外爲不仁

命曰不足大寒留於谿谷也

邪氣盛其真氣不禁髓液內消故爲是淹留陽不外勝內消筋髓故曰不足大寒留於谿谷之中也

小婢溼溢循脉往來微鍼所及與法相同

常法相同爾若小寒之氣流行溼用鍼調者與溢隨脉往來爲彈病

帝乃辟左右而起再拜曰今日發蒙解惑藏之金匱不敢復出乃藏之金蘭之室署曰氣穴所在歧伯曰孫絡之脉別經者其血盛而當寫者亦三百六十五脉並注於絡傳注十二絡脉并獨十四絡脉也

十四絡者謂十二經絡兼絡起自於脾故解謂骨解之中經絡也雖則別行不并言之也然所受邪亦還注寫於五藏之脉

左右各五故十脉也

氣府論篇第五十九

新校正云按全元起本在第三卷

足太陽脉氣所發者七十八穴

兼氣浮薄相通者言之當言九十三穴非七八也正經脉會發者七十八穴浮薄相通者一十五穴則其數也

兩眉頭各一

謂贊竹穴也所在刺灸分壯與氣穴同法

寸半傍五相去三十

謂大杼風門各二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法

自百會項中數左右前後各三寸有五行行五共二十五穴也後人誤認將項耳所以言入髮至項者自入髮顯會穴至項百會凡三寸自百會後至後項又三寸故云入髮至項三寸傍五者爲兼中行傍數有五行也相去三寸者蓋謂上去髮際非止三寸半也其誤甚明

爲項以爲大杼風門此甚誤也況大杼在第一椎下兩傍風門又在第二椎下

入髮至項三寸半

謂大杼風門各二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法

其浮氣在皮中者凡五行行五五三十五

謂天柱二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法

新校正云按甲乙經風池是少陽陽維之會非太陽之所發也經言風府兩傍乃天柱穴之分位此亦覆明上項中大筋兩傍穴也此注刺出風池二穴於九十三數外更剩前大杼風門及此風池六穴也

謂附分魄戶神堂諺南闕魂門陽綱意舍胃倉肯門志室胞肓足刺同身寸之三寸足太陽之會刺同身寸之八分若灸者可

兩傍各

謂風池二穴也刺灸分壯與氣穴同法

新校正云按甲乙經風

之分位此亦覆明上項中大筋兩傍穴也此注刺出風池二穴於九十三數外更剩前大杼風門及此風池六穴也

謂附分魄戶神堂諺南闕魂

傍各相去挾脊同身寸之三寸足太陽之會刺同身寸之八分若灸者可

尾二十節十五間各一

十五間各一者今中諸孔穴圖經所存者十三穴在右共三十六謂附分魄戶神堂諺南闕魂

門陽綱意舍胃倉肯門志室胞肓足刺同身寸之三寸足太陽之會刺同身寸之八分若灸者可

挾背以下至尻

風府

卷之三

三分若炎者可灸二壯
客主人穴名也在耳前

新校正云按甲飞紅云手
上廉起骨開口有空手足少
可入同身寸之三分留七呼

卷之三

一

謂和髎二穴

也在此前後橫動三分若炎者可灸三壯

新校正云按甲乙經云手少陽二脉之會刺可

耳前角下各

謂縣整釐三穴也

耳前角上咎二

謂頷厭二穴也在曲角下顙之上上廉手足少陽足陽

小指傍各六俞 謂委中、崑崙、京骨、束骨、通谷、至陰、六穴也。左右言之則八穴，今此所有兼土者，九十三穴。由此則大數差錯，傳寫有誤也。
詳王氏云：兼土者，九十三穴。入于兼大杼、風門、風池為九十九穴。以此王氏揔數計之，明知此三穴後之妄增也。

足少陽脉氣所發者六十二穴 兩角上各二
謂天衝、曲痏。

直目上瞤際內各五 謂臨泣、目窓、正營、承靈、腦空。左右十也。臨泣在頭直上，入瞤際，同身寸之五分。足太陽少陽陽維三脉之會，留七呼。目窓在臨泣後，同身寸之一寸。正營在目窓後，同身寸之一寸。承靈在正營後，同身寸之一寸半。腦空在承靈後，同身寸之一寸半。夾枕骨後，枕骨上並足少陽陽維二脉之會。刺可入同身寸之四分餘，並刺可入同身寸之三分。若灸者並可灸五壯。

小指傍各六俞 謂上

八穴半此所有兼土者詳王氏云兼土者九十計之明知此三穴後之妄增也

足少陽

入同身寸之三分若多
空足太陽少陽二脉之
會刺灸分壯如天衝法

目上入髮際同身寸之
後同身寸之一寸正營

寸半腦空在承靈後同
之會刺可入同身寸之

六非謂每藏府而各五名六也。委中以下至足
証委中。當委中。京骨束骨通谷。至陰六穴也。左右言之。則
十二俞也。其所在刺灸如氣穴法。經言。肺氣所發者七十
日。九十三穴。由此則大數差錯。傳寫有誤也。新校正云。
十三穴。今兼大杼風門風池為九十九穴。以此王氏揔數。
耳上如前同身寸。文三分足太陽少陽二脉之會。刺可
灸者。可灸三壯。曲鬚在耳上入。緩際曲隅陷者中。敲頭有
直目上。緩際內各五。謂臨泣目窓。正營承靈。腦
空左右十也。臨泣在頭直
五分足太陽少陽陽維三脉之會。留七呼。目窓在臨泣。
在目窓後同身寸之一寸。承靈在正營後同身寸之一
寸。半腋枕骨後枕骨上。並足少陽陽維二脉。
四分餘並刺可入同身寸之三分。若灸者並可灸五壯。
同身寸之一寸半。腋枕骨後枕骨上。並足少陽陽維二脉。

卷之三

卷之三

若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經及氣穴

耳後陷中各

謂贊風穴

注刺禁注並云手少陽足陽明之會與此異
陷者中按之引耳中手足少陽二脉之會
刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

耳後陷中各

也在耳後
下關穴名也所在

耳

刺灸氣穴同法

下牙車之後各一

謂頰車二穴也刺灸分壯氣穴同法

下關各一

骨陷者中足陽明脈氣刺灸氣穴同法

八間各一

新校正云按骨空注作半陽明

腋下三寸同身寸也腋下謂淵腋筋天池在乳後同身寸之二寸

身寸之三寸足少陽脈氣所發舉臂得之刺可入同身寸之三寸禁不可灸

筋在腋下同身寸之三寸復前行同身寸之一寸

搓作着下同足少陽脈氣所發刺可入同身寸之六分若灸者可灸三壯天

池在乳後同身寸之二寸

身寸之三寸足少陽脈氣所發刺可入同身寸之三寸禁不可灸

筋在腋下同身寸之三寸復前行同身寸之一寸搓

池在乳後同身寸之二寸五分上直兩乳

身寸之三寸足少陽帶脈二經之會刺可入同身寸之一寸若灸者可灸三壯

是太陰少陽二脉之會刺可入同身寸之七分若灸者可灸五壯章門脾募也

在季肋端足厥陰少陽二脉之會刺可入同身寸之六分若灸者可灸五壯五樞在帶脈下同

寸之八分留六呼若灸者可灸三壯帶脈在季肋下同身寸之一寸八分足少

陽帶脈二經之會刺可入同身寸之六分若灸者可灸五壯五樞在帶脈下同

寸之三寸足少陽帶脈二經之會刺可入同身寸之一寸若灸者可灸五壯

維道在章門下同身寸之五寸三分足少陽帶脈二經之會刺灸分壯如章門

居髎在章門下同身寸之四寸三分髂骨上

新校正云按甲乙經作監骨

上陷者中陽蹻足少陽二脉之會刺灸分壯如維道

法所以謂之八間者自腋下三寸至季肋凡八肋骨

謂環鍤二穴也刺灸分壯氣穴同法

新校正云接氣穴論云兩髀厭分中主

注為環鍤穴又甲乙經注環鍤在髀樞中傍各一者蓋謂此穴在

髀樞中也傍各一者謂左右各一

穴也非謂環鍤在髀樞中傍也

謂環鍤二穴也刺灸分壯氣穴同法

同身寸之一寸直瞳子足陽明陰維之會今王氏注云足陽明陰維六穴也左右言

之則十二俞也其所在刺灸分壯氣穴同法

陽明近是然陽明經不到此又不與陰維會疑王注非甲乙經爲得

會刺可入同身寸之五分禁不可灸

新校正云按甲乙經陽白足少陽陽維

陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分炎三壯

頭維在額角髮際俠本神兩傍各同身寸之一寸五分足少陽陽明二脉之交

同身寸之一寸直瞳子足陽明陰維之會詳此在足陽明脈氣所發刺可入同

陵泉陽輔丘虛臨泣俠本神兩傍各同身寸之一寸五分足少陽陽明二脉之交

陽明近是然陽明經不到此又不與陰維會疑王注非甲乙經爲得

會刺可入同身寸之五分禁不可灸

新校正云按甲乙經刺入三分灸七壯

陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分炎三壯

人迎穴名也在頸項前同身寸之一寸三分骨陷者中

所發刺可入同身寸之四分過深殺人禁不可灸

人迎穴名也在頸項前同身寸之一寸三分留七呼

大迎穴名也在目下同身寸之一寸足陽明脈氣所發刺可入同

人迎穴名也在頸項前同身寸之一寸三分留七呼

動脈足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三分留七呼

人迎穴名也在頸項前同身寸之一寸三分留七呼

少陽陽維三脉之會刺可入同身寸之八分若灸者可

灸三壯

新校正云按甲乙經伏骨作趺骨

骨下同身寸之四寸八分陷者中足陽明脈氣所發刺可入同

之四分若灸者可灸五壯此穴之上又有氣力庫房屋掣下又有乳中乳根氣

謂膺窓等六穴也膺窓在膺兩傍

戶在巨骨下直膺窓去膺窓上同身寸之四寸八分庫房在氣戶下同身寸之一寸六分屋翳在氣戶下同身寸之三寸二分下即膺窓也膺窓之下即乳中也乳中穴下同身寸之一寸六分陷者中則乳根穴也並是陽明脈氣所發仰而取之乳中禁不可灸刺灸刺之不幸生蝕瘡瘡中有清汁膿血者可治瘡分若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經灸五壯

下二寸夾胃脘各五

謂不容承滿梁門闢門太一五穴也左右共十也

各夾腹中行兩傍相去各同身寸之四寸

正云按甲乙經云各二寸疑此注刺各字不容在第四肋端下至太一各上

下相去同身寸之一寸並是陽明脈氣所發刺可入同身寸之八分若灸者可

灸五壯 新校正云按甲乙經不容刺入五分此云並入八分疑此注誤

如太一之遠近也各三者謂滑肉門天樞外陵也滑肉門在太一下同身寸之一寸天樞在滑肉門下同身寸之一寸正當於齊外陵在天樞下同身寸之一寸並是陽明脈氣所發天樞刺可入同身寸之五分留七呼滑肉門外陵各刺

可入同身寸之八分若灸者並可五壯

新校正云按甲乙經天樞在齊傍各二寸上曰滑肉門下曰外陵是三穴者去齊各二寸也今此經注云

廣三寸素問甲乙經不同然甲乙經分寸與諸書同特此經為異也

下齊二寸半若灸者可灸二壯歸來在水道下

廣三寸

巨水道歸來也大巨在外陵下同身寸之一寸足陽明脈氣所發刺可入同身寸之二十半若灸者可灸五壯

下齊二寸則外陵下同身寸之一寸大巨穴也各三者謂大

廣三寸

足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

新校正云詳此注與甲乙經同刺熱注及熱穴注云氣街在腹臍下橫骨兩端

上刺禁論注在腹下夾齊兩傍相去四寸

足陽明與大腸合下廉足陽明與小腸合也其所

空注云在毛際兩傍

膝上諸穴也左右言之

一可入同身寸之六分若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之二寸刺可入同身寸之八分若灸者可灸五壯

會發而不於所會刺脉下

其直俱行至足跗上入中指出其端則厲穴也其支

言之者出從其正者也

指間穴空處也

會發而入同身寸之三分

若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三分

刺可入同身寸之三分

會發而入同身寸之三分

若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三分

刺可入同身寸之三分

會發而入同身寸之三分

若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三分

刺可入同身寸之三分

會發而入同身寸之三分

若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三分

刺可入同身寸之三分

巨骨穴各二

巨骨穴名也在肩端上行兩叉骨間陷者中手太陽少陽二脉之會

新校正云按甲乙經手太陽作手陽明

按甲乙經作五壯

曲腋上骨穴各二

謂臑前二穴也在肩端上行兩叉骨間陷者中手太陽陽維蹻脉三經之會

者中手太陽陽維蹻脉三經之會

臂取之

內此目各

指各八俞分之所在穴空

謂三里上廉下廉解谿衝陽

一刺可入同身寸之一分留六呼若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之二寸刺可入同身寸之二寸

會發而入同身寸之三分

若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三分

刺可入同身寸之三分

會發而入同身寸之三分

若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三分

刺可入同身寸之三分

會發而入同身寸之三分

若灸者可灸三壯

耳郭上各一

謂角孫二穴也在耳上郭表之中間上瞤際之

耳中各一

灸分壯與氣穴同法

新校正云灸三壯

謂聽官二穴也所在刺

新校正云

謂膽前二穴也在肩端上行兩叉骨間陷者中手太陽少陽二脉之會

刺可入同身寸之三分

會發而入同身寸之三分

若灸者可灸三壯

耳郭下各一

謂頸髓二穴也頸髓也頸面頸也

之五分手太陽手足少陽三脉之會

刺可入同身寸之三分

會發而入同身寸之三分

若灸者可灸三壯

巨骨穴各二

巨骨穴名也在肩端上行兩叉骨間陷者中手太陽陽維蹻脉三經之會

刺可入同身寸之三分

刺可入同身寸之三分

會發而入同身寸之三分

若灸者可灸三壯</

井支溝陽池中渚液門關衝六穴也左右言之則十二俞也所在刺灸分壯與氣穴同矣

今少一穴

新校正云按會陽二穴為項中央二

是謂風府瘡門二穴也

二十九乃剩一穴非少也少當作刺

新校正云按會陽二穴為項中央二

悉在項中餘一穴今亡

風府在項上入髮際同身寸之一寸大筋內宛宛中督脈陽維之會刺可入同

身寸之四分留三呼不可妄灸灸之不幸令人瘡瘍門在項髮際宛宛中去風

府同身寸之一寸督脈陽維之會刺可入同身寸之四分禁不

可灸灸之令人瘡瘍門悉在項中餘一穴今亡者

非謂此二十八穴中亡一穴也王氏蓋見氣穴論大椎上

新校正云按王氏云風府瘡門悉在項中餘一穴今亡者

兩旁各一穴亦在項之穴也今主故去餘一穴今士也

庭上星顙會前項百會後項陰間腦戶八穴也其正髮際之中也神庭在髮際直鼻督脈足太陽陽明脉三經之會刺不可刺若刺之令人顱疾目失睛若灸

者可灸三壯上星在齟上直鼻中央入髮際同身寸之一寸陷者中前項在頭會後同身寸之一寸五分骨間陷在上星後同身寸之一寸陷者中白會在前項後同身寸之一寸五分督脈足太陽之會不可灸此八者並督

脈氣所發也上星百會強間腦戶各刺可入同身寸之三分上星留六呼腦力

校正云按甲乙經腦戶不可灸骨空論注云不可妄灸矣

新校正云按甲乙經腦戶不可灸骨空論注云不可妄灸矣

留三呼餘並刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯

交三穴也素髎在鼻柱上端督脈氣所發刺可入同身寸之三分水溝在鼻柱

人中直脣取之督脈手陽明之會刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三壯斷交在脣內齒上斷續督脈任脉二經之會可逆刺之入同

身寸之三分若灸者可灸三壯此三者正居凹左右之中也

大椎以下至尻尾及傍十五穴

脊椎之間有大椎陶道身柱神道靈臺至陽筋縮中樞脊中懸樞命門陽關脊俞長強會陽十五俞也大

椎在第一推上陷者中三陽督脈扁會膕道在項大推節下間督脈足太陽之

會逸而取之身柱在第三推節下間逸而取之神道在第五推節下間逸而取之靈臺在第六推節下間逸而取之至陽在第七推節下間逸而取之筋縮在第九推節下間逸而取之中樞在第十推節下間逸而取之脊中在第十一推

節下間逸而取之禁不可灸令人僵懸樞在第十三推節下間伏而取之命門

在第十四推節下間伏而取之陽關在第十六推節下間坐而取之脊俞在第二十一推節下間長強在脊髓端督脈別絡少陰二脉所結會陽穴

在陰尾骨兩傍凡此十五者並督脈氣所發腰俞長強各刺可入同

身寸之二分繆刺論注作二寸熱穴注作二寸刺熱注作二分諸注不同雖甲乙經

身寸之二分身刺可入同身寸之二分會陽刺可入同身寸之八分並餘刺可

入同身寸之五分陶道神道各留五呼陶道身柱神道筋縮可灸五壯大

椎可九壯餘並可三壯

新校正云按甲乙經無靈臺中樞陽關三陽

腰

謂璇璣華蓋紫宮玉堂

膻中中庭各相去同身寸之一寸六分陷者中並在脉氣所

發仰而取之各刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯

新校正云詳二字疑誤

腹脈法

胃脘五寸胃脘以下至橫骨六寸半一

新校正云詳二字疑誤

鳩尾下三寸

中骨陷中各一

謂璇璣華蓋紫宮玉堂

謂廉泉天突二穴也廉泉在頸下結喉上舌本

呼若灸者可灸三壯天突在頸結喉下同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯

在肺之會低鍼取之刺可入同身寸之三分留三

發仰而取之各刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯

膻中中庭各相去同身寸之一寸六分陷者中並在脉氣所

發仰而取之各刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯

也

鳩尾心前穴名也其正當心蔽骨之端言其骨垂下如鳩鳥尾形故以爲名也鳩尾下有鳩尾巨闕上院中院建里下院水分臍中陰交膀胱用田開元

中極曲骨十四俞也鳩尾在臍前蔽骨下同身寸之五分任脉之別不可灸刺人無蔽骨者從歧骨際下行同身寸之一寸

新校正云按甲乙經云一寸半

則足陽明手太陽之會中院則手太陽少陽足陽明三脈所生也臍中禁不可刺若刺之使人齊中惡瘡潰突出者死不治陰交在齊下同身寸之一寸任脉

陰衝之會膀胱在齊下同身寸之一寸半丹田三焦募也在齊下同身寸之二寸開元小腸募也在齊下同身寸之三寸足三陰在脉之會也中極在開元下

一寸足三陰之會也曲骨在橫骨上中極下同身寸之一寸足厥陰之會凡此十四者並任脉氣所發建里丹田並刺可入同身寸之六分留大呼

新校正云按甲乙經作五分十呼

上腕陰交並刺可入同身寸之八分下院水分並各可灸七壯齊中中極曲骨各三壯餘並可五壯自鳩尾下至陰間並在脉主

刺可入同身寸之一寸中院膀胱並刺可入同身寸之一寸二分曲骨刺可入同身寸之一寸半留七呼餘並刺可入同身寸之一寸二分若灸者開元中院

云按甲乙經作五分十呼

新校正云揚此注云餘並刺入一寸

及氣穴骨穴注刺入二寸

上腕陰交並刺可入同身寸之八分下院水分並

不同當從甲乙經之寸數

新校正云按甲乙經七呼作三呼

呼若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經七呼作三呼

衝脈之會故曰下陰別一也刺可入同身寸之二寸留七

在目下同身寸之七分上直瞳子陽蹻任脉足

陽明三經之會刺可入同身寸之三分不可灸

下脣

謂會陰一穴也自曲骨下至陰間並在脉主

在脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼

若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經作六呼

法同

衝脉氣所發者二十二穴俠鳩尾外各半寸至齊寸

謂幽門通谷陰都石開商曲盲俞六穴左右則十二穴也幽門俠巨闕兩傍相去各同身寸之半寸陷者中下五穴各相去同身寸之一寸並衝脉足少陰二經

之會各刺可入同身寸之一寸若灸者可灸五壯

新校正云按此云各刺入一寸按甲乙經云幽門通谷刺入五分

陰毛中急脈各

謂中注髓府胞門陰開下極五穴左右

分上直幽門下四穴各相去同身寸之一寸並衝脉足少陰二經

之會各刺可入同身寸之一寸若灸者可灸五壯

新校正云詳舌下毛中之穴甲乙經云

陰之大絡通行其中故曰厥陰急脈即罩之系也可灸而不可刺

新校正云詳舌下毛中之穴甲乙經云

病少腹痛即可灸

新校正云詳舌下毛中之穴甲乙經云

陰蹻一謂交信穴也交信在足內踝上同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間

陰蹻之部刺可入同身寸之四分留五呼若灸者可灸三壯陽蹻一謂附陽穴

也附陽在足外踝上同身寸之三寸太陽前少陽後筋骨間謹取之陽

蹻之部刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸三壯

言而甲乙經經脉流注多少不同者以此

諸魚際小脉氣所發者凡三百六十五穴也

經之所存者多凡一十九穴此所謂氣府

黃帝內經素問卷第十六

啓亥子次註林億孫奇高保衡等奉敕校正兆重改誤

骨空論

水熱穴論

骨空論篇第六十

新校正云按全元起本在第二卷自灸寒熱之法已下在第六卷刺齊篇末

黃帝問曰余聞風者百病之始也以鍼治之奈何

始初也

伯對曰風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒

風中身形則腠理閉

密陽氣內拒寒復外勝勝

一寸

治在風府

風府穴也在項上入賾際同身寸之

拒相薄榮衛失所故如是

各已注與甲乙經同此

注云督脈足太陽之會可灸五壯

新校正云按風府注氣穴論氣府論中

入同身寸之四分若灸者可灸五壯

新校正云按風府注氣穴論氣府論中也當云督脈陽維之會

留三呼不可灸乃是盛寫虛補其常也

調其陰陽不足則補有餘則寫

用鍼之道必法天常

大風頸項痛

刺風府風府在上椎

上椎謂大椎上入長際同身寸之一寸

大風

汗出灸諺諺諺應手

諺諺穴也在肩髃內廉腋第六椎下兩傍各同身寸之三寸以手厭之令病人呼諺諺之聲則指下動矣是太

正云詳陽關穴甲乙經無

諺諺諺諺在背下夾脊傍三寸所厭之令病者呼

諺諺穴也在肩髃內廉腋第六椎下兩傍各同身寸之三寸以手厭之令病人呼諺諺之聲則指下動矣是太

正云詳陽關穴甲乙經無

汗出灸諺諺諺應手

諺諺穴也在肩髃內廉腋第六椎下兩傍各同身寸之三寸以手厭之令病人呼諺諺之聲則指下動矣是太

正云詳陽關穴甲乙經無

陽脉氣所發刺可入同身寸之六分留七

呼若灸者可灸五壯諺諺者因取爲名爾從風憎風刺眉頭

謂贊竹穴也

中脉動應手足太陽脈氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

新校正云按氣府注作足陽明此云手陽明詳二經俱發於

入深令人逆息

此故正注

新校正云按氣府注作足陽明此云手陽明詳二經俱發於

入深令人逆息

折使榆臂齊肘正灸脊中

榆讀爲搖搖謂搖動也然灸

扶非獨取肩上攢骨間亦當

失枕在肩上橫骨間

謂缺盆穴也

在肩上攢骨

八或爲九竅貞骨及中誥孔穴經正有八

正形灸脊中也欲而驗之則使搖動其臂屈折其肘自項之下攢齊肘端當其中間則其變也是日陽開在第十六椎節下間督脈氣所發刺可入同身寸之

五分若灸者可灸三壯

新校

正云詳陽關穴甲乙經無

新校正云按難經甲乙經無上頤循面入目

膀絡季脇引小腹而痛脹刺諺諺

氣喜中故名寒府也解謂

外空開也跪而取之者任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏

上八髎在腰尻分間

八或爲九竅貞骨及中誥孔穴經正有八

正形灸脊中也欲而驗之則使搖動其臂屈折其肘自項之下攢齊肘端當其中間則其變也是日陽開在第十六椎節下間督脈氣所發刺可入同身寸之

骨解營謂深刺

而必中其營也取膝上外者使之拜取足心者使之跪

拜而取

寒熱還刺寒府寒府在附膝外解營

膝外骨間也屈伸之處寒氣喜中故名寒府也解謂

令足心宛宛變深定也

任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏

氣喜中故名寒府也解謂

外空開也跪而取之者任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏

上闕元至咽喉上頤循面入目

新校正云按難經甲乙經無上頤循面入目六字

衝脉者

起於氣街並少陰之經

新校正云按難經甲乙經作陽明

俠脅上行至胷中而

散

任脉衝脉皆奇經也。任脉當齊中而上行。衝脉夾齊兩傍而上行。然中而外出於毛際而上非謂木起於此也。閑元者謂齊下同身寸之四寸也。言中極之下者言中極從少腹之內上行者穴名也在毛際兩傍鼠鼷上同身寸之一寸也。言衝脉起於氣街者亦從少腹之內與任脉並行而至於是乃循腹也。何以言之。鍼經曰。衝脉者十二經之海與少陰之絡起於腎下出於氣街又曰。衝脉任脉者皆起於胞中上循脊裏爲經絡之海其浮而外者循腹各行會於咽喉別而絡脣口血氣盛則皮膚熱獨盛則滲灌皮膚生毫毛由此言之則任脉衝脈從少腹之內上行至中極之下氣街之內明矣。新校正云。按氣街與氣府論刺執篇水熱穴篇刺禁論等注重文雖不同處所無別備注氣府論中。

任脉為病

男子內結七疝女子帶下瘕聚衝脉為病逆氣裏急督

脈為病脊強反折

督脉亦奇經也。然任脉衝脉督脉皆一源而三歧也。故經或謂衝脉為督脉也。何以明之。今甲乙及古經脉流注圖經以任脉循背者謂之督脉自少腹直上者謂之任脉亦謂之督脉是則以背腹陰陽別為名目爾。以任脉自胞上過帶脉貫齊而上故男子

為病內結七疝女子為病則帶下瘕聚也。以衝脉夾脅而上並少陰之經上至腎中故衝脉為病則逆氣裏急也。以督脉上循脊裏故督脉為病則脊強反折也。督脉者起於少腹以下骨中。女子入繫廷孔

起非初起亦猶任脉

孔湧孔之端也

此湧孔之上端也。而督脉自骨圍中央則至於是

絡循陰器合篡間繞篡後

督脉別絡自湧孔之端分而各行下循陰器乃合篡間也。所謂間者謂在

前陰後陰之兩間也。自兩間

之後已復分而行繞篡之後別繞脅至少陰與巨陽中絡者合少

陰上股內後廉貫脊屬腎

別謂別絡分而各行之於焦也。足少陰之絡者自股內後廉貫脊屬腎足太陽

絡之外行者循髀樞絡股陽而下其中行者下貫脅至脰中與外行絡合故言

至少陰與巨陽中絡合少陰上股內後廉貫脊屬腎也

新校正云詳各行於

項循肩臂內夾脊抵腰中入絡脅絡腎

接續脅而上行也

其男子

循莖下至篡與女子等其少腹直上者貫齊中央上貫心

自與太陽起於目內眎下至兩目之下中央

女子等並督脈之別絡也。其少腹直上至兩目之下中央並任

此生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝

尋此生病正是任脉經云為衝

瘡痔遺溺嗌乾亦以衝脉任脉並自少腹上至於咽喉又以督脉循陰陽之異主則此生病者當心背俱通宜獨衝心而為疝乎

以謂之任脉者文字得之以任養也。故經云此病其女子不孕也所以謂之衝脈者以其氣上衝也。故經云此生病從少腹上衝心而痛也。所以謂之督脉者以其督領經脈之海也。由此三用故一

源三政經或通呼似相謬引故下文曰。督脉生病治督脉治在骨上

其者在齊下營

此亦正任脉之分也衝任督三脉異名同脉亦明矣骨上謂腰橫骨上尾際中曲骨穴也任脉足厥陰之會刺

可入同身寸之一寸半若灸者可灸三壯齊下謂齊直下同身寸之寸陰交穴任脉陰衝之會刺可入同身寸之八分若灸者可灸五壯

其上

氣有音者治其喉中央在缺盆中者

中謂缺盆兩間之中天突穴在頸結喉下同身

其漸漸者上挾頤也

陽明之脉漸上頤而環脣故以挾頤名為漸也是謂大迎大迎在曲領前骨同身寸之一寸三分陷中動脈足陽明脈氣所發刺可入同

身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯伸蹇難也捷謂髀輔骨上橫骨下股外之中側立搖動取之筋動應手

其病上衝喉者治

而暑解治其骸關

暑熱也若膝痛立而膝骨解中熱者治其骸關

則異起立二字其意頗同

膝骨解之中也暑引二字其義於

膝骨解之中委中穴背向取之脉動應手足太陽脈之所入

刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯

則正取三里穴也

其病上衝喉者治

膝痛立按之以動搖筋應手膝痛如物隱

謂膝痛不可屈伸連

而暑解治其骸關

暑熱也若膝痛立而膝骨解中熱者治其骸關

則異起立二字其意頗同

膝骨解之中委中穴背向取之脉動應手足太陽脈之所入

刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯

則正取三里穴也

則正取三里穴也

而暑解治其骸關

暑熱也若膝痛立而膝骨解中熱

經闢其名
在尻骨下

新校正云按甲乙經長強在脊髓端正氏云不應主療經闢其名得非誤乎

數髓空在面使鼻

詎蓄骨等
指陳其處

或然一或胃空者早
小小者爾

當兩肩 言分左右七肩有榮 臂骨空在臂陽去踝

四寸兩骨空之間

在支溝上同身寸之
一寸是謂通間

謂贊鼻穴
脉氣所發

穴下在承扶也月小空不車
刺可入同身寸之六分若灸者可灸三壯股際骨

其多

右死骨全在骨骨之後，取去四、上八髎穴。
扁骨謂尻間，扁戾骨也。其骨上有滲灌文理，歸湊之。

無另附子也易於也當有髓有孔凹骨若無孔髓亦無

有子見無孔也灸寒熱之法先灸頸大椎以年爲骨以年爲壯數尾竈謂之撥骨視皆俞陷者灸

之 背脾胃骨際有陷處也 **舉臂**

肩上陷者灸之 肩髃穴也。在肩端兩骨間手陽明、蹻脈之會。刺可入同身寸之本部，脊則可入同身寸之三分留之。

卷之三十一
呼若灸者
可灸三壯 外踝上絕四

本傳有東可不品此之三穴皆七
骨之端灸之 骨之端如前同身寸之三分所去
陽輔穴也 在足外踝上輔骨前絕

丘墟七寸足少陽肝之井
若灸者可灸三壯
新校

足小指次指 行也刺可入同身寸之五分留七呼
正云按甲乙經云在外踝上四寸

甲乙經流當作留 腸下陷脉名

承筋穴也。在膕中央陷者中。足太陽脈氣所發也。禁不可刺。可灸三壯。新校正云。按刺腰痛。

如外隔者中火足行之五分留十呼若缺火爲灸者可灸三壯

動應手足太陽脈之所行也。東可入同身寸，隨其所有而灸之。經闕其名當

之席中附骨間矣
在手裹腕上陷者中手少
入同身寸之二分留六呼

之壯與前鍼盆中者同法掌東骨下多之陽脉之所過也刺可若灸者可灸三壯齊下關元三寸灸之正在齊下

同前一之三、世反三陰
若久炎者可灸七壯 新校

任脈之會刺可入同身一寸之二寸留七呼
正云按氣府注云刺入一寸二分者卦毛際動

筋肉分間足陽明脈之所
身寸之一寸留七呼若灸
在足跗上同身寸之五寸
留十呼灸首可灸三七

足陽明跗上動脉灸之 衝陽穴也

之二字并附上動脈是三
則見一穴今於症中却存
中陷空指督脈足太陽脈

新本正云指全元起并及日之經足陽明下有穴名矣王氏去灸之二字百會穴也在灸之二字以關疑耳

傷病法灸之大傷而發寒熱者卽爲病亦發寒熱故灸凡當灸二十九處傷食灸之傷食灸則有二十八處新校正云詳足陽明不別
於陽者數刺其俞而藥之

水熱穴論篇第六十一

新校正云按全元起本在第八卷

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水歧伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者少陰脉也故其本在腎其末在肺皆積水也陰者謂寒也冬月至寒腎氣合應故云水出腎少陰脈從腎上貫肺鬲入肺中故云其本在腎其未在肺也腎氣上逆則水氣客於肺中故云皆積水也帝曰腎何以能聚水而生病政伯曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也故腎氣化則二陰通二陰閑則胃墳滿故云皆之開也開門則水積水積則氣停氣停則水生水積則氣溢氣水同類故云

閑閉不利聚水而從其類也靈樞經曰下焦溢爲水此之謂也皮膚故爲肘腫肘腫者聚水而生病也上謂肺下謂腎肺腎俱溢故聚水於腹中而生帝曰諸水皆生於腎乎政伯曰腎者牝藏也牝陰也以主病也

於裏故謂之玄府府聚也

素問

四十二

陰位故云牝

藏地氣上者屬於腎而生水液也故曰至陰勇而勞甚則

腎汗出腎汗出逢於風內不得入於藏府外不得越於皮

膚客於玄府行於皮裏傳爲肘腫本之於腎名曰風水

勇而勞甚謂力房也勞勇汗出則玄府開汗出逢風則玄府復閉

所謂玄府

者汗空也

汗液色玄從空而出以汗聚於裏故謂之玄府府聚也

帝曰水俞五十七處者是

何主也歧伯曰腎俞五十七穴積陰之所聚也水所從出入

也尻上五行行五者此腎俞背部之俞凡有五行當其中者督脈氣所發次兩傍四行皆是太陽脉氣

也故水病下爲肘腫大腹上爲喘呼水下居於腎則腹至足而肺吸故也腎爲水腫者以其主呼

也不得卧者標本俱病

標本者肺爲標腎爲本如此者是肺腎俱水爲病也

分爲相輸俱受著水氣之所留也分其居處以名之則是氣相輸應

也

肺爲喘呼氣逆不得卧者以其主呼

也故肺爲喘呼

腎爲水腫肺爲逆不得卧

肺爲喘呼氣逆不得卧者以其主呼

分

伏菟上各行五者此腎之衝也

衝謂道也腹部正俞凡有五行交齊兩傍則腎藏足少陰

脉及衝脉氣所發次兩傍則胃府足陽明脉氣所發此四行穴則伏菟之上也

三陰之所交結於脚也踝上各

一行行六者此腎脉之下行也名曰太衝

腎脉與衝脉並下行
循足合而盛大故曰

太衝凡五十七穴者皆藏之陰絡水之所客也

經所謂五十七者然尻上五行行五

則背脊當中行督脈氣所發者脊中懸樞命門腰俞長強當其處也次夾督脉兩傍是太陽脈氣所發者有大腸俞小腸俞膀胱俞中胞內俞白環俞當其處也又次外夾兩傍是太陽脈氣所發者有胃倉俞門志室胞肓沒邊當其處也伏莞上各二行行五者腹部正俞夾中行任脉兩傍衝脉足少陰之會者有中注四滿氣穴大赫橫骨當其處也次夾衝脉足少陰兩傍足陽明脈氣所發者有外陵巨水道歸來氣街當其處也踝上各二行行六者足內踝之上有足少陰陰蹻脈並循腨上行足少陰脈有太鍾復溜陰谷三穴陰蹻脈有照海交信築賓三穴陰蹻既足少陰脈之別亦可通而主之兼此數之猶少一穴脊中在第十一椎節下間俛而取之刺可入同身寸之五分不可灸令人悽懸福在第十三椎節下間伏而取之刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯命門在第十四椎節下間伏而取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯腰俞在第二十一椎節下間刺可入同身寸之二分 新校正云按甲乙經及終刺論注并熱穴凡俱云刺入二十而刺熱注氣府注并此注作二分宣透三分之說留七呼若灸者可灸三壯長強在脊髓端督脈別絡少陰所結刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯此五穴者並督脈氣所發也 新校正云詳王氏云少一穴按氣府論注十二椎節下有陽關一穴若通敷陽關則不少矣 次夾可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯小腸俞在第十八椎下兩傍相去及刺灸分壯法如大腸俞膀胱俞在第十九椎下兩傍相去及刺灸分壯法如大腸俞中胞內俞在第二十椎下兩傍相去及刺灸分壯法如大腸俞夾脊脂膚起肉留十呼白環俞在第二十一椎下兩傍相去如大腸俞伏而取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經云刺入八分不

可灸 此五穴者足太陽脈氣所發所謂腎俞者則此也又次外兩傍胃倉在第十二椎下兩傍相去各同身寸之三寸刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯肓門在第十三椎下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉志室在第十四椎下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉正坐取之胞肓在第十九椎下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉伏而取之此五穴者並足太陽脈氣所發也次伏莞上兩行中注在齊下同身寸之五分兩傍相去任脉各同身寸之五分 新校正云按甲乙經同氣府注云夾中行方一寸文異而義同 四滿在中注下同身寸之一寸氣穴在四滿下同身寸之一寸大赫在氣穴下同身寸之一寸橫骨在大赫下同身寸之一寸各橫相去同身寸之一寸並雋脉足少陰之會刺可入同身寸之一寸若灸者可灸五壯次外兩傍穴外陵在齊下同身寸之一寸 新校正云接氣府論注云外陵在天樞下一寸與此正同 兩傍去衝脉各同身寸之半大巨在外陵下同身寸之一寸水道在大巨下同身寸之三十歸來在水道下同身寸之二寸氣街在歸來下 新校正云按氣府注刺熱注熱穴鼠蹊上同身寸之一寸各橫相去同身寸之二寸此五穴者並足陽明脈氣所發水道刺可入同身寸之二寸半若灸者可灸五壯氣街刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯餘三穴並刺可入同身寸之八分若灸者並可五壯所謂腎之街者則此也踝上各二行行六者太鍾在足內踝後街中 新校正云按甲乙經云跟後衝中刺瘡注刺腰痛注作跟後街中動脈此云內踝後三壯復溜在內踝上同身寸之三十脂者中足少陰脉之所行也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯照海在內踝下刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯交信在內踝上同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間六呼若灸者可灸三壯築賓在內踝上端

分中陰維之鄒刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯陰谷在膝下內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脉之所入也刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯所謂腎經之下行名曰太衝者則此也

帝曰春取絡脈分肉何也歧伯曰春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經脈常深其氣少不能深入故取絡脈分肉間帝曰夏取盛經分腠何也歧伯

曰夏者火始治心氣始長脉瘦氣弱陽氣留溢新校正云按流熱熏分腠內至於經故取盛經分腠絕膚而病去者邪居淺也

絕謂破絕令病得出也

所謂盛經者陽脈也

帝曰秋取經俞何也

歧伯曰秋者金始治肺將收殺

三陰已升故斬將收殺

金將勝火陽氣

在合

金王火衰故云金將勝火

陰氣初勝濕氣及體

以漸於兩濕霧露故云濕氣及體

陰氣未盛未能深入故取俞以寫陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰故取於合

新校正云按皇甫士安云是謂治秋之治變

帝曰冬取井榮何也歧伯曰

冬者水始治腎方閑陽氣衰少陰氣堅盛巨陽伏沈陽脉乃去

去謂下去

故取井以下陰逆取榮以實陽氣

新校正云按全元起本實

作遣甲乙經千金作通故曰夏取井榮春不勦畊

新校正云按皇甫士安云是謂未冬之治變

中行謂上星顙

之謂也

新校正云按此與四時刺逆從論及証要終論義頗不同與九卷之義相通

帝曰夫子言治執病五

十九俞余論其意未能領別其處願聞其處因聞其意此

歧伯曰頭上五行行五者以越諸陽之執逆也

頭上五行者當中行謂上星顙

會前頂百會後頂次兩傍謂五處承光通天絡却玉枕又次兩傍謂臨泣目胞正營承靈腦空也上星在顙上直鼻中央入髮際同身寸之一寸陷者中容瓜刺可入同身寸之三分顙會在上星後同身寸之一寸陷者中刺可入同身寸之四分前頂在顙會後同身寸之一寸五分骨間陷者中刺如顙會法百會在頂後同身寸之一寸五分湏中央旋毛中陷容指督脈足太陽脈之交會刺如上星法後頂在百會後同身寸之一寸五分枕骨上刺如顙會法然是五者皆同身寸之一寸五分承光在玉處後同身寸之一寸通天在承光後同身寸之一寸五分絡却在通天後同身寸之一寸五分玉枕在絡却後同身寸之七分然是五者並足太陽脈氣所發刺可入同身寸之三分五處通天各留七呼絡却留五呼玉枕留三呼若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經承光不灸玉枕刺入二分又次兩傍臨泣在頭首目上入募際同身寸之五分足太陽少陽陽維三脉之會目窓正營透相去同身寸之一寸承靈腦空遊相去同身寸之一寸五分然是五者並足少陽陽維二脉之會腦空一穴刺可入同身寸之四分餘並可刺入同身寸之三分臨泣留七呼若灸者可灸五壯

大杼膺俞鍼盆背俞此八者以寫月中之執也

大杼在項第一椎下兩傍相去各同身寸之一寸半陷者中督脈別絡手

足太陽三脈氣之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸五壯
正云按甲乙經并氣穴注作七壯刺瘡注刺熱注作五壯一膺俞者膺中前也
正名中府在胷中行兩傍相去同身寸之六分雲門下一寸乳上三肋間動脈
應手陷者中仰而取之手足太陰脉之會刺可入同身寸之三分留五呼若灸
者可灸五壯鍼盆在肩上橫骨陷者中手陽明脉氣所發刺可入同身寸之二
分留七呼若灸者可灸三壯背俞即風門熱府俞也在第二椎下兩傍各同身
寸之一寸五分督脉足太陽之會刺可入同身之五分留七呼若灸者可灸五
壯今中誥孔穴圖經雖不名之既曰風門熱府即治熱之背俞也

按王氏注刺熱論云背俞未詳何處注此指名風門熱府

新校正云

注氣穴論以大杼為背俞三注不同者蓋亦疑之也

氣街三里巨虛

上下廉此八者以寫胃中之熱也

氣街在腹齊下橫骨兩端鼠鼷
上同身寸之一寸動脈應手足

陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯
按氣街諸注不同具前水穴注中三里在膝下同身寸之三十肺外廉兩筋
肉分間足陽明脉之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯
巨虛上廉足陽明與大腸合在三里下同身寸之三寸足陽明脉氣所發刺可
入同身寸之八分若灸者可灸五壯巨虛下廉足陽明與小腸合在上廉下同
身寸之三十足陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯矣

雲門 體骨委中 隘空此八者以寫四支之熱也

雲門

素問六十一

新校正云

骨下胷中行兩傍相去同身寸之六寸動脈應手足太陰脉氣所發
正云按甲乙經同氣穴注作手太陰刺熱注亦作手太陰經與臂取之刺可入
同身寸之七分若灸者可灸三壯驗今中誥孔穴圖經無髓骨穴有肩髓穴正
在肩端兩骨間手陽明蹻脉之會刺可入同身寸之六分留六呼若灸者可灸
三壯委中在足膝後屈處脣中央約文中動脈足太陽脉之所入也刺可入同
身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯按今中誥孔穴圖經云腰俞穴一名髓

空在脊中第二十一推節下主汗不出足清不仁督脉氣所發也刺可入同身
寸之二寸留七呼若灸者可灸三壯 新校正云詳要腎俞刺入二寸當作二分
以具前水 素問六十二

新校正云

穴注中 五藏俞傍五此十者以寫五藏之熱也

新校正云

俞傍五者謂

門意舍志室五穴腋脊兩傍各相去同身寸之三十並足太陽脉氣所發也魄
戶在第五椎下兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸五壯神堂
在第五椎下兩傍刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯魂門在第九椎下
兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯意舍在第十一椎下
十四椎下兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯志室在第
十九穴者皆熱之左右也帝曰人傷於寒而傳爲熱何也

歧伯曰夫寒盛則生熱也

寒氣外凝陽氣內鬱腠理堅緻玄府閉封
則外凝內鬱之理可知斯乃新病數日者也

黃帝內經素問卷第十六

音釋

骨空論篇第六十

謹語

上音衣謹力調切

瘻 音漏

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

篡

初患

瘻

音隆

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

骭 戸當切 漢書若
腫也

骭 同切

骭 音博

骭 音彼

骭 音所禁

骭 其月

骭 市充切

骭 方无切

骭 足上

五行 戶當

骭 同切

骭 宇說謂汚穢所隱

骭 在骭上

尻 去高切

五行 戶當

齒 魚絲切

髀 音博

髀 音彼

髀 所禁

髀 其月

髀 市充切

髀 方无切

髀 足上

五行 戶當

髀 同切

髀 宇說謂汚穢所隱

髀 在骭上

尻 去高切

五行 戶當

水勢災論篇第六十一

肘

音附

菟

音兔

閼

音祕

溜

力救溪

𣴤

音溪緻

俞

音庶

行

戶當

踝

胡瓦切

勣

音求

劙

奴六切

別

井節切

杼

直呂偶魚二音

𩦔

有前也

黃帝內經素問卷第十七

啓玄子次註林億孫奇高保衡等奉 教校正孫兆重改誤

調經論篇第六十二

新校正云按全元一起本在第一卷

黃帝問曰余聞刺法言有餘寫之不足補之何謂有餘何謂不足歧伯對曰有餘有五不足亦有五帝欲何問帝曰願盡聞之歧伯曰神有餘有不足氣有餘有不足血有餘有不足形有餘有不足志有餘有不足凡此十者其氣不足也神屬心氣屬肺血屬肝形屬脾志屬腎以各有所宗故不等也帝曰人有精氣津液四支九竅五藏十六部三百六十五節乃生百病百病之生皆有虛實今夫子乃言有餘有五不足亦有五何以生之乎日兩神相薄合而成形常先身生是謂精上焦開發宣五穀味熏膚充身澤毛若霧露之微是謂氣腠理發泄汗出腠理是謂津津之滲於空竅留而不行者爲瘀也十六部者謂手足二十九竅九五藏五合爲十六部也三百六十五節者非謂骨節是神氣出入之處也鍼經曰所謂節之交三百六十五會皆神氣出入遊行之所非骨節也言人身所有則多所舉則少病生之數何以論之

歧伯曰皆生於五藏也謂五神藏也夫

心藏神肺藏氣肝藏血脾藏肉腎藏志而此成形

言所以病皆生

於五藏者何哉以内藏五神而成形也

志意通內連骨髓而成形五藏

志意者通言五神之大凡也骨髓者通言表裏之成化也言五神通泰骨髓化成身形既立及五藏互相為有也

新校正云按甲乙經無五藏二字

五藏之道皆

出於經隧以行血氣血氣不和百病乃變化而生是故守經

隧焉隧潛道也經脉伏行而不見故謂之經隧焉血氣者人之神邪侵之則

血氣不正血氣不正故變化而百病乃生矣然經脉者所以次死生處

百病調虛實故守經隧焉

新校正云按甲乙經經隧作經渠義各通

帝曰神有餘不足何如歧伯曰神有餘則笑不休神不足則悲

心之藏也鍼經曰心藏脉脉舍神心氣虛則悲實則笑不休也悲一為憂誤也新校正云詳王注云悲一為憂誤也按甲乙經及太素并全元起注本並作憂皇甫士安云心虛則悲悲則憂心實則笑笑則喜夫心之與肺脾之與心互相成也故喜發於心而成於肺思發於脾而成於心一過其節則二藏俱傷陽上善云心之憂在心變動也肺之憂在肺之志是則肺主秋憂為正也心主於夏憂而生憂也

血氣未并五藏安定邪客於形酒淅起於毫毛未入於經絡也故命曰神之微

并謂并合也未與邪合故曰未并也酒淅寒貞也始起於毫毛太素作洫汗楊上善云洫毛孔也水逆流日洫謂邪氣入於腠理如水逆流於

洫也心主於夏帝曰補寫奈何歧伯曰神有餘則寫其小絡之血出血

勿之深斥無中其大經神氣乃平

邪入小絡故可寫其小絡之脉出其血勿深推鍼鍼深則

傷肉也以邪居小絡故不欲令鍼中大經也絡血既出神氣自平斥推鍼鍼深則孫絡也鍼經曰經脈爲裏支而橫者爲絡絡之別者爲孫絡平謂平調也新校正云詳此注引鍼經曰與三部九候論注兩引之在彼云靈樞而此曰鍼經則王氏之意指靈樞爲鍼經也按今素問注中引鍼經者多靈樞之文但以靈樞今不全故未得盡知也

神不足者視其虛絡按而致之刺而利之無出

故不欲出血及泄氣也新校正云按甲乙經按作刃利作和帝曰刺微奈何

覆前初起於毫毛

但通經脈令其和利抑按未入於經絡者

歧

伯曰按摩勿釋著鍼勿斥移氣於不足神氣乃得復

不釋散著鍼於病處亦不推之使其人神氣內朝於鍼移其人神氣令自充足則微病自去神氣乃得復常新校正云按甲乙經及太素云移氣於足無不字揚上善云按摩使氣至於踵也

帝曰善氣有餘不足奈何歧伯曰氣有餘則喘而歟上氣不足則息不利少氣

肺之藏也肺藏氣息不利則喘鍼經曰肺氣虛則鼻息利少氣實則

喘喝曾憲抑息也皮其色白故皮膚微病命曰白氣微泄

帝曰補寫奈何歧伯曰氣有餘則寫其經

路不得傷

其正經也

帝曰刺微奈何

覆前白氣微泄者

歧伯曰按摩勿釋出鍼

隨無傷其經無出其血無泄其氣不足則補其經隧無

出其氣

氣謂榮氣也鍼寫若傷其經則血出而榮氣泄脫故不欲出血泄氣但寫其衛氣而已鍼補則又宜謹閉穴俞然其衛氣亦不欲泄之

新校正云按揚上善云經隧者手太陰之別從手太陰走手陽明乃是手太陰向手陽明之道欲道藏府陰陽故補寫皆從正經別走之絡寫其陰經別走之路不得傷

其正經也

帝曰刺微奈何

覆前白氣微泄者

歧伯曰按摩勿釋出鍼

視之曰我將深之適人必革精氣自伏邪氣散亂無所

休息氣泄腠理真氣乃相得

亦謂按摩其病處也革皮也我將深之適人必革者謂其深而淺刺之也

如是脇從則人懷懼色故精氣潛伏也以其調適於皮精氣潛伏邪無所擾故

亂散而無所休息發泄於腠理也邪氣既泄真氣乃與皮腠相得矣

新校正云按揚上善云革改也夫人聞樂至則身心忻悅聞痛及體情必改異忻悅則百體俱縱改革則情志必拒拒則邪氣消伏

有餘不足奈何歧伯曰血有餘則怒不足則恐

肝之藏也鍼經亦謂肝藏血肝氣虛則恐實則怒

新校正云按全元起本恐作悲甲乙經及太素同

血氣未并五藏安定孫絡外溢則經有留血

孫絡外溢則經有留血

帝曰補寫奈何歧伯

曰血有餘則寫其盛經出其血不足則視其虛經內鍼其

脉中久留而視久留之血至太素同

脉大疾出其鍼無令血泄

脉中久留而視久留之血至太素同

帝曰刺留血奈

脉盛滿則血有餘故出之經氣虛則血不足故無令血洩也久留疾出是謂下之鍼解論曰徐而疾則實義與此同

何歧伯曰視其血絡刺出其血無令人惡血得入於經以成其

疾

血絡滿者刺按出之則惡色之血不得入於經脉

帝曰善形有餘不足奈何歧伯曰形

有餘則腹脹溼溲不利不足則

四支不用

脾之藏也鍼經曰脾氣虛則四支不用五藏不

利不足則腹脹溼溲小便也

新校正云按楊上善云溼作經婦人月經也

血氣未并五藏安定肌肉

蠕動命曰微風

邪薄肉分衛氣不通陽氣內鼓故肉蠕動

新校正云按全元起本及甲乙經蠕作溢太素作需

帝曰

補寫奈何歧伯曰形有餘則寫其陽經

不足則補其陽絡

並胃之經絡

帝曰刺微大示何歧伯曰取分肉間

無中其經無傷

而同開闔故肉蠕動即取分肉間但開

其絡衛氣得復邪氣乃索

衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理

肉分以出其邪故無中其經無傷其

絡衛氣復舊而邪氣盡索散蓋也

帝曰善志有餘不足奈何

歧伯曰志有餘則腹脹飧泄不足則厥

衛氣之藏也鍼經曰腎藏精舍志腎氣虛則厥實

則張張謂張起厥謂逆行上衝也是少陰脉

下行今氣不足故隨衝脉逆行而上衝也

血氣未并五藏安寧骨節

有動

腎合骨故骨有邪薄則骨節段動或骨節之中如有物鼓動之也

帝曰補寫奈何歧伯曰志

有餘則寫然筋血者

新校正云按甲乙經及太素云寫然筋當是然谷下筋再詳諸處

其血楊上善云然筋當是然谷下筋再詳諸處

引然谷者多去然骨之前血者

不足則補其復溜

然謂然谷足少陰榮也

疑少骨之二字前字誤作筋字

陷者中血絡盛則泄之其刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯復

溜足少陰經也在內踝上同身寸之二寸陷者中刺可入同身寸之三分留三

呼若灸者可灸五壯

帝曰刺未并大示何歧伯曰即取之無中其經邪

所乃能立虛

不求穴俞而直取居邪之即故云即取之

帝曰善余已

聞虛實之形不知其何以生歧伯曰氣血以并陰陽相傾

氣亂於衛血逆於經血氣離居一實一虛

衛行脈外故氣亂於衛血行經內故血逆於經

血氣不和故一虛一實

血并於陰氣并於陽故為驚狂

氣並於陽則陽氣外盛故為驚狂

并於陽氣并於陰乃為炅中

氣並於陰則陽氣內盛故為熱中炅熱也

血并於上氣并

於下心煩惋善怒血并於上氣并

而喜忘

謂鬲上下

帝曰血并於陰氣并於陽如是氣離居者為實何

者為虛歧伯曰血氣者喜溫而惡寒寒則泣不能流溫則

消而去之

泣謂如雪在水中

是故氣之所并為血虛血之所并

為氣虛

氣并於血則血少故血虛

帝曰人之所以所有者血與氣耳

今夫子乃言血并爲虛氣并爲虛是無實乎政伯曰有者爲實無者爲虛氣並於血則血無
氣今血與氣相失故爲虛焉氣並於血則血失其氣血並於氣則氣失其血故曰血與氣相失絡之與孫脉俱輸於經血與氣并則爲實焉氣並於血則血失其氣血並於氣則氣失血之與氣并走於上則爲大厥厥則暴死氣復反則生不反則死帝曰實者何道從來虛者何道從去虛實之要顧聞其故政伯曰夫陰與陽皆有俞會陽注於陰陰滿之外陰陽勻平以充其形九候若一命曰平人平人謂平和之人夫邪之生也或生於陰或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒帝曰風雨之傷人奈何政伯曰風雨之傷人也先客於皮膚傳入於孫脉孫脈滿則傳入於絡脉絡脉滿則輸於大經脉血氣與邪并客於分腠之間其脉堅大故曰實實者外堅充滿不可按之按之則痛

六十六

素問六

二十八

帝曰寒濕之傷人奈何歧伯曰寒濕之中人也皮膚不收新校正云按全元起云不收不仁也肌肉堅緊榮血泣衛氣去故曰虛虛者腠理氣不足按之則氣足以溫之故使然而不痛也新校正云按經云喜怒不奪謂之也政伯曰喜怒不節則陰氣上逆上逆則下虛下虛則陽氣走之故曰實矣新校正云按甲乙經作動氣也帝曰善陰之生實奈何實謂邪氣盛也政伯曰喜則氣下悲則氣消消則脉虛虛空因寒飲食寒氣熏滿新校正云按甲乙經作動氣也則血泣氣去故曰虛矣帝曰陰之生虛奈何虛謂精氣也政虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒余已聞之矣不知其所由然也經言謂上古經言也政伯曰陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間寒氣在外則上焦不通上焦不通則寒氣獨留於外故寒慄慄謂振慄也帝曰陰虛生內熱奈何政伯曰有所勞倦形氣襄少穀氣不盛上焦不行下脘不通

新校正云按甲乙

胃氣熱執氣重脣中故內熱

甚用其力致勞倦也貪役不食

故穀氣不盛也

帝曰陽盛生外熱奈何歧伯曰上焦不通利則皮

膚痏密腠理閉塞玄府不通

及太素無玄府二字

衛氣不得

泄越故外熱

外傷寒毒內薄諸陽寒外盛則皮膚收皮膚收則腠理密故

外熱也帝曰陰盛生內寒夫何歧伯曰厥氣上逆寒氣積於

脣中而不寫不寫則溫氣去寒獨留則血凝泣凝則脉不

通

新校正云按甲乙

經作腠理不通

其脉盛大以濶故中寒

溫氣謂陽氣也陰逆內滿則陽氣去於皮

也帝曰陰與陽并血氣以并病形以成刺之奈何歧伯曰刺

此者取之經隧取血於營取氣於衛用形哉因四時多少

高下

營主血陰氣也衛主氣陽氣也夫行鍼之道必先知形之長短骨之廣狹循三備法通計身形以施八分寸故曰用形也四時多少高下具在下

篇

帝曰血氣以并病形以成陰陽相傾補寫奈何歧伯曰寫

實者氣盛乃內鍼鍼與氣俱內以開其門如利其戶鍼與

氣俱出精氣不傷邪氣乃下外門不閉以出其疾搖大其

道如利其路是謂大寫必切而出大氣乃屈

言欲開其穴而泄其氣也切謂

急也言急出其鍼也鍼解論曰疾而徐則虛者疾出鍼而徐按之也大氣謂大邪氣也留謂退屈也

帝曰補虛奈何歧伯

曰持鍼勿置以定其意候呼內鍼氣出鍼入鍼空而塞精

無從去方實而疾出鍼氣入鍼出熱不得還閉塞其門邪

氣布散精氣乃得存動氣候時

新校正云按甲乙

經作動無後時

近氣不失

遠氣乃來是謂追之

言但密閉穴俞勿令其氣散泄也近氣謂已至

若皆必候氣之所在而刺之是謂得時而調之追言捕也鍼經曰追而濟之安得無實則此謂也

帝曰夫子言虛實

者有十生於五藏五藏五脉耳夫十二經脈皆生其病

新校正云按甲乙經云

今夫子獨言五藏夫十二經脈者皆終三百

六十五節節有病必被經脈經脈之病皆有虛實何以合

之歧伯曰五藏者故得六府與為表裏經絡支節各生虛

實其病所居隨而調之

從其左右經氣支節而調之

新校正

病在脉調之血府脉實血

實脉虛血虛由此脉病而調之血也

云病在血調之也

之於病在氣調之衛衛主氣故氣病
而調之衛也 痘在肉調之分肉候寒熱
而取之 痘在骨調之骨察輕重
而調之 燔鍼劫刺

病在筋調之筋適緩急而
刺熨之 痘在骨調之骨調筋法也筋急則
燒鍼而劫刺之 痘在骨粹鍼藥熨調骨法也燐
鍼火鍼也

其下及與急者新校正云按刺腰痛注云在踝下五分中刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯照海在足內踝下刺可入同身寸之四分留六呼若灸者可灸三壯 痘在骨粹鍼藥熨調骨法也燐
鍼火鍼也

病不知所痛兩蹻為上兩蹻謂陰陽蹻脉陰蹻之脉出於照海陽蹻之脉出於申脉申脉在足外踝下陷者中谷爪甲 痘在骨粹鍼藥熨調骨法也燐
鍼火鍼也

痛在於左而右脉病者巨刺之巨刺者刺經脉脉左
痛刺右右痛刺左 必謹察

其九候鍼道備矣

黃帝內經素問卷第十七

音釋

調經論篇第六十二

隧音遂俗作隧 洒所賣切 淑音析 中去聲 涣所有蠕切 蠕而充切蠕同動也字說云蠕動更而不強

索星名切

艮

古迥切

惋音腕

驚也

綈持二切

潘所力切

猝七內去遙切

蹻切

黃帝內經素問卷第十八

啓亥子次註林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

繆刺論

四時刺逆從論

標本病傳論

繆刺論篇第六十三

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞繆刺未得其意何謂繆刺
繆刺言所刺之也
岐伯對曰夫邪之客於形也必先舍於皮毛留而不去入舍於孫脈留而不去入舍於經脈內連五藏散於腸胃陰陽俱感五藏乃傷此邪之從皮毛而入極於五藏之次也如此則治其經焉今邪客於皮毛入舍於孫絡留而不去閑塞不通不得入於經流溢於大絡而生奇病也

病在血絡是謂奇邪

新校正云按全元起本大絡十五絡也

夫邪客大絡者

左注右右注左上下左右與經相干而布於四末其氣無常

處不入於經俞命曰繆刺

四末謂四支也

帝曰願聞繆刺以左取右以

右取左奈何其與巨刺何以別之岐伯曰邪客於經左盛

則右病右盛則左病亦有移易者

新校正云按甲乙經作病易且移

左痛未已

而右脉先病如此者必巨刺之必中其經非絡脉也

先病者謂絡謂正經之

而此先病故絡病者其痛與經脉繆處故命曰繆刺

絡謂正經之傍支非正別

足少陰之絡令人卒心痛暴脹脣脢支滿

以其絡支別者並正經

包故邪客之無積者刺然骨之前出血如食頃而已

然骨之前然

則病如是內踝前起大骨下陷者中足少陰榮也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯刺此多見血令人立飢欲食

取左

言痛在左取之右痛在右取之左餘如此例

病新發者取五日已

素有此病而新發先刺之五日乃盡

已邪客於手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉

痛手不及頭

以其脈循于表出臂外上有入缺盆布腮中散給心包其支者從膻中上出缺盆上項又心主其舌故病如是

刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一病

謂關衝穴少陽之井也刺可入同身

者立已老者有頃已左取右右取左比新病數日已邪客

於足厥陰之絡令人卒疝暴痛

以其絡去內踝上同身寸之五寸別走少陽其支別者循脣上繫結

於莖故令人卒疝景痛羣陰丸也

刺足大指爪甲上與肉交者各一病

謂大敦穴

同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯

男子立已女子有頃已左取

支別者從脾內左右別下又其絡自足上行循背頭故頭項肩痛

新校正云按甲乙經云其支者從巔入絡腦還出別下項王氏云經之正者正當作

刺足小指爪甲上與肉交者各一病立已

謂至陰穴太陽之井也刺可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經云在足小指外側去爪甲角如韭葉

不已刺外踝下二病左

謂金門穴足太陽郄也在外踝下刺

取右右取左如食頃已

謂至陰穴太陽之井也刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

邪客於手陽明之絡令人氣滿胷中喘息而支胠胷中熱

以其經自有端

死生爲數月生一日一病二日二病十五日十六日十

四病

隨日數也月半以前謂之生月半以後謂之死虧滿而異也

邪客於足陽蹻之脉令人目痛從內

二病

謂申脉穴陽蹻之所生也在外踝下陷者中容爪甲刺可入同身寸之合於太陽陽蹻而上行尋此則至於目內皆也

刺外踝之下半寸所各

分左刺右右刺左如行十里頃而已人有所墮墜惡血留

內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脉下傷

少陰之絡刺足內踝之下然膏之前血脉出血

此少陰之絡也謂衝陽穴胃之原也刺可入同身寸之三分留

出血脉字疑是終字

刺足跗上動脈

謂衝陽穴胃之原也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯主腹大不嗜食以腹脹

滿故爾
厭陰之井也

不已刺三毛上各一瘡見血立已左刺右右刺左

謂大
取之耳

善非驚不樂亦

如上法刺之

邪客於手陽

謂大
刺

明之絡令人耳聾時不聞音

以其經支者從缺盆上頸貫頰又其
絡支別者入耳會於宗脉故病令人
耳聾時不聞聲

刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一瘡立聞

謂中衝穴手心主之井也在手中指之端

去爪甲如韭葉陷者中刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯古經
脫簡無絡可尋之恐是刺小指爪甲上與肉交者也何以言之下文云手少陰
絡會於耳中也若小指之端是謂少衝手少陰之井刺可入同身寸之一分留
一呼若灸者可灸一壯新校正云按王氏云恐是小指爪甲上少衝穴按甲
乙經手心主之正上循喉出耳後合少陽完骨之下如是則安得不刺中衝而疑為少衝也

已絕故不可刺

其不時聞者不可刺也

凡痺往來行無常處者在分肉間痛而刺之以月死生爲數用針者隨氣盛衰以爲瘡數針過其日數則脫氣不及日數則氣不寫左刺右右刺左病已止不已復

刺之如法

言所以約月死生爲數者何以隨氣之盛衰也

月生一日

瘡二日二瘡漸多之

十五日十五瘡十六日十四瘡漸少之

如是刺之則無過數無不及也

邪客於足

陽明之經令人鼽衄上齒寒

以其脉起於鼻交頤中下循鼻外入上齒中還出俠口環脣下交承浆却循頤

右右刺左

中當爲大亦傳寫中大之誤也據靈樞經孔穴圖經中指次指

後下廉出大迎循頤車上耳前故病令人鼽衄上甲上無穴當言刺大指次指爪甲上乃厲兌陽明之井不

當更有次指二字也厲兌者刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯

面部故舉經脈之病以明繆處之類故下文云

新校正云按甲乙經云刺足中指爪甲止無次指二字蓋以大指次指爲中指

作陽明之絡

刺足中指次指爪甲上與肉交者各一瘡左刺

令人脇痛不得息效而汗出

以其脉支別者從目兌皆下大迎合

以下胷中貫鬲絡肝膽循脇故令人脇痛效而汗出

刺足小指次指爪甲上與肉交者各一瘡

謂竅陰穴少陽之井也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三不得

新校正云按甲乙經竅陰在足小指次指之端去爪甲角如韭葉

息立已汗出立止效者溫衣飲食一日已左刺右右刺左病

立已不已復刺如法邪客於足少陰之絡令人嗌痛不可

內食無故善怒氣上走賁上

以其經支別者從肺出絡心注胷中

疾龍俠舌本故病令人嗌乾痛不可內食無故善怒氣上走賁上也
也新校正云詳王注以賁上爲氣奔者非按難經胃爲賁門楊操云賁屬也
是氣上走鬲上也經既云氣上走安得更以賁爲奔上之解

立已左刺右右刺左

謂涌泉穴少陰之井也在足心陷者中屈足蹠指
宛中刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可

壯灸三嗌中腫不能內唾時不能出唾者刺然鼻之前出血

立已左刺右右刺左

亦足少陰之絡也以其絡並大經循喉嚨故爾刺之
此二十九字本錯簡在邪客手足少陰太陰足陽
明之絡前今遷於此新校正云詳正注以其絡並大經循喉嚨差云按甲乙
經足少陰之絡並經上走心包少陰之經循喉嚨今王氏之注經與絡交亥當

以甲乙經爲正邪客於足太陰之絡令人要腎痛引少腹控脇不可以仰

息

足太陰之絡從脾合陽明上貫尻骨中與厥陰少陽結於下髎而循尻骨內
入腹上絡嗌貫肩中故要痛則引少腹控於脇中也眇謂季脇下之空軟處
也受邪氣則絡拘急故不可以仰伸而喘息也刺腰痛篇中無息字

云詳王注云足太陰之絡按甲乙經乃太陰之正非絡也王氏謂之絡者未詳

其刺腎尻之解兩肺之上是要員以月死生爲病數發鍼

立已左刺右右刺左

腎尻胥骨間曰解當中有腎俞刺可入同身寸之二
寸新校正云按氣府論注作二分刺熱論注作

三分水穴篇注作二分熱穴篇注作二寸甲乙經作二寸留七呼主與經同
中誥孔穴經云左取右右取左穴當中不應爾也次腎下俠尻有骨空各四皆

主腎痛下髎主與經同是足太陰厥陰少陽所結刺可入同身寸之二寸留十
呼若灸者可灸三壯肺謂兩肺腎也腎俞髎伸皆當取之也

三

四

新校正云按此

知全元起本舊無

其刺腎尻之解兩肺之上是要員以月死生爲病數發鍼

立已左刺右右刺左

腎尻胥骨間曰解當中有腎俞刺可入同身寸之二
寸新校正云按氣府論注作二分刺熱論注作

三分水穴篇注作二分熱穴篇注作二寸甲乙經作二寸留七呼主與經同
中誥孔穴經云左取右右取左穴當中不應爾也次腎下俠尻有骨空各四皆

主腎痛下髎主與經同是足太陰厥陰少陽所結刺可入同身寸之二寸留十
呼若灸者可灸三壯肺謂兩肺腎也腎俞髎伸皆當取之也

新校正云按此

三

四

新校正云按此

以月死生爲數立已

解樞之後則環跳穴也正在脾樞後故

新校正云按此解樞可入同身寸之一寸留二十呼若灸者可灸三壯毫鍼者第七鍼也
新校正云按甲乙經環跳在脾樞中氣穴論云在兩脾厭分中此經云刺樞中而
王氏以謂脾樞之後者誤也

治諸經刺之所過者不病則繆刺之

正言也經不病則邪

耳前者

手陽明謂前手大指次指去端如韭葉者也是謂商陽揚中誥孔

新校正云按此合谷等穴也耳前通脉手陽明脉正

指謂前商陽不謂此合谷等穴也耳前通脉手陽明脉正

當聽會之分刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯

齒齶刺手陽

明不已刺其脉入齒中者立已

甲乙流注圖經下陽明肺中商陽二間三間合谷陽谿偏歷溫留

齒中足陽明脈循鼻外入上齒中也邪客於五藏之間其病也脉引而痛時來時止視其病繆刺之於手足爪甲上名刺其井左取右右取左視其脉出其血間日一刺一刺不已五刺已有血脉者則刺之如此數繆傳引上齒齒齶有寒氣見其手背承泣者此若病緣傳而引上齒之脣

足陽明中指爪甲上一痛手大指次指爪甲上支口一痛立
已左取右右取左謂第二指厲兑穴也手大指次指謂商陽穴手陽明井也鍼經曰齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取手

新校正云詳前文
是誤剩次指二字當

太陽足陽明之絡此五絡上耳會方
陰腎脈手太陰肺脉足太陰脾脉足陽明胃
脉此五絡皆會於耳中而出絡左額角也

且中上經左角心脈足少陰俱竭令人身脉皆動

而形無知也其狀若刃或曰刃厥
則下氣重上而邪氣逆邪氣逆則陽氣亂陽氣

中上經左角 心脉足少陰
絡俱竭令人身脉皆動

閉結而不通故其狀若尸也以是從厥而生故其

或曰尸厥 束其足大指內
陰之井也 刺可入同身後刺
呼若灸者可灸三壯

足心 謂涌泉穴足少陰之井。前取涌泉穴法，後刺足中指。

或曰尸厥 東其反大指內
陰之井也刺可入同身後刺
呼若灸者可灸三壯

刺同前取厲兌穴法後刺手大指內側去端如韭三呼若灸者後刺二三謂中衝穴手心土

或曰尸厥 束其反大指內
陰之井也 刺可入同身後刺
呼若灸者可灸三壯

可灸三壯 後束手心主分留三呼若灸七

或曰尸厥 束其反大指內
陰之井也 刺可入 同身後刺
呼若灸者可灸三壯

一痛立已 謂神門穴在掌後腕骨之端陷者
刺可入同身寸之三分留七呼若

或曰尸厥 束其手大指內
陰之井也 刺可入同身後刺
呼若灸者可灸三壯

爪甲上各一竅 謂第二指足
正葉 刺可入同身寸之一分留
王之井也 刺可入同身寸之一
者可灸一壯

新校正云按甲
主而此之首也 少陰銳骨之端各
中手少陰之俞也 不已以竹
灸者可灸三壯

管吹其兩耳 言使氣入耳中內助五經
密攢之勿令氣泄而極吹之

或曰尸厥 束其反大指內
陰之井也 刺可入同身後刺
呼若灸者可灸三壯

擗二度復吹其右耳三度 嘗其方石之酒一杯不能飲者灌之立已左角之酒飲之以治

或曰尸厥 束其足大指內陰之井也 刺可入同身後刺呼若灸者可灸三壯

爪甲上各一病 謂第二指足謂少商穴手太陰之井也刺可入同身寸之一分留王之井也 刺可入同身寸之一者可灸一壯 新校正云按甲主而此少陰銳骨之端各灸者可灸三壯

中手少陰之俞也 不已以竹火之氣復通也 當內管入耳以子之氣蹙然後絡脉通也 新校正

是五絡血之餘故耳之燙治美酒也 酒者所以行藥勢又灸

上而內起於心心主脉故以美酒服之凡刺之數先視其

或曰尸厥 束其足大指內
陰之井也 刺可入同身後刺
呼若灸者可灸三壯

爪甲上各一病 謂第二指足
陽明之井也

韭葉 刺謂少商穴手太陰之井也
刺可入同身寸之一分留
王之井也 刺可入同身寸之一
者可灸一壯

新校正云 按甲
主而此少陰銳骨之端各
中手少陰之俞也 不已以竹
灸者可灸三壯

人之氣復通也 當內管入耳 以下
之氣蹙蹙然後絡脉通也 新校

髮方一寸 燻治飲以美
經脉切而從之審其虛

髮是五絡血之餘故煑之燻治
美酒也 酒者所以行藥勢又灸

實而謂之不謂者經刺之有痛
因視其皮部有血絡者盡取之

四時刺逆從論篇第六十四

或曰尸厥 東其反大指內
陰之井也 刺可入同身後刺
呼若灸者可灸三壯

爪甲上各一病 謂第二指足
井葉 謂少商穴手太陰之井也
刺可入同身寸之一分留
王之井也 刺可入同身寸之一
者可灸一壯 新校正云按甲
主而此少陰銳骨之端各
灸者可灸三壯

中手少陰之俞也 不已以竹
令氣復通也 當內管入耳以管
之氣盛然後絡肺通也 新校
方一寸燔治飲以美酒也
是五絡血之餘故易之燔治
美酒也 酒者所以行藥勢又炎
經脉切而從之審其虛
而經不病者繆刺之
此繆刺之數也

厥陰有餘病陰痺

痺謂痛也陰謂寒也有餘謂厥陰氣盛滿故陰發於外而爲寒痺

新校正云詳王氏以痺爲痛未

通不足病生熱痺

痺故爲熱痺

滑則病狐疝風濬則病少

腹積氣

厥陰脉循股陰入脣中環陰器抵少腹又其絡支別者循脣上界

得尿日出方得人之所病與狐同故曰狐疝

一日孤疝謂三焦孤府爲疝故曰孤疝

少陰有餘病皮痺隱軫不足

病肺痺

腎水逆連於肺母故也足少陰脉從腎上貫肝鬲入肺中故有餘病皮痺隱軫不足病肺痺也

滑則病肺風疝

濬則病積洩血

以其正經入肺費腎絡膀胱故爲肺疝及積洩血也

太陰有餘病肉覃寒中

不足病脾病

脾主肉故如是滑則病脾風疝濬則病積心腹時滿太之脉入腹屬脾絡胃其支別者復從胃

別上鬲症心中故爲脾疝心腹時滿也

陽明有餘病肺痺身時熱

不足病心痺

足則心下痺故爲是

滑則病心風疝濬則病積時

善驚

心主之脉起於胷中出屬心包下南歷絡三焦故爲心疝時善驚

太陽有餘病骨痺身重

不足病腎痺

胃有餘則上歸於心不足病歸於腎也

滑則病腎風疝濬則病積

積善時巔疾

太陽與少陰爲表裏故有善驚循督絡腎故爲腎風及巔病也

少陽有餘病筋痺腸

滿不足病肝痺

少陽與厥陰爲表裏故病歸於肝

滑則病肝風疝濬則病積

時筋急目痛

肝主筋故時筋急厥陰之脉上出額與督脉會於巔其支別者從目系下頸裏故目痛

是故春氣

在經脈夏氣在孫絡長夏氣在肌肉秋氣在皮膚冬氣

在骨髓中帝曰余願聞其故歧伯曰春者天氣始開地氣

始泄凍解冰釋水行經通故入氣在脈夏者經滿氣溢入

孫絡受血皮膚充實長夏者經絡比日盛內溢肌中秋者天

氣始收湊理閉塞皮膚引急引謂牽引以縮急也

冬者蓋藏血氣在

內著骨髓通於五藏是故邪氣者常隨四時之氣血而入

客也至其變化不可爲度然必從其經氣辟除其邪除其

邪則亂氣不生

得氣而調故不亂

引謂牽引

帝曰逆四時而生亂氣大何歧伯

曰春刺絡脉血氣外溢之人少氣

血氣溢於外則中不足故少氣新校正云按自春刺絡脉至令人日不明與許要經終論義同文異波注甚詳於此彼分四時此三分即彼秋皮膚分也

長夏刺肌肉之分而遂時各關刺秋分之事疑此肌肉之分即彼秋皮膚分也

也春刺肌肉環逆令人上氣

血逆氣上故上氣新校正云按經關春刺秋分

春刺筋

骨血氣內著令人腹脹

內著不散故脹

夏刺經脉血氣乃竭令人解

休 血氣竭少故解休然不可名之也解休謂寒人善恐 阳氣不通故善恐

人善恐

卻閉也血氣內閉則

夏刺肌肉血氣內却令

人善怒 血氣上逆

於肺中故善

志秋刺絡脉氣不外行

新校正云按別本作氣不行

全元起本作氣不衛分太素同

令人卧下欲

動

以虛其故 新校正云按經闕秋刺長夏分

秋刺筋骨血氣內散令人寒慄

血氣散則

寒慄 氣虛故

冬刺經脉血氣皆脫令人目不明

以血氣無所營故也

冬刺絡脉

內氣外泄留爲大瘡冬刺肌肉陽氣竭絕令人善

而竭故善忘新校正云按全元起本作氣不衛分太素同

凡此四時刺者大逆之病

新校正云按全元起本作氣不衛分太素同

可不從也反之則生亂氣相溼病焉

新校正云按全元起本作氣不衛分太素同

刺不知四時之經病之所生以從爲逆正氣內亂與精相

薄必審九候正氣不亂精氣不轉

不轉謂逆轉也

帝曰善刺五藏

中心一日死其動爲噫

新校正云按甲乙經語作噫

中肝五日死

其動爲語

新校正云按甲乙經語作語

中肺三日死

其動爲歎

新校正云按甲乙經語作歎

中腎六日死

其動爲嚏欠

新校正云按甲乙經語作嚏欠

中脾十日死

死

新校正云按甲乙經作十五日

其動爲呴

新校正云按甲乙經語作呴

中肝五日死

標本病傳論篇第六十五

新校正云按全元起本在第二卷皮部論篇前

黃帝問曰病有標本刺有逆從奈何歧伯對曰凡刺之方

必別陰陽前後相應逆從得施標本相移故曰有十往標

而求之於標有其在本而求之於本有其在本而求之方

標有其在標而求之於本故治有取標而得者可取之而

得者有逆取而得者有從取而得者得病之情知治大體則

故知逆與從正行無間知標本者萬舉萬當

道不疑惑識

古知逆與從正行無間知標本者萬舉萬當

斷深明則無

問於人正行皆當

不知標本是謂妄行

識猶偏淺道未高深

夫陰陽逆

從標本之爲道也小而大言一而知百病之害

著之至也言別陰陽知逆順法明著

大以斯明著故言一而知百病之害小而多涉而博口以言一而知百
也

一能至於是取古學之者猶可以言一而知百病也博大也
察近而知遠言標與本易而勿及雖事極深玄人非识之略以淺近
而悉盡貫之然標本之道亟且可爲

言而此人識見無能及者治之爲逆治得爲從先病而後逆者治其末元逆而後病者治其本先寒而後三兩者合其二三言方略

滿者治其標先病而後泄者治其本先泄而後生也

其本必且調之乃治其他病先病而後生中滿者治其標先中滿而後貞心首當其一

病必僅系之 溝而後煩心者治其本人有客氣者同氣元起本同作固 小大不利治其標小大利治其本本先病標後

標之先治其本後治其標病發而不足標而本之先治其

標後治其本 卒而標之謂有先病後有後病也以其有餘故先治其本後治其標也標而本之謂先發輕微緩者後發重太急者以其有餘故先治其本後治其標也

謂多也甚謂少也多謂多形謐謂多也甚謂少也少謂少形謐而輕易少謂少形謐而重難也以

餘非謂捨法而以意妄爲也。問者并行其道，方不未可
後生病者治其本。并謂他脉共受邪氣而合病也，獨爲一經受病，而無異氣相參也。并甚則相傳，傳急則亦死。夫

病傳者心病先心痛 藏貞通於心肺金勝木轉於肝也 一日而效 心火勝金傳於肺也 三

日勝支痛 其脉循脇肋故如是 **五日閉塞不通身痛** 因胃重木

東之故閉塞不通身病體重
一不傷豈其能久故為一死

日而之肺三日而之肝五日而之脾三日不已死冬夜半夏日中田經曰病先發於心心痛一日之肺而後三日之肝肋支痛五日之脾閉塞不通痛壅重三日不已死冬夜半夏日中諱素問言其病靈樞言其布一丙戌卯火人志火

藏甲乙經并素問靈樞二經之文而病與藏兼舉之

孟冬之中日入於申之八刻二分仲冬之中日入於

申之七刻三分季冬之中入於申與孟月等孟夏之中日出於寅之八刻一分仲夏之中日出於寅之七刻三分季夏之中日出於寅與孟月等

而脹

自傳於府

三日薯脊少腹痛脰痠

謂胃傳於腎以其脈起於足厥陰屬腎絡膀胱故如是

也薯爲腎之府故腰痛三日不已死冬日入

新校正云按甲乙經作日中

夏早食入

早晏如冬法也早食謂早於食時則知正之時也

新校正云按甲乙經作日中

自傳二日少腹薯脊痛脰痠

胃傳於腎主肌肉故爾

於府二日少腹薯脊痛脰痠

謂胃傳於腎內出腫內廉上股內後廉貫

於府及之脛也十日不已死冬日入

人定謂申後二十五刻又一

自傳二日少腹薯脊痛脰痠

謂胃傳於腎主肌肉故爾

少腹薯脊痛脰痠

藏真下於腎故如是

三日背脂筋痛小便弱

傳有新校正云按靈樞經云之脛膀胱是自傳於府及之脛也

日兩脇支痛

府傳於藏新校正云按靈樞經云二日之小腸

不巳死冬大晨夏晏晡

大晨謂寅後九刻太明之時也晏晡謂申後九刻向昏之時也

胃病脹滿

以其脉循脰故如是

五日身體重

膀胱水府傳分脾也新校正云按靈樞經及甲乙經各云五日上之心是膀胱傳

六日不已死冬夜半後夏日昧

夜半後謂子後八刻

膀胱病小便閉

以其爲津液之府故爾

五日少腹脹薯

新校正云按甲乙經無止字

刺一日腹脹

腎復傳於小腸

二日不已死冬雞鳴夏下晡

雞鳴謂早

諸病以次相傳如是者皆有死期不可

新校正云按甲乙經無止字

刺五藏相移皆如此有緩傳者有急傳者緩者或一歲二歲三歲

此類由尋此病傳之法皆五行之氣考其日數理不相應夫以五行爲紀以不勝之數傳於所勝者謂火傳於金當云一日金傳於木當云二日木傳於土當

勝者則木三日傳於土土五日傳於水水一日傳於火火二日傳於金

云四日土傳於水當云三日水傳於火當云五日也若以已勝之數傳於木經之傳日以法三陰三陽之氣玉機真藏論曰五藏相通接皆有之

三月若六月若三日若六日傳而當死此與同也雖爾猶當臨病詳

其勝害於彼所生則父子無交代之期氣順以行故刺之可矣

非爾間一藏止

新校正云按甲乙經無止字

及至三四藏者乃可刺也

一藏止

黃帝內經素問卷第十八

音釋

繆刺論篇第六十三

繆明又

別切

并減

必中

去聲

卒

上切

瘡

于鬼切

踝

胡瓦切

胠

胠胠音胠

胠

音胠

臂

在計

跗

甫無切

足上也

勦

音求鼻

塞也

血劙

奴六切鼻

出盃也

嗌

於昔切

咽也

尻

去高切

伸

音申

脣

音彼

齶

丘禹切

齒齶也

觴

他計切

又音

錫

鱗鱗同

四時刺逆從論篇第六十四

潛

所力波

所有切

瀉

或作瀉

瀉

音頸

顛

項也

著

直略切

彷

音亦

郤

去約切

薄

并

嚏

音帝

標本論篇第六十五

別

必列切

易而

上音異

間

夫聲

眩

音胫

胫

胡正切

痠

先丸切

胫

脚疼

脂

力之切

脂

也

切脛

脯

博孤切

昧

徒結切

昧

日累也

昧

日累也

