


外臺秘要方

一

據中國國家圖書館藏宋紹興兩浙東路茶鹽司刻本影印原書版框高二十一釐米寬十四·四釐米



外臺祕要方卷第十一 傷寒上一

卷第十一

卷第十一

卷第十一

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍匡林

億等上進

諸論傷寒八家合一十六首

論傷寒日數病源并方二十一首

肘後方七首

深師方四首

小品方四首

集驗方五首

千金方六首

千金翼方一十三首

崔氏方一十五首

張文仲方一十首

古今錄驗方八首

雜療傷寒湯散丸方八首並是論

諸論傷寒八家合一十六首

中所要

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冽此則
四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子周密則不傷於寒
觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為
毒者以其最成殺瘍之氣也中而即病有名曰傷寒不即病者熟
寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熟
極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸冒
寒冷之所致非時行之氣也凡時行者春時應暖而反大寒夏
時應熱而反太冷秋時應涼而及大熱冬時應寒而反大溫此
非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時
行之氣也

仲景病源小品

王叔和曰傷寒之病逐日淺深以施方治今世人得傷寒或始

不早治或治不對病或日數久淹因乃告醫醫又不知次第而治之則不中病肖以臨時消息利方無不効也今搜採仲景舊論錄其證候訟訴聲色對病真方有神驗者擬防世急也又土地高下寒溫不同物性剛柔冷若亦異是故荀帝興四方之間岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟臨病之工宜須丙審也

小品十

全同

又曰夫表和裏病一作陽下之而愈汗之則死裏和表病一作陽汗之而愈下之則死夫如是則神才不可以誤發神丹丸在此卷崔氏甘遂者水道散在第三卷天行狂語表裏之治相背十里吉凶之機應若影響然則桂枝下咽表和則甦桂皮湯仲景曰數部中桂枝等三味者是也承氣入胃裏平則亡承氣湯在此卷仲景曰此桂皮湯三味者是也表裏虛實之交錯其候至微發汗吐下之相及其補至速而醫術淺狹為汗乃誤使病者陷沒自謂其分至令冤魂塞於冥路死

戶盈於曠野仁者鑒此豈不痛歟全

又凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷生意者乃云神丹甘遂合而服之且解其外又除其內言似是於理實違安危之變豈不詭哉夫病發熱而惡寒者發於陽無熱而惡寒者發於陰發於陽者可攻其外發於陰者宜溫於內發表以桂枝溫裏以四逆湯在此卷傷寒下得服部中三味者是也

華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏大矣即愈若不解者至二日在膚可法鍼服解肌散發汗汗出即愈苦不解者至三日在肌復發汗則愈若不解者止勿復發汗也至四日在膚宜服藜蘆丸微吐則愈若病困藜蘆丸不能吐者服小豆爪蒂散土之則愈視病尚未醒醒者復一法鍼之藜蘆丸近用指人不錄之王方二味五日在腹六日在胃入胃則可下也若熱毒在胃外未者是也

入於胃而先下之者其熱乘虛便入胃則爛胃也然熱入胃病

要當須復下去之不得留於胃中也。胃若實熱致此為病三死。一生此輩皆多不愈。胃虛熱入懶胃也。其熱微者赤斑出劇者黑班出赤斑出者五死。一生黑班出者十死。一生但論人有強弱病有難易攻效相信耳。病者過日不以時下之熱不得泄亦。

胃懶班出矣

若得病無熱但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以五苓散一方寸匕水和服之。五苓散仲景云猪苓寒神風部中十全翼方五味者是也當以新汲井水強飲一升許若一升半可至二升益佳令以指刺喉中吐之病隨手愈不即死者此病輩多不善勿強與水水停卽結心下也當更以餘藥吐之。日令相主當者不爾必危若此病不急以猪苓散吐解之者其死殆速耳亦可先以去毒物及法鍼之尤佳。

又云春夏無大吐下秋冬無大發汗發汗法冬及始春天寒宜

服神丹丸亦可摩膏大灸。膏在解療中黃膏六味白膏四味並范汪方是也若未春夏月初秋凡此熱月不宜火灸又不宜厚覆宜服六物青散。青散中范汪方古物者若崔文行度障散。度障散在雜療中范汪方四味者是也本土虛亦善。虛煎在雜療中古今錄驗方三味者是也若無丸散及前但單真柴胡散兩傷寒時行並可服也不但一也至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脉朝夕駛。跡吏切疾者為實癖也朝平夕駛下同若嘔者為實癖也朝平夕駛者非癖也轉湯為可早與但當少與勿令下多耳少與當數其間。

病有虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也。不可發汗頭不痛脉不緊數故知非裏實也不尋不如此內外皆不可攻而師強攻之必遂損竭多死矣。請虛煩但當行竹葉湯。竹葉湯在第三卷天行虛若嘔者與橘皮湯一劑不愈者可重與也。橘皮湯在第二卷傷寒嘔渴部仲文仲方是也此法宜泰數用甚效。

傷寒後虛煩亦宜服此湯仲景方同

陳廩丘云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何答曰醫經云連發汗汗不出者死吾思可蒸之如蒸中風濁蒸濕之氣於外迎之不得不汗出也後人問張苗苗云曾有人作事疲極汗出卧草簾中冷得病但苦寒甚諸醫與丸散湯四日之內尤八發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之即得大汗於被中就粉傳身極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性自有難使汗出者非但病使其然蒸之無不汗出也

小品十全同薦法在此卷集

桃葉湯裏身法在第三卷天行

部中文仲方文太素法是也

范汪論黃帝問於岐伯曰人傷於寒而得病何以反更為熱岐伯曰極陰變陽寒盛則生熟熟盛則生寒諸病發熟寒脉浮洪者便宜發汗當發汗而其人適失血及大下利如之何岐伯答曰數少與桂枝湯使體潤熟熱汗繞出連日如此自當解

也

附全

九卷云黃帝曰傷寒熱病死候有九太素之不一曰汗不步大灌發者死觀發亦死者死二日泄而腹滿甚者死堪一三日目不明熱不已者死四曰老人嬰兒熱病腹滿者死五曰汗不出歐下血者死六曰舌本爛熱不已者死七日欬而衄反六汗不出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而痙反巨郢者死熱病痙者腰反折瘻反制癰反十用齒禁其禁齧也也熱病七八日脉微小病者便血口中乾一日半而死脉代者一日死熱病七八日脉不躁不數後三日中有汗三日不汗四日死熱病已得汗而脉尚躁盛此陰脉之極也死其得汗而脉靜者生熱病脉常盛躁而不得汗者此陽脉之極也死脉盛躁得汗者生脾乙太小品論曰古今相傳稱傷寒為難療之病天行溫疫是毒病之氣而論療者不別傷寒與天行溫疫為異氣耳云傷寒是

稚士之辭玄天行溫疫是田舍間號耳不說病之異同也考之衆經其實殊矣所宜不同方說宜辨是以略述其要爲出第十

卷中十全同

子全論曰人生天地之間命有遭際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存亡憂患關心之慮日有十條謀身之道時生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天行溫疫病者則天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能廢之雖不能廢之而能以道御之其次有賢人善於攝生能知樽節與時推移亦得保全天地有斯瘴_病還以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解療皆云日滿自差以此致枉者天下大半凡始覺不佳則須救療迄至病愈湯食競進折其毒熱自然而差必不可今病氣自在恣意攻人拱手待斃斯爲誤矣今博採羣經以爲上下兩卷廣設備擬好養生者可得詳焉

又夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛不隔同行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表發汗則愈三日以上氣浮在上部轉寒宵心故頭痛脅中滿當吐之則愈五日以上氣沈結在藏故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈明當須消息爲候不可亂投湯藥虛其胃氣也經言脉微不可吐虛細不可下又夏月亦不可下此醫之大禁也

又脉有沈浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云時覺視病已積日其疹源結成非復發汗解肌所除當診其脉隨時形勢救解求免也不可苟以次第爲同失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以內發汗者謂當風解衣夜卧失覆寒濕

所中并時有疾疫賊風之氣而相染易為惡邪所中也至於人自飲食生冷過多腹臟不消轉動稍難頭痛身溫其脉實大者便可吐下之不可發汗也

又凡人有少病若似不如平常則須早道若隱忍不療冀望自差湏更之間以成痼疾小兒女子益以滋甚若天行不和當自戒勒若小有不和則須救療尋其邪由及在腰理以時早療鮮有不愈者患人忍之數日乃說邪氣入藏則難可制止雖和緩亦無能為也癰疽腫尤為其急此自養之要也

又凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覲病須臾即宜便治不等早晚則易愈矣服藥當如方法若縱意違師不須療之也又凡得時氣病五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也所以爾者腹中熱尚少不能消之便更與人作病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與之勿令極意也能飲一斗者

與五升若飲而腹滿小便澀若喘若嘯者不可與之飲而忽然汗出者已愈也人得病能飲水者欲愈也出第九卷中
經心錄論曰傷寒病錯療禍及如反覆手耳故諺云有病不治自得中醫者論此疾也其病有相類者傷寒熱病風濕濕病陰毒陽毒熱毒溫疫天行節氣死生不同形候亦別宜審詳也

出第二
也

論傷寒日數病源并方二十一首

素問黃帝曰大熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日間其愈皆以十日以上者何也岐伯曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故為諸陽生氣也人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必死帝曰願聞其狀岐伯曰一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脉夾臈絡於目故身熱目疼而臈乾不得卧三日少陽受

之少陽主膽其脈循脅絡於耳故脣爲脅痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於藏者故可汗而已四日太陰受之太陰脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脈貫腎絡肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六腑皆受病榮衛不行五藏不通則死矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病東腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不満舌乾已而健十二日厥陰病衰囊縱少腹微下太氣去病日已矣

帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脉病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已

又帝曰其病兩感於寒者其脉應與其病形何如岐伯曰兩傷於寒病者脉一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴也二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譏之廉譏言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮厥逆水漿不入不知人則六日而死

帝曰五藏已傷六腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脉之長也其氣血盛故不知人三日其氣乃盡故死出第九卷中甲乙同太

病源傷寒一日大陽受病太陽者小腸之經也爲三陽之首故先受病其脉絡於腰脊主於頭項故得病一日而頭項背膊腰脊痛也

又傷寒二日陽明受病陽明者胃之經也主於肌肉其脉絡臯入目故得病三日而熱鼻乾不得眠也諸陽在表表始受病在皮膚之間故可摩膏大矣發汗而愈出第七卷中

仲景傷寒論傷寒一二日心中悸而煩者小建中湯主之方

桂心三

甘草二兩

生薑三

大棗十二枚擘

膠飴升一

芍藥六兩

右六味切以水七升先煮五味取三升去滓內飴更上微火
銷令解溫服一升日三服如嘔家不可服建中湯以甜故也

忘海藻菘菜生葱半金翼同出第三卷中

張仲景傷寒論陽
寒一二日內麻黃

湯主之此云小建中湯非也此方但治心中悸而煩
病源傷寒二日少陽受病少陽者膽之經也其脉循於脅上於
頭耳故得病三日脅脅熱而其龍耳也三陽經絡始相傳病未入
於藏故可汗而解出第七卷中

仲景傷寒論療太陽病三日發其汗病不解蒸蒸發熱者屬
調胃承氣湯方

甘草二兩

芒消半升

大黃四兩

右三味切以水三升煮二物取一升去滓內芒消更煮微沸
溫溫頓服以調胃氣則愈忘海藻菘菜經心錄同出第十

卷中張仲景傷寒論三日亦可服麻黃湯此云謂胃承
氣湯非也此方但治三日發汗不解蒸蒸發熱者

病源傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也為三陰之首是知
三日以前陽受病訖傳之於陰而太陰受病為其脉終于脾主
於喉嗌故得病四日腹滿而嗌乾也其病在胃膈故可吐而愈
又傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脉貫腎絡肺繫
於言故得病五日口熱舌乾渴而引飲也其病在腹故可下而
愈失並出第七卷中

仲景傷寒論傷寒四五日身熱惡風頭項強脅下滿手足溫
而渴者小柴胡湯主之方

柴胡半

桔梗根四兩內少

桂心三兩

黃芩二兩

杜鵑二兩

甘草炙二兩

乾薑二兩

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服
一升日三服初服微煩溫覆汗出者便愈也忘生葱海藻菘
菜范汪同出第三卷中張仲景傷寒論各柴胡桂也合用柴胡
胡湯是也五

亟千全冀同

病源傷寒六日厥陰受病厥陰者肝之經也其脉循陰器絡於
肝故得病六日煩滿而囊縮也此則陰陽俱受病毒氣在胃故
可下而愈

又傷寒七日太陽病乘頭痛少愈傷寒七日病法當小愈陰陽
諸經傳病盡故也今七日以後病反甚不除者欲為再經病也
再經病者是陰陽諸經絡重受病故也並出第七卷中
仲景傷寒論療傷寒不大便六七日頭痛有熱此承氣湯其人
小便反清便反青一本作大者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者

必翫宜桂枝湯方

桂枝

芍藥

甘草

生薑三兩

大棗

十二枚擘

炙甘草

右五味切以水七升者取三升去滓溫服一升須臾啜稀粥
一升助藥力覆取微汗忌生葱海藻菘菜集驗備急文仲
范汪同張仲景傷寒論此方六
七月病在表者可服之

又傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以佗藥下之柴胡
證仍在故可與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發
熱汗出而解

病源傷寒八日陽明病表身熱少愈傷寒八日病不解者或是
諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之後毒氣未盡所以病
證猶存也

又傷寒九日少陽病表耳聾微聞傷寒九日以上病不除者或

初一經受病即不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於陰致停滯累日病證不罷者或三陽三陰傳病已畢又重感於寒故日數多而病候改變出第十七卷中

仲景傷寒論療傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴下之脉浮虛而濇者屬桂枝附子湯若大便鞭小便自利者附子白朮湯方

桂枝附子湯方

桂心四兩

甘草二兩

附子三枚炮
大棗十二枚

生薑三兩

右五味切以水六升煮取二升去滓分溫三服初一服其人

身如痺半日許復服之都盡其人如骨狀者勿怪此以附子

木併走皮中逐水氣未除故使人如骨狀也本云附子一枚

今加之二枚名附子湯已生葱豬肉菘菜海藻桃李雀肉

等十全翼同出第十一卷中張仲景論法當加桂枝四兩此本

去桂也以大便不鞭小便不利當加桂附子三枚恐多也

虛弱家及產婦宜減服之此二方但治風濕非治傷寒也

病源傷寒十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病

衰渴止不滿舌乾已而噫十二日厥陰病衰裏緩少腹微下

大氣皆去病日已矣出第十七卷中太素問申乙

仲景傷寒論療吐之後不大便五六日至十餘日日晡所發

潮熱不惡寒獨語如見鬼狀者發則不識人省衣摸床骨而

不安微喘但發熱誠誠訓戲令語者屬大承氣湯方

大黃四兩 陳枳實五枚 芒消合 厚朴半斤
右四味切以水一斗先煮二杓取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒消煮一二沸分為再服初一服便得利者止後服不必盡劑千金方并翼同出第五卷中

又太陽病過經十餘日及二三下之後四五日柴胡湯證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急一云嘔安鬱鬱微煩者為未解也可與大柴胡湯下之即愈方

柴胡桂枝

黃芩

芍藥 酸三

半夏水洗

大棗十二枚

生薑五兩

枳實 四枚

古七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服一方加大黃二兩今不加大黃恐不各為大柴胡湯也心羊肉鴆兼主天行千金翼肘後同

又傷寒十三日不解肩背滿而嘔目睛所發潮熱畢而微利此本柴胡湯下之不得利今反利者知醫以丸藥下之此非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後以柴胡加芒消湯主之方

柴胡桂枝

黃芩

人參

甘草 炙

生薑六兩

半夏五兩

大棗四枚

芒消合

右八味切以水四升煮七味取二升去滓下芒消更上火煎一二沸分為再服未解更作忌海藻菘菜羊肉鴆等五味經一方芒消三合桑螵蛸五箇大黃四分大黃取一升半溫服五升經微下愈本云柴胡湯再服以解其外取餅一粒加芒消大黃

桑螵蛸也

肘後方七首

肘後療傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼療者若初覺頭痛熱脉洪起一二日便作此葱豉湯方

葱白一株

豉一升

豆綿裹

右二味以水三升煮取一升頓服取汗若汗不出更作加葛根三两一方更加升麻三两水五升煮取二升分温再服徐徐服亦得必得汗即差若不得汗更作如麻黄三两去節服取汗出為効文仲同

又方

葱白切一握
米飴三合
豉升
右三味以水一斗煮未少時下豉後內葱白令大熱取三升分温三服則汗出

又方

豉一升
葛根四两
綿果

右一味以童子小便三升煮取二升分温再服汗出為効集驗方加葱白一升切云神良支太醫文仲備急同

又方

葛根四两
右一味以水一斗煮取三升內豉一升更煮取一升半分温再服取汗為差又云擣生葛根汁一二升服亦佳

又療傷寒汗出不歇已三四日晝中惡欲令者方

豉三升
綿裹

鹽一兩

右二味以水七升煮取二升半去滓內蜜一升又煮三沸頓服一升安外當吐如不吐更服一升取吐為効

又方

苦參二分

赤小豆七枚

甘草一分

瓜蒂

右四味切以水一升煮取半升一服之當吐吐不止者作葱豉粥解之必止心海藻菘菜

又方

苦參

黃芩各二

生地黃、脾

右三味切以水八升煎取二升服一升或吐下毒物忘蘇羹

深師方四首

深師療傷寒一日至三日應汗者作此湯方

葛根半

烏梅十四

葱白一握

豉綿裹

右四味切以水九升煎取三升分為三服初一服便厚覆

取汗汗出粉之

又麻黃解肌湯療傷寒三四日煩疼不解者方

麻黃一去節三兩

桂心二

甘草一兩

杏人七十枚去皮碎

右四味切以水九升先煮麻黃減二升掠去沫乃內諸藥合

糞取二升半絃去滓分服八合以汗出為度忌海藻菘菜

生葱一本仲景麻黃湯

并其同

又黃芩湯療傷寒六七日發汗不解嘔逆下利小便不利肩臂

痞滿微熱而煩方

黃芩

前胡八

桂心略三

半夏半升洗

茯苓四

桂心四

右五味切以水一斗二升煎取二升分為六服日三服夜三服間食生薑粥按取小便利為度忌羊肉鴨生葱酢物又右膏湯療傷寒病已八九日三瞧熟其脉滑數昏憤身體壯熱沈重拘攣或時呼呻而已攻內體猶沈重拘攣申表未解今直用解毒湯則癒急不差直用吐藥則毒因加劇而方無表裏療者意思以三黃湯以救其內有所增加以鮮其外是故名石膏湯方

石膏

黃連

黃蘖

黃芩略二

石膏一升

梔子十枚

麻黃三兩去節

右七味切以水一斗糞取三升分為三服一日併服出汗初

服一劑小汗其後更合一劑、ノ兩日服常令微汗半拘擗
煩憤即差得數行利心開令語毒折也忌豬肉冷水米
十四卷中

小品方四首

小品詔書發汗白薇散療傷寒二日不解方

白薇二兩

麻黃去節七分

杏人去皮炙

貝母各三分

右四味擣散酒服方寸匕月覆汗出則愈古今錄驗千

全同

又雞子湯療發汗後二三日不解頭痛肉熱方

麻黃去節一兩

甘草三分

右二味切以水二升和雞子白令置於水內合和令勻內藥復攪令和大煎之勿動煎至一升適寒溫頓服之蓋覆汗出粉停之有効急海藻菘菜古今錄驗備急同

張文仲療天行

又葛根湯療病三四日不差身體毒熱方

葛根八兩

生薑三分

龍膽

天青解

桂心

甘草兩

麻黃去節各二兩

姜蕤

芍藥

黃芩

石膏碎二兩

升麻

各五分

右十二味切以水一斗先煎葛根麻黃取八升掠去沫然內餘藥煮取三升分三服日二夜一服急海藻菘菜生葱一千全同

又療傷寒六七日其人大下寸脉沈遲手足厥逆下部脉不至咽喉痛不利唾膿血泄利不止者麻黃升麻湯方

麻黃去節二兩半

升麻三分

當歸

各五分

知母

姜蕤呂瀨一作昌瀨

芍藥

各三分

麥門冬天門冬桂心

乾薑

石膏碎

各三分

甘草炙

茯苓

白朮各一

右十四味切以水一斗先煮麻黃減二升掠去上沫內諸藥
煮取三升去滓溫分三服相去如炊三斗未頃令盡汗出便
愈忌海藻菘菜生葱醋桃李雀肉等並去茅卷中此張仲景

傷寒論方

集驗方五首

集驗療傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛始得一二日者方

真丹砂一兩

右一味以水一斗煮之取一升頓服之覆取汗心生血物十

金同

又療疫氣傷寒三日以後不解者方

好豉綿裹一升

葱白切一升

右二味童子小便五升煮取二升分再服覆取汁神効十

金同

又療傷寒五日斑出以後湯方

豬膽三合

雞子一枚

苦酒合三合

右三物合和煎令三沸強人盡服之羸人六七沸分為兩

服取汗出為效文仲備急千金同

又療傷寒七八日不解默默煩悶腹中有乾糞誠語大柴胡

湯方

柴胡

半夏湯洗各一兩

生薑四兩

大黃

一兩

甘草炙

四兩

知母

二兩

芍藥

大黃

一兩

一方加枳實四枚黃芩二兩

右十味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服忌海
藻菘菜羊肉鴨肉注加人參三兩餘並背千全用芍藥
又療傷寒熱病十日以上發汗不解及吐下後諸熱不除及下
利不止斑出方

大青四兩

甘草二兩

何膠一兩

豉綿糲

右四味切以水八升煮二物取三升半去滓內豉煮三升去滓乃內膠令烊分溫三服欲盡更作當使有餘渴者當飲但除熱止吐下無毒忌海藻菘菜附後深師千全同本第二卷中

千全方六首

一法

千全治傷寒頭痛項強四肢煩疼青膏方

一日在右語中

當歸

亨窮

吳茱萸

附子

烏頭

莽草

蜀椒各三

白芷三兩

右八味切以醇苦酒漬再宿以豬脂四斤緩火煎候白芷色黃絞去滓以慢酒服棗核大三枚日三服取汗不知稍增可服可摩如初得傷寒一日若頭痛背強宜摩之佳急猪肉又少陰病得病二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯又少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯

又陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘雖坐大便反易色必黑宜抵當湯下之

又傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此為有血不可餘藥宜抵當丸

又太陽病身黃脉沈結少腹堅小便不利者此為無血也小便自利其人如狂者血證諦也宜抵當湯下之

又陽明病脈遲雖汗出不惡寒體必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濺然汗出者此為大便已堅宜承氣湯主之若汗多而微發熱惡寒為外未解宜桂枝湯其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不大便可少與承氣湯微和其胃氣勿令至水下

又陽明病潮熱微堅者可與承氣湯不堅者勿與之若不大便六七日恐胃中有燥熱欲知之法可與小承氣湯若腹中轉

夫氣者為有燥熱乃可攻之若不轉失氣者此為但頭暉後瘧不可攻之攻之必脹滿不能食欲飲水者即噦其後發熱者必復堅與下承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻之

夫實則讒語虛則鄭聲鄭聲重語也直視讒語喘滿者死者下利者亦死

又傷寒四五日脉沈喘滿沈為在裏而反發汗津液越出大便

為難表虛裏實久則讒語

承氣湯方

枳實二枚陳 大黃四兩

芒消三錢

厚朴半斤

右四味切以水一斗先煮二味取五升內大黃更煮取二升

去滓內芒消更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服也

小承氣湯方

大黃四兩

厚朴二兩

枳實一枚

大者三

右三味切以水四升煮取一升二合去滓分溫再服若一服得利病止勿服之也

又抵當丸方

水蛭二升

及蟻

桃人皮二十五枚去足

大黃人

皮

去足

蟻

右四味末下篩令分為四丸以水一斗煮一丸取七合頓服

醉時當下血不下更須服之取血下為效

又抵當湯方

水蛭二升

及蟻

桃人皮二十五枚去足

大黃人

皮

去足

蟻

右四味切以水五升煮取三升分為三服不下更服又療傷寒頭痛壯熱百節疼痛湯方

柴胡

芍藥

大青

知母

杏人皮

双人皮

柏子仁四升

麻

香豉二升

綿裹

石膏碎一升

碎

右十味切以水九升煮取二升七合分三服苦熱盛者加大黃四兩並出第十卷中

千金翼方一十三首合三十

三法

千金翼療少陰病一日口中和其背惡寒者當灸之附子湯方

大附子炮二枚

茯苓

芍藥各二兩

右一味切以水八升煮取三升溫服一升日三忌豬肉桃李

雀肉酢

白朮四兩

又療少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差可與桔梗湯甘草湯方

甘草二兩

右一味切以水三升煮取一升半服七合日三服忌海藻菘菜

又桔梗湯方

大桔梗一兩

甘草二兩

右一味切以水三升煮取一升分兩服吐膿血矣忌豬肉海藻菘菜

又療少陰病二日至三四日腹痛小便不利下利不止而便膿血桃華湯方

赤石脂一斤半綿裹半篩末

乾薑切一兩

粳末一升

右三味以水七升煮取米熟去滓服七合內赤石脂末一方寸匕日三服傷寒論千金崔氏范汪同又療少陰病得之二三日已上心中煩不得卧者黃連阿膠湯主之方

黃連四兩

芍藥二兩

黃芩一兩

阿膠三兩

雞子中黃枚

虛煩不得眠耳

又傷寒六七日結膚熱實其脈沈緊心下痛按之如石堅大陷膚湯主之方

大黃
一兩

甘遂末
一錢

芒消
升

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒消煮一升沸乃內甘遂末溫分再服得快利止後腹

又傷寒苦吐若下後七日不解熱結在裏未裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎湯主之又諸亡血家不可與白虎湯虛者亦不可與卒得之腹痛而利者但可溫之

又傷寒無大熱而口乾渴心煩其背微惡寒者白虎湯主之又傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯消欲飲水無表證者白虎湯主之方

知母
六兩

石膏
一升碎

甘草
三兩

梗米
六合

右四味切以水一斗二升煮取米熟去米內藥煮取六升去滓分六服日三服忌海藻菘菜千金傷寒論備急文仲崔氏范汪經心錄同諸家兼療天行之病

又白虎湯方

石膏

甘草
二兩

梗米
一升

知母
六兩

人參
三兩

右五味切以水一斗二升煮米熟內藥煮取六升去滓分服一升日三服此方立秋後立春前不可行白虎湯正二三月時尚冷亦不可與服與之則嘔利而腹痛忌海藻菘菜又療傷寒九日下之膚滿煩驚小便不利識語謔一身盡重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯方

柴胡
四兩

黃芩

生薑

龍骨

人參

茯苓各一兩半

牡蠣熬

鉑丹

桂心

大黃二分

大棗六枚

大黃二兩

右十二味切以水八升煮取四升內大黃切如博碁子煮取二升去滓溫分再服忌羊肉鷄生葱酢物又陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出其身無有劑頸而還小便不利渴欲水漸此為瘀熱在裏身必發黃宜服茵陳湯方

茵陳六兩

大肥梔子十四枚擘

大黃二兩

右三味切以水一斗二升先煮茵陳減六升去滓內諸藥煮取三升分三服小便當利如皂莢沫狀色正赤二宿腹減黃從小便去並出第九卷中

崔氏方一十五首

崔氏療傷寒始得一二日方

便可矣項三壯又炙大椎三壯各加至五炷益良用之驗大椎平肩斜齊高大者是也仍不得侵項分取之則非也上接項骨下肩齊在椎骨節上是餘穴盡在節下凡灸刺不得失之毫釐今崔氏不定高下是以言之出黃帝鍼灸經

又療傷寒一日至三日可發汗度瘴散方

麻黃去節十分

桔梗

蜀椒汗

白朮

吳茱萸

細辛

乾薑

桂心六半

防風分四

烏頭炮

右十味擣篩為散溫酒服方寸匕溫覆取汗或教服得汗即止若得病一二日而輕者服此藥消得汗解若得便重者頗不能解也然可以二大豆許著鼻孔中覺燥涕出一日可三四著必愈兼辟天行病忌豬肉生葱生菜桃李雀

肉等

又療傷寒勑色惡寒發熱體疼發汗神丹丸方

人參五分

烏頭炮四分

半夏三分

赤芍分位

朱砂一分

附子炮四分

右六味擣為末蜜和丸如大豆每服三丸生薑湯下發汗出令體中濺濺然如汗未出更以熱粥飲之令汗出若汗少不解復如前法若得汗足不解當服桂枝湯此藥多毒飲水解其熱愈周護軍子期自說天行用之甚良故記之已猪

羊肉大酢生血物等刑繁范汪同兼主天行

又療傷寒服度瘴散而不汗出者便作葱豉湯方

葱莖十四

豉一升

綿裹

右二味以水三升煎取一升頓服溫暖覆取汗出勝度瘴散

也與前附方重

又療傷寒服葱豉湯不得汗可服葛根湯方

葱白四

豉一升

葛根三兩

右三味以水五升煮取二升分為再服溫覆取汗上汗不出

更服余時用此一服輒汗略不再服救數十人甚效

又療傷寒前軍府直吏周虎服葛根湯再服不得汗余更

視之甚惡寒而拘急更思作麻黃湯以解之方

麻黃二兩

葛根三兩

豉一升

綿裹

又療傷寒阮河南蒸法

薪火燒地良久掃除去火可以水小灑取蠶沙若桃葉

桑柏葉諸禾稼及麥葵皆可取用易得者牛馬糞亦

可用但臭耳桃葉欲落時可益收取乾之以此等物著

大處令厚二三十寸布席卧上溫覆用此發汗汙出若過熱當審納消息大熟者可重席汗出周身輒便止當以溫粉粉身勿令通風

又療傷寒三五日疑有黃則宜服此油方

取生烏麻清油一盞水半盞以雞子白一枚和之熟擾

令相得作一服令盡

又小前胡湯療傷寒六七日不解寒熱往來脣脛苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔寒疝腹痛方

胡合云出張仲景

前胡八兩

半夏半升

生薑三兩

黃芩

人參

甘草三兩

乾棗枚擘十二

右七味切以水一升煮取三升分四服

古今錄驗同忌羊肉

鵝海藻菘菜

仲景方用其胡不用前胡今詳此方治寒疝腹痛知其

恐性涼耳合用仲景此胡桂姜湯今崔氏用之未

桂姜

可也

又療傷寒或始得至七八日不大便或四五日後不大便或下後祕塞者承氣湯方

厚朴矣

大黃兩

枳實三錢

右三物切以水五升煮取二升體強者服一升羸者服七合

得下必效止

范注同

又若胃中有燥糞令人譖語正熱盛亦令人錯語若祕而錯語者宜服承氣湯通利而錯語者宜服下四物黃連除熱湯承氣湯舊用芒消余以有毒故去之用之數年安穩得下良飫服湯亦應外用生薑兌讀作說便必去燥糞若服湯兼兌而並不得下者可依本方芒消一兩

又薑兌法

削生薑如小指長二寸鹽塗之內下部中立通

又方

以猪膽灌下部用亦立通

張仲景傷寒論云猪膽和法醋少許灌救道中

又前軍督護劉車者得時疾三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得卧余思作此黃連解毒湯方

黃連

兩

黃芩

黃芩

梔子

十四枚

右四味切以水六升煮取二升分二服一服目明一并服進粥於此漸差余以療凡大熟盛煩嘔呻吟錯語不得服皆佳傳語諸人用之亦效此直解熱毒除醋熱不必飲酒劇者此湯

療五日中神效忘豬肉冷水

又大前胡湯療傷寒九月不解心腹堅滿身體疼痛內外有熱煩嘔不安方

張仲景

前胡

半升

生薑

五兩

枳實

八片

芍藥

四兩

黃芩

五兩

乾棗

十二枚擘

右七味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一根古今錄

驗同忘羊肉鷄等物

張仲景用柴前不用前胡本去加黃二兩不加大黃恐不名大柴胡湯

又凡以陰病寒多表無熱但若煩憤默默而極不欲見光有時腹痛其脉沉細而不喜渴經日不差舊用四順湯余舉其熟根不甚用也若少陰病下利而體猶有熱者可服黃連龍骨湯若已十餘日而下利不止手足微冷及無熱候者可服增損四順湯方

黃連龍骨湯見第三卷天行中

甘草

二兩

人參

兩

龍骨

二兩

黃連

兩

乾薑

一兩

附子

一枚

炮去黑皮

右六味切以水六升煮取二升分再服不差復作甚良若下而腹痛加當歸二兩嘔者加橘皮一兩忘海藻菘菜豬肉冷水

又療少陰病二十日後下不止可服陟厘丸治京方

陟厘

四兩不

漢防己

三兩

黃連

三兩

紫石英
碎二兩

別擣末細
或升

厚朴
二兩

苦酒
升

右八味切以二升苦酒漬防已一宿出切矣之燥復內苦酒
中盡止又以三升苦酒漬豉一宿小蒸之研絞取汁擣下篩
諸藥以酒豉汁和之丸如梧桐子大冷漿水服二十九丸九極
燥乃可服之忌諸內冷水並出茅一卷中

張文仲方二十首

張文仲葛氏療傷寒及溫病頭痛壯熱脉盛始得二日方

破雞子一枚著冷水半升中攪令相得別煮一升水令
沸以雞子水投其湯中急攪調適寒溫頓服覆取汗備

急同

又療傷寒二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方

柴胡
半錢

人參
生薑各三

半夏五合

大棗
十枚

甘草
炙

黃芩

桔梗

右七味切以水一斗二升煮取三升分三服微覆取汗半日
便差不差更服一劑忌羊肉鷄海藻菘菜備急丸注同

斛金翼

方

又療傷寒溫病等三日以上骨中滿陶氏云若傷寒溫病已三
四日骨中惡欲令吐者服酒膽方

苦酒半升

猪膽一枚

右二味盡和服之吐則愈神驗文言去毒氣妙胡洽集驗

備急千金同

又療傷寒近效方凡骨中惡淡飲傷寒熱病瘴瘧須吐者方

鹽末
一大匙

右一味以生熟湯調下須臾則吐吐不快明日更服甚良備
急同

又瓜蒂散主傷寒骨中痞塞宜吐之方

瓜蒂

赤小豆各一
兩

右二味擣散白湯服一錢以取得吐去病差止備急經心錄

范汪同

又療傷寒已四五日頭痛體痛肉熱如火病入腸胃宜利瀉之方

生薑門冬

一升

生地黃

切一升

知母

兩

生薑半

五兩

芒消半

兩

右五味以水八升煮取二升半內芒消煎至沸分五服取利為度忌無羨備急同

父療傷寒五日以上宜取下利陶氏云若汗出大便堅而誠語方

大黃五兩

厚朴

二兩

枳實

四枚

厚朴

二兩

枳實

四枚

右三味以水四升煮取一升二合分兩服通者一服止此是

仲景方備急范汪同

崔氏方全

又療傷寒九日不差名為敗傷寒諸藥不能消者方

鼈甲矣

蜀升麻

前胡

烏梅

兩合二

枳實矣

一兩

犀角屑

黃芩

兩

甘草

炙

生地黃

八合

右九味切以水七升煮取二升半分五服日三服夜二服出

支太醫方忌海藻菘菜莧菜蕪荑備急方同

又若十餘日不大便者服承氣丸方

大黃

一兩

杏仁去皮尖破

二兩

枳實

二兩

芒消

一合

右四味擣末篩蜜和丸如彈子以生薑湯六七合研一丸服

之湏臾即通不通更服一丸取通為度備急同

又療晚發傷寒三月至年末為晚發方

生地黃

一斤

梔子

三十

升麻

三刀

柴胡

五兩

石膏

五刀

右五味切以水八升煮取三升分五服頻服若不解更服

若頭面赤去石膏用乾葛四兩無地黃用豉一升莫取三升
分三服忌薰羨備急同並出第二卷中

古今錄驗方八首

古今錄驗陽毒湯療傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後
變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見神鬼或吐血
下利其脉浮大數面赤斑斑如錦文喉嚙痛嘔膿血五日可療
至七日不可療也宜服升麻湯方

升麻二分

當歸二分

蜀椒汗一

雄黃研

梔子

桂心各一分

甘草二分

鼈甲大如手一片

右八味切以水五升煮取二升半分三服如人行五里久再
服溫覆手足毒出則汗汗出則解不解重作服亦取得吐佳
陰毒云雄黃忌海藻菘菜生葱莧菜

張仲景方無梔子桂心陰毒去雄黃蜀椒

又陰毒湯療傷寒初病一二日便結成陰毒或服湯藥六七日

以上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛喉嚙不利毒氣
攻心心下痞強短氣不得息嘔逆肩青面黑四肢厥冷其脉沉細
緊數一本無數字仲景云此陰毒之候身如被打五六日可療至七月
不可療宜服甘草湯方

甘草矣

升麻

當歸二分

蜀椒一分

鼈甲大如手一片矣

右五味切以水五升煮取二升半分再服如人行五里須復
服溫覆當出汗汗出則愈若不得汗則不解當重服令汗出
忌海藻菘菜莧菜十全集驗備急文仲小品附後同並出

第二卷中

又遠夷丸療傷寒四五日及數年諸癥結堅心下飲食不消目
眩四肢疼咽喉不利壯熱脣齶滿腸鳴兩脇裏急竊戶鬼疰
邪氣或為驚恐傷瘦背痛手足不仁口苦舌燥天行發作有

時風溫不能久住吐惡水方

已豆去心皮熟

甘草炙

朱砂

芍藥兩各二

麥門冬二兩去心

右五味各擣下節合和以蜜擣三千下丸如梧桐子大每服兩丸葱棗湯一小兒一歲以下服如麻子大二丸日二服忌心海藻菘菜野猪肉蘆筍生血物出第三卷中又麥奴丸療傷寒五六日坐不解熱在肩中口噤不能言唯欲飲水為敗傷寒醫所不療方

麻黃去節

大黃

芒硝

竈突中墨

黃芩分二

麥奴

右一味搗篩蜜和如彈丸以新汲水五合研一丸

病者渴欲

飲水但極飲冷水不節升數湧更當寒寒訖汗出則愈若

金底墨分一

葛根四

食以除藥勢一名黑奴丸小麥黑勃名為麥奴是也

附張仲深師范汪經心錄廣濟並同

日後五丈不汗依前法服一丸以微利止藥勢盡乃食當冷飲水但極飲冷水不節升數湧更當寒寒訖汗出則愈若

葛根四

麻黃去節

黃芩分二

牡蠣熬二兩

右回味切以水八升煮取三升分三服徐徐服之得汗通則止忌酢物薑甘草

又調中湯療夏月及秋忽有暴寒折於盛熱熱結四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下痢或血或水或赤帶下壯熱且悶脈微旦數宜下之方

大黃

芍藥

藁本

葛根

桔梗

白朮

黃芩

茯苓

甘草炙各二兩

右九味以水九升煮取三升分三服服別相去二食久勿以
食隔須取快下壯熱便。其下亦止也。如秋夏旱熱積日忽
有暴寒折之熱無可散喜搏著肌中作壯熱氣也。胃為六
腑之長最易得傷非意暴寒傷之而一下虛令人則不在
壯熱但下痢或霍亂也少實人有脈五石人喜壯熱其過
藥與折下則加熱喜財而危矣亦有不止便作壅熱毒壯
熱甚不敵則劇宜此調中湯下之和其胃氣其未熱
者宜前胡大黃下之也忘海藻菘菜豬肉酢物桃李雀肉等
又療往來寒熱脅肩逆滿桃仁承氣湯方

大黃四刀清

桂心各二兩

桃人皮去

芒消三十枚去

甘草炙

芒消湯成

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消更煎一兩沸溫
分三服太醫校尉史脫肘後傷寒論千金翼同忘海藻

菘菜並出第二卷中

花汪療傷寒

勑色頭痛頭強賊風走風黃膏方

附子

細辛

乾姜

蜀椒去皮

桂心各二兩

巴豆去皮者五十粒

右七味各切以淳若酒清藥一宿以臘月猪脂一斤煎之調
適其大三上三下藥成傷寒勑色發熱酒服如梧桐子許又
以摩身數百遍兼療賊風絕良風走肌膚追風所在摩之已
用有效此趙家方十全同忌野豬南生葱生菜苦蘆
又療傷寒白膏摩體中手當十遍藥方乃行并療惡瘻小
兒頭瘡牛頭馬鞍背療之先以鹽湯洗惡瘻布拭之著膏瘡
腫三摩向火千遍日再自消方

天雄

烏頭炮

莽草

羊躄躅各三

右四味各切以苦酒三升漬一宿作東尚露竈又作十二聚濕土各一升許成煎豬脂三斤著銅器中加竈上吹以葷薪為火令膏釋內所漬藥炊令沸下著土聚上沸定頃上火前如此十二過令土聚盡通藥成絞去滓傷寒頭痛酒服如杏核一枚溫覆取汗咽痛令如棗核目三咽之不可近月千金同忌猪肉等

又崔文行解散療傷寒發熱者方

一召次
瘴癰

烏頭炮

介

桔梗

細辛

白术

兩

右四味擣散皆合盡若中寒服一錢覆取汗若不覺復少增服之以知為度時氣不和服錢五克碎惡氣飲有病服一服背酒服忌生菜豬肉桃李雀肉等千金同

又六物青散療傷寒初色惡寒者方

作慾通赤

烏頭炮

桔梗

白术

各十

附子炮五

防風

細辛

右六味擣節為散溫酒服錢五克不知稍增服後食頃不出者飲薄粥一升以發之溫覆汗出濺濺可也勿令流離勿出手足也汗微出勿粉若汗大亦不止溫粉粉之不得汗者當更服之得汗而不能當服神丹丸一千金同生菜

豬肉桃李雀肉等

又服桂枝湯大汗出後服洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧一日再發者汗出便解屬桂枝二麻黃一湯主之方

桂心

一兩十

杏仁

十六枚

芍藥

六兩

麻黃

十六

大棗

五枚

生薑

一兩六

甘草

一鉢

大棗

五枚

右七味切以水三升先煮麻黃一兩沸掠去沫乃內諸藥煮得二升去滓溫服一升日再本云桂枝湯二分麻黃湯一分合為二升分再服今合為一方忌海藻菘菜生葱

本張仲景傷寒驗方集驗療天行

又療傷寒及天行爪帶散吐方

赤小豆一兩

瓜蒂一兩

右二味擣作散溫湯二合服一錢已藥下便卧若吐便且忍也候食頃不吐者取錢五七散二合湯和服之便吐矣不吐復稍增以吐為度吐生黃如茱黃者汗者五升以上為佳若吐少病不除者明日如前法復服之可至再三不令人虛也藥力過時不吐服湯一升助藥力也壯亦便可食無復餘毒若服藥過多者益飲冷水解之此方前張文仲方

又療傷寒熱病辟毒氣疫病大物亦散方

朱砂

烏頭炮各二兩

細辛

躄躅

乾薑

白朮各一兩

桔梗半兩

右藥擣散服半錢用酒調服汗出解不解增至一錢匕除邪氣消瘦癟忌桃李雀肉生菜豬肉生血物等出第二

十一卷中

又療傷寒雪箭方

麻黃十斤去節

杏人皮熟擣為膏

大黃一斤十三兩全

右三味以雪水五石四斗瀆麻黃於東向竈金中三宿入大

黃櫞調炊以薪薪煮至二石去滓復於金中下杏人膏煎至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三升合煎得二斗六升其藥已成可丸如彈子大有病者以三沸白湯五合研一丸入湯中通寒溫服立汗出若不愈者復服一丸密封藥勿令泄氣也此本出第三卷中千金同

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士匡裴宗元校正

外臺祕要方卷第一

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦事干監校

吉士勸

外臺秘要一書凡二十卷共貳拾壹本內目錄一本
斯乃古籍且^{新正}珍藏寶玩永貽諸後謙坐其鑒之
告永樂己亥立春後一日誠意齋識

嘉靖癸卯秋八月東沙草堂重襄



