

脉調句乃可診有過之脉或有作爲當停寧食須俟定乃診師亦如之。

釋曰停寧俟定即不拘於平旦况倉卒病生豈待平旦學者知之。

經云切脉動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六府強弱形之盛衰可以參決死生之分。

釋曰切脉動靜者以脈之潮會必歸於寸口三部診之左關前一分爲人迎以候六淫爲外所因右關前一分爲氣口以候七情爲內所因推其所自用皆經常爲不內外因三因雖分猶乃未備是以前哲類分二十四字所謂七表八裏九道七表者浮芤滑實弦緊洪八裏者微沉緩濶遲伏濡弱九道者細數動虛促結代革散雖名狀不同證候差別皆以人迎氣口一分而推之與三部相應而說證故脉贊曰關前一分

人命之主左爲人迎右爲氣口神門決斷兩在關後而漢論亦曰人迎緊盛傷於寒以此推明若人迎浮盛則傷風虛弱沉細爲暑濕皆外所因喜則散怒則激憂滯思結悲緊恐沉驚動皆內所因看與何部相應即知何經何臟受病方乃不失病機也其如診按表裏名義情狀姑如後說但經所述謂脉者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進丈蓀雖雅義理難尋動靜之辭有博有約博則二十四字不濫絲毫約則浮沉遲數總括紀綱故知浮爲風爲虛沉爲濕爲實遲爲寒爲冷數爲熱爲燥風濕寒熱屬於外虛實冷燥屬於內內外既分三因領別學者宜詳覽不可憚煩也經中所謂視精明者蓋五臟精明聚於目精全則目明神定則視審審視不瞭則精明敗矣直視上視眩瞑晦瞑皆可兼脉而論病狀也所謂察五色者乃氣之華也赤欲如帛裹朱不

三因極一病證方論

二

三因極一病證方論卷之二

青田

王鵠

陳山

無擇

山編

脉經序

學醫之道。須知五科七事。五科者。脉病證治。及其所因。所處。所乘。所制。所制。所乘。所處。所因。者。所因中復分爲三。博約之說。於斯見矣。脉爲醫門之先。雖流注一身。其理微妙。廣大配天地。變化合陰陽。六氣緯虛。五行麗地。無不揆度。是以聖人示教。有精微氣象之論。後賢述作。爲太素難經之文。仲景類集於前。叔和詮次於後。非不昭著。六朝有高陽生者。剽竊作歌訣。劉元賓從而解之。遂使歪曲應稀。已歌和衆。經文溺於覆鑿。止道翳於詖辭。可歎息今乃糾簡要義。別白討論。分人迎氣口。以辨内外因。列表裏九道。以叙感傷病。六經不昧。五臟昭然。識病推因。如指諸掌。類明條備。文略義詳。儻能留神。則思過半矣。

學診例

凡欲診脈。先調自氣。壓取病人息。以候其遲數。過與不及。所謂以我醫彼。智與神會。則莫之敢違。

凡診脉。須先識脉息兩字。脉者血也。息者氣也。脉不自動。爲氣使然。所謂長則氣治。短則氣病也。

凡診須識人迎氣口。以辨内外因。其不與人迎氣口相應。爲不內外因。所謂閏前壹分。入命之主。

凡診須先識五臟六經本脉。然後方識病脉。歲主臟害氣。候逆傳。陰陽有時。與脉爲期。此之謂也。

凡診須認取二十四字名狀。與閏前一分相符。推說證狀。與病者相應。使無差忒。庶可依源治療。

總論脉式

經云。常以平日陰氣未動。陽氣未散。飲食未進。經脉未盛。絡

欲如赭白欲如白璧之澤不欲如墨青欲如蒼玉之澤不欲如藍黃欲如羅裏雄黃不欲如黃土黑欲如漆畫澤不欲如炭五色精敗壽不久矣。所謂觀五臟有餘不足者候之五聲五聲者臟之音中之守也中盛則氣勝中衰則氣弱故聲如從室中言者是氣之滯也言微終日乃復言者是氣之壅譖妄不避善惡神明之亂也鄭聲言意不相續陰陽失守也故曰得守者生失守者死。所謂六府強弱以候形之盛衰頭者精明之府頭傾視深精神奪矣背者胷中之府背曲肩隨胷將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將倦矣膝者筋之府屈伸不能筋將憊矣骨者髓之府也行則振掉骨將備矣倉廩不藏者腸胃不固也水泉不止者膀胱不藏也得強者生失強者死此等證狀醫者要門在脉難明惟證易辨是故聖智備論垂教學者宜兼明之不可忽也。

三部分位

三部從魚際至高骨得一寸名曰寸口從寸口至尺名曰尺澤故曰尺中寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界又云陰得尺內一寸陽得寸內九分從寸口入六分爲關分從關分又入六分爲尺分故三部共得一寸九分

六經所屬

心部在左手寸口屬手少陰經與小腸手太陽經合
肝部在左手關上屬足厥陰經與膽足少陽經合
腎部在左手尺中屬足少陰經與膀胱足太陽經合
肺部在右手寸口屬手太陰經與大腸手陽明經合
脾部在右手關上屬足太陰經與胃足陽明經合
右腎在右手尺中屬手厥陰心包經與三焦手少陽經合手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系

膽

上俠咽系目其直者復從心系却上肺出腋下下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後廉抵掌後允骨之端入掌內廉循小指之內出其端

手太陽之脈起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支別者從缺盆循頸上頰至目允臂却入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目內臂

足厥陰之脈起於大指聚毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股入陰毛中環陰器抵小腹俠胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頑頲連目系上出額與督脈會於顛其支從目系下頰裏環脣內其支復從肝別貫膈上注肺

足少陽之脈起於目允臂上抵頭角下耳後循頸行手少陽之脈前至肩上却交出少陽之後入缺盆其支別者從耳中出走耳前至目允臂後其支別者自允臂下大迎合手少陽於顙下交頰車下頸合缺盆下會中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街繞毛際橫入髀厭中直者從缺盆下腋循會過季脇下合髀厭中以下循髀太陽出腋外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其支者從跗上入大指循歧骨內出其端還貫入爪甲出三毛足少陰之脈起於小指之下斜趣足心出然谷之下循內踝之後別入跟中上腨內出腘內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本其支從肺出絡心注胷中

足太陽之脈起於目內眴上額交顛上其支別者從顛至耳上角其直行者從顛入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵

頤 腳 目 允 硬 頸

髀厭別本作脾厭

脾別本作肺

腰中入循膂絡腎屬膀胱其支別者從腰中下貫臀入臚中

魚徇別本作魚徇

其支別者從體內左右別下貫肺俠脊內過髀樞循髀外後廉下合臚中下貫膕外踝之後循京骨至小指外側端

手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上

骨下廉入寸口上魚徇魚際出大指之端其支者從腕後直

腕出次指內廉出其端

膕肉別本作膕內

手陽明之脉起於大指次指之端循指上廉出合谷兩肩之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉循臑內前廉上肩出

鶡肩之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫頰下入齒縫中還出俠口交人中左

之右右之左上俠鼻孔

足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過竅骨後上內踝前廉上膕肉循骻骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈俠咽連舌本散舌下其支者復從胃

別上膈注心中

膕肉別本作膕內

足陽明之脉起於鼻交頰中下循鼻外入上齒中還出俠口

環唇下交承漿却循順後下廉出大迎循頰車上耳前過客

主入循髮際至額顱其支者從人迎前下人迎循喉嚨入缺

盆下膈屬胃絡脾其直行者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣

充中其支者起胃下口循腹裏下至氣充中而合以下髀闊

抵伏兔下入膝臚中下循骻外廉下足跗入中指內間其支

者下膝三寸而別以下入大指間出其端

手厥陰之脈起於曾中出屬心包下膈歷絡三焦其支者循

曾出膕下腋三寸上抵腋下下循臑內行太陰少陰之間入

肘內下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者從掌

顙

顱

頤

齧別本作齧

陽

中循小指次指出其端

手少陰之脉起於小指次指之端上出次指之間循出表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心包下膈偏屬三焦其支者從膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下頰至顙其支者從耳後入耳中却出至目充眥

五藏所屬

左寸外以候心內以候膻中 右寸外以候肺內以候胷中
左關外以候肝內以候膈中 右關外以候脾內以候胃脘
左尺外以候腎內以候腹中 右尺外以候心主內以候腰
釋曰六臟六腑十二經絡候之無踰三部要之前布六經乃
候淫邪外入自經絡而及於臟後說六臟乃候情意內鬱自
臟腑出而應於經內外所因穎然明白李診之道當自此始
外因雖自經絡而入必及於臟須識五臟部位內因鬱滿於
中必應於經亦須徇經說證不可偏局故經云上竟上會喉
中事也下竟下腰足中事也不可不通

五臟本脉腑

人之脉者乃血之隧道也非氣使則不能行故血爲脈氣爲
息脉息之名自是而分呼吸者氣之橐籥動應者血之波瀾
其經以身寸度之計十六丈二尺一呼脉再動一吸脉再動
呼吸定息脉五動閏以太息則六動一動一寸故一息脉行
六寸十息六尺百息六丈二百息十二丈七十息四丈二尺
計二百七十息漏水下二刻盡十六丈二尺營周一身百刻
之中得五十營故曰脉行陽二十五度行陰二十五度也息
者以呼吸定之一日計一萬三千五百息呼吸進退既遲於
脉故八息三分三毫三釐方行一寸八十三息三分三毫行

隧

厚樞作

是別李
是字

佳別李
季字

一尺八百三十三息三分行一丈八千三百三十三息行十丈餘六丈二尺計五千一百六十七息通計一萬三千五百息方行盡十六丈二尺經絡氣周於一身一日一夜大會於風府者是也脈屬陰陰行速猶太陰一月一周天氣屬陽陽行遲猶太陽一歲一周天如是則應天常度故春肝脉絃細而長夏心脉浮大而洪長夏脾脉軟大而緩秋肺脉浮濶而短冬腎脉沉濡而滑各以其時而候旺相休囚脉息無不及太過之患故曰平人平人常氣稟於胃必以胃氣為本取其資成也合本臟氣三分微似弦洪緩濶沉則為平脉若真臟脉見則不佳矣廣如後說

六經本脉脉

六經所以分手足陰陽者以足為本手為標如足厥陰風木肝與足少陽相火膽為表裏同在一處足太陰濕土脾與足陽明燥金胃足少陰君火腎與足太陽寒水膀胱皆相附近至於手三陰三陽相去頗遠蓋足陰陽本乎地莫方有常手陰陽法乎天變化無定足為常度手為揆度脉常尽变故為奇度奇常揆度其道一也足厥陰肝脉在左關上絃細而長足少陰腎脉在左尺中沉濡而滑足太陰脾脉在右關上沉軟而緩足少陽膽脉在左關上弦大而浮足陽明胃脉在右關上浮長而濶足太陽膀胱脉在左尺中洪滑而長手厥陰心主包絡在右尺中沉弦而軟手少陰心脉在左寸口洪而微實手太陰肺脉在右寸口濶短而浮手少陽三焦脉在右尺中洪散而急手陽明大腸脉在右寸口浮短而滑手太陽小腸脉在左寸口洪大而緊此手足陰陽六經脉脉及其消息盈虛則化理不住運動密移與天地參同彼春之暖為夏之暑彼秋之忿為冬之怒四變之動脉與之應者乃氣候之

尺
寸
掌

連動別李
連運

別本言之
政民乃而變
泉則居於南
故寸不應
三智之而政
以當委革
小陰在天居
故證之而變

至脉也。故要論云厥陰之至其脉弦。一云短而數少陰之至其脉鈎。一云細而微太陰之至其脉沉。一云長而大少陽之至大而浮。一云短而大陽明之至短而濡。一云浮而大太陽之至大而長。本脉至脉雖識肺狀，又須推尋六氣交變。南政北政司天在泉，少陰四運者皆曰北政。少陰在泉，故寸不應。甲巳上運德流四政，譬如巡狩而居南面北謂之南政。少陰在天，故寸亦不應。若北政厥陰在泉，則右不應。太陰在泉，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。此乃常度合不應而反應是謂太過應而不應是謂不及。皆爲外淫所因，所以欲知少陰應否者，以君火爲万物資始不可不知。此且以一歲而論之，若細推尋，當以日論精微之道，不可不知。若歲主藏害，自當揆度平治，不能反隅則不復也。

五臟傳变病脉

右手關前一分爲氣口者，以候臟氣發與胃氣兼并過與不及，乘尅傳變也。以內氣鬱發食氣入胃，淫精於脉，自胃口出，故候於氣口。以五臟皆稟氣於胃，胃者五臟之本，臟氣不能自致於手。太陰必因胃氣而至邪氣，勝胃氣衰，故病甚。胃氣絕，真臟獨見，則死。假如春肝脉弦多，胃少曰肝病，但弦無胃氣曰死。若其乘尅，春雖有胃氣而有濡脉見，則秋必病。濡甚則今病。夏心脉洪多，胃少曰心病，但洪無胃氣曰死。如乘尅見微沉，則冬病沉甚，則今病。秋肺脉濁多，胃少曰肺病，但濁無胃氣曰死。秋見洪爲夏病，洪甚爲今病。冬腎脉沉多，胃少曰腎病，但沉無胃氣曰死。冬見濡爲長夏病，濡甚爲今病。長夏脾脉濡多，胃少曰脾病，但濡無胃氣曰死。

脉學新編

亦
脊脈

弦脉本元

劉李仲神廷脉
法

長夏見弦脈爲春病弦甚爲今病又如春肝脈合弦細而長太過則實強令人善怒忽忽眩冒癲疾不及則微虛令人智痛引背兩脇胠滿夏心脈合洪而微實太過則來去皆盛令人身熱膚痛爲浸淫不及則來不盛去反盛令人煩心上欬唾下氣泄秋肺脈合浮而短濶太過則中堅傍虛令人逆氣背痛悶悶然不及則毛而微令人呼吸少氣上咯血下喘聲多腎脈合沉而緊實太過則如彈石令人解仰脊脈痛少氣不欲言不及則其去如數令人心懸如飢眇中清脊中痛少腹滿小便變長夏脾脈當沉而濡長太過則如水之流令人四肢不舉不及則如鳥之啄令人九竅不通名曰重強太過不及脈之大要迫近而微不可失機又人之五臟配木火土金水以養竈神意魄志生怒喜思憂恐故因怒則竈門弛張木氣奮激肺金乘之脉必弦濶因喜則神廷融泄火氣赫羲

腎水乘之必沉散因思則意舍不寧土氣凝結肝木乘之脉必弦弱因憂則魄戶不閉金氣濶聚心火乘之脉必洪短因恐則志室不遂水氣旋却脾土乘之脉必沉緩此蓋五情動不以正悔所不勝既不慕德反謂能勝而乘之悔反受邪此之謂也其病有五五二十五變若其能所傳授勝尅流變又當詳而論之故經曰五藏受氣於其所勝如肝受氣於心傳於脾氣舍於其所生死於其所不勝如肝受氣於心傳於脾氣舍於腎至肺而死心受氣於肺傳於脾氣舍於肝至腎而死脾受氣於肺傳於腎氣舍於心至肝而死肺受氣於腎傳於肝氣舍於脾至心而死腎受氣於肝傳於心氣舍於肺至脾而死則知肝死於肺候於秋庚寅辛死餘皆倣此又如甲乙主寅卯丙丁主巳午庚辛主申酉壬癸主亥子戊己主辰戌丑未一日一夜五分則可以占死者之早暮此病之次也然

肺脾腎

刺灸大字

卒發者不必治於傳。或其傳化不以次、不以次入者，憂恐怒喜思令不得以其次故令人有大病矣。此五臟傳變之大要學者幸留神焉。

六經中傷病脉

熱別本云寒

左手關前一分爲人迎者，以候寒暑燥濕風熱。傷於人，其邪咸自脈絡而入，以迎納之。故曰人迎前哲方論謂太陽爲諸陽主氣，凡感外邪，例自太陽始。此考尋經意似若不然。風暑傷肝，寒喜傷腎，暑喜傷心，包濕喜傷脾，熱傷心，燥傷肺。以暑熱一氣燥濕同源，故不別論。以類推之，風當自少陽入濕，當自陽明入暑，當自三焦入寒，却自太陽入，故經曰：陰爲之主，陽與之正。別於陽者，知病從來，此之謂也。諸大陽傷寒生左手尺中與人迎皆浮緊而盛，浮者足太陽脉也。緊者傷寒脉也。盛者病進也。其證頭項強腰脊痛無汗，惡寒不惡風，陽明傷濕右手關上與人迎皆濶細而長濶者足陽明脉也。細者傷濕脉也。長者病襲也。其證關節疼痛重痺而弱，小便澀祕，大便飧泄。少陽傷風左手關上與人迎皆弦浮而散，弦者足少陽脉也。浮者傷風脉也。散者病至也。其證身熱惡風，自汗，項強筋痛，手少陽傷暑右手尺中與人迎皆洪虛而數，洪者手少陽脉也。虛者傷暑也。數者病增也。其證身熱惡寒頭痛，狀如傷寒，煩渴足太陰傷濕右手關上與人迎皆濡細而沉濡者足太陰脉也。細者濕脉也。沉者病着也。其證身重脚弱，關節煩疼，冷痺脹滿，足少陰傷寒左尺中與人迎皆沉緊而數，沉者足以陰脉也。緊者寒脉也。數者病傳也。其證口燥舌乾而渴，背惡寒，反發熱倦怠，足厥陰傷風左關上與人迎皆弦弱而急弦者厥陰脉也。弱者風脉也。急者病變也。其證自汗惡風而倦，小腹急痛，手厥陰心包傷暑在右尺中與人迎皆

皆沉弱而緩沉者心包脉也弱者傷暑也緩者病倦也其證往來寒熱狀如瘧瘧煩渴眩暉背寒面垢此乃分布六經感傷外邪除燥熱外叙此四氣以爲宗兆若其傳變自當依六經別論所傷隨經說證對證施治或燥熱傷心肺亦當依經推明理例調治如四氣兼并六經交錯亦當隨其脈證審處別白或先或後或合或并在絡在經入表入裏四時之動脉與之應氣候以時自與脉期微妙在脉不可不察察之有紀從陰陽始始之有經從陰陽生此之謂也

五用乖違病脉

列本太上皇

蹠

察脉必以人迎氣口分内外所因者乃李診之要道也所以脉讚云閑前一分人命之主然既有三因固不可不詳而考之於理自備且如疲極筋力尽神度量飲食飢飽叫呼走氣房室勞逸及金瘡踴折虎狼毒虫鬼疰客忤畏壓溺等外非六淫內非七情內外不收必屬不內不外雖漢論曰人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食殊不知飲食入胃能助發宿蘊其所以應於氣口者正由七情鬱發因食助見本非宿食能應氣口且如宿食脉有浮大而微濶者有數而滑實者宿食不化脉則沉緊宿食成瘕脉則沉重此等名證皆曰傷胃曾何關於氣口邪其如疲極筋力其脉弦數而實筋痛則動皆傷肝也凝思則滑神耗則散皆傷心也絃誦耗氣脉濡而弱叫呼走氣脉散而急皆傷肺也房勞失精兩尺浮散男子遺精女子半產弦大而革皆傷腎也右件明文氣口何與况藏寒蛔厥脉自微浮及爲緊滑胃虛不食其脉必緩亦有微濡五飲停伏浮細而滑久畜沉積沉細而軟形虛自汗脉皆微濡揮霍變亂脉自沉伏僵仆墜下脉則細滑踴折傷損瘀血在內疝瘕癥癖五內作痛脉皆弦緊中寒癥結脉耗不耗

傷胃
傷脾
耗不耗

交結別李作

則遲濶五積六聚飲食痰氣伏留不散隧道節滯脈皆促結三消熱中尺中洪大癲狂神亂閨上洪疾氣實脈沉血實脉滑氣血相搏脉亦沉實婦人妊娠脉則和滑遁戶戶疰脉沉而不至寸或三部緊急鬼祟附着脉兩手乍大乍小乍短乍長陽邪來見脉則浮洪陰邪來見脉則沉緊鬼疰客忤三部皆滑洪大嫋嫋沉沉澤澤但與證不相附者皆五尸鬼邪遁症之所爲也如診得此等脉證雖與人迎氣口相應亦當分數推尋三因交結四句料簡所謂單內單外不內不外亦外亦不內外脉理微妙藝能難精李然後知不足教然後知困此之謂也然形於脉兆墮於數義未有不李而能者未有李而不成者李者宜留心焉又如忽見異像驚惑眩亂脉多失序急虛卒中五臟閉絕脉不往來譬如墮溺脉不可察與夫金瘡踴折頓走血氣脉亦無準李者當看外證不必拘脈

脉偶名狀

浮者按之不足舉之有餘與人迎相應則風寒在經與氣口相應則榮血虛損沉者舉之不足按之有餘與人迎相應則寒伏陰經與氣口相應則血凝腹藏遲者應動極緩按之尺牢與人迎相應則濕寒凝滯與氣口相應則虛冷沉積數者去來促急一息數至與人迎相應則風燥熱煩與氣口相應則陰虛陽盛虛者遲大而軟按之豁然與人迎相應則經絡傷暑與氣口相應則榮衛走本

實者按率有力不疾不遲與人迎相應則風寒貫經與氣口

相應則氣血壅脈。

緩者浮大而軟去來微遲與人迎相應則風熱入藏與氣口相應則怒極傷筋。

緊者動轉無常如紡單線與人迎相應則經絡傷寒與氣口相應則藏府作痛。

洪者來之至大去之且長與人迎相應則寒壅諸陽與氣口相應則氣攻百脉。

細者指下尋之來往如線與人迎相應則諸經中濕與氣口相應則五藏凝滯。

澀者往來流利有如貫珠與人迎相應則風痰潮溢與氣口相應則涎飲凝滯。

濁者參伍不調如雨沾沙與人迎相應則風濕寒痺與氣口相應則津汗血枯。

弦者端緊徑急如張弓弦與人迎相應則風走注痛與氣口相應則飲積溢疼。

弱者按之欲絕輕軟無力與人迎相應則風濕緩縱與氣口相應則筋絕痿弛。

結者往來遲緩時止更來與人迎相應則陰散陽生與氣口相應則積阻氣節。

促者往來急數時止復來與人迎相應則痰壅陽經與氣口相應則積留胃府。

芤者中空傍實如按慈葱與人迎相應則邪壅吐衄與氣口相應則榮虛妄行。

微者極細而軟似有若無與人迎相應則風暑自汗與氣口相應則微陽脫泄。

動者在閔如豆厥厥不行與人迎相應則寒疼冷痛與氣口

相應則心驚膽寒

伏者沉隱不出。着骨乃得與人迎相應。則寒濕痼閑與氣口相應。則凝思滯神。

長者往來流利。出於三閨與人迎相應。則微邪自愈。與氣口相應。則藏氣平治。

短者按舉似數。不及本部與人迎相應。則邪閉經脈。與氣口相應。則積遏藏氣。

濡者按之不見輕手乃得。與人迎相應。則寒濕散漫。與氣口相應。則飧泄緩弱。

革者沉伏實大。如按鼓皮與人迎相應。則中風着濕。與氣口相應。則半產脫精。

散者有陽無陰。按之滿指。與人迎相應。則淫邪。脫泄。與氣口相應。則精血敗耗。

代者藏絕中止。餘藏代動。動無間内外。所因得此必死。

七表病脉

浮爲在表。爲風。應人迎爲氣。應氣口爲熱。爲痛。爲嘔。

爲脹。爲痞。爲喘。爲厥。

爲內結

爲滿不食。

浮大爲鼻塞。浮緩爲不仁。

浮大長爲風眩癲疾。

浮滑疾爲宿食。

浮大而濶爲宿食。

浮短爲肺傷諸氣。

浮渭爲飲爲刺。

浮細而滑爲傷飲。

浮滑疾緊爲百合病。

浮數大便堅小便數。

浮緊爲淋。爲癃閉。

寸芤爲吐血。

微芤爲衄血。

閏芤爲大便出血。

尺芤爲下焦虛。小便出血。

滑爲吐。爲瀉。爲效。爲熱。爲伏痰。爲宿食。

爲蓄。爲瀉。爲鬼。爲血氣俱實。

滑散爲癰緩。滑數爲結熱。滑實爲胃。

和滑爲妊娠。

泄利利水作

實爲熱、爲嘔、爲痛、爲氣塞、爲喘欬、爲大便不禁。

寒列本作寒

滑而大小不拘病進必吐爲、滑而浮大小腹痛弱則陰中痛大便亦然、滑而浮大小腹痛弱則陰中痛大便亦然。

實爲熱、爲嘔、爲痛、爲氣塞、爲喘欬、爲大便不禁。

實緊爲陰不勝陽爲胃寒、爲腰痛。

弦爲寒、爲痛、爲飲、爲瘡、爲水氣、爲中虛。

爲逆

爲拘急

爲辟基

弦緊爲惡寒

爲疝

爲瘀血

弦緊爲惡寒爲疝瘕爲瘀血

弦長爲積隨左右上下

緊爲寒、爲痛

頭骨肉等

緊爲欬、爲欬

爲喘

爲滿

滑而浮大小腹痛弱則陰中痛大便亦然。

雙弦脇急痛、弦而鈎爲刺痛

弦而鈎爲刺痛

弦長爲積隨左右上下

緊爲寒、爲痛

頭骨肉等

緊爲欬、爲欬

爲喘

爲滿

滑而浮大小腹痛弱則陰中痛大便亦然。

浮緊爲肺水、緊滑爲蛇動爲宿

浮緊爲肺水

緊滑爲蛇動爲宿

緊急爲尸

緊數爲寒

洪爲脹、爲滿、爲痛

離列本作離

離爲寒、爲痛、爲飲、爲瘡、爲水氣、爲中虛。

緩列本作緩

沉爲實、爲水、爲寒、爲喘、爲癥、爲瘕。

沉弱爲寒熱、沉細爲氣、臂不能牽、沉滑爲風、爲下重。

沉緊爲下冷、沉重而絕者爲瘀血、沉重而中散、爲寒。

沉重不至寸、徘徊絕者爲道尸、沉緊爲懸飲。

沉遲爲痼冷、沉重爲傷暑發熱。

緩爲在下、爲風、爲寒、爲弱、爲癰、爲疼。

爲不仁、爲氣不足爲眩暉、緩而滑爲熱中。

緩而遲虛寒相搏食冷則咽痛。

濶爲少血、爲亡汗、爲氣不足、爲逆冷、爲下痢。

爲心痛、濶而緊爲癰、爲寒濕。

遲爲寒、爲痛、遲而濶爲癰瘕咽酸。

伏爲霍亂、爲疝瘕、爲水氣、爲溏泄、爲停痰。

爲宿食、爲諸氣上衝、爲惡膿貫肌。

痺列本作痺

爲心痛、爲氣不足、爲逆冷、爲下痢。

爲不仁、爲氣不足爲眩暉、緩而滑爲熱中。

緩而遲虛寒相搏食冷則咽痛。

濶爲少血、爲亡汗、爲氣不足、爲逆冷、爲下痢。

爲心痛、濶而緊爲癰、爲寒濕。

遲爲寒、爲痛、遲而濶爲癰瘕咽酸。

伏爲霍亂、爲疝瘕、爲水氣、爲溏泄、爲停痰。

爲宿食、爲諸氣上衝、爲惡膿貫肌。

宿食

爲宿食、爲諸氣上衝、爲惡膿貫肌。

濡爲虛、爲殫、爲自汗、爲氣弱、爲下重。

濡而弱爲內熱、外冷自汗、爲小便難。

弱而虛、爲風熱、爲自汗。

九道病脉

細爲氣血俱虛、爲病在內、爲積、爲傷濕、爲後泄。

爲寒、爲刺

爲勞、爲脾

爲憂傷、過

爲虛、脾

細而緊爲癥瘕積聚。

爲熱、爲刺

細而滑爲僵仆、爲筋

爲發熱、爲嘔吐。

數爲熱、爲刺

爲虛、爲脾

爲吐、爲肺

爲痛、爲肝

爲煩渴、爲心

動爲痛、爲刺

爲虛、爲心

爲驚、爲肺

爲攣、爲脾

爲泄、爲肝

虛爲寒、爲刺

爲虛、爲心

爲寒、爲脾

爲食不消化、爲心

爲傷暑。

促、經並無文

釋曰其促有五、一曰氣、二曰血、三曰飲、四曰食、五曰痰。但藏熱則脈數、以氣血痰飲留滯不行則止促止促非惡脉也。

結爲痰、爲飲、爲血、爲積、爲氣。

釋曰氣寒脉緩則爲結、數則爲促、雖緩數不同、結亦當如促、脉分別可也。

散、經無文

釋曰六府氣絕於外、則手足寒上氣五藏氣絕於內、則下利不禁、甚者不仁、其脉皆散、散則不聚、病亦危矣。

革爲滿、爲急、爲虛寒相搏、婦人半產漏下。

釋曰革者革也、固結不移之狀、三部應之、皆危脉也、代者一藏絕、他藏代至。

釋曰代真死脉、不分三部、隨應皆是。

如前所例、皆本聖經、李者當熟讀、令心開眼明、識取脉狀、然後交絡互織、所謂六經流注、五藏相傳、各以部位

推尋便了然不昧其如隨病分門諸脉證狀尤當參對審詳之如是精誠方可爲醫者之萬分不爾則倚傍聖教欺罔賢良爲含靈之巨賊幸宜勉旃

三因極一病證方論卷之一

三因極一病證方論卷之二

太醫習業

國家以文武醫入官蓋爲養民設未有不自學古而得之者。學古之道雖別而同爲儒必讀五經三史諸子百家方稱學。若醫者之經素問靈樞是也。史書即諸家本草是也。諸子難經甲乙太素中藏是也。百家鬼遺龍樹金鍼刺要銅人明堂幼幼新書產科保慶等是也。儒者不讀五經何以明道德性命仁義禮樂醫不讀靈素何以知陰陽運變德化政令儒不讀諸史何以知人材賢否得失興亡醫不讀本草何以知名德性味養生延年儒不讀諸子何以知崇正衛教學識醇疵醫不讀難素何以知神聖工巧妙理奧義儒不讀百家何以知律曆制度休咎吉凶醫不讀雜科何以知脈穴骨空竒病異證然雖如是猶未爲博况經史之外又有文海類集如漢之班馬唐之韓柳及我大宋文物最盛難以槩舉醫文漢亦有張仲景華佗唐則有孫思邈王冰等動輒千百卷其如本朝太平聖惠乘閑集效神功萬全備見崇文名醫別錄豈特汗牛充棟而已哉使學者一覽無遺博則博矣儻未能反約則何以適從予今所述乃收拾諸經筋髓其亦反約之道也。讀醫方者當推上聖養民設教爲意庶不負於先覺也。

五科凡例

凡學醫必識五科七事五科者脉病證治及其所因七事者所因復分爲三故因脉以識病因病以辨證隨證以施治則能事半矣故經曰有是脉而無是診者非也究明三因內外不濫參同脉證盡善盡美

凡學脉須先識七表八裏九道名脉證狀了然分別然後以關前一分應動相類分別内外及不内外又須知二十四脉

以四脉爲宗所謂浮沉遲數分風寒暑濕虛實冷熱交結諸脉隨部說證不亦約乎、

凡審病先須識名所謂中傷寒暑風濕瘟疫時氣皆失所因藏府虛實五勞六極皆內所因其如金瘡踐折虎狼毒虫涉不內外更有三因備具各有其名所謂名不正則言不順言不順則事不成學不可不備、

凡學審證須知外病自經絡入隨六經所出井營輸源經合各有穴道起沒流傳不可不別內病自五藏鬱發證候各有部分溢出諸脉各有去處所謂上竟上頭項胷喉中事也下竟下腹肚腰足中事也、

凡用藥須熟讀本草廣看方書雷公炮炙隨方過製汗下補吐輕重滋滑燥潤等性量病淺深飲服多寡五德五味七情八反升合分兩朝代不同一一備學將欲對治須識前後故經曰先去新病病當在後、

凡治病先須識因不知其因病源無目其因有三曰內曰外曰不內外外則七情內則六淫不內不外乃背經常金匱之言實爲要道巢氏病源具列一千八百餘件蓋爲示病名也以此三條病源都尽不亦反約乎、

凡學醫既明五科每科須識其要脈有浮沉遲數病有風勞氣冷證有虛實寒熱治有汗下補吐若於三因推明外曰寒熱風濕內曰喜怒憂思不內外曰勞逸作強各有證候詳而推之若綱在綱有條不紊、

凡看古方類例最是朝代沿革升合分兩差殊若數味皆用分兩不足較也第中間有用升合枚數大段不同升斗秤尺本自積黍黍自不可見度量衡卒亦難明今以錢譜推測粗知梗槩、

自作似

凡度者分寸尺丈引本以一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引觀今之尺數等不同如周尺長八尺京尺長一尺六寸淮尺長一尺二寸樂尺長一尺二寸五分並以小尺爲率小尺既自三微起却自可準唐武德年鑄開元錢八分當十二錢半得一尺排錢比之十一箇已及一尺又不知唐用何尺顧漢唐龠量並用尺寸分布尺寸如是不齊將何憑據博古君子必有說矣

凡量者龠合升斗斛本以黃鍾龠容十二銖合龠爲合重二十四銖今以錢準則六銖錢肆箇比開元錢叅箇重升斗斛皆壘而成數漢唐同用至宋紹興升容千二百銖則古丈六銖錢二百箇開元二百二十箇以紹興一升得漢五升其餘私用不足計也

列本之古文六銖錢二箇合開元一百五十五个以銀量

凡衡者銖兩斤鈞石亦以黃鍾龠所容重十二銖兩之爲兩

二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石每兩則古丈六銖錢四箇開元錢三箇至宋廣秤以開元錢十箇爲兩今之三兩得漢唐十兩明矣千金本草皆以古三兩爲今一兩以古三升爲今一升諸藥類例尤爲難辨且如半夏一升準五兩不知用何升何兩此修合制度之要務不可不知漢銅錢質如周錢文曰半兩重如其文孝文五年錢益多而輕乃更鑄四銖其文爲半兩雜以鉛鐵錫非般雜爲巧則不得贏而虧或盜鑄錢質取鎔有司言錢輕重請郡國鑄五十銖錢周郭有質令不得磬取鎔則知漢以二半兩錢爲兩重十銖明矣漢唐例以二十四銖爲一兩抑未知修史人改作唐例亦不可知觀錢譜漢無六銖錢至唐方有今以五銖錢十六个正得開元錢十个重又以六銖錢十二个正得開元錢九个重則知開元錢每个以重八銖唐武德四年鑄開元

鎔

列本作鎔下錄目

重

列本作鎔

列本

重

通寶徑捌分重貳銖肆繁積十錢爲兩似難攷據明食貨者必有說焉。別本作三銖四分或謂四分八銖或謂以銅金鑄成四分八銖也明有貨幣必有其舊考按藥書漢方湯液大齊三十餘兩小齊十有餘兩用水陸升煎或七升多煎取貳升參升並分參服若以古龠量水柴升煎今之參拾兩未淹得過况散末藥只服方寸刀圭匕圓子如梧桐子大極至參拾粒湯液豈得如此懸絕又如風引湯一劑計伍拾伍兩每兩只用參指撮未撮水參升煮三沸去滓溫服壹升觀其煮製每只參指撮也今以臆說漢方當用半兩錢貳枚爲一兩且以木附湯方較若用漢兩計一百八十銖得開元錢二十二个半重若分三服已是今之七錢半重一服若以唐方準計三百三十六銖得開元錢四十二个重每服計今之十四錢重大略可知若以開元錢準得一百單五个重分三服每服計三十五錢重此猶是小齊况有大齊名件兩數之多者未易槩牽留心此道幸少詳焉。

凡古書所註不出脉病證治四科而撰述家有不知此多致顛晦文義重複要當以四字類明之凶字者即名脉性用也如脉浮則爲名。辛有餘按不足爲脉爲風爲虛曰性可補可汗曰用。如病太陽傷風爲名。感已嗆嗆爲脉惡風自汗爲性傳變經絡爲用。如證太陽風證爲名。頭項痺腰脚痛爲脉不與諸經濫爲性。候其進退爲用。如治藥桂則爲名。出處形色爲脉。德味備缺爲性。汗下補吐爲用。以此推之。讀脉經看病源推方證節本草皆用此法無餘蘊矣。

紀用備論

夫陰陽運五氣行乎天地之間則神明爲之紀故有德化政令。變眚之異物類應五行孕於八方之内則生靈賴其資故

天之由也是以政理觀化藥集商量服餌不藥不具五味五氣而外服之雖且獲勝久必暴天此之謂也近世庸俗爲治使人單服附子爲害滋多可不謹乎

藏府配天地論

韓子曰形而上者謂之天形而下者謂之地介於其兩間者謂之人人受天地之中以生莫不稟二氣以成形是以六氣緯空五行麗地人則默而象之故足厥陰肝居於巳手厥陰右腎居於亥巳亥爲天地之門戶故風木化爲足少陰腎居於子手少陰心居於午子午得天地之正中故君火位焉足太陰脾居於未手太陰肺居於丑丑未爲歸藏之標本故濕土守焉足少陽膽居於寅手少陽三焦居於申寅申擢生化之始終故相火麗焉足陽明胃居於酉手陽明大腸居於卯卯酉爲日月之道路故燥金行焉足太陽膀胱居於辰手太

陽小腸居於戌辰戌爲七政之既置故壅水注焉此三才應奉二氣相須不利之說如指諸掌至於五行六氣第相資生亦莫不有自然之序如厥陰風木生少陰君火君火生太陰濕土濕土生少陽相火相火生陽明燥金燥金生太陽寒水順天道而右旋所謂運行也或問若火生土土復能生相火復生金其義何在此生成之道也相火既已發焰盡翬灰滅非土不成未見虛空能聚火金在鑛非火不能煅出所以河圖火七居西室金九居南室蓋互顯其成能也若以一性而推之無所不偪故木焚則爲火絞則爲水石擊則爲火鎔則爲水洲潭之內江河競注大海之中火光常起此皆性之本有也又何疑土中火火中金夫木火土金水此乃常度人皆知之至於風暑濕燥寒謂之揆度鮮有能明其狀者故以木比風以火比暑以土比濕以金比燥以水比寒仍以上下

二氣而配手足三陰三陽則謂之奇度又况五行各各不同
有正氣有太過有不及天地氣化既然人之藏府亦然感而
爲病或外邪或本氣或稟賦必當推類隨二度而調之非究
心明道之士孰能與此

三因論

二四本情
經引本情

夫人稟天地陰陽而生者蓋天有六氣人以三陰三陽而上
奉之地有五行人以五藏五府而下應之於是資生皮肉筋
骨精髓血脉四肢九竅毛髮齒牙唇舌總而成體外則氣血
循環流注經絡喜傷六淫內則精神魂魄志意意思喜傷七情
六淫者寒暑燥濕風熱是七情者喜怒憂思悲恐驚若將護
得宜怡然安泰役冒非理百疴生焉病診既成須尋所自故
前哲示教謂之病源經不云乎治之極于二者因得之閉戶
塞牖繫之病者數問其經以從其意是欲知致病之本也然

六淫天之常氣冒之則先自經絡流入內合於腑臟爲外所
因七情人之常性動之則先自藏府鬱發外形於肢體爲內
所因其如飲食飢飽呼呼傷氣尽神疲量瘦極筋力陰陽違
逆乃至虎狼毒虫金瘡踒折疰忤附着長厭漏等有背常理
爲不内外因金匱有言半般疢難不越三條以此詳之病源
都尽如欲救療就中尋其類例別其三因或内外兼并淫情
交錯推其深淺斷以所因爲病源然後配合諸證隨因施治
藥石鍼艾無施不可

外所因論

夫六淫者寒暑燥濕風熱是也以暑熱一氣燥濕同源故
上經收而爲四即冬傷寒春溫病春傷風夏飧泄夏傷暑秋稼
瘡秋傷濕冬咳嗽此乃因四時而序者若其觸冒則四氣皆
能交結以病人且如溫病憎寒發熱不特拘傷寒也冒風暑

嘶

美州本作失

濕皆有是證。但風散氣故有汙暑消氣故倦怠濕溢血故重著雖折傷諸證不同。經絡傳變咸尔不可不知。飧泄亦然。經曰：寒甚爲腸澼。又熱濕久客腸胃滑而下利亦不止於傷風。瘧瘧諸證亦以寒暑風濕互絡而爲病。因初不偏勝於暑也。咳論以微寒爲咳。熱在上焦咳爲肺痿。厲風所吹声嘶發咳。豈獨拘於濕也。以是觀之則知四氣本乎六化。六化本乎一氣以運变而分陰陽。反則爲六淫。故經曰：陰爲之主。陽当之正逆之則爲病。乃亂生化之常矣。常則天地四塞矣。治之必求其本。當隨交絡互織而推之所謂風寒風溫風濕寒濕。溫五者爲并風。濕寒風濕溫二者爲合。兼前四單共十一變。儻有所傷當如是而推之。又兼三陽經絡亦有并合能所簡辨甄別。脉證毫釐不濫乃可論治。非通明淫化邪正之精微。其孰能专於此。

叙中風論

梨本作周
科梨本作

夫風爲天地浩蕩之氣。正順則能生長万物。偏邪則傷害品類人或中邪風。鮮有不致斃者。故入藏則難愈。如其經絡空虛而中傷者爲半身不遂。手脚癱瘓。涎潮昏塞。口眼喎邪。肌膚不仁。痺痺牽僻。隨其藏氣所爲不同。或左或右。邪氣反緩。正氣反急。正氣引科喝僻。不遂蓋風性緊暴善行數變。其中人也卒其眩人也暈激人涎浮昏人神亂故推爲百病。長聖人先此以示教。太醫編集所以首論中風也。然四氣皆能中人。在證亦有緩縱牽急。搖搦痺痺奄忽不知人者。不可不以脉別。故論曰：寒熱諸症所有證候。皆如風狀須得脉別。可也。要知脉淨則爲風。緊則爲寒。細則爲濕。數則爲熱。外證走注自汗則爲風。痞滿無汗則爲寒。緩弱熱煩則爲暑。停蓄腫滿則爲濕。隨其并合尤宜歷辨。唯詳其所因合以脉診。在絡在

梨本作周
科梨本作

經入腑入臟依而調之乃可爲治

五臟中風證

肝中風者人迎并左關上脉浮而弦在天爲風在地爲木在人藏爲肝肝虛喜中風爲類相從故脉應在左關肝風之狀多汗惡風色微蒼頭目矇左脇偏痛嗜甘如阻婦狀筋急牽脾不伸診在目其色青

心中風者人迎與左寸口脉洪而浮在天爲熱在地爲火在人臟爲心心虛因中邪風乃子母相因故脉應在左寸口心風之狀多汗惡風色微赤翕々發熱瘡不能言飲欲食食則嘔診在舌其色焦赤

脾中風者人迎與右關上脉浮而微遲在天爲濕在地爲土在人臟爲脾虛因中風邪爲勝尅故脉應在右關上脾風之狀多汗惡風薄黃四肢急墮皮肉瞤動發熱短氣不欲飲食嗜卧如醉人診在唇其色黃

肺中風者人迎與右寸口脉浮濶而短在天爲燥在地爲金在人臟爲肺肺虛因中邪風爲乘尅故脉應在右寸口肺風之狀多汗惡風色皓然白口燥而喘逆氣肩息身重背痛面脹腫脹暮甚診在鼻其色白

腎中風者人迎與左尺中脉浮而滑在天爲寒在地爲水在人臟爲腎虛因中邪風爲母子相感故脉應在左尺中腎風之狀多汗惡風色如始面㿠然浮腫腰脊痛引小腹隱曲不利昏寢汗愈多志意惶惑診在耳其色黑

胃中風者人迎與兩關上脉並浮而大六府无中風論唯胃有者嘗累臟海納五味以滋養五臟虛而中邪風故其狀額多汗食飲不下隔塞不通腹蓋痛失衣則腹脹張口肩息心下淡淡食塞則泄

中風治法

生薑生附湯 治卒中風涎潮昏塞不知人并主瘀冷癥氣脅滿嘔沫頭痛飲食不消

大附子

壹枚生去皮
切作八片

右以水二椀生薑壹兩切同煎至一大盞去滓溫冷服一法加沉香壹錢 一法加辰砂末少匕 凡中風无問冷熱虛實皆可服蓋此藥能正氣消痰散風神效

白散湯 治肝腎虛爲風所襲卒中涎潮昏塞不語嘔吐痰沫頭目眩暉上竇下虛真陽耗竭兼治陰證傷寒六脉沉伏昏不知人又治霍亂吐瀉飲食不進及小便淋澀不通眼赤口瘡咽喉冷痛

大附子

生去皮
附子

桂府滑石各半

圓白半夏

湯洗二十
一枚半分

右爲末每服貳錢水貳盞薑七片蜜半匙煎七分空腹

冷服霍亂加藿香小便不利加木通灯心茅根煎此藥就有差互亦无所苦

別本元集

紅龍散 治中風開闔竅

朱砂

別研

五靈脂

各兩半

扶神

去心

草薢

各壹錢

全蝎

半兩

腦麝

各壹錢

右爲末每服貳錢酒調服先服此次服神異溫風丹

神異溫風丹

治中風一切諸疾

麻黃

五兩不去節
擇爭生用

人參

乾薑

炮各

茯神

附子

炮去

白朮

甘草

炙各

兩半

乳香

別研

全蝎

炒各

右將麻黃細剉用水五升熬去半入蜜六兩又熬成膏入前件藥末和貯如彈子大每服一貯溫酒下日三服

芎風湯

治風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂肝風發

全

則面青心悶吐逆嘔沫脣滿頭眩不聞人声偏枯筋急曲
踰而卧心風發則面赤翕然而熱悲傷嗔怒目張呼喚脾
風發則面黃身躰不仁不能行步飲食失味夢寐顛倒与
亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎
風發則面黑手足不隨腰痛難以俛仰冷痺骨疼諸有此
證令人心驚恚意不定恍惚多忘服此湯安心定志聰耳
明目通臟腑諸風疾悉主之

白鮮皮

白朮

芍藥

桂心

芎芻

當歸

杏仁

防風

甘草

炙各
式兩

獨活

麻黃

桂心

卷之二十一

本草

小續命湯 治卒中風欲死身躰緩急口目不正舌強不能語
奄忽神情悶死諸風服之皆驗不令人虛

桂心

甘草

白芍藥

芎芻

杏仁

去皮大炒
附子

防已

崔氏外人參
去皮附子

防風

兩半

右爲剉散每服四大錢水一盞半姜七片棗二个煎七
分去滓不以時服取汗隨人虛實與所中輕重有人腳
弱服此六七劑得差有風瘡家天陰節變轉合服之可
以防增一云恍惚加茯神遠志骨節疼有熱去附子芍
藥古今錄驗有白朮无杏仁救急无芎芻杏仁止十味
延年无防風一云遺失便利產後失血并老人小兒用
及用麻黃三兩入參桂枝白朮各二兩无防風附子生
姜有當歸一兩

獨活湯

治風癩不能言四肢不收手足掣曳

列本獨活

用四月廿二日

白芍藥

括蔞根

獨活

桂心各半兩

甘草各半兩

右爲剉散每服四錢匕薑五片水二盞煎六分去滓入生葛汁一合和勻服

黃湯

治中風手足拘挛百節疼痛煩熱心亂惡寒不欲飲食兼治賊風偏風猥退風半身不遂失瘡不言

麻黃

去節根半兩

黃芪半兩

黃芩三分

獨活壹兩

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分去滓不以時服取汗爲效心熱加大黃半兩脹滿加枳實一分氣逆加入參三分心悸加牡蠣三分渴加括蔞根塞加附子一枚炮熟入列本有細辛半兩埋竈火薦

小竹瀝湯

治中風涎潮譫語昏塞四肢緩縱不收

秦艽

去苗土頭半兩

防風

附子

炮去皮三分

獨活

剉各半兩

右水四盞煎二盞入生地黃汁竹瀝各半盞煎三五沸去滓分四服不拘時熱服病去以它藥扶持未知再作

燒竹瀝湯

新竹截尺許長用兩磚對立相去八寸置竹在上每截破作二片仰安磚上急着火磚外兩頭各置碗以盛瀝盡以絹纏盞清夏秋須沉冷水中防瀝酸大熱有風人亦可單服冷暖隨人勿過度荆瀝亦然

獨活散

治男子婦人氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪使上氣不守正位致頭搖手足顛掉漸成目昏

獨活

地骨皮

細辛

三分

芎藭

菊花

防風

去叉子甘草炙

右等分爲末每服三錢水煎半煎一錢去滓取六分清計入少竹瀝再煎食後溫日兩服又法不用獨活

有病覆花

朱圓治中風涎潮咽膈作声目瞑不開口眼渴斜手足不隨但是一切風疾並宜服之

雄黃別研

辰砂

龍骨別用

麝香

各壹錢

烏蛇

酒浸後去皮骨

白僵蚕上大絲備

天南星生

白附子生各半兩

右爲末陳蜜丸梧桐子大如中風涎潮牙關不開先用大蒜一瓣搗爛塗在兩牙關外腮上用豆淋酒化一丸揩牙斷上即開續用薄荷酒化下一丸如丈夫風氣婦人血氣牙關緊急只用豆淋酒化一丸揩牙如頭風目眩暗風眼黑故倒者急嚼一二丸薄荷湯下引本處薄荷酒下

仁壽圓

治肝腎氣虛風冷所中筋脈瞼動口眼喎邪常服補

肝元行榮衛養氣血

附子

炮熟去皮

桂心

白茯苓

山茱萸

五味子

杜仲

去皮姜制炒熟去心

續斷

枸杞子

熟地黃

洗去心

巴戟

去心

兔絲子

酒浸防風各半兩

牛膝

酒浸

右爲末蜜丸梧子大每三十五九溫酒鹽湯食前任下

鐵彈圓治男子婦人一切風疾无間遠近癱瘓中風口眼喝斜言語蹇澁手足痺拽難以稱牽或發搐攢或如虫行或失音不語牙關緊急脚不能行身軀須麻百節疼痛精神不爽頭虛煩悶夜卧不安多涎脣膈不利口乾眼澁多困少力如破傷風身如角弓口噤不開作汗如油及洗頭風腦重眉緊骨痛卒中不語迷悶兼白癲風遍身癰癧鼻多清涕耳作蟬鳴小兒驚風天吊搖搦婦人血風手足煩熱夜多虛汗頭旋倒地並皆治之

白附子

沒藥別研

虎脰骨

酒浸全蝎

烏頭

炮去皮尖

麻黃

不去節

自然銅

燒存性醋浸一斤各壹兩

白花蛇

酒浸半兩

辰砂

別研

五靈脂

酒浸壹分

木鱉子

二十個去皮別研不入羅

腦麝

酒浸壹分

乳香

炒木提研一兩

右爲末蜜圓彈子大用无灰酒一升浸一貯分二十服
傷風鼻塞分三十服空心臨卧各一服大風五貯可安
活絡通經散
治半身不遂口眼喎斜癱瘓諸風通活經絡宣
導凝滯常服壯筋骨助血脉起偏廢之疾其效如神
川烏頭
川烏頭(去皮尖一兩炮去皮尖一兩生不去了皮)草烏(去皮尖一兩生不去了皮)木鱉子(三兩三
班貓
班貓(酒煮去頭足井水浸熟研末并香白熟研末并
好墨
好墨(火煅)白膠香(名兩別研)當歸(兩半)
白膠香
白膠香(名兩別研)當歸(兩半)五靈脂(三分)
右爲末
右爲末將木鱉子末醋研爲膏和黑豆末一片好醋拌
一兩作十九以墨爲衣空心食前溫酒盃嚼下一丸
烏藥順氣散
治風氣不順手脚偏枯流注經絡并濕毒進襲
腿膝牽痙筋骨疼痛

烏藥(去木) 麻黃(湯去節) 橘皮(略去) 甘草(炙)
川芎 枳殼(炒去殼) 桔梗
白芷(各壹兩) 白僵蚕(炒去殼)
右爲末
右爲末每服二錢匕水一錢薑三片薄荷七葉煎七分
舒筋保安散
治左癱右瘓筋脈拘挛身肢不遂脚腿少力乾
濕脚氣及濕帶經絡久不能去宣導諸氣
乾木瓜(五兩) 草薢(炒去) 松節
續斷 白僵蚕(炒去) 松節
烏藥(去木) 天麻
歲靈仙 黃芪
川當歸 防風(去叉) 虎骨(略去) 翅(每丸重一錢)
右用
右用无灰酒一斗浸上件藥二七日緊封扎日數足取
藥焙乾搗爲細末每服二錢用浸藥酒半錢調下喫酒
尽用米湯調下又方添金毛狗脊一兩却將乳香白膠
香各一兩同研入乾藥末內

青石里
江都縣
味通之書

松節散治風寒冷濕搏於筋骨使筋挛攣痛行步艱難但是諸筋挛縮疼痛悉主之

淡神中心木

剉如米
壹兩

乳香

壹錢研

右入銀石器內炒留兩分性爲末每服貳錢木瓜酒下芎桂散治中風四肢疼痛及兩足俱軟行復不便

川烏頭

剉切作片水浸一宿不洗日乾透妙微赤爲度乾了秤

川芎

兩半

桂心

壹兩

甘草

炙

乾姜

炮各一分

右爲末每服貳錢溫鹽酒調下日參服

趁風膏治中風手足偏廢不舉

川山甲

生用右脚用左足

紅海蛤

如棋者

川烏頭

大者生用各兩

右爲末每用半兩擣烈葱白汁和成厚餅約徑壹寸半貼在所患處邊腳中心用舊帛裹緊縛定於無風密室中椅子上坐椅前用湯壹盆將貼藥脚於湯內浸仍用人扶病人恐汗出不能支持候汗出即急去了藥汗欲出身麻木得汗周遍爲妙切宜避風自然手足可痊如病未尽除候半月二十日以後再依此法用一次自除根本仍服治風補理藥忌口遠慾以自養

附子酒治中風風冷痰癖脹滿諸癇

大附子

切去皮脐四片

右用醇酒一升春浸五日夏三日秋冬七日每服一合

日二三服以痺住爲効未知再作

小黃芪酒大治風虛痰癖四肢偏枯兩脚弱手不能上頭或小腹縮痛腸下牽急心下有伏水脇下有積飲夜夢悲愁不樂恍惚善忘此由風虛五藏受邪所致或久坐腰痛耳聾聾起眼眩頭重或脊髓流腫疼痛飲食惡冷滯_{二惡寒}胷中痰滿心下寒疝及婦人產後餘疾風虛積冷不除

君方正言叔

江右乃而善

且

梨

丸

黃芪

附子

去皮

川椒

去目并桂心

秦艽

牛膝

防風

去叉者去義

烏頭

用山藥方

白术

川芎

獨活

細辛

去苗

甘草

各二兩

大黃

葛根

山茱萸

乾姜

各二兩

當歸

二兩半

右爲剉散少壯人無熬棟虛老人微熬之以絹袋盛用清酒或斗漬之春夏五日秋冬七日可先服食一合不知至四五回日三服此藥攻癰尤佳亦不令人吐悶小熱宜冷飲食也大虛加蕤荳二兩下利加女萎三兩多忘加石斛菖蒲紫石英各二兩心下多水加伏苓人參各二兩山藥三兩酒尽可更以酒二斗重漬滓服之不可曝滌搗下筛酒服方寸匕不知稍增之服一劑得力令人耐寒冷補虛治諸風冷神妙

竇朝議經進仙酒方治大風及偏風一切風疾延年益壽

牛蒡根

牛膝

各二兩

秦艽

鼠粘子

各二兩

枸杞子

炒一升

蒼朮

蒸爛

防風

蚕沙

各二兩

大麻子

炒一升

桔梗

羌活

各二兩

右爲剉散无灰酒二斗淨瓷器內浸密封七日開二時不得對瓶口日進三服每服一大錢溫服常令面有酒色甚者不過一斗忌麪食并魚肉動風物

李裕方醫案卷之三

科簡類例

且人之冒風也輕則爲傷重則爲中蓋風散氣動於陽腠理開故自汗而惡風其色診皆隨藏氣而言六府無論唯胃中有中者蓋飲食所致故孫真人曰新食竟取風爲胃風瘧論亦然然六府經絡邪既能中豈不能中諸府也雖曰轉輸在大小腸則有膩脹在胞則有轉戾在膽則有攝縮但文缺不論

或謂竟中諸藏故不論諸府此亦一說故仍存之諸方論中所謂左瘡右瘻者蓋邪氣中人邪氣反緩正氣即急正氣引邪咽僻不隨入風懿者以心肺間既不能言但噫三作嘔蓋肺氣入心則能言邪中心肺逆朝逼塞故使然也四肢緩緩爲風痱者以風散涎注於閏節氣不能行故使四肢不遂也舌強不能言者以風入心脾經心之別脈係於舌本脾之脉緒胃挾咽連舌本散舌下風涎入其經絡故舌不轉而不能言也四肢拘挾者以中風冷邪氣入於肝臟使諸筋弛張緩而不收也故經云寒則挾急熱則弛張風顛者以風入於肝藏經絡上氣不守正位故使頭招搖而手足顛掉也風瘡者以風冷之氣客於中帶而不能發故使口噤不能言也與前所謂涎塞心肺同候此以口噤爲差耳猥退風者半身不遂失音不語臨事不前亦偏中於心肺經所致也諸證類例可推而知不內外因中風凡例

凡因不內不外而致風中者亦各從其類也如新沐中風名曰首風飲酒中風名曰漏風又曰酒風入房中風名曰內風又曰勞風治之各有方

醫學 治因沐頭中風多汗惡風當先風一日而病甚頭痛不可以出至日則少愈名曰首風

大附子

大附子

葛等分

右二味爲散沫了以方寸匕摩夾上令藥力行

醫學 治因醉中風惡風多汗少氣口乾善渴近衣則身熱如火臨食則汙流如浴骨節懈惰不欲自勞名曰漏風

澤鴻

白朮

麋術

半兩

右爲末每服二錢酒飲後調下食前服

附子湯治房室竟中風惡風多汗汙出沾衣口乾上齶不能勞事身體尺痺名曰內風

附子生去皮研人參各半兩茴香砂

山藥各一分甘草

乾姜

茯苓

右爲剉散每服四大錢水二盞姜三片鹽少許煎至七分去滓食前服

叙中寒論

夫寒者乃天地殺厉之氣在天爲寒在地爲水在人藏爲腎故寒喜中腎之中之多使牽急疼痛皆不知人挾風則眩暈兼濕則腫疼治之唯宜溫劑不可吐下皆通也然寒性重喜歸腎五藏皆能中之若中於經絡之表則易散入裏則不消與傷寒暎證无異但輕重不同其有本藏即中寒者經論凡載不可不辨明也詳論在傷寒門

五藏中寒證

肝中寒者人迎与左關上脉緊而弦肝虛中寒乃母子相因弦多則吉但緊不弦舌卷裹縮爲不利故使本部脉緊如勁繩肝中寒之狀其人酒三惡寒翕二發熱薰然而亦熱二如有汗胷中煩熱脇下掣急足不得伸
心中寒者人迎与左寸口脉緊而洪心虛中寒賊邪相尅脉應本部滑潤則吉但緊苦乾焦爲不利心中寒之狀其人如噦韭薹狀劇則心痛掣背二痛掣心猶如蠱注惡寒四肢厥自吐少間頓時復發乍作不已昏塞不知人
脾中寒者人迎与右關上脉緊而沉細脾虛中寒三邪乘克脉應本部長則吉沉緊痕揭爲不利脾中寒之狀心腹脹脹四肢牽急愛噫不通藏氣不傳或祕或泄
肺中寒者人迎与右寸口脉緊而濶肺虛中寒母子相感脉

應本部浮者爲吉但緊而濶鼻乾燥爲不利肺中寒之狀喜吐濶逆氣短不能挾息迺二而寒吸二而咳

腎中寒者人迎与左尺中脉沉緊而滑腎虛中寒二喜中腎以類相從脉應本部沉滑者吉緊濶目輪黑目睛昧爲不利腎中寒之狀色黑氣弱吸二少氣且聲腰痛膝下墳拘挛而疼昏不知人餘創見傷寒門

中寒治法

附子理陽 治五臟中寒口噤四肢強直失音不語昔有武士守邊大雪出帳外觀瞻忽然暈倒時林繼祚隨行醫官確以此藥兩劑遂醒

大附子炮去皮入參

乾姜炮

甘草炙

白朮各分

右爲散每服四大錢水一盞半煎七分去滓不以時服口噤則煎開灌之

乾姜炮去皮 治中寒卒然暈倒或吐逆涎沫狀如暗風手腳牽搐口噤四肢厥冷或復燥熱

乾姜炮去皮

附子炮去皮

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分去滓食前服入肝加木瓜入肺加桑白皮入脾加术入心加茯苓隨證加

中暑論

中暑其暎頭而陰虛微遲似就夫暑在天爲熱在地爲火在人藏爲心故暑喜歸心中之使人嗜悶昏不知人入肝則眩暎頭揮入脾則昏睡不覺入肺則喘滿擾鬱入腎則消渴利小便凡中暎死治之切不得用冷唯宜溫養得冷則死道塗无湯即以熱土熨胸中仍使更羸先可見矣若發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚下之則淋甚治之不可不謹也然傷暑中暎其實一病但輕重不同新校正要略者乃云傷寒

家別有暑病非也詳論治法見傷暑門

中暑治法

大黃根圓治中暑眩暉昏不知人或身熱惡寒頭痛狀如傷寒或吐來寒熱煩躁渴甚嘔吐泄瀉常服去暑毒分利雖

硫黃

消石略

雄黃通明

滑石

白礬

各半
寒食麪四兩

右為末調水為丸如梧子大每服五丸至七丸漸加至二十丸新水下昏塞不知人則以水化開灌之中暑忌得冷此藥却似冷水下之乃熱因寒用寒者釋之

中暑尾例

中暑陽熱急疾在陰涼處切不可與冷當以布巾衣物等蘸熱湯藥擦中及氣海續以湯淋布上令徹膝腹暖即漸惺如倉卒无湯处搘道上熱去於膝以多為佳冷即易古法道塗无湯即搘熱土於膝上仍撥開作窩子令人更弱於其中以代湯續與解暑毒藥如白虎竹葉石膏湯凡瘡中暑急嚼生姜一大塊以水送下如已迷亂悶嚼大蒜一大瓣以水送下如不能嚼即用水研灌之立醒路中倉卒无水渴甚急嚼生葱二寸許津同煎可搘飲水二升

中濕論

中溫者脉沉而細微緩以溫溢入肌浮脈則沉細夫濕者在天為雨在地為土在人藏為脾故溫喜歸脾虛喜中濕故曰溫流關節中之多使人腹脹四肢關節疼痛而煩火則浮腫喘滿昏不知人挾風則眩暉呕噦兼寒則寒拳掣痛治之不得發發汗及灼艾泄瀉惟利小便為生故論六治溫不制小便非其治也大汗大下皆死詳論治法見傷暑門

中濕治法

資生遺治中濕口噤不知人

白朮半兩

右酒二盞煎一盞顧服不能飲酒以水代之日二夜一

四氣兼中證論

風寒暑濕本乎一氣性中相同用中相皆風寒既能中五藏暑濕具可不論方論有肝著其人常欲蹈其胷上未苦時但欲飲熱體著四肢浮腫身重如石不能自反身腎著身重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利食飲如故心肺不見明文恐文簡脫難以臆補或云濕唯中足三陰故不及心肺然五藏有本病片舉尅勝尅相感相因而得之假如風中肝爲李病中脾爲勝尅中肺爲乘尅中心爲相因中腎爲相感則无所不通謂濕不及心肺未爲確論故缺以俟明哲暑病亦然况六淫均被四氣皆能中人中風則有汗脉必浮弦惡風走注中寒則无汗脉必緊數惡寒疼痛中暑則昏憊面垢脉必虛緩倦怠中湿則重著脉必遲緩四肢歷節疼痛皆能交絡互織所謂風寒風溫風溫寒溫溫等當以人迎脉譯別之令无差誤更有七情內忤亦能涎潮昏寒手足婢曳一如中風不可例作六淫氣治其至天枉及素畜痰涎隨氣上吸使人眩暈昏不知人半身不遂口眼喝邪手足婢曳者故有中氣中痰之別猶當詳辨毋使混濛除外所因方見於此後內所因各見本門

四氣兼中治法

附子湯治五臟中風寒手足不仁口面喝斜晝暉失音眼目瞤動牙車緊急不得轉動

附子皮膚桂心細辛防風去火各

入參

乾姜地黃各

右爲剉散每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎七分去滓食前服或爲末酒調一錢服

防風湯治中風挾暑卒然暎倒面青黑四肢緩弱喜呻吟口渴邪四肢不仁好笑

防風去叉

澤鴻

升火

杏仁

處妙去皮尖

乾姜曲

甘草

升火

杏仁

處妙去皮尖

右爲剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

生附子去叉治中風濕昏悶挑根脹滿身重手足緩緩熱二自汗失音不語便利不禁

附子

生去皮附子

乾姜

白朮

兩

甘草

一分炙

右爲剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

附子去叉治寒濕漸中昏迷緩弱或腰背強急口渴語聲混濁心腹脹氣上喘不能轉轉

附子

生去皮附子

甘草

升火

乾姜

一分炙

右爲剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

附子去叉治暑濕兩暑濕發四肢不仁半身不遂骨節酸解緩弱不收或入浴臺樹口眼渴邪手足顫曳皆濕溫類也

附子

生去皮附子

桂心

三分

白朮

乾姜炮

澤鴻

桂心

三分

右爲剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

