

本草衍義

四



本草衍義卷第十五

通直郎添差充收買藥材所辦驗藥材定編纂編撰

石南

蜀椒

莽草

郁李人

鼠李

礪華

杉

楠木

榧實

樟木皮

白楊

欒荆

紫荆木

釣藤

檻藤子

皂莢

柳華

桐葉

椿木葉 椿英附

诃梨勒

橡實

胡椒

槲若

無石子

無患子

黃藥

樺木皮

赤櫟子

木鼈子

大槿

棗櫟木

柘木

石南葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不正二月間開花冬有二葉爲花苞苞既開中有十五餘花大小如棗花甚細碎每一苞約彈許大成一穗一花六葉

一叢有七八枝淡白綠色葉末微淡赤色花細開繁滿  
花但見蕊不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新葉  
治腎衰脚弱最相宜但京洛河北河東山東頗少已  
此故少用湖南北江東西二浙甚多故多用南實今醫  
家絕可用

蜀椒須微炒使汗出又須去附紅黃殼去殼之法先微  
炒乘熱入竹筒中以梗椿之播取紅如未盡更揀更椿  
以盡爲度凡用椒須如此其中子謂之椒目治盜汗尤  
功將目微炒搗爲極細末用半錢匕以生猪上脣煎湯  
一合調臨睡服無不效蓋椒目能行水又治水蟲

莽草今人呼爲蘭草濃煎湯淋渫皮膚麻痺本經一名

春草諸家皆謂爲草今居宋部圖經亦然今世所用者  
皆木葉也如石楠枝梗乾則繩擗之其喚如椒爾雅釋  
草云薈春草釋曰今莽草也與本經合今當具言之石  
南條中陶隱居注云似蘭草凌冬不凋誠木無疑

郁李人其子如御李子至紅熟堪嚼微澁其人湯去皮  
研極爛入生龍腦點赤目陝西甚多根煎湯渫風蟬牙  
鼠李即牛李子也木高七八尺葉如李但狹而不澤子  
於條上四邊生熟則紫黑色生則青葉至秋則落子尚  
在枝是處皆有故經不言所出處今關陝及湖廣江南  
北甚多木皮與子兩用

欒華今長安山中亦有子即謂之木欒子携至京都

爲數珠未見其入藥

杉其幹端直大抵如松冬不彫但葉闊成枝廬山有萬  
杉寺即此杉也作屑煮汁浸洗脚氣腫滿今劇處有  
楠材今江南等路造船場皆此木也緣木性堅而善居  
水久則多中空爲白蟻所穴

榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重龜黑衣  
其人黃白色嚼久漸甘美五痔人常如果食之愈過多  
則滑腸

櫟木皮今人呼爲櫟柳然葉謂柳非柳謂槐非槐木最  
大者高五六尺合二三人抱湖南北甚多熟亦下材  
也不堪爲器用嫩皮取以繩栲栳與箕屑

白楊陝西甚多永耀間居人脩蓋多此木也然易生根  
斫木時碎札入土即下根故易以繁殖非止壠墓間於  
人家舍前後及夾道往往植之土地所宜爾風繞至葉  
如大雨聲葉梗故如是又謂無風自動則無此事嘗官  
永耀問熟見之但風微時當風逕者其葉不孤絕覩則往  
往獨搖以其蒂細長葉一莖數氣雖過故往來卒無已  
時勢使然也其葉面青背白不身微白故曰白楊非  
如粉之白

纓荆卽前所謂牡荆也不合更立此條况本經元無纓  
荆已具蔓荆實條中

紫荆木春開紫花甚細碎共作朵生出無常處或生於

木身之上或附根土之下直出花花罿葉出光緊微圓  
園圃間多植之

釣藤中空二經不言之長八九尺或一二丈者湖南北  
江南江西山中皆有小人有以穴隙間致酒瓮中盜取  
酒以氣吸之酒既出涓涓不斷專治小兒驚熱

檣藤子紫黑色微光大一二寸圓彌治五痔有功燒成  
黑炭微存性米飲調服入多剔去肉作藥瓢垂腰間  
皂莢其子炒去赤皮入將骨浸軟煮熟以糖漬之可  
食甚踈導五臟風熱壅甚莢不艸肥者微炙爲末一兩  
入生白礬末半兩膩粉半兩風涎潮塞氣不通水調嚥  
一二錢但過咽則須吐涎凡用白礬者分隔下涎也又

暑中濕熱時或父雨合蒼水燒辟溫疫邪濕氣

柳華經曰味苦即是初生有黃繫者也及其華乾繫方  
出又謂之柳絮收之貼灸瘡及爲茵褥絮之下連小黑  
子因風而起得水濕處便生如地丁之類多不因種植  
於人家庭院中自然生其蓋亦如柳絮兼子而飛陳藏  
器之說是然古人以絮爲花陶隱居亦曰花隨風狀如  
飛雪誤矣經中有寶及子汁諸家不解今人亦不見用

釋氏謂柳爲瓦俱律陀木其子纏細如人妾

因極小妾果至大是知小黑子得因風而起

桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種桐各有  
治療條其狀列于後一種白桐可斷琴若葉三枚開白  
花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮

桐早春先開淡紅花狀如鼓子花成筒子子或  
油日華子云桐油冷微毒一種梧桐四月開淡黃  
小花一如棗花枝頭出絲墮地成油沾漬衣履五六月  
結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之日桐  
始華者一種崗桐無花不中作琴體重

烏臼葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九月熟初  
青後黑分爲三瓣取子出油然燈及染髮

訶黎勒氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物雖澁腸而又  
泄氣蓋其味苦澀

椿木葉椿梗皆臭但一種有花結子一種無花不實且  
以無花不實木身大其幹端直者爲椿椿用木葉其有

花而莢木身小幹多彎矮者爲樗樗用根葉莢故曰未  
見椿上有莢者惟樗木上有又有樗雞故知古人命名

且不言椿雞而言樗雞者以顯有雞者爲樗無雞者爲

椿其義甚明用椿木葉樗木根葉夾著宜依此推窮洛

陽一女子年四十六七耽飲無度多食魚蠣攝理之方

茂如也後以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十謁大便

與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不

效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如此

已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熟藥則腹

愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸弱愈減服溫平藥

則病不知如此將暮歲醫告衛窮垂命待盡或有人教

服人參。病家亦不敢主當謾與服之。纔一服知二服減三服。膿血皆定。自此不拾服。其疾遂愈。後問其方云。治大腸風盛。飲酒過度。挾熱下痢。膿血疼痛。多日不差。樗根白皮。兩八參。一兩爲末。每用二錢。匕空心以溫酒調服。如飲酒。以溫米飲代忌油膩。濕麪青菜葉子。甜物雞猪等。

胡椒去胃寒痰吐水食已。即吐甚。驗過劑。則走氣大暘。寒滑亦用須各以他藥佐之。

橡實櫟木子也。葉如栗葉。在處有但堅而不堪充枕。亦木之性也。山中以僧人爲糧。然澁腸木善爲炭。他木皆不及。其殼堪染皂。若曾經雨水者。其色淡。不若不經雨水者。櫟亦有殼。但少而不及櫟木所實者。

無石子今人合他藥染毬。

槲若亦有斗。但不及櫟木。雖堅而不堪充枕。葉微炙炒槐花。減槲葉之半。同爲末。米飲調服。治初得腸風及血痔。熱多者尤佳。亦堪爲炭。但不及櫟木。

黃藥亦治馬心肺熱。有功。

無患子今釋子取以爲念珠。出佛經。惟取紫紅色小者。佳。今入藥。絕少。西洛亦有之。

椰子開之有汁。如乳。極甘香。自別是一種氣味。中又有塊。瓢形如瓜。囊上有細塊起。亦白色。但微虛紋。若婦人褪裙。其味亦如其汁。又着殼。一重白肉。剗取之皆可

與瓢糖煎爲果汁色如白酒其味如瓢然望之酒者好事者當日強名之取其殼爲酒器如酒中吐毒則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意

樟木皮燒爲黑灰合他藥治肺風毒及取土紫黑花勻者裹鞍弓鞚韁

赤檉木又謂之三春柳以其一年三秀也肉紅色成細穗河西者戎人取消枝爲鞭京師亦多木鼈子蔓生歲一枯葉如蒲桃實如大括螺熟則紅黃色微有刺不能刺人今荆南之南皆有之六月十月熟實中之子曰木鼈子但根不死春旋生苗廿二子一頭尖者爲雄凡植時須雌雄相合麻縷纏定及其生也則去其雄者方結實

木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮歛花與枝兩用湖南北人家多種植爲籬障餘如經

櫻櫛木今人旋爲器皮燒爲黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲剗取櫻皮不爾東死花如魚子潔熟淹爲果柘木裏有紋亦可旋爲器葉銅簪曰柘蠶葉梗然不及桑葉東行根及皮煮汁釀酒治風虛耳聾有驗餘如經

本草衍義卷第十六

通直郎添差充收買藥材所辦驗藥材寇 宗奭編撰

髮髮

亂髮附

人乳

人屎

人溺

牛黃

龍骨

人指甲

今補

麝

象牙

羚羊角

犀角

醍醐

羖羊角

牛角

鯢白水牛鼻牛屎附

大膽

鹿茸

虎骨

豹肉

狸骨

鼴鼠

鼴鼠

狐

獮

野猪

驥肉

家格附

鹿

膾胸臍

敗鼓皮

丹雄雞

鷄

鷄

鷄屎白

雀卵

鸕

孔雀

白鵠

鷓鴣

斑鳩

鶉

髮髮與亂髮自是兩等。髮髮味苦，即陳舊經年歲者，如橘皮皆橘也。而取其陳者，狼毒麻黃吳茱萸半夏枳實之類，皆須陳者。謂之六陳，入藥更良。敗蒲亦然。此用髮之義耳。今人又謂之頭髮，其亂髮條中自無用髮之義。此二義甚明，亦不必如此過謂。搜索右以亂髮如雞子大無油器中熬焦黑，就研爲末，以好酒一盞沃之，何首烏末一錢同勻攬候溫嚙之下咽。過一二刻再嚙，治破傷風及沐髮中風極效。

人乳汁治目之功多何也？人心生血，肝藏血，肝受血則能視。蓋水入於經，則其血乃成。又曰：上則爲乳汁，下則爲月水。故知乳汁則血也。用以點眼，豈有不相宜者？血爲陰，故其性冷。藏寒人，如乳餅、酪之類，不可多食。雖曰牛羊乳，然亦不出乎陰陽造化爾。西戎更以駝馬乳爲酥酪。老人患口瘡，不能食飲，人熱乳良。

人采乾陳者爲末，於陰地淨黃土中作五六寸小坑，將末三兩匙於坑中，以新汲水調勻，良久俟澄清，與時行大熱，狂渴須水人飲之，愈。今世俗謂之地清，然飲之勿極意，恐過多耳。又治一切癰癧，熱毒瘡膿，血未潰，疼痛不任用。乾末麝香各半錢，同研細，抄一豆，大津唾貼。

瘡心醋麵錢子貼定膿潰出去藥

人溺須童男者產後溫一盃飲壓下敗血惡物有欲過七日若過多恐火速血藏寒今人發帶病人亦不覺氣虛無熱者尤不宜多服此亦性寒故治熱勞方中亦用指甲治鼻衄細細刮取俟血稍定去淤血於所衄鼻中搐之立愈獨不可備則衆人取之甚善衄藥并法最多或效或不效故須博採以備道途田野中用

龍骨諸家之說紛然不一既不能指定終是臆度西京穎陽縣民家忽崖壞得龍骨一副支體頭角悉具不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又生不得見死方可見謂其化也則其形獨不能化然西域記

卷之十六

三

良明

中所說甚詳但未敢據馮萬物所稟各異造化不可盡知莫可得而詳矣孔子曰君子有所不知蓋闕如也妾當審別考而用之爲其形相亂也黃牛黃輕鬆自然微亂穿鑿恐誤後學治精滑及大腸滑不可闢也香以此爲異蓋又有釐音猫牛黃堅而不香

麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝氣遂爲人獲亦物之一病尔此獵人云餘如經象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非口內食齒齒別入藥今爲象笏者是牙也

醍醐作酪時上一重凝者爲酪面酪面上其色如油者

酒煮之即出不可多得極甘美雖如此取之用處

少惟閏春瘡癥最相宜

犀角凡入藥須烏色未經湯水浸煮者故曰生犀川犀及南犀紋皆細烏犀尚有顯紋者露黃犀紋絕少皆不及西番所出紋高兩脚顯也物像黃外黑者爲正透物像黑外黃者爲倒透蓋以烏爲正以形像肖物者爲貴既曰通犀又須紋頭顯黃黑分明透不脫有兩脚滑閔者爲第一鹿取茸犀取尖其精銳之力盡在是矣犀角尖磨服爲佳若在湯散則屑之西番者佳

羚羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之集集鳴者良亦強出此說未嘗遍試也今將他角附耳皆集集

有聲不如有掛痕一說盡矣然多僞爲之不可不察也

羖羊角出陝西河東謂之羖繩羊尤健毛最長而厚此羊可入藥如要食不如無角白大羊本草不言者亦有所遺爾又同華之間有卧沙細肋其羊有角似羖羊但低小供饌在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不敢犯此寒疝也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊內湯少減水二服遂愈

牛角鰓此則黃牛角鰓用尖燒爲黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷痢又白水牛鼻乾濕皆可用治偏風

口喝斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸正

犬膽塗盆如金色又救生接元氣補虛損備黃狗脊骨

一條

去兩頭截爲五七段帶肉些小用研細砂一兩細研漿水二升入硝砂在漿水中攪勻浸骨三日後以炭火炙令黃色又入汁蘸候汁盡爲度其狗骨已酥脆搗令極細後入諸藥

肉蕊蓉

去心薄切

兔絲子

酒浸二日

曝乾杜仲

去皮皮

肉桂

去皮桂通

附子

炮去皮臍去毛酥微炙

乾薑

炮已上各一兩微炒

附子

炮去皮臍去毛酥微炙

陽起石

半兩酒煮一日令數人不住手研一日

附子

炮去皮臍去毛酥微炙

附子

前八味同杵羅爲末次入陽起石并狗骨末用熟棗肉

五兩酥一兩同和再搗千餘下看硬軟丸如小豆大點

乾每日空心益湯下二十九

鹿茸化獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立辛丑等爲

十二辰以名月又以名獸配十二辰屬故聲鹿肉爲肉

中一者避十二辰也味亦勝他肉二祀皆以鹿腊其

義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其力盡在血

中獵時多有損傷故也茸上毛先薄以酥塗勻於烈燄

中急灼之若不先以酥塗恐火焰傷茸俟毛淨微炙入

藥今人亦能將麻茸爲之不可不察也頭亦可釀酒

然須作漿時稍益葱椒角爲膠別有法按月令冬至一

陽生麋角解夏至陰生鹿角解各逐陰陽分合如此

解落今入用麋鹿茸作一種殆蹠矣凡麋鹿角自生至

堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅如石計一晝夜

生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木至易生亦

無能及之豈可與凡骨血爲比麋茸利補陽鹿耳利補

陰丸用茸無須太嫩唯長四五寸茸端如馬硝紅者最  
佳須佐以他藥則有功

虎骨頭脰與脊骨入藥由微鹹陳藏器所注之骨之事  
及射之目光墮地如白石之說必得之於人終不免其所誣也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金  
制焉得不從故呼嘯則風生自然之道也所以治風攀  
急屈伸不得走疰癲疾驚癇骨節風毒等乃此義爾  
豹肉毛亦黃其紋黑如錢而中空比比相次此獸猛烈  
過虎故能安五臟補絕傷輕身又有毒豹毛更無紋色  
亦不赤其形亦小此各自有種非能變爲虎也聖人假  
喻而已恐醫家未喻故書之

狸骨形類猫其紋有二一如連錢者一如虎紋者此二  
色狸皆可入藥其肉味與狐不相遠江西一種牛尾狸  
其尾如牛人多糟食未聞入藥孟說云骨理痔病作  
羹臘食之然則骨如何作羹臘者即炙骨也和麝香雄  
黃爲丸服治痔及瘻瘍甚效

兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘免至秋深時  
則可食金氣全也纔至春夏其味變取四脚肘後毛爲  
逐食飼鷓鴣至次日却吐出其意欲腹中遂盡脂肥使  
饑急捕逐速尔然作齧必使五味既患豌豆瘡又食此  
則發毒太甚恐班爛損人

鼴鼠音經中不言性味惟是於難產通用藥中去鼴鼠

毛赤黑色長尾人捕得取皮爲煖帽但向下飛則亦不能致遠今關西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背偃僂身有竹節紋長二三寸今謂之海馬

鼴鼠貪食也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短但能行尾長寸許目極小項尤短兼易掘取或安竹弓射之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形似猪灰赤色者也設使是鼠則孰能見其湧精成鼠也陶如此輕信但真醇之士不以無稽之言爲妄矣今經云在土中行則鼴鼠無疑

獺四足俱短頭與身尾皆褊毛色若故紫帛大者身與

尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦能休於大木上世之水獺嘗繫置木甕中於其間旋轉如風水謂之成旋籠起四面而中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾毳服領袖問之云垢不着如風羈翳目即就袖口飾目中即出又毛端果不着塵亦一異也又本草叙獺言獺膽分盃嘗試之不驗惟塗於盃脣但使酒稍高子盞而分盃之事亦古今傳誤言也不可不正之功用之有驗

狐今用汗治風皮兼毛用爲裘者是也此獸多疑極審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者多用置瑞肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑觜尖黑尾短闊

之極美貉形如小狐毛黃褐色野獸中瑞肉最甘美

人益瘦人

野豬黃在膽中治小兒諸癇疾客山西界野豬甚多形如家豬但腹小腳長毛色褐作群行獵人惟敢射最後者射中前奔者則群猪散走傷人肉色赤如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有間得之亦少用食之尚勝家猪

驥肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以謂止風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發散皮膚之外也仍須鳥者用鳥之意如用烏雞子烏蛇烏鴉之類其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

溫肺脾今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前即似獸尾即魚其身有短密淡青白至腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點以則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍轄其腰治腰腹積冷精衰脾胃勞極有効不待別試也似狐長毛之說蓋令人多不識鹿獐之屬又介於獐但口兩邊有長牙好鬪則用其牙皮爲第一無出其右者然多牙傷痕四方皆有山深處則頗多其聲如擊破鍛

野駝生西北界等處家生者足蹄最精人多煮熟糟啖糞爲乾末搐鼻中治鼻衄此西番多用嘗進築於彼屢

見之

敗鼓皮黃牛皮爲勝今不言是何皮蓋以驥馬皮爲之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處尙少尤好煎膠專用等處始可入藥丹雄雞全言赤鷄者是也蓋以毛色言之翼爲鷄爲風鷄鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故不可食經所著其用甚備產後血暈身痺直帶眼口角與目外脰向土牽急不知人取子一枚去殼分清以荆芥末二錢調服遂安乃依次調治若無他疾則不須甚敏捷烏鷄子尤善經注皆不言鷄發風今體有風人食之無不發作爲鷄爲巽信可驗矣食鷄者當

審謹

鷄  
肪而隱居云鷄即是鷄然有家鷄有野鷄陳藏器本草曰丁子云野鷄爲鳬家鷄爲鷄蜀本注云爾雅云野鳩鷄注云鷄也如此則凡鷄皆是鷄也又云本經用鷄肺即家鷄也如此所說各不同其義不定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鷄齊飛則明知鷄爲野鷄也勃唐之名儒必有所據故知鷄爲野鷄明矣

鷄肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之行序世或謂之天厭亦道家之一說爾食之則治諸風唐本注曰鷄爲陽鳥其義未盡茲蓋得中和之氣熱則即北寒則即南以就和氣所以爲禮幣者一以取其信二取

其和

鵝鴨鄭谷所謂相呼相應湘云者南方專充府家治瘡及菌毒甚效餘悉如經

雉其飛若矢一柱而墮致今人取其尾置船上煮食如此快速也漢呂太后名雉高祖烹之曰野鵝甚肥即鷄屬也食之折損多所益少

鷄屎白兼化藥用之作潰瘍瘍治小兒妙舞黃耆蜜白一錢蜜阿僧一兩舶上硫黃一分丁香二十一箇右爲末每服一字三歲已上半錢用乳汁或白麵湯調下並不轉鴉一復時取大青蟲七枚用油鹽醋石榴簽兩枚黑色印祁一分木香一錢麝香半錢同爲末每服轉舞不愈坐取之多失

雀加盃既至肉十月已後正月已前食之此蓋取其陰陽靜定未決泄之義外亦取第一番者

鶴頭無丹項無烏帶身如鶴者是兼不善唳但以喙相擊而鳴依池養魚蛇以哺子之事豈可垂示後世此禽多在樓殿吻上作窠日夕人觀之更知其未審耳碧石條中亦著

伏翼屎合斑藥白日亦能飛但畏鷄鳩不敢出此物善服氣效能壽冬月不食亦可驗矣

孔雀尾不可入目昏翳人眼

卷之六

鷦鷯陶隱居云此鳥不卽生口吐其鷦鷯今人謂之大  
鷦鷯巢於大木群集宿處有常穴則不祐以其多毒也每  
姪者不敢食爲其口吐其鷦鷯藏於洞中博取之經臨時  
令童婦熟之與蜜相戾嘗官於潤州公子王侯一木一  
株其上有三四十巢因之觀之既能文矣不知其布  
地其色若葢得鷦吐是全未考尋口竟當是誤人  
之謬言也

白鷦其毛羽色於鶴少而第最名重鷦糞一兩水微  
麝香別研吳白木半一分赤芍藥青竹茹三分  
三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七分研細不溫無灸  
他藥補血臟

酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以  
補氣雖有此數色真則一也

鷦有雌雄從卵生何言以六說甚容易考於西醫二疊  
得其卵初生謂之羅鷦至秋末謂之旦秋中秋之後謂  
之白唐然一物四名當悉書之小兒尤忌稻之下痢五速  
但旦食之有效



