

新編婦人大全良方

八



新編婦人大全良方卷之十四

妊娠中風方論第一

論曰夫四時八方之氣為風也常以冬至之日候之若從其鄉來者長養萬物若不從其鄉來者多為虛邪賊害萬物人體虛則中之若風邪客於皮膚入於經絡即頑痺不仁若入於筋脉挾寒則攣急喎僻挾溫則弛縱若入臟腑則恍惚驚悸凡五臟俞皆在背臟腑虛風邪皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而為諸病也妊娠中風若不早治則令墮胎也

治妊娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言四肢強急

**防風散**

防風

桑寄生

葛根各壹兩 菊花

防已

北細辛

秦艽

當歸

挂心

茯神

甘草

羚羊角各半

右為粗末每服肆錢水壹瓖薑參片煎至陸分去滓入竹瀝半合溫服

治妊娠中風口噤語言不得 **白木酒**

白木壹兩半 獨活壹兩 黑豆壹合炒

右細剉以酒參升煎取壹升半去滓溫分肆服口噤者拗口灌之得汗即愈

治妊娠中風口眼不正手足頑痺

防風

羌活

防已

麻黃去節

黃松木節

壹兩

挂心

荆芥穗

羚羊角

桑寄生

甘草

薤苳仁各半

者當先作瀝汁次辦湯也其竹遠不可即辦者當先辦湯  
此二瘡會得其一種其竹瀝偏瘡諸瘡絕起死也非但偏  
瘡妊娠產婦絕死者有効小兒或癩瘡金瘡發瘡瘰之亦  
驗。作竹瀝法見華三卷第一論

**膏** 瘰瘡妊娠臨月因發風瘡忽悶憤不識人吐逆眩倒

小醒復發名為子癩

葛根 貝母 去心 牡丹皮 去心 木防已

防風 當歸 川芎 白茯苓

桂心 蒸 澤瀉 甘草 各貳兩 獨活

石膏 人參 各參兩

右細切以水致升煮取參升分貳服貝母令人易產若

未臨月者升麻代之忌海藻菘菜酢物 其詳見第三卷

第二論亦可選方詳而服之

妊娠腹內有鬼胎方論第三 九三方

夫人臟腑調和則血氣充實風邪鬼魅不能干之若榮衛

虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷妊故曰鬼

胎也

瘰瘡是鬼胎致腹中黑血散下腹痛 **雄黃元**

雄黃 細研 鬼臼 去毛 莽草 丹砂 細研

巴豆 去皮 獺肝 各半兩 蚘 蚘 黃 吳公 黃 黃

右為細末蜜元如梧桐子大空心溫酒下貳元日兩服

後當利如不利加至參元初下清水次下虫如馬尾狀

無數病極者下蛇蟲或如段卵雞子或如白膏或如豆

汁其病即除

右以咀每服參錢水壹瓊生薑半分煎至陸分去滓服  
治妊娠因感外風如中風狀不省人

熟艾 參高

右以米醋炒令極熟乘熱以絹帛裹熨臍下良久即省  
陳總領時云余丈夫趙汝磐居夫台親見王一救舍人療  
其嫂氏

妊娠風症方論第二 九三方

論曰夫妊娠體虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相  
搏發則口噤脊強白之曰瘖又云瘖其候胃悶不識人須  
臆自醒良久復作謂之曰瘖亦名子癩亦名子冒甚則反  
張

治妊娠中風用弓反張口噤語澀

麻黃去節 獨活之膏 桑葉三片 屑

桂心 升麻 酸棗二枚 甘草

秦艽各半兩 川芎 當歸 杏仁製各

右以咀每服肆錢水壹瓊薑一分煎至陸分去滓入竹  
瀝一分流煎

治妊娠中風腰背強直時復反張

防風 葛根 川芎 生乾地黄各

杏仁製 麻黃去節各 桂心 獨活

甘草 防已各壹兩

右以咀每服肆錢水壹瓊煎至柒分去滓溫服

小品療妊娠忽悶眼不識人須臾醒復發亦有不醒者  
名爲產病亦名子癩亦名子冒葛根湯若有竹近可速辦

療婦人鬼胎及血氣不可忍方

班固去頭翼足製

延胡索少各參枚

右為細末再研如麪以溫酒調下半錢以胎下為度

治婦人虛羸有鬼胎癥塊經候不通

芫花根參兩

右剉炒令黃色為細末每服壹錢桃仁煎湯調下當下

惡物

妊娠傷寒方論第四 九二十方

論曰夫之時嚴寒人躰虛為寒所傷即成病為傷寒輕者  
淅淅惡寒翁翁發熱微咳鼻塞數日乃止重者頭疼體痛  
先寒後熱久而不愈則傷胎凡妊娠傷寒仲景無治法用  
藥宜有避忌不可與尋常婦人一藥治之也

妊婦產前腹痛及治月事或多或少或前或後胎氣不安  
產後血塊不散或亡血過多或惡露不下宜**加減四物湯**

當歸

川芎

白芍藥

熟乾地黄

壹方用生者各壹兩

右以咀每服肆錢水壹錢半煎至捌分取陸分清汁熟  
服日肆服以知為度。妊孕下血即入艾陸柒葉阿膠  
末壹錢同煎疾勢甚大散藥不及以肆味各半兩細剉  
以水肆錢煎至貳錢半去滓分肆服食前熱服壹日之  
中令盡以知為度平常產乳服至三膈止如虛弱血臟  
不調至壹月止。因虛致熱熱與血搏口舌乾渴欲飲  
水者加括樓根壹兩麥門冬參分。腹中刺痛惡物不  
下加當歸芍藥各壹分。血崩加地黃蒲黃各壹兩。

因熱生風加川芎壹分柴胡半兩 身熱脈躁頭昏項強  
加柴胡黃芩各半兩 大便秘結加大黃半兩桃仁壹分  
炒 如大便滑洩加桂心熟附子各壹分發寒熱加乾薑  
牡丹皮芍藥各壹分 嘔者加白朮人參各半兩 腹脹  
加厚朴枳實各壹分 虛煩不得眠加竹葉人參各壹分  
煩躁大渴加知母石膏各半兩 水停心下微吐逆加  
猪苓茯苓各壹分 虛寒狀類傷寒加人參柴胡防  
風各叁分

妊婦傷寒惡露時氣先服此以安胎宜**阿膠湯**却以治病  
藥相間服

阿膠 各

白朮

桑寄生

人參

白茯苓

右等分為細末黃糯米飲調服方寸七日參服

妊婦傷寒憎寒發熱當發其汗 **葱白湯**

葱白 十莖

生薑 貳兩

右細切以水貳瓊煮取壹瓊連服取汗愈

妊婦傷寒頭痛壯熱肢節煩疼宜**煎胡湯**

出廣濟方

正膏 貳分

煎胡 陸分

甜竹茹 叁分

外薑 伍分

黃芩

大青 伍分

知母

梔子仁 貳分

如四

右咬咀每服伍錢水壹瓊半葱白叁寸煎至捌分去滓  
溫服集驗文仲備急救急同

妊婦傷寒或中時行洒淅作寒振慄而悸或加噦者

**蘇木湯**

赤芍藥

橘紅

黃芩

黃連

甘草

蘇木 等分

右以咀每服伍錢水壹錢煎至陸分去滓溫服汗出瘥  
若胎不安兼服

妊婦寒熱頭眩嘔嘔不飲食脇下痛嘔逆痰氣及產後傷  
風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱  
不解宜服

柴胡

黃芩

人參

甘草

右以咀每服伍錢水壹錢半煎至壹中錢去滓溫服

妊婦傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢疼痛項背拘急口乾  
燥宜服

柴胡

甘草

石膏

右以咀每服貳錢水壹錢薑伍片煎至陸分去滓溫服

若氣虛體冷加人參肆兩

妊婦傷寒四日至六日以來加心腹脹上氣渴不止飲食  
不多腰疼體重

枳實

陳皮

麥門冬

右為細末每服參錢水壹中錢生薑半分葱白柒寸煎

至陸分去滓溫服

妊婦傷寒頭目旋疼壯熱心躁宜服

旋覆花

赤芍藥

甘草

前胡

石膏

白木

人參

麻黃

黃芩

右以咀每服肆錢水壹錢半薑半分煎至陸分去滓溫服

妊婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎氣不安



人參

石膏 各曾兩 前胡

黃芩 各參分

家葛根

麥門冬 各半

右以咀每服伍錢水壹瓊半生薑肆片棗貳箇淡竹茹壹分煎至捌分去滓温服

妊婦發斑變為黑也尿血宜調子大青湯

外臺書有調子方

升麻

梔子仁 各曾兩 大青

杏仁

黃芩 各曾兩半

右以咀每服伍錢水壹瓊半葱白參寸煎至壹瓊去滓温服

治妊婦傷寒五箇月已前嘗用此方為藥湯

出傷寒指要

黃芩

當歸

芍藥 各肆錢

川芎 拾陸錢

白朮 捌錢

右為細末温酒調服方寸匕日貳服產後百病悉皆主之常服則易產無疾苦 王子亨為產後常服之藥

當歸芍藥散 治婦人傷寒腹中隱痛

當歸

茯苓

白朮 各曾兩

芍藥 半斤

澤瀉

川芎 各肆兩

右為細末酒服方寸匕日叁

白朮散 治妊婦傷寒煩熱頭痛胎氣不安或時吐逆 不下食

白朮

橘紅

麥門冬

人參

前胡

赤茯苓

川芎 各壹兩

甘草

半夏 各半兩

右以咀每服肆錢水壹中瓊薑肆片淡竹茹壹分煎至陸分去滓無時温服

**胎前散** 治妊娠熱病骨節煩痛頭疼壯熱若不治熱不止則損胎

柴胡 家葛根 知母 梔子仁  
甘草 各半兩 石膏 壹兩 大青 黃芩  
升麻 各三分

右以咀每服肆錢水壹錢葱白參寸煎至陸分去滓無時熱服

**麻黃散** 治妊娠伍陸箇月傷寒頭疼壯熱四肢煩疼

麻黃 桂心 柴胡 赤芍藥 各壹兩  
甘草 半兩

右以咀每服參錢水壹錢薑炙片煎至陸分去滓無時溫服

**升麻散** 治妊娠傷寒頭痛身體壯熱

川升麻 蒼朮 炒 麥門冬 麻黃 各壹兩  
黃芩 大青 各半兩 石膏 貳兩

右以咀每服肆錢水壹錢薑炙片煎至陸分去滓無時溫服

治孕婦傷寒

柴胡 前胡 川芎 當歸  
人參 芍藥 粉草 生地黃 等分

右為細末每服貳錢薑炙片煎至陸分去滓溫服要出汗加葱

**良方白朮散** 治妊娠傷寒

白朮 黃芩 各半兩 新瓦上炒令香

右為散每服二錢水一中瓊薑一片棗一枚煎至七分  
溫服但覺頭痛發熱便可喫二三服即瘥唯四肢厥冷  
陰證者未可服此方本常州一士人實此藥醫等論斤  
售去行醫用之如神無人得此方予自得此治疾無有  
不効者仍安胎益母子

治妊婦傷寒頭疼腹痛

升麻

黃芩各六分家乾葛

大青

石膏

甘草各二分苦竹葉乙墨正細劉

右用水一升半先煮苦竹葉乾葛減一半入諸藥再煮  
至六合去滓溫服

妊婦時氣方論第五九三方

論曰天四時之間忽有非節之氣如春應暖而反寒夏應  
熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反暖非其節而有其  
氣而一氣之至無人不傷長少雖殊病皆相似者多候於  
表毒也言其時普行此氣故云此時氣也妊婦遇之重者  
致傷胎也

**秦艽**治妊婦時氣五六日不得汗口乾多喫冷水狂語

秦艽

柴胡各乙石膏二兩

赤茯苓

前胡

甘草

桑葉屑

家葛根

川升麻

黃芩各半兩

右咬咀每服四錢水一錢姜半分淡竹茹一分煎至六  
分去滓無時溫服

**家乾葛**治妊婦時氣煩熱口乾頭痛

家乾葛

麻黃去節石膏乙

豉乙合

白米半合

梔子仁二七

葱白一莖連根

右細切以水一大瓊煎至一瓊三分去滓無時分溫三服汗出為効

**治妊婦時氣**

治妊婦時氣六七日熱甚大小便不利最宜也

川芒消之兩細研

葵子二兩搗

右如前煎服以利為効

**升麻葛根湯**

升麻葛根湯皆可用凡用葛根自用家葛曬乾用野葛切動胎氣養身必用方言之甚詳

妊婦熱病方論第六

九五方

論曰夫冬時嚴寒觸冒傷之藏於肌骨夏至乃發壯熱又為暑病即熱病也此寒氣蘊積發即為病若妊婦遇之多致墮胎也

經云熱病與中暑相似但熱病者脈盛中暑者脈虛

治妊婦熱病壯熱頭痛嘔吐不止不食心胃煩悶

人參乙方無竹茹

家葛根略盧根二兩

麥門冬去心乙兩半

知母三分

右咬咀每服四錢水一瓊連根葱白二寸煎至七分去滓溫服

**治妊婦熱病**

治妊婦熱病班出黑色小便如血氣急欲絕胎欲落

梔子仁

升麻

石膏

乾地黄各一兩

黃芩

大青各乙兩

右咬咀每服半兩葱白七寸煎四十九粒水一瓊煎至五分去滓無時溫服救急有赤石無地黃石膏

治妊娠執病陸柒日熱入腹中大小便秘澀煩

川大黃微炒石膏各壹兩知母前胡

赤茯苓各叁分梔子仁甘草黃芩各半兩

右以咀每服半兩水壹大瓊生地黄壹分煎至陸分去滓無時溫服

又方

以伏龍肝細研無時水調下膏錢亦同調下

又方

以家葛根煮汁無時服壹小瓊

妊娠傷寒熱病防損胎方論第七九七方

論曰非節之氣傷於妊婦執毒之氣侵損胞胎遂有墮胎

漏血俱害子母之命也

治妊婦傷寒骨節疼痛壯熱不急治則胎落

葱白切壹升前胡家葛根石膏各拾分

青黛陸分升麻捌分梔子仁拾貳分

右以咀以水柒升煮取貳升半去滓分溫叁服

治妊婦時氣頭痛腰背強壯熱

升麻青黛前胡梔子仁

黃芩各二兩石膏八分家葛根三兩

右以咀以水伍升煎取貳升半去滓分為叁服

治妊婦陸柒日傷寒熱入腹大小便秘結不通蒸熱

前胡拾分大黃石膏拾分梔子仁拾枚

知母黃芩茯苓生薑各八分

右水捌升煎取貳升半後下大黃更煎參伍沸分作叁服

治妊娠傷寒苦熱不止身上斑出忽赤忽黑小便如血氣欲絕胎必落

梔子仁

升麻各肆兩 青黛貳兩

石膏捌兩

葱白

切壹升 黃芩叁兩

生地黄貳拾分

右咬咀以水玖升煎取叁升去滓作叁服已熱物

治妊娠時氣身大熱令子不落護胎方

伏龍肝

研令極細

右水調塗臍下貳寸乾則易差即止消清亦可

又方

芥中泥塗心下乾則易二方出本事身熱有瘰

又方

浮萍

川朴消

蛤粉

藍根 等分

大黃 鐵沙

右為末水調付臍上安胎解煩熱極妙

妊娠熱病胎死腹中方論第八 邪積中 九四方

論曰熱病胎死腹中者何答曰因母患熱病至陸柒日以

後臟腑極熱熏其胎是以致死緣兒死身冷不能自出

但服 異神散 暖其胎須臾胎即自出何以知其胎之已死

但看產母七十月者是其候也

異神散

右烏金散 靈苑方名尚桂散

桂心

高麗

芍藥

甘草炙

乾薑

生乾地黄各兩 黑豆貳兩 附子炮去皮

右為細末每服貳錢空心溫酒調下一分無附子有黃  
陳無擇評曰夫妊娠謂之重身二命係焉將埋失宜皆能  
損胎不特病重者所致或因頓仆驚恐出入觸冒及素有  
癥瘕積聚壞胎最多其候舌青即知子死養胎論曰面青  
舌赤母死子生唇青吐沫子母俱斃又有雙懷貳胎或一  
死一活其候尤難知自非臨岐觀變不易預還不可不備  
學也然以重神散溫胎未若補助產母使其氣正免致虛  
乏困頓胎自下矣催生湯殊勝黑神散

**治胎死腹中或產母氣乏**

變頓產道乾澀

蒼米甘受洗 苦梗壹兩 陳皮陸錢 白芷  
桂心 甘草各壹錢 川芎錢半 川烏

當歸 乾薑炮 厚朴製 芍藥

茯苓 半夏湯炮 附子炮去皮 南星山各

枳殼炒 木香壹錢 杏仁去皮尖炒 阿膠炒各

右為細末每服壹大錢溫酒調下覺熱悶加白蜜新汲  
水調服只是五積散無麻黃有川烏附子南星阿膠木  
香杏仁陸味

**鹿角散** 治妊娠熱病胎死腹中下之

鹿角屑壹兩

右以水壹瓊葱白伍莖豉半合煎至陸分去滓溫服效  
又方取死胎

烏雞壹隻

右細判以水參升煮取貳升去雞通手用衣帛蘸摩臍  
下胎自出

妊娠瘧疾方論第九 九四

論曰夫妊娠病瘧者由夏傷於暑客於皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪乘之動則暑熱陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱俱歇若邪動氣至交爭則發故瘧休涼有時其發寒時節漸晏者此由風邪客於風府循脊而下衛氣至晝日晝夜常大會於風府故發日晏其發日早者衛氣之行風府日下一節貳拾壹日下至尾骶貳拾貳日入脊內上注於伏衛之脉其行致日出缺盆之內其氣既止故發更早其間日發者由風邪內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作故間日搖積乃發也妊娠而發則寒熱之氣相迫傷於胎多損動也

治妊婦瘧疾不差出集驗方千金救急古今錄驗同

常山 石膏各壹兩 甘草 黃芩各半兩

烏梅 拾肆箇

右細切以酒水各壹大瓊相和浸壹宿平旦煎至壹瓊去滓分貳服

千金療妊婦患瘧方

柏山 竹葉各叁兩 石膏捌兩 糯米百粒

右切以水陸升煮取貳升半去滓分叁服第壹服未發前一食久服之第貳服取臨欲發時服餘壹服用塗頭額及脊前五心藥滓置頭邊當發壹日勿進水及飲食然過後乃進粥飲忌生葱菜集驗文仲備急同

治妊婦患瘧寒熱頭痛心煩

黃芩 麥門冬 去心各壹兩 石膏貳兩



甘草半兩 烏梅拾肆箇

右吹咀每服肆錢水壹瓊煎至陸分去滓溫服

治男子婦人一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或熱多或熱多寒少或一日一發或一日兩三發或連日或間日發或三四日一發不問鬼瘧食瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者並皆治之

常山

厚朴姜製

青皮

陳皮並不去白

甘草

檳榔

草菓去皮

右等分吹咀每服半兩於夫發時夜用水壹碗酒壹瓊煎至壹大瓊濾出露一宿却將滓再用酒水更依前煎壹次去滓別以柅盛貯亦露一宿來日當發之早盪溫面東先服頭藥少歇再服藥滓大有神效山謝氏。僕嘗治一姪婦陸柒箇月而沾瘧疾先寒後熱六脉浮緊眾醫用柴胡桂枝無効僕言此疾非常山不愈眾醫不肯因循數日病甚無計甬勉聽僕治之遂用七寶散壹服愈黃帝問曰婦人重身毒之柰何歧伯曰有故無殞帝曰願聞其故何謂也歧伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止豈不以審藥之性味明治療之方處以中庸與疾遇好於半而止之勿過而餘則何疑於攻治哉

姪婦霍亂方論第十 九四方

此方論專治婦人霍亂也然亦可治男七卷第二論選方通用也故不繁引

論曰夫陰陽清濁相干謂之氣亂於腸胃則為霍亂也但飲食過度觸冒風冷使陰陽不和致清濁相干腸胃虛者受之故霍亂也熱亂者先吐或心腹痛則吐利並發有頭

痛體疼發熱而吐痢者亦為霍亂所以然者挾風而有實故也風折於氣皮膚緻密故血氣不得宣通故令壯熱風邪乘其經脈氣上衝頭則頭痛風氣入於腸胃則洩痢胃逆則嘔逆故為吐痢也吐痢甚者則多煩臟腑虛故也又手逆冷陽氣暴竭謂之四逆也吐痢之病吐痢甚者則傷胎也

**人參散**

治妊婦霍亂吐瀉心煩腹痛

人參去心

厚朴姜製

橘紅

各壹兩當歸炒

乾薑炮

甘草

炙各半兩

右為散每服錢水壹錢棗子煎至陸分無時溫服

**白朮散**

治妊婦霍亂腹痛吐逆不止

白朮

益智仁

枳殼製

橘紅各叁分

草豆蔻

各壹分

右為散每服參錢水壹錢薑半分煎至陸分去滓溫服

無時

**木瓜散**

治妊婦霍亂吐瀉轉筋入腹則悶絕

吳茱萸湯洗

生薑切各

木瓜

切壹兩

一方有白朮各壹分甘草壹分

右細剉水貳貳煎壹錢貳分去滓分參服無時熱服

一方治妊婦霍亂吐瀉心煩悶亂作渴

右用糯米壹台泡令淨細研以水壹大錢研瀝取汁入蜜壹合生薑汁半合相和渴即頓服立止。縮脾散亦

**五苓散**

治霍亂吐瀉

理中元

胡椒湯

香薷散

夏月宜宜合此以防霍亂若有是證以此藥療口上五方之其效神速阻

通淋散 方解伏熱除煩渴消暑毒止吐瀉霍亂之後服熱藥太多致煩躁者宜沉冷冰冷頓服

草薢仁 四兩 烏梅肉 三兩 甘草 二兩半

右以咀每服半兩水漬瓶生薑以片煎至稠分侵以熟水溫冷任意

新編婦人大全良方卷之十四

新刊婦人大全良方卷之十五

妊娠泄瀉方論第一

凡三方

論曰凡妊娠泄瀉冷熱不同水瀉青白或黃白或水穀不化腹痛腸鳴其脉弱而緊此內傷冷也謂之洞泄寒中若泄注如水深黃色及有完穀小便赤腹脇脹滿煩躁喜飲時時嘔逆或下利清水或小便不利得熱則極脉虛大而數由乘虛熱入於胃湊滲下焦津液不分併於大腸謂之協熱利先以五苓散利小便次以黃連阿膠元或三黃熟艾湯凡泄瀉色黃而有沫腸鳴腹脹滿微痛其脉沉緊而小數謂之冷熱不調宜戊己元和之凡暴下或青或白水穀或化或不化腹脇或脹或不脹或痛或不痛但飭生熟氣全不思食其脉內虛外實右關脉沉緊者謂之飧泄先去沉積宜感應元後調和之 凡治瀉先須理中焦如理中湯元是也次即分利水穀如五苓散是也治中不效然後斷下即用禹餘糧赤石脂是也亦可就第八卷第

厚朴治妊娠洞泄寒中

乾姜

厚朴去粗皮

右等分先杵令爛水拌同炒令乾再為末水煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十丸食前米飲下

**真真散**治妊娠藏氣本虛宿挾風冷脾胃久弱藏府虛滑

厚朴去粗皮

浸炒黃二兩

肉豆蔻

一個草豆蔻

一個

右咬咀每服三錢水一瓊姜二片煎至七分去滓熱服

三黃熟艾湯

方見第八卷第十論

理中元

理中湯

五苓散

黃連阿膠元

戊己元

感應元

已上並見和劑局方

妊娠下痢赤白及黃水方論第二凡十五方

論曰夫妊娠之人胞血既閉臟氣不理脾胃易傷或恣食腥肥生冷脾胃停滯不能尅化冷熱相搏致令心腹攪刺疼痛膿血赤白雜下古書所謂滯下是也原疾之由皆因冷熱不調大腸虛冷熱氣客於腸間熱氣乘之則赤冷氣乘之則白冷熱相交則赤白相雜而運滯水止名爲滯痢也其狀白膿如涕而有血雜亦有血少者如白膿涕而有赤脉如魚腦此名魚腦痢又有血痢者熱乘血入於大腸爲血痢也血之隨氣外行經絡內通臟腑常無滯積若觸冒勞動生熱熱乘血散滲入大腸腸虛相化故成血痢也

療妊娠患痢膿血狀如魚腦髓小腹絞痛難忍

阿膠炙二兩

地榆

酸石榴皮三兩 蘇白井切一

黃連一方是黃連皮各二兩並細切

右用水七升煎取二升溫分三服忌生冷肥膩

療妊娠白膿痢腹中冷

乾姜四兩

赤石脂六兩

粳米一升炒黃

右用水七升煎取二升溫分三服忌如前

療妊娠腹痛下痢赤白不可忍

黃連一方是白木

石榴皮

當歸各二兩

阿膠炙二兩

熟艾一兩

右用水六升煮取二升溫分三服忌如前

療妊娠腹痛下痢膿血不止

黃連 捌分

厚朴 捌

阿膠 炙

當歸 各陸分

艾葉

黃蘗 各肆

乾薑 伍分

右為細末空心米飲調下方寸匕日參服

療妊娠臍下刺痛大便白晝夜參伍拾行

根黃厚者蜜炙大蒜煨令熟

右以根黃為末研蒜作膏為元如梧子大空心粥飲下

參拾元日參服妙

壹方不用根黃用當歸以芍藥煎湯吞下

療妊娠痢黃水不絕

厚朴薑汁炙黃連 貳兩

肉豆蔻連皮

右用水貳升煮取壹升頓服忌如前此上陸方

文仲療妊娠下痢不止方

黃蘗

乾薑

赤石脂各貳兩酸石榴皮壹

右細切以水捌升煮取貳升分參服

百今錄驗療妊娠下痢方

酸榴皮

黃芩

人參

檳皮各肆

粳米參合

右細切以水柒升煮取貳升分參服

療妊娠挾熱下痢冷熱不調千金翼同

黃連 壹升

黃蘗 壹升

梔子仁貳拾

右為末每服伍錢水貳瓊浸參時久煮十沸頓服嘔者

加橘皮壹兩生薑貳兩亦治丈夫常痢

壹方治中暑挾熱下痢無梔子仁用薑錢羊脂煎服

肘後方療妊娠下痢赤白如魚腦腹中絞痛

阿膠炒

黃蘗

地榆

當歸各壹兩

川芎

酸榴皮各叁分

右為細末葱白粥飲調貳錢

療妊娠下痢腹痛不食

薤白

切壹台 當歸炒

地榆各壹兩

甘草半兩

糯米壹台

右為散以水柒升煮取貳升去滓溫分叁服

療妊娠下痢腹痛小便澀

糯米壹台

當歸炒

黃耆各壹兩

右細切和停以水貳瓊煮取壹瓊貳分去滓溫分肆服

治妊娠臨產下痢

右梔子不以多少燒存性為細末每服壹大錢空心熟

水調服甚者連進肆伍服即止

治妊娠藏府氣素弱頻併下利時時腹痛漸覺羸瘦面

色痿黃不美飲食

厚朴兩半

白朮

川芎

白芍藥

當歸炒

熟地黃各壹兩

乾薑

人參各半兩

呵子叁分

甘草壹分

右以咀每服肆錢水壹瓊棗叁枚煎至陸分溫服

療妊娠下痢赤白絞刺疼痛出三因方

烏雞子壹枚

傾去頭上開壹孔

黃丹

壹錢入雞子殼內打令均細末

右每服貳錢米飲調下壹服愈者是男兩服愈者是女

妊娠大小便不通方論第三凡十方

論曰夫妊娠大小便不通者由藏府氣實而生於熱熱者隨傳之則成病也若熱結於大腸則大便不通結於小腸則小便不通若大小腸俱為熱所結故煩滿而大小便皆不通也

小品療妊娠子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不差宜服**甘遂散**下之 太山赤皮甘遂 貳兩

右壹味為末以白蜜貳合和服如大豆粒多覺心下煩得微下者日壹服下之後還將猪苓散不得下日兩服漸加至半錢以微利為度經心錄同

**猪苓散**療妊娠小便澁痛兼療胎水 猪苓 伍兩 去皮

右為末白湯調方寸匕加至貳匕日叁夜貳不差宜轉下之服前藥

古今錄驗療妊娠得病六七日以上身熱入藏大小便不利安胎除熱**葵子湯** 葵子 貳升 滑石 肆兩 碎

右以水伍升煮取壹升去滓盡服須臾當下便愈又方 葵子 壹合 川朴消 貳兩

右研每服叁錢水壹瓊煎至陸分去滓溫服

治妊娠大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食手足煩熱

**檳榔** 赤茯苓 大腹皮 木通

郁李仁去皮 北五味略壹 桑寄生 甘草

苦梗各半

右為粗末每服叁錢水壹瓊煎至陸分溫服

治妊娠大小便不通熱閉心膈腹脇妨悶妨害飲食

大黃 木通 檳榔各壹 枳殼叁分



大腹子參三枚 訶梨勒半斤

右為末以童便壹錢葱白貳寸同煎至陸分調下貳錢

**當歸散**治胎前諸疾或因怒中氣充子藏或充腠脈腹急  
肚脹腰腹時疼不思飲食四肢浮腫氣急時喘大便忽難  
小便忽澀產門忽腫

當歸兩 赤芍兩 枳殼 白芍藥

川芎各貳 川白薑炮 木香煨 粉草各半

右吟咀每服參大錢水壹錢半薑參片煎至捌分去滓  
無時溫服如稟受氣弱及南人枳殼減半如氣實及北  
人於內加分兩服之或連日大便秘澀加蜜同煎

初虞世治妊娠大便秘澀方

枳殼參兩 防風貳兩 甘草炙壹兩

右為細末沸湯點服壹貳錢空心日參

又治虛羸大便秘方 枳殼集 阿膠炒等

右為細末煉蜜和劑杵貳參千下元如梧子大別研滑  
石末為衣溫水下貳拾元半日來未通再服參拾元止  
於伍拾元

又方 車前子壹兩 大黃半兩

右為細末每服參錢空心蜜湯調下

妊娠小便不通方論第四凡八方

論曰夫妊娠小便不通者由小腸有熱熱入於脬內熱結  
甚者故令小便不通也若小便不通則心膈小腹氣澀而  
喘急也陳無擇云凡妊娠胎滿逼脬多致小便不利者或  
心腎氣不足不能使脬令清濁相干為諸淋病或胞系了

矣小便不通名曰轉胞又胎滿尿出不知時名曰遺尿治之各有方

古今錄驗療妊娠卒不得小便

杏仁貳拾箇去皮

右壹味搗元如大豆燈心煎湯吞茶粒立得利

又方以滑石末水和泥臍下

又方用車前草汁調滑石末塗臍肆畔方把熱即易之

治妊娠卒然小便不利方

滑石末 杏仁等分

右先搗杏仁令爛次入滑石末以軟飯搗和為元如小豆大每服貳拾元白湯送下

治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂

葵子研 榆白皮壹切葱白茶葉

右以水貳大瓊煎取壹瓊參分去滓分參服

又方用紫苑去苗為末并花水調下貳錢壹方用紫苑

苦參元治妊娠小便難飲食如故

當歸 貝母此心 苦參各參 滑石半兩

右為末蜜元如小豆大以米飲下貳拾元不拘時

葵子散治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水腫者

王子亨云妊娠小便不通特避寒藥又名茯苓湯千金翼要同

葵子伍兩 赤茯苓參兩

右貳味為末每服貳錢米飲調下小水利則愈

壹方無茯苓有榆白皮壹兩

八味元治婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息以將

系了矣不得溺故致此病名轉脬但利小便則愈以此藥有茯苓故也此藥雖局中有賣除非自合方有効

熟地黃

別兩

山藥

山茱萸

去核各

附子炮

桂心

牡丹皮

去心

茯苓

澤瀉各參

右為末蜜元如梧子大每服參拾元空心温酒下

妊娠子淋方論第五凡五方

論曰夫淋者由腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則小便數也膀胱熱則小便行澁而數不宣妊娠之人胞繫於腎腎間虛熱而成淋疾甚者心煩悶亂故謂之子淋也

小品療妊娠患子淋宜下地膚大黃湯

川大黃

地膚草

知母

黃芩

猪苓

赤芍藥

通草

川升麻

枳實

甘草

右咬咀每服肆錢水壹瓊煎至柒分去滓温服

經心錄療妊娠患子淋小便數出少或熱疼痛及足煩

地膚草參兩

右細切水肆升煮取貳升半去滓分參服日參服文仲

小品同

療妊娠患淋小便澁不利小腹水道熱痛

冬葵子

壹升

芍藥

黃芩

赤茯苓

車前子

各參

右咬咀以水柒升煎至貳升温分參服

療妊娠數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思食

瞿麥穗

赤茯苓

桑白皮

木通

葵子

各壹兩

黃芩

芍藥

枳殼

車前子

各半兩

右為粗末每服肆錢水壹瓊煎至陸分温服

療妊娠子淋小便澀痛

冬葵子

滑石

木通

各等分

右為末每服肆錢水壹瓊煎白朮寸煎至陸分去滓服

**猪苓散** 療妊娠子淋小便澀痛子母祕錄療妊娠胎水

方見本卷第三論

妊娠遺尿方第六

凡三方

療妊娠尿不知出時胎滿故也宜服

白薇

芍藥

右為細末温酒調貳錢

又方

白礬

牡蠣等分

右為細末温酒調貳錢

又方 用雞毛灰末之酒調方寸匕

亦見第八卷第四論

妊娠尿血方論第七

凡五方

論妊娠尿血者由勞傷經絡有熱在內熱乘於血血得熱

則流溢滲入脬故令尿血也

千金療妊娠卒下血反子淋方

葵子

右以水伍升煮取貳升分温參服

又方

生艾葉

右以酒伍升煮取貳升分參服

又方

生肌黃糖各半

右以酒肆升煮取貳升分溫參服亦療落身後血

**續命湯**治妊娠下血及尿血

當歸

生地黃各壹兩續斷半兩

赤芍藥壹分

右為末空心葱白煎湯調下貳錢

療妊娠尿血

阿膠

熟地黃

右各等分為細末空心粥飲調貳錢

妊娠胎水腫滿方論第八

凡十一方

產寶論曰夫妊娠腫滿由藏氣本弱因產重虛土不尅水血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀陳無擇云凡婦人宿有風寒冷濕妊娠喜脚腫俗呼為皺脚亦

有通身腫滿心腹急脹名曰胎水

論曰凡妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣安穩若中風寒邪氣及有所觸犯則隨邪而生病也凡妊娠經血壅閉以養胎若忽然虛腫乃胎中挾水水血相搏脾胃惡濕主身之肌肉濕漬氣弱則肌肉虛水氣流溢故令身腫滿也然其由有自或因泄瀉下痢藏府虛滑耗損脾胃或因寒熱瘧疾煩渴引飲太過濕漬脾胃皆能使頭面或手足浮腫也然水漬於胞兒未成形則胎多損壞及其臨產日脚微腫乃胞藏水少血多水出於外故現微腫則易生也宿有寒氣因寒冷所觸故能令腹脹腫滿也

產乳集養子論

妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫腿膝以來行步

艱辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於脚指間有黃水  
出者謂之子氣直至分娩方消此由婦人素有風氣或衝  
任經有血風未可妄投湯藥亦恐大段甚者慮將產之際  
費力有不測之憂故不可不治於未產之前也古方論中  
少有言者按名醫錄云木少主元微與徐文伯微行學鍼  
法文伯見一娠婦足腫不能行少主脉之此女形也文伯  
診之曰此男胎也在左則胎黑色少主怒欲破之文伯則  
然曰臣請鍼之胎遂墮男形而色黑此妊娠足腫之說見  
於古者今巢氏病源中但有子煩之論千金并產寶方亦  
畧言之劉禹錫續傳廣信方以謂妊婦有水氣而成胎太  
平聖惠亦言之皆非也元豐中淮南陳景初名醫也獨有  
方論治此病方名初謂之香附散李伯時易名曰天仙藤

天仙藤散方

天仙藤洗畧 香附子炒 陳皮 甘草

烏藥不須要天台者因得數白香而辣者良

右等分淨秤為細末每服參錢水壹大瓊薑參片木瓜  
參片紫蘇參葉同煎至柒分放溫澄清空心食前服日  
參服小便利氣脉通體輕腫漸消更不須多服元豐末  
居金陵舉家病以詩贈景初曰舉族貧兼病煩君藥石  
功到家何所寄一一問征鴻因此見方得於李伯時家  
傳方歸于臨  
川張右丞宅

產寶療妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

茯苓津兩 杏仁 檳榔各參 旋覆花

郁李仁各壹

右為粗末以水陸升煮取貳升去滓分溫參服小便通

即差

崔氏療妊娠體腫有水氣心腹急滿

茯苓

白朮各半

旋覆花貳兩 杏仁

黃芩各半

右細切以水柒升煮取貳升半分溫參服忌桃李雀肉

鮓物千金錄驗集急治

療妊娠遍身洪腫

葶藶子拾分

白朮貳拾

茯苓貳兩

桑白皮貳兩

郁李仁捌分

右為粗末以水陸升煮取貳升分溫參服小便利即差

又方

澤瀉

葶藶各半

茯苓

枳殼

白朮各半

右細切以水陸升煮取貳升分溫兩服小便利即差

澤瀉治妊娠氣壅身體腹脇浮腫喘急大便不通小便

赤澁

澤瀉

桑白皮

木通

枳殼

檳榔

赤茯苓等分

右以咀每服肆錢水壹瓊薑肆片煎至陸分去滓食前

溫服

防己湯治妊娠脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便利

防己參分

桑白皮

紫蘇葉

赤茯苓各壹

木香壹分

右為粗末每服肆錢水壹瓊薑肆片煎至柒分去滓食

前温服

**千金鯉魚湯** 治妊婦大胎間有水氣

白木 伍兩

茯苓 肆兩

當歸

芍藥 各叁兩

右細剉以鯉魚壹頭修事如食法煮取汁去魚不用每服肆錢入魚汁壹瓊半薑朮片橘皮少許煎至柒分去滓空心服集驗同

**茵陳赤小豆湯** 治妊婦手足腫滿急

赤小豆

茵陳 等分

右咬咀每服壹兩用水壹碗煎至柒分澄清汁服集驗千金方有澤漆 產寶方無澤漆有桑白皮

**白朮散** 治妊婦腰脚腫

白朮

白朮 各肆兩

乾薑

甘草 各貳兩

杏仁 叁兩

右咬咀每服肆錢水壹瓊半煎至柒分食前服

指迷方治胎水(五皮散尋常脾虛腫滿亦治)

大腹皮

桑白皮

生薑皮

茯苓皮

橘皮 各等分

右咬咀每服半兩水貳瓊濃磨木香水壹呷同煎至捌分去滓空心温服亦治男子脾虛腫滿 壹方無桑白皮有白朮倍之名白朮散

妊婦腹內鍾鳴方第九

凡一方

治孕婦腹內鍾鳴用鼠窠前後土為細末研麝香酒調下貳錢其產立愈

龔彥德孕癰方第十

凡一方



治孕癰方立効

烏藥州山嶽州較

右用水壹錢牛皮膠壹片同煎至柒分温服

妊娠不語論第十一無方

孕婦不語非病也間有如此者不須服藥臨產月但服保  
生元四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也  
醫家不說與人臨月則與尋常之藥產後能語則以為醫  
之功豈其功也哉黃帝問曰人有重身九月而產此為何  
言之岐伯曰胎絡有繫於腎少陰之絡脈絕也帝曰何以  
故不能言帝曰胎之何故岐伯曰無治也當十月後

妊娠傷食方論第十二凡二方

經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之  
五宮傷在五味若妊子飲食不節生冷毒物恣性食噉致

傷脾胃故妊娠傷食最難得藥唯此二方最穩捷

**木香元**治婦人有孕傷食

木香貳錢 三稜 人參 白茯苓各叁錢

右為細末麪糊元如綠豆大熟水吞叁肆拾元

**白木散**治妊娠氣不調和飲食易傷

白木炒 乾紫蘇各壹兩 人參 白芷各叁分

川芎 呵子皮 青皮各半兩 甘草壹分

右為末每服貳錢水壹錢薑叁片煎至柒分温服

愚詳小七香元規局保氣散見十六卷豈無良効

妊娠臟燥悲傷方論第十三凡一方

許學士云鄉里有一婦人數欠無故悲泣不止或謂之有  
祟祈禳請禱備至終不應予忽憶有一證云婦人臟燥悲

傷欲哭象如神靈數欠者大棗湯予急令治藥盡劑而愈  
古人識病製方種種妙絕如此試而後知

**大棗湯**治婦人臍燥悲傷欲哭象若神靈數欠者皆主之

甘草 參 兩 小麥 壹升 大棗 升

右咬咀以水陸升煮取參升去滓分温參服亦補脾氣

專治婦人方名甘草湯

下數人如有所遇醫與聖者兼治元皇皇無益僕年十四正  
在齋中習業見此證而程省元皇皇無益僕年十四正  
管先生伯同說此證先人曾說此證對證笑而治藥一  
非大棗湯不愈虎卿借方看之甚喜對證笑而治藥一  
投矣

新編婦人大全良方卷之十一

坐月門

妊娠疾病既明須知  
坐月避忌故以次之

產寶方周頌序第一

頌聞至靈者人最重者命人皆知命之所重而不知養命之方天年未終疾病攻奪嗟乎世無良醫著述則急難倉卒尋醫其舛誤多矣醫之中惟產難為急子母生命懸在片時頌勤志方書常思救療每覽名醫著述皆誌於心且夫男女構精陰陽分氣就中女弱疾狀頗多蓋其稟柔質以為人有血藏而抱育妊娠之內導理有常至於飲食之間動靜之際尤多制忌以節性情及乎既產鮮保安者蓋是損觸藏府傷動筋骨將理稍失疾患便生更值盲醫取次下藥致其所苦積漸懸危日復一日亟至于死可不痛哉故易曰天地之大德曰生則知在天地之間以生育為本又豈因生產而反危人之命乎自惟攝理因循藥餌差謬致其產婦不保安全且婦人生產方二三次血氣未衰飲食易進但能節性則無病生縱或偶有微病不難醫治至於四五次迨乎七八次傷敗已深血氣衰微子藏虛弱穢敗內滯風邪外攻若有病生宜須審療醫若不子細疾便危殆此醫殺之理甚明矣且仕俗之家婦人產後復乳其子產既損氣已甚乳又傷血至深靈命耗神莫極於此稍失常理便合急醫或以家貧不及厚賂醫者醫者怠慢須臾困篤吁人之生產非小事也而醫者有圖財侮而致死此醫殺之理又明矣且夫產前產後血氣未寧一疾苟生

百疾同作古人所以著方論於產乳者正在此也至若鯉

魚阿膠能治胎動芤弱當歸善療胎痛抵如胎動胎痛非

至理也有因胎而胎動者痛亦如之此略舉大綱蓋須

知醫者之攻也降及地黃益血生薑助氣芍藥止痛黃耆

補虛用之得門其効如聖用之失理不如不醫乃知醫人

不可苟作類以此疾心常思著方以濟危急而學解不博

未能自信所以偏採產術志在廣行復見咎殷產寶感切

深入醫門乃大中歲相國白敏中傷茲婦人多患產難詢

訪名醫思救人命或人舉殷相國迎召問其產乳殷乃撰

方三卷贄於相國相國重其簡要命曰產寶此方雖存得

者甚少類志在愈疾常恨不家藏一本故輒敢序之蓋欲

開其衆聽凡五十二篇三百七十一方兼拾咎氏之遺作

小論三篇次於序末庶幾妊娠之家自得覽斯為家內明

師爾時丁巳歲秋八月序

將護孕婦論第二

凡婦人妊娠之後以至臨月藏府壅塞關節不利切不可

多睡須時時行步不宜食粘硬難化之物不可多飲酒不

可亂服湯藥亦不可妄行鍼灸須寬神減思慮不得負重

或登高涉險若偶然胎不安腰痛者須服安胎藥一二服

得安即止周頴論曰生產雖然觸穢排比須要在先入月

壹日貼產圖并日遊胎殺所在并借地法於妊婦房內北

壁上仍依位設床帳厚鋪茵蓐周密使無孔竅夏月亦鋪

厚薦用好油單薄席紗帳以備之常焚香令潔淨備辦湯

藥器物既覺欲產不得喧闐人力雜亂大小惶惶為動產

婦宜預擇年高歷練生婆一人并穩當曾經慣婦人一人  
扶持不得揮霍恐產婦憂驚又忌閑雜外人并喪孝穢  
觸之人看視切不得驚動傷早若坐婆拙不能體候胎氣  
方轉動之際便為欲坐多端下手驚動傷早則橫倒之憂  
從此而致也

產寶方云妊娠欲產腹雖痛而腰不甚痛者未產也且令  
扶行熟忍如行不得則凭物扶立行得又行或衣漿先下  
然後作陣腰腹痛眼中如火生此是胎離腎經兒逼產門  
也即服催生藥一二服即去之葶草切不可坐草早務要  
產婦用力存養調停亦令坐婆先說諭之如覺心中煩悶  
可取白蜜壹匙用新汲水調下或覺飢即喫軟飯或粥少  
許亦須預備勿令飢渴恐產婦無力困乏也若不飢渴亦  
不須強食大凡生產自有時候不可強服催生滑胎等藥  
或因坐草早勢不獲已則服之若無事強服恐變生他疾  
又須戒之

滑胎例第三

凡妊娠已滿十月形體成就神識咸備分氣趣產宜服滑  
胎湯藥

**滑胎枳殼散** 瘦胎易產胡陽公主每產累日不下南山道  
士進此方

商州枳殼

粉草

右為細末百沸湯點貳錢服空心日參服凡懷孕六七  
箇月已上服之令兒易生初生胎小微黑百日已後肉  
漸變白此錐孫真人滑胎易產方然抑陽降氣為衆方

之冠此方分兩出必用方以此為正

壹方枳殼陸兩甘草壹兩故加枳殼或甘草蓋未產人

日參服忌

壹方有糯米半升淘洗控乾同炒為末米飲白湯調下

壹貳錢

溫隱居加當歸木香各等分

張氏方治妊娠胎肥壅隘動止艱辛臨月服之縮胎易

產兼治腸中諸疾下氣寬萬 枳殼伍兩甘草壹兩半

香附子叁兩為末薑煎湯點亦可如丈夫婦人冷氣

攻刺脇肋疼痛者用葱白叁寸同煎服 婦人脾寒血

氣成塊作痛熱酒調服 大小便不通白牽牛為末煎

湯調服

選奇方

香附子

枳殼各貳兩

甘草半兩

內補元

治妊婦衝任脉虛補血安胎

熟地黃貳兩當歸壹兩微炒

右為細末煉蜜元如梧子大溫酒下參肆拾元

許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋抑陽助

陰之藥甚多然胎前藥唯惡羣隊若陰陽交錯別生

他病唯是南山道士枳殼散所以抑陽四物湯所以

助陰故爾然枳殼散差寒若單服之恐有胎寒腹痛

之疾以內補元佐之則陽不至強陰不致弱陰陽調

停有益胎嗣此前人未嘗論及也

易產滑胎方其藥性滑利小便

車前子

右為末酒調方寸匕服不能飲者水調 詩云采芣能  
令婦人樂有子矣 陸機注云治婦人產難愚詳孔子  
序詩云樂然而生易於生育後人以為注 甚誤矣

治產難補遺元瘦胎滑利易產臨入月服之極有神効知  
蘄州施少卿方蘄州徐太丞傳

通明乳香詳前

枳殼壹兩

右為細末煉蜜元如梧子大空心温酒吞下 參拾元日  
壹服懷孕九箇月以後方可服

陸氏方名補遺元乳香壹分

榆白皮治妊娠滑胎易生

榆白皮

甘草各貳兩

葵子壹兩

右為粗末每服貳錢水壹錢煎至柒分去滓温服

壹方無榆白皮名葵子散

主孕九箇月將產消息

猪肚壹全具

依法用葱五味煮熟食食如不盡更食以盡為度不得  
與別人食無効

保氣安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失宜偶然頻

仆胎動胎痛漏胎下血兼服佛手散見前方神寢元 枳殼

散見前此三藥入月內大宜常服

香附子肆兩

山藥貳兩

縮砂仁壹兩

木香肆錢

粉草壹兩

益智仁

紫蘇葉各半兩

右為細末白湯點貳錢服

月空方位例第四出太平聖惠

正月 三月 五月 七月 九月

十一月 巳上在丙壬

二月 四月 六月 八月 十月

十二月 巳上在甲庚

逐月安產藏衣忌向方位第五


凡安產藏衣方位並於卧閣内分布太平聖惠方云凡妊婦初入月便寫產圖壹本以朱書某月某日空貼在某位如正月在丙壬可於壬位安產婦床帳丙位藏衣之類貼掛在產婦房內北壁上若值閏月只看節氣用之又云每月產圖有雷公招搖運鬼力士天狗軒轅大時咸池吳時豐隆白虎大夫天候狂虎凡十三神並從月建易其位所謂月空者按内經云月廓空無寫王冰注云論月輪中空日也即非十三神之數今太平聖惠方以六陽月在丙壬以六陰月在甲庚正如外臺所言正月在丁壬至十二月在甲庚之類其理一也但外臺言之詳聖惠言之簡耳今人多依聖惠方者特從其簡而已或云凡逐月安產藏衣並向月德月空方位所有十三神殺並從節氣更換若交次月節便作次月用書產圖者非也假如正月十四日立春若妊婦十三日乳卧豈可作去年十二月用也必依月分用之乃是若依節氣更換則天德月德所在差矣然月空與壬謂之中天空頗相類議者以為天空者非十三神之數蓋課中有天乙貴人其位無可與對者故此空是謂天空值此神百事不宜止宜安產婦床帳藏衣之類耳集聖曆云天德正月在丁二月在坤三月在壬四月在辛五



月在乾六月在甲七月在癸八月在艮九月在丙十月在  
 乙十一月在巽十二月在庚  
 又堪輿曆有遊年白虎殺神在太歲後一辰如太歲卯則  
 白虎在寅餘倣此推之若產及藏衣犯之則子母皆不利  
 也

○王子亨云難產逆生論稱犯一切神殺固有是理然亦  
 有自然難產兒自逆生者及有產腸胃俱下者產已則  
 復如故此非疾病所致氣血所主天下之理蓋有不可  
 窮詰者亦宜知之

大全良方卷之六



西

東

安產藏衣十二神吉凶方位

正月	壬	丙	艮	寅	寅	卯	辰	辰	辰	午	申	酉	戌
二月	坤	艮	乾	亥	卯	子	丑	未	巳	酉	巳	戌	亥
三月	丙	壬	坤	申	辰	酉	戌	戌	午	子	寅	亥	子
四月	甲	庚	巽	巳	巳	午	未	丑	未	酉	亥	子	丑
五月	丙	壬	艮	寅	午	卯	辰	辰	申	子	申	丑	寅
六月	庚	甲	乾	亥	未	子	丑	未	酉	卯	巳	寅	卯
七月	丙	壬	坤	申	申	酉	戌	戌	子	寅	寅	卯	辰
八月	庚	甲	巽	巳	酉	酉	戌	丑	亥	卯	亥	辰	巳
九月	丙	壬	艮	寅	戌	卯	辰	辰	子	午	申	巳	午
十月	庚	甲	乾	亥	亥	子	丑	未	丑	卯	巳	午	未
十一月	壬	丙	坤	申	子	酉	戌	戌	寅	午	寅	未	申
十二月	庚	甲	巽	巳	丑	午	未	丑	卯	酉	亥	申	酉

推婦人行年法第六

生氣方

產婦宜向之坐臥及

反支月

此月即鋪灰上用牛皮或馬

禍害月

不得於其上產又不得

絕命方

不得於其上產又不得

懸尸日

此日產不得攀繩

閉肚方

至滿月並不得向之

八疰方

開門忌之大吉





四歲行在庚申 乾 二月 坎 震 巳亥在正南 在正南 黃色 西北 西北方黃

四歲行在庚寅 兌 三月 巽 離 辰戌在正南 在正南 白色 正西 正西方白

四歲行在己丑 巽 六月 兌 坤 卯酉在正西 在正西 黃色 東南 東南方黃

四歲行在庚子 坤 九月 離 巽 寅申在正西 在正西 黃色 西南 西南方黃

四歲行在庚亥 離 十月 坤 兌 丑未 在正北 在正北 赤色 正南 正南方赤

四歲行在庚戌 坎 十一月 乾 艮 子午 在正北 在正北 黑色 正北 正北方黑

四歲行在己酉 震 十二月 艮 乾 巳亥 在正東 在正東 青色 正東 正東方青

四歲行在甲申 艮 正月 震 坎 辰戌 在正東 在正西 黃色 東北 東北方黃

體玄子借地法第七

東借十步 西借十步 南借十步 北借十步

上借十步 下借十步

壁方之中肆拾餘步安產借地或有穢汚或有東海神王  
或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有日遊  
將軍白虎夫人遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天符地軸  
入地十丈令此地空閑產婦某氏安居無所妨碍無所畏  
忌諸神擁護百邪速去急急如律令勅  
前項借地法於入  
貼於產婦房內也  
更不須避忌神殺也

禁草法第八

鋪草及檀褥訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之銅一言得之鐵母子  
相生俱獲鐵急急如律令

禁水法第九 欲產時貯水呪曰

南無三寶水

水在井中為井水

水在河中為河水

水在器中為淨水

水在法中為真水

自知非真莫當真水

以淨持濁

以正治邪

日遊月殺

五士將軍

青龍白虎

朱雀玄武

招搖天狗

軒轅女媧

天吞地吞

懸尸閉肚

六甲禁諱

十二神王

土符伏神

各安所在

不得動靜

不得忌干

若有動靜

若有忌干

施以神呪

當攝汝形

阿佉左阿毗羅莫多梨娑地梨婆訶

入月預備藥物第十

保氣散

佛手散

枳殼散

神寢元

榆白皮散

催生元

催生丹

黑神散

大聖散

花藥石散

黑龍丹

理中元

催生符

生地黃

羌活

葵子

黃連

竹茹

烏梅

雌雄石燕

甘草

海馬

馬嚼鐵

棗子

陳皮

薑錢

黑豆

白蜜

無灰酒

童子小便

好醋

白米

煎藥爐

銚子

煮粥沙瓶

瀝藥帛

醋炭盆

小石壹貳拾顆

湯瓶

軟硬炭

乾柴茅

煖水盆

洗兒肥皂頭髮

斷臍線及剪刀

斷臍本不用刀只用  
帛裹臍下齒斷

乾蓍草

卧交椅

軟厚氈

燈籠

火把

繳巾

油燭

發燭

灯心

催生靈符第十

書符時宜以水飛朱砂書之貼於房內北壁上遇坐蓐之時割於針上就球內以燈燒之庶免飛揚溫水調服

治產難橫生逆產胞衣不下靈符 出聖應方 局方同

麗出 麗出 麗出 麗出 麗出 麗出

麗出 麗出 麗出 麗出 麗出 麗出  
不安穩寐 覺不安穩 治橫生靈符  
書貼產婦 書貼枕上 朱砂書此符  
麗出 麗出 麗出 麗出 麗出 麗出  
處北壁上 書貼枕上 以順水吞下

此 此 此 此 此 此  
此四符入月一日墨 書鞋底上仍密安產 婦蓐褥下勿令人知

此 此 此 此 此 此  
此三符遇產難 以墨書其合之

麗出 麗出 麗出 麗出 麗出 麗出  
治胞衣不出靈符四道 急則以朱砂書符吞下





