

外臺秘要方

七

外臺祕要方卷第七

心痛心腹
寒疝三十一

言書樓藏

中

吳郡錢中立

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍日林億等上進

心痛方八首

九種心痛方三首

諸蟲心痛方一十八首

冷氣心痛方五首

惡症心痛方三首

心痛癰塊方二首

心背微痛方四首

卒心痛方一十四首

中惡心痛方五首

多唾停飲心痛方二首

心下懸急懊痛方四首

心痛不能飲食方二首

久心痛方六首

雜療心痛方三首

腹痛方四首

卒腹痛方七首

心腹痛及脹滿痛方一十首

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

卒心腹脹滿方六首

腹脹雷鳴方三首

腹內諸氣及脹不下食方一十一首

灸諸脹滿及結氣法二十二首

背脊痛及妨悶方四首

脅肋痛方二首

胃膈氣方三首

寒疝腹痛方九首

寒疝心痛方三首

卒疝方三首

七疝方三首

寒疝不能食方四首

寒疝積聚方四首

心疝方四首

心痛方八首

病源心痛者由風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者有久成痼者心為諸藏主而藏神其正經不可傷傷之而痛為真心痛朝發夕死夕發朝死心有皮別之絡脉其為風冷所乘不傷於正經者亦令心痛則乍聞乍甚故成痼不死

又心為火與諸陽會合而手少陰心之經也若諸陽氣虛少陰之經氣逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也

又諸藏虛受病氣乘於心者亦令心痛則心下急痛謂之脾心痛也是大陰為脾之經與胃合是陽明為胃之經氣虛逆乘心而痛其狀腹脹歸於心而痛甚謂之胃心痛也腎之經足少陰是也與膀胱合膀胱之經足太陽是也此二經俱虛而逆逆氣乘心而痛者其狀下重不自收時若泄寒中為腎心痛也

診其心脉急者為心痛引背食不下寸口脉沈緊苦心下有寒時痛

關上脉緊心下苦痛

左手寸口脉沈則為陰陰絕者無心脉也苦心下毒痛出第十

六卷中

備急療心痛方

延年療心痛朱黃丸方
桂心末温酒服方寸匕須臾六七服乾薑依上法服
之亦佳文仲集驗時後同忌生葱出第一卷中

吳茱萸^{半兩} 乾薑^{半兩} 桂心^兩 白朮^{二兩}
人參^兩 橘皮^兩 附子^{半兩} 椒^{一兩} 去閉口
甘草^{一兩} 黃芩^{一兩} 當歸^{一兩} 細切

右十一味搗師為散蜜丸一服五丸如梧子大日三服稍加至
十九十五丸忌猪肉生葱海藻松菜桃李雀肉等菜盡更合
酒飲無拘食前後任意出第十五卷中
救急心療心痛方

又方

東引桃枝一握切以酒一升煎取半升頓服大効

後同出第八卷中

必効療心痛方

當歸末酒服方寸匕頓服備急文仲同

又方

生油半合温服差肘後備急張文仲同並出第五卷中

古今錄驗療心痛黃連湯方

黃連^{八兩}

右一物咬咀以水七升煮取一升五合絞去滓適寒温飲
今日三忌猪肉冷水肘後范汪同出第八卷中

九種心痛方三首

唐濟療九種心痛蛔蟲冷氣先從兩肋背撮痛欲變吐當

歸鶴蟲散方

當歸^{八分} 鶴蟲^{八分} 橘皮^{六分} 人參^{六分}

檀榔人分十二枳實分六芍藥分六桂心分五

右八味搗篩為散空腹者量棗飲服方寸匕日二服漸漸加至一匕半不利忌生葱生冷物油膩粘食出第四卷中

千金療九種心痛一蟲心痛二注心痛三氣心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛悉主之并療冷衝上氣路馬墮車附子丸方

附子一兩 巴豆人二兩去心皮熱 人參一兩 生狼毒一兩炙
乾薑一兩 食茱萸一兩

右六味搗末蜜和空腹服如梧子三九一日一服弱者二九卒中惡心痛口不能言連年積冷流注心背痛者亦服之好好得息神効不傳忌野猪肉芦笋必効經心錄同

又療九種心痛方

取當太歲上新生槐枝一握去兩頭水三升煮一升頓

服之並出第十三卷中

諸蟲心痛方一十八首

唐濟療諸蟲心痛無問冷熱蛔蟲心痛檀榔鶴蟲散方

當歸 桔梗 芍藥 橘皮
鶴蟲各八分 人參分六 桂心分六 檀榔人分

右八味搗篩為散空腹煮薑棗湯服方寸匕漸漸加至二匕不利忌猪肉生葱油膩小豆粘食等

又療蛔蟲心痛積年久不差方

取者酒五合燒青錢二文令赤安酒中則取雞子白一顆去却錢溲者酒中頓服之差無所忌

又生心腹攪結痛不止仍似有蛔蟲者當歸湯方

當歸 橘皮 細辛 甘草炙
生薑各四分 大黃別漬 鶴蟲分二

右七味切以水六升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服不利未差三日更作服之忌海藻菘菜生菜救急同出第四卷中

小品溫中當歸湯療暴冷心腹刺痛面目青肉冷汗出欲霍亂吐下脉沈細者及傷寒毒冷下清水變作青白滯下及白滯後還復下清水者悉主之此方可以調諸冷痛也

當歸 人參 乾薑 茯苓
厚朴 炙 青木香 桂心 桔梗

芍藥 甘草 炙各二兩

右十味切以水八升煮取三升分溫三服日三服不耐青茶

香者以犀角一兩代之忌海藻菘菜猪肉醋物生葱等

又凡厥心痛與背相引喜痠癢如物從後觸其心身偃僂者腎心痛也

厥心痛腹脹滿心痛尤甚者胃心痛也

厥心痛痛如錐鍼刺其心痛甚者脾心痛也

厥心痛色蒼蒼如死灰狀不得太息者肝心痛也千金

厥心痛卧若從^靜心間痛動作痛益甚色不變肺心痛也

真心痛手足^清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

心腹中痛發作種聚行來上下痛有^休止腹中熱喜涎出是蛇

蟲咬也出甲乙經第一卷中

千金療心腹中痛發作種聚往來上下痛有休止多^熱喜涎出是蛇蟲咬也並宜溫中當歸湯服兩三劑後若不効有吳宜改方增損湯其溫中當歸湯在前小品方中此是增損湯方

芍藥 黃芩 厚朴 桔梗

柴胡 當歸 升麻

右七味切以水八升煮取二升半分三服忌猪肉出第十三

卷中

張文仲療蛔蟲心痛鶴蟲散方

鶴蟲二分末温酢一盞和服之蟲當出備急千金同

又乾漆丸方

乾漆熬搗蜜和丸服十五丸日再備急同

又方

取槐上木耳燒灰末如棗大正發和水服若不止飲熱水一升蛔蟲立出心効方云酒下備急同

又方

發時取鹽一匕內口中水下立定蟲即出備急同出
第一卷中

延年療蛔蟲吐水心痛鶴丸方

鶴丸三兩搗篩蜜和為丸用蜜漿水平旦服二十九

日只一服各依前不相妨禁肉者不服則得食右今用十兩去草雲連心病十年不便蓋方內見令服之便蓋

又鶴蟲丸療蛔蟲心痛方

鶴蟲兩 吳茱萸兩五 橘皮兩四 桂心兩三

檳榔兩四

右五味搗篩蜜和為丸如梧子大一服二十九蜜湯下日二

服加至三十九以蟲出為度忌生葱出第十五卷中

救急療心痛不可忍似蛔者胡粉丸方

生真胡麻合 胡粉半合

右二味先以猪肉脯一片空腹啖嚥汁勿嚥肉後取胡粉和胡

麻搜作丸以少清酒使成頓服盡十歲以上斟酌增減忌生

冷猪肉魚雞蒜酢滑等七日若是蛔吐水者是也出第八卷中

必効療蛔俗心痛方

取鱖鱧魚淡炙令熟與患人喫一二枚永差飽食彌佳
又方 熊膽如大豆和水服大効

又茱萸丸方

吳茱萸升 桂心二兩 當歸二兩

右三味搗篩蜜和丸如梧子酒服三十九日再服漸加至四十九丸以知為度忌生葱

又丁香散方

丁香枚 賴髮灰一棗許

右二味並末和酒服之

又鶴虱檳榔湯方

鶴虱二兩小兒用一兩 大腹檳榔二七枚碎皮子

右二味以猪肉汁六升煮檳榔取三升去滓肉鶴虱末先夜不食明旦空腹頓服之須臾病下及吐水永差神効七日禁生

冷酢滑高大處並出第五卷中

冷氣心痛方五首

廣濟主冷氣心痛助下鳴轉喉中妨食不多消常生食氣每食心頭住不下桔梗散方

桔梗 當歸 芍藥 茯苓

橘皮 厚朴炙 白朮炙 葶撥四

豈菟子四 檳榔八分 桂心六分 訶梨勒皮六分

右十二味搗篩為散空腹煮薑棗飲服方寸匕日二服加至一匕半
不利忌生葱猪肉酢物桃李雀肉等出第四卷中一方有枳實不用桔梗
深師療胃滿短氣心痛吐虛冷防風茯苓湯方

防風二兩 茯苓二兩 桂心七兩 甘草二兩炙

半夏洗四兩 乾薑炮四兩 人參三兩

右七物切以水一斗煮取三升絞去滓分三服良忌酢物生

葱海藻松菜羊肉錫出第十六卷中

崔氏療心痛與冷氣痛者特相宜烏頭丸方

烏頭炮三兩 附子炮三兩 赤石脂兩三 蜀椒閉口者汗兩 桂心兩二 乾薑兩二

右六物搗篩蜜和為丸痛發時溫清酒服三丸如梧子覺至痛處痛則止若不止加至五六丸以知為度若早朝服無所覺至午時又服三丸晚又服三丸此方丹陽有隱士出山云得華他法其療略同他云若久心痛每且服三丸稍加至十丸盡一劑遂終身不發忌生葱豬肉張文仲備急同出第四卷中

延年療冷氣又刺心痛不能食方

當歸 桂心 吳茱萸 桔梗 人參 白朮 高良薑上五 橘皮分三

右八味搗篩為散蜜和為丸如梧子大一服十九酒下日二服加至十五二十九為度忌生葱桃李猪肉雀肉等又療心痛冷痛腹滿如錐針刺及蟲嚙心痛當歸湯方

當歸兩三 桔梗兩二 吳茱萸兩二 桂心兩二 芍藥兩二 大黃兩二

右六味切以水六升煮取三升三合去滓內鶴蝮一兩攪溫一沸分三服空腹服之微利為度忌猪肉生葱出第十五卷中 惡症心痛方三首

廣濟療惡症撮助連心痛當歸湯方

當歸分八 青木香分六 白桉榔十顆 麝香一銖

右四味切以小便一大升半煮取六六合絞去滓下麝香末分溫三服服別如人行四五里進一服微微利忌生葱蒜麩猪犬肉粘食蒜陳臭物出第四卷中

崔氏療症在心腹痛不可忍方

取東引桃枝削去蒼皮取白皮一握以水二大升煮取半升一服令盡則差如不定更依前服之無忌又療心腹痛不可忍似疰病者或暴得惡疰攪刺欲死桃人大黃湯方

鬼箭羽二兩 挑人六十枚去皮尖兩人 芍藥四兩 鬼臼三兩削去皮

橘皮二兩 當歸二兩 生薑五兩 桂心二兩

柴胡二兩 朱砂一兩研湯成下 麝香一分研湯成下 朴消一兩研湯成下

大黃三兩麤切別浸湯飲熟內之

右十三味切以水九升急火煮取三升温分三服如人行相去六七里服但得快利三四行必差忌生冷葱生血物並出第

心痛癥塊方二首

唐濟療心痛癥塊硬築心氣欲絕當歸湯方

當歸 桔梗 芍藥八兩 厚朴十兩

橘皮八兩 人參六兩 高良薑八兩 桃人五十枚去皮尖兩人

生薑八兩

右九味切以水八升煮取二升五合去滓分温三服服別相去如人行六七里進一服不利忌猪肉生冷油膩雞魚粘食小豆大蒜出第四卷中

張文仲療心下堅痛大如椀邊如旋音如 鱒名為氣分水飲所結牙

枳實七枚炙 白朮三兩

右二味切以水一斗煮取三升分三服腹中軟即當散也備急肘後同忌桃李雀肉等出第一卷中此張仲景傷寒論方

心背微痛方四首

仲景傷寒論心痛微背背痛徹心馬頭赤石脂丸主之方

烏頭一分炮 附子一分炮 赤石脂二分 乾薑二分
蜀椒一分

右五味搗篩蜜和丸先食服如麻子大一服三丸少少加之
忌猪肉冷水千金必效文仲范汪經心錄等同出第十五卷中
千金分 兩小別

張文仲蜀椒丸療胃中氣滿心痛引背方

蜀椒一分 半夏一分 附子一分

右三味搗篩蜜和為丸如梧子大一服五九日三忌猪羊肉
錫等出第三卷中

范汪療心下切痛引背胃下畜氣在胃中有宿食菜羹煎方

成擇吳茱萸一分切 蜀椒五分 甘草二分

乾地黄一分

右四味以清酒三升漬三宿絞取汁銅器中煎令沸麥門冬

五升去心乾漆一斤咬咀內煎中色黃絞去之內成擇六安

石斛五兩阿膠一斤白蜜六升凡九味以湯煎令可丸取如

棗大含稍稍咽之日三甚者日五六服藥溫中下氣稍益體
中病膝膈重痛者加石斛少氣加麥門冬服藥五日愈當下

癢奉車都尉陳蓋試有驗忌海藻松菜蕪荑等
又芫花湯主卒心痛連背背痛徹心心腹並懊痛如鬼所刺絞
急欲死者方

芫花分 大黃分

右二味搗下篩取四方寸匕著二升半若酒中合煎得一升
二合頓服盡須臾當吐吐便愈老小從小起此療強實人良
若虛冷心痛恐未必可服並出第十八卷中

卒心痛方一十四首

肘後療卒心痛方

又方

先煮三沸湯一升以鹽一升合攪飲之若無火以作湯仍可用水鹽或半升服之古今錄驗同

吳茱萸_{二升} 生薑_{四兩} 豉_{一升} 酒_{六升}

右四味煮取二升半分三服

又方

白艾成熟者三升以水三升煮取一升去滓頓服之若為寒氣所中者當吐蟲物出范汪同

又方

取龜下熟灰篩去炭分以布囊盛令灼灼爾更番以熨大痛上冷者更熱令熱

又桂心散方

桂心_{一兩} 當歸_{各一兩} 梔子_{人_{十四}枚}

右三味搗為散酒服方寸匕日三五服亦主久心痛發作有時節者已心生葱

又桂心丸方

桂心_{一兩} 烏頭_{炮_{一兩}}

右二味搗篩蜜和為丸如梧子服三丸稍增之忌生葱猪肉又療暴得心痛如刺苦參湯方

苦參_{二兩} 龍膽_{二兩} 升麻_{三兩} 梔子_{人_{三兩}擘}

右四味切苦酒五升煮取一升分二服當大吐乃差並出第一卷中

集驗卒心痛桂心湯方

桂心_{八兩}

右一味以水四升煮取一升半分二服肘後范汪千金同忌生葱出第一卷中

張文仲療卒心痛方

取敗布裏鹽如彈子燒令赤末以酒一杯和服之肘後備急同出第五卷中

又方

閉氣忍之教十過并以手大指按心下宛宛中取差肘後備急同

又方

苦酒一升破雞子一枚煮中合攪飲之好酒亦佳肘後備急范汪同

又方

蒸大豆苦煮之以裏盛更番熨心上冷復易之肘後同並出第十卷中

救急療卒心痛不能起止方

井華水一大升 蜜半合

右二味相和婦人患令男度與飲男患令婦人度與飲必愈出第八卷中

必効療卒心痛人參湯方

人參 桂心 梔子擘 黃芩

甘草略炙

右五味切以水六升煮取二升分三服則愈奇効已心海藻松菜生葱心肘後同出第五卷中

中西心痛方五首

廣濟療卒中覓心腹絞刺痛氣急脹奄奄欲絕瓜蒂散方

雄黃研兩 赤小豆熬四分 瓜蒂三分

右三味搗篩為散空肚溫漿水服一錢匕半當吐止不吐加至兩錢匕忌生冷油膩粘食陳臭等

又療卒中惡心腹刺痛去惡氣麝香散方

麝香研一分 生犀角一分 青木香一分

右三味持節為散空肚以熟水服方寸匕立愈未止更服之不利忌五辛並出第四卷中

集驗療卒暴心痛或中惡氣毒痛不可忍方

大黃兩四 芍藥兩四 升麻兩三 黃芩兩三
鬼箭兩三 鬼臼兩二 桂心兩二 桔梗兩三
柴胡兩四 朱砂別研兩二 朴消兩二

右十一味切以水九升煮取二升七分三服先分朱砂作三分一服內一分攪朱砂調服之此湯快利若痛不止宜服後方忌猪肉生葱生血物千金同千金云寒氣卒客於五藏六腑中則發心痛方又方

赤芍藥兩六 桔梗兩五 杏仁三兩去尖

右三味切以水六升煮取二升半分三服日三忌猪肉千金同出第一卷中

千金療卒中惡心痛方

苦參切兩三 好醪醋半一升

右二味以醋煮苦參取八合強人類服老小二服出第三卷中

多唾停飲心痛方二首

病源心痛而多唾者停飲乘心之絡故也停飲者水液之所為也心氣通於口心與小腸合候象大小腸心之腑也其水氣下行於小腸為溲便則心絡無有停飲也膀胱與腎俱象水膀胱為腎之腑主藏津液腎之液上為唾腎氣下通於陰若腑藏和平則水液下流宣利若冷熱相乘致腑藏不調津液水飲停積上迫於心令心氣不宣暢故痛而多唾也出第十六卷中

范汪療背脊中寒熱心痛清唾滿口救救欲吐食不化乾薑丸方

乾薑一分 桂心一分 礬石一分今欲蒸 半夏湯洗

蜀椒一分去閉口

右五味擣篩蜜和丸如大豆許服二九月三不知稍加以知為

度忌生葱羊肉飭出第十八卷中

集驗療心痛唾多似蟲者方

取六畜心隨得生切作四瓣刀縱橫各一割破之內

少真珠砂著中平旦吞之蟲死愈矣無真珠砂可用

雄黃麝香也肘後經心錄同出第一卷中射後云切作

橫各割之以真丹一兩粉力割

中旦悉吞之入推黃麝香作

病源心與小腸合為表裏俱象於火而火為陽氣也心為諸藏

主故正經不受邪若為邪所傷而痛則死若支別終為風邪所乘

而痛則經久成疔其痛懸急心懊者是邪迫於陽氣不得宣暢擁

瘀生熱故心如懸而急煩懊痛也出第十六卷中

仲景傷寒論心下懸痛諸逆大瘧者桂心生薑枳實湯主之方

桂心兩 生薑兩 枳實五枚炙

破四片

右三味切以水六升煮取三升去滓溫分三服忌生葱范汪

同出第十五卷中

肘後薑附丸方

附子二兩炮 乾薑兩

右二味擣篩蜜和丸如梧子服四丸酒飲並得日三服忌猪

肉冷水出第一卷中本方云治心

肺傷動冷痛

古今錄驗療人心痛懊懷惛悶築築引兩乳或如刺困極桂

心湯方

桂心兩 茱萸兩 芍藥兩 當歸兩

生薑乾薑無生薑以
右五味切以水一斗二升煮取四升服一升晝三夜一良有驗
忌生葱出第八卷中

千金心下痞諸逆懸痛桂心三物湯主之方

桂心兩 膠飴半 生薑兩

右藥切以水四升煮二味取三升去滓內飴分三服忌生葱
出第十三卷中

心痛不能飲食方二首

病源心痛而不能飲食者積冷在內客於脾而乘心絡故也心
陽氣也冷陰氣也冷乘於心陰陽相乘冷熱相擊故全痛也脾
主消水穀冷氣客之則脾氣冷弱不勝於水穀也心為心脾為
土是母子也俱為邪所乘故痛復不能飲食也出第十六卷中
廣濟療心刺肋冷氣結痛不能食高良薑湯方

高良薑分 當歸分 橘皮分 厚朴分

桔梗分 桃人五枚 吳茱萸分

生薑分 訶梨勒分

右九味切以水八升煮取二升八合絞去滓分溫三服服別相
去如人行六七里再服忌猪肉桂冷油膩粘食小豆等出第

四卷中

肘後療常患心痛不能飲食頭中疼重烏頭丸方

烏頭分 椒分 乾薑分 桂心分

右四味擣末蜜丸酒服如大豆四九稍稍增之忌生葱出第
一卷中

久心痛方六首

病源心為諸藏主其正經不可傷傷之而痛者則朝發夕死夕
發朝死不暇展療其人心痛者是心之支別絡為風邪冷熱所

乘痛也故成疔不死發作有時經久不差也出第十六卷中
廣濟療心痛三十年不羣月上旬殺蟲雷丸鶴虱散方

雷丸分
鶴虱分
貫衆分
狼牙分
桂心分
當歸分
檳榔人分

右七味搗篩為散空腹真蜜水半雞子許服方寸匕日二服
若重不過三服則差不利忌生葱生冷油膩猪魚小豆大蒜
等出第四卷中

范汪療久心痛烏頭赤石脂丸方

赤石脂
乾薑
桂心
烏頭炮
椒汗去開口
者淚日汗

右五味等分末之蜜和丸如梧子服三九日三以知為度亦
石脂當取斑斑赤中者忌猪肉冷水生葱出第十八卷中
必効療三十年心痛方

右一味研湯水合類眼酒服亦良時後經心錄同出第五卷中
古今錄驗療久心痛腹痛積年定不過一時聞遠發發甚則數
日不能食又便出乾血窮天下方不差甄立言為處犀角丸服
之數日則差方

犀角二分
麝香二分
朱砂四分明者研
桔梗二分
莽草二分
鬼臼二分
附子炮分
桂心分
貝齒五枚
甘草分
芫花熬分
巴豆去心皮二十枚
赤足蜈蚣足天二枚去

右十三味搗篩蜜和丸如梧子飲服一九日一漸加至三九
以利為度忌生葱猪肉野猪肉蘆筍生血物出第八卷中
一方無附子全有雄黃二分
療心痛如蟲齧痛宛轉欲不救方

又濃搗地黃汁和麪作冷淘不用鹽服一頓蟲即出
不出再服必出便若正元十年通事舍人律抗女患
心痛垂氣欲絕忽記此方服便吐出一物可方一寸以
來狀如蝦蟇無目是微似有口蓋被此物所蝕抗云往
年見親表患心痛因偶食地黃餅餽遂吐一蟲猶動
其時亦不謂地黃冷淘能害此蟲因盛於小竹筒正
食緣其上便以數莖地黃冷淘投於竹筒中須臾
之已化為水然覺此冷淘殺蟲心痛無不求絕緣自
得此方救三四人皆如神効出手抄方

經心錄療四十年心痛不差方

黍米潘汁溫服隨多少出第一卷中

雜療心痛方三首

廣濟療心痛又心撮肋心悶則吐血手足煩疼食飲不入桃人

丸方

桃人八分去皮兩分當歸六分為藥八分訶梨勒六分
甘草六分延胡索四分人參六分檳榔人枚
右八味搗篩蜜丸如梧子以酒空腹下二十丸漸加至三十
九月再服取快利忌海藻菘菜生菜熱麪蒼麥猪犬肉粘
食出第四卷中

右今錄驗真心痛論手足清至節心痛甚者旦發夕死夕發
旦死療心痛痛及已死方

高其枕桂其膝欲冷腹皮感柔後其臍上五寸胃管
有頃其人患痛短氣欲令人舉手者小舉手問痛差
緩者止出第八卷中

救急療心痛冷熱方

取狀龍肝末莫水服方寸匕若冷以酒和服差范汪

吳茱萸^{兩二} 甘草^炙 人參 桂心^{各一}

生薑^{兩五} 半夏^{洗一升} 小麥^{升一} 當歸^{兩二}

右八味切以水一斗五升煮取三升分溫服一升日三服忌

海藻松菜羊肉飭生葱出第一卷中 干薑^{切一升}

古今錄驗芎藭湯療卒寒腹中拘急痛方

芎藭 當歸 桂心 芍藥

甘草^炙 黃芩^{兩半} 乾薑^{兩半} 杏仁^{三十枚去皮}

右八味切以水五升煮取二升分再服忌海藻松菜生葱出

第八卷中

卒 此枚少者以枚之心

肘後療卒腹痛

梗牙^升

右一味以水六升煮取六七沸飲之

掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之差並出第

一卷中

張文仲療卒腹痛方

令病人卧高枕一尺許柱^{挂膝}漆便腹皮踈氣入脊令

人瓜其齊上三寸便愈能乾咽吞氣數十過者彌

佳亦療心痛肘後備急同

又方

灸兩足指頭各十四壯使^火俱下良備急肘後同並

出第一卷中

千金療背腹中卒痛生薑湯方

生薑^{取汁} 食蜜^兩 醎^{胡兩四}

右三味微火上耗令相得適寒溫服三合日三出第十六卷中

吳茱萸^{兩二} 甘草^炙 人參 桂心^{各一}

生薑^{兩五} 半夏^{洗一升} 小麥^{升一} 當歸^{兩二}

右八味切以水一斗五升煮取三升分溫服一升日三服忌

海藻松菜羊肉錫生葱出第一卷中生薑切一升

古今錄驗芎藭湯療卒寒腹中拘急痛方

芎藭 當歸 桂心 芍藥

甘草^炙 各^兩 黃芩^{兩半} 乾薑^{兩半} 杏仁^{三十枚去皮尖兩人熬}

右八味切以水五升煮取二升分再服忌海藻松菜生葱出

第八卷中

卒腹痛方七首

肘後療卒腹痛方

粳米^{升二}

右一味以水六升煮取六七沸飲之

掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之差並出第一卷中

張文仲療卒腹痛方

令病人卧高枕一尺許柱^{桂膝}溲便腹皮踈氣入背令

人瓜其^臍上三寸便愈能乾咽吞氣數十過者彌

佳亦療心痛肘後備急同

又方

灸兩足指頭各十四壯使火俱下良備急肘後同並出第一卷中

千金療背腹中卒痛生薑湯方

生薑^{取汁搏} 食蜜^兩 醴醐^{兩四}

右三味微火上耗令相得適寒溫服三合日三出第十六卷中

經心錄同出第八卷中
腹痛方四首

病源腹痛者由肺藏虛寒冷之氣客於腸胃募原之間結聚不散正氣與邪氣交爭相擊故痛其有冷氣搏於陰經者則腹痛而腸鳴謂之寒中是陽氣不足陰氣有餘者也診其寸口脈沈而緊則腹痛尺脈緊臍下痛脈沈遲腹痛脈來觸觸者少腹痛脈陰弦則腹痛丸腹急痛此裏之有病其脈當沈若細而反浮大故當愈矣其人不可愈者必當死以其病與脈相反故也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云
肢腫手臂痛法屈一脛臂中所痛者正偃卧口鼻閉氣腹痛以意推之想氣往至痛上俱熱即愈又云偃卧展兩脛兩手仰足指以鼻內氣自極七息除腹中弦急切痛又云偃卧口內氣舉出之除裏急飽附氣數十令温中寒乾吐嘔腹痛口內氣七十

所人振腹咽氣數十兩手相摩令熱以摩腹令氣下出第十六卷中

張文仲當歸大黃湯療冷氣牽引腰背肋下腹內痛方

當歸

芍藥

桂心

乾薑

大黃

人參

大黃

甘草

右八味切以水六升煮取三升去滓温服一升日三忌海藻

菘菜生葱出第三卷中

范汪四味當歸湯主寒腹痛方

當歸

桂心

乾薑

甘草

右切以水八升煮取三升一服一升日三服虛冷激痛甚者

加黃耆芍藥各二兩忌海藻菘菜生葱出第十五卷中

無甘草有附子一兩

小品療寒冷腹痛菘菜湯方

集驗療卒腹痛葛氏方

桂末三七酒服人參上好乾薑亦佳忌生葱肘後文仲

又方

食鹽一大把多飲水送取吐肘後張文仲同並出第卷中
心腹痛及脹滿痛方一十首

病源心腹痛者由腑藏虛弱風寒客於其間故也邪氣發作與
正氣相擊上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛上下相攻故心
腹絞痛氣不得息諒其脈左手寸口人迎以前脈手少陰經也
沉者為陰陰虛者病苦心腹痛難以言心如寒狀心腹痛痛不得
息脈細小者生大豎疾者死心腹痛脈沉細小者生浮大而疾者
死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引
法云行大道常度日月星辰清靜以難鳴安身卧漱口三咽生
調五藏殺蟲出軀令人長生療心腹痛出第十六卷中

廣濟療心腹中氣時時痛食冷物則不安穩及惡水桔梗散方

桔梗 茯苓各八分 枳實炙 人參
厚朴炙 芍藥 橘皮各六分 桂心五分
檳榔人參 麥門冬八分

右十味搗師為散空肚者薑棗末飲服方寸匕日三服漸加
至一口半熱以茶飲下不利忌猪肉酢物生葱生冷油膩小豆
粘食熱麪炙肉等物

又療卒心腹痛氣脹滿不下食欲得瀉三兩行佳當歸湯方

當歸 茯苓 桔梗 橘皮
高良薑 檳榔人參 生薑

右七味細切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服
別相去如人行六七里服訖利三兩行宜停後服忌猪肉酢物
生冷油膩魚蒜粘食小豆並出第十五卷中

肘後療心腹俱脹痛煩滿短氣欲死或已絕方

枳子枚十枚 豉綿裹七合

又方 右二味以水二升先煮豉取一升二合去滓內枳子更煎取八合絞去滓服半升不愈者盡服之備急文仲同

烏梅二七枚水五升煮一沸內青大錢二七文煮取一升半強人可類服羸人分再服當下愈文仲同

又方

茱萸兩二 生薑切兩 豉綿裹三合

右三味酒四升煮取二升分三服即差

又療心腹相連常脹痛狼毒丸方

狼毒灸兩 附子炮兩

右二味搗篩蜜和丸服如梧子一日服一九二日二九三日三

九再一九至六日服三九自一至三以為常服即差當避食忌

猪肉冷水

又方

吳茱萸合 乾薑分四 附子炮二分 細辛分二

右五味搗末蜜和丸如梧子服五丸酒飲並得日三忌猪肉生菜等並出第一卷中

深師療久寒冷山月膈滿心腹微痛不能食茹心乏吸吸不足前胡湯方

前胡兩一 羊脂兩二 大棗枚二十 當歸兩一

茯苓兩一 白朮兩一 芍藥分六 桂心兩一

半夏洗兩 乾薑兩一 麥門冬去心分六 吳茱萸粒三百

右十二味切以水八升煮取三升分三服相去如人行十里進一

服忌酢物生葱羊面錫桃李雀肉等出第十七卷中
小品當歸湯療心腹微痛諸虛冷氣滿方

當歸三兩 乾薑四兩 甘草二兩 芍藥三兩
厚朴三兩 黃耆二兩 蜀椒汗一兩 半夏三兩
肉桂兩 人參兩

右十味切以水一斗煮取三升二合強人可一升高麗人服八合
大冷者加附子一枚炮忌海藻菘菜羊肉錫生葱古今錄驗
千金同

右今錄驗通命九療心腹積聚寒中絞痛心迫滿脅下
痛方

大黃 遠志心去 黃芩 麻黃節去
甘草炙已上 芒消三兩 杏仁六十枚去 豉工合
巴豆五十枚去心 皮熬別為脂

右九味持合下篩蜜和丸如梧子大先食飲服三九日三忌
野猪肉蘆葦海藻菘菜出第八卷中

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

病源心腹脹者藏虛而邪氣客之乘於心脾故也足太陰脾之
經也脾虛則脹足少陰腎之經也其脈起於足小指之下循行
上絡膀胱其直者從腎上入肺其支者從肺出絡於心藏虛邪
氣客於三經與正氣相搏積聚在內氣并於脾胃脾虛則脹故
令心腹煩滿氣急而脹也詠其詠遲而滑者脹滿也其湯射針
石別有正方補養宣導令附於後養生方導引法云伸右脛屈
左膝內壓之五息引脾去心腹寒熱肖臆邪脹依經為之引脾
中熱氣出去心腹中寒熱肖臆中邪氣脹滿久行之無有寒熱
時節之所中傷名為直父之方出第十六卷中
廣濟療心腹脹滿臍下塊硬如石疼痛不止為藥丸方

芍藥

當歸

白朮

鼈甲各八分

訶梨勒核去乾薑

人參各六分

豆蔻

雄雀屎各四分 郁李人去皮十分

右十味搗篩蜜和為丸如梧子大空肚以酒下二十九漸加至三十九日再服不吐不利忌生菜熟麪人苽桃李雀肉蒜粘食等物

又療鼓脹氣急衝心硬鼈甲丸方

鼈甲炙

芍藥

枳實炙

人參

檳榔炙

訶梨勒

大黃各六分

桂心四分

橘皮四分

右九味搗篩為末蜜和為丸空肚以酒服如梧子大二十九漸加至三十九日二服微利為度忌生菜苽肉蒜麪等

又療鼓脹氣急通草湯方

通草

茯苓

玄參

桑白皮

白薇

澤瀉各三兩 人參二兩

郁李人五兩

澤漆葉切一升

右九味切以水一斗煮取三升去滓分温四服服別相去如人行六七里進一服不利忌熱麪油膩酢粘食等

又療鼓脹上下腫心腹堅強喘息氣急連陰腫坐不得仍下赤黑血十日夜不停者茯苓湯方

茯苓二兩 防己一兩 橘皮一兩 玄參一兩

黃芩一兩

澤瀉一兩

杏仁二兩

白朮一兩

大豆一升

郁李人二兩

桑白皮二兩

澤漆葉切一升

猪苓一兩

茯苓一兩

杏仁二兩

白朮一兩

右十三味切以水一斗先煮桑白皮大豆澤漆葉取五升去滓

澄去下淀內諸藥煎取二升絞去滓分三服效者加五

味子二兩停二日服一劑忌酢物桃李雀肉熱麩蒜炙肉粘
食油膩等茯苓一云茯苓

又療患久心痛腹滿并瘦飲不下食人參丸方

人參

白朮

枳實

茯苓

厚朴六分

青木香六分

橘皮五分

大黃六分

檳榔六分

右九味搗篩蜜和丸空腹煮生薑棗湯下如梧子二十九日

二服漸加至二十九不利忌酢物桃李雀肉等

又療心腹脹滿柴胡厚朴湯方

柴胡

厚朴十分

茯苓

橘皮

紫蘇各八分

生薑十二分

檳榔五分

右七味切以水七升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別

相去如人行六七里進一服微利忌酢物生冷油膩粘食

又療心腹脹滿腹中有宿水連兩肋滿悶氣急衝心坐不得
郁李人丸方

郁李人

牽牛子六分

甘遂四分

防葵三分

菴蘭子

桑白皮

檳榔一分

橘皮

澤瀉各二

茯苓

澤漆葉炙

杏仁去尖兩人

右十二味稱節蜜和丸空肚飲服如梧子五丸日二服服別一

丸微利為度忌酢物生冷油膩熱麩炙肉蒜等

又療患心氣發心腹脹滿兩肋氣急紫蘇湯方

紫蘇

訶梨勒皮

當歸

生薑各八分

人參六分

檳榔十顆

生地黃汁

右七味切以水六升煮六味取二升絞去滓下地黃汁分溫

三服服別如人行四五里溫進一服利三兩行忌無美生菜

熱麩炙肉魚蒜粘食陳鼻等並出第二卷中

深師齊腹脹滿彭彭逆害飲食煩熱不得卧流汗厚朴湯方

厚朴炙

桂心

為藥

半夏洗各三兩

枳實三枚

甘草炙二兩

麥門冬去心

黃芩各一兩

乾薑二兩

右九味切以水一斗煮取二升半絞去滓服八合日三小便難加木三兩人參四兩忌生葱海藻菘菜羊肉饒出第十

六卷中

千金厚朴七味湯主腹滿氣脹方

厚朴半斤

甘草炙

大黃各三兩

大棗擘十枚

枳實五枚

桂心一兩

乾薑五兩

右切以水一斗煮取五升去滓內大黃取四升服八合日三

嘔者加半夏五合利者加大黃寒加生薑至半斤忌海藻菘菜生葱羊肉饒出第十六卷中此本中景傷寒論方

集驗療胃滿有氣心腹脹中冷半夏湯方

半夏洗一升 桂心四兩 生薑八兩

右三味切以水七升煮取二升絞去滓通寒温飲七合忌羊

肉饒生葱等出第六卷中

古今錄驗消化丸療人腹脹心滿腸胃結食不消化嘔逆頭痛

手足煩疼此方出太醫執藥常用芫花丸方

芫花一兩 大黃 葶藶子熬 甘遂

黃芩各二兩

巴豆四十枚

消石二兩

右七味搗合蜜和丸如梧子先食服三九日再服一方無消

石已心野猪肉蘆薈等出第十卷中

必効青木香丸主氣滿腹脹不調不消食兼冷方

青木香六分 檳榔八分 大黃十二分 芍藥五分

訶梨勒五分 枳實五分 桂心四分

右七味搗篩蜜和丸如梧子飲服十五丸左側漸漸常加以
利為度不限丸多少不利者乃至五十九亦得韓同識
頻服大效古今常用忘生葱

又療腹脹滿堅如石積年不損者方

取白楊東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃酒五
升淋訖則以絹袋盛滓還由酒中蜜封再宿每服一
合日三並出第二卷中
卒心腹脹滿方六首

時後療卒心腹煩滿方

劉蕙苡根濃煮取汁服三升

又方

黃芩一 杏仁二十枚去尖 牡蠣一兩
右三味切以水三升煮取一升頓服之

又方

灸兩手大姆指內邊爪後第一文頭各一壯又灸兩
手中央長指爪下一壯愈肘後此方承治卒吐逆

此本在雜療中其病亦是痰飲霍亂之側兼宜依霍亂條中
法療之人乎居有患者亦少皆因他病兼為之耳或從傷寒後
未復或從霍亂吐下後虛躁或是勞損服諸補藥痞滿或觸寒
熱邪氣或食飲協毒或服藥失度並宜各循其本源為療不得
專用此法也並出第一卷中

備急療卒心腹脹滿又背脊痛欲死方

熱者煮湯令灼灼爾以漬手足冷則易祕之時後張文仲同

又桂心散方

枳實炙 桂心
右二味等分下篩以米汁服一匕忘生葱肘後張文仲同並

出第一卷中

救急療卒患心腹脹滿刺痛方

生薑大有功能遠行宜將自隨者其汁服良患久痢虛損嘔逆不下食見食則吐取三兩細切搗絞取汁微煖點少多蜜頓一服則下食大効出第七卷中

腹脹雷鳴方三首

范汪療腹中寒氣腹雷鳴切痛背脊逆滿附子粳米湯方

附子一枚炮半夏半升洗甘草一兩大棗十枚粳米半升

右五味切以水八升煮米取熟去米內藥煮取三升絞去滓

適寒溫飲一升日三仲景傷寒論同集驗加乾薑二兩心海

藻菘菜猪羊肉錫出第十五卷中

延年療患腹內氣脹雷鳴背脊痛方

丹參 枳實各三兩 桔梗二兩 白朮

芍藥略二兩 生薑四兩 檳榔一枚

右七味細切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服忌猪肉

桃李雀肉生冷油膩魚蒜等出第十五卷中

又丹參湯療腸鳴發則覺作聲方

丹參 茯苓各三兩 桔梗二兩 生薑四兩

細辛 厚朴炙 食茱萸各二兩

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服每服如

人行七八里忌生菜猪肉酢物出第四卷中

腹內諸氣及脹不下食方一十一首

廣濟療腹內諸氣脹滿昆布散方

昆布 海藻 人參 玄參

橘皮 升麻各三兩 芎藭 桂心

乾薑各二一升大醋一升半清
小麥之一宿出暴醋盡也
右十味搗篩為散別搗小麥作散合藥散一處更搗干杵酒
服方寸匕日三服漸加至二匕不利忌熱麪炙肉生葱蒜粘食
等物

又療冷氣意以人飯粥方

研細代意以人炊為飯氣味欲勻如麥飯煮粥亦好致
漿粥並任意無所忌

又療氣蘇子粥方

蘇子不限多少研如麻子作粥依食法著葱心豉薑並
得無所忌

又療氣膀胱急妨宜下氣方

蕪荑搗和食鹽末令調以綿裹如棗大內下部久時
或下惡汁并下氣佳無所忌

又療氣昆布腫法

高麗昆布一斤白米泔汁浸一宿洗去鹹味以水一斗
煮令白熟擘長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切
斷擘之更合熟煮令昆布極爛仍下鹽酢豉蒜調和
一依腫法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調和宜食
粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大効無所忌

又療心頭冷硬結痛下氣檳榔湯方

檳榔十顆合 生薑 青木香各三 橘皮
枳實炙 甘草炙 大黃各二

右七味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服服別如
人行四五里進下服取微利忌生菜熟麪炙肉海藻松菜等
又療一切氣妨則不能食檳榔丸方

檳榔散 芍藥五 枳實七枚 人參五

大黃分十六 青木香分六 桂心分四

右七味搗篩蜜和丸空腹服如梧子二十九日再服漸加至二十五丸微洩為度忌生菜熱麪炙肉蒜粘食生葱等物

又療氣小芥子酒方

小芥子一升搗碎以絹袋盛好酒二升浸之七日空腹溫服三合日二服漸漸加之以知為度酒盡旋旋添之無所忌

又療久患氣脹烏牛尿方

取烏牛尿空心溫服一小升日一服氣散則止無所忌並出第二卷中

近効燒鹽通一切氣尤療風方

取鹽花以生麻油和之以濕布一片急裹以繩子繫如打牆鎚許大置瓦子上以炭大四面燒望之如火氣訖

更勿加炭待火盡訖吹扇去灰收取鹽搗破如患心腹脹滿氣隔不通取芥子大含之立差如黃訶梨勒檳榔及茶湯用此鹽療一切病葦特進用之極効驗又訶梨勒丸療氣脹不下食尤除惡氣方

訶梨勒 青木香

右二味等分搗篩融沙糖和衆手一時捻為丸隨意服之氣甚者每服八十九日再稍輕者每服四五十九則得性熱者以生牛乳下性冷者以酒下不問食之前後禮部蕭郎中處得云自服大効

灸諸脹滿及結氣法二十二首

千金療臏脹脅腹滿法

灸膈俞百壯三報宛在第七椎下兩傍各一寸半翼同

又療脹滿水腫法

又療脾俞隨年壯穴在第十一椎下兩傍各一寸半翼同

又療大腸俞百壯三報穴在第十六椎下兩傍各一寸半翼同

又療脹滿雷鳴酒沸法

灸胃管穴在心鳩尾下三寸灸百壯三報之翼同

又療脹滿繞臍結痛堅不能食法

灸中守百壯穴在脊上一寸一名水分翼同

又療脹滿癥聚帶下痰痛法

灸氣海百壯穴在臍下一寸半忌不可針翼同

又療脹滿結氣如水腫狀小腹堅如石法

灸膀胱募百壯穴在中極齊下四寸翼同

又療脹滿腎冷癥聚泄痢法

灸天樞百壯翼同銅人經天樞二穴俠臍二寸

又療冷脹胃滿心腹積聚痞疼痛法

灸肝俞百壯穴在第九椎下兩傍各一寸半翼同

又療五歲六腑積聚脹滿羸瘦不能飲食法

灸三焦俞隨年壯穴在第十三椎下兩傍各一寸半

翼同並出第十六卷中

又療結氣法

扁鵲曰第四椎下兩傍各一寸半名闕俞主胃中膈氣灸隨年壯

又主心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄痢法

灸太倉穴一名田畝在心下四寸胃管下一寸灸百壯又主結氣囊裹針藥所不及法

灸膏肓二穴在從乳頭邪度至臍中屈去半從乳下行
度頭是多隨年壯銅人胸穴依法量度及得日月膽募之穴然主療別禁募期門穴在乳上五分然五療與此頗同
又凡臍下撒痛流入陰中發作無時此冷氣療之法
灸臍下三寸名關元百壯

又療短氣不語法

灸肘後兩筋間名天井百壯

又方 灸大椎隨年壯

又方 灸肺俞穴在第三推兩傍各一寸半百壯

又方 灸肝俞第九椎百壯

又方 灸尺澤百壯

又方 灸手十指頭各十壯

又方 灸小指第四指間交脉上七壯

又少年房室多短氣者法

灸鳩尾頭五十壯並出第十七卷中

灸脊痛及妨悶方四首

病源脊骨痛者由膽與肝及腎之支脉唐為寒氣所乘故也足少陽膽之經也其支脉從目兌貫背下行至脊循脊裏足厥陰肝之經也其支脉起足大指聚毛上循入腹貫膈布脅助足少陰腎之經也其支脉起肺出絡心注脊中此三經之支脉並循行背脊邪氣乘於脊骨故傷其經脉邪氣之與正氣交擊故令脊骨相引而急痛也詠其寸口脉弦而滑弦則為痛滑則為實痛則為急實則為躍弦滑相搏則凶自穆搶息痛也
又卒苦煩滿又脊骨痛欲死候此由于少陽之絡脉虛為風邪所乘故也手少陽之脉起小指次指之端上循入缺盆布臆中散絡心包風邪在其經邪氣迫於心絡心氣不得宣暢故煩滿乍上攻於背或下引於脅故煩滿而又脊骨也若經久邪氣留

連搏於臧則成積搏於腑則成聚也並出第十六卷中
廣濟療氣結築心胃脅悶痛不能喫食訶梨勒散方

右二味搗篩為散以牛乳二升煮三四沸頓服之分為二服
亦得如人行三二里進一服無所忌

又療山脅下利腹中脹氣急妨悶半夏湯方

半夏一斤洗去滑生薑一斤合桂心兩檳榔人末二兩

右四味細切以水八升煮取二升四合絞去滓分溫五服服別
相去如人行六七里進一服快利為度忌羊肉飴生葱油膩
小品有美菜更三十顆無檳榔人餘並同

又療山脅下妨胃中客氣大便苦難大黃丸方

大黃十二厚朴四分枳實四分芒消分
杏人六分煮葶藶子四分熬

廣濟療山膈氣脹滿喫食心下妨虛熱脚手煩疼漸羸瘦不能
食四肢無力枳實丸方

枳實分犀角分前胡分青木香分
麥門冬分赤茯苓分苦參分芍藥分

右八味搗篩為末蜜和丸如梧子以飲空腹下二十九漸加至
三十九日二服不利已心生菜熱麩油膩炙肉酢蒜

又療山膈滿塞心背最痛走注氣悶宜服此柴胡湯方

柴胡分當歸分青木香分犀角分
檳榔子和甘草二分

右六味切以水七升煮取二升半絞去滓內麝香末分溫三服
如人行四五里微利為度忌海藻菘菜生菜熱麩膏麥猪魚蒜
又療山膈間伏氣不下食膈下滿柴胡湯方

柴胡兩枳實兩生薑兩白朮兩

甘草一兩 按柳七箇合

右六味切以水六升煮取二升絞去滓分溫三服服別如人行六七里進一服小弱人微利禁生冷蒜腥海藻松菜桃李雀肉等並出第一卷中

寒疝腹痛方一十三首

病源疝者痛也此由陰氣積於內寒氣結搏而不散腑藏虛弱風冷邪氣相擊則腹痛裏急心故云寒疝腹痛也出第二十卷中
唐濟療丈夫虛勞寒疝腹痛并主產後方

生乾地黄兩三 甘草兩三 茯苓兩二 人參兩二

當歸兩二 大棗枚十四 白羊肉去脂一斤

右七味切以水三斗先煮羊肉取一斗去羊肉內諸菜煮取五升內葱白一把煮取四升絞去滓分溫五服服別相去如人行十二三里後藥消進少食食消服藥已心無羨海藻松菜

酢物餘無忌出第四卷中

仲景傷寒論寒疝遺精苦痛若發則白汗出手足厥寒若脈沈弦者二物大烏頭煎主之方

大烏頭十五枚炮 白蜜斤二

右藥以水三升煮烏頭取二升去烏頭內蜜煎令水氣盡得二升強人服七合弱人五合一服不差明日更服日止一服不可再也忌猪肉冷水千金同

又寒疝腹滿逆冷手足不仁若一身盡痛矣刺諸藥所不能治者抵党烏頭桂枝湯主之方

秋烏頭實中大者十枚去皮生用一方五枚 白蜜斤二 桂心兩四

右三味先以蜜微火煎烏頭減半去烏頭別一處以水二升半煮桂取一升去滓以桂汁和前蜜合煎之得一升許初服二合不知更服至三合又不復知更加至五合其知如醉狀得吐者

為中病也忌猪肉冷水生葱等范汪方云

桂心兩三 芍藥兩三 甘草二 生薑三兩切

大棗十二枚擘

右五味切以水七升煮取三升去滓取五合和前烏頭蜜令得一升餘並同前法服仲景傷寒論千金同

又療寒疝腹中痛引脇痛及腹裏急者當歸生薑羊肉湯主之方

當歸三兩 生薑五兩 肥羊肉去脂

右三味切以水一斗令煮取三升去滓溫服七合日三服即當止若寒多者加生薑足煎成一斗若痛多而重者加橘皮二兩木一兩合前物煮取三升加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之依前經心錄范汪同無忌心

又方寒疝腹中痛者柴胡桂枝湯方

柴胡四兩 大棗六枚 黃芩半兩 人參一兩

甘草一兩 半夏二合洗 桂心 生薑各一兩

芍藥一兩

右九味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服本云人參湯作如桂枝法加半夏此胡黃芩復如此胡法今著人參作半劑忌海藻松菜羊肉飴生葱並出第十五卷中

小品寒疝氣腹中虛痛及諸病有痛裏急當歸生薑等四味湯主之方

當歸 生薑 芍藥各三兩 羊肉三斤

右藥切以水一斗二升煮肉爛熟出肉內諸藥煎取三升分溫服七合日三數有效古今錄驗經心錄范汪同出第一卷中集驗療寒疝氣來往衝心腹痛桂心湯方

桂心四兩 生薑三兩 吳茱萸二兩

右三味切以酒一大升煎至三合去滓分溫三服如人行六七里一服忌生葱

又療寒疝下牽少腹痛附子丸方

附子二兩炮去皮

桃人三兩去皮

疾梨子一斤去核

右三味搗篩末蜜和丸梧子大空心腹酒下十九丸漸加至十五

丸及二十九日再服忌生菜熟麩豆肉豆蒜猪魚出第六

卷中

又療積年腹內宿結疝冷氣及諸癖癥等香豉丸方

香豉爛豉暴乾微熬令香即止

小芥子攘去土石微熬令赤即止

右二味搗篩蜜和丸空腹酒服二十九丸漸加至三十九日二

服初服半劑以來腹中微絞痛勿怪之是此藥攻病之候

又療疝瘕冷氣方

採鼠李子日乾九蒸九暴酒浸服三合日兩服漸加

至三服能下血及碎肉積滯物

古今錄驗楚王瓜子丸療心腹寒疝曾習支滿食飲不化寒中腹痛及嘔痢風瘕瘕項強急不得俯仰方

桂心五分

茱萸二兩

白薇一分

乾薑四分

烏頭二分炮

椒四分熬汗

芎藭四分

防葵二分

白芷三分

右九味末之合蜜和為丸如梧子先食服一九日三不知稍

稍增之以腹中溫身中懷懷為度忌生葱猪肉冷水范汪

等同出第八卷中方中無瓜子未詳方意

寒疝心痛方三首

病源夫疝者痛也陰氣積結所生也陰氣不散則寒氣盛寒氣盛則痛上下無常言冷氣上衝於心故令心痛也出第二十卷中

范汪大柴萸丸療心腹寒疝背中有逆氣時上搶心痛煩滿不
得卧面目惡風悸掉惕惕時驚不欲飲食而嘔變發寒熱方

吳茱萸并 細辛 芍藥 柴胡一方用前胡

旋復花 黃芩 紫苑 人參

白朮 茯苓 乾薑 桂心

附子炮 甘草炙 半夏洗 當歸各半

右十六味搗篩以蜜和為丸如梧子先食服三九日三不知
稍加忌生葱羊由錫酢物桃李雀肉猪肉生菜海藻松菜除

此更無所忌深師同出第十四卷中 一方有蜀椒無桂心又一方有乾地黃無黃芩

小品解急蜀椒湯主寒疝氣心痛如刺繞臍腹中盡痛白汗出
欲絕方

蜀椒二百枚汗 附子一枚 粳米半升 乾薑二兩
半夏十二枚洗 大棗二十枚擘 甘草一兩炙

右七味切以水七升煮取三升澄清熱服一升不差更服一
升數用療心腹痛極困急欲死解結逐寒上下痛良忌猪
半肉錫海藻松菜肘後古今錄驗記汪方無甘草餘同經心
錄同出第一卷中

古今錄驗療心痛寒疝牡丹丸方

牡丹心 桂心各二兩 烏頭炮二枚

右三味末之合蜜和為丸如大豆旦起未食服三九日二不
知稍增之藥少急寧少服并治遁尸發動無烏頭附子亦
可用炮之忌胡荽猪肉冷水生葱等出第八卷中

卒疝方三首

集驗療卒疝暴痛方

灸大敦男左女右三壯立已完在灸經圖上出第六卷中
文仲療卒得諸疝少腹及陰中相引絞痛白汗出欲死方

搗沙參下篩酒服方寸匕立愈肘後備急同

又若不差服諸利丸下之走馬湯亦佳此名寒疝亦名陰疝張仲景飛尸走馬湯方

巴豆二枚去心皮熬 杏仁一枚去尖皮

右二味取綿纏紅搗令極碎投熱湯二合捻取白汁服之須臾差未差更一服老小量之通療鬼繫有尸疔者常畜此藥用驗忌野猪肉芦笋備急同出第十卷中

七疝方三首

病源七疝候七疝者厥疝癥疝寒疝氣疝盤疝肘疝狼疝也厥逆心痛足寒諸飲食吐不下名曰厥疝也腹中氣下滿心下盡痛氣積如臂名曰癥疝也寒飲食則脅下腹中盡痛名曰寒疝也腹中下滿乍減而痛名曰氣疝也腹中痛在臍傍名曰盤疝也腹中齊下有積聚名曰肘疝也少腹與陰相引而痛大便難

名曰狼疝也凡七疝皆由血氣虛弱飲食寒溫不調之所生也出第二十卷中

文仲小器七疝丸主暴心腹厥逆不得氣息痛連背脊名曰尸疝心下堅痛不可手迫名曰石疝臍下堅痛得寒冷食輒劇名曰寒疝脅下堅痛大如手痛時出若不痛不見名曰盤疝臍下結痛女人月事不時名曰血疝少腹脹滿引脇腕急痛名曰脉疝悉主之方臣等看詳七疝已載前序

椒四分 桔梗 芍藥 乾姜 厚朴炙 細辛 附子炮各二分 烏頭一分

右八味末之蜜和丸服如大豆三丸加至七八九日三服忌猪肉冷水生菜出第一卷中

古今錄驗七疝丸療疝諸寒臍傍痛上心胃中滿少氣太醫承樊之方

蜀椒五分 乾薑 厚朴炙 黃芩

細辛 芍藥 桂心各一分 桔梗二分

烏喙炮一分 柴胡一分 茯苓一分 牡丹皮一分

右十二味搗篩蜜和丸梧子大先鋪以酒服七九日三不知漸

加以知為度忌猪肉冷水生葱生菜酢物胡荽芫花同出第廿卷中

集驗疝氣桃人湯方

桃人去皮去核 吳茱萸 橘皮 海藻各三分

生薑 茯苓 羌活 疾藜子去角各三分

右八味切以水三大升煮取九合分為三服空心服忌酢物

寒疝不能食方四首

深師療虛冷心腹寒疝背脊支滿飲食不消腹中痛久痢頸強

芎藭丸方

芎藭七分 烏頭炮四分 防葵三分 蜀椒汗九分

白薇二分 桂心一分 白芷五分 茱萸六分

乾薑八分

右九味搗篩蜜和丸如梧子飲服二九日三稍加至五六九以知

為度忌猪肉冷水生葱范汪同

又主虛冷疾癖疝食不消心腹痛氣弱不欲食虛優羸瘦吳

茱萸丸方

吳茱萸十分 柴莞三分 白薇三分 烏頭炮十分

桂心六分 前胡 芍藥 細辛

芎藭 黃芩各五分

右十五味下篩蜜和酒服如梧子五九日三稍加之忌猪肉

冷水桃李生葱生菜等出第十六卷中 謹按別本有此方无欠

當用自木恐後古今錄 驗治寒疝積聚是金方

范汪療手足熱腹中寒疝不能食飲數心腹痛十一物七煎飯後丸方

茯苓五兩 乾薑六兩今倍 大黃二兩 柴胡十兩
 芎藭七兩 蜀椒汗兩 芒消一斤重十兩 杏仁一斤去成
 葶藶子升 加桂心五兩 附子三兩 杏人尖兩 煎

右藥乾薑茯苓不熬餘皆熬搗篩以蜜和丸如梧子飲服七
 九日三龍朔元年三月十七日詔書十一物七熬方忌猪肉冷
 水醋物生葱等出第十四卷中

集驗療寒疝不能食方

取馬蘭子一升每日取胡桃許以麩拌熟煮吞之然
 後依常飯日再服服盡必愈亦除腹內一切諸疾消
 食肥肌仍時燒博熱以殺羊毛作繯裏却繯上熨之

日一度尤佳

寒疝積聚方四首

病源夫積聚者由寒氣在內所生也血氣虛弱風邪搏於腑藏

寒多則氣溢氣溢則生積聚也積者陰氣五藏所生始發不離
 其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成也故無根本上下
 無所留止但諸藏腑受邪初未能為積聚邪氣留滯不去乃成
 積聚其為病也或左右脅下如覆杯或臍上下如臂或胃管間
 覆大如盤羸瘦少氣或洒淅寒熱四肢不收飲食不為肌膚或
 累累如桃李或腹滿嘔泄寒則痛故云寒疝積聚也其脉所史駛
 而緊積聚浮而牢積聚牢強急者生虛弱急者死出第二十卷中
 深師破積丸瘕寒疝積聚圖走動搖大者如鼈小者如杯乍來
 乍去在於胃管大腸脹滿不通風寒則腸鳴心下寒氣上搶腎
 脅支滿芫花丸方

芫花洗一分 椒一分 大黃六分 細辛六分
 桔梗一分 烏頭四分 茱萸
 茯苓略三 龍膽分 半夏洗分 芍藥

右十一味搗篩蜜和丸如梧子大飲服五九日三當下如泥
病愈忌猪羊肉鰾酢物生菜等

又當歸丸療心腹勞強寒痞邪氣往來牢堅固結聚苦寒煩悵
於解切不得卧夜著汗出大便堅小便不利流飲在腹中食不生肌方
下同

桔梗分

葶藶子熟五分

藜蘆條二分

厚朴炙五分

杏人五十枚去尖皮兩人煎

附子炮五分

桂心

人參各三分

沙參分

特生礬石半日

右十味搗篩蜜和如梧子服三九日三稍加之忌猪肉生菜葱冷
水出第二十二卷中

古今錄驗療久寒三十歲心腹疝瘕積聚邪氣往來惡逆搶
心痛大痺羸瘦少氣婦人產乳餘疾皆治支滿不嗜食手足悵
煩月水不通時時便血名曰破積聚烏頭續命丸方

食茱萸分

芍藥分

細辛分

前胡五分

乾薑分

烏頭十分

紫苑

黃芩

白朮

白薇各三分

芫花分

人參分

乾地黄各五分

蜀椒汗分

桂心分

右十五味搗篩蜜和為丸如梧子大先食服三九日三不知稍
加至七丸忌生菜葱猪肉冷水桃李雀肉蕪菜等范汪同出

第十卷中

集驗療腎冷及疼疝氣滯後灌方

鹽花一大

漿水升

右二味和煖灌下部少間即下膿日一度再灌之即止

心疝方四首

病源心疝者由陰氣積於內寒氣不散上衝於心故使心痛謂
之心疝也其痛也或如錐刀所刺或四肢逆冷或唇口變青皆
其候也出第二十卷中

范汪療心疝復繞臍痛上支脅心下痛方

芍藥

桔梗

細辛

蜀椒汗

桂心

乾薑

附子一分炮

右七味末之合蜜和為丸如梧子服七丸以酒下日二服忌猪肉冷水生葱生菜等

又療三十年心疝神方

真射干醱好者新好茱萸一名殺子

右二味等分搗篩蜜和丸服如麻子二九日三藥勢盡乃熟食良祕已用得差劉國英所祕

又主心疝方

灸兩足大指甲空之際甲空各半炷隨年壯良

又心疝發時心腹痛欲死方

灸足心及足大指甲後橫理節上及大指岐間白黑肉

際百壯則止足心者在足下偏近大指本節際不

當足心中央也並出第十八卷中

外臺祕要方卷第七

右從事郎元西浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟校勘

