

永類鈐方

十一

水類金方卷第二十

卷二十

全醫門

卷二十

○相見壽夭歌

身收陽後頭而破脣小將高肉不就髮稀色脆短聲嘶遍体青筋俱不壽尻
腎臍界若不成能路能行能立死肺深色老性尊持方是人家長命子

○論面部形色病候

夫要見誰察其面部必有五色以知病源人身五体以頭為首首中有面面中有睛睛
中有神神者目中光於是也隱顯橫衝應位而見以應五臟五色者青黃赤白黑五藏之色
宗肝青脾黃肺白腎黑五藏所主病證蘊其內必形色見於外故小兒有病先觀其面部
形色以論其五行生剋吉凶形色若不相應然後听聲切脉



卷二十

○五藏病證形色總見面部

青色者爲驚積不散欲發風候 紅赤色者爲熱為痰積壅盛爲憤煩躁增進
黃色者亦為熱為食積癥陽欲作痘候或作癰癧若神思昏沉其候潮熱氣粗困倦
或嘔噦或鴉痢 白色者爲寒為肺氣不利大腸滑泄欲作吐利 黑色者爲痛所傳不變
變證即為逆候榮衛失序為疾若惡

○五藏各部所主形色分見面部

肝部所主睛中瞳人乃藏其神外窓五輪眶脈屬脾熱即生眵兩目總心熱痛如針白
屬肺家赤生砂黃屬肝藏昏瞽翳障中心瞳人腎熱不明眼乃眩厥發風發驚
(心部所主) 顧面臉頰皆屬心位黑即沉困青即驚悸赤即發風白即疳氣虛黃衛積
浮腫氣逆心絕何因大吐聲過關不吐必作鳴聲加熱驚議散熱清心

脾部所主唇口鼻病人口承漿四圍上下合口脾鄉口屬心心脾有熱脣列舌瘡瘍積挑
脣紅如血深紅重渴鴉口莫口木舌重舌腫熱就易噴臭脾胃氣寒色如死肝大
驚一嚇口乾脣白常時積驚漸心寒心氣不足令兒煩哭何知脾絕指甲皆黑目无神
光定難用藥五種撮口驚風更惡不治訖

肺部所主鼻准兩孔并連山根大小二督肺部所有鼻孔黑煤即肺經焦黑煤如墨片
經即絕鼻中亦痒癥盛蛔長或鴉白涼膚寒困篤或流清涕傷風喜膈肺熱聲
塞因自咬得或感風寒亦觸觸萬鼻爛即肺鼻臭積块

耳穴之前名曰耳花耳弦名輪輪裏名廓輪廓黑腎家宜擦其黑

如炭飲食絕聲。眞耳門審瘡衛精。非常耳中膿出。腎熱肺根暴蒸。停耳膿汁不止。

瘡痒如烈其候虛熱忽懶不曉。心腎氣壅常作閑閑。熱氣上攻或如虫刺。虛

衛熱耳輪如冰更省日後有紅絲。麻豆相侵耳輪紅熱傷寒是則熱極內

痛。腫氣相攻清涼膈閥竅通寒。兒孩而腎常虛無病功莫攻擊補更無益。

○聽聲辨王病

重实聲

重实声

体热為焦氣壅在肺傷風咳嗽喉咽痛結滿腸中糞出遲

悲焦聲

聲悲焦有燥心肺行生風重濁聲沉靜。肝攻必打龍耳

啼哭聲

但哭無啼。旨是聲多嘶不哭。痛分明。声軒豎。嘔風瘤病速緩。舌頭吐瀉成

慈前聲

慤前煩躁病難安。燥促聲音為感寒語短氣微。不主遊長。達声細弱多聲

遲緩聲

語短聲遲緩。腸鳴泄瀉頻囁舌多柔。不響風熱時家因

○看額脉

額前眉上髮際下以三指滿曲按之分曰名中食

三指俱熱。感寒邪鼻塞氣粗三指俱冷。藏寒吐瀉食指為上。名指為下。若食中熱則上熱下冷。若名中指熱。夾驚之候。若食指熱則胃滿。若名指熱則乳食不和。

○看虎口脉紋

氣紋黃盛

作紅紅盛

紫紫盛

作青青盛

變黑變黑則難治矣

深青主驚慄。淺青主驚搐。青肚疼。青東主驚搐。內吊。青肚疼。青東主驚搐。內吊。

男左女右末中初

命風氣

不表風氣不順

一枝不治終不愈

發驚搐不治又當於面部問以互考之

○看額脉

流珠形

主夾食癟熱躁驚火欲吐

或腸鳴瀉瀉

主下痢腹痛。聚利。走瀉。不食。浮紫主煩渴。絃弯主傷乳。不吐即瀉。

長珠形

主積滯腹痛。或寒

躁氣喘。神困食化

去蛇形

主脾虛食積。瀉瀉湯

主夾食作熱。煩渴。

弓反裏形。向裏為須。感寒頭昏

心悸。脣裂。寒痰。便赤

魚骨形

風痰。挑定可截風化。

瘀利。驚退。恐者。脾虛。發逆。

其候危重。須則可治。

○看額脉

劍形

心肝熱。極生風熱。挾煩悶。

倦怠。風寒發寒。筋惕。瘡瘍。

透關射。指形。驚風。突然。證不散。

其候危重。須則可治。

○看額脉

弓形

心虛。寒。食少。瘦。急。

魚骨形

風痰。挑定可截風化。

瘀利。驚退。恐者。脾虛。發逆。

其候危重。須則可治。

○看額脉

弓形

心虛。寒。食少。瘦。急。

魚骨形

風痰。挑定可截風化。

瘀利。驚退。恐者。脾虛。發逆。

其候危重。須則可治。

○論變蒸

生五藏

變得之日至七日

夜中必有白沫

涎乎。如魚目者


為變蒸。目白睛微赤

則身熱。微熱耳。與究冷微。有汗重。則熱或汗或不汗。脈乱。不食。或腹滿。

黑睛若微白。則脹畢。若身有熱耳。足皆熱。則為他證矣。醫之。

變


變蒸



卷之二

上寒微腫頭目痛身作非熱頭額熱或生虛火候津液化硬氣逆水心汗出或不汗不食時欲驚夜啼始得至晉變訖无所苦不前茅若寒

變蒸



主其
表裏
內有病但數呵其頰川

夫變蒸者，長氣也。變者，氣蒸者，体热變蒸有輕重。巢氏云：变五日為十日之中，挑方除古法以薰散之。聚元子主之，亦有不然，不熱或無證候，暗變者多矣。蓋受胎壯实故也。自生之後三十六日為一變，傳肝六十四日，變傳脾一百九十二日，變傳膽九十六日，變傳心三百六日，變傳小腸二百六十四日，變傳肺一百九十二日，變傳胃二百四十七日，變傳肺三百六十五日，變傳大腸二百八十八日，九變傳脾三百三十日，十變傳脾三百三十日，變傳膀胱積三百三十日，小女蒸畢，每變蒸之後，竟情性異常，後又六十四日大蒸，後更一百二十日復蒸，積五百七十六日。蒸畢始乃成人血脉，骨肉皆堅牢也。錢氏曰：腎起變者非也。鄭端友集詳見。

變蒸方

陳氏神仙黑散治變蒸壯熱亦治傷風熱。

麻黃姜節杏仁去皮尖各半兩，太黃一分同剉炒令黑，為末一歲兒半不熟水調下，暖處良久微浮，差後齋火燭燒存性，研末杏仁研膏裹火光一豆許，乳汁和咽，麻黃不盡即鄭氏紫圓子治變蒸發熱不解，并來食湯，寒溫汗後，熱不去，腹中有癥瘕，吐噃食癪，先寒後熱，赤石脂代赭石各一兩，巴豆三十五粒去油，杏仁半粒，姜皮尖一粒，用蜜元。

卷之二

三

為末，爛散杵末，小豆大一歲三元，空心米湯，令小利即差。千金云：无所不治，雖下不虛人。

湯氏惺惺散治變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞，重。

參半兩，梔子白桑芩甘草白芍天花粉桔梗各半兩，半細辛一分。

為末，水服一茶匙，姜片薄荷葉煎服，或除天花粉加川芎或加粉葛、麻柴胡等分。

百種方紫胡湯，變蒸骨熱，心煩啼不止。

人參甘草大麥門冬去心紫胡各一錢，龍膽草防風各一錢，坐散每服三克，煎服。

（當歸散治變蒸有寒，走熱當歸二分，木香官桂甘草炙，各一分，剉散，龍膽草、姜、薑。

○看三部七表八裏脉法，見前脉圖及脉訣同。

小兒脉三歲已上，五歲三十六方，看候然与大人有異者，為呼吸至大，是常也，至病于焉，蓋

小兒純陽，故脉息數促為不同也。小兒周歲色前脉息難憑，周歲已後方有脉形也。

○保嬰集論脉所主病證歌

小兒脉緊風癇候沉緩傷食多嘔，弦急因氣不和急促，靈驚神不守，冷則沉細風則浮，牢實大便應秘，久腹痛之候緊而弦，脈軟治无可，變蒸之時，脉必變下治，且其无穴，补單細指夢洪有虫，大小不勻為思候，脉伏而遲无潮熱，此則胃寒多作嘔瀉，刺浮大不可醫，子細斟量看審究。

○脉應雜病

諸數脉為熱屬肺

寒脉不吐不發熱

（諸遲脉）為冷屬臟

（諸緩脉）為冷屬臟

沉緊脉 脾熱寒多寒少亦主膏蒸熱

沉緊脉 心腹痛短數同亦主咳嗽

沉伏脉 為積聚亦主霍亂

微澀脈 漏泄筋卒

淳滑脈 宿食不消亦主咳嗽

淳弦脈 頭疼身熱

心脉急數 敗瘡不驚者主疳淋

肺脉浮寒 鼻塞并大小便不通

(尺脉微細) 潟泄冷痢乳食不化

(脉過寸口入曲陰) 主遺尿

○(審脉逆順)

盤擣脈 浮數頻沉細逆身溫順肢冷逆

心腹痛 沉細頻浮大逆身溫順肢冷逆

(汗後脉) 沉細頻洪緊逆困瞞煩狂躁逆

厥厥脈 滑浮頻沉細逆身溫順肢冷逆

(曉喚脉) 浮大頻沉細逆身溫順身冷逆

諸痢脉 沉細頻浮大逆身溫順肢冷逆

(諸瘧脉) 浮大頻沉細逆肢冷逆

諸瘧脉 浮大頻沉細逆肢冷逆

(小兒初生搜口法)

兒初出母胎初啼聲吊元有惡物即喫入喉腹冷兒多病後必瘡疹當預備甘草黃連各

半錢沸湯預浸下候兒初出胎入少朱砂末令老娘用牽托兒肩背右手提双足令兒倒啼舌

桃李梅三件根皮前洗尤佳皆所以拔除不祥之氣也

(小兒脣風撮口噤風三證)

脣風者斷脣後為水溫風冷所乘入於脣而流於心脾遂脣突多啼咀乳若脣邊青黑撮

口瓜甲黑癰不治亦有熱在眉骨當引營氣此胎中母多驚悸或食熱毒所致

頭脣青聚撮面阻乳又口出白沫四肢冷不可治或肚脹吊疝引痛皆腸胃鬱結不通

發宜鍊利撮口最為患候七日後始可免

緊數脈 寒熱熱多寒少又膏熱當前

沉細脈 乳食不化亦主腹痛等症

微緩脈 乳不化泄渴沉緩亦同

微急脈 寒熱嘔而

浮緊脈 利氣耳聾

浮滑脈 吐血惡

肝脉急逆 賦瘡風瘤痰延流液

(巽脉緊滑) 主蛔虫尺脉沉亦主蛔

(尺脉微澀) 便血無暑必益汗

夜啼脈 微小煩洪大逆身冷逆

傷寒脈 洪弦煩沉細逆浮大煩微伏逆

(溫病脉) 洪大煩沉細逆身熱煩腹痛逆

逕亂脈 浮洪煩浮微逆身溫煩肢冷逆

泄鴟脉 緩小煩浮大逆身溫煩肢冷逆

(諸渴脉) 洪數煩微細逆身溫煩肢冷逆

腹脹脈 浮大煩虛小逆臟实煩腹瀉泄逆

風邪閉塞而溼小舌上脣肉如粟米狀阻口吐沫大小便皆通由胎中受熱氣流
毒於心肝或初生後感風邪所致自滿月至百二十日見此名曰犯風噤手足舉呆明

【肺風散】
諸方一
為末先用馬毛管吹藥鼻內噴嚏叫氣可醫後用薄荷調服

【張氏方治肺風散】赤脚金頭蜈蚣一條蝎梢四尾白姜茶二個瞿麥半分

定命散治肺風以致唇青撮口金赤蜈蚣半條酒浸至半升川烏尖三個射干少許研

為末和合元吹入鼻內噴嚏可用薄荷湯調

【湯氏方治撮口角直參茶末蜜調膏脣內即瘥】

聖惠方治撮口角半黃芩二分竹瀝一合調抹口中

陳氏方治脾瘡不乾白芷根白龍骨煅研各等分為末傳瘡又綿子燒灰亦可

又脾瘡腫溫火則成瘍黃連三分龍骨煅亂髮燒灰胡粉別研各半烏梅傳膿油調奇

瘍止大連翹飲子治兒脣瘻有熱脣突腫赤及脾利心與小腸經一切邪熱

連翹瞿麥梗滑石車前子牛蒡子少赤芍各三兩山梔仁木通當歸防風各三兩

黃芩二錢紫胡荽各二錢

研末各半水煎服

蟄口瘡走齒齦者泡如蠶狀以帛裹手指蘸溫水輕擦破即口開便安不必服藥神妙

小兒口舌生瘡或生白瘡心脾經熱用吳茱萸作末醋調傳腳心拔下熱氣愈用地龍研傳亦佳

咬咀每一大分水煎服水前風痰熱或交蒸癰疹熱加麥門冬煎瘡疹熱取華當歸

丹熱寒熱項頸瘡痒作熱加大黃燈心煎本方真珠天麻元刺其脹吊繩結之証

繩口瘡走齒齦者泡如蠶狀以帛裹手指蘸溫水輕擦破即口開便安不必服藥神妙

慕呂者舌苔白重舌者舌腫大滿口木舌者舌腫硬皆心脾有熱也與上証用藥相似

有用南星末醋調貼腳心效又洗心散自佳又名鵝口瘡自內生出可治自外生入不治

有用鵝所食草下青糞者瀝汁加沙糖調搽足效又用雄鷄糞眼圈者燒灰加射干末

次合中又用髮纏指頭點井花水拭舌上有初生舌根有膜如石塊不可摘去之並出無禁不許

燒灰傳之有不可乳食茶砂白凡善為末先拭舌井水漱之却傳藥佳

直指方控涎散治噤口風吐去風涎次用益脾散和胃

金鷄梢銅青各半朱砂之水狀粉二字射干少許

為末每服之字臘茶清調下先吐風涎又詳虛實

益脾散白茯苓人參草果木香煨甘草炙半斤陳皮制厚朴蘇子炒

等分為末每服半錢

蛤蟆方治噤口不能收引亦名蛤蟆半不去足矣焦亦為末入射少許以猪乳乙

合和分作三服猪乳主小兒口噤不能張口

演山真珠天麻元冰散口吊勝銷肚臍結腹脹青筋阻急與疎利量重輕截風定搐
南星碗天麻良附子炮各之半巴霜二字無苦炒金鷄梢炒滑石各半

為末麵糊天麻子大牙兒三錢元五十五元加青黛名青黛元薄荷湯茶清下

小兒初生大小便不通腹脹欲死

太婦人以溫水嗽口吸唾前後亦將一手指心共七次凡三五次嗽吸唾取之紅赤為度即可

小兒小便不通心氣

葛洪於小腸經遠用生天地龍蟲僵蠶少許研傳並卯仍燒而服之

存性朱砂脂子白

杏同研煎表明冬燈心湯調服

初生不乳小便難

引水谷忽白寸煎灌之

初生小兒谷道無穿不得通利此肺經結熱閉於肛口乾燥而合須用金玉簪子刺之尤勝火

筋攻刺以蘇令首內孔中以通變之說耳或服先心散或順飲加荆芥以疏利之

○急驚風慢驚風慢肺風總論

急驚風屬胸外解表慢驚風屬宜溫裏

小兒急慢驚風古謂以陰陽癪止急者屬陽二盛而陰虧慢者屬陰二盛而陽虧陽動而燥疾陰靜而遲緩皆因臟腑虛而得之虛能發熱二則生風是以風生於肝發生於脾驚止於心發出於肝而心亦熱驚風然合為四證搐搦牽掣引竇視為候眼瞼頭張口舌紅脣青面眼青及深皆青髮際印堂青筋三關虧口紅紫或青若皆驚風候如天折肝心火二者交爭必挾心熱而後發始於搐故熱必論虛實証先分逆順治則有后先蓋实熱為急驚虛熱為慢驚慢驚當無熱其發熱者虛止急驚屬陽用藥以寒慢驚屬陰用藥以溫又必明淺深輕重進退疾徐之機故愚論虛实者此一男搐左視左女搐右視右男眼中竇玄脈下竇男握指指出外女握指入裏男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲此皆順反之則逆亦有先搐左而後双搐者但搐順則無声搐逆則有声其指紋弯弓之裏者順度外者逆出入相半者難瘥故曰訛分逆順者此也傷病陰肺陰病陽脉亦為反凡熱感生痰二盛生驚二盛風盛發搐治搐先於截風治風先於利驚治驚先於點瘀治瘀先於

詳熟其若四証俱有又當兼施並理或有遺必生他証故曰治有先後者此以綱領如此若分三者言之暴烈者為急驚沉重者為慢驚至重者肝風乘之克脾而則為慢肺風矣急驚之候亦曰真搐牙關緊急壯熱潮熱竇視反張搐搦顫動口眉張緊引頸併口鼻氣急踰赤客紅不凜望亦見脉浮數躁緊此內挾实熱外感風邪家受熱積熱而家生風發搐竇風心火藏交孕而亂氣并於涎壅盛嘔脈發滯關竅不通風氣蕃盛無所發泄聲烈如又有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎而氣熱未可直指以為驚風恐是傷風傷寒來食夾驚疹豆恙証此即宋氏假搐之說又各依本証施治矣又急驚搐搦不可把擗但扶持之否則風癇逆入經絡遂使手足拘掣成發疾

治法大要用藥有次序有輕重通閑以後且順截風定搐風搐既定却下瘀熱理為至當若患在瘀熱不有驚風只可退熱化瘀不可妄擗驚風禁蓋藥中多用寒涼恐引入瘀熱之經絡凡病在熱不可妄治發止當解表而解奇妄治風蓋驚由瘀熱得只可退熱化瘀而驚自止驚在瘀不可便治驚須退熱化瘀病在風不可便治搐蓋風而驚作只可利驚化瘀其風自散若也有搐搦用截風止驚退熱化瘀病在風不可便治搐蓋風而驚作只可利驚化瘀其風自散若亦不散瘀安得去及知不治之所以治之之謂解急驚初傳風搐得定而瘀熱一去須急與督脈定心之劑卷定而瘀熱無多則但用輕藥消瘀除熱尚然急驚雖嘔切不可過用寒涼及水銀丹粉已豆蔻硝等湯滌大驟或當劑皆不得已但使疾去即止或不當用而用或可用以過焉由此遂成慢驚矣且其下瘀熱不必大驟之用但斟酌加減人黃品足矣急驚証原在於去肝風降心火幻幻書以為至要之說也

左榮下之濕風當審問前色不赤或曾經吐瀉否已下及熱溫者不可再但取風化痰消涼而已大約於熱一分且汎其三分下劑中須用枳殼呂浦貨心通氣之類佐之驚急在時治不可緩二則候加深若時休認不明又不可妄施藥餌

急驚頭已傳截風定搐次第風驚已定而發汗劑有三則且輕下又稍重下又加重下之劑下後利胃助氣而後定志寧神驅風鎮驚方其再發若下後諸證猶存未易痊愈更勿再下當作慢驚推詳其不可治之證見于下

爪甲黑忤絕鴻黑與絕多盜汗衛氣絕忽作鴻舌肺經咬人骨絕眼半閉合腎絕口鼻乾黑脾絕逆搐吐鴻火作而喘不可治

慢驚風之候或吐或瀉微喘眼閉神緩瞶則露睛驚跳乍發乍靜或身熱或身冷或四肢熱或呂鼻空氣而色淡白淤青眉衣間或有黯其脈沉遲散緩並由急驚過用寒涼或轉入驟傳爻成之又有吐利不止而成者有氣壅長吐瀉而成者有夏月脾胃伏熱大吐瀉當解暑熱不可專曰固陽有心臟洞泄成者有久痢氣脫而成者有下積取瀉成者有吐血瀉而未成者有傷寒傳變陰證成者有得之久嗽作癆者有得之發瘡不已者有導之虫積衝心者有行之郊腫疝氣腹痛其或汗出六過脾困煩渴四肢浮腫不便行走馬急瘧並傳慢候惟吐瀉積痢成虛致之則證變甚速凡經吐瀉便是慢驚須用溫中扶裏大擣來緊急乃慢驚初傳尚有陽証不可誤作急驚用藥世言擣慢為慢驚非也若泥此徃二指慢脾為慢驚矣凡慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重又吐有五証瀉有五証客明

卷十

十

所因主治古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如因瀉驚不止先已瀉若更治風則驚風愈甚姑因他証例當循原施治也其慢驚似若從急驚傳來只可驚風調胃均平陰陽不可全用陽藥使陽歸陽復作急驚不得用藥兼治無遇不可也急驚以闔格不通各施賄射明通定其搐搦尚可慢驚法重陽虧諸經已虛不宜通厥谷汗出交流口面黯黑指甲黑四体垂顛至重慢驚証脉一閑丁合代睡不眠是也其脉或浮或沉身或熱或涼或吐或瀉或不瀉或食乳或飲水陰半陽合病即如傷寒半表半裏也類推以弟子后然慢驚已傳屬陰亦追牽轉陰陽互盛生火深不可溫燥火則大過慢脾風之候面青額汗舌短頭低眼合不開瞳中無神吐舌頻滯醒臭嚥口咬牙手足微僵而不收或身冷身溫而服令其脉沉微陰氣極盛苦氣微赤傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾氣若運氣則無風可治但脾間痰涎盡熱往來其眼合者脾困氣乏神志沉迷痰涎以於滯而已然慢脾之名又曰虛風小兒或吐或瀉之後面色虛黃因虛發熱終見晝明於視昏困額汗身亦粘汗声沉蓋胃為腑屬陽非若脾乃陰臟也故小兒疾傳在脾久自愈在臟不可不治蓋少兒純陽之氣正騎為順在臟為逆古人皆理其臟未言治間也六腑一臟常主虛不可攻治若腎臟有寒但清心肺緣心與腎即既濟也肺與腎又子母也無與肝藥及諸補藥七

慢脈惟吐與渴積與瘀博入慢候其証變至遠重更遠也治必循後平和與急速急之

和胃調脾養胃不可過劑也才者有黃芩湯止勝水冰得其要則風自止以脾主為本也治法大要生胃而陽若眼半開半合手足不冷証候尚在慢驚則勿用回陽或曰慢脾而陽氣未甚脫者亦未可即用硫黃附子等前手足漸暖仍以醒脾散等調之

慢脾風用藥乃不得已其危如燃黑油漸見昏滅不發金液丹與青州白元子各半細研和勻飯飲薄搗湯下之不許此徵風而陽又方以黑湯加黑附子末四分之二服

水參者用和對半生姜棗子煎服古人用方豈不同常亦心曲之善也

驚風也癲癇發癇卒中天鵝擗只少風之種類者

癰者手足冰冷癰者牽身僵卧蓬痺本一病當以陽剛陰柔別之剛者有汗柔者無汗肢體強直腰身反張甚於風、癇難治。癰者目暎涎流神氣鬱勃四肢昏沉似死似生其声惡叫凡驚咬牙啼叫湧通心氣行小便、癰亦有牛羊雞犬猪之說當只以風驚食三証別而治之風病在肝面紅目青發搐驚病在心啼叫驚搐食病在脾驚氣驚搐爭風者五藏各有脉証隨五臟俞施參與六科同但小作口小劑耳。天熱者身體壯熱翻眼擡睛手足搐掣舌苔微脹腹痛多啼夜黑陰腫腫脹後張眼中紅筋斑旁寒氣壅結兼驚得之撮口者臍內危疾腑風胎風鑽肚而臍外弛緩至撮口蓋風入心脾全完氣促口撮如裹而不乳驚蒸亦發微驚亦治亦愈。豆疹欲發亦或搐掣右鼻冷脚冷尻冷耳後有紅脉赤綫可驗不可用腦射開漆銀粉色硝等下至若自陷無光爪甲青黑而體無彈頭而後肢厥目青白脹胃高脹舌黑魚子脹

卷十

八

粗顯腫顛瘡喘哭無淚冷汗不止如珠如渴黑涎入肺噦盡夢人五硬互軟互冷皆惡寒也或有慢驚欲絕虛瘦引氣喘息粗脈浮數此陰極陽強而非陽復以柴胡陳皮麥桂隨瘀絕矣。王氏謂發搐為肝。笑身熱喘急為肺虛目眩翳睛為肝肺相勝四肢為脾虛治法先用益脾補肺胃氣稍復然後瀉肝涼驚而安一証叶瀉或利小便過多忽脾盡不食用益薑散作效經數日忽不語或以失音湯無效不歸地黃元祐學而能言其由生前利小便大過遂脾胃俱虛雖補脾而取尚虛耳至論肺虛瘀安注當不然必先益脾而後瀉肝經云欲瀉其子先補其母宋氏要法也心中驚熱清心而熱不退則與之助胃二不虛則熱不生或胃虛不食又且大小便難則不為之疏利蓋利之則胃愈虛而身必冷。其有傷風寒云叶瀉者欲止叶瀉不特溫脾須以發散之劑不愈則易之攻擊固守之劑大過則叶止而躁利主治在我不可不問源流不可偏病家圓機達变消息輕重不可無法也

急驚風脈紅者風熱盛紫者驚熱青者驚症青赤相半驚積風熱俱有慢驚風脈青而淡紫伸縮來去

慢脾風脈紫黑青絲或黑絲隱二相雜似出不出

○初有發熱未有驚風先具解表

和劑香蘇散解肌加乾葛(參蘇散除木香又參加川芎生姜棗子煎)
(人參羌活散治初作急驚散風邪除風熱)

羌活川芎人參甘草炙白茯苓各二兩前胡桔梗冰掌皮

天麻酒浸焙各半兩制秋葵蕊兩錢

咬咀每服不水半盞姜一片薄荷一葉桑半煎服。未發亦可服。直指方。

每服三字末紫蘇薄荷湯調搗剉取急者去節麻黃六錢湯調或惺二散

加荆芥防風亦可兑得邊施胸引

霍二散除風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓淨細辛桔梗爪姜根人參甘草炙白朮川芎各等分

為末每服不水半盞姜一片薄荷三葉同煎湯氏細散減半

石蠶星角湯治心驚熱盛

犀角防風木通赤茯苓桑白皮炒甘草炙等分剉細每三字水煎服

膽星元鎮心驚利痰解熱

牛膽南星麝月牛膽中陰干百日者半兩朱砂防風各三錢身香二字

為末研浸牛膽皮煎湯為元梧子大每之元井花水調下

消驚丸治諸驚小兒平常用

人參天麻茯苓朱砂全蝎焙直姜桑炒羚羊角犀角各二分

牛膽南星四分射少許細末煉蜜元梧子大每之元昌油煎湯調下

參砂膏通氣除膈熱素瘀壅

朱砂人參南星炮茯神遠志肉姜浸焙天麻白附子生桑炒等分

獨活湯治胎驚發散風邪

羌活獨活各三分竇即天麻麻黃去節甘草炙各半分

剉散每服半分水煎於內加南星末蜜調可貼額門

急驚初傳且可通閑定驚搐

諸風搐搦閑竅不通痰涎潮塞氣实使之先用蘇合香丸姜自然浸薄荷

調與服使氣下則痰下閑竅自通

直指方木通散能瀉肝風降火最利驚熱

山楂或矛大黃紙裹煨羌活木通赤茯苓甘草炙各二分

為末每服二字紫蘇煎湯調下

鴻青元治竄視發搐痰熱

龍膽草焙梔子仁大黃煨羌活防風各二分川芎芍藥各半

為末煉蜜元梧子大每二字煎竹葉泡薄荷湯調下水氏有當歸

○急驚輕下法

防風湯治風熱麥壅大便不通

羌活防風於實各半兩川芎甘草炙大黃煨各二半剉末每服三字姜蜜煎

小柴胡湯加枳殼防風最利風熱解血熱免用銀粉巴硝重劑一方加大黃少許

宣風散疎導風熱驚風痰熱四証俱備者極效

卷十七

九

卷之三十一

橘桂半夏黑牽牛末阿胶生地炒

為末每服半茶匙湯調下

定命丹治急驚天吊撮通利痰熱

金蝎七个天麻 南星炮 白附各二分半 朱砂 青黛各二分半 輕粉

射干半分 腎乙字 炸末粟米糊元草豆衣元荆芥涼水調半研半元吹鼻中

躁風散治驚風痰熱四証俱盛 漢川加朴消之方

賓郎淨陳皮各三分 炒牛大黃略煨各三分為末每服半茶匙調下

保裏子大黃黑牽牛白牽牛三味各半生半熟賓郎各半兩細末蜜湯調研多加輕粉

演活四証已作八做木具截風丹胎驚夜啼加蟬退之分極效

全蝎去毒炒姜蘇心白附炮 南星炮 天麻各三分朱砂乙分半足蜈蚣一條酒炙

射乙字 炸末煉蜜元梧子大每服三元金銀薄荷湯化下

定搐散急驚四証八候併作

天麻白附炮 南星炮 各半兩蝎梢炒之分朱砂不代赭石兩米醋淬煅次推黃

乳香各三分 白花蛇頭乙分酒炙赤脚蜈蚣一條酒炙腦射各二字

細末每服半茶匙薄荷湯下煉蜜元調亦佳

平黃清心丸治四証候去風痰散驚熱

南星半夏白附川烏各三兩並洗川鹽金華西五味作粗末用臘月黃牛膽兩枚取汁和藥

入膽中扎懸當風處一月乾取出入添馬牙硝朱砂雄黃朋砂各一分腦射少許如膽藥乙

湯氏抱龍丸治癰癓驚風時作潮熱氣粗及中暑浴後

牛膽南星或兩天竺黃半兩雄黃辰砂各三分別研 射香乙分別研

為末煉蜜元吳茱萸大甘草薄荷湯調下

鄭氏比金元急驚壯熱喘粗痰嗽大小便不利

輕粉滑石各二分 南星三分乙字 青黛半茶匙滑石各半

為末稀糊元小豆大乙歲或元薄荷湯調下急驚頭熱足冷疊面青痰嗽加乙元蛇膽漿

名挑符躁流蘊積涎熱瘡豆餘毒宜服又去青黛加蝎梢三分名小青元同治

利驚元急驚痰熱潮搐

輕粉青黛各二分 牽牛末半兩天竺黃三分 炸末糊元或煉蜜半元小豆大薄荷湯化下

太白散急驚搐搦涎盛粉霜三分 軟粉白牽牛炒各三分為末每服乙字薄荷湯調吐痰効

防風元治驚風痰熱神昏驚悸

天麻防風 人參川芎各二分金蝎 甘草 姜桑 朱砂 雄黃八牛膽南星各三分

為末蜜元雞頭大每元薄荷湯下

保異方金蝎散治急慢驚風發搐服之神效急慢三証加減方法在內制法更佳

金蝎二四个新薄荷葉包以竹夾住於慢火上炙數次或干薄荷酒浸開包炙亦可

姜桑半兩炒去綠紫角用薄荷依潔家 南星乙兩取末以生姜乙兩搗新薄荷葉兩同搗和捏作餅晒干却急驚不用南星乙大黃 大黃乙兩摺若慢驚不用大黃制南星

白附子炮三分 防風去辛以天麻

甘草炙 陳年酒川芎各半兩

為末三歲兒服之字三歲兒服半分薄荷湯調下量大小歲數加減身熱發

搐前後穴府散調慢驚止瀉後發搐生姜湯調急驚搐煎穴府散加大黃湯調

穴府散西赤咬牙發熱吞旱燥小便赤澁一切虛寒邪熱並治

生地黃木通各二兩淨黃芩甘草炙各半兩哎咀分服水煎溫服無時

湯氏金星元治急驚壯熱痰壅大便不通

鬱金末雄黃各二分膚粉半分巴豆七个取霜為末醋糊元朱米大二歲三元薄荷湯

急驚重下法

演山青金元治驚風痰熱四証壅盛

巴霜半分巴青黛三分南星半兩炮軟粉二分重一金帽二分毒炒

為末稀糊麻子大二歲五元三歲七元大小加減薄荷茶清下以迎為度一方加白附子

真珠天麻元治驚風痰熱壅盛及吊腸鎖肚撮口絕效

南星炮天麻白附子炮各二分膚粉半分重巴霜二字蘸裏心金竭麵炒

滑石各二分半為末糊元粟米大二歲五元三歲十元大小加減薄荷湯點茶清送下

輕驅風膏肝風筋脉拘急面紅目青眼上驚搐及胎風

瓦砂蝎尾當歸龍膽草川芎山楂仁大黃羌活防風牛黃各二分

為末入射香二字煉沙糖元雞頭大三歲三元薄荷竹葉蜜湯化下

瞞安散急慢驚風潮搐不得安瞞

卷廿

十一

瓦砂乳香血竭各二分射半分人參酸草芩南星炮白附各半兩全蝎或之板

蜈蚣一條醋炙黃酒浸宿為末一歲一等薄荷汁好酒煎沸調下得瞞效

蛇頭乙个久赤足蜈蚣三條朱砂三分金白霜輕粉各三分 腦射各二分

鐵液粉百草霜各半兩 燕含石二兩醋淬一方加全蝎二分

烏末米糊元雞頭大三歲半元薄荷湯磨下一方慢驚加附子半兩姜尖血竭二分

湯氏奪命散治急慢驚風痰潮壅塞咽喉間命在須臾服此立下風痰神效

真青礞石乙兩入甘窩內同焰硝乙兩用白炭火煅令通紅須消盡為灰候冷如金色取

出研極細末急驚風痰發熱者薄荷自然汁入蜜調服慢驚脾虛者有用青礞

白元子丹研煎稀糊入熟蜜調下神效

直指天麻元利驚下痰吊腸鎖肚撮口通用

利驚後調胃助氣定志寧神防作慢驚

真指銀白散助胃驅風嘔吐作慢驚候者通用

蓮肉扁豆炒白茯苓各二分人參 天麻 白附炮 全蝎炒 木香

甘草炙 霍香半分陳米炒香三分一方加白朮一分

為末每分姜粉乙片入冬瓜子仁七粒同煎或陳米調下

醒脾散 大醒脾散葉氏惺惺散葉方見慢驚門皆藉胃助氣可通用

定志丸 治驚風色退神志未定以此調之御院有乳香

琥珀 药神 遂志肉姜制焙 人参 白附炮 天麻 天門冬志 草芩

酸阜仁炒 為末煉蜜元皂子大朱砂為衣每乙元盛心薄荷湯調下

溫膽湯 治驚悸煩癆

制半夏 枳实炒各三分半 白茯苓半两 净陳皮 甘草各二分半

酸早仁湯 浸去殼二分半 剁散每服二分入竹茹少許姜棗煎

慢驚方傳証治

鄭氏清脾飲治方傳慢驚尚有陽証或吐瀉多困不惺欲止風假

人參 白附 南星炮 制半夏 全蝎 姜蟇 白朮 川弓羌活 甘草

各等分為飲子三錢乙分水半盞姜三片冬瓜仁三七粒煎無時

小續命湯 吐瀉後因虛生風癓痰神昏涎盛不利一切慢驚虛風

麻黃去節泡半兩防風乙分半芍藥 生附子 人參 川芎 白朮 防己各二兩

黃芩乙分桂枝 甘草各半兩

粗末三錢乙分水半盞姜早煎空心加射蝎丸妙有汗去麻黃

神丹先吐後瀉或先瀉後吐或只吐不瀉或止瀉俱作变慢驚

附子用米泔及姜汁和浸三日用蛤粉炒去皮脐半兩羌活 朱砂 蝎尾各半兩
射香乳香各二分 南星三不各半兩去皮臍剉片酸漿水姜汁同煮軟去姜搗干
人參木香各半分 陳倉米或百粒

醒脾散治驚脾困不食痰作驚風

人參 白茯苓 白附炮 天麻焙 甘草炙 石菖蒲細節者 木香 石連肉 白朮 各

乙分全蝎焙半分 為末每三字姜棗煎服有熱去木香或加南星半夏陳皮陳米

大醒脾散 同治南星白茯苓淨陳皮各二分全蝎焙 甘草炙 白附炮 蓬肉

人參 木香各半分 陳倉米或百粒

湯使同上駁風醒脾二方通用亦可釀乳小兒胃虛不消乳食尤須節約

神室既濟丹 分陰陽平冷熱定吐瀉痰涎或已作風候不可下者

硫黃 蕃硝 五灵脂 青皮 陳皮 半夏曲炒等分

硫硝二味合研懶器溶汁傾出候冷再研細入諸藥末粟米蠟元麻子大蜜元米飯

空心下若危急不待作丸子只以末飲調服慢驚慢脾通利方與來復丹相似

演山觀音全蝎散 因吐後傳慢驚候清神固氣補虛益肺開胃 止吐

黃芪 人參各二分 木香 炙草 蓬肉炒 扁豆炒 白茯苓 一四正全喝 防風

羌活各二分 天麻三分 為末每乞分棗半个煎無時服慢驚尤宜

湯代醒脾散 陞鴻不正瘻作驚風脾困不食

白朮 人參 菖草炙 净陳皮 白茯苓 全蝎各半兩 半夏曲 不香各二分

白附四個炮

南星二个炮

陳倉米二百粒

演山加天麻姜

熟陳皮半夏陳

陳

當末每服三分水半盞姜三片棗半個煎時服頻則吐

宜指星香全蝎散治慢驚風已傳昏迷搐

南星溫紙煨三分木香人參淨陳皮各三分全蝎炙三个甘草炙半分

剉細每服三分入紫蘇姜棗濃煎旋以匙送下行其加防風

烏鵲四君子湯四君子湯加生川烏焙過全蝎為末各少許每服半分姜棗煎服

如再服即去川烏湯氏蝎烏湯生川烏去皮脐口兩全蝎十个去毒分作三服

姜七片煎溫服

蘇合香丸倍大味青州白元三分倍夾和每服半分姜湯調下

味青州白元三分多加金液丹鴻糸或等分驅風回陽二藥合研每半分陳米飲下

一方加五灵脂淨青皮神室既濟丹可通用方見前

(湯氏奪命散治慢驚利痰之聖藥其功在真礞石驗真者以器盛少水吐痰水上以少藥粉之痰隨藥而下慢風慢脾風用南木香煎湯調下礞石煖消古文分等雖能利痰然其性非胃家所宜須以木香佐之星香更佳

黑附湯治慢脾風盛四肢厥冷生胃回陽

附子炮三分南木香三分半白附子三分甘草炙半分演山有南星半夏白朮

剉散每服三字姜五片煎取半匙送下若手足煖而蘇省即止後劑

川烏散驅風回陽生川烏三分全蝎木香各半分為末三字姜四片煎取半匙加丁香

卷廿

十三

全附四君湯助胃回陽四君子湯加生附子三分之二厥逆者對加每半分姜五片煎溫服

(靈砂)正胃回陽止嘔吐溫利瘀涎但鴻者勿用細末或糕元或米飯調少許

已上諸方慢驚已傳立胃回陽利痰驅風隨輕重適用

白姜蘇元三分傳慢脾風氣未甚脫者痰盛不化可用亦能截風

牛膽南星三分姜蘇炒分子地龍洗土淨半川姜火脂全蝎焙各三分

演山用前半黃清心丸以牛膽制五味者三分仍加姜制半夏末三分並為末

水煮生半夏糊元蘇子丸每五七克姜湯或薄荷湯下

星蘇散治諸風口噤不語

南星畧炮剉散每服三分姜蘇瓦薑煎取其半却入雄豬腰汁少許

溫和服凡語者大小便不通或調導治癒營養南星更以人參石菖蒲為佐

木香湯治慢風慢脾得效

南星溫紙煨白附焙去蘇木香淨陳皮白芍各三分黃芪

白朮石菖蒲甘草各半分細末每服半分姜棗煎服

助胃膏治慢風吐瀉不進乳食

人參白朮蓬虆各三分丁香檀香舶上面香炒白豆蔻仁木香

甘草炙各三分為末粟米糊元橘子每元陳米飲調下脾困不醒用冬瓜仁煎湯

滿山附硫元慢脾風候或四肢厥冷尤佳一歲可千元

生附子大或个去皮蝎梢七个熟硫黃末三分已細末姜自然汁先裹良大米數

卷前方角附

者不可按謂性熱其兒患脾風勝手冷者有微有暴審其證

重輕即用湯

即以圓重即以膏服之皆效須候手足煖陽氣而即當

更以醒脾正

藥溫暖腑臟補益腸胃奪命回陽必矣

七宝妙砂丹慢驚

慢脾利瘀竒效須以木香佐之

開元通寶丹

月後上下有兩月片者其色淡黑頗小諸分只一个月子者不用
將分放鐵鉢頭於炭火內燒湏臾四維上分各有黃白珠子滿弦將出候冷放盡

中入少朱砂末一作一服南木香煎湯或人參或薄荷湯下仍審慢脾已傳未傳
之理其兒眼目未合尚在慢驚腳手不冷之時未可便與回陽且与丹三

服眼合沉水陰証極盛者方可回陽

湯氏八仙散治慢驚三虛風

天麻白附炮花蛇肉酒炙防風南星炮半夏曲冬瓜仁全蝎各等分

㕮咀每服三分姜棗薄荷煎或加姜棗炒慢驚加川烏

（醸乳法）慢驚睡多驚哭比面黃脉細難治

人參木香藿香沉香陳皮神曲麥芽丁香減半餘各等分

㕮咀每服四分水一椀姜十片紫蘇十葉棗三枚砂瓶煮至半椀乳母食後

裡去滓汁服之即仰卧片時令藥入乳之絡次令兒吮不可過飽亦良法也

慢驚慢脾危惡証俱藥力不到者但看兩脚面中間陷處有大衝脈即灸百會穴

其穴直取前後交際折中橫取兩耳尖折中在頭之中心端正旋毛处是也如

卷廿

十四

有双旋及旋毛不正者非艾炷約小麦許但三五壯而止灸後仍去醒脾藥

幼幼方木附湯治慢脾風身弓背直吐乳食不進汗流不已

大附子二隻炮去皮乙兩煨木香半兩甘草炙

南豆蔻乙枚麪裹煨

㕮咀每服二分水半盞姜三分煎服

發癇方論 古云驚風三發便為癇

癇為小兒患病病閑五臟故有五癇之名其發也如驚風狀但發而四體柔軟時醒
者為癇若一身強硬終日不醒則為痓痓治法先審驚風食三種陰陽二証別
之風癇者風邪乘虛有熱生癇先與化瘀散熱安神定搐然後治風驚癇者駁怖
積驚啼叫恍惚先涼煥去熱化瘀然後治驚食癇者食時得驚停結大便酸臭
先寒後熱先與推下然後治癇陽癇則身熱抽掣啼叫面光脈浮病在腑易治
陰癇身無熱手足不寧不啼面點脈沉病在臟難愈或仰卧屬陽覆臥屬陰
可驗大柴胡帶心竈邪氣心積驚成癇清心調血順氣豁痰又其要也平常小
兒有痰有熱疽乳不睡時常驚慄皆癇之漸即以紫石根元道守之量輕重以減其
盛氣可免驚風癇之患癇証方明日後高骨必有青紋紛三如線見之意
為爪破出血啼叫大得氣通仍睡兒衣恐有純雌落羽所汚即作癇也諸癇瘧
不能言此風傷其形瘧滯於心以南星為末雄猪膽汁調少許啖之輒效

續山化風丹治風

制先用此直指方去甘草加淨細辛

漆製黃牛膽或外裹薄荷獨活防風天麻人參荆芥川芎甘草各乙分為末煉蜜元皂子大每元薄荷柴蘇泡湯化下

直指獨活湯治風癇解表通裏

獨活麻黃去節川芎各乙分大黃焙甘草炒各半分

剉散每三字姜三片煎有內熱加天麻防風細辛二分犀角少許去麻黃獨活

比金丹驅癇先用此

人參琥珀白梔芩遠志肉姜制焙朱砂天麻細節昌蒲川芎

南星姜汁浸各乙分射乙字青黛乙分為末蜜元皂子大每元金銀湯泡薄荷

紫霜元食癇先用此取積不虛人

代赭石煅醋淬研赤石脂末各一兩巴豆三十粒去皮出油炒研

杏仁五十個去皮尖麪炒別研合研細飯元麻子大每三元米飲下

錢氏五癇元定癇

朱砂半兩水銀乙分鉛三兩溶開次入水銀結砂雄黃丙兩蓼真珠乙兩細研

為末煉蜜元麻子大每服或元金銀煎湯泡薄荷調下

豬心湯治五癇鎮癇及心風血迷神效

甘遂末乙分右用帶性豬心乙个取三管頭血三條和甘遂末如血多只隨藥末得中和之將豬心批作兩片入所和藥在內再合用線縛定外以紙溫包慢火煨熟不可過度取出甘遂細研次入朱砂末半分和之分作四元以所

當歸大黃湯治諸癇壯熱利下心中惡血

大黃署煨甘草炙當歸赤芍各乙分半

為末每服三字姜棗煎服

直指定癇元治五癇

赤蠍蛇乙不去頭足酒浸炙蝎梢白附生烏附肉酒炙大南星末半夏姜汁

牛黃無則以膽制加倍用烏梢蛇頭七八分酒炙白梔芩天麻半夏姜汁浸一宿

犀角銹各三分南星末乙分姜汁浸一宿赤連蛇乙條酒浸炙熊膽射

為末蒸棗肉元如○大每十元至十五三元金銀薄荷湯下朱砂為衣一方
加代赭石乙分醋淬如欲利瘀加巴霜煮枳壳乙分

瘡瘍上景下世瘡風強也瘡惡也

瘡瘍之證先傷於風又感寒濕所致此虛極生熱二極生風之甚者也傷風發熱頭汗出又自嘔逆汗之心發瘡溫家發汗過多外發瘡新產血虛汗出作瘡

英項背強直腰身反張搖頭掣肘顎嚙口不語發熱腹痛鎖目不醒病屬太陽經剛症。汗面紅眼赤牙緊手張脣青腫脣瀆渴煩小便赤澁少言譖語而發者此剛症也當發。

柔症有汗大便滑泄不渴不語先手足冷而發者此柔症也當解。

治法並以小續命湯加減剛症去附子用麻黃柔症去麻黃用生附子大便而厥逆者以附子之其間一証。自體壯熱讐語口乾手足反微寒大使反滑泄性關柔不分之證可用生附小續命湯要之得病以來無汗則麻黃按方有汗則麻黃慎勿用也若瘡塞氣盛則南星半夏枳壳以消其痰枳實陳皮紫蘇以順其氣癥消則風止氣順則神醒治之先與消瘀順氣病勢稍止然後審其輕重而解利之熱輕者與敗毒散熱盛者與小柴胡湯壯熱胃滿疎咬齒而大便秘結皆是為內实大承氣湯下之又清

剛症麻黃葛根湯柔症桂枝加葛根湯產為難治過三日不治諸方見活人書柔症

厥冷自汗理中湯自汗肢體厥冷三生飲

(墨香散) 治串風 南星炮二分 木香淨陳皮各二分 金蝎二个 姜草炙半分

剉散每服二分 姜三片煎虛冷可加熱附川烏少許 泽姜三分

客忤證治

小兒神氣羸弱外邪客氣伏而異物暴觸忤之其喉口吐青黃白沫水冷鮮難色變喘息腹痛癰瘍狀如驚癇但眼不上竄脉來弦數口干或有懸核以爪刺之若中惡客忤作醋炭或降真香皂角熏之仍先以蘇合香姜湯調灌仍用艾搗元彈大擦五至七次

辛角散治客忤驚啼壯熱

卷廿

十六

天麻犀角麥門冬鈞藤朱砂各二分 鐵粉雄黃半分 茶少許

為末每服半分薄荷湯下仍以手裹覆兒身以熨之即愈

(天虧證治) 漢天虧氣促脣青鼻瘡熱毒脹脹須臾起而脾若將驚藥真堪笑其證壯熱驚悸眼翻抽掣啼哭喜怒不常甚則爪甲皆青由乳母食毒之氣入乳使兒心

肺生熱痰鬱氣帶外加風邪所致治當解利風熱取安

(全要鈞藤飲) 鈞藤白芍各半兩 大黃包裏或分半 防風朱砂蟬蛻羌活獨活

青皮甘草各半分 粗末每服二分 姜棗煎

鴻氏鈞藤飲治天吊潮熱

鈞藤人參犀角屑各半兩 甘草炙半分全蝎天麻各二分

為末每服二分水半盞煎至半溫服

(驚風內吊附見鈞藤氣虫痛)

驚風內吊腹痛多啼唇黑脣腫脣瘻反張眼內有紅筋斑血乃寒氣壅結驚風得之。盤腸氣與虫痛証亦今腹痛多啼偏腫相似但盤腸氣脰曲乾噦額上有汗乃小腸受氣相搏虫痛則嘔吐清沫痛有去來乃瘕化為蠅藏府留滯而成內吊周調氣鍊風鎮藥盤腸用溫和調氣藥虫蟲用殺虫藥先安胃而後取

(全要乳香元) 治驚風內吊腹痛驚啼

乳香三分 清藥沉香各二分 蟾梢十四粒 雞心寶即之半

為末陳蜜元皂子大每二元膏滿鈞藤煎湯九分

雜志元濟證同前 銀朱丁鱗乳香鐵大蒜等

先研乳香令細後入銀朱研勻入大蒜研為元薄荷湯下

(三)白散治盤腸氣吊先服此後服金藤膏

白牽牛兩炒末白朮

桑白皮淨陳皮木通各三錢為末姜湯調

金藤膏乳香沒藥木香姜黃各一錢水別子七个

為末煉蜜為膏納藤煎湯化下川磨湯化下更佳

(魏香散治腹肚吊痛 羞水半兩阿魏一錢用水化開浸義水宿沙為末紫蘇葉

乾漆散治腹肚吊痛 羞水半兩阿魏一錢用化開浸義水宿沙為末紫蘇葉

練柏皮向東取皮厚者剉日乾一兩為末砂糖熟水調下

(化虫丸治虫痛蕪荑雀風細實即乾蝦蟆多焦各一分蘆薈半分

為末雄猪膽汁為元麻子大安五元陳米飲下或史君子湯下

漢山小沉香前元治冷積癰積瘤積食積乳積盤腸虫痛即感應元加沉香乳

乳香沉香杏仁炒木香丁香各一錢肉桂冠一个煨百草霜一分巴豆四粒制

如霜為末以黃酒封面蝶和元參豆大安五元姜湯下鈎藤湯送下尤佳

九下止藥在月初虫頭向上可下仍湏空心凌早下後以和胃藥調之

(百)豆蔻散治盤腸氣痛

白豆蔻仁砂仁青皮半陳皮各附子莪术各等分細末每一錢紫蘇湯調

鄭氏安虫散治虫咬心痛不可忍一方云火燄史君子與食以殼煎湯送下甚妙

乾深三分炒雄黃半兩射香炒一分為末三歲半錢煎苦練根湯

遣虫元治虫動腹痛啼叫吐沫沫賓即蕪荑去皮留元定粉

雀風炒桑芽分為末煎苦練湯煮糊元參豆大安二元史君子煎湯下

化虫丸治虫咬心痛來去不定阻乳雀風賓即胡粉苦練根各半两

白凡三錢半生為末糊元參豆大安三錢半元溫水入油三五滴吞下空心

子金方云虫攻下部燒艾煙熏之既煩渴極也青童角生姜擦黑轉而紅即回陽

金氏安虫散几虫不可盡去宜安之(漢山下羌見後疳脹門

胡粉炒黃賓即川練子肉雀風炒蕪荑各兩白凡煅一分為末每二字溫湯調下

神景云藏寒宵虛蛔時止特煩宜理中湯方見活人書

禾香散黑牽牛末半生半熟大伏子各一錢半蜜即雷元錫方體炒

三稜莪朶木香大黃各一兩細末每錢空心蜜水或砂糖水調下仍先用

燒豬肉一片細嚼不吞切咬却服藥引虫

○夜啼證治附舉啼

鄭氏分兒啼痛有十驚啼夜啼膈氣吊啼陰虛內吊啼胎寒宵冷啼肺熱
內心心腹刺痛啼和平心痛啼乳食作痛啼然晝陰陽冷熱之同惟夜啼乃作
盛於夜為藏之證陰極發躁寒盛作疼啼而不哭是痛故直聲宋往而無聲
哭而啼是驚故連聲不絕而多淚演山則夜啼而哭為癟哭而不啼是闢陰陽毒蟲
在此真證腹冷而痛而青口大便漏青白頭低身冷以閉肚緊夜半後發

又有邪熱在心爲熱所乘炎而集器中熱面紅舌白腹熱小便赤啼時有汗濱學
布先當清道不勝重則胷突頭反喜燈又宜暖以利。又有客忤中寒兒日有煩躁
不能言而驚哭日夜哭上聲前後甚者其兩手虎口皆無脉紋面變五色。又有口瘻
重舌到乳上即啼身額微熱急以燈照非是瘻也古腫所致牽舌亦是兒夜啼非有瘻
崇因胎熱於蹊蹊篤帶承鏡論云天奪之地生一小兒夜啼踈衣裳人舍即盜室踈若轉籠
鄭氏鈞藤膏治內吊夜啼臘身外哭食面青冷。

乳香燈心研末五靈脂沒藥當歸各一錢射香二字

為末蜜丸晚豆大百日火之元鈞藤湯化下或燈花四顆乳香湯化下

附子炮棗乳香當歸訥炮肉桂心乾姜炮吳茱萸各等分

為末酒糊丸小豆大月內兒一元鈞藤湯或米飲下空心大小加減服

乳沉膏治盤腸氣吊軀身啼叫西醫胃不定大便青白殊片不化

附子炮或錢乳香當歸各二錢射口沉香各一字丸製湯使同上

(紅輪散)熱夜啼涎壅躁并治暑冒

牙硝寒水石殼各三兩射香半錢腦子半錢朱砂或丙甘草一兩炙

為末周淬兒一字薄荷湯調下

(蟬花散)治夜啼不止狀若鬼祟右蟬殼下半截為末初生抄一字薄荷湯

入酒少許調下或者半截為末依湯調啼復始初古人格物之意若此

十八

(朱砂安神丸)治客忤中惡夜啼吊痛方見和劑

保和益味子散治夜啼腹痛一方石菖蒲湯加芳葉肉桂子姜丁香半夏各等分

五味子當歸赤芍白朮各半兩甘草桂各三分㕮咀水煎

(養臟湯)治臟冷內吊夜啼

當歸一兩沉香半兩丁香白朮桂川芎各兩㕮咀姜煎加沒藥尤好

(萬金散)治證同上

沉香丁香公參五味子當歸乳香各半兩肉桂之量赤芍白朮各分咬咀煎

一方夜啼用燈透大半明砂一字朱砂少許研蜜調兒睡時抹脣內

一方燈花數顆燈心煎湯調抹口中乳送下并以井花水調朱砂塗脣上效

一方鵝喙以油晏燒灰存性一字末湯調不必察有血也

○積(疳)辨總論

夫積者疳之母由積而虛遂致成疳兒十歲半為病十歲半為良由乳虛寒
溫喜怒飢飽醉飲氣亂勞傷便乳兒者致傷且生脾胃羸弱飲食生冷不耐
食肉大便停滯于胃脾弱不化或久吐瀉久瘡痢久渴久汎少批以嗽久則久瘡
久則久渴久致傷亡失津液不能宣布成積成疳疳之新者為熱疳而黃膿赤骨熱
鼻乾口臭唇焦煩渴心躁驚悸情意不樂若疳之久者為寒疳而白膿赤骨熱

服便利不宣導其肥脈或以山林煩渴黃瘦熱病庠多在外冷痛病在內又有冷熱之證立五非新非久不出外因者。錢氏曰治病當辨冷熱而瘦初病則熱之病瘦冷小寒易為虛寒而虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此之若積而虛甚則先与扶胃使。胃氣內充然移為之微利若積勝乎胃則先去利導緩得一泄急以和胃之劑去之扶虛然取積雖當疎利如白豆蔻蘿蔔子砂仁義木消積等不可无。脾證在胸膜間亦虛中之積先寒後熱飲水不食以致喘嗽不以癖為潮熱治法解。取寒熱即与下癖。病證亦在右脇痞為陽癖為陰。

乳積止乳鴻乳其氣酸臭

口苦已以乳哺引停滯不化得

食積肝硬滿熱渴或嘔因飲食過飽飽後即睡眼白臉浮

氣積腹痛啼叫利如蛔湧因觸忤其氣榮衛不和日久得之

虛積渾身微熱不食飲食無味神緩抱起如睡肚肚定冷

積

實積肚熱糞秘脾腫壅塞淤滯盛熱毒發瘡

積證有傷乳傷食而身熱者惟肚熱為甚且夜間有熱者傷積之明驗也

心疳即弱病身體五心皆熱

證類亦會胸煩滿肌瘦便膿虛驚盜汗發渴

肝疳即風疳筋青腦熱癆瘍

燒灼肉色青黃搖頭擗目遍身流汗白膜遮睛躁渴

腎疳即急疳肌肉消瘦齒黑指爛止蝕瘻寒熱時作腦熱脚冷鴻癆脫

食泥土愛暗憎明癆多

臭

肺疳即氣疳皮乾焦咳嗽

逆氣熱憎寒揉鼻咬甲口鼻生瘡則瘻出

脾疳即食疳腹多筋脉惕

氣粗面瘦肌黃毛焦骨立肚大肺細情意不樂好

食泥土愛暗憎明癆多

臭

蛔疳多寒舌淡苔白口渴腹痛腸筋腸頭齒痒蛔動自口出難治

逆氣熱憎寒心肺熱渴引食阻乳夜則渴止

脊疳虫蚀脊督身熱羸瘦

火積中生熱煩渴下痢十指生瘡頻咬爪甲

腦疳挾風熱傷陰頭皮光急腦熱生瘡髮結如穗顛高多汗

乾疳瘦卒少聲乾多啼瘧

在心口不轉睛乾啼少淚病在肝身熱家乾半足清火

疳渴者汗多氣急乳母合

立憲傳使見心肺熱渴引食阻乳夜則渴止

疳渴者毛乾唇白額有

紋七服腸澼不化勿用熟藥止之

疳渴者挾氣冷熱不調

傳滌水谷不化

疳渴者臟有積毒与兼攻腹脾復受濕便頭面手足虛浮

疳渴者潮熱往來五心煩熱發瘡盜汗口渴蒸軟端枯悴或渴鴻肚硬而銀不沾

無辜疳者腦後項邊有核腫動軟而不疼中有串如米粉連破之否則出隨熱氣

淫熱觸脈府生瘡便膿水熱頭面高腫或雌馬落羽污黑不中入皮毛必燙之

丁奚疳子足細項小骨高突則瘡脹大腳突號哭腎陷或生谷癰

嘴露疳虛熱性來頭腫全關翻食吐蟲煩渴嘔噦此皆使紫腫極露危矣

腎疳多內虛不食大便固當金鉢匙黃芩有因虛多成者有肝風筋抽者必治

疳

卷二十

十九

不瀉

見病奇寒調停復有孕乳毒氣黃連散酒脣羸亦作脂治之
心脾飲水不已食則驚喘口邊紅多舌上點黑月經左脇結硬頭數吐沫清青
筋眼角黑氣腎消傾水好酸小便如乳月焦肩聳牙黑骨枯肺消咳逆氣
頰鴻白沫身粟生其色如黑脾疽喫泥酒水谷不消吞白腹高令水
或渭油不休脫肛吃通拖足底沉手足垂軟項筋骨展身冷鼻頭乳直瀉皆不治
○積滯證治經化積散以換積磨積無下積之說故不可首便取下以傷胃氣也
保胃安胃和脾散兒脚肯不松羸氣焰喉瘡肺噫氣吞酸面黃肌瘦腹脹刺痛便利
不調且引不思飲食不化先此

制淨桑末兩切生姜兩切炒黃色制淨厚朴姜炒人參白朮白芍茶淨夏
淨陳皮藿香砂仁莪术各半兩小半丸而小核焙
細末每三克姜湯調下或就吞下消食元

快膈消食元砂仁淨陳皮三錢莪术神曲麥蘖各半兩淨香附子一兩別炒
為末糊元麻子大食後湯下者輕重却用下積藥一方加制散

紫霜丸治乳食宿滯不化胃滿利咽止惡心便利不調大使酸臭傷乳食或作諸癟
代赭石醋蝦淬赤石脂少燒紅各一兩杏仁炒去皮五十粒研為泥
巴霜一升淨凡巴豆取仁一升裹膜油取巴霜一升重方可為定體之法

右除杏仁色霜外為細末研杏巴研勻水浸蒸餅元黃米大每至元溫米湯下

(消積丸治證同上砂仁制青皮淨陳皮莪术三錢並煨各半兩)

卷二十

二十

巴豆二十粒去皮膜不去油同前味炒令黃色去巴豆不用

研末醋麵糊元黃米大每三十元溫米湯下旦服量兒大少加減

演山褐元子治陰陽不和臟腑怯弱乳食不消心腹脹滿食癰乳癰痞結冷痛或秘或
利頭面腫滿五疳八痢功效非常直指加實即五蠶脂各一兩吞紫霜元治疳脹
蘿蔔子三兩微炒淨陳皮油青皮黑牽牛半生半炒三錢莪术各炮各兩

胡椒半兩木香一分又一方加吳茱連半兩苦練根半兩蘿蔔子只二兩

仁蘇下積元治乳食傷積心腹脹滿氣粗壯熱或腹立嘔

一青砂仁二十个炒研末大每半錢烏梅肉燒巴豆肉三个不去油

五味和研爛敍元麻子大每半錢煎水服不傳皮湯不

集驗蓬木元治乳食不化心腹脹滿一切所傷

三棱莪术並煨淨陳山梘青皮蘿蔴白炒各半兩砂仁淨青皮

沖枳殼制胡黃連蘆薈各三錢胡椒二錢半

細末糊元黃米大每三十元加至四十五元溫米飲下旦三服忌生硬冷物

剪紅元瘧癆積殺諸虫進飮食神效男女老幼皆可服孕婦莫服

乾漆一錢炒令煙盡紫朮花一錢醋拌炒巴豆七个去皮膜心不去油

麝香不去頭足翅炒研時塞了鼻

右為末醋糊元梧子大汗紅紗包紅線縛定剪下來每服元同後熱服

南木香雷丸三錢

義木生首部微炒各半兩

硝砂一錢

各半錢

史君子四九不生半炒牽牛草取頭末三兩半

細末用肥皂角升鉢搗碎前承一兩苦練根皮二兩水四五碗慢火砂鍋

煎至一小杯將前末搜為元梧子大目乾小兒粟米大毒脂二錢半重各隨

改湯使引下五更初服忌葷腥生硬油腻物此方与諸方甚異毋忽

小兒齁喘急咳嗽嗽白皮湯下

取半白虫煎石榴根湯下

脚氣腫不可行木瓜湯或蜜水下

取蛔虫苗少沙糖水送下

小兒一切諸證蜜水或砂糖水下

酒痢酒積百藥煎湯下

婦人血脉不行淡醋湯紅花湯下

婦人血蠱病葱心白湯下

腸風下血煎小桔子湯下

食積氣塊諸證用溫蜜水溫茶湯下

真方五色元李治小兒一切所傷癰癤壅塞胃膈不利乳食不消變生癰積腸肋片硬

按之疼痛及治一切急慢驚風發搐癰癤壅塞

(青李) 青黛別研南星姜製各半兩

巴霜半錢

(紅李) 朱砂水飛半夏姜制各半兩

巴霜半錢

(黃李) 大黃煨薑金各半兩

巴霜半錢

(白李) 白附子生寒水石煅各半兩

巴霜半錢

(黑李) 五靈脂炒金蝎炒各半兩

巴霜半錢

○諸癥證治附五軟

卷二十

十一

右前五色藥各另研為細末色霜半錢同勻麵糊元粟米大面脂五丸

胡黃連半兩猿猪膽二個射育少許為末猪膽元麻子大麥五七元飯飲下

湯氏大胡黃連元面糊消腹脹虫動多睡黃瘦心煩熱

胡黃連宣連苦練子肉各一兩白蜜去扇半兩炒乾蟾頭燒存性一分

射育一錢青黛一兩半蘆薈一分別研

右前四味為末猪膽汁和為丸每胡桃大入巴豆仁之不輕用油單一重包之蒸

熟却入後四味糊元麻子大每服十五元清米飲下食後晚卧日進三服

肥兒丸脾疳肚癟食泥消虫進食

胡黃連神曲麥蘖各一兩並炒史君子肉別研為末粟米飯丸蜜豆大米飲三王元照時

賓郎不生陰史君子旋外為末糊元粟米大密飯飲下亦隨加減

錢氏大蘆薈丸治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連黃連蕷夷去扇蘆薈木香淨青皮砂仁開胃者集亦有殺虫

雀氣炒各半兩射育一錢另研為末粟米飯丸蜜豆大米飲三王元照時

史君子元臟虛滑泄及疳瘦下痢腹脹滿不乳常服安神補胃消疳肥肌

擇朴姜製河子肉半兩蜜豆各半兩蜜豆肉一兩橘梗根蜜豆

第陳皮牙青蠟丸治頭顱不舒體瘦骨露有如雀膝骨腫不足非治腎怕天柱傾倒腎主骨也

北黃元治頭顱不合体瘦骨露有如雀膝骨腫不足非治腎怕天柱傾倒腎主骨也

熟地黃洗焙八錢澤鴻洗三錢牛川皮志白茯苓各三錢川茱萸肉牛膝

鹿茸酥炙山藥各四錢為末蜜元桔子人三歲已下三三溫水空心化下

湯氏貼項方治肝膽停熱致令筋軟用此貼項

附子生去皮臍南星功為末姜自然汁調貼患處次服防布元瀉青元

鄭氏麝連元酒積勞熱黃瘦髮稀腹急氣喘阳乳盜汗

薰連一兩酒浸一宿使君子、蠶甲米醋炙紫胡淨陳皮、無薑、青皮各半兩

仁七味剉碎巴豆仁四九粒炒黃色去巴豆、賓郎木香各一分射香半錢

秦艽半兩為末酒糊元如小豆大三歲三十元米湯下無時

牛黃煎諸瘡諸癆食傷腹急骨蒸消瘦至堅面黃壯熱多困少力

乾蚯蛻一個酒一盞煑猪脂六不同浸一宿焙乾夫骨半兩牛黃二錢

射香一錢龍膽草半錢朱砂、蘆薈、菖蒲、熊膽、沒石子去殼使君子肉

雄黃、蟬退、胡薰連、訶子炮肉、蕪荑仁、木香、夜明砂、肉豆蔻各一分

為末煉蜜元小豆大三歲三十元米湯下無時

麝沉膏治疳渴白濁腥臭肥膩骨熱多渴腹痛不食羸乏無力頭骨垂倒

乳香一錢木香炮一錢訶子炮肉四錢射香半錢沉香半錢、蚯蛻酒浸取肉

沒石膏治鴉白濁腥臭肥膩骨熱多渴

沒石子二个香附子四錢、參、訶子炮肉、丁香各一錢皂莢壳一錢巴豆搗粒針

冬黃六錢肉豆蔻半兩取孔子入乳香在內姜汁麵裹炮焦辛麵

為末蜜元雞頭大三歲一元米湯下

六神丸治疳氣消瘦臟腑怯弱渴鴉白濁腥臭肥膩骨熱多渴腹脹一涌

木香丁香肉豆蔻麵煨訶子炮肉使君炮各半兩薑、苦、一兩為末蜜元

加減米湯下又方黃蠟猪大浴雞子不碎和炒熟食食盡至一元子治休息疳渴烈如火

沒石膏治鴉白濁腥臭肥膩骨熱多渴

金靈散久患瘡疾体虛可食及諸病後天柱骨倒醫者、識謂之五軟

白姜蚕豆炒為末三歲半錢薄荷酒調下後用生筋貼之用木別子六

去殼草麻子半粒去殼研細先急抱頭搗頸上令熱津吐調貼之

太黃元治無毒清證壯熱瘡戀大黃三兩木香半兩五味米附一升和置銅碗內用

端葵葉、重湯浮湯上炭火煮竹管搗候可隨即用糊和一、小豆大三歲二十斤米

湯下加減服當下青膿為效又方以漏蘆為末每服一錢猪肝兩片薑少許水煮空心

磨酥散治走馬消癰潰侵飭鼻

乾蟾散黃泥裹入燈紙黃連各一分青黛一錢為末入射、許和研粉傳乾

油調亦治身上肥瘡但痛瘡神效又南星入雄黃、麵娘入射為末傳之

柏胡薰連丸治熱瘡

胡薰連川薰連各半兩蜜丸一錢半研

右通氣藥不列。大猪膽內綽定，歸縣於中者，以水取研，置器中。
青黛一錢半，去皮蠍，交一錢射少許，粳米飯，元麻子，大黃，桑白皮，各一錢，鈎藤皮
（或神元治心肺驚，川枝神薑，薑，燒柏黃連，赤茯苓，各三錢，鈎藤皮
遠志，肉荳蔻，製蜜，蠍，各二錢，細節菖蒲，二錢，射少許。

為末，粟米糊，元麻子大，每十元薄荷湯下。

（清肺飲治肺疳熱，瘡，膿，穿孔，汁臭，或生息肉。

桑白皮炒半斤，生蘇北紫胡，黃芩，當歸，天門冬，去心，連翹，防風

赤茯苓，桔梗，生地黃，甘草，炙，各二兩。

細剉每服二錢，水煎，食後，却用前藥酥散，傅之。

黃連元治痢渴，苦連半兩，淨以猪膽汁浸宿，晒乾，瓜蒌根，烏梅，焙乾，杏仁去皮，另研，蜜一錢，肉桂二錢，烏米半膳，汗浸，糕作糊，元麻子大，烏梅湯，燒

（阿胶元治無辜痢，諸痢之服虛熱退，服須渴止，三服鴻劑住。

蟾蜍隨數夏月，溝中取腹大，不跳不鳴者，而身多癩者。

右取糞虫一杓，置桶中，張漫之，桶上要乾，必不可走，將蟾打殺，放桶中，俟其食

一日，次以新布袋兜住，急流中，一宿取出，焙末，射少許，粳米糊

為元，每三元米，飲下，三方夜明沙炒為末，入飲食中啖之，治无辜痢。

（龍膽湯治腹病，龍膽草，鈎藤，柴胡，桔梗，芍藥，川芎，茯苓，甘草，炙，各二錢，人參一錢，大黃一錢，半煨，剉水煎，仍以紅紗袋，夜明沙，帶。

卷二十一

九三

（豬肚黃連元治疳熱，流注遍身瘡，或潮熱，肚脹或渴者。

雄豬肚，乙具，淨洗，大宣連淨五兩，判作小截，水和潤納，猪肚中線縫放在五

升梗米上，蒸至爛，入口，中入少蒸飯，搗千杵得，所搗元小稻子，大每二元米，數粒，

仍服調血清心之劑，信之，凡此病不出於疳，則出於熱，於肺生痰，常有識此。

金匱五疳保童元治五疳八，即西黃，肥瘦頭髮作綬，好食，不可思，食

大乾蠍，一个燒存性，毛角一錢，大皮弦燒存性，蛤粉三錢，水飛，射一錢，別研。

細末糊元粟米大，每三四十元空心溫米飲下，日二服。

錢氏龍粉元治疳渴，龍膽草，定粉，微炒，烏梅肉，焙黃，連各三分。

為末，蜜元麻子大，米，共下三元，无時，拌，蜜，用補藥，適反生大熱，而渴，當審。

（幼方）小兒耳鼻下赤爛，溫藥名月蝕，消瘡。

黃丹乙錢，煅赤，袁豆粉一錢，白凡一錢，飛研細，乾傅，擦上，唾調亦可。

直指取辟元治，肠傍，膜包水，僻側作痛，遂發寒熱，潮熱，先服平肝清肺藥，却服此

甘遂微炒，芫花炒，牽牛半生半炒，取末，辣桂，義木，淨青皮，桃仁，赤皮炒

木香五錢，防各二錢，為末，巴霜一錢，研勻糊元麻子大，風乾，每三元，姜蜜湯下。

（鴻民端氣元治積水，驚水飲，水多，停積於脾，肢腫而熱，

亦小巨陳皮蘿白子廿克，苡米半兩，木香炮一分，㕮咀，草煎。

（御院）氣散治，肺氣逆喘，吸，出，浮，骨，膈，痞，悶，小便不利。

桑白及，兩淨陳皮，兩半桔梗炒，甘草炙，赤茯苓，各二兩，蜜，香半兩，水通，羨，藥。

○諸訛證治

小兒病惟挑證居多當審虛實實則面赤氣粗燥渴夜腫脹大小便難煩躁呼噦則面色青白恍惚神緩吊泊冷噓氣軟弱沉澀多承夜盜汗其或有清寒佛櫻角憐惕上盛下泄則冷熱不調之證虛熱用惺惺散火熱散加川芎柴胡熱不調香菖湯加正氣散打丸且先消表和胃其或表裏已解熱安時來此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外不可首用涼藥後陽動於內身體自涼參參草散用演山古議恐有半證驚熱非熱厥熱潮熱傷寒熱瘡熱積熱丹熱瘡疹熱毒熟脫甲散治爲寒未足体熱頭昏昏沉不思飲食夾驚火食寒熱木便秘或赤或白煩躁作渴水汗妄流夾積火傷脾胃腹泄青黃體瘦日夜發熱及傷風傷暑驚癇客忤筋骨頭腦急等熱並宜服之

柴胡當歸洗龍膽草知母各三錢人參川芎各一錢半甘草炙錢麻黃二錢杏仁外朴一錢重細末每一錢水小盞葱白連根須煎半溫服無時大連翹飲治證同上解利心經抑熱常令疎通及膈熱眼鼻腫脹口舌瘡津液不導嘴糊後雖在表裏並得其證熱風痰熱四證皆能消化

連翹明桂麥穗滑石車前子牛蒡子炒赤芍各一兩桔子仁木通當歸防風各半兩黃芩一兩半柴胡甘草各三兩荆芥穗一兩半蟬退去足一分

哎咀每一大錢水一小盞煎取半風瘡熱變蒸熱麥門冬志前实

黃芩前瘡疼熱末前已出後紫草當歸煎胎熱肺熱傷寒後餘毒熱瘡黃芩同煎至半空一服

卷二十

十四

疔瘡毒挑加薄荷前、遠慮毒挑加大黃朴消前

(梨糉飲治證在前治脾積寒熱如瘡先服此藥然後下其癥積瘡塊

半夏泡洗淨厚朴一味各一兩生姜和皮兩搗漬三宿令透日乾慢火炒焦

青蒿取花頭用童便浸三天日乾用柴胡人參黃芩前胡秦艽去土

甘草各一兩甘草炙意以炒白茯苓白朮各半兩

白芍一錢水一小盞生薑半盞生藥生梨無則梨條亦可薄荷二葉生地

黃芩同煎至半空一服

正氣調胃散治八種虛症作熱或吐或瀉發熱壅亂卡氣不復常心虛煩悶作熱半夏泡洗淨厚朴一味各一兩生姜和皮兩搗漬三宿令透日乾慢火炒焦

白芍一錢水一小盞生薑半盞生藥生梨無則梨條亦可薄荷二葉生地

白芍一錢水一小盞生薑半盞生藥生梨無則梨條亦可薄荷二葉生地

黃芩同煎至半空一服

鄭氏犀角飲治小兒骨蒸熱潮熱盜汗肌瘦

犀角屑、鱉甲酥、大柴胡知母各半兩地骨皮胡蘿蔔連各一兩川大黃

桃枝各半兩哎咀一歲一錢服水半盞煎服無時

靈犀飲治骨蒸潮熱

盜汗咳嗽食多渴面黃肌瘦壯急氣粗虛熱餘熱遺

犀角參消風散治兒解脫傷風骨膈有涎惡風壯熱加朱砂射毒尤佳

玄湯小兒熱瘡

當歸大黃川芎熟地黃白芍柴胡各二兩生地黃桑白皮各一兩

當歸大黃川芎熟地黃白芍柴胡各二兩生地黃桑白皮各一兩

為末三歲水煎服半盞前服無障

和劑三黃元治諸熱及身黃黃疸取治鼻衄便血衄血藥水擦下便血赤小兒水

導赤散治小兒客熱心躁睡語利小便演加黃芩減半名火府散

木通生地黃乾甘草各等分咬咀三歲一錢入少竹葉水煎服

藿香散合肺胃虛弱有熱者水喉氣逆收及轉取過多者

麥門冬心半夏麴甘草各半兩藿香一分石膏半兩為末三歲水煎

草果飲治寒熱盜汗不思飲食同黃膠急

草果二兩厚朴薑兩甘草半兩棗子半兩生熟各半皮同桔楂宿

咬咀三載一錢水半盞煎方治五癰夜明沙為末冷水調下半錢効

陳山參散治癆

虛煩作渴不思食體重服此卷前頭效

集驗前木散小兒傷風傷寒或瘡或疹此藥無寒無熱疎風順氣一切諸熱證

前木亦各一兩制蜜丸二兩甘草半兩炒細末隨大小三錢又名洋和散

人參、芥末、當歸、龍腦草根其葉炙赤芍白芍各一錢制枳殼等分為末麥門冬湯下

集驗前木散小兒傷風傷寒或瘡或疹此藥無寒無熱疎風順氣一切諸熱證

前木亦各一兩制蜜丸二兩甘草半兩炒細末隨大小三錢又名洋和散

傷風傷寒北熱咳嗽鼻塞聲重生姜葱白湯下傷風潮熱或寒蒸發熱

薄荷湯風熱傷肺鼻涕氣粗紫疏湯暴卒急驚風熱宜急驚門疎風散

病後之傷寒熱保養散發汗止前麻黃湯調盜汗自汗杜房浮蒙湯調

母乳熱煎順飴湯調眼暈亦熱腫前羌活黃芩生地黃湯調口舌脣項

熱清生瘡煎防風牛蒡子湯調咽喉疾重豆煎麻枳殼大黃防風薄荷調

卷二十一

卷二十一

粟胡飲子治傷寒五六日發挑刺挑大便秘乳母多服

紫胡人參芍藥當歸黃芩大黃甘草炙各半兩咬咀隨大小加減姜煎

簡易養神散治小兒經汗下熱去復作收斂胃氣清涼肌表神效

人參、白芍各一錢炒各半兩扁豆瘦米知母生地黃甘草各半兩

淡竹葉地骨皮、麥門冬各一分細末每錢水一小盞姜片乘不煎無時

保良紫石膏元示兒寒熱不解及傷寒溫壯後熱不歇又食糲吐噔阻乳有熱

和劑清涼飲子治小兒藏府壅熱生熱煩亦多渴惡煩躁躁腹熱或渴熱

先寒後熱此方無不治雖下一小虛人方具前積滯門身熱留置熱敷又為地兩

連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發熱瘡又風熱瘡腫目赤咽痛瘡疹餘毒

人參羌活散治傷寒發挑頭痛身疼或潮熱煩渴痰火咳嗽

桔梗川芎甘草赤芍大黃各等分粗末每錢水煎空心溫服得微利為度

川當帰甘草赤芍大黃各等分粗末每錢水煎空心溫服得微利為度

桔梗川芎甘草白芍各半兩前胡

咬咀每錢水半盞姜片東半不薄荷葉煎溫服無時瘡疹未發亦可服

介柴胡湯治感寒發挑或瘡瘍疾湯代加生地黃、川芎和劑

鐵氏背皮散虛熱潮作亦治傷寒壯熱

智母紫胡川芎人參地黃川皮赤芍各半兩

為末每錢水煎服

第廿卷終

