

外臺秘要方

二十三

外臺秘要方卷第二十六痔病陰病九虫等
朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院
上進

三十五門
藏書
上護軍臣林億等

五痔方一十二首

五痔方數年不差六首

五痔脫肛方二首

腸痔方一十五首

諸痔方二十八首

痔下部如虫齧方九首

大便下血風冷積年變作痔方三首

灸痔法二首

雜療痔方五十五首

脫肛方三首

肛門凸出方三首

卒大便脫肛方六首

腸肛俱出方二首

脫肛歷年不愈方三首

疝氣癩方六首

卒病癩方五首

癩卵漏大方三首

灸諸癩法一十四首

陰腫方六首

陰疝腫縮方一首

陰卒腫痛方三首

陰囊腫痛方五首

陰下瘰濕方七首

陰痛方三首

陰瘡方七首

陰邊粟瘡方五首

著礪砂方四首

九虫方二首

五藏虫方七首

長虫方二首

蛔虫方九首

寸白方一十九首

蟻虫方六首

三虫方七首

雜療虫方三首

五痔方一十二首

崔氏論曰凡痔病有五若肛邊生肉如鼠尾出孔外時、濃血出者名牡痔也若肛邊腫痛生瘡者名酒痔也若肛有核痛及寒熱者名腸痔也若大便輒清血出者名血痔也若大便難肛良久肯入者名氣痔也此皆坐中寒濕或房室失節或醉飽過度所得當時不為患久、不差終能困人別有大方今單行亦要便宜依按用之肘后集驗同出第四卷中
廣濟療五痔方

生槐煎五分

皂角吳二兩
去皮子

麝香研

鱧鱓魚炙

雄黃研

良薑熬

丁香各五分

木香二分

石八味搗篩以槐煎和丸分為五丸取一淨瓶可以一弁以末掘地理之著一疊子于瓶上鑽疊子作孔內火瓶甲反蓋之然內藥一丸燒之令安穩以下部着疊孔上坐便通汗其盡一丸藥即止內痔以藥一丸內下部立効仍不及薰忌魚

熱麩膏

又療五痔蝟皮散方

蝟皮炙

龜甲炙

當歸各六兩

黃耆

槐子

大黃各八分

蛇皮炙五分

露蜂房熬五分

藁本

桂心各五分

猪後懸蹄甲十四枚熬

右十味搗為散空腹以米飲服方寸匕日二漸加一七半不

利忌麩炙肉雞魚葱蒜

又療五痔下血不止方

槐子

五色龍骨

榭若炙令紫色

乾姜

茅薊

當歸

菡根

吳茱萸各六分

白歛

附子炮五分

黃耆八分

大黃十分

猪懸蹄甲十四枚

髮灰四分

右十味搗篩密丸空腹以飲服如梧子二十九日二漸加至

四十丸若利恐多以意減之忌生冷炙肉魚蒜出第四卷中

小品療五痔散主酒客勞及損傷療下部中傍孔起居血縱橫出

又肉方

赤小豆四分熬黃耆三分

附子炮

白歛

桂心各兩

芍藥

黃芩各二兩

右七味搗為散以酒服方寸匕日三止血大驗文仲備急集

驗同

又方

藜芦

大黃

黃連

練木子十四枚

桃仁十四枚去皮尖

巴豆四枚去皮心

葶麻

十四枚各相準

右七味以猪肪一升煎三沸下去滓停餐肉上日三外

着此膏內服紫參丸常併行右今錄驗同

又療五痔大便取邊清血出紫參丸療久不差服之無不差方

紫參

秦艽

乳髮灰

紫堯

厚朴炙已上各一兩

藜蘆本一兩

雷丸

白芷一兩

麝香半兩去翅足熱

石南半兩

貫衆

猪後懸蹄甲十四枚

右十三味搗篩以羊瘡骨中髓合猪脂各半并煎和丸如梧

子大未食酒服十五丸日再亦可飲下劇者夜一服四日取

邊痔止八日濃血盡鼠乳悉愈滿六十日終身不復發久服

益善有痔病十八年取出長三寸服此方即愈亦療脫肛有

人熱可除羊髓以赤蜜代集驗倍急千金同禁生冷魚肉

集驗療五痔有氣痔溫寒濕勞即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如

鼠乳孔中頭見外妨于更衣蟹甲主之牝痔從孔中起外腫五

六日自潰出濃血蛻皮主之腸痔更衣挺出久乃縮牡猪左懸

蹄甲主之腸痔更衣出清血蜂房主之

右所主藥皆下篩等分隨病倍其所主藥為三分旦早以井

花水服方寸匕病甚者旦暮服之亦可至四五服忌冷食猪

肉生菜房室唯得食乾白肉病瘥之後百日方通房內又用

藥內下部有瘡內瘡中無瘡內孔中千金剛繁文仲同

又方 野葛燒末

右一味以刀圭內藥中服五日知二十日差三十日愈餘安

用之良千金同

又方

煮槐根洗之又煮槐根洗之千金倍急同第出第九卷中

刪繁療五痔桃葉蕪痔方

桃葉解

細糖

胡麻各一具熬

右三味合為一家蕪之取細糖熟為度內小口甕中將肛門

坐上桃氣熏入肛門虫出當死出第十七卷中

千金療五痔方

摺皮分三指大切 熏黃如棗大 熟艾如藪子大

右三味穿地作調和取便薰之取口中熏黃烟盡出為佳
火氣消盡即停三日將息更薰之三度水差勿犯風冷羹臃
將補慎難猪肉生冷二十內補之

又方

素耳

右一味作羹空腹下飽食之待孔卒痛如鳥喙取大豆小
豆各一升合搗作兩囊中蒸之及熱更互用之坐之即差並
出第二十四卷中

五痔數年不瘥方六首

深師療五痔數年不差槐子丸主燥濕痔：有雌雄為病苦暴
有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者有腸中煩痒者

三五年皆殺人忌飲酒及作勞色犯之即發

- 槐子 乾漆熬 檉木根皮各四兩 秦朮
- 黃芩 白歛 青木香 牡蠣
- 龍骨 附子炮八角者 雷丸 蒺藜子
- 白芷 桂心 雞舌香各二兩 黃耆二兩

右十六味搗篩蜜和為丸一服二十丸日三服忌猪肉冷水
雜魚蒜生葱千金翼同 千金翼有丁香菜萸根皮無雜舌
香檉木皮

千金小槐小寶丸主五痔十年方

- 槐子三斤 龍骨十兩 礬石燒 硫黃各一斤
- 白糖二斤 大黃十兩 乾漆十兩

石七味搗篩石二種及糖並細切內銅器中一石米下蒸之
以綿絞取汁以和藥合作丸餅手捻之丸如梧子大陰乾一

服二十九日三服深師同

又槐酒五痔五十年不差方

槐東南枝細剉 槐東南根細剉 槐白皮細剉

槐子一石

右四味大釜十六石煮取五石澄取清更煎一石六斗炊兩石黍米上麴二斗釀之攪令調封泥七日酒熟取清飲日三四遠寒溫量性常令小。解耳合時更煮滓取汁擣米洗器不得用生水此藥忌生水故也深師併翼同

又方

塗熊胆取差乃止旦發即塗一切方皆不及此故急并翼同並出第二十四卷中

古今錄驗療三十年痔肛出下血如雞肝此腸痔肛邊生瘰癧肛中此壯痔肛邊生乳此壯痔皆飽勞氣所生

大黃如金色者

滑石研

芒消

桑白皮

棗三十枚擘

黃芩

杏仁

右七味切以酒一斗二升煮取二升盡服之當下以大骨蒸

補之

入療十年痔如鼠乳膿出便作與劇白飲散之

赤小豆

黃耆

芍藥

白飲

黃芩

桂心

蜀附子

牡蠣

右八味搗篩為散酒若泔汁服方寸匕日三服忌豬肉生冷並出第三十卷中

五痔脫肛方二首

千金療五痔脫肛槐皮膏止痛痒血出方

槐白皮

薰草

羊糞

甘艸

白芷

野葛

巴豆

漆子

桃人 十枚去皮

猪脂半斤

右十味切以猪脂煎三上三下去滓以绵突膚塞孔中日四
五通虫死差止痒痛大佳出第二十四卷中 董州肘後作

董陵

必効五痔脱肛方

以死蛇一枚指大者用温掘地作坑烧蛇取有孔板覆
坑坐上虫盡出張文仲處出第六卷中

腸痔方一十五首

肘後療患腸痔每天便當有血方

以蒲黄水服方寸匕日三差備急文仲崔氏古今錄驗
並同

又方

礬石熬 附子炮各一两

右二味搗篩密丸如梧子服二丸酒下日三稍增百日永差
不發忌猪肉冷水備急文仲崔氏千金同 崔氏方有乾姜

一两

又方

以鯉魚作鱠姜葢食之任性多少良 崔氏用鱮魚

又方

常食鯽魚羹及蒸随意用之備急文仲並出第三卷中

文仲療腸痔方

以槐木上耳搗末飲服方寸匕日三肘後古今錄驗并
金同

又方

白薔薇根 枸杞根 各二两炮乾

右二味搗篩為末服方寸匕日三服五六日當更小腫是中

病至公傳將服勿止崔氏備急肘後同

又方

生地黃一斤 酒三斗

右二味以酒漬地黃三日隨意飲多少即差肘後備急同

又方

取枳椇皮米飲服方寸匕日三亦可煮汁常飲肘後備

急崔氏同

備急療腸痔方

以穀子燒末傳之深者真之文仲崔氏中

又方

以槐白皮一握剉水煎令濃脫衣入中坐常如欲大便
狀冷更易不過三出

又方

搗槐白皮作屑粉以真之崔氏文仲千金必効同又以
繁萋燒灰礬石熬和為粉之崔氏文仲范汪同出第

六卷中

刑繁療肺虛勞寒指至腸中生痔名為腸痔肛門邊有核痛寒
熱得之好挺出良久乃縮生猪懸蹄青龍五生膏方

猪懸蹄甲三枚 生梧桐白皮蜀 生龍膽五分

生棠白皮五分 蛇脫皮五分 椎黃五分

生青竹皮六分 生栢皮七分 露蜂房炙

蜀椒汗各三分 猬皮 附子炮各四分 杏人二十枚

右十三味細切綿裹以苦酒三升浸一宿于火上炙燥搗篩

以猪脂三升和微火煎之如薄糖傳并酒服如棗核並出茅

七卷之中

崔氏療大便后出血此腸痔之疾宜服薤白湯方

薤白 切二合 羊腎脂 一斤

右二味後火煎令薤白黃去滓稠盡未差更服即止得膿血
子糞相和即差便可服後方

白礬 燒汁尽 附子 炮炙 乾姜 各一兩

右三味搗篩蜜和飲服二丸至三日二服忌猪雞酒麩生冷
魚油膩等並出第四卷中

諸痔方二十八首

廣濟療痔下血方

以蛇不問多少煎煮肉消盡去滓用汁和婆羅粉著少鹽
食之大効一無所忌

又黃耆丸方

黃耆 枳實 各三兩 烏蛇 炙 當歸
赤石脂 各兩 蝟皮 二兩炙

右六味搗篩蜜丸空腹酒下如梧子二十九日二服更不加
減不利忌麩猪肉魚蒜陳臭湯並出第四卷中

范汪療痔下血黃連麴散方

黃連 三兩 麴 二兩用七月七日者

右二味搗篩薄蜜漫先食以飲服五分日三不知增至方寸
匕

集驗療治獨皮湯

獨皮 一具細切 附子 炮二兩 當歸 二兩 連麴 二兩
乾地黃 五兩 乾姜 二兩 礬石 二兩燒令 續斷
黃耆 各一兩 槐子 三兩

右十味搗篩蜜丸飲服十五丸如梧子日再加三十丸亦主
瘰常用大驗忌猪肉冷水肘後備急文仲刪繁千金古今錄
驗同

又方

以槐皮十兩削去黑皮熟搗丸如彈子綿裹內下部中
大効脩急千金同

又方

以槐赤雞一斤為散飲服方寸匕千金云槐糲也

千金療痔神方

以七月七日多採槐子熟搗涎取汁重綿絞內銅器中
盛庭高門上暴之二十日以上煎成取如鼠糞大內穀
道中日三亦主瘰及百腫瘡救急崔氏古今錄驗同

又方

鯉魚腸 三具以火炙令香

右一味以綿裹內下部中一食頃出當出魚腸數二易之盡
數枚當差一方云生上出出古今錄驗同

又方

虎頭骨炙 犀角

右二味各為末如雞子大以不中水猪脂和塗瘡上即差救
急深師同並出第二十四卷中

崔氏療痔方

崔林艸 一大握粗切

右一味以水二大升煮取一大升頓服盡三日重作一劑无
不差

又方

取駱駝頷下毛燒作灰可取半雞子大酒和搗用之並
出第四卷中

必初熨療痔法頭出或疼痛不可堪忍方
取枳實煨灰中煨之及熱熨病上盡七枚立定發即熨

之永除也

又方

以麝香當門子印成鹽相和以手塗痔頭上若令人着亦佳其痛不可忍者不過兩度永差

又方

以野猪肉炙食十頓即差三方云奇効

又方

取五月五日蒼耳子陰乾搗末水服方寸匕日三差乃止

又方

以一十年久鍼縫袋上燒作灰分和水服

又痔止癢疼痛方

以葱和鬚濃煎湯置盆中坐浸之消更即痛止

又方以狸肉作羹食之或作脯食之不過三頓無不差

又方

以肥大棗一顆剝去赤皮取水服掌中以唾研令極熟塗棗款上內下部中差

又方

姜屑二兩小秤

右一味以水三大合煮之取一合取滓煖空腹服隔日再服忌猪肉蒜等

又方

倚死竹黑色者取之折斷燒為灰篩和薄飲服之方寸匕忌牛肉餘魚所忌出第三卷中

古今錄驗療痔黃耆丸方是直穀日者散騎常侍郎甄玄言起

黃耆

青箱子

漏蘆

鼈甲炙

狼牙各五分

黃芩四分

猪懸蹄甲七枚

蝟皮四分

白礬十分燒

羌青燂

斑猫去足燂

地膽去足燂

蜈蚣各八枚

肩角肩八分

右十四味搗篩為散年和丸如梧子大空腹以飲服二九日
二增之以知為度忘一切油膩 菟菜

大方

掘地深一尺圓徑四寸炭火燒令赤去火以薄魚著口
上取葭管子一合內坑中燒烟出痔人坐上以被擁當
汗出密屋內作之以烟盡更著一合葭管子熏避風如
法即差

久療諸痔及下血不止轉虛羸者服之无不効方

黃耆原州者

枳實高州者各二天兩半細剉熬令黃

黃礬石

一天兩炭火煨經一飯時乃數翻轉令勻著火冷洗去沙淨

右三味先搗黃耆枳實篩訖和礬石更搗令勻密和丸空
腹以酒下二十九加三十九日再服忌蒼麥猪肉蒜魚芫事

唯久服一年半愈良驗

久療痔方

鯉魚腸可半斤

右一味擇之令淨仍新鮮取一方板可濶二尺以來厚一寸
當中鑿孔深一寸半圓如醬蓋口大布魚于其內以麝香碎
末摻魚腸取厚二三重當心開孔可板大小鋪坐以被擁之
數進食可至兩炊久覺下部痛者即是腸出也時且更坐良
久取魚腸細擇之恐出入于腸中可長一二寸許細如繭絲
班作五色每出不過十餘枚不勒數出盡即止

許仁則曰此病有內痔有外痔內但便即有血外有異外痔下
部有孔每便血從孔中出內痔每便即有血下血甚者下血擊
地成孔出過多取体無復血色有痛有不痛者有此候者宜依
後藥方

生槐子一斗候未堅硬時揀

右一味搗令碎絞取汁日暴取稀取地膽暴乾搗篩為散槐子煎作丸以飲服十九日再加至三十九如梧子大參煎參燃作丸如枣核大內下部中日夜三四度亦可搗苦參末代地胆一方地胆作地脉艸藥中無地藥惟有地參依前生槐子煎不覺可宜合後黃芪十味散服之方

黃耆五兩

苦參

玄參各六兩

附子炮

大黃各三兩

乾姜二兩

蜎皮炙二兩

黃連各四兩

槐子六合

猪懸蹄甲一具炙

右藥搗篩為散空腹以飲服方寸七日再服之漸加至二十七忌猪肉冷水下卷中

痔下部如虫齧方九育

肘後療痔下部痒痛如虫齧方

胡粉

水銀

右二味以枣膏調勻綿裹夜卧內穀道中真之効崔氏同

又方以兔絲子熬令黃黑末以雞子黃和塗之集驗文仲備

急范注同

又方以杏仁熬令黑搗取膏塗之集驗備急文仲崔氏同

又方以蜎皮燒灰傳之又獭肝燒搗散塗之崔氏備急文仲同

又方以温湯令熱內少礬石以洗之良崔氏同並出第二卷中

又仲療痔下部如虫齧方

搗桃葉一斛蒸之令熱內小口器中以布蓋上坐之虫

死即差肘後崔氏備急同 一云有烏梅

又方掘地作小坑燒令赤以酒沃中搗吳茱萸三升內中及

熱以板覆上開一小孔以下部坐上冷乃下不過三度

即差肘後崔氏備急同

又方 以下豆一升加善酒五升煮豆令熟出暴乾復內令酒盡止搗末以酒服方寸七日三崔氏備急同

又方 以猪椒子一升酒一升漬經五日稍飲一日令盡肘後崔氏同第六卷中

大便血風冷積年變作痔方三首

崔氏療大便急去血或至一升數合面少血色此是內傷風冷積年多變作痔方

大黃五分 甘遂三分 黃芩二分 乾姜

附子炮各四分 桃人二十七枚去皮尖 葱白七莖

右七味以水六升煮取一升半先服半升藥稍安又服半升洵更血發又服半升未斷候發日再作不過三劑差忘猪肉

痔

又方 煮桃皮李皮扁菑苦參取汁漬之大佳出第四卷中

備急療大便血風冷積年多變作痔方

燒稻藁灰滲汁煎熱漬之三二度佳崔氏肘後文仲同

灸痔法方二首

崔氏灸痔法

以繩圍病者項令兩頭相拉展繩後大椎止中量之重繩一頭當脊正下以墨點記又量病者口吻頭接繩頭止下復點之又量病者口吻如前病中屈繩接前口吻繩頭正下復點之望使相當兩三處並下火重者各五百壯輕者三百壯即愈

又法

今病者平坐解衣以繩當脊大椎骨中向下量至尾椎骨尖頭記再折繩更後尾椎尖頭向上量當繩頭即下火高髡州初灸至一百壯得差後三年復發法又灸以便斷兼療腰脚並出第四卷中

雜療痔方五首

廣濟療痔瘻疽瘡方

光明砂別研 麝香當門子別研 蛇皮五月五日者熱

右三味等分研先以鹽湯洗拭乾于瘡上傳少密以散傳上

差止

小品療穀道中疼痛痔瘡槐皮方膏

槐皮五兩 甘草 當歸 赤小豆二合 白芷各二兩

陳豉 桃人各五十粒 去皮

右七味剉以猪脂二升煎候白芷黃膏成去滓以塗之三日

一度集驗同

刪繁療虛勞寒下痢不止肛邊轉生肉如鼠乳在下孔傍時

濃血出名牡痔驚甲凡方

驚甲炙 乾地黄 黃連 連翹各七分

栝樓 黃耆 乾姜各六分 鱗蛸五枚炙

猬皮炙 續斷各五分 附子炮 槐子

礬石各四分燒汁盡

右十三味搗篩以蜜丸如梧桐子大飲下二十丸漸加至三

十九日再忌如常

又療腎勞虛或酒醉當風所損腎藏病所為酒痔肛門腫生瘡

目酒勞傷發瀉清血肛門疼痛蜂房膏方

蜂房三四炙 生槐皮十兩 棟實 桃人各五十枚熱

白芷二兩 赤小豆二合碎 猪膏一升半

右七味以咀綿裹以苦酒一升漬一宿下膏煎取酒盡膏成

去滓取杏仁子大綿裹內肛門中又酒服一方寸匕出第三

卷中

必効療痔方及諸虫方

石榴東引根深者取一握

右一味勿令見風拭去皮剉之取鹿脯四指大一片炙兩畔令熱槌細碎以水三升煮取一升遠寒溫空腹頓服之其患痔甚者服即定諸出無問赤白並出並出第三卷中

脫肛方三首

病源脫肛者肛門脫出也多因久痢後大腸虛冷所為肛門為大腸之候大腸虛而傷于寒利而用氣嘔而氣下衝則肛門脫出因謂脫肛也出第十七卷

小出天品療脫肛方

以麥一升以器中燒坐土熏肛門即愈范汪集驗千金

同出第十卷中

刪繁論曰肛者主大便通肺大腸合也蹄為通事令史重十二

兩長一尺二寸廣二寸三分應十二時若歲傷于熱即肛閉塞

大便不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛大開便洞瀉肛門凸

出良久乃入熱則通之寒則補之不虛不實依經調之療肛門

主肺熱應肛門閉塞大便不通腫縮白蜜充通之方

以白蜜三升煎令成乾燥投冷水中可得丸長六七寸

許內肛門中倒身向上頭向下停少時炷燂斯須即通

泄千金同出第三卷中

千金療肛門出方

磁石 四兩研 桂心 獨皮 一枚炙黃

右三味搗篩為散服方寸匕日一服一服即縮勿舉重及急

帶衣洞斷房室周年乃佳出第十五卷中

肛門凸出方三首

刪繁療肛門主大腸寒應肛門寒則洞瀉凸出豬肝散方

豬肝 一斤炙 黃連 阿膠 炙 芎藭

烏梅肉 五兩 艾葉 二兩

右六味搗篩平日空腹溫清酒服方寸七日再若不能酒白
飲服亦得千金同出第三卷中

千金肛門凸出壁土散方

故屋東壁土 一升 研碎 皂莢 三挺 長一尺二寸者

右搗土為散裹粉肛門頭出處取皂莢炙煖更逆慰之取入

則止

大麻履底按入方

麻履底 蟹頭 一枚

右二味燒蟹為散傅肛門凸出頭灸履底以按慰令入頻按

永差矣並出第二十五卷

卒大便脫肛方六首

肘後療卒大便脫肛方

肘後療卒大便脫肛方

灸頂上迴髮中百壯

又方 以豆醬清合清酒塗之文仲備急方同

又方 燒虎骨末水服方寸七日三即差

范汪療卒大便脫肛方

以猪膏和蒲黃傅之指推內之但以粉之亦佳張文

仲備急同

又方 灸鳩尾膏上七壯備急文仲集驗同出第二十一卷中

腸取俱出方二首

肘後療若腸隨肛出轉廣不可入一尺來者方

搗上栝樓取汁溫服之以猪肉汁洗手隨抑按自得入

初范汪小品張文仲備急千金同

備急若腸隨肛出方

熬石灰令熱布裏熨之隨按令入冷即易小品文仲脩
急同出第八卷中

集驗療脫肛歷年不愈方三首
脫肛歷年不愈方

以生鐵三斤以水一斗煮取五升以洗之日再范汪千
金脩急文仲同出第六卷中

千金療脫肛歷年不愈方

以死鱉頭一枚燒令烟盡作屑以傅肛門上手按之令
入魚灸橫骨一百壯

又方以鐵精粉上按令入即愈並出第二十五卷中
瘞氣及癩方六首

廣濟療疝氣核疼痛方

黃耆 桃人去尖皮 山茱萸 五加皮

檳榔人各八分 葶藶子二枚 海藻洗八分 玄參十分

五味子十八分 牛膝六分 茯苓六分 茯苓二分

枳實炙 人參 續斷各六分 桂心八分

遠志志 石南各五分 龍骨八分

右十九味搗篩蜜丸如桐子大酒服二十丸日二漸加至四
十丸忌熱麪生葱大蒜粘食等物

又療腎虛疝氣腰膝冷疼陰囊腫痒狐陰方丸

狐陰一枚 木香 蒺藜子 脘胛
昆布各六分 牛膝 菟絲子各八分 酒漬 桃人去尖皮

石斛各十分 檳榔人十枚

右十味搗篩蜜和丸如梧子大空腹以酒下二十丸至三十
丸日再服忌熱麪蕎麥猪魚粘食等物並出第二卷中

集驗療癩方

取楊柳如脚大指長三尺二十枚以水煮令極熱以故布乾捲腫處取柳枝更互指之如此取姜文仲備急千金同

千金療癩方

桃人 五十枚去皮 桂心 二兩 澤瀉 二兩 蒺藜子 二兩

蜘蛛 五十枚 防葵 細辛 橘皮

茯苓 五味子 芍藥 地膚子

牡丹皮 海藻 洗各二兩 狐陰 一具 防風 二兩

右十六味下篩蜜丸服十九如梧子大稍至二十九忌胡荽

生葱生菜酢物出第二十五卷中

備急療癩方

以桃人擣薄之亦療癩人陰腫乾即易集驗同出第五

卷中

古今錄驗療癩蒺藜丸方

蒺藜子 乾地黃 各十分 鹿茸 炙十分 白歛 八分

磁石 礬石 鍊六分 鐵精 桂心

續斷 巴戟天 芍藥 玄參

通州 升麻 牛膝 寄生 各八分

澤瀉 七分 射干 八分 茯苓 十分 海藻 八分如髮者

右二十味搗篩以蜜和為丸如梧子大飲下十九日二漸增

至二三十丸忌生葱薑菜生血等物甄玄言處出第十一卷中

卒病癩方五首

肘后療超躍舉重卒得陰癩方

白木 五分 地膚子 十分 桂心 一分

右三味搗末以飲服一升去日三忌生葱桃李雀肉等物古

今錄驗同

又方

椒陰 一具炙

海藻

牡丹

桂心 二分

右四味搗篩為散蜜和為丸如梧子大小兒服五丸大人增之忌胡荽生葱

集驗灸卒癩方

以蒲橫度折之一倍增之以布著小腹大橫理會度中與上當臍勿使偏僻灸度頭及中央合二處隨年壯好自養勿舉重大語怒言大笑呼喚千金范汪同

又法

牽頭陰正向上灸莖頭所極又牽下向穀道又灸所極又牽向左右解直下行灸所極皆使正直勿偏四處炷隨年壯佳千金范汪同

又法

灸足厥陰左右各三壯穴在足大指間是也千金范汪同並出第九卷中

癩卵偏大方三首

千金療癩疔卵偏氣上方

牡丹

防風

右二味搗為散溫酒服方寸匕日忌胡荽出第二十五卷中張文仲小呂牡丹散療癩偏大氣脹方

牡丹

桂心

防風

缺精

豉 各一分

右五味搗篩酒和方寸匕服之小兒一力至二十日愈嬰兒以乳和如大豆與之大効忌生葱胡荽肘後同出第七卷中古今錄驗牡丹五苓散療癩疔氣陰卵偏大有氣上下脹大行走腫大服此良驗方

牡丹皮

防風

黃蘗炙

桂心 各一分

桃人去火尖
研二分

右五味搗為散以酒服一升圭二十日愈少小癩症最良小兒以乳汁和如一大豆與之長宿人服方寸匕忌生葱胡荽
出第四十一卷中

灸諸癩法一十四首

千金論曰男癩有腸癩卵癩氣癩水癩四種腸癩卵癩難差氣癩水癩鍼灸易差

又卵偏天上入腹法

灸三陰交在內踝上八寸隨年壯

又男陰卵偏天癩法

灸肩井在肩解臂接處隨年壯男癩灸手心指端七壯病在左者灸右者灸左良効差止

又法 灸關元百壯

又法 灸玉泉百壯報之穴在臍下四寸

又法 灸泉陰百壯三報之在橫骨邊三寸

又癩病陰平腫者法

令並足合兩拇指爪相並以一艾炷灸兩爪端方角處一炷令稠上兩爪角各令半炷瓜上七壯

又兩丸縮入腹法

灸二陰交隨年壯神効

又男陰卵天癩病法

灸太陽五十壯三報之

又法 灸足太陰五十壯亦在內踝上一尺

又法 灸大姆指內側去端一寸白肉際隨年壯甚驗復灸之

又法 灸橫骨兩邊二十壯夾莖是也

又法 灸足大指理甲十壯隨邊腫灸之

灸小兒癩法

先將兒至碓頭祝之曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝
三七二十枚灸訖便牽小兒令雀頭下向暑囊縫當陰
頭灸縫上七壯即消已驗艾炷帽簪頭大耳

又法

凡男癩當騎碓軸以莖伸置軸上齊莖頭前灸軸木上
隨年壯即愈並出第二十五卷中

陰腫方六首

病源出由風熱客于腎經，，流于陰腎不能宣散故至腫也
出第四卷中

集驗療男子陰腫大如斗核痛人所不能療者方

以雄黃一兩研碎綿裹甘州半天生用切水一斗煎取
二升以洗之忌海藻菘菜千金有礬石二兩文仲用礬
石

又方 取菟菜根薄之范汪千金同

又方 取蔓菁根搗薄之范汪同

又方 搗馬鞭州薄之范汪同出第九卷中

文仲療陰腫方

取桃人去皮尖熟末酒服无許不過三服差千金備急
同出第七卷中

古今錄驗療腫大如斗方

取雞翹燒灰飲服其毛一孔生兩毛者腫在左取左翹
在右取右翹雙腫取兩邊翹出四十一卷中 千金治
小兒卵腫

陰疝腫縮方一首

病源疝者氣痛也聚筋會於陰器邪客于厥陰少陽之經与冷
氣相搏則陰痛而疝縮也出第四卷中

又仲療陰卒縮入腹急痛欲死名陰疝方

狼毒四兩 防葵一兩 附子二兩 炮

右三味搗篩蜜和丸如梧子酒服三九日夜二忌猪肉冷水

古今錄驗范汪同出第七卷中 肘後用防風不用防葵

陰卒腫痛方三首

又仲葛氏療男子陰卒腫痛方

灸足大指第二節下橫理文止中央五壯姚云足大指

本三炷出第五卷中 亦治小兒陰疝發時腫痛隨痛

左右灸之

脩急療男子陰卒腫痛方

雞翎六枚 燒 蛇床奇分

右二味為末以飲服少許隨卵左右取雞翎集驗同姚方無

蛇床

又若有息回突出方

以苦酒三升清鳥喙五枚三日以洗一日夜三四度差

肘後同出五卷中

陰囊腫痛方五首

千金有人陰冷漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜即痛悶不得眠

腫方

取生椒擇之合淨以布綿裹著丸囊令厚半寸漬更熱

氣天通日再易之取消為効乃止

又方 煮大薊根汁服一升三日不過三劑愈

又方 酢和麩炙令熱熨之

又方 以醋和麩塗之

又方 釜月下土以雞白和傅之初肘後同並出第二十五卷中

陰下痒濕方七首

病源大虛勞損腎氣不足故陰汗陰冷液自泄風邪乘入之則
極養也其湯熨鍼石別有正方補養宣通今附于後養生方集
引法云卧令兩手布膝頭取踵置尻上以口內氣腹脹自極以
鼻出氣七息除陰下濕少腹裡痛膝冷不隨出第四卷中

又伸療陰痒生瘡方
嚼胡麻塗之驗肘後千金同

葛氏療陰囊下濕養皮刺方

烏梅十四枚 酸四十文

右二味以苦酒一升于銅器中浸九日洗五劫肘後同

又方 煮槐皮苦參黃蘗及香薷汁洗之並良肘後同出第七

卷中

救急療陰下濕痒成瘡方

猪蹄兩脚 槐柯裏白皮切一升

右二味以水煮洗瘡一日五六遍水差

又方 煮桃皮和黍米汁洗之並出第五卷中

古今錄驗療陰下痒濕湯洗方

甘艸一尺以水五升煮取三升清洗之日三四度便愈

又療陰下濕癢生瘡方

吳茱萸一升水三升煮取三升去滓以洗瘡諸瘡亦

治之出第四十一卷中

陰痛方三首

病源腎氣虛損為風邪所侵邪氣流入于腎經典陰氣相擊別擊真正
邪交爭故令陰痛但冷者惟痛挾熱者則腫其湯熨鍼石便有

正方補養宣通今附于後養生方集引法云兩足指向下拄席

兩涌泉相拓坐兩足根兩膝頭外扒手去前向下盡勢七遍去

勞損陰膝冷出第四卷中

集驗療平陰痛如刺汗出如兩方

小蒜一斤 韭根一斤一 楊柳根一斤

右三味合燒以酒灌之及熱以氣蒸之即愈千金同出第九卷中

千金療腫痛方

灸大敦三壯

又方 車前子末酒服之佳出第二十五卷中

陰瘡方七首

病源腎榮于陰腎氣虛不能制津液則汗濕虛則為風邪所乘邪客腠理而正氣不泄邪正相干在于皮膚故痒搔之則生瘡出第四卷中

千金療陰下生瘡洗湯方

地榆 黃蘗 各八兩

右二味切以水一斗煮取六升去滓造寒溫洗瘡日再此黃蘗湯洗亦効

又凡妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似甘瘡作印劑食之大痛甘即不痛方

用銀釵以綿裹用臘月猪脂熏黃火上煖以釵烙瘡上令熱取乾槐枝熟澆塗之以丁香黃礬青礬末傅之小便後即傅之不過二三度差但用甘瘡方中藥傅之即差出第二十五卷中

葛氏療男子陰瘡方

爛煮黃蘗洗之又用白蜜塗之

又方 黃連黃蘗各等分末之先煮肥猪肉湯洗之然後以藥粉之

又方 以蜜煮甘艸末塗之大良此見有人患莖頭腫坎下瘡

欲斷者以猪肉湯清洗之并用前粉塗之及依後方即
差神驗出第七卷中

必効療陰生瘡濃出于口方

高昌白礬一兩

右一味細研之煉猪脂一合于瓷器中和攪作膏取槐白皮
切作湯洗瘡上拭令乾却取膏傅上及以椒葉貼上不過三
二度永差肘后有細麻人等分同研

古今錄驗療陰瘡方

黃蘗

黃連

各三分

胡粉

右三味搗為末粉上日三頻人綿裹棗核大內之出第四十
一卷中

陰邊粟瘡五首

必効療陰瘡陰邊如粟粒生瘡及濕痒方

以槐北面不見日者處白皮一大握鹽三指一撮以水

二大升煮取一升洗之日三五遍遠寒温用若涉遠恐

衝風即以胡粉塗之神効

又療陰瘡有二種一者作白濃出名曰陰蝕瘡二者但赤作瘡

名為熱瘡若是熱瘡用此方

取黃蘗黃芩各一兩切作湯洗之用黃連黃蘗末粉去

神効

又方 以黃連和胡粉末傅之必効

又方 紫笋茶末一分 荷葉

右二味為末以鹽醬水洗訖傅之三五度即愈

又方 取停水處乾卷地皮末傅之神効是長安郭承恩用之

得効出第四卷中

著硃砂方四首

救急避逆著礪砂 陰方

猪蹄一具擘破 浮萍草

右二味以水三大升煮取半升去滓以瓶子盛汁內陰瓶中漬之冷即出拭乾便傳藥粉之

又粉法

蕃薇根尖 黃蘗 各二兩 補消 蛇床子 各一分

甘州 二分矣

右五味搗為散用前法浸洗後以粉瘡上亦不甚痛慎風出

第八卷中

必効主著礪砂方

取雞子一枚煮熟剝去肉更用生雞子二箇傾取白和熟研令細以帛裹之立定李饒州云神効

又方

甘州 黃蘗 白礬 燒令汁盡

右三味為末傳之瘡上並出第四卷中

九虫方

病源九虫者一曰伏虫長四分二曰蛔虫長一尺三曰白虫長

一寸四曰肉虫狀如爛杏五曰肺虫狀如蚕形六曰胃虫狀如

蝦蟇七曰弱虫狀如瓜瓣八曰赤虫狀如生肉九曰蟻音曉虫

至細微形如菜虫伏虫群虫之主也蛔虫貫心則殺人白虫相

生子孫轉大長則四五寸亦能殺人肉虫令人煩滿肺虫令人

嗽嗽胃虫令人嘔吐胃逆喜噦弱虫又名膈虫令人多唾赤虫

令人腸鳴蛻虫居胴後林切大腸也腸多則為痔劇則為癩因人

瘡處以生諸癰疽癬瘡痂齧虫无所不為人亦不必盡有

亦不必盡多或偏有或偏無者此諸虫依腸胃之間若腑臟氣

實則不為害若虛則能侵蝕隨其虫之動而變成諸患也出第

十八卷中集驗同

集驗貫衆丸主療九虫動作諸病方

貫衆熬

石蚕熬五分

狼牙四分

藿蘆二分作藥芦

蜀漆六分炙

殭蚕三分熬

雷丸六分

葶藶四分

厚朴二分

煨榔

右十味搗篩末蜜和為丸空心暖漿水服三十丸日三不知稍加之白虫用樵子湯服脩急文仲古今錄驗范汪同出

第九卷中 五藏虫方七首

剛繁療脾旁有白虫長一寸在脾為病令人好嘔而胸中駭嘔而不出前胡湯方

前胡

白朮

赤茯苓各三兩

枳實炙二兩

細辛三兩

旋復花二兩

常山三兩

松蘿二兩

龍胆二兩

竹葉切一升

杏仁三兩去皮

右十一味切以水一斗煮取三升去滓分三服若腹中熱滿下芒硝三兩梔子黃芩各二兩若參二兩加水二升依方煎忌桃李雀肉大酢生葱生菜等

又療脾旁熱有白虫在脾中為病令人好嘔葉莖根下虫湯方

葉莖束引根大者一尺切

大麻子八升

陳皮二兩切

右三味搗麻子爛並和煎服或下黃汁丸合藥噤声勿語道作藥虫當聞使不下切須忌之甚驗以水煎服臨時量之劫又療肺旁熱損生肺虫形如蚕在肺為病令人欬逆氣喘或謂憂患氣膈寒熱皆從旁之而生名曰膏肓鍼灸不着麥門冬五膈下氣丸方

麥門冬

蜀椒四分汗

遠志皮

附子炮各六分

乾姜五兩

甘州十分炙

人參七分

細辛六分

桂心五分 百部根 白朮 黃耆各象

杏仁去皮尖人者十枚熬 楨榔

右十四味搗篩蜜丸如彈子許含一丸稍嘔久忌猪肉冷

水海藻菘菜生葱生菜桃李雀肉等

千金療腎熱四肢腫急蟻虫如菜中虫生腎中為病方
貫衆大者三枚熬 乾漆二兩 萊菔六分三五枚 杏仁四枚去皮尖熬

蕪荑 胡粉 槐白皮各四分

右七味搗散平旦以井花水服方寸匕增之以差止

又肺勞熱生虫在肺為病方

東行紫根白皮切一升 東行萊菔根切五兩

狼牙三兩

右三味切以酒七升煮取一升半平旦服盡

又療肝勞生長虫在肝為病令人恐畏不安眼中赤方

雞子五枚去黃 東行萊菔根切三升 蠟三兩

乾漆四兩 粳米粉

右五味搗菜莢皮添為和藥銅器中打雞子調火煉可丸

如小豆宿勿食且以飲服一百二十九丸小兒五丸虫即爛即

瘥

又療心勞熱傷心有長虫名蛔虫長一尺貫心為病方

雷丸熬 陳皮 桃人各五分 狼牙六分

貫衆三枚 蕪荑 青箱子 乾漆熬各累

亂髮如雞子燒 殭蚕二十八枚熬

右十味搗篩蜜丸以飲及酒空腹服二七丸日再服之並出

第十八卷中

長虫方二首

集驗療長虫雞子丸方

雞子白三枚

乾漆四兩

蠟三兩

粳米粉半斤

右四味內銅器中于微火上煎攪令調內粉令凝可丸下置土上才溫乃內雞子攪令相得又煎令可丸宿勿食以飲下小豆許大一百二十九小兒五十九驗

又方

取棗實以淳苦酒漬再宿以綿裹內下部中令入三寸許一日易之千金范汪同出第九卷中

蛔虫方九首

病源蛔虫者是九虫之一也長一尺亦有長五六寸或回膈臟虛弱而動或日食甘肥而動且發動則腹中痛發作腫聚去來上下痛與休息亦攻心痛口中喜涎及吐清水貫傷心者則死診其脈腹中痛其法脈當沉弱弦今反洪而大則蛔虫也出第十八卷中

廣濟齋蛔虫方

酸石榴皮

棟引八寸五寸者

換榔碎

右二味以水七升煎取二升半絞去滓着少米煮稀粥平旦空腹實之少間虫盡死快利効無忌出第四卷中

肘後療蛔虫或攻心痛如刺口中吐清水方

取龍胆根多少任用以水煮濃汁去滓宿不食平旦服一二升不過再服下蛔虫也

又方

取有子棗木根剉以水煮取濃赤黑汁用米煮作糜宿勿食旦取肥香脯一片先喫令虫聞香舉頭稍從一口為度如小進自後食一七食半升糜便下蛔不傳千金文仲同

又方

以雞子一枚開頭去黃以好漆少許內中相和仰頭吞之出悉出矣文仲集驗備急千金同出第二卷中

集驗蛔虫攻心腹痛方
取薤苢根二斤剉以水七升煮取三升先食盡服之虫死盡出千金范汪司出第九卷中

千金療蛔虫方

蘘蘆下篩以餅臙和服方寸匕虫不覺出之亦主燒虫出第十八卷中 肘後云蘘蘆一兩末以羊肉作臙和服

崔氏療虵回方

取縹蚕蛹汁空腹飲之良若非縹縹時即洩收蛹暴乾患者搗篩取意斟酌多方和粥飲服之

又方 波斯鶴虱三兩

右一味搗散以肥猪羊肉但得一色以葱或為臙汁每旦空腹以臙汁和一方寸匕用稍多飲臙汁佳若不能散服即以蜜和為丸如梧子一服十丸還以此臙汁下之假令明日服今日未後即勿食明日服藥記還至已時為佳要服此丸散使盡已後三十日勿雜食永瘥出第五卷中

必効療方

菜豆三升煮取濃汁麻子一大升研取汁一升以下然後取麻子汁半升豆汁一升更煖令温；止發即矣平由脯令熟先含嚥下三五嚥即服之洩更即吐出或利其出以消如帛練帶三二條如服更盡服即永絕郭泰軍云頻試無不差者一方服麻子汁効出第六卷中

寸白虫方一十九首

病源寸白者亦九虫之一也長一寸而色白形小褊或藏肺長

虛弱而能發動或云飲白酒以紫葳貫牛肉炙食之并生栗所
成又食生魚飲乳酪亦令生之其發動則損人精氣腰脚痿弱
又云此虫生長一尺則殺人出第十八卷中

廣濟療白虫如馬蘭葉入于下部出不盡以刀截斷者令人漸
羸瘦石榴湯方

酸石榴根東引者一大握 蒸萸三兩 牽牛子熱末兩

右三味以水六升煮取二升去滓分三服別和牽牛子末每
服如人行五里更服盡快利虫亦盡死出忌生冷猪魚牛肉
白酒葵笋等此方神驗

又方

狼牙 白飲各四分 蒸萸六分

右三味搗散空肚以大酢和如膏温頓服之亦不利無所忌
千金同出第四卷中

肝後療白虫方

淳漆三合 猪血三合

右二味相和微火上煎之不著手成宿勿食空腹且先喫肥
香脯一片服如大豆許一百丸日中出即出范汪同

又方

濃煮猪肉汁煎楝柳三十枚取三升飲之虫盡出文仲
備急同

又方

熟煮猪脂血宿勿食明旦飽食之虫當下及仲備急中
出第二卷中

范汪療白虫陳皮丸方

橘皮四分 牙子 蒸萸各六分

右三味搗篩蜜丸如梧子以漿水下三十丸先食日再服

又方 狼牙 五兩

右一味搗篩蜜丸如麻子大不食明旦空腹以漿水下一合服盡差

又方

棘實破其上取皮中子搗合蜜丸如梧子宿不食旦以醋漿水着米汁下三百丸食虫并死下裁以糜爛皮亦可丸服八十丸忌如常法出十七卷中

備急療白虫蕪美散方

狼牙三分炙 蕪美二分

右二味搗為末以酒服之先食脯後搗服盡立差張文仲同出六卷中

救急療白虫方

石榴枝 東引者一握去蒼皮

檳榔 七枚碎

右二味以水二大升煮取強半頓服欲服時先嚼鹿脯唾汁即進之每月一二三日吃藥必瘥以虫頭向上月三以後服藥不効為其虫頭向下也今日欲服預前一日莫食其虫吃藥之後或利出或內潰皆差忌食生穀白酒諸生物一月餘又方

取榧子一百枚去皮火燃炙之能十盡佳不能者但炙五十枚亦得經宿虫消自下無忌崔氏同出第八卷中

崔氏療白虫諸方不差方

取石榴東引根令患人以手大指與第二指滿握一握兩頭出者摠留之又取乾脯肥者如手大一片細剉石榴根以水四升漬之一宿明旦煮取一升去滓分三服如人行十里久每欲服先嚼脯一片然後飲藥併令人按所患人腹令藥易宜多服子有頃當自便虫出服藥

一月至五日以前是出頭向上服之得力無問多少皆
出盡若疑虫未盡更合一劑永差

又方

東引萊萸根一大握 麻子仁

右二味先搗麻子極細碎又盆中麻熟研以水一大升更和
研絞取濃汁以浸萊萸一宿明旦煮二三沸頓服分服至
明旦欲服藥今日午後便不得食乃須先嚼一片肥乾脯噉
汗然後服藥服一劑去虫不盡停一日更作服一劑永差後
一月日勿食脂膩魚肉必効不用脯餘同出第五卷中

千金療白虫方

取榧子四十九枚以月上旬旦空腹服七枚七日服盡虫
消成水永差

又方

取萊萸北蔭根洗去土切以酒一升漬一宿平旦去滓
分再服凡萊萸皆用細根東北蔭良若指以上大者皆
不用之無力范注同

又方

熬錫令速燥末平且作羊肉臠以藥方寸匕內汁中服
之一方熬胡椒

又方

桑白皮切三升以水七升煮取二升宿不食明旦頓服
之

又方

用石榴皮根如萊萸根法

又方

胡麻一升 胡粉一兩
右二味搗末明旦空腹以猪肉臠汁服盡即差並出第十八

卷中

蛭虫方六首

病源蛭虫是九虫之一也形甚小如今之蝮虫状亦目腑藏虛弱而致發動甚者則能成痔瘻疥癬癩癰疽癘諸瘡蛭虫此是
人体虛極重者故蛭虫目之動作無所不為也出第十八卷中
范汪療蛭虫芫荽散方

芫荽

狼牙

雷丸

桃人去皮共蒸各三分

右四味搗散宿勿食平旦以飲服方寸匕當下虫也

又巴豆白膏療蛭虫方

巴豆

一枚燒令烟
斷去心皮

桃人

四枚熬令
黑去皮

右二味合搗作三九大人清旦未食以漿水服盡少小服一
丸若不下明旦更服並出第十九卷中

千金療蛭虫在胃中漸羸人方

淳酒

白蜜

好漆各一升

右三味合銅器中微火上煎之令可丸如桃核大一枚宿勿
食空腹温酒下虫不下再服之肘後備急集驗同出第十八
卷中

備急葛氏療蛭虫攻心如刺吐消汁方

搗生艾汁宿不食平旦嚼脯一片令虫聞香後飲汁一
升當下蛭虫備急文仲並同肘後云療蛭虫

陶氏療之方

取七月七日蒺藜子陰乾燒作灰先服食方寸匕一服
三日止范汪千金同

又方

以好鹽末二兩淳酒半升于銅器中煮令數沸宿勿食
清旦空肚頓服之備急文仲千金范汪等同並出第七

卷中

三虫方七首

病源三虫者長虫赤虫蛻虫為三虫也猶是九虫之數也長虫者蛻虫也長一尺動則吐清水出則心痛貫心則死赤虫狀如生肉動則腸鳴蛻虫細微形如菜虫也居腸胃之間多則為痔劇則為癩目人瘡處即生諸癰疽癬癩痛疥齧虫无所不為此即是九虫內之三者而今別立名者當以其三種偏發動成病故謂三虫也其湯熨鍼石別有方補養宣導今附于後養生方導引法云以兩手著頭相叉長引氣即吐之坐地緩舒兩脚以兩手從外抱膝甲疾低頭入兩膝間兩手交叉頭上十二通愈又云叩齒二七通輒咽氣二七如是三百通乃止為之二十日抑氣悉去六十日小病愈百日大病除三虫伏尸皆去面体光澤也出第十八卷中

肘後療三虫方

茱萸根

取東行者大者長一尺

括樓 四兩切

右二味細剉茱萸根以酒一升浸之旦絞去滓宿勿食旦空腹先吃脯然後頓服之小兒分再三服亦療寸白虫

又方

搗桃葉絞取汁飲一升千金集驗同 一方云平旦飲三合

大方

真珠 兩研

乱髮如雞子大燒末

右二味納苦酒中旦空腹頓服之令盡集驗范汪同千金治

蛻虫

又三虫者謂長虫赤虫蛻虫也乃有九種而蛻虫及寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一寸則殺人服藥下之

潰結裏潰然出盡乃佳若新者相生不已更宜速除之蟻出者多是小兒患之大人亦有其病令人心痛清朝口吐汁煩燥則除之

范汪療三虫白飲丸方

白飲 狼牙 藿蘆 桃花
貫衆 各三分 橘皮 二分 蕪荑 一分

右七味搗篩蜜丸如小豆大宿勿食旦以漿水服此藥下赤虫如茅莖者一尺所有頭目百餘枚病愈又九江譙丘病瘳下有積大如杯小腹亦堅伏痛上下移嘔逆喜唾心下常痛欲食肉服此藥下虫無頭足赤身口尾三百餘枚得愈又九江陳疇病大腹頓滿常欲食生菜服此藥服下白虫大如臂小者百餘枚主差瘦身煩人不得服之

又療三虫竹節丸方

燒竹節 雷丸 各一分 錫屑 二分 橘皮 一分半
右四味搗下篩蜜丸如梧子大一服八九日三服三日斷口也

又療三虫芎藭散方

芎藭 雷丸 桔梗 白芷 各四分
右四味搗散以蜜飲若酒或米汁服方寸匕日三服又可用蜜丸如梧子吞十五丸當稍下不見盡服一劑出第十九

卷中

備急療三虫丸

藿蘆 四兩 乾漆 二兩 熬 吳茱萸 四兩

右三味為末依前法嚙脯以粥清服方寸匕日一服秘要法肘後范汪同

雜療虫方三首

廣濟療蛔虫寸白虫方

檳榔人十二分當歸

陳皮各六分貫衆

鶴虱

雷丸各四分

蕪荑熱

右七味搗散空腹煮大寒湯服方寸匕日二服漸加至三匕

微利無忌出第四卷中

千金療蛭虫蛔虫及痔瘻食下部生瘡桃湯方

桃皮一兩

槐子三兩

艾葉一兩

大寒三十枚擘

右四味以水三升煮取半升空腹頓用之出第十八卷中

又療寸白虫為水瀉出永除方

榧子

檳榔

蕪荑等分

右三味為散温酒服二錢匕先燒牛肉脯吃後服藥也

外臺秘要方卷第二十六
右迎功即充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校勘

外臺秘要方第二十七淋并大小便難二十七門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等

上進

諸淋方三十五首

五淋方三首

石淋方一十六首

血淋方五首

小便赤色如絢者方三首

熱淋方三首

勞淋方三首

氣淋方五首

膏淋方二首

許仁則淋方二首

大便難方六首

大便不通方一十七首

大便黏澀不通方七首

大便失禁并閉格大小便不通方二十二首

閉格脹滿不通方四首

許仁則大便暴閉不通方二首

小便不通方一十三首

小便難及不利方九首

遺尿方六首

尿血方一十一首

胞轉方一十五首

小便血及九竅出血方一十二首

小便不禁方二首

小便數多方五首

許仁則小便數及多方四首

尿床方六首

灸穴雜方一十二首

諸淋方三十五首

病源諸淋者由腎虛而膀胱熱故也膀胱與腎為表裡俱主水
入小腸下于胞行于陰為溲便也腎氣通于陰津液下流
之道也若飲食不節喜怒不時虛實不調則府藏不和致腎氣
虛而膀胱熱也膀胱津液之府熱則精液內溢而流于罅水道
不通水不上不下停積于胞腎虛則小便數膀胱熱則水下淋
數而且澁則淋瀝不宣故謂之淋其狀小便出少起數少腹弦
急痛引于臍又有石淋勞淋血淋氣淋膏淋諸淋形証各隨名
其說于後章而以一方療之者故謂諸淋也其湯熨鍼石別有
止方補養宣遺今附于後養生方導引法云偃卧令兩足布膝
頭斜踵至鳩口內氣振腹鼻出氣去淋數小便又去石淋莖中
痛又云蹲踞高一尺許以兩手從外屈膝內入至足趺上急手
握足五指極力一通令內曲必利腰膈療淋也出第十四卷中
廣濟療患淋來積年比鑿療不能得損或十日五日一發即有
可時今年因病更頻數經二十日來不定方

滑石

冬葵子各六分

瞿麥

石常各五分去毛

蒲黃六分

陳橘皮四分

芍藥

茯苓

芒消各六分

子芩六分

右十味搗篩為散空腹煮後飲子服方寸七日二服漸加至

一七半不利忌熱麪炙肉醋蒜等

又飲子方

桑白皮六分

通州

百合各八分

白茅根

新者

右四味細剉以水四升煎取二升去滓温下散藥口乾渴含之亦得也

又療淋小便不通來六七日方

滑石五兩 通艸 瞿麥二兩 冬葵子一兩

茅根一斤 石常三兩五分 芒硝二兩

右七味切以水九升煎取二升八合去滓內芒硝分温三服每服如人行六七里進一服以微利為度忌諸熱食物並出

第四卷中

范汪療淋方

取紫萸州滿兩手把以水煮服之可常作飲勿不飲也

又方

煮兔絲子服之如紫萸法

又方

露蜂房燒飲服之取如椀大者妙

又方

雞子二枚去白黃以鹽內殼中使滿以三升水漬一升致絞取汁以殼中鹽投汁中攪令調盡服之

又方

滑石 海蛤 雞子殼 各等分

右三味搗篩為散以飲服半錢七日三服漸加至一錢七甚良

又方

取地麥草一名地膚州二七把以水二升煎之亦可長服一法旦清飲汁飲之良

又療淋利小便葵子散方

葵子半升 石南葉一兩 滑石二兩 地榆三兩

石常 一兩去毛 通州 一兩

右六味搗篩為散飲服方寸匕日三服良

又療淋莖中有石方

取鷄屎白半斤暴乾熬之令香搗篩為散以酪一云酢漿飲方寸匕日三服到一二日當下石便當于器中原石下為驗

又療淋師所不能療者神方

取葛上亭長生折斷腹中自有白子如小米長二三分取著白板上陰乾燥三二日藥成若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小杯中水如棗許內藥蓋中半食頃以瓜甲研當令扁見于水中仰頭令人寫入咽喉中勿令近牙近則著牙齦間不盡得入之咽也藥雖微小下喉自當覺至下焦淋所有頃

藥作大煩急不可堪者飲麥乾飯汁藥勢止也若無麥乾飯汁但水亦可耳老小服三分一耳藥當下淋疾如膿血連二爾石去者或如指頭或青或黃男女服之皆水道去并療婦人產後餘疾積聚或成帶下服之皆愈此療正月二月為芫青三月為黃不留行四月五月六月為葛上亭長七月為班猫九月十月為地胆隨時變耳亭長時頭當赤身黑若藥不攻淋不可下以意節度增服之並出第六十五卷中

小品地膚湯療下焦諸結熱小便赤黃數起出少大痛或便血者溫病後餘熱及霍亂後當風取涼過度飲酒房勞及步行胃熱冷飲遂熱結下焦及乳石熱動閉格少腹堅胞脹如斗大諸淋服之即通方

地膚子膏

知母

猪苓

瞿麥

黄芩

升麻

通艸各二兩

海藻二兩

葵子一升

枳實炙二兩

右十味切以水九升煮取三升分三服大小行皆閉者加大黃三兩賴人房勞腎中有熱小便難不利腹滿痛脉沉細者加猪腎一具千金同崔氏云若加腎加水一斗半煮取一斗肉煎內

又療淋榆皮湯方

榆皮半斤

滑石二兩一方

黄芩二兩一方

甘草炙

瞿麥各二兩

葵子一升

右六味切以水一斗煮取三升温服一升旦服忌海藻菘菜並出第四卷中

集驗療淋方

以比輪錢三百文以水一斗煮取三升飲之千金不傳

神効肘後同千金治氣淋

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢七五愈又仲必効同

又方

燒頭髮灰服之良並出第五卷中文仲同

千金療淋痛方

滑石四兩

貝子燒三十枚

茯苓

白朮

通艸

芍藥各二兩

右六味搗篩為散酒服方寸七日二服大良忌酢桃李雀肉等

又方

葵子五合

茯苓

白朮

當歸各二兩

右四味切以水七升煮取三升分三服忌雀肉桃李酢物等

范注同
又方

桔樓

滑石

石常 去毛各二兩

石三味為散以大麥粥飲服方寸七日三服良

又方

宿葵根八兩

大麻子五兩

甘草二兩炙

石首魚頭石四兩

通艸二兩

茅根三斤

貝母五合燒

石七味切以水一斗二斤煮取五升分為三服日三夜二服
亦主石淋忌海藻菘菜神良

又方

一取細白沙三升一味熟令極熟以酒三升淋取汁一合
服之三頻服

又方

橘皮一升

車前子一升

冬瓜子一升

鯉魚鱗

桃膠

地麥草

通草各二兩

瞿麥四兩

右八味切以水一斗煮取三升分三服日三服

又療卒淋方

灸外踝尖七壯

又方

取石首魚頭石末水服方寸七日三服

又方

鯉魚鱗燒灰末酒服方寸七日三服並出第二十一卷

崔氏療淋散方

中

石常洗刮去毛 大虫魄一兩研滑石二兩 當歸
芎藭 黃芩 冬葵子 瞿麥

乱髮 三圓如雞子大燒炭 茯苓 一兩半

右十味搗篩為散服方寸匕日二服忌酒麪炙肉油膩蒜鯨
酢及熱物等出第四卷中

古今錄驗療淋瞿麥散

瞿麥 石常 去毛 滑石 車前子

葵子 各四兩

右五味搗篩冷水服方寸匕日三服增至三七忌水麪慎生
冷水

又方

取生續斷絞汁一升服之

又療淋滑石湯方

滑石 一兩 榆白皮 二兩 石常 一兩 去毛 地麥艸 二兩
葵子 二兩

右五味切以水一斗煮取四升分四服日再服甚効

又療淋榆皮湯

瞿麥 二兩 防風 一兩 榆白皮 三兩 葵子 一兩

滑石 一兩 一方 四兩 甘艸 二兩 一方 黃芩 一兩 一方 二兩

右七味切以水一斗煮取三升分二服忌海藻生菜

又方

取附奴底苔大如鴨子以甌半水煎取一甌頓服日三
服並出第二十六卷中千秋治氣淋

近効療淋方

葵子 一升

右一味以水三升煮取二升去滓分溫再服相去如人行十
里無所忌並茅根飲之亦佳

又方

人參六分 厚朴三分 粟米二合
右三味切以水三升煮取七八合以新布絞去滓分三服温服別相去如人行七八里久忌食生冷等

又方

茯苓 地膚皮各三分 甘州炙 黃芩
前胡 生姜各二兩 麥門冬二兩 竹葉切一升

蒲黃二兩
右九味切以水九升煮取二升六合去滓分為三服別相去如人行七八里久忌熱麩油膩海藻菘菜酢物等

五淋方三首

集驗論五淋者石淋氣淋膏淋勞淋熱淋也石淋之為病小便莖中痛尿不得率出時自出痛引小腹膀胱裏急氣淋之為病小便便難常有餘瀝膏淋之為病尿似膏白出以腹膀胱裏急勞

淋之為病勞倦即發痛引氣衝小便不利熱淋之為病熱即發其尿血後如豆汁狀毒作有時五淋各異療方用雜故不載也出

第五卷中

范汪療五淋方

麝香五分 班猫二分 地胆二分 猪苓三分
右四味搗篩為散每服四分七日進三服夜二服但少腹有熱者去猪苓服藥二日後以罌盛小便當有所下肉淋者下碎肉血淋者下如豚短繩若如肉膿氣淋者下如羹上肥石淋下石或下砂劇者十日即愈禁食炙猪肉生魚葱鹽醋以小麥汁服之良

又療五淋神良延命散方

滑石 礬石燒半日 石膏 車前子
露蜂房炙并白子用之 貝子搗著苦酒中二三宿取細者用之

栢子仁 魚蔥 搗令熟

白雞腔脰裏黃皮 特牛陰頭毛 燒

雞矢白 苦瓠中穰 并子熬 芒消 熬令汁盡各下

婦人陰上毛 一本元 二分燒

右十四味搗篩為散每服半錢匕加至一錢匕日三夜一服以葵引下之三日愈甚者不過六七日愈小便以器盛之當見石及諸物也並出第五卷中

必勅療五淋方

白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升去滓分三四服肘後千金同出第三卷中

石淋方一十六首

病源石淋者淋而出石也腎主水，結則化為石故腎容砂石腎虛為熱而乘熱則成淋其病之狀小便則莖裏痛溺不能卒

出痛引以腹中膀胱裏急砂石從小便通出甚者塞痛令悶絕出第十四卷中

范汪療石淋方

鱉甲燒灰搗篩為散酒服方寸匕頸脹數劑當去石也肘後同

又方

取人家雞埒上連蔓葶閣掘出見其根挽斷以杯于坎中承其汁服之二升石自當出若不出更服一升

又方

取車前子二升用絹囊盛之以水八升煮取三升去滓頓服之移日又服石當下也宿不得食引之神良肘後千金同

又方

栲子仁 芥子 滑石各等分
右三味搗篩為散以麥汁飲服方寸匕日三服已効

大方 牛角燒灰服方寸匕日五六服任意飲酒

大方 瞿麥子搗為末酒服方寸匕日三服到一二石當下石
入香薷搗碎屑以酢漿飲服方寸匕日三至二三日當
下石小便于器中並出第十五卷中

小品療石淋方 滑石以滿一斗搗為末以水三升苦酒一升煮取二升
澄清溫服一升不過再三服石即便出古今錄驗千金
崔氏同出第四卷中

集驗療石淋方 鯉魚薑一升貝薑一升搗篩以三年苦酒和分為三服
宿不食且服一分日中服一分暮一分古今錄驗范汪
同

艾仲石淋方 桃膠如棗入夏月著三合冷水中冬天以湯三合和之
一服日三當下石盡即止千金古今錄驗同

大方 濃煮車前汁飲之良古今錄驗同出第四卷中
古今歸驗療石淋及諸淋方

石首魚頭石十四枚 當歸等分
右二味搗篩為散以水二升煮取一升頓服立愈單用魚頭

石亦佳
又療淋石常散方

石常 去毛 滑石 各三分
石二味搗篩為散用米汁若蜜服一升至日二服范法同
又方

取生律葉搗絞取汁三升為三服無苦毒石自出范法同

又滑石散療石淋莖中疼痛瀝：晝夜百餘行內出石溺血方

滑石 二十分 石常 去毛 當歸 通艸
地胆 去足熱 鍾乳 二分各 車前子 五分 瞿麥
蛇床子 二分 細辛 蜂房 炙各一分

石十一味為散以葵汁麥粥服方寸七日三忌生葱生菜

又療石淋瀝：莖中痛晝夜百行或亦出延命散方

滑石 牛角齧燒灰 芒硝 各二兩 瞿麥 三兩
車前子 露蜂房 炙 貝子 燒 柏子仁

魚薑 炙 雞矢 白 苦瓠子 燒 牛陰頭 毛 各一兩

婦人陰上毛 二分一本無

石十三味搗篩為散以葵汁服方寸七日三服

又療石淋方

取雞子陳者一枚用淳苦酒一升以雞子令苦酒置器
中以油帛三四重密封頭不令水得入沉井中一宿平
旦取剝去皮吞其黃石消去也並出第二十六卷中

血淋方五首

病源血淋者是熱淋之甚者則尿血為之血淋心主血之行身
通通徑絡循環腑臟勞熱甚者則散失其常經溢滲入胞而成

血淋也出第十四卷中

廣濟療血淋不絕雞蘆飲子方

雞蘇 一握 竹葉 一握切 石膏 八分研 生地黃 一斤切

蜀葵子四分末湯成下

右五味以水六升煮取二升去滓和葵子末分温二服如人行四五里久進一服不利忌蕪荑蒜熱麩炙肉等餘無所忌古今錄驗范注同

久療血淋小便疼痛方

雞蘓二兩 滑石五兩碎 生地黄半斤 小蘓根二兩

竹葉二兩 通州五兩 石膏五兩碎

右七味細剉以水九升煎取三升去滓分温三服如人行四五里進一服不利忌蕪荑熱麩蒜陳臭物並出第四卷中

千金療血淋方

石常去毛 當歸 芍藥 蒲黃各等分

右四味為散酒服方寸匕日三服肘后文仲同出第二十一卷中

備急陶氏療淋下血二升者方

取苧麻根十枚以水五升煮取二升一服血止神驗肘後古今錄驗同

又方

灸足大指前節上十壯良並出第六卷中
小便赤色如紅方三首

延年論曰療小便赤色如淺紅花汁此是憂愁驚恐心氣虛熱客邪氣與熱傳于心所以致小便赤心主南方火王在四月五月六月其色赤驚恐動于心不受邪即搏于小腸滲入胞中所以小便赤此為微邪其病猶輕今服九子即漸差心即是火：患于清；即是水；能滅于火既損心氣即不得食熱及冷水并勿憂愁如不慎恐小便色赤如血漸即難愈今處乾地黃丸補心神益脾氣散客熱自坐調和小便色即自變如常第

一不得憂愁在心并勿食熱食及冷水等方

乾地黄 黃耆 各六分 防風 遠志皮

茯苓 栝樓 子苓 各四分 鹿茸 炙三分

龍骨 四分五 人參 五分 滑石 十二分 石韋 湯清一宿 刮去皮

當歸 各二分 車前子 八分

右十八味搗篩為末以蜜及棗膏各半相和煎令消散和藥為丸如梧子大每食後少時以粥清下十九日二三稍加至十五二十丸以知為度禁熱食及冷水海藻菘菜蕪荑酢許

孝璋處得

入茅根飲子療胞絡中虛熱時小便如血色方

茅根 一斤 茯苓 三四 人參 乾地黄 各二兩

右四味切以水五升煮取一升五合去滓分溫五六服中間任食一日令盡忌大蒜蕪荑大酢五辛熱麩等物文仲處得

文仲通州飲子主熱氣濕淋小便赤如紅菟汁色方元本缺新補

通州 葵子 茅根 王不留行

蒲黃 炮 桃膠 瞿麥 滑石 各兩

甘州 七錢

右九味切以水一斗煮取六升去滓分溫五服或六服忌如

藥法

熱淋方三首

病源熱淋者三焦有熱氣搏于腎流入于胞而成淋也其狀小便赤色而澀亦有宿病淋令得熱而發者其熱甚則變尿血亦有小便後如豆羹汁狀者畜作有時也出第十四卷中廣濟療熱淋方

車前子 切一斤 通州 切三升 葵根 切一斤 芒消 六分 湯成下

右四味以水七升煮取二升絞去滓內消分溫三服：別相

去如人行六七里微利為度忌熱食出四卷中
古今錄驗療淋小便數病膀胱中熱滑石散方

滑石二兩 栝樓三兩 石葦二分去毛

右三味搗散以大麥粥清服方寸七日三並出第二十六卷
中

近効療熱淋日夜數十度喫藥不差方

空腹服并花水一二升必差常特進鴻臚進用如神効
方吃水了後行六七百步甚良

勞淋方三首

病源勞淋者謂勞傷腎氣而生熱成淋也腎氣通于陰其狀尿
留壅內數起不出引少腹痛小便不利勞倦即發也出第十四
卷中

千金云勞淋之為病勞倦即發痛引氣衝灸之方

灸足太陰百壯在內踝上三寸三報之治與氣淋同

又療五勞七傷八風十二痺以為淋勞結為血淋熱結為肉淋
小便不通莖中痛及少腹急痛不可忍者方

滑石三分 王不留行 冬葵子 車前子

桂心 甘遂 通州各二分 石葦四分去毛

右八味搗篩為散以麻子粥五合和服方寸七日三服尿清
差並出第二十一卷中

古今錄驗療石淋勞淋熱淋小便不利胞中滿急痛石葦散方

通草二兩 石葦去毛二兩 白朮 瞿麥

甘艸炙 當歸各三兩 滑石三兩 王不留行二兩

芍藥 葵子各三兩

右十味搗篩為散先食以麥粥清服方寸七日三服忌海藻
菘菜桃李雀肉等出第二十六卷中

氣淋方五首

病源氣淋者腎虛膀胱熱氣脹所為也膀胱與腎為表裡膀胱熱氣流入胞熱則生實令胞內氣脹則少腹滿腎氣不能制其小便故成淋其狀膀胱小便皆滿尿澀常有餘瀝是也亦曰氣癢診其少陰脉數者男子則氣淋出第十四卷中

千金療氣淋方

又方

灸關元五十壯

又方

夾玉泉相去一寸半灸三十壯

又方

水三升煎豉一升一沸去滓內鹽一合頓服之

又方

搗葵子末湯和服方寸匕

膏淋方二首

病源膏淋者淋而有肥狀如膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎虛不能制于肥液故與小便俱出也第十四卷中

千金療膏淋方

搗葶艸汁三升醋三合和空腹頓服當如火炙汁下一名芎藭也

又膏淋之為病尿似膏白色療之一如氣淋也並出第二十一卷中

許仁則淋方二首

許仁則療小便淋澀方此病有數種有石淋有熱淋有氣淋者氣壅塞小便不通遂成氣淋此自須依前療水氣法石淋

者緣先服石氣不散擁遏生熱故成石淋熱淋者體氣生熱更緣食飲將息傷熱氣灼遂成熱淋更無餘候但君體氣熱小便澀出如醇酒宜依後瞿麥芎五味湯大出鬼芎五味散三淋俱服之方

瞿麥穗 三兩 冬葵子 一斤 榆皮 切一斤 桑白皮 六兩

白茅根 切一斤 石常 四兩 去毛

石藥切以水一斗煮取三升去滓分溫三服每服如人行十里久服三五劑後宜合大出魄五味散服佳

又方

大出魄 三兩 石常 三兩 去毛 瞿麥穗 四兩 冬葵子 一斤

茯苓 六兩

右藥搗篩為散煮桑根白皮作飲子初服一方寸七月再服稍加至三七吳昇同志酥物出下卷中

大便難方六首

病源大便難者由五藏不調陰陽偏有冷熱虛實三焦不利則冷熱并結故也胃為水穀之海水穀之精化為榮衛其精粕行之于大腸以出也五藏三焦既不調和冷熱擁塞結在腸胃之間其腸胃不實而又為冷熱之氣所并結聚不宣故令大便難也又云邪在腎亦令大便難所以爾者腎藏受邪虛而不能制小便則小便利精液枯竭致令腸胃乾燥故大便難又渴利之家大便亦難所以爾者為津液枯竭致令腸胃乾燥診其左手寸口人迎以前脈手少陰經也脈沉為陰實者病若閉問大便不利腹滿四肢重身熱若胃脹右手關上脈陰實者脾實也病者腸中休一作伏如牢狀大便難脈緊而滑直大便亦難附陽脈微弦法當腹滿不滿者必大便難而脚痛此虛寒從下向上也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附于後養生方

導引法云偃卧直兩手捻左右脅除大便難腹中寒腹痛口內
氣鼻出氣溫氣逆之數十病愈出第十四卷中
肘後療脾胃不和常患大便堅強難方

大黃

芍藥

厚朴 炙各三兩 枳實 六枚 炙

麻子 別研五分

右五味搗篩入麻子蜜和為丸如梧子大每服十九日三服
稍增之以通和為度可常時服之集驗備急古今錄驗同
出第三卷中

千金療大便難方

灸承筋二穴三炷在臍中央陷中

又方

單用致清醬清羊酪土灰根汁並單灌之並出范汪同
又煉中丸宿食不消大便難方

大黃 八文

葶藶 熬

杏仁

去皮尖熬

芒消 各四兩

右四味搗篩為末鍊蜜為丸如梧子大每服十九日三服稍
加之並出十五卷中

備急不得大便或十日一月

葵子二升水四升煮取一升去滓服不愈重作服良姚
方出第六卷中古今錄驗文仲范汪同忌蒜炙肉

古今錄驗麻子人丸療大便難小便利而反不渴者脾約方

麻人 二升 別為膏

枳實 半斤 炙

芍藥 半斤

杏人 一升 去皮尖熬別為脂

大黃 一斤

厚朴 炙 一尺

右六味搗篩為末鍊蜜為丸如梧子大每服飲下十九漸添
至三十九日三服出第十六卷中此本仲景傷寒論方

大便不通方一十七首

病源大便不通者執三焦五藏不和冷熱之氣不調熱氣偏入

腸胃津液竭燥故令糟粕痞結雍塞不通其湯實鐵石別有五
方補養宣通今附于後養生方通引潘云垂行氣伏衣被中覆
口鼻額面正卧不息九通微臭出氣瘳閉塞不通出第十四卷

中

肘後瘳大便不通方

研麻子以米糲為粥食之

又方

用礬石如指大者燒下部並出第六卷中

千金瘳大便不通方

灸第七椎兩傍各一寸七壯

又方

桃皮三升水五升煮取一升頓服

又方

水一升煮羊蹄根一把取半升頓服

又方

煮麻子取汁飲之

又方

常服蜜和五合

又方

猪脂和陳葵子末為丸如梧子大每服飲下十九通即
止

又方

常服車前子及苜並通也

又方

搗葵根汁服之

又方

葵子一升牛酥一升猪脂亦得以水三升煮葵子取一

升內酥煮一沸待冷分二服並出第十五卷中
必効療大便不通方

牛膠一條 廣二寸長四寸 葱白一握

右二味用水二升和煮消盡去滓頓服之千金同

又方

溼瓜蒂七根綿裹納下部如非時將瓜亦得並出第三

卷中

崔氏療大便不通方

芎藭末 石鹽末各一兩

右二味相和取半丸和烏麻脂少許綿裹內下部中即通

又方

猪脂一升温酒一服令盡良並出第四卷中

古今錄驗療心腹脹滿大便不通方

芍藥 六分 杏仁 熬去皮尖 大黃 各八分

芒消 六分

右五味搗散為末煉蜜為丸如梧子大每服十五丸粥飲下

加至二十九取通利為度經心錄同出第二十六卷中

近効療大便不通方

用猪胆和少蜜于罐中熬令熟稠丸如枣大內下部中

即差

大便秘澁不通方七首

千金療大便秘塞不通方

猪羊胆汁

右一味以筒灌三合許令深入即出夫不盡洩更更灌一方

加葵子汁和之又有椒豉湯五合猪膏三合灌之佳臨時易

可得即用之經心錄同

大三黃湯療下焦熱結不得大便方

大黃 三四

黃芩 二兩

甘州 各一兩

梔子 二十枚

右四味切以水五升煮取一升八合分三服若秘加芒硝二

兩忌海藻菘菜並出第五卷中

脩急療卒大便閉澀不通方

葛氏云削灰菘如指大導下部中即効

又方

亂髮燒灰三指捨投水半升一服

又方

綿裹藍作三丸如指大內下部中

又方

煎蜜令強加乾姜末和丸如指導下部中姚云欲死者

煮蜜三升微火煎如飴投冷水中令凝丸如大指長三

四寸導之良

又方

穿猪胆一枚內下部中倒瀉之姚云療七八日奔氣傷

心欲死者須更使通良范汪同

大便失禁并闕格大小便不通方二十二首

病原大指失禁者大腸與肛門虛冷滑故也肛門大腸之候也

俱主行精粕既虛弱冷滑氣不能溫制故使大便失禁

又闕格大便不通謂之內闕小便不通謂之外格二便俱不通

為闕格也由陰陽氣不和索衛不通故也陰氣大盛陽氣不得

營之曰內闕陽氣大盛陰氣不得營之曰外格陰陽俱盛不得

相營曰闕格則陰陽之氣痞結腹內脹滿氣不行于大小腸故

闕格而大小便不通也又風邪在三焦二二約者則小腸痛內

閉大小便不通日不得前後而手足寒者為三陽俱逆三日死

也診其脉来浮牢且滑直者不得大小便也並出第十四卷中
范汪療下部閉不通方

取烏梅五顆着湯漬須臾出核取熟搗之如彈丸納下
部中即通也肘後同

又方

取蒟藿根一把搗末水和絞去滓強人服一升數用有
効魚療脚氣

又療大小便不通三陽實大便不通方

榆白皮三兩 桂心二兩 滑石六兩 甘州三兩炙

右四味以水十升煮取三升分三服忘海藻松菜生葱集驗

同並出第十六卷中

集驗療閏格之病腸中轉痛不得大小便一日一夜不差欲死
方

芒硝三兩紙三重裹于炭火內燒令沸安一升水中盡
服之當先飲溫湯一二升以來吐出乃飲芒硝汁也肘
後同

千金療老大小兒大便失禁方

灸兩脚大姆指去爪甲一寸三壯

又方

灸大指奇間各三壯

又療大小便不通方

灸臍下一寸三壯

又方

灸橫文一百壯

又方

葵子一升 竹葉青者一把

右二味以水一升煮一沸頓服之

又方

葵子一升 榆白皮切一升

右二味以水五升煮取二升分二服

又方

水三升煮葵子一升去滓取一升內猪膏一升空肚一
用服

又方

鹽半斤合蜜三合同煎如腸出之著冷水中凡如枳櫛
形如指大深內下部中主通並出第十五卷中

千金翼濡臍湯主大小便不通六七日腹中有燥莫寒熱煩迫
短氣汗出腹滿方

生葛根二升切猪膏二升 大黃二兩切

右三味以水七升煮取五升去滓內膏煎取三升澄清強人
頓服之羸人分再服出第七卷中

脩急曹氏療卒閉格大小便不通支滿欲死二三日則殺人方
鹽以苦酒和塗臍中乾又易之必効同

陶氏卒大便秘不通方

紙裹鹽燒投水中服之

姚氏風寒冷氣入腸急堅急如吹狀急已大小便不通或小腸
有氣結如升大脹起名為閉格病

又療大小便不利方

苦參 滑石 貝葉 各等分

右三味搗篩為散每服飲下一匕或煮葵根汁服之弥佳又

仲同出第六卷中

一古今錄驗療閉格大小便不通方

以水三升煮塩三合使沸遠寒温以竹筒灌下部立通

又療大小便不通方

通神 四兩 柳葶人 三兩 去皮 車前子 五合 一方一升
黄芩 三兩 朴消 四兩 瞿麥 三兩

右六味切以水八升煮取二升去滓分三服經心録同

又方

取生土瓜根搗取汁以水解之于筒中吹内下部即通
秘方並出第二十六卷中

經心録療閉格不通方

芒消 烏梅 榆白皮 各五兩 芍藥

杏仁 去皮尖 各四兩 麻子人 三兩 大黃 八兩

右七味切以水七升煮取三升分為三服一方無烏梅加枳

實乾地黄各二兩

又療大小便不通方

滑石 二兩 葵子 榆白皮 各一兩

右二味下篩為散煮麻子汁一升半取二匕和服兩服即通

並出第二卷中

近効療大便不通方

含消石吐去水

閉格脹滿不通方四首

千金療大小便不通方

芍藥 六分 芒消 六分 黄芩 五分 杏仁 八分 去皮尖

大黃 八分

右五味末之蜜和丸如梧子飲下十九日二服良

又方

獨頭蒜燒熟去皮綿裏內下部氣立通削姜裹鹽導並佳

又方

乾姜 鹽

杏仁

右三味等分搗導之

又療脹滿閉格不通方

吳茱萸 一升 乾姜

大黃

桂心

當歸

芍藥

甘州矢

芍藥 各二兩

雄黃 三分 研

人參

細辛 各分

真珠 一分 研

桃白皮 一握

右十三味切以水一斗煮取三升去滓內雄黃真珠末酒一升微火煎三沸只服一升得下止不必盡也每服如人行十里久進之忌海藻松菜生葱生菜生血等物並出第十五卷

中

許仁則大便暴閉不通方二首

許仁則論曰此病更無餘候但由飲食將息過熱；氣蘊積秘塞着緣氣閉自酒依前療氣法服巴豆等三味丸及療水氣葶藶等諸方取利若是風閉自依後服大黃丸五味丸暴秘之狀骨肉強痛体氣煩熱唇口乾焦大便不通宜依後大黃芒硝二味湯取利方

大黃 六兩 芒硝 五兩

右藥先切大黃以水四升煮取二升去滓內芒硝頓服之須更利良久不覺以熱飲投之若服此依前不利宜合後大麻人等五味丸服之取快利矣

五味大黃方

大黃 高

大麻子 一升 微熱熱之

芒消 六兩

乾膏

紫根白皮 各五兩

右五味先將四味為散然後搗麻人令如膏即投四散和搗和以蜜搗之丸如梧子大初服十丸日再服稍之得大便通為限吳昇同出下卷中主大便風秘不通

小便不通方一十三首

病源小便不通由膀胱與腎俱有熱故也腎主人膀胱為津液之府此二經為表裡而水行于小腸入胞者為小便腎與膀胱既熱入于胞熱氣大盛故終溢令小便不通少腹脹氣急甚者水氣上逆令心急腹滿乃至于死診其脈腎而滑直者不得小便也出第十四卷中

廣濟療下冷疼小便不通雞蘇飲子方

雞蘇 一握

通艸 四兩

石常 一兩矣

冬葵子 一兩半

杏人

二兩去皮

滑石 二兩

生地黃 四兩

右七味切以水六升煮取二升半候去滓分溫三服如人行四五里進一服不利忌薑蔥熱麩炙肉蕎麥麩蒜陳臭物粘

食等

又方

冬葵子 五兩

通草 三兩

茅根 四兩

芒硝

二兩湯洗下

茯苓 三兩

滑石 五兩

右六味切以水九升煮取三升去滓內芒消分溫三服別相去如人行六七里忌炙肉熱食醋蒜等物

又方

茯苓 二分

大黃 六分

芍藥

當歸

枳實 炙

白朮

人參 各二分

大麻人參

右八味切以水六升煮取二升去滓分溫三服要著芒硝亦得忌酢物桃李雀肉等並出第十四卷中

崔氏療小便不通方

取熏黃如豆許末之內小孔中神良

又方

紫根白皮 猪苓 各二分 通州 各二分

右 三味切以水六升煮取二升分三服

又方

雞屎白如彈丸以苦酒和服即下不過三四一本云療

淋

又方

足大指骨間有青脉針挑出血灸三壯愈並出第四

卷中

救急主小便不通方

取印成鹽七顆搗篩作末用青葱葉尖盛鹽末開便孔

內葉小筒于中吹之令鹽末入孔即通非常之効

又方

取嫩穀木搗濃汁可飲半升以來即愈

必効療小便不通或利不得服滑葉急悶欲絕方

鹽二升入大罇中熬以布帛裹熨臍下按之小便當漸

通也肘後同

古今錄驗療熱結小便不通利方

刮滑石屑水和塗少腹及繞陰際乾復塗之肘後同

又方

取鹽填滿臍中大作艾炷灸令熱為度良肘後千金同

並出第二十六卷中

近効療小便不通數而微腫方

取陳久筆頭燒作灰和灰服之

小便難及不利方九首

病源小便難者此是腎與膀胱熱故也此二經為表裡俱主水
：行于小腸入胞為小便熱氣在于藏府水氣則澀其熱微
故但小便難也診其尺脈浮小便難尺脈濡小便難尺脈緩小
便難有餘瀝也出第十四卷中

集驗療小便難淋瀝湯方

滑石八兩 石常毛三兩五 榆皮一升 葵子一升

通艸四兩

右五味切以水一斗煮取三升分三服一方加黃芩三兩

又療淋小便不利陰痛石常散方

石常二兩五 瞿麥一兩 滑石五兩 車前子三兩

葵子二兩

右五味搗篩為散服方寸匕日三並出第五卷中

千金療小便不利莖中痛少腹急方

通艸一兩 葶藶子熟三 茯苓三兩

右三味搗為散以水服方寸匕日三服忌醋物出第二十一

卷中

備急療小便不利莖中痛劇亦療婦人血結腹痛牛膝飲方

牛膝一名牛腎掘取根煮服之五差有驗肘後同

陶効方

秦苑二分 冬瓜子二兩

右二味搗為末酒服一七日三服神良肘後同

又仲療小便不利

紫螺蛸三枚 黃芩一兩

右二味切以水一升煮取四合頓服之良肘後同

又方

蒲黃

滑石 各一分

右二味為散酒服一七日三天驗時後同

久療諸淋及小便常不利陰中痛日數十度起此皆勞損虛熱
而致長將散服方

石常去毛

滑石

瞿麥

王不留行

葵子 各二升

右五味搗篩為散每服方寸匕日三服之姚方加滑石五兩
車前子三兩無王不留行備急同出第廿四卷中

古今驗錄療淋胞痛不得小便滑石散方

滑石

葵子

鍾乳 各二兩

桂心

通州

王不留行 各半兩

右六味搗篩為散先食灑以水服方寸匕日三服忌白葱出

第二十六卷中

遺尿方六首

病源遺尿此由膀胱虛冷不能約于水故也膀胱為足太陽腎
為足少陰二經為表裡腎主水腎氣下通于陰小便者水液之
餘也膀胱為津液之府、既虛冷陽氣衰弱不能約于水故全
遺尿也診其脈來過寸口入魚際遺尿肝脈微滑亦遺尿左手
關上脈沉為陰、絕者無汗脈也若遺尿尺脈實少腹牢痛小
便不禁尺中虛小便不禁腎病小便不禁脈當沉滑而反浮大
其色當黑反黃此土之剋水為逆不治其湯熨鍼石別有正方
補養宣道今附于後養生方藥引方云躄踞高一尺許以兩手
從外屈膝至足趺上急手握足五趾極力一通令內曲以利腰
腕療遺尿也出第廿四卷中

集驗療遺尿方

取雄雞腸燒灰為末用三指一撮服之朝暮服當愈范

注同出第五卷中

千金療遺尿小便澀方

牡蛎

鹿茸四兩各

桑耳三兩

阿膠二兩

右四味切以水七升煮取二升分爲二服作散以飲送之經

心錄同

木防己二兩

葵子二兩

防風三兩

右三味切以水五升煎取二升半久溫三服作散亦佳古今錄驗同並出第二十一卷中

古今錄驗牡蛎湯療遺尿小便澀方

牡蛎四兩

鹿茸炙四兩

阿膠炙各二兩

桑螵蛸二兩

右四味切以水五升煮取二升分再服

又方

桑耳三分

礬石三分煎汁

阿膠二分炙

龍骨三分

右四味爲散空心飲服方寸匕日三

又方

桑耳二兩

牡蛎各三兩煎

礬石二兩煎汁

右三味搗篩爲散酒服方寸匕日三服並出第二十六卷中

尿血方一十一首

千金療房損傷中尿血方

牡蛎

車前子

杜心

黃芩

右四味等分搗篩爲散飲服方寸匕日三服不知加至二七

崔氏療卒傷熱行來尿血方

大黃末

芒硝末各半匕

右二味冷水和調用之立止三日內禁如法藥出第四卷中

古今錄驗療尿血鹿茸散方

鹿茸炙

當歸

乾地黄各二兩

葵子五合

蒲黃五合

右五味搗篩為散酒服方寸匕日三服忌葷菜出第二十六

卷中

蘆澄療尿血方

車前草搗絞取汁五合空腹服之差

又方

一水服亂髮灰方寸匕日三服時後千金同

又方

服益母草汁一升差立止一云葶艸

又方

車前三升水五升煮取二升分三服

又方

棘刺二升水五升煮取二升分三服差

又方

膠三兩炙以水二升煮取一升四分再服

又方

酒服蒲黃二方寸匕日二服水服亦得

又方

搗水筋汁服六七合日一服

胞轉方一十五首

病源胞轉者由是胞屈辟小便不通名為胞轉其病狀臍下急痛小便不通是也此病或由小便應下便強忍之或為寒熱所迫此二者俱令水氣上還氣迫于胞屈辟不得充張外水應入不得入內澁因出不得出外內相擁塞故令不通此病至四五

日乃致死者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或小便急目疾走或忍尿入房而昏令胞轉或胞落並致死出第十四

卷中
肘後療卒小便不通及胞轉方

取雞子中黃一枚服之不過三也備急同

又方

水上浮萍暴乾末服之小便不通利水脈流腫佳千金

翼同

又方

炙蟪蝟搗為末水服之方寸七日三服良效

又療忍小便久致胞轉方

自取瓜甲久燒服之備急同

又方

取梁上塵三指撮以水服之神效

又方

服蒲黃方寸七日三服良

范汪療胞轉不得小便方

用蒲席捲人倒立令頭至地三反則通肘后同

又方

雀矢半合 車前子 滑石 各四兩 通州

芍藥 各二兩

右五味切以水七升煮取三升服五合日二先食便得立愈

又療胞轉欲死及失溺方

取豆醬清和突灶中黑如豆大內陰乳中立愈並出茅

十五卷中

備急卒小便不通及胞轉方

車前艸一斤水一斗煮取四升分四服小豆同出第六

卷四

古今錄驗療轉小便不通亂髮散方

亂髮三斤洗去垢燒滑石半斤 鯉魚鱗一兩

右三味搗篩為散以飲食方寸七日三良服

又療胞轉不得小便方

吸芥真琥珀一兩 葱白十四莖

右二味以水四升煮取三升去葱白末琥珀細篩下湯中溫

服一升日三服大利范汪同

又張苗說士程婁有客忍小便不時起胞轉大小便不得四五

日困篤欲死無脈服此差方

滑石二兩 亂髮三兩燒灰

右二味搗下篩取生桃白皮一斤熟春以水合絞得汁二升

以汁服散方寸七日三服即愈其但淋者取亂髮三兩燒灰

滑石五兩合搗為散服方寸七日三

又說不得小便者為胞轉或為寒熱氣所迫胞屈辟不得充張

津液不入其中為尿及在胞中尿不出方

當以葱葉除尖頭內入莖竅中吹之初漸以極大吹之令氣

入胞中得脹乘津液得入便愈朱郁用此藥療郭虎將十五

歲男用

葵子一升 通州 甘艸各二兩 石常一兩半

滑石四兩 榆皮二升

右六味以水一斗煮取三升分服范汪同並出第二十六卷

中

小便血及九竅出血方一十二首

小豆療小便血菟絲丸方

菟絲子

蒲黃

乾地黄

白芷

荆實

葵子

敗醬

當歸

茯苓

芎藭各二兩

右十味合搗為末以白蜜和丸如梧子大飲服二丸日三服不知加至五六丸劉洪起方已効常服忌酥物薑菜古今錄驗范汪同

又斷血諸方所云下血者其從腹裏出者悉為下血也有痔漏血從孔邊出者別尋痔方出第四卷中

千金療小便出血方本云以下治虛勞尿白濁

灸脾俞百壯在第十椎

又方

灸三焦俞百壯在第十三椎

又方

灸腎俞百壯在第十四椎

又方

灸章門百壯在季肋端

又方

榆皮二斤水一斗煮取五升分十服佳

又方

搗羊乾骨下篩水服方寸七日三服

又治小便血方

生地黄八兩柏葉一把黃芩二兩阿膠二兩炙

右四味切以水七升煮取三升去滓納膠分三服並出第二

十一卷中

文仲療小便出血方

生地黄汁一升

生薑汁一合

右二味相和頓服不差更作評今公處云極初時後同
又方

灸足第二指本第一文七壯立愈附後同
又方

龍骨末二方寸匕溫酒一升服之日三服深師附後范
注同陶氏同

又方

當歸四兩酒三升煎取一升頓服之附後深師范注同
並出第六卷中

小便不禁方二首

病源小便不禁者腎氣虛焦受冷也腎主水其氣不通于陰腎
虛下焦冷不能溫制其水液故小便不禁也出第十四卷中
千金翼小便不禁多日便一二斗或如血色方

麥門冬 各心

乾地黄 各八分

茯苓子

桂心

續斷 各五兩

升麻 一兩

乾姜 四兩

右七味切以水一斗煎取二升五分三服忌海藻菘菜生葱

等物

又久房散主小便多或不禁方

菟屎子 二兩 蒲黃 三兩

黃連 三兩

消石 二兩

肉蓯蓉 二兩 五味子 三兩

雞臍中黃皮 三兩

右八味搗篩為散每服方寸匕日三服每服如人行三四里

又服並出第十五卷中

小便數及多方五首

病源小便數者膀胱與腎俱虛而有客熱乘之故也腎與膀胱
為表裡俱主水腎氣下通于陰此二經既虛致受于客熱虛則
不能制水故令數小便熱則水行溢則小便不快故令數起

也診其脈附陽脈數胃中有熱即消穀飲食大便必鞭小便則數其湯熨臍石別有上方補養宣通今附于後養生方導引法云以兩踵布膝除數尿出第十四卷中

范汪療小便數而多方

黃連二分

苦參高

麥門冬 各一分

五灰根

龍胆各一分

右五味搗篩以蜜丸如梧子每服十九加至二十九良一方
無苦參有黃芩

又方

枯樓十分

黃連五分

右二味搗篩為散每服方寸七日三良

又方

瞿麥二兩

滑石一兩

葵子一升

黃芩

右五味切以水六升煮取三升去滓一服六合

桃仁一味吹咀酒一升煮三沸去滓分為三服強人一服盡之並出第十七卷中

集驗療小便數而多方

羊肺炙內少許羊肉合作之調和鹽如常食之法多少任意不過三具効出第五卷中范汪同

許仁則小便數多方四首

許仁則論此病有兩種一者小便多而渴飲食漸加肌肉漸減乏氣力少顏色此是消渴一者小便雖數而不至多又不渴飲食亦不異常或不至多能食但稍過天寒冷即小便多更與別候此是虛冷所致大都兩種俱緣腎氣膀胱冷渴不差便能殺人腎虛腰冷无所為害若候知是消渴小便數宜服後獲葵子

八味湯黃耆等十四味丸并竹根等十四味飲以麥麩等十四味煎以次服之

菝葜 土瓜根 各五兩 黃耆 地骨皮

五味子 各四兩 人參 三兩 石膏 八分 碎 牡蛎 三兩 熬

右藥切以水一斗煮取三升去滓分溫服三服每服如人行十里久服一劑覺可重合服之至五六劑佳隔五日服一劑三數滿宜合後黃耆等十四味丸服之

又方

黃耆 黃連 土瓜根 各五兩 苦參 三兩

玄參 桔樓 地骨皮 龍骨

菝葜 鹿茸 各四兩 牡蛎 熬 人參

桑螵蛸 炙 各三兩 五味子 一升

右藥搗篩為末蜜和為丸用後竹根飲下之初服十五丸日

二服稍加至三十丸如梧子大忌豬肉冷水

又竹根飲子方

薑竹根 生茅根 芦根 各四升 菝葜 切二升

石膏 一斤 碎 烏梅 五十顆 生姜 切一升 小麥 三升

竹瀝 二升 白蜜 一升

右藥以水五斗煮取一斗去滓內竹瀝及蜜着不津執貯之用下前丸縱不下丸但覺口乾及渴即飲之不限多少冷煖及前後如熱日即逐日斟酌煎之須煮恐壞也如不能作此飲即用烏牛乳下丸及解渴日服丸及飲夜中恐虛熱宜合後小麥麩等十四味煎細含嚥之

又小麥麩五升以水硬浸之別于水中揉挺令麩粉盡麩筋別成一塊即止以此麩粉汁別器澄停澹却清汁即以稠粉盛于凍袋子中漉着令微生燥生葛根五挺

徑三寸長二尺碎槌于水中揉挺令膏根中粉汁盡別
器澄停盛貯一如小麥麩法生枯樓五斤搗如上法胡
麻三升去皮熬令熟為散薑竹根切一斤生茅根切一
斤生芦根切一斤烏梅五十顆以上用水五斗緩火煎
取一升半去滓澄取清冬飲汁二升生麥門冬汁三升
生姜汁一升牛乳一升白蜜二升先取竹根等汁和冬
飲以下微火上煎減半次內牛乳白蜜又煎六七沸投
小麥麩粉生葛粉枯樓粉胡麻散于諸汁中煎和熟攪
之勿住手候如稠糖即成訖止火待冷貯別器中每
夜含如此初服一棗大稍加至一匙亦任性日三含
之欲作丸飲服亦得第十卷中方凡十三味元欠一
味

尿床方六首

病源人有于眠睡不覺尿出者是其稟質陰氣偏盛陽氣偏虛
則膀胱腎氣俱冷不能溫制于水則小便多或不禁而遺尿膀胱
脫足太陽也為腎之府腎為足少陰為藏與膀胱合俱主水凡
人之陰陽日入而陽氣盡則陰受氣至夜半陰陽大會氣交則
卧睡小便者水液之餘也從膀胱入于胞為小便夜卧則陽氣
衰伏不能制于陰所以陰氣独發水下不禁故于眠睡而不覺
尿出也出第十四卷中

千金療尿床方

羊肚系盛水令滿急繫兩頭熟煮開取水搗服之玉差

又方

雞肌脰一具并腸暴乾末酒服之男雌女雄也

又方

羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉晨朝空腹食之不過四

五疝差

又療尿床方

新炊熟潰飯一盞寫尿床處拌之收取與食之勿令知

又方

重兩子髀上盡指陷處灸七壯又灸橫臍天七壯並出

第二十一卷中

近効療尿床方

取麻鞋乳帶及鼻根等佳不用皂瀉七量以水七升煮

取二升分再服

灸穴雜法一十二首

千金翼灸之淋法

灸大敦三十壯

又石淋臍下三十六種疾不得小便法

灸關元三十壯一方云百壯

又血淋方

灸丹田穴隨年壯良

又法

灸復溜穴五十壯一云隨年壯

又尿黃法

灸石門穴五十壯

又遺尿法

灸遺道俠玉泉五十隨年壯

又法

灸陽陵泉穴隨年壯

又失禁尿自不覺知法

灸陰陵泉穴隨年壯

又單中痛法

灸行間穴三十壯

又腹滿小便數法

灸屈骨端二十壯

又淋痛法

灸中封穴三十壯亦隨年壯

又小便不利及轉胞方

灸心下八寸七壯以上穴並出第二十七卷中

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟校勘
外臺秘要方卷第二十七

