

濟生拔粹方

十

勞傷并治

大病差後真氣未全強行房事勞損腎任二經故少腹裏急或引陰中急痛拘急熱氣上衝曾頭重不能舉日中生花脛拘牽兩足躄脈腎任四經病可易取男子婦人焮燒之名燒焮散方在前陰證略例內

大病差後勞復身熱而煩脈微數無汗下證者枳實梔子湯主之有表則汗之 有裏則下之

大病差後正氣尚虛不能施化水穀為榮氣故腰下有腫當利其水行其氣宜牡蠣澤瀉散

大病新愈喜唾不休正氣尚虛胃中寒腎主液自入為唾宜理中丸

大病新差久虛瘦少氣欲吐正氣不復也宜竹葉石膏湯

大病已解因食後微煩者正氣不能勝穀氣也穀氣與正氣相搏故日晡而煩減食則愈 若勞乎氣無力與精神者微舉之若勞乎血與筋骨以四物之類補之若勞在脾為中州也調中可矣

諸證辨

水證

凡病表裏傷寒而口乾引飲水氣在內停而不散外有表證未除內有水者小青龍湯主之 表證外除裏有水氣不散者十棗湯主之

渴飲水證

與桂枝麻黃發汗之後脈洪大而渴者有一一 中下有熱

藥所主而治之肺熱於上焦渴而飲水故上焦之渴白虎湯也熱在中焦胃熱飲水小便不利故中焦之渴續命湯也熱在下焦膀胱有熱而渴小便不利五苓散也

陽厥陰厥證

凡厥者厥陰也或脈見與不見併之陽明本胃中實口乾而渴欲飲水為熱厥其人狂言妄語如見鬼狀雖熱不見脈伏於內也故厥深熱亦深厥微熱亦微併於太陰少陰之中大便自利躄重惡聞人聲雖有狂言口乾而不渴此寒厥也雖脈沉者為沉數也非沉遲也沉遲為陰也

小便不利證

凡病小便不利者太陽之本也所併既異治亦不同併之陽明之本不利者下之則利不必五苓也

保命集下

併之少陽之經而不利者和之陰陽和則利亦非五苓也併之少陰而不利者溫之則利亦非五苓也併之厥陰而不利者溫之而利亦非五苓也太陽標本自併而不利者則五苓散主之

發黃證

凡發黃有六有畜血有濕熱實有風濕熱虛有寒濕有結胃有痞氣

畜血發黃邪熱傳於太陽之本小便先淋而黃其人暴狂內有血也為太陽發黃本病也

濕熱發黃太陰併陽明之本為濕熱發黃而小便不利風濕熱發黃併少陽也寒濕發黃太陰併少陰也

結胃發黃附太陽也

痞氣發黃附太陰也

凡六者
隨脈證
標本而治之大抵發黃從太陽陽明而論
陽明屬胃且太陰屬脾皆土也故見黃色當從其脾故脾病
黃土氣化濕非濕毒氣何能發黃又涼藥太過亦能生黃惟
寒濕與此宜溫也

結胃證

結胃病邪氣動膈結於胃中故名結胃非標本傳變而有妄下
而有也邪在太陽之標反下之邪熱乘虛內陷胃中結而痛
甚熱而煩燥手不可近頭微汗際頸而還大陷胃湯
結胃背項強如柔荑狀邪氣結於內柔疼多汗結胃自汗陷
胃丸小結胃按之硬且痛心下微硬脈浮而滑小陷胃湯
三證結胃皆日晡潮熱
結胃微熱者水結胃也必謹察之無令妄治

痞氣證

痞氣按之軟而不痛寸沉關浮而有熱者大黃黃連瀉心湯
傷寒汗下後身寒痞滿而嘔食飲不下脈微按之不痛非柴
胡證宜半夏瀉心湯
傷寒發黃於陰反下之後心下痞而惡寒自汗脈遲者附子
瀉心湯
傷寒汗下後聞食不欲食自利腸鳴而心下痞滿者生薑瀉
心湯
傷寒汗下後心中痞大便硬又下之道氣上衝大便復硬也
胃氣虛故也當和胃氣甘草瀉心湯

虛煩證

虛煩為汗之後有之也汗虛其表下虛其裏表裏俱虛陰陽氣

爭故煩而不得眠神志不安心中懊懣故曰虛煩各變以藥應之

汗下後心中懊懣頭汗出煩而不得眠心中微結而痛者梔子豉湯主之

傷寒醫以丸藥下之身熱不去裏不結微煩而不得眠者梔子乾薑湯主之

傷寒汗下後喘而不得眠者梔子豉加杏仁二十枚主之傷寒汗下後咳嗽而煩不得眠者梔子豉加入參芍藥各五錢主之

傷寒六經諸證

凡發表皆太陽也邪初傷皮毛腠理太陽經行身之後為表之表故可發汗

作命集下

太陽非頭痛項強不可發汗 非身熱惡寒不可發汗

非脉浮不可發汗

陽明凡發熱蒸蒸然發熱翕翕發熱皆不惡風可解其肌

少陽往來寒熱可和解之凡此三者皆標病經病故外則從

太陽內則從陽明陽明主胃胃者水穀之海諸經本傳至陽明而不傳也

非陽明之本不可下陽明本病胃家實故也

非痞滿燥實不可下 非潮熱發渴不可下

非罵詈不避親跡不可下 非脉沉數不可下

非棄衣而走登高而歌如見鬼狀不可下

非少陽不可和雖有太陽而見少陽一證便可和之不必悉具

非往來寒熱不可和

非脇肋急痛不可和

非胃滿而嘔不可和

非脈緩者不可和

非太陰不滿滿者痞氣也因安下傷胃內損穀氣脾胃既衰不能行氣於四藏結而不散故為痞故非太陰無痞

非太陰不自利

非太陰腹中無虛滿

非少陰而不溫足少陰腎本寒故也

泄瀉下重腹痛少陰也

身寒拘急少陰也

足脛寒逆少陰也脈浮而微故溫之也

非厥陰而不逆胃虛寒氣逆於上厥陰也

四肢厥冷身寒者厥陰也

邪在三陰少陰證多邪在三陽太陽證多

兩感傷寒證

兩感於寒不治者表裏俱傷標本皆病故知不治外則腠理不

閉榮衛不能守衛氣不能護內則大小便不禁穀氣不能榮

養少氣脈微而欲絕者故不治

有兩感可治者感異氣也使表中風內傷於寒可治

表中於濕內傷於寒可治

表中於熱內傷於寒可治

當切脈逆從以知吉凶兩感之邪三陰三陽皆有之脈從陽

可治脈從陰難治陽生陰死此之謂也

關格病

陰陽易位病名關格曾膈已上陽氣常在熱則為主病身半已

下陰氣常在寒則為主病寒反於胃中舌上白胎而水漿不

下故曰格格則吐逆

熱反丹田小便不通故以關關則不得小便胃中有寒以熱

藥治胃中之寒丹曰有熱以寒藥以丹田之熱胃中有寒上

下之法治主當緩治客當急尺寸及之石死陰陽交者死關格者不得盡其命而死矣

傳受諸證并方

傷寒汗下後熱結胸中者宜**栝樓連翹湯**

栝樓 連翹 黃芩各兩 薄荷 甘草

川芎各伍分 梔子壹个

右剉細每服一兩水二盞煮至一盞去滓溫服

傷寒汗下後熱結胸中大便澀微小便赤者宜**黃連梔子湯**

黃連 梔子 黃芩 大黃四味各五分

右剉細每服壹兩水二盞煎服

傷寒後心風狂妄者宜**防風黃連湯**

黃連 大黃 防風 遠志 茯神五味各半兩

右剉細每服一兩水三盞煎服

傷寒汗下後頭痛起目眩者宜**獨活湯**

防風 獨活 旋覆花 當歸四味各七升

右剉細每服七錢生薑同煎

傷寒汗下後腹中時痛小便清者**芍藥乾薑湯**

芍藥 乾薑 白朮 桂枝四味各半兩

右剉細每服五錢生薑同煎

傷寒熱病後頭痛不止**石膏川芎湯**

石膏 川芎二味各一兩

右為麤末每服五錢水煎服

傷寒汗下後頭痛不止不可再發汗**麻黃湯**

石膏 葛根 麻黃各五 黃芩 芍藥 甘草各七

右劉細每服七錢生薑同煎

傷寒汗下後餘熱不退或煩或渴面赤者人參散

人參 梔子 藍葉 甘草 白鮮皮各半兩

右劉細每服五錢水煎服

傷寒汗下後熱不除而渴者人參知母散

傷寒汗下後裏急後重下利者七宣丸

大黃一兩 桃仁十二个 木香五分 檳榔五分 訶子皮五分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十九溫水下

傷寒汗下後大小便自利腹中痛者煨腸丸

附子一个 龍骨半兩 乾薑一兩 吳茱萸半兩 米殼半兩

阿膠半兩

右為細末酒糊為丸如梧子大每服三十九溫水下利止勿服

保命集下

傷寒汗下後喘咳不止恐傳肺痿補肺散

人參一兩 五味子五分 桑白皮二兩 款冬花 蛤蚧一對

右為細末每服五錢沸湯一盞調服

傷寒汗下後咳嗽肺虛聲音嘶敗者阿膠散

薯蕷一兩 阿膠一兩 人參一兩 五味子一兩 麥門冬一兩

白木一兩 乾薑三分 桂枝五分 杏仁三分 去尖

右劉細每服七錢水一盞入烏梅一錢同煎服

傷寒汗下後喘嗽煩燥氣滯滿邪氣逆者栝梗湯

栝梗 桑白皮各二兩 甘草 貝母 阿膠各五分

右劉細每服五錢水一盞入五味子烏梅肉各一錢同煎

傷寒汗下後足腫有濕氣不除者木通散

木香 木通 檳榔 獨活各一兩 丹參七分

右劉細每服五錢水煎服

傷寒汗下後飲食不入而逆氣者胃氣虛故也如聖加枳實湯

仲景有方陳皮湯下

傷寒汗下後氣逆利不止者寒也枳實芍藥湯如聖加甘草湯

芍藥半兩 甘草半兩 枳殼半兩 乾薑半兩

右劉細每服五錢水煎服

傷寒噫氣者何氣使然答曰胃中氣不交故也少陰經至胃中

交於厥陰水火之相傳而有聲故噫氣也如聖加枳實湯

甘草 桔梗 枳實炒三味各五分

右劉細每服五錢入五味子半錢水煎

傷寒氣逆而其無汗下證如聖加吳茱萸湯

甘草 桔梗 吳茱萸炒五分

右劉細每服五錢入五味子半錢同煎

傷寒汗下後喘而噫氣者如聖加人參藿香杏湯

甘草 桔梗 人參 藿香各五分 杏仁三不去

右劉細每服五錢水煎

汗下後動氣在左右上下證

傷寒汗下後臍左有動氣者防葵散

防葵一兩 小香五分 柴胡 黃芩各半兩

右劉細每服五錢水煎

傷寒汗下後臍上有動氣者枳殼散

枳殼五分 赤茯苓兩 當歸一兩 京三稜炮一兩

木香五分 訶黎勒五分

右為細末每服五錢泔湯點服

傷寒汗下後臍右有動氣者**前胡散**

前胡

赤茯苓

各一兩

大腹皮

人參 各五分

木香

三分 檳榔

大黃 各二分

右為細末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍下有動氣者**茯苓散**

茯苓

檳榔

三分 桂心

大腹皮

川茴香 炒

良薑 各五分

右為細末每服五錢沸湯點服

如久不治傳為積熱治之難痊不可汗下也

婦人無孕傷寒七證方七道

夫婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入血室妊娠傷寒則不同也宜以四物安養胎血佐以汗下之藥而治之

婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒脉浮而緩熱入

血室故倍加芍藥**桂枝加芍藥湯**

桂枝

半兩

芍藥 二兩半

生薑

半兩

大棗 六枚

右剉細每服五錢水煎

婦人傷寒脉浮而緊頭痛身熱惡寒無汗發汗後恐熱入血室

宜**麻黃加芍藥湯**

麻黃

半兩

桂枝 二兩

甘草

半兩

杏仁

二十五個

生地黄

一兩

右剉細每服五錢水煎

婦人傷寒太陽經傳表證仍在而自利併陽明也宜**小柴胡加**

芍藥湯

柴胡

一兩

甘草 六分

大棗

三枚

人參

三分

黃芩

二分

生薑

三分

芍藥

二分

右劉細每服一兩水二盞煎服

婦人傷寒身熱脈長而弦屬陽明少陽往來寒熱夜躁晝寧如見鬼狀經水適斷熱入血室大實滿者桃仁承氣湯主之不實滿者宜小柴胡加牡丹皮湯

柴胡二兩 黃芩半斤 人參二兩 半夏六分 大棗二枚

甘草半斤 生薑半斤 牡丹皮二兩

右劉細每服一兩生薑同煎

婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱內攻熱入血室經水過多無滿實者宜小柴胡加芍藥湯

甘草 芍藥 生地黃 川芎 四味各一兩

右劉細每服一兩水二盞煎至一盞半去滓入棕櫚灰五錢調勻溫服不止者刺隱白

保命集下

婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脈沉而遲太陽標與少陰本病經水適斷宜桂枝加附子湯

桂枝二兩 芍藥 生薑各一斤 甘草二兩 附子炮

紅花各五

右劉細每服一兩水二盞煎服

婦人傷寒頭痛脈浮醫反下之邪氣乘虛而傳於裏經水閉而不行心下結硬口燥舌乾寒熱往來狂言如見鬼狀脈沉而數當下之宜小柴胡加芒硝大黃湯

柴胡二兩 黃芩半斤 半夏製一斤 甘草半斤

大黃七斤 芒硝七斤 大棗二枚 生薑半斤

右劉細每服一兩生薑同煎去滓下硝再沸溫服若脈不沉即不可下

婦人有孕傷寒二十證方二十首

婦人傷寒脉浮頭腫自利腹中切痛宜桂枝湯

桂枝 芍藥 當歸各一兩

右剉細每服一兩水煎

婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脉沉者大陰也宜芍藥湯

芍藥 白朮各一兩 甘草 茯苓各五兩 黃芪二兩

右如前修服

產後二證

產後往來寒熱而脉弦者少陽也小柴胡加生地黄湯

柴胡二兩 黃芩半斤 人參五兩 半夏一兩五錢 甘草七錢

大棗三枚 生地黄 梔子 枳殼各五兩

右如前修服

產後虛煩不得眠芍藥枳實湯

芍藥 當歸 梔子各五兩 香豉半合

右如前修服產後傷寒便同下後變證

妊娠諸證合用四物等湯方俱在按粹下元戎方中

產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

產後虛損食飲不下加建中入參白朮茯苓諸虛不足飲食不

進加建中湯

產後血痢臍腹疼痛四物內加槐花黃連御米殼等分

產後血崩如豆汁澁黑過多者加蒲黃生地黄汁阿膠煎根艾

白芷痢臍腹疼痛大便自利經事頻併加白芍藥

立効散治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰

川芎 當歸各等分

六分糯米秤三錢水煎食前溫服

治婦人胎漏下血或因事下血

枳殼去穢法炒半兩 黃芩半兩 白朮二兩

右為麤末每服五七錢水煎去滓食前

治婦人帶病熱入小腸為赤熱入大腸為白皆任脉經虛也宜

苦練丸

苦練碎酒炒 茴香炒 當歸各五分

右為細末酒糊為丸每服五十九空心溫酒送下

治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者

五靈脂二兩半 一半生一半炒

右為細末每服一錢溫熱水調下口噤者斡開嚙之

若血崩不止用炒熟者加當歸酒同煎或水酒童便各半盞

同煎 **又方** 水煎為膏加神麩末和九桐子大空心溫酒下

調經門

萬病丸 治女人月經淤閉月候不來繞臍痛及產後血氣不調

乾漆杆碎炒令一時久 牛膝去苗酒浸一宿焙各一兩

右為末以生地黄汁一升入二味藥末銀石器內慢火熬可

丸即丸如桐子大每服二九空心米飲或溫酒下

紅花當歸散 治婦人經候不行或積淤血腰腹疼痛及室女月

經不通

紅花 當歸尾 紫葳 牛膝 甘草

蘇木細剉已上 白芷 桂心各一兩半 赤芍藥九兩

劉寄奴五兩

右為細末空心熱酒調三錢服食前臨臥再服

共入血不行濃煎紅花酒調下孕婦休服

治心腎俱虛勞嗽唾中有紅絲發熱盜汗名曰肺痿

白芍藥兩六黃芪

甘草

人參

當歸

半夏湯

白茯苓

熟地黄

五味子

阿膠炒各二兩

右咬咀每服三大錢水一盞半生姜十二片棗三個煎至九

分溫服日三

麥煎散治少男室女骨蒸婦人血風攻疰肌熱盜汗

鱉甲

大黃溫湯

常山

赤茯苓

柴胡

白朮

當歸

乾漆炒令生地黄

石膏各兩甘草半兩

右為細末每服三錢水一大盞小麥五十粒煎至六分臨卧

溫服若有虛汗加麻黃根一兩同煎

牡丹散治婦人月水不利臍腹疼痛

保命集

十一

牡丹皮

川大黃炒各一兩

赤茯苓

生地黄

桃仁

當歸

桂心

赤芍藥

白朮各半

石韋去毛

木香各半

右咬咀每服五錢水一盞半姜二片至七分去滓空心溫服

牛膝散治婦人月水不利臍腹疼痛

牛膝一兩

桂心

赤芍藥

桃仁

延胡索

當歸

牡丹皮

川芎

木香各半

每服方寸匕為極細末溫酒調下食前

溫經湯若經道不通統臍寒痛厥沉緊宜此及桂枝桃仁湯萬

病丸

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

我茂各半人參

甘草

牛膝各一

右咬咀每服五錢水一盞半去滓溫服

桂枝桃仁湯

桂枝 芍藥 生地黄 桃仁製五個甘草一兩

右為粗末每服五錢水二盞姜二片棗一個同煎去滓溫服

琥珀散

治月經壅滯心腹疼痛不可忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死

三稜 莪茂 赤芍藥 牡丹皮 劉寄奴

當歸 熟地黄 桂心 烏藥 延胡索各兩

右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆爛

為度焙乾入後五味同為細末每服二錢空心溫酒調下

烏豆一升約五兩

柏黃散

治經血不止

黃芩少則五分 當歸 柏葉 蒲黃各一兩少

生薑五分少則二分 艾葉一分 生地黄六兩少四分

伏龍肝二兩七分少合

右咬咀用水二升煎取八合分為二服此少合之數

療經血不止

歌曰 婦人經血正淋漓 舊瑞蓮蓬燒作灰

熱酒一盃調八字 自然安樂更無疑

小續命湯

治崩漏不止陽傷於陰令人下血當補其陰脉數疾小者順大者逆

小蘗葉研取汁 生地黄汁一盞 白木半兩剉

右三件入水一盞煎至一半去滓溫服

琥珀散

治崩暴下血

赤芍藥 香附子 粘荷葉 男子髮毛並水洗 當歸

棕櫚炒焦存性 烏紗帽是漆絨頭巾取陽氣充出故也

右等分除棕櫚外其餘並切鹿片新瓦上煨成黑炭存性二分爲細末每服五錢空心童子小便調下如人行十里再一服七八服即止 若產後血去多加米醋京墨麝少許一法宜先以五積散加醋煎投一二服次服五靈脂散五靈脂散方在前

散 治血室有熱崩下不止服溫藥不効者

延胡索 瞿麥穗 當歸 乾葛 牡丹皮各乙兩
石膏式兩 桂心別爲末七分半 蒲黃半兩 威靈仙七分半

右爲細末每服三錢水一盞半空心溫服日二

方 治崩中晝夜不止醫不能治

芍藥乙兩 生地黄汁乙盞

右先用酒五盞煮芍藥一盞去滓下地黄汁再煎三三沸分爲三服

方 治患崩中不止結作血片如雞肝色碎爛

芍藥分式 阿膠 青竹茹各八分 續斷 地榆
小薊根各十分 當歸六分 生地黄 伏龍肝各十分

右用水九盞煮取三盞去滓分作三服

四物湯 方在前元戎內加減于后

若產後一月內惡物積滯敗血作病或脹或疼曾膈脹悶或發寒熱四肢疼痛加延胡索沒藥香白芷各四物等分爲細末淡醋湯或童子小便酒調下

若血風於產後乘虛發作或產後傷風頭痛發熱自骨節痛

加荆芥穗天麻香附子石膏霍香各三錢半四物料共一兩中加之水煎服

若虛熱心煩与血相搏口舌乾渴欲飲水者加枯菱根一兩麥門冬七錢半

若寒熱往來加炮乾姜牡丹皮各二錢半

若婦人血虚心腹疼痛不可忍者去地黃加乾姜名四神湯

若老人風秘加青皮等分煎 若血痢亦加膠艾煎

若瘡疾加荆芥酒煎常服

若以四物湯四兩加甘草半兩蜜丸每兩作八九酒醋共半盞溫湯同化下名當歸煎去敗血生好血

婦人百疾只四物湯加吳茱萸煎若陽藏少使茱萸陰藏多使茱萸

保命集下

十一方

安胎散治榮衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛血經諸疾並皆

治之

生薑兩十式 生地黃乙斤式

白芍藥 當歸

延胡索醋帶裏煨令熟用布擦去皮

桂心各乙 紅花炒无惡血不用

沒藥另研各半兩

蒲黃乙兩隔

右將地黃汁炒生薑滓姜汁炒地黃滓各稍乾焙同諸藥為細末每服三錢溫酒調下

若月經不依常蘇木煎酒調下 若腰疼糖煎酒調下

安胎散

生地黄乙斤式 生薑如交加散

當歸 川芎

牡丹皮 芍藥 義茂 蒲黃 白芷

菴活各炒 桂心不見 熟地黃炒

右十味各一兩同前一味為細末於甕合內收之加減了后

若婦人冷氣痛并血海不調膈氣炒薑酒調下三錢

若產後胞衣不下暖酒調下一錢

若產後血犯心眼見鬼神用童小便半盞酒半盞同煎調二

錢此藥治婦人諸疾空心日干食前並暖酒調下日二

朱砂散 治婦人胎前產後血氣諸疾

木香半兩 三稜 莪茂 白朮各一兩 枳殼去穢麩炒黃

白茯苓 當歸 延胡索 人參 熟地黃洗

牡丹皮 粉草各半兩

右為末米糊丸如桐子大每服二三十丸常服溫酒下

若胎前渾身并脚手痛炒姜酒下

若胎前腹內疼并安胎紫草煎酒下

若胎前嘔逆吐食粳米飲下

若胎前飲食不得渾身倦怠豆淋酒下

若胎前渾身發熱甘草湯下

若胎前咳嗽煨姜鹽湯下 若胎前頭痛煨葱茶下

若胎前產後瀉紫蘇姜酒下

若催生胎衣不下嚼葱白三寸暖酒下

若產後赤白痢乾姜甘草湯下

若產後下血不止燒漆灰一錢調酒下

若產後渾身虛腫陳皮去白只乾浸酒下

若頭疼薄荷茶下 若赤白帶下燒棕櫚灰二錢調酒下

若久年血氣成塊染心痛溫酒下炒姜酒下及良姜浸酒下

皆可 若婦人室女血脈不通煎紅花蘇木酒下

若經脈不調或前或後或多或少或前或後歸酒下

若大小便秘結心煎湯下

若乳汁不行苦葶藶煮豬蹄羹下

若產後腰疼煎芍藥酒下

中風門

續命湯

方在發明內附加減于后

若精神恍惚加茯神遠志

若骨節煩痛有熱者去附子倍芍藥心煩多驚者加犀角半

兩骨間冷痛者倍用桂附

若嘔逆腹脹者倍人參加半夏一兩

若躁悶大便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎服

若臟寒下利者去防己黃芩倍附子一兩加白朮一兩

若利者去防己

若下利者去防己

若便利產後失血并老人小兒加麻黃桂心甘草各二兩

若治或歌哭或笑語無所不及用麻黃二兩人參桂枝白朮

各二兩無附子防風生薑有當歸一兩自汗者去麻黃杏仁

加白朮

若脚弱加牛膝石斛各一兩 若身疼痛加秦艽一兩

若腰疼加桃仁杜仲各半兩 若失音加杏仁一兩

春加麻黃一兩 夏加黃芩七錢 秋加當歸四兩 冬加

附子半兩

續命湯

治男子婦人腰痛

延胡索 當歸

桂心等分一方有杜仲

右為末溫酒調下三錢甚者不過數服

續命湯

治腰痛脚膝拘牽重痺亦治麻節風脚氣流注

獨活 三兩 桑寄生 續斷 杜仲 細辛

牛膝 秦艽 茯苓 白芍藥 桂心

川芎 防風 人參 熟地黄 當歸 各三兩

右咬咀每服三錢水一盞去滓溫服空心無桑寄生加甘草

大腹子散 治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子 紫薊 木通 桑白皮 羌活 木瓜

荆芥 赤芍藥 青皮 獨活 枳殼 各三兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片葱白七寸去滓空心溫服

骨碎補散 治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇拘急肢節不持

骨碎補 炒 草薢 牛膝 桃仁 海桐皮

當歸 桂心 檳榔 各二兩 赤芍藥 附子

川芎 各七 枳殼 半兩

右為粗末每服三錢水一大盞姜三片棗一個煎去滓食前

熱服

紫蘇散 治風毒脚氣腹內痰惡脚重虛腫

紫蘇 木通 桑白皮 茴香 各二兩 枳殼 三兩

羌活 獨活 荆芥穗 木瓜 青皮

甘草 各半 大腹子 十個

右咬咀每服三錢水一大盞姜三片葱白一莖同煎

桑白皮散 治脚氣成發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急坐

卧不得

桑白皮 郁里仁 赤茯苓 木香 防己

大腹子 紫蘇子 木通 檳榔 青皮 各七

右咬咀每服三錢姜三片水煎

四白散 治脚氣弱痺腫滿心下急大便澀

薏苡仁 防風 猪苓 川芎 防己

郁里仁各一兩 檳榔 大麻仁各一兩 桑白皮各一兩 枳實七錢

甘草半兩 羚羊角屑 乙兩

右為末每服三錢水煎

四白散 治男子婦人血虛發熱夜多盜汗羸瘦脚痛不能行

黃耆 厚朴 益智仁 藿香 白朮

白扁豆 陳皮各二兩 半夏 白茯苓 人參

烏藥 甘草 白豈蔻仁各半兩 芍藥乙兩半

檀香 沉香各半

右為細末每服三錢姜三片棗一个水煎

養榮丸 治乾濕脚氣筋脉拘牽疼痛不能行

乳香 沒藥各三錢 牛膝 青鹽各半兩

熟艾四錢 川烏三錢 全蝎乙錢

右為細末共研藥和勻以木瓜一个大者切一頭留作蓋去穰入上件藥於內將蓋簽定安木瓜於黑豆中蒸令極爛取出去皮連藥研成膏却入生蒼朮末拌勻丸如桐子大每服五十丸空心木瓜湯下以溫鹽酒亦可日三服忌血与蒜

蒸病明

雞蘇丸 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉半斤 黃耆乙兩 甘草 川芎各半兩 防風乙兩

桔梗半兩 荆芥穗乙兩 甘菊花乙兩 生地黄半兩 腦子半錢

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸用麥門冬去心煎湯嚥下若肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不得喘嗽痰涎或發

寒熱小便赤澀加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯

甘草 黃芩 桑白皮 防風各一兩 杏仁二十粒製

人參 茯苓各半兩 麥門冬二兩

以前五味用米泔浸一宿曬乾次入人參茯苓麥門冬三味同為細末每服三錢蠟一豆大水煎食後服

子苓散 涼心肺解勞熱

黃耆一兩 白芍藥 子苓 人參 白茯苓

麥門冬 桔梗 生乾地黄各半兩

右為粗末先用竹葉一握小麥七十粒水三盞姜二片煎至一盞半入藥末三錢重煎至七分去滓溫服

補肺湯 治勞嗽

保命集下

桑白皮 熟地黄各二兩 人參 紫苑

黃耆 五味子各一兩

右為末每服三錢水煎入蜜少許食後

四君子湯加秦光黃蠟煎服尤妙

麥煎散 治少男室女骨蒸婦人血風攻瘥四肢

赤茯苓 當歸 乾漆生 鱉甲醋炙 常山

大黃煨 柴胡 白朮 生地黄 石膏各一兩

甘草半兩

右為末每服三錢小麥五十粒水煎食後臨卧服 若有虛汗加麻黃根一兩 東坡曰此黃州吳判官療骨蒸黃耆臭肌熱盜汗極效吳君室之如希世之珍其效可知

治婦人客熱四肢煩悶疼痛

犀角骨 赤芍藥 地骨皮 紅花 甘草各半兩

柴胡一兩 黃耆半兩 麥門冬 人參 枳殼

赤茯苓 生地黃各七

右咬咀每服四錢薑二片水煎

黃耆湯 治婦人客熱心胃壅悶肢節煩疼

生乾地黃一兩 黃耆一兩 犀角骨 甘草

瓜蒌仁 黃芩各半 人參 茯神各七

右為末每服三錢淡竹葉五片水煎

地骨皮散 治血風氣体虛發渴寒熱

柴胡 地骨皮 桑白皮 枳殼 前胡

黃耆各半 白茯苓 五加皮 人參 甘草

桂心 白芍藥各半

右咬咀每服三錢生薑二片水煎

柴胡湯 治寒熱体瘦肢節疼痛口乾心煩

柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮各一 人參

地骨皮 枳殼製 桔梗 桑白皮 赤芍藥

生乾地黃各七 麥門冬二兩 甘草半兩

右咬咀每服四錢薑二片水煎

刺骨湯 療時氣風温寒熱瘴瘧往來潮熱並宜服之

陳皮去白 麻黃去節 香附子 甘草各一 荆芥穗

厚朴各二 草果仁三 白芷 桂心各半

右為麤末每服四錢薑二片棗二枚水煎

清氣湯 治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上氣喘急喉中涎声

胃滿氣逆坐臥不安飲食不下

鷲粟殼

人參

粉草

各半兩

陳皮

茯苓

杏仁製

明阿膠炒

五味子

桑白皮

薏苡仁

紫蘇

各一兩

加百合

貝母

去心

半夏麩

欬冬花

右咬咀每服五錢薑二片棗二枚烏梅半枚水煎臨卧服

攝皮湯

古今錄驗方

療春夏傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中作聲上

氣不得下頭痛

陳皮

紫苑

麻黃

去根

杏仁

當歸

桂心

甘草

黃芩

各等分

右咬咀每服五錢水煎

四七湯

治痰涎咽喉之中上氣喘逆甚効

紫蘇葉

二兩

厚朴

三兩

茯苓

四兩

半夏

五兩

右爲末每服四錢姜七片棗一枚水煎

千錢湯

治痰喘

半夏

七枚炮裂

四片破之

皂角

去皮

甘草

換一

生薑

如指

右同以水一椀煮去半頓服

嘔吐腹痛

阿字散

治老幼霍亂吐利一服取効又治九種心痛及心脾冷

痛不可忍神効

呵子

甘草

厚朴

製

乾姜

草果仁

陳皮

良姜

茯苓

神麩

麥蘗

右爲細末每服三錢候發刺痛不可忍用水一盞半煎七分

入鹽服

續命散

治虛損氣逆吐血不止

鷄蘇葉

黃芩

各一兩

當歸

半兩

赤芍藥

半兩

阿膠

二兩

伏龍肝二兩刺薊

生地黄

黃耆各二兩

右為麤末每服四錢薑二片竹茹彈子大水同煎

五神湯治婦人熱毒上攻吐血不止

生藕汁

刺薊汁

生地黄汁各二

生薑汁半白蜜一

右和煎三兩沸無時以一小盞調炒麩塵一錢服

產前地黃湯

方在前雖知內附

白散治一切冷氣不和及本藏膀胱氣攻衝疼痛大治產前

後復痛胎不安忽血刺痛宿冷帶癖

川芎

當歸

枳殼

厚朴

桂心

乾薑

芍藥

青皮

木香

麥芽

三稜

莪朮

茯苓

神麩

人參

苦練子

熟地黄

船上茴香各等分

係命蓮心

一十

右為細末每服三錢水一盞連根葱白二寸拍破鹽半錢煎

至七分溫服內大黃呵子宜相度病狀如大便不利入大黃

同煎却不入鹽如大便自利入呵子煎

續命仁方

方在前治經候前小腹痛不可忍者

果神丸

神麩

茴香各四

木香

椒炒香

丁香各半

檳榔四枚

漆六兩半生用重湯煮半日令香

右除椒漆外五物皆半生半炒為細末用前生熟漆和丸如

彈子大茴香末十二兩鋪陰地陰乾候外乾并茴香收器中

乾去茴香腎餘膀胱疝癖及疝墜五隔血崩產後諸血漏下

赤白並一九分四服死胎一九皆綿交酒下

若難產炒葵子四十九枚搗碎酒煎下

諸疾不過三服痊

氣十服膈氣癥瘕五服血癥二九當差

桃仁 治婦人血癥血積經候不通

桃仁 大黃各一兩 蝨蟲半兩 朴消一兩

右四味為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升半下
大黃桃仁蝨蟲等不住手攪欲下手丸下朴消更不手攪良
久出之丸如桐子大前一日本用喫晚食五更初用溫酒吞
下五丸日午取下如赤豆汁或如鷄肝蝦蟇衣狀未下再作
如鮮血來即止

大藥散 治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行兒枕塊痛

血竭 沒藥並細研 桂心 當歸 蒲黃

紅花 木香 延胡索 乾漆炒 赤芍藥各等分

右為極細末每服二錢熱酒調下食前 若血塊衝心痛甚

危者以大順散二錢熱酒調服立止

牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼痛

牡丹皮 桂心 當歸 延胡索各兩 莪茂

牛膝 赤芍藥各二兩 荆三稜半兩

右為末每服二錢水酒各半煎

妊娠惡阻門

人參瀉心散 治阻滯嘔吐痰水

人參 橘紅 白朮 麥門冬去心各

甘草 厚片 白茯苓各半

右為末每服二錢淡竹茹彈子大生姜二片水同煎空心

合前

大順散 治痰惡嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無功者

人參

甘草

川芎

當歸

芍藥

丁香各半兩

白茯苓

白朮

陳皮各一兩半

桔梗炒

枳殼炒各半半夏洗七次切炒

右咬咀每服三錢生姜五片棗一枚水同煎

安胎散治妊娠惡阻心中憤悶頭重目眩嘔逆不食或胎動不安腰腹疼痛

甘草

茯苓

當歸

熟地黄

川芎

白朮

黃耆

白芍藥

半夏洗七次炒

阿膠炒

地榆各等分

右咬咀每服三錢姜四片水同煎

保命集 **不牢** 治妊娠惡阻虛煩吐逆百節煩疼羸瘦有痰胎孕不牢

半夏洗七次炒

生姜五兩

茯苓

熟地黄各二兩

橘紅

細辛

人參

芍藥

紫蘇

川芎各一兩

桔梗

甘草各半兩

右咬咀每服五錢姜七片水煎空心兼服茯苓丸

若有客熱煩渴口瘡去橘皮細辛加前胡知母各二兩

若腹冷下痢去地黄加炒桂心二兩

若胃中虛熱大便秘小便赤澀加大黃二兩去地黄加黃芩

一兩然半夏雖能動胎若炒過則無妨也

茯苓丸 治妊娠阻病心中煩悶痰吐量重先服半夏茯苓湯兩劑後服此藥

赤茯苓

人參

桂心

乾姜

半夏洗七次炒

橘紅各一兩

白朮

葛根

甘草

枳殼各二兩

右為細末煉蜜為丸桐子大每服五十九丸米飲下日三
一方加麥門冬 肘後加五味子

續命散 治妊娠胎上逼脹滿疼痛謂之子懸兼治臨產驚恐氣
結連日不下

當歸 甘草各二 大腹子 人參 川芎

陳皮 白芍藥各半兩 紫蘇一兩

右咬咀每服半兩水一盞半姜四片葱白七寸去滓溫服空
心

奪命丸 治婦人小產下血子死增寒手指唇口爪甲青白面色
黃黑或胎上搶心則悶絕欲死冷汗自出或食毒物傷動胎氣
下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下

牡丹皮 白茯苓 桂心 桃仁製 赤芍藥各等分

右為細末以蜜丸如彈子大每服一九細嚼淡醋湯下速進
兩丸至胎腐爛腹中危甚者立可取出

阿膠散 治妊娠或因頓仆胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎
上搶心

熟地黄二兩 白芍藥 艾葉 當歸 甘草

阿膠 黃耆各一兩 一方有川芎

右咬咀每服半兩姜三片棗一个水同煎

當歸芍藥散 治妊娠腹中絞痛心下急痛及產後血暈崩中
久痢

白芍藥半斤 當歸 茯苓 白木各一兩 澤瀉

川芎各四兩

右為細末每服二錢食前溫酒調服以蜜和丸亦可

治妊娠先患冷氣忽中腹痛如刀刺

川芎 人參 茯苓 桔梗 吳茱萸

當歸各三兩 厚朴製 芍藥各二兩

右咬咀以水九升煎取三升分三服氣下即安

通神散 治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故布不以多少瓦上炒香熟為末嚼胡桃肉一个空心

温酒調下三錢

五加皮散 治妊娠腰疼不可忍或連膝痛 先服此散

杜仲四兩 五加皮 阿膠炙 防風 狗脊

川芎 白芍藥 細辛 萆薢各三兩 杏仁八十個去

右咬咀以水九升煮取二升去滓下膠作三服

五加皮丸 治妊娠腰痛不可忍者 次服此丸

續斷 杜仲各二兩半 芍藥 獨活各三兩 五加皮

狗脊 萆薢 芍藥 薯蕷 阿子肉各八兩

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下四十九日三

咳嗽門

桔梗散 治妊娠肺壅咳嗽喘急

天門冬去心一兩 貝母 人參 甘草

桑白皮 桔梗 紫蘇各半兩 赤茯苓兩 麻黃去節七

右咬咀每服四錢姜二片水煎

馬兜鈴散 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母各半兩

陳皮去白 大腹子 桑白皮 紫蘇各一兩 五味子半兩

右咬咀每服四錢姜二片水煎

麻黃湯 治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃去節 陳皮去白 前胡各一兩 半夏洗 人參

白朮 枳殼炒 貝母 甘草各半兩

右咬咀每服四錢葱白五寸姜二片棗一個水同煎

紫苑湯 治妊娠咳嗽不止胎不安

紫苑一兩 桔梗半兩 甘草 杏仁 桑白皮各一兩

天門冬一兩

右咬咀每服三錢竹茹一塊水煎去滓入蜜半匙再煎一沸

溫服

升麻湯 治妊娠壅熱心神煩躁口乾渴逆

升麻 黃芩 人參 麥門冬 梔子仁

柴胡 茯神 瓜蒌根 犀角屑各一兩

知母 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水煎

知母湯 治妊娠煩躁悶亂口乾及胎藏熱

知母 麥門冬 甘草各半兩 黃耆 子苓

赤茯苓各半

右咬咀每服四錢竹茹一塊水煎

黃芩湯 治婦人妊娠胃熱煩躁唇口乾渴四肢壯熱少食

葛根 黃芩 人參 萎蕤 黃耆

甘草 麥門冬各等分

右咬咀每服四錢竹茹彈子大水煎

人參湯 治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參 黃耆 葛根 秦艽 麥門冬各一兩

知母半 甘草半 亦茯苓二

右咬咀每服四錢姜二片淡竹葉十四片水同煎

獨活散 治妊娠中風角弓反張口噤語澁謂之風瘓亦名

子癰

麻黃去節 防風 獨活各一 桂心 羚羊角屑

升麻 甘草 酸棗仁 秦艽各半 川芎

當歸 杏仁製各七分

右咬咀每服四錢姜四片竹櫪一合水同煎

防風膏 治妊娠中風腰背強直時復反張

防風 葛根 川芎 生地黄各二兩

杏仁製 麻黃去節各一兩半 桂心 獨活

甘草 防已各一兩

右咬咀每服四錢水煎

養神湯 治妊娠臨月因發風瘓忽悶憤不識人吐逆眩倒名子

癰 葛根 貝母去心 牡丹皮 防已 防風

當歸 川芎 白茯苓 桂心煮 澤瀉

甘草各二兩 獨活 石膏 人參各三兩

右咬咀以水九升煮取三升分二服貝母令人易產未臨月

升麻代之

傷寒門

白朮散 治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣未安或時吐逆不下食

白朮 橘紅 麥門冬 人參 赤茯苓

前胡 川芎各一兩 甘草 半夏洗炒各半兩

右咬咀每服四錢姜四片竹茹一錢半水煎

治妊娠傷寒頭痛身體壯熱

升麻 蒼朮炒 麥門冬 麻黃去節各 葛根

大青各半兩 石膏貳兩

右為鹿末每服四錢姜四片淡竹葉二七片水同煎

治孕婦傷寒

柴胡 前胡 川芎 當歸 人參

芍藥 粉草 生地黃各等分

右為細末每服二錢姜二片棗二枚水煎要出汗加葱

治妊娠時氣五六日不得汗口乾多喫冷水狂語嘔逆

秦光 柴胡各壹兩 石膏貳兩 前胡 赤茯苓

甘草 葛根 升麻 犀角屑 黃芩各半兩

右咬咀每服四錢姜四片竹茹二錢水煎

敗毒散 升麻葛根湯皆可用之

治男子婦人一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒不問

鬼瘧食瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者亦皆治之

常山 厚朴姜製 青皮 陳皮並不 甘草

檳榔 草菓仁各等分

右咬咀每服半兩於未發隔夜用水一椀酒一盞煎至二六

錢濾出露一宿却將滓再用酒水更依前煎一次去滓別以

椀盛亦露一宿次日當發之早盪溫面東先服頭藥少歇再

服藥滓大有神效

霍亂吐瀉

治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參 厚朴姜製 橘皮紅絲 當歸炒 乾姜炮

甘草 各半兩

右為末每服四錢棗二個水同煎

白朮散 治妊娠霍亂腹痛吐逆不止

白朮炒 益智仁 枳殼製 橘紅各茶分 草豆蔻煨去

良姜炒各半兩

右為末每服四錢姜四片水同煎

無度 治妊娠藏氣本虛脾胃久弱藏府虛滑臍腹疔痛日夜

厚朴姜汁浸炒 肉豆蔻煨不麩 草豆蔻煨不

右咬咀每服三錢姜三片水煎

黃連湯 方在活人內

治妊娠下痢赤白膿血不止

黃連捌分 厚朴製 阿膠炙 當歸各陸分 艾葉

黃蘗各肆分 乾姜伍分

右為細末空心米飲調下方寸匕日三服

厚朴散 治妊娠下痢黃水不絕

厚朴姜汁炙參兩 黃連貳兩 肉豆蔻伍個連皮

右用水二升煮取一升頓服

黃連 治妊娠挾熱下痢亦治丈夫常痢

黃連升 梔子仁貳拾枚

右為末每服五錢水一盞浸二時久煮十沸頓服

若嘔者加橘皮一兩生薑二兩

當歸 治妊娠下痢腹痛小便澀

當歸壹合 當歸炒 黃蘗各壹兩

右細切和勻以水二瓊煮取一瓊二分去滓分四服

又方 治妊娠素弱頻併下痢腹痛羸瘦面色痿黃不美飲食

厚朴壹兩 白朮 川芎 白芍藥 熟地黃各壹兩

當歸炒青 乾姜 人參各半 呵子叁分 甘草壹分

右咬咀每服四錢棗二枚水煎

又方 治妊娠遍身洪腫

葶藶子貳兩半 白朮伍兩 茯苓 桑白皮

郁里仁各貳兩

右為鹿末水六升煮取二升分二服小便利即差

又方 澤瀉 葶藶各叁 茯苓 枳殼 白朮各陸兩

右細切以水六升煮取二升分二服

又方 治妊娠氣雍身體腹脇浮腫喘急大便不通小便赤澀

澤瀉 桑白皮 木通 枳殼 赤茯苓

檳榔各壹分

右咬咀每服四錢姜四片水同煎食前

又方 治妊娠脾虛遍身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防己柒分 桑白皮 赤茯苓 紫蘇莖葉各壹兩

木香貳分

右為鹿末每服四錢姜四片水同煎食前

治妊娠三五月胎死在腹內不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮各叁 當歸壹兩 滑石末柒分

瞿麥 葵子 茯苓 粉草 子苓各半

古者 服四錢水煎

部知縣傳瘕死胎不出

朴硝研細半兩以童子小便溫調下

治婦人敗血奔心胎死腹中胎衣不下等證極妙

治產後血暈

澤蘭葉 人參各取半 荆芥壹兩 川芎半兩 甘草貳分

右為末用溫酒熱湯各半盞調一錢急噙之

治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急欲絕

芍藥 甘草 丹參並咬咀各壹兩 生地黄汁壹升

生姜汁 白蜜壹合

右水二升先煮前三味取八合下地黄生姜汁蜜分為一分

治產後血暈昏迷不省衝心悶絕

五靈脂半生半炒貳兩

保命集下

右為細末溫酒調下二錢口噤者拗開口灌之入喉即愈

一方加荆芥等分為末童便調下

治產後血暈危困

生地黄汁壹大盞 當歸貳錢半剉 赤芍藥貳分半剉

右水煎三五沸溫服如覺煩熱去當歸入童子小便半盞

治產後血暈入心經語言顛倒健忘失志

沒藥 血竭等分

右細研為末產後使用童子小便與細酒各半盞煎一二沸

調下二錢良久再服其血自下

蘇合香丸童子小便調下亦妙

治產後敗血衝心發熱狂走脈虛大者

乾荷葉 生地黄剉 牡丹皮等分

右三味濃煎湯調蒲黃一錢匕一服即定 四物湯加柴胡

又方 治產後中風不省人事口吐涎手足癱瘓

當歸 荆芥穗各等分

右為細末每服三錢水一盞酒少許煎至七分灌之如牙關緊急用匙斡開灌下屢用救人有效

經方 治產後中風腰背強直時時反張名曰風痙

防風 乾葛 川芎 地黃各貳兩 麻黃去節

甘草 桂心 獨活 羌活 秦朮

防己各肆兩 杏仁伍拾个去皮尖炒

右咬咀每服一兩水煎有汗者不可服

小續命湯連進數服愈

保命集下 壯子

又方 治產後中風半身手足不遂言語蹇澁恍惚多忘精神不

定 獨活 當歸 芍藥 防風 川芎

玄參 天麻各五分 桂心參分

右咬咀以水八升煮取二升半分為二服竟効更作一劑又作九每服二十九 若有熱加葛根五兩有冷加白朮五兩

若有氣證加生姜一兩半

若手足不穩加牛膝一兩一錢草薢二兩黃耆四兩

若腹痛加當歸芍藥各七錢半

若不食加人參五錢玄參一兩

若寒中二陽所患必冷小續命湯加生姜汁煎

若暑中二陰所患必熱小續命湯去附子減桂心一半加薄荷

可煎

產後門

赤白帶下 治產後氣弱血滯身熱頭痛遍身疼痛

牛膝

當歸

桂心

白朮

黃耆

獨活

生薑

各半兩

甘草

薤白

各貳分半

右咬咀每服半兩水二盞煎至一盞半去滓食前

五積散加醋煎治感寒頭痛身疼方在雜知內附

加桃仁煎治腰痛逐敗血去風濕

生肌散

治產後腰疼腹中餘血未及並手足疼不下食

生地黄汁一升

芍藥

甘草

各二兩

丹麥

蜜一合

生薑汁半合

右切以水三升煮取一升去滓內地黃汁蜜姜汁微火煎一

二沸一服三合日一夜三利一兩行

治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四肢乏弱頭目昏重

煩熱

牡礪

川芎

熟地黄

白茯苓

龍骨各一兩

續斷

當歸炒

艾葉酒炒

五味子

人參各半兩

甘草二分地榆半兩

右為末每服三錢生薑三片棗一枚水同煎食前

治產後三四日惡露不下嘔逆壯熱

芍藥

知母

生薑

當歸

蒲黃各二兩

紅花

荷葉中心蒂

生地黄汁一盞

右咬咀以水一升煎至一升去滓下蒲黃煎四沸分六分作

三服

治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊

以錦紋大黃一兩為細末用醃醋半升同煎成膏丸如桐子
大患者用醋七八錢化五丸至七丸服之須臾血下即愈
若墜馬內損惡血不散服之神效

天麻散治心腹痛欲死百藥不効服此頓愈

五靈脂 蒲黃 各等分

右為末先用醃醋調一錢熬膏入水一盞煎至七分食前熱
服是驗

治產後惡物不盡腹內疝痛

生乾地黃 當歸 並畧炒各壹兩 生薑 半兩細切如蠟頭
大新瓦炒令焦黑

右為細末姜酒調一錢服

治產後血上衝心刺血暈腹痛惡露不快

初出卷荷 紅花 當歸 各壹兩 蒲黃 畧炒 牡丹皮 各半

右為細末每服三錢空心溫酒調下一臘內用童小便調下

治產後血結下不盡腹中絞痛不止

大黃 另爇 生乾地黃 當歸 各壹兩 川芎 芍藥

桂心 各壹兩 甘草 黃芩 各壹兩 桃仁 西十九枚製

右切細以水七升煮取一升半下大黃更煎一二沸分二服

治先患冷氣因產後發腹痛

芍藥 桂心 當歸 芍藥 吳茱萸

芍藥 甘草 各壹兩 桃仁 二貳兩半

右以水七升煮取一升去滓分二服

治產後腹痛

桃仁 半升 芍藥 當歸 川芎 乾漆 各壹兩

桂心 甘草 各壹兩

右細切以水八升煮取二升半去滓分二服

又方 治腹中絞痛不可忍

延胡索 當歸 白芍藥 川芎 乾姜 各等分

右為末每服二錢溫酒調下

又方 治諸同前

延胡索 桂心 各半 當歸 膏兩

右為細末熱酒調下

紫金丹 治產後惡露不快腰痛小腹如刺寒熱頭痛久有瘀血

月水不調亦可治心痛與失笑散同

五靈脂 炒為末 真蒲黃 等分

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃末搜和

丸如櫻桃大每服一二丸水與童子小便各半盞煎至七分

孫命集下

卅九

至藥化溫服之少頃再一服惡露即下

若久有瘀血成塊月信不利者並用酒磨下

產後六七日忽然膈腹痛皆由呼吸冷氣乘虛入客於血宜服

當歸建中湯 方在元戎內附

以當歸建中湯和四順理中丸共研蜜丸飯飲吞下極妙

羊肉湯 治產後內虛寒氣入腹腹中絞痛

肥羊肉 膏斤 當歸 甘草 芍藥 各壹兩

右以水一斗先煮羊肉取七升入藥更煮作一升去滓

分服

產後心腹切痛不能飲食之氣往來寒熱

當歸 川芎 黃芩 人參 甘草

芍藥 防風 生薑 各半 大黃 各半

桃仁 搗拾分

右以咀以水七升煮取一升下大黃更煎二升分作二服

心腹 治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四肢
羸瘦煩疼

青皮

乾漆炒烟尽各
升分半

沒藥

檳榔

當歸

桂心

赤芍藥

牡丹皮

各半兩

大黃炒

桃仁去皮尖

蟬甲酥炙

厚朴製

三稜煨

延胡索各壹兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服三四十九溫酒下

心腹 治血瘕痛無定處

童小便去升

生地黃汁

生藕汁

各壹升

生姜汁貳升

右先煎前三味約一分減二次下生姜汁慢火煎如稀餲每

取一合溫酒調下

心腹 治血瘕痛臍下脹不下食

當歸貳兩

桂心

芍藥

血竭

蒲黃各壹兩半

延胡索壹兩

右為細末每服一錢匕溫酒調下

心腹 治產後虛渴少氣力

以葉去升

甘草

人參

茯苓各壹兩

小麥五合

半夏

半夏各壹兩

麥門冬兩

大棗拾五枚

右以咀以水九升先煮茯苓桑小麥半夏更取七升去滓內藥

再煎取一升去滓一服五合日二夜一

心腹 治產後血暈不止

延胡索

蔚金

乾薑

桂心

青皮

枳殼製等分

右並以好醋浸一宿焙乾為細末每服一錢冷橘皮湯調下
三服差

當歸飲子 治婦人產後瘧疾寒熱相半或多熱者

半夏洗 赤茯苓 甘草炙 草薢炮去 川芎

陳皮 白芷各一分 青皮去白 良姜 紫蘇各壹分

乾薑四分

右咬咀每服秤二錢姜二片棗二枚水同煎去滓當發日侵
早連進三服無有不安

中氣飲子 治產後瘧疾多寒者

肉苳蔻 草薢仁 厚朴生 半夏 陳皮

甘草 大棗去核 生薑各等分

保命集

四十一

右細剉和勻一半生用一半以濕皮帚裹煨令香熟去帚同
和勻每服秤五錢水一盞煎至七分食前一服食後一服

增補柴胡湯 治產後虛羸發寒熱飲食少腹脹

柴胡 人參 甘草 半夏 陳皮

川芎 白芍藥各等分

右咬咀每服三錢姜五片棗一枚水同煎食後日二

助產膏 治產後羸勞皆由躰虛氣力未復勞動所致四肢煩

按時發寒熱

熟地黄 人參 白芍藥 白茯苓 白朮

續斷各壹分 黃耆 桂心 五味子 當歸

麥門冬 川芎各柒分半

右咬咀每服四錢姜二片棗一枚水同煎

續斷 治產後虛勞寒熱進退頭目眩痛百骨節痠疲氣力羸之 鱉甲 當歸 桂心 白芍藥

續斷 川芎 牛膝 茯苓 沉香 栝子仁 枳殼 五味子 熟地黄 各半兩

右為細末煉蜜為丸桐子大每服四五丸粥飲下食後療產後嘔吐不止

橘紅 薑兩 半夏 麴 甘草 藿香 各兩

右為細末每服三錢姜三片水煎

蘇香 治產後血入於肺面黑發喘者此者 人參 壹兩另為 蘇香 貳兩

右以水兩椀煮取一椀以下去滓調參不隨時加減服神效不可言

黃連丸 治產後赤白痢腹中絞痛不可忍

黃連 四兩 阿膠 蒲黃 梔子仁 各壹兩 當歸 半兩 黃芩 貳兩 黃蘗 參兩

右為細末煉蜜為丸桐子大每服六十九丸米飲下日三夜一救急心治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥 阿膠 艾葉 熟地黄 各四兩 甘藥 當歸 各參兩

右以咀水二升煮取八合分一服空心

桑螵蛸 拾个炒 鹿茸 蘇炙 黃耆 各參兩 牡蠣 煨 人參 厚朴 赤石脂 各貳兩

右為細末空心米飲調下二錢

桑螵蛸半兩炒 龍骨壹兩

右為細末米飲調下一錢空心

痔瘡後大小便不利下血

車前子 黃芩 蒲黃 牡礪 生地黄

芍藥各壹兩半

上為細末空心米飲服方寸匕忌麵蒜

五効方 下乳汁

粳米各半 糯米各半 葛苳子壹合並淘淨 生甘草半兩

右煎汁一升研藥令細去滓分作二服立下

方 豬蹄壹隻 通草四兩

右以水一斗煮作羹食之

治吹妳

婦人吹妳意如何

皂角燒灰蛤粉和

熱酒一杯調八字 須用揉散笑呵呵

乳香一分 括裏根末壹兩

右研令勻溫酒調一錢服 天南星末用溫湯調塗之

連翹 升麻 芒硝壹兩 玄參 芍藥

白欬 防己 射干各捌分 大黃貳分 甘草陸分

杏仁四十八 去皮尖

右以水五升煮二升下大黃次下硝分二服

治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍者細効

因小兒吹妳變成斯疾者並皆以此

陳皮湯浸去白臘乾麩炒 椒黃為細末麝香研調 錢

初發竟赤腫疼痛二服見効

瓜萎散

治乳疔疔勞神効

瓜萎實个去皮爛為末子多者有力生甘草當歸酒浸焙各半兩

乳香青少通明沒藥各半兩味另研

右為末用無灰酒三升於瓶或石器內慢火熬取一升清汁分作三服食後良久服如有少勞便服此藥可杜絕病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即於大小便中通利如疾甚再合服以退為妙

小兒十二證方十一道

亦可方在寶鑑內

小兒十二證方十一道

夫小兒傷寒與大人不同何也小兒竒經未盛精神未全八脉皆虛七神尚弱語言不正喜怒心不節性情未定非食穀味專

作合在六一

六一

於精神也是食乳專於精神也直牙未生變蒸尚在豈不異於大人哉設令小兒十歲已上卒暴身壯熱惡寒四肢冷或耳聾冷鼻中氣熱或為疔疹也與傷寒表證相似胎氣始發自內之外與傷寒表證同治者誤也當作小疔瘡治之小兒傷寒身熱頭痛面赤者在表也氣壅腹滿小便赤澀者在裏也小兒形候雖有汗下之病未及五歲可以視聽未可脉別故不行於胗五歲已上穀氣漸實可以脉別浮沉遲數表裏寒熱察色聽聲而得其全故知小異大同也

小兒傷寒頭痛身壯熱無汗鼻氣壅塞自瀉小便清者知不在裏可汗而發之具藥黃芩各半

麻黃各兩赤芍藥各半黃芩各半甘草炙桂枝各兩各半

右為鹿朮水煎

小兒中風身熱頭項背強自汗大不和也宜升

升麻 葛根 黃芩 芍藥 各半 甘草 壹分半

右判細每服一錢水煎

小兒表傷則皮膚閉而為熱盛即生風欲為發黃血氣未實不

能勝邪故發黃也大小便依度口中氣熱當發之宜

天麻末 伍分 白附子末 貳分半 蝎梢 去毒生半分

朱砂 研壹字 麝香 壹字 烏蛇稍肉 酒浸焙乾取末半分

青黛 研壹分 天竺黃 研壹字

右同再研細生蜜和成膏每服半皂子大月中兒粳米大同

半黃膏溫薄荷湯化一匙服之五歲已上同甘露散服之

小兒傷寒熱煩小便赤澀大便褐也面赤氣熱者

生地黄 木通 甘草 各等分

右為細末每服二錢竹葉五七片同煎

小兒熱結於內腹脹壯熱大便赤黃燥煩悶亂者

當歸 龍膽 川芎 山梔子 大黃

羌活 防風 各等分

右為細末煉蜜丸鷄頭大每服半錢至一丸煎竹葉同沙糖

水化下

小兒結熱於內口乾而渴身黃躄重者

人參 白朮 白茯苓 甘草 炒 藿香葉 各壹兩

葛根 貳兩

右為麤末每服一錢至二錢水煎

小兒結熱上氣喘者

大黃 蒸 甘草 當歸 芍藥 洗各等分

右為細末每服一錢內荷一葉同煎

小兒客熱在內不思乳食者赤散以服

陳皮壹兩 青皮 枳實壹兩 甘草各半 丁香貳分

右為細末每服一錢水煎

小兒疳瘡始竟有表證

升麻 葛根 甘草 芍藥各等分

右為麤末每服一錢水煎

小兒疳出不快者或不出者

紫草歲者 升麻 甘草炙各半兩

右劉細每服三錢粳米五十粒同煎

小兒疳出欲透皮膚身熱咽喉不利

甘草 桔梗壹兩 升麻半兩

右劉細每服一錢水煎

小兒疳瘡黑陷者

人牙貳枚燒存性入麝香少許

右為細末用紫草升麻湯調下

小兒疳瘡黑陷方

乾胭脂三分 胡桃壹个燒存性

右為細末煎胡荽酒調藥一錢服之立効

小兒疳瘡黑陷方

腦片充臬腦子或一个或二个以好酒調服若乾者以好酒

浸少時化開依上調服立効

小兒疳後眼有翳膜竹葉湯同沙糖化下瀉青丸一兩九漸至

微利神効

咳嗽喘逆身熱... 入肺... 呼有

黃耆兩 人參參分 桑白皮五分 地骨皮五分 甘草貳分半

右以咀煎至七分放冷時服之
治小兒寒邪濕 時疫瘡疹頭疼身痛壯熱多睡
下注潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活 獨活 柴胡 人參 芍藥

枳殼麩炒 甘草炙各 前胡貳兩 桔梗 天麻酒浸

地骨皮各半兩 白茯苓去皮貳兩

右為散每服一錢水一盞入薄荷少許同煎去滓溫服不拘
時候

治急慢驚風壯熱發搐

羌活 獨活 烏蛇肉酒浸一宿焙 天麻

全蝎 人參 白僵蚕各半兩

右為末煉蜜為丸如皂子大每兩作五十九每服一九煎煎
芥湯化下

保命丹論類



昔睦親官十大尉病痘疹與醫治之王曰疹未出屬何藏府一

醫言胃氣熱一醫言傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢氏

曰若言胃氣熱何也 小熱若言母腹中有毒屬何藏也

醫曰在脾胃錢氏曰良在脾胃何以驚悸錢曰夫胎在腹中

月至六七則已成形食母穢液入兒五藏食至十月滿胃

中至生之時口有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連

汁墜之方下臍糞及涎穢也此亦母之不潔餘氣入兒

本先因微寒入而成疹疹未出五藏皆兒病證內一藏受穢

多者乃出痘疹初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍涼乍熱

冷面腮赤燥欬噴嚏此五藏證俱也呵欠頓悶肝也時發

驚悸心也乍涼乍熱手足冷脾也面赤腮頰赤噴嚏肺也惟

腎無候以在府下不能食穢故也凡痘疹乃五藏毒若出歸

一證肝水疱肺膿疱心斑脾疹惟腎不食穢毒而無諸證

黑者屬腎由不慎風冷而不飽內虛也又用抱龍丸數服愈

以其別無他候故未發出則見五藏證已出則歸一藏矣

海藏云本先因微寒入一句并由不慎風冷而不飽內虛一

句勿認作寒證當識用抱龍丸即知斑疹多熱也

治小兒壯熱昏睡傷風風熱痘疹傷食皆相似未能辨認間服

升麻葛根湯惺惺散小柴胡湯甚驗蓋此數藥通治之不致

悞也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐宜以藥下之

海藏云傷食宜以藥下之者當詳其所傷何物生硬寒熱不

等不可遽用巴豆之類大毒之藥下之升麻葛根湯太陽陽

明也惺惺散風熱咽不利脾不和少陽渴小便不利也小柴胡湯往來寒熱脅微痛少陽也然欲知其經當以脉別之小兒耳冷翕冷手足乍煖乍涼面赤時嗽時嚏驚悸此瘡疹欲發也未能辨認間服升麻湯消毒散已發未發皆宜服仍用胡荽酒黃柏膏暑月煩燥食後與白虎湯玉露散熱盛與紫雪咽喉或生瘡與甘桔湯甘露散餘依錢說大人小兒同治法惟劑小大不同耳

海藏云消毒散太陽藥白虎湯治身熱目疼鼻乾不得卧陽明藥也正為泄時暑之劑甘露飲子之腎藥也甘桔湯少陰藥也紫雪天門冬麥門冬黃芩地黃為血劑玉露散肺腎藥石膏寒水石為氣劑

升麻膏根湯

方在保命小兒門內

海藏云太陽陽明之劑

消毒散

治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和

桔梗 細辛去葉 人參 甘草炒 白茯苓去皮
白朮 括婁根各一兩

右同為細末每服二錢水一盞入薄荷五葉煎至七分溫服如要和氣入生姜五片同煎用防風一分用川芎一分此法海藏云此加減四味亦各隨經證也

消毒散

治瘡疹未出或已出未能勻遍又治一切瘡涼膈去痰

治咽喉痛

牛蒡子一二兩炒 甘草半兩剉炒 荆芥穗二分半

右同為鹿末每服二錢水一盞半去粗溫服

海藏云此前所註皆溫平之劑一法加防風薄荷

治瘡疹已出用此藥塗面次用胡荽酒外治法

黃蘗 壹兩 新棗豆 壹兩半 甘草 肆兩

右同為細末生油調從耳前至眼匡並厚塗之日三兩次如早用瘡不至面縱有亦少

胡荽酒

胡荽細切四兩以好酒二盞煎一二沸入胡荽再煎少時用物合定放冷右每吸一兩口微噴從頂至足勻遍勿噴頭面病人左右常令有胡荽即能辟去汗氣瘡疹出快

四聖散

治瘡疹出不快及倒靨

紫草 首 木通 剉 甘草 剉炒 枳殼 麩炒去穢

右同為鹿末每服一錢水一中盞煎至八分溫服無時

甘露飲子

治心胃熱咽痛口舌生瘡并瘡疹已發未發並可服之及治熱氣上攻牙齦腫齒動搖

生地黃 熟地黃 天門冬 法 麥門冬 法 枇杷葉 去毛

枳殼 麩炒 黃芩 去心 石斛 去苗 甘草 剉炒 山茵陳葉

右各等分為鹿末每服二錢水一盞食後溫服牙齒則含嗽并服

海藏云甘露飲為血劑

瀉青丸

方在保命小兒條下

海藏云東垣先生治癰後風熱毒翳膜氣暈遮睛以此劑瀉之大効初覺易治

補肝丸

四物湯內加防風羌活等分為細末煉蜜為凡是也

鎮肝丸

瀉青丸去梔子大黃 治肝虛

地黃丸

治腎虛解顛即眩病也治脈毛而虛

熟地黄 割方 山茱萸 乾山藥 澤瀉

牡丹皮 白茯苓 各肆分

右為末煉蜜丸如桐子大三歲已下一二丸或三五丸空心溫水下

增腎丸 治脉洪而實前地黄丸熟地黄改生地黄去山茱萸是也此治左手本部脉若右尺洪實以鳳髓丹瀉之此地黄丸仲景八味丸去桂附若加五味子腎氣丸也此益肺之原以生腎水焉

瀉白散 瀉肺脾熱目黃口不吮乳喘嗽
桑白皮 一兩剉炒黃 地骨皮 一兩 甘草 半兩炒
右為細末每服一二錢水一盞入粳米百粒同煎食後服易老加黃連

海藏云治肺熱傳骨蒸自汗用此以直瀉之梔子黃芩亦能瀉肺當以氣血分之

阿膠散 補肺
阿膠 一兩半 馬兜苓 半兩 甘草 二分半 黍粘子 一分半
杏仁 七個去尖 糯米

右為末每服一二錢水一盞食後海藏云杏仁瀉肺非若人參天門冬麥門冬之補也當以意消息

導赤散 泄丙 方在保命小兒條下

瀉心湯 瀉丁 黃連 一兩去須

右為極細末每服一字去半錢一錢臨卧溫水調下

海藏云易老單瀉心湯加減法出於此乃實邪也實則泄其子

補脾

青皮

阿子肉

計華各兩

陳皮 壹兩

丁香 貳分

右為細末每服一錢水一盞煎服

海藏云此劑瀉脾以燥濕

瀉脾熱

黃口不能吮乳

山梔子仁 貳分

石膏 半兩

甘草 叁兩

防風 肆兩

右劉同蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一盞煎清

汁服 海藏云此劑瀉肺熱

白朮

藿香葉

白朮

木香

白茯苓

甘草炒

人參 各一兩

乾葛 貳兩劉

右為末每服一錢至二錢水煎如飲水者多煎與之

海藏云四君子湯加減法治濕勝氣脫泄利太過

生犀湯

生犀 貳分

地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛 壹兩

甘草 半兩炙

右為末每服一錢水煎

海藏云此少陽陽明相合也

白朮

檳榔

橘皮

甘草 各半

牽牛 肆兩

右為細末一二錢蜜湯調下生錢已上一錢食前防風

海藏云與通脈丸相上下氣血也

通脈丸

大黃

牽牛

木通 各半

右為細末滴水丸藥粒大每服三五丸薑湯加減

其氣 功散温中利氣治吐泄思食凡小兒虛冷病先與數服以

人參 茯苓 白朮 甘草 陳皮 各等分

右為細末每服一錢水一盞生姜七片棗二枚同煎
海藏云四君子補脾湯加減法

芍藥 黃連 牛黃 麝香 青黛 研各龍腦壹分

右為細末麝香六每服一二十丸金銀湯下
治盜汗

牡蠣 煨 黃耆 生地黄 各等分
右為末水煎

連翹 防風 梔子 甘草
治一切熱兼治瘡疹有神

海藏云治熱在外而不厥此少陽藥也
化毒湯 治小兒瘡豆已出未出並可服之

紫草 升麻 甘草 各等分

右改咀水二盞粳米五十粒同煎此乃陽明之藥也
治小兒瘡疹

紫草 木通 人參 茯苓 粳米 各等分
甘草

右為末每服四錢水煎此小便不利之劑也
治小兒瘡豆欲出未能得透皮膚熱氣攻咽喉眼赤

心煩

鼠粘子四兩 荆芥穗一兩 甘草一兩 防風半兩

右為細末沸湯點服即大利咽喉化痰涎止咳老幼皆宜
海藏云太陽少陽藥也首論溫平者此也

治疔瘡 治瘡子或出不快

白芍藥一分 酒調如欲止痛只用溫熱水調下

海藏云張和之治四支出不快加防風大効此正的大陰藥也

如聖散子 治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗一兩 甘草生一兩 牛蒡子炒一兩 麥門冬去心半兩

右為末竹葉同煎細細服

犀角地黄湯

方在按粹內脈訣中

論曰瘡疹之病其為證多異瘡發焮腫於外者屬少陽三焦相

瘡論

火也謂之斑小紅屬行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂

之疹凡顯斑證若自吐瀉者慎勿亂治而多吉謂邪氣上下

皆出也大凡瘡疹首尾皆不可下恐妄動而變此謂少陽通

表宜和之也當先安裏解毒次微發之安和解毒須安五臟

防風湯是也如大便不澀者須微發之藥錢氏方中甚多宜

選用之如大過秘宜微利一當歸丸棗變百祥丸是也初知

斑疹若使之斑疹併出小兒難禁是以別生他證也首忌不

可下者首曰上焦尾曰下焦若能吐利猶不可下也便宜安

裏若不吐瀉者先安裏藥二三服如能食而大便秘結內實

者宜疎利之若內虛而利者宜用裏藥末後一服調微發之

藥服之六抵安裏之藥多發表之藥少秘則微發之令邪氣

不壅併而能作番次使兒易禁也身溫煖者慎身寒者逆

者宜多服防風湯和之安裏若大便實秘能飲食而內實宜當歸丸微利之

防風湯

防風 一兩 地骨皮 黃耆 芍藥

荆芥 枳殼 黍粘子 各半兩

右為鹿末每服四五錢水煎

當歸丸

當歸 半兩 甘草 一分 黃連 大黃 各二錢

右先將當歸燉膏子入藥末二味為丸漸加服之以利為度

養血百祥丸

治斑疹大便秘結

紅牙大戟 去骨 兩 青州棗 去核二十個

右用水一椀同煎至水盡為度去大戟不用將棗焙乾可和作劑旋丸從小至多以利為度

海藏老人斑論

夫斑之為病皆由于在母腹中時浸漬食母血穢蘊而成毒皆太陰濕土壅滯君相二火之所作也因小兒真氣既盛正氣又王邪無所容或因天冷或因傷表或因傷裏斑由是而生焉治當何如外者外治內者內治中外皆和其斑自出至於惡寒者發之表大熱者奪之渴者清之大便秘結者下之小便不通者利之驚者安之泄者分之可以執一為哉大抵傷寒同治最為高論隨經用藥不可闕也假令五日已裏諸病與斑疹不能別辨者不可疑作斑疹必須發之但各從其所傷應見治之皆不妨礙出若強發之其變不可勝數矣前人言首尾俱不可下者何也曰首不可下者為斑未顯於衣下則邪氣不得伸越此脉證有表而無裏故禁首不可下也尾不可下者為斑毒已顯於外內無根帶大以不實無一切裏

證下之則癱氣逆陷故禁毛不可下也有如所言溫煖蓋燥
不令通風以其癱未出或身表涼而惡寒或天令寒而惡火
溫煖蓋覆不令通風也癱其已出身熱天暄何必用蓋覆
不使之通風乎後人執此一句首尾俱不敢下溫煖不令通
風不知天令之所加人身之所感致使悞人多矣夫抵病人
之言隨時應變以其所可者而言之後人不知其變故執定
而不移也噫首尾俱不可下者以其始終藏府元氣無虧滯也
若有一切裏證及大便結者安得不下溫煖不使之通風以
其發在冬時故如此也若發在夏時癱雖未出亦不用於此
也癱之用藥大率以脉為主浮中沉之診平舉按之脈察其
虛實定其中外則可以乃全矣

未顯癱證所用之藥

外傷升麻湯主之

內傷枳實丸主之

大便實者枳朮丸主之

若傷冷者溫之桂枝湯主之

惡寒者發之宜防風蒼朮湯

表大熱者奪之此表者通言三陽也夫陽盛則氣必上行言
奪者治法不令上行也

渴者清之大渴者白虎湯小渴者涼膈散

大便秘結者下之桃仁承氣湯四順飲子柴胡飲子選用然
其在氣在血

小便不通者利之導赤散八正散之類當求上下一便何經
而用之驚者安之涼驚丸重者瀉青丸

吐者分之寒則異功散四君子湯熱則澤瀉茯苓湯

已顯癱證所用之藥

出不快

化毒湯

出太多

犀角地黄湯

地骨皮鼠粘子湯

咽不利

桔梗甘草鼠粘子湯

煩者

桔梗甘草梔子湯

肺不利

紫草茸甘草枳殼湯

太陽出不快

荊芥甘草防風湯

陽明出不快

升麻加紫草湯

少陽出不快

連翹防風湯

四肢出不快

防風芍藥甘草湯

瘡疹輕重候

凡出未而發播者是外感風寒之邪內發心熱之所作也當用

茶粉下鮮毒犀角地黄湯主之

症論卷

一

十一

一發便密如針頭形勢重者合經其表而涼其內連翹升麻湯

若斑已發密重微喘飲水者有熱證用去風藥微下之

若出不快清便自調知其不在表不在裏當微發散升麻湯

若青乾黑陷身不大熱大小便澀則是熱在內煎大黃湯下

宣風散

若身表大熱者表證未罷不可下

若癩疹已出見小熱小便不利當利小便八正散

若已發後有餘毒未散復有身熱瘡腫之類當用茶粉下鮮

毒丸瘡疹已出後有聲實有身熱病也瘡疹未出

先聲音不出者乃形不病而氣病也若瘡疹出而聲音不

出者是形氣俱病也當清其肺氣宜用八風湯并涼藥散

去硝大黃亦可

海藏雜論萃

氏保嬰奪

月裏生驚

忘取豬乳細研辰砂牛黃各少許調抹口中神效乳母服防風通聖散三劑其驚自銷

月裏生赤

肌膚赤如丹塗者先用牛黃散托裏續後用藍葉散塗外乳母服清涼散子三大劑

月裏生嘔

先用朱砂丸下之如利後用朱沈煎隊其邪氣惡物自下而不嘔也

月裏生黃

因母受濕熱傳於胎也乳母宜服生地黃湯

生下不大便

治法先用硬葱針任肛門如火便不下後用牛黃散送朱砂丸一時自見

春日病溫

凡遇溫病未滿三日先用惺惺散二服後四五日不解煩渴乾嘔用白朮散如自汗口燥用製白虎湯至六七日大便燥結用四順飲子下心腹大實大滿牛黃通萬丸下初覺之時疑是瘡疹只宜用葛根升麻湯解肌

夏日吐瀉

凡小兒盛暑吐瀉邪熱在下則瀉在上則吐亡津必渴用玉露散雖吐時時與啜之過三日不愈身熱熱大小便黃用五苓散益元各半熱湯調溫飲之身涼脈細小便清早晨益黃散

後玉露散過四五日如困弱宜服異功湯和中丸開胃丸

秋日泄痢

治泄痢活法機要二十五論內甚多宜選而用之

冬日咳嗽

治咳嗽方前發明內甚多宜選而用之

五藏病

治法曰肝熱則手搯衣頰瀉青丸主之

肺熱則手搯眉毛甘桔湯主之

心熱則上竄咬牙導赤散主之

脾熱則目黃肚大瀉黃散主之

腎虛則下竄畏明地黄丸主之

急慢驚風

作眼不昏

潔古曰急驚者陽證也客熱於心因聞大驚宜用涼驚丸導赤

散瀉青丸瀉肝丸地黄丸搐止宜服安神丸

慢驚者陰證也因吐瀉病久脾胃虛損似搐而不似搐亦名

瘦癡脉有力先用宣風散導之後用益黃散平之天麻防風

丸亦可

大凡小兒過煖生熱熱極生風提抱生癱餵飼生癖也

嘔吐

凡有嘔吐不止者皆宜朱沉煎定心紫金核用無不効也

重舌

治法竹瀝清黃柏末點舌上如不愈後用真蘇薄荷之不過三

次愈

木舌

治法用局方中紫雪一分竹瀝半合和之時時抹入口中自消
鵝口

小兒初生白屑滿舌治法用髮纏指頭蘸井花水揩拭之後用
黃丹鍛出火氣摻於上自愈

口瘡

治法乳母同兒宜服洗心散瀉心湯然後用黃蘗末青黛研細
摻之

撮口

治法宜用白殭蚕末蜜調塗兒口又用牛黃一錢竹瀝一合時
時抹入口中即瘥

解顛

治法宜用生乾地黄散

作嬰集

夜啼

治法宜五味子散亦宜用燈花七枚研細乳汁送下立已

癩耳

治法宜紅玉散摻之

鼻疳

治法先用甘草白礬水洗淨後摻盧會黃連黃蘗末日三上

脫肛

治法宜用蒲黃一兩猪脂二兩煉猪脂和蒲黃成膏塗腸頭上
即縮入

便青

因驚氣內感脾氣不和泌法宜服白朮湯

頰赤

由心藏邪熱上攻也宜服道手赤散

弄舌

脾藏微熱舌紋緊也治法勿用冷藥下之當少與瀉黃散若肥實者用牛黃散治之

赤流

治法宜服犀角散一法先鍊去惡血服上藥一法用牛膝一兩去苗甘草半兩生剉碎水煎一大盞去滓調伏龍肝塗之

虫痛

其候哭啼惋仰坐卧不安自按心腹時時大叫面無正色或青或黃唇慢而白目無精光口吐涎沫此為虫痛宜服安虫散

客忤

因而驚忤者治法用竈中黃土此藥內研雞子青殼去殼二件相和入少

許水調先以桃柳湯浴兒後將此藥塗五心及頂門上

眉煉

治法用青金散傳之如不愈燒小麥存性研細好油調塗

瘡癬

治法浸淫瘡宜用苦瓠散塗之乾癬宜用羊蹄根絞自然汁調膩粉塗之濕癬宜用青金散貼之

暴喘

俗傳為馬脾風也大小便硬宜急下之用牛黃散奪命散後用

白虎湯平之

偏墜

宜服防葵丸令兒坐於土中午時灸印下偏墜之處七壯

便難

使難得結兒或油藥不張悶亂命在頃刻可用握管丸以男左女右手握之不移時大小便自利也

辨小兒病證

目赤兼青者發搐也

目直而青身反折者生驚也

咬牙甚者發驚也

口吐涎沫而叫者虫痛也

昏睡善嚏悸者將發瘧疹也

吐瀉昏暈露睛者胃虛熱也

吐稠涎咯血者肺熱也

吐瀉昏睡不露睛者胃實熱也

瀉青白穀不化者胃冷也

吐瀉乳不化者傷食也宜下之

身熱飲水者熱在內也

瀉黃紅赤黑者脾胃熱毒也

呵欠面赤者風熱也

身熱不飲水者熱在外也

呵欠面青者驚風也

呵欠面黃者脾虛驚也

呵欠而多睡者內熱也

呵欠氣熱者傷風也

錢氏得効大青膏方在前保命集小兒條下

保嬰方在前癩論萃英內

升麻湯方在前保命集小兒條下

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

知母

炙甘草

半夏

銀州柴胡

人參

地骨皮

赤茯苓

右為細末每服二錢生姜五片水煎食後溫服量大小加減

生犀散治證同前

生犀

地骨皮

赤芍藥

柴胡

葛根

炙甘草

右為鹿末每服一二錢水煎食後溫服

方在前草英內

安神丸 治心虛煩熱面黃頰赤壯熱驚睡神志恍惚不寧

麥門冬去心 馬牙硝 白茯苓 乾山藥

寒水石研 甘草各半兩 朱砂青兩研 龍腦壹字研

右為細末煉蜜丸如雞頭大每服半丸沙糖水化下無時

保命散 方在前保命小兒條下

衛生寶鑑小兒條下

大盧會心 治疳積與和胃止瀉

胡黃連 黃連 盧會研 木香 白蕪荑去屑

雷丸 青皮去白 鶴虱微炒已上各半兩 麝香貳分另研

右為細末粟米飯和丸如棗豆大米下一二十九無時

宣風散 方在前草英內

方在前草英內

治極保小兒大便不通小便澀滯并驚熱痰壅欲得澆

動者

郁李仁壹兩 川大黃壹兩酒浸炒 滑石半兩

右另為末將郁李仁研為膏和末為丸如黍米大量兒大小

與之以乳汁或薄荷湯下食前

方在保命小兒條下

方在草英內

方在草英內

治瘡疹太盛服令瘡不入眼

生犀貳分 龍膽半兩 黃耆半兩 大棗貳分 桑白皮半兩

麻黃去節 鈎藤去心 續石膏半兩 甘草炒各貳分

右為鹿末每服二錢水煎食後溫服微利効

生肌散治小兒生下胎毒

生地黄 赤芍藥 川芎 當歸 瓜蒌根 各等分

右攻阻每服五錢水煎乳母服時時少抹入兒口中

六神丸治小兒泄瀉青白膿血相雜

黃連 黃芩 木香 荳蔻 各等分

右為細末麪糊為丸黍米大亦痢粟米飲下白痢厚朴湯下

空心

防風湯治小兒邪熱在表惡風惡寒所傷瘡疹未出可解

表發瘡疹

防風 半兩 蒼朮 石膏 各壹兩 炙甘草 半兩

川芎 黃芩 各半兩

右為鹿末每服二錢生姜三片薄荷七葉水煎日二

柴胡散方在寶鑑氣分熱條下

八正散方在寶鑑小便不通條下

桃仁承氣湯治小兒瘡疹結燥百無一失方在前雜知畜血條下

生肌散治瘡疹後寒熱往來嗜卧煩燥悶亂

生地黄 當歸 地骨皮 人參 甘草 各

赤芍藥

右等分攻阻每服水煎服熱時

小兒浸淫瘡漸發不止

苦瓠 三兩 蛇蛻皮 蜂房 麝香 各等分

右為細末生油調塗及帛上貼

小兒驚風治小兒驚風身熱喘急多睡驚悸手足搐搦驚悸

昏憤痰涎不利熱風濕

天麻

防風

人參各壹兩

蝎尾去毒半兩甘草

朱砂

雄黃各壹分牛黃壹分

麝香壹分姜蚕半兩

右為細末煉蜜丸櫻桃大朱砂為衣每服一九薄荷湯下時

治小兒肺脹喘滿膏高氣急兩肋扇動陷下作坑

兩鼻竅張亂咳嗽渴聲啞不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不

急治死在朝夕

白牽牛

生一兩半熟黑牽牛一兩半生

川大黃

檳榔各一兩

右為細末三歲兒每服二錢冷漿水調下涎多加膩粉少許

無時加蜜小許

治小兒嘔吐不止

朱砂

沉香

藿香葉三分滑石半兩丁香十四個

右為細末每服半錢用新汲水一盞芝麻油點成花子抄藥

在上須更墜濾去水却用別水送下空心

小兒驚熱疳瘦乳癖

大黃

黃連半兩龍膽

防風

川芎

薄荷葉各五分半

右為細末麩糊為丸粟米大青黛為衣每服三五丸加至二

十九溫水下

治小兒瘡疹口瘡咽喉腫痛牙疳臭爛

天門冬

麥門冬

玄參各三分甘草

薄荷葉各一兩

右為細末熬生地黄汁和丸櫻桃大每服一九溫蜜水化服

小兒瘡疹出不快或倒撮毒氣入腹

紫草

黃菁

桑白皮

木通

枳殼

白朮 各等分

六為鹿末每服三錢水酒各半蓋麝香少許同煎

治小兒一切嘔吐不止

半夏湯洗米泔水製

人參 白朮 木香 丁香 藿香

右六味各二錢半為極細末稀麵糊為丸黍核大後用沉香一錢為末朱砂一錢水飛二味同研勻為衣陰乾每服一九用小便一枚去核納藥在內濕紙裹燒熟嚼與小兒服後以米飲壓之

一名清涼飲子方在保命小兒條下

治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉

犀角末 地骨皮 麥門冬 枳殼去穢炒 大黃蒸山

柴胡 茯苓 赤芍藥 黃耆 桑白皮

人參 鱉甲涂醋炙焦 已上各等分

右為鹿末每服一錢入青蒿少許水煎量兒大小加減

治小兒夜啼及腸痛至夜輒劇狀似鬼祟

一五味子 當歸 赤芍藥 白朮各半兩 茯神

陳皮 桂心 甘草炙各五分半

右為末每服量兒大小加減水煎

治小兒癩耳

白礬火枯 乾胭脂 鱗香各壹分

右同研勻先以綿裹杖子擦淨搽之

治小兒疳積

胡粉炒黃 鶴虱炒黃 川練子去皮核 檳榔各式 白礬各式

右為細末每服一字大者半錢温米飲調下痛時服

金散 治小兒濕癬浸淫瘡

白膠香式兩分 蛤粉半兩 青黛式分半

右研勻為細末乾摻瘡上

送宣丸 治小兒大小便難嘔吐藥食不下命在頃刻

巴豆半粒 硫黃 良姜 附子 檳榔

甘遂各等分

右為細末粟米飯和九蒸豆大用椒湯洗小兒男左女右手握之用綿裹定看行數多少置藥洗去不用即止

黃耆湯 治欬喘逆身熱鼻乾燥者是熱入肺經為客熱呷呀

有聲黃耆為主入參為佐

黃耆式兩 人參三分 桑白皮三 地骨皮伍 甘草半

右咬咀水煎放冷時時服之

無價散 治風熱喘促悶亂不安俗謂之馬脾風者

辰砂半 輕粉半 甘遂壹分 麝香壹分 乾

右為細末每服一字用温漿水少許上滴小油一點抄藥在上沉下去却漿水灌之立効如神

小兒身熱蒸熱膏膈煩滿皮膚如漬搦之黃白睛亦然濕熱所致也宜加減

黃連 茵陳各五分 黃蘗 黃芩各四分 梔子

茯苓 澤瀉各二分

右咬咀都作一服水一大盞煎至六分去滓稍熱服食前

小兒孤疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛十四枚熬糖半兩

一物為散每服八分一七日再酒調下蜜丸亦通

大人小兒以藥牙開牙關者諸藥勿効生天南星末一錢麝香
心相和研勻用指蘸生薑自然汁蘸藥於左右大牙根上
搽之立開

灸慢驚風及臍風撮口

小兒慢驚風灸尺澤一穴各七壯在肘中橫紋約上動脈中炷
如小麥大

小兒初生臍風撮口諸藥不効者灸然谷穴在內踝前起大骨
下陷中可灸三壯鍼入三分不宜見血立効

灸小兒癩癩風癩驚癩

小兒癩癩癩瘰脊強低引項灸長強穴三十壯在脊底端跌
取之乃得

小兒癩癩驚風目眩灸神庭穴七壯在鼻直上入髮際五分

小兒風癩灸鼻柱上髮際宛宛中灸三壯炷如小麥大

小兒驚癩先驚怖啼叫後乃發也灸頂上旋毛中三壯及耳後
青絲脉炷如小麥大旋毛中即百會穴也

小兒癩氣久而不痊者灸中脘一穴章門一穴在大橫外直臍
季肋端側卧曲上足舉臂取之右中脘章門各灸七壯臍後
脊中灸二七壯取中脘從髑髀下取病人四指是穴灸之無
不効也

小兒脇下滿瀉痢躄重四肢不收痰癖積聚腹痛不嗜食痰癯
寒熱脾俞二穴在十一領下兩傍相去各一寸五分

又治腹脹引背食飲多漸漸羸瘦黃可灸一壯黃疸者可灸
三壯

灸疳瘦法

小兒疳癪於脊下鳩尾骨尖上灸三壯以於脊下端尾端骨尖上灸三壯

小兒疳瘦脫肛疳疔疔瀉飲形容瘦瘠諸方不差尾端骨上三寸骨陷中灸三壯

小兒身羸瘦黃肌肢腫四肢懈惰者背不舉章門一穴灸七壯小兒脫肛瀉血秋深不較灸龜尾一壯炷如小麥者端節骨也

小兒脫肛者灸臍中三壯

小兒脫肛又不差及風癩中風角弓反張多哭言語不澤發無時節盛即吐沫灸百會一穴七壯在鼻直入髮際五寸頂中

中央旋毛中可容豆炷如小麥太

小兒偏墜若非胎中所有在後生者於墜下腎囊前中間孩子上灸七壯愈

小兒龜背及肺熱腹滿攻背膈所生又緣乳母食熱麪五辛轉

更膏高起也灸兩乳前各一寸五分上兩行二骨鍊間六處各三壯炷如小麥大者夏從下灸上秋冬從上灸下若不依此法十灸不愈一二也

又一法小兒喘脹俗謂之馬脾風又謂之風喉者以草葉等病

兒手中指裏近掌紋至中指小截斷如此三莖自乳上微斜直上立兩莖於兩尺頭橫一莖兩頭尺頭點下各灸三壯此

法多曾見愈



