

外臺秘要方

十八

外臺松要方卷第十八

脚氣上
十二門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進



脚氣論二十三首

脚氣服湯藥色目方一十九首

脚氣不隨方五首

風毒腳弱痺方六首

大小續命湯中風方二首

不仁不能行方三首

因腳氣續生諸病方四首

大法春秋宜服散湯方六首

腳氣嘔逆不下食方二首

腳氣疼不仁方二首

腳氣衝心煩悶方二十二首

嶺南瘴氣腳氣酒湯散方一十三首

脚氣論二十三首

千金論曰考諸經方往往有腳弱之論而古人少有此疾自永嘉南度衣纓士人多有遭者。嶺表江東有支法存仰道人善並留意經方偏善斯術。晉朝仕望多獲全濟莫不由此二公又宋齊之間有釋門僧深師仰道人述支法存等諸家舊方為三十卷其脚弱一方近百餘首。魏周之世蓋無此病所以姚公集驗殊不勝勤徐王撰錄未以為意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒暑不等是以關西河北之人不識此病自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於彼不襲水土往者皆遭近來中國士大夫雖不涉江表亦有居然罹患之者良由今代天下風氣混同物類齊等所致之耳然此病初得即先從腳起因即脰腫時人號為腳氣深師云腳弱者即其義也

深師述支法存所用水平山敷施連范祖耀黃素等諸家療脚弱方凡八千餘條皆是精要學者尋覽頗覺繁重正是方集耳卒欲救急莫測指南今取其所經用灼然有効者以備倉卒餘者不復具述

論何以得之於腳

問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於腳也答曰夫人有五十藏心肺二藏經絡所起在手十指腎肝與脾三藏經絡所起在足十指夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之所以風毒之中人也必先中腳久而不差遍及四肢腹背頭項也微時不覺痛滯乃知經次傳間傳是也

論得已便令人覺不

凡腳氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因他病一度乃始發動或奄然大悶經三兩日不起方乃覺之諸小庸醫皆不識此疾謾作餘病療之莫不盡斃故此病多不令人識也始起甚微飲嬉戲氣力如故唯卒起腳屈弱不能動有此為異耳黃帝云緩風濕痺是也

論風毒相貌

夫有腳氣未覺異而頭項脣膊已有所差有諸處皆悉未知而心復五內已有所困又風毒之中人也或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下痢或大小便澀祕不通或胷中衝悸不欲見光明或精神惛憤或喜迷忘語言錯亂或壯熱頭痛或身體酸冷疼煩或覺轉筋或脚脛腫或不腫或腫腿頑痺或時緩縱不隨或復百節攣急或少腹不仁此皆腳氣狀貌也亦云風毒腳氣之候也其候難知當湏細意察之不爾必失其機要一朝病成難可以理婦人亦爾又有婦人產後春夏取涼多中此毒宜深慎之其熱悶癆癥驚悸心煩嘔吐氣上冒其候也又但覺腑下冷痞悶惱然不

快兼小便淋瀝不同生平即是脚氣之候頑弱名緩風疼痛為

濕痺

論得之所由

凡四時之中皆不得久立久坐湿冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣靴襪當風取涼皆成腳氣若暑月久坐久立濕地者則熱湿之氣蒸入經絡病發必熱四肢酸疼煩悶若寒月久坐久立濕冷地者則冷濕之氣上入經絡病發則四體酷冷轉筋若當風取涼得之者病發則皮肉頑痺諸處閼動漸漸向頭允當革之日忽然暴熱人皆不能忍得者當於此時必不得賴取於寒以快意也卒有暴寒復不得受之皆生病也世有勤功力學之士一心注意於事久坐行立於濕地不時動轉冷風來擊入於經絡不覺成病也故風毒中人或先中手足十指因汗毛孔開腠理疎通風如擊箭或先中足心或先中足趺或先中膝以下蹠脛即寒痺

表裏者若欲使人不成病者初覺即久所覺處三二十壯因此

即愈不復發也黃帝云當風取涼醉已入房能成此疾

論冷熱不同

問曰何故得者有冷有熱答曰足有三陰三陽寒中三陽所患必冷暑中三陰所患必熱故有表裏冷熱冷熱不同熱者療以冷藥冷者療以熱藥人意消息之脾受陽毒即熱頑腎受陰濕

即寒痺

論湏療緩急

凡小覺病候有異即湏大怖畏決意療之傷緩氣上入腹或腫或不腫脣爛逆滿氣上有息急者死不旋踵寃者數日必死不可不急療也但看心下急則氣喘不停或白汗數出或乍寒乍熱其脈促短而數嘔吐不止者皆死也

論脈候法

凡脚氣雖復診候多塗而三部之脉要須不違四時者為吉其逆四時者勿治餘如脈經所說此中不復具載其人本黑瘦者易治本肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白不耐風瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受疾至深難已也

論腫不腫

凡有人久患脚氣不自知別於後因他病發動療之得差後直患嘔吐而復脚弱余為診之乃告為脚氣病者曰我平生不患脚腫何因名為脚氣不肯服湯餘醫以為石發狐疑之間不過一旬而死故脚氣不得一向以腫為候有腫者亦有不腫者其以小腹頑痺不仁者脚多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕凡患脚氣到心難治以其隋水剋心火故也

論湏愾不湏愾

凡脚氣之病極湏愾房室羊肉牛肉魚霖戴菜菘菜蔓菁瓠子酒麪酥油乳糜猪雞鵝鴨有方用鯉魚頭此善並切禁不得犯之并忌大怒唯得食梗米梁米粟米蕷豆葱韭薤樹薑橘皮又不得食諸生果子酸醋之食犯之者皆不可恙又不宜生牛乳生栗子

論善能療者幾日可恙

凡脚氣病枉死者衆略而言之有三種一覺之傷晚二驕狼恣傲三狐疑不決此之三種正當枉死之也世間雖有良醫而病人有性靈堪受人者更復甚少故雖有駢驥而不遇伯樂雖有尼父而人莫之師其為枉橫亦猶此也今有病者有受入性依法使余療之不過十日可得永差矣若無受入性者亦不湏愾為療縱令療之恐無恙日也非但脚氣諸病皆然良藥善言觸目可致不可使人必服法為信者施不為疑者說出第七卷中

病源九脚氣病比日感風毒所致也得此病者多不即覺或先無他病而忽得之或因衆病後得之初甚微飲食嬉戲氣力如故當熟察之其狀自膝至腳有不仁或若痺或淫_淫如蟲所緣_縫或脚指及膝脰洒洒爾或脚屈弱不能行或微腫或酷冷或痛_瘡或緩縱不隨或掣急或有至困能飲食者或有不能者或見飲食而嘔吐惡聞食臭或有物如指發於端陽逕上衝心氣上者或舉體轉筋或壯熱頭痛或口心忪悸寢處不欲見明或腹內苦痛而兼下者或語言錯亂有善妄謬者或眼濁精神惛憤者此皆病之證也若療之緩便上入腹入腹或腫或不腫肩臂滿氣上便殺人急者不全日緩者或一二三月初得此病便宜速療之不同常病也病既入藏其脉有三品內外證候相似但脉異耳若病人脉得浮大而緩宜服續命湯兩劑若風盛宜作越婢湯加术四兩若脉轉駛而緊宜服竹瀝湯若脉微而弱宜服風引湯一三劑此皆多是因虛而得之若大虛乏短氣可間服補湯隨病體之冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駛此是三品之中最惡脉也脉或沉細而駛者此脉正與浮大而緊者同是惡脉浮大者病在外沉細者病在內療亦不異當消息心以意耳其形或尚可而手腳未及至弱數日之内上氣便死如此之脉急服竹瀝湯日服一劑湯勢常令相及勿令半日之內空無湯也若服竹瀝湯得下者必佳也此湯竹瀝多服之皆湏熱服之不熱輒停在肯脯更為人患若已服數劑病及脈勢未折而若脹滿者可作大鼈甲湯下之湯勢盡而不得下者可以丸藥助令得下下後更服竹瀝湯輒令脈勢折氣自心料理乃佳江東嶺南土地卑下風濕之氣易傷於人初得此病多從下上所以脚先屈弱然後毒氣循經絡漸入腑藏腑藏受邪氣便喘滿以其病從脚起故名脚氣其湯熨鍼

石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云坐兩足長
舒自縱身內氣向下使心內氣一作和適散然後屈一足安膝下
努長舒一足仰取指向上便急仰眠頭不至席兩手自然向^編前頭
向工努挽一時各各取勢來去二七逆玄亦然去脚疼腰脣冷血
冷風痺日日漸損入云覆卧停視內踵生腰以單內氣目極七息
除腳中弦痛轉筋脚酸疼脚痺弱又云舒兩足坐散氣向涌泉可
三通氣徹到始收右足屈捲將兩手急捉脚涌泉挽足踏手挽
足踏一時取勢手足用力逆氣向下三七不失氣數尋去脅中冷
氣腋冷脚疼又云一足屈之足指仰俟急一足安膝頭散心兩足
跟出氣向下一手拓膝頭向下急捺一手向後拓席一時極勢左
右亦然二七去膝痺疼急又云一足踏地一足向後將足解谿安
肺上急努兩手偏相向後側身如轉極勢二七左右亦然去足疼
痛痺急腰痛出第十三卷中

吳氏竊尋蘇長史唐侍中徐五善脚氣方身經自患三十年
各序氣論皆有道理具述灸之備說醫方咸言槐試但有効驗
比來傳用實愈非虛今櫛此三本勒為二卷色類同者編次寫
之仍以朱題蘇唐徐姓號各於方論下傳之門肉以救疾耳
蘇長史論曰脚氣之爲病本因腎虛多中肥溢肌膚者無問男女
若瘦而勞苦肌膚薄寒皮膚厚緊者縱患亦無死憂一毫已後
又不可久立蒸濕等處多飲酒食麪心情憂憤亦使發動晉宋
以前名為緩風古來無脚氣名後以病從脚起初發因腫滿故
名脚氣也又有不腫而緩弱行卒倒漸至不仁毒氣上陰攻
心便死急不旋踵寢延歲月耳然則緩風毒氣得其槐稱矣近
來諸醫多宗小品所說粗為詳悉而曰循舊曾頗為膠柱肘後
單略時有可依集驗亦遵小品胡洽淘公微在梗篋並非身以
經患不能原始要然也今略述病有數種形證不同一人經病

三十年中便數發每發差異爲療亦殊前用經効後用便增一旬之內變候不尋未能力深遠往往致斃因不可先方救後發也鄙年二十許時因丁憂得此病三十年中已經六七度發每發幾死後發時大況雖同三分論之二分有異依舊用差方療不復有効更張乃瘳耳一分同者每氣足後手足緩弱頑痺不仁服側子金牙酒往往得差此酒腳氣之要也餘無以加療疎不能動者服之指期取起二分異者毒氣入腹冷熱不同已經投藥虛實亦異或補或瀉百病時變革也按小品集驗脚氣脉三種以緩脉為輕沉緊為次洪數者為下自三十年凡見得此病者數百脉沉緊者多死洪數者並生緩者不療自差大沉如此療之違法雖輕亦殆療之得理雖重可生也凡脚氣為疾不同餘病風毒不退未宜停藥比見病者皆以輕疾致斃或以病小則言疾自愈廢藥不服或已服藥而患未退諸藥病相違乃改

為佗療皆自取危殆如之何略述所知以示同病者

蘇凡脚氣病多以春末夏初發動得之皆因熱蒸蒸地憂憤春夏如輕夏發更重入秋輕至冬自歇大約如此亦時有異於此候者近入京以來見在室女及婦人或少年學士得此病者皆以不在江嶺庸醫不識以為佗病皆錯療之多有死者風氣毒行天下徧有非獨江嶺間也既婦人亦病又非由腎虛而得卑濕之土斯病由衆不為此療覘死極多深用哀悼無知之何夫療脚氣者須順四時春秋二時宜兼補瀉夏時疾盛專須汗利十月以後乃用補藥雖小小變通終不越此法或有丸人曾以夏特見患汗利得差冬時遇病還令汗利冬時見患用補藥得除夏時遇病還用補藥此並不愚專固同之醫者雖懷濟物之心翻有致死之効既未深達以何差療又如治葛叔飢人乎今錄此方並經試驗患者披覽當狀自療必有驗効殊勝庸醫也

幸當傳之以濟危殆矣

蘇凡脚氣病雖苦虛羸孰要不可補之補藥唯宜冬月酒中用之丸散亦不可補服之膚張非瀉不差唯毬布丸用草薢子大黃乃佳耳庸醫多示曉此謂為腎虛多將補藥有不經劑而斃也古方多用風引續命湯療之猶十愈一二若氣毒少而風多者若以療脚氣法用療風則十愈八九矣如當病用藥終無不差脚氣非死病若不肯療蓋自取死非病能殺人也若在遠無藥物處病毒深非灸不能差病者不論耳中華足藥病不肯療而致死者深可痛哉

蘇夫脚氣病不可常服補藥補藥多令鼓張緊實難救也每月之中湏五六度行利為佳縱常服藥時時取利亦宜時取汗當候冷熱隨時消息不可專一法覺熱煩口乾頭面熱悶即湏取冷覺頑婢不仁身體強屈冷疼者便暖將息此並可解尋常飲

酒作豉酒服之大辟風濕兼利腰脚晝日莫多卧湏力遨遊舒暢情性以勿睡也

蘇諸毒氣所攻攻內則心急悶不療至死若攻外毒出皮膚則不仁不仁者膏摩之差若未出皮膚在榮衛刺痛者隨痛處急宜灸三五炷即差不必要在孔穴也遠方無藥物處急宜灸之腹背手足諸要穴皆能療此病縱明堂無正文但隨所苦火艾徹處痛便消散此不可知也又候灸瘡差後癥色赤白平復如本則風毒盡矣若色青黑者風毒未盡仍灸勿止待肢體輕乃休矣

蘇療脚氣不可全補當依前論隨四時候病虛實療之常宜食犢肉犢蹄鯽魚鱠魚豬兔肉葱芥薤薑等菜猪肝食法先湯中浸之使繞熟作脔切以醬汁和水并著一抄米盦椒煮令極熟每食下飯大補益消得脚氣生盦蒜豉當食大佳不宜食麪及

羊肉蘿蔔蔓菁韭酒醉房室父立冷濕船行水氣夏月屋中濕
氣熱氣勞劇哭泣更憤如此善類好使氣發也初以微發即服煮
散以壓之服煮散不必日別二三服量病輕重日一服或二日一
服以攘毒耳若毒氣盛非煮散所能救者急服麻黃姜湯也
毒氣既退唯苦頑婢兩脚緩弱十月服側子酒不至三劑皆即

能行

蘇凡脚氣復發或似石發惡寒壯熱頭痛手足冷或似瘡發發
作有時又似傷寒脉甚洪急七日以後杜熱既定則脚氣狀見也
冷毒盛脹即服金牙酒熱盛脹即服紫雪平平脹者單用擴榔
飲子亦差患脚氣人遠行在家常有金牙紫雪不虞病發便能
起死諸大湯藥卒求難濟

蘇凡脚氣虛病猛在皮膚毒未入者可服三五劑大小竹瀝湯
唯宜多熟者大小續命湯時宜可用不宜多至十劑也石斛酒

及鍾乳酒惡於側子而傷緩鈍小石斛散及鍾乳散宜多冷者
猶不如側子酒中加鍾乳二十兩白石英三斤合漬服之其
力數倍兩脚緩弱者服之百日日起行消息腳氣法依此消息
必得氣愈第一忌嗔嗔即心腹煩煩即腳氣發第二忌大語大
語即損肺肺損亦發動又不得露脚當風入水以冷水洗脚脚
脰尤不宜冷雖暑月常須着綿襪至冬寒倍令兩腔溫暖微有
汗是大佳依此將息氣漸薄損每至丑寅日割手足爪甲丑日
指寅日足亦宜十二日一度割少侵肉去氣又數須用梳攏
頭每梳欲得一百餘梳亦大去氣每旦長展脚坐手攀脚七度
虛攀一度令手著脚指漸至脚心脚極趺手極攀每日如此

脚氣亦不傷人

唐若頭面及項少似熱氣上即露背膊取冷勿使腰臂冷其背
膊冷極厚著衣湧如此姑息必漸差若不解將息立見危殆因

篤轉加易發致性命洗面及腳皆湏熱湯小添冷水洗之又不得食酸飯不用乘馬若能步行勞筋力其脚氣自然漸老唐凡脚氣病人不能永差至春夏還復發動夏時腠理開不宜卧睡睡覺令人按櫻勿使邪氣稽留數勞動閑節常令通暢此並養生之要拒風邪法也尋常有力每食後行五百步疲倦便止此腳中惡氣隨即下散雖浮腫氣不能上也出上卷中

服湯藥色目方一十九首

千金風毒之氣入人體中脉有三品內外證候相似但脉有異耳若脉浮大而緩宜服續命湯兩劑應、若風盛宜作越婢湯加木四兩若脉浮大而緊轉駛者宜服竹瀝湯若病人脉微而弱宜服風引湯兩劑應、此脉多是因虛而得之若大虛短氣力乏可其間作補湯隨病冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駛此是三品之中最惡脉也脉或沈細

而駛者此脉正與浮大而緊者同是惡脉浮大者病在外沈細者病在內治亦不異但當消息以意耳其形尚可而手脚未及至弱數日之中氣上便終如此之脉往往有人得之無一存者急服竹瀝湯日服一劑切要湯勢常令相及勿令半日之中空無湯也此湯竹汁多服之若不極熱輒停在胃心更為人患每服當使極熱若服竹瀝湯得下者必佳也若已服三劑竹瀝湯病及脉勢未折而若腹脹滿可以大鼈甲湯下之湯勢盡而不得下可以丸藥助湯令得下後更服竹瀝湯趣令脉勢折氣息料理便停得服三十二物八風散佳又初得病便摩治葛膏日再煖、痺脚弱都愈乃止若服竹瀝湯脉勢折如未病時氣力轉勝脚故未能行體力充足然後漸微行步病重者差後半年始能扶人行耳既覺脉及體內差但當勤服八風散勿以脚未能行輕加餘療餘療未必得益更生諸惡失此諸療也猥

人邊亦勿行治葛膏有人聞竹瀝湯即云恐傷腰脚者即勿與
療宜知此法人無受人性者不可醫故也不爲疑者說此之謂
也竹瀝湯有三首輕者服前方重者次第服後者此風毒乃相
注易病人宜將空缺服小金牙散以少許塗臘孔耳門病困人
及新亡人喜易人強健人宜將服之亦以塗耳臘乃可臨近亡
人及視疾者絳囊帶一方寸匕男左女右臂上此散毒服宜從
少始金牙散方在第十二卷中

病人唯宜服赤小豆飲冬服側子金牙酒續命湯療風毒病初
得似天行毒病而脉浮緩終不变駛比不療或數日而死或十
日而死或得便不識人或發黃或發斑或目赤或下部穿爛或
腿膝穿漏者此最急得之即先服續命湯一劑湏服葛根湯麻
黃湯下之若故不折更與續命湯兩三劑必差此病大急令湯
勢相接不可使半日闕湯即便殺人

又第一竹瀝湯療兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁脹起如腫按之
不陷心中惡不欲食或患冷方

- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|----|---------|
| 甘草 | 一两 | 秦艽 | 一两 | 葛根 | 一两 | 附子 | 炮
一枚 |
| 黃芩 | 一两 | 麻黃 | 一两 | 杏人 | 五十枚去
皮尖碎 | 防己 | 一两 |
| 防風 | 半两 | 升麻 | 半两 | 細辛 | 一两 | 桂心 | 一两 |
| 竹瀝 | 升五 | 桂心 | 一两 | 乾薑 | 一两 | 獨活 | 二两 |
| 獨活 | 二两 | 芍藥 | 二两 | 白朮 | 二两 | 茵芋 | 二两 |
| 麻黃 | 一两 | 菖根 | 二两 | 細辛 | 二两 | 生薑 | 三两 |
| 防風 | 二两 | 茯苓 | 三两 | 桂心 | 二两 | | |
- 右十五味切以水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗忌海
藻菘菜豬肉醋物生菜生葱羣方無葱人有白朮
- 又第二大竹瀝湯療卒中風口噤不能語言四肢緩縱偏癱掣
急痛風經五藏恍惚恚怒無常手足不隨方

防己

烏頭一枚

人參一兩

石膏一兩碎
綿裹

黃芩兩

芎藭兩

甘草二兩

右十九味切以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗一狀相當即服忌猪肉冷水海藻菘菜生葱生菜桃李雀肉醋物等_翼又第二竹瀝湯療風毒入人五內短氣心下煩熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語方

當歸兩

防風三兩

生薑八兩

白朮三兩

人參二兩

黃芩兩

芎藭兩

細辛二兩

桂心二兩

茯苓三兩

甘草二兩

附子一枚

秦艽三兩

葛根五兩

升麻二兩

麻黃三兩

蜀椒一兩

汗

附子炮一枚

去節

右十七味切以甘竹汁一斗九升煮取四升分五服忌猪肉冷水海藻菘菜生菜生葱桃李雀肉醋物並出第七卷中

翼方有
方藥

千金翼療腳氣常作穀白皮粥防之法即不發方

穀白皮

切五升勿
取班者有毒

右一味以水一斗半煮取七升去滓煮米粥常食之出第十六卷中

崔氏療腳氣初須食瓜及瓜飲子方

生瓜

一枚如棒許大去蒂四破

白朮

二兩

生薑

一兩

右三味切二物以前汁煮取二升去滓分三服禁食桃李雀肉等出第六卷中

生瓜一枚
是木瓜

又療腳氣遍内外煩熱口中生瘡者方

服紫雪強人服如兩重大弱者減之和水服當利熱毒若經服石發熱毒悶者服之如神勝三黃湯十劑

備急同

又若冷脹毒悶方

服金牙散以湯如桃李許和散如棗核大服卒患取利及吐者一服四分匕用之若神良備急同並出第九卷中

必効療脚氣方

蒼耳子五升 赤小豆半升 鹽一斤

右三味以水一石五斗緩火煎取五六斗去滓別貯取受半鑄於前泥四面開一畔入火處鑄內著所煎汁用浸脚統令沒踝鑄下微著炭火常令溫溫如汁漸盡不沒踝續添使沒浸時仍於密房中林前邊閉為重腳恐風不能久坐之仰卧亦得連夜浸之彌佳浸經三日外其欲食飲常若飢便食任食此一劑藥汁盡必差不過用半汁即可覺漸可一日兩日食一頓生猪肉鱠大精此方甚効

又方

取上好樹末經蒸者取三大斗分為兩袋袋以布作長八寸樹須滿實勿使虛即以醋漿水三大升鹽一大升內在桶水中即煮或板袋可經十餘沸即止其鑄釜底仍微著火勿使冷又取冷醋一大升安貯盆中即取前件袋一枚內於冷桶盆裏患人於林上坐垂脚林下盆安地上持兩脚踏盆中熱袋上其樹袋冷熱令可忍竟樹袋如冷還於舊盆中以火溫使熱更_五用之其以脚踏之如冷還於舊盆中以火溫使熱更_五用之其林前可垂簷席到地勿使風吹脚如兩脚至膝以來牽風如虫行頭項及四肢身體_{干腹}中如雷鳴氣下即休踏樹袋得汗問竟心氣悶可取冷飯喫三三口以鹿脯下勿食猪羊肉魚及臭穢又不得食梗米如須和羹可以蘇和羹生薑含皮啖_鴨餅_蒜葱薑豉醋等

並得食踏袋得汗已後覺微利勿怪之此是病狀通
洩之候若不差隔日三日二回取舊湯袋依前法踏
之得汗還止覺腹中緩空能食起即停如未覺損終
而復始以差為度白桑葉膏服之亦可不相妨

又方

白椹桑葉切細取大斗一石以斗量縱剩亦非事如
無葉即取軟條還細剉取一石以清水一石五斗於
一金中和上仲一石白桑椹葉即大煮使常沸其湯
可有五斗許即瀝却葉更煎可有二斗以來移於鑄
中又煎取三升以下二升以上似稠餳即止每旦空腹
服一匙至日晚又服一匙如嘔不能下可和羹和粥和
食能喫不嘔能服一七日以上即竟四肢通暢下洩
氣洩氣以後兩脚腫勿怪此得藥力是病差候此法

已經療五六十人以上異種神効

又方

吳半夏三兩削去皮淨 生薑汁三升

右二味水五升煮取二升去滓空腹一服盡每日一劑三劑必
好禁羊肉餠此方梁公家出方始有本竒異神効並出第三
卷中

蘇恭云凡患腳氣每旦早食任意飽午後少食日晚不食粥佳
如飢可食豉粥若暝不消及喫難消之物致霍亂轉筋十不一
活若晚食不消欲致霍亂者方

高良薑一打碎

右一味以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄
粥甚藥唯極飲之良若卒無高良薑取母薑一兩切之以清
酒一升煮令極沸并滓飲之雖不及高良姜亦大驗

又若已曉見者肺氣宜服此方

一月此一
蒜三升去心切一小升去皮大
蒜熬令黄色 排人两人熬令紫色
右三味合和生絹袋盛以美酒一斗漬之夏月三日冬月七
日初服半升漸加至二升量增減若盡更著五升美酒漬飲之
加椒一二合尤妙

又亦

香豉一升小便一升和清少時令有褐色去滓平旦
空腹服三日一停三日復作服以差為度

草熟導毒發引熱卒黃等瘡疔瘻死溫瘡五戶五注心腹諸
疾絞利切痛蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病最良方
黃金百兩側左
滑石一斤
寒水石三錢右膏一錢磁石三錢
玄參一錢
羚羊角五兩眉牛角五兩
骨

升麻一
甘草八兩
沉香五
丁子香一
青木香五
兩

甘草八兩
大黃一兩

沉香兩五
丁子香一
飛青木香兩五

丁子香一
飛青木香兩
兩五

兩五

右十三味以水一斛先煮五種金石藥得四斗去滓後內八物
煮取一斗五升去滓取消石四升芒消亦可用朴消精者十斤
投汁中微炭上煎柳木草攪勿住手有七升投在水盆中半日
欲凝內成^血_研朱砂^三_兩細研麝香當門子^五_分內中攪調寒之二
日成霜雪此色病人強壯者一服二分當利熱老弱人或熟
毒微者一服一分以意節之合得一劑支十年許用大神妙
不用餘論脚氣病經服石藥發熱毒悶者服之如神水和四
分服勝三黃湯十劑以後依舊方用麝香丸下腳氣或熱脹
曾用不如金牙散良已海藻菘菜生血物等

金牙研
舍丹研
疑研
譽石
研泥聚
燒半月丹砂研

雄黃八研

朴消研

寒水石研代赭研

龍骨研

犀角屑

懶肝炎

鶴骨灸

狸骨灸

巴豆去心皮熬

大黃

冶瘡皮三分

牛黃別

麝香別

升麻

桂心

附子生用去皮

鬼臼

鬼督郵

黃環

蔚根木草有蔚毛此云蔚根即是用蔚毛之根也

青木香

牡蠣熬

桂心

蘇合香研別常山

茯苓

黃耆

玉支

知母一本作鬼箭羽

龍膽各二分

露蜂房

白薇

蜀漆

當歸

桔梗

地膽灸

蜈蚣一枚

蟬蛻一枚

羌青灸

徐長卿

石長生

亭長十九枚

椒一枚汗

白薇

分一

右四十九味合擣為散以湯如桃李許和散三分匕或如棗核

服之常患者日再服卒患取利吐者服四分匕若以絳袋裝之
方才亡三七帶之辟諸惡痛忘心食生冷蘆筍生葱菜豬肉冷
水醋物陳臭生血等物合藥用臘月王相日勿令穢汚風見之
以臘紙裹得二年用此藥能冷熟能虛實說其功效卒不盡矣
凡服藥散酒丸等但所服者衆家効者寡或五藏證候不同七
情有所乖舛分兩參差冷熱有異故陶隱居君醫者意也古
之所謂良醫蓋以其意量而得其節是知療病之者皆意出當
之時不可以和合病機未察診候宜然大同小異致令乖舛毫取危殆如
之何又云代無良醫枉死者半此之一言深可悲也凡患脚氣者
雖苦虛羸不得多服補藥服之腫脹非瀉不差但益虛羸也唯
冬月得用補藥如冬月仍患氣不除者亦不得服之甚解此大
都患氣尋常湧微利但不得大利益虛耳凡脚氣至冬則定者

多所以然。冬腎王，王則不受邪。所以腰脚得利也。凡此有五種。
冷脚氣熱，脚氣平，脚氣大虛，脚氣大實，脚氣或寒變作五者。
冷者專瀉，亦兼療風毒，尋起脚氣乃似傷寒，參差危殆，深須曉
識。若不通博，不如不為。全牙散功少，大猛就中姑息，兼療諸病，盡
毒注忤鬼魅野道，肺痿骨蒸，傳屍相易為第一藥。用物既多，斟
酌用，患者者乃為施功少，合之湧得其好法，得差不要盡劑用。
之並出筆一卷中。

近効療脚氣方

附子 五兩

甘草 五兩

右二味並細剗以水五斗煎，取二斗半置盆中以版子隔三寸許橫，湯上共水面平，脚踏版上以湯持脚水冷即休。此湯

得四五度用脚氣永除。此方極驗。

又桑煎療水氣肺氣癰腫兼風氣方

桑條 二兩並用

大秤六兩

右一味細剗如豆以水一大升煎，取三大合如欲得多造准此增加先熬令香然後煎，每服肚空喫或如秦湯或羹粥，每服半大升亦無禁忌。

又本方云桑枝平不冷不熱，可以常服療遍體風痒，乾燥腳氣，風氣四肢拘攣，掌上眼氣服，暈肺氣，欬嗽，銷食利小便，多服輕悅耳目，令人光澤，兼療口乾，仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子。

桑枝

細切一

右一味熬令香，以水三大升煎，取二大升一日服盡無閒食，前後比服只依前方。

脚氣不隨方五首

雀氏側子酒療脚氣不隨方

側子四
秦艽炮四
防風兩

生石斛八
甘草三
茯苓八

紫蘇莖一
桂心兩

獨活兩
石八
握前胡四

防已兩
山茱萸四
白朮四
乾薑四
桂心兩

生石斛八
甘草三
茯苓八
桂心兩
桂心兩

丹參兩
細辛兩
蜀椒二
當歸三

五味子四
黃芩三
細辛兩
當歸三
蜀椒出汗

右二十三味薄切絹袋貯以清酒四升浸五日一服四合日再細細加至八九合溫飲慎生冷猪肉森麪其中間覺熱渴得飲豉酒豉仍須蒸暴之忌海藻菘菜桃李佳肉生葱生菜及醋物等

又煮散方

細辛三分
地骨白皮分
黃芩分
大黃六分
蒺藜子半分
甘草半分
杏仁八分去皮
生石斛二分
人參六分
丹參分
澤瀉六分
桂心分

右二十二味擣以鹿髓葛節度攪使極調三兩爲一劑以後棄汁二升煮取一升頓服之日服一劑以小便利爲度忌海藻菘菜生葱菜桃李佳肉生葱生菜及醋物等

又小飲子法

大棗擘五枚
桑根白皮兩
白前兩
橘皮分

右四味切以水五升煮取二升將煮前散慎如藥法
又若脚氣上入少腹少腹不仁即服張仲景八味丸方

茯苓兩
乾地黃八
澤瀉四

桂心兩
牡丹三

附子炮二
去心三兩

山茱萸四五

右八味擣篩蜜和爲丸如梧子酒服二十丸漸加至三十九
仍灸三里絕骨若脚數轉筋灸承山若脚腔內稍不仁灸三陰
交忌猪肉冷水生葱醋物薰蒸
又脚氣雖差至冬季間常湏服側子酒方

側子二丙

乾薑二丙

石斛八刀

丹參三丙

牛膝二丙

甘草二丙

防風三丙

乾地黃四丙

芎藭二丙

當歸三丙

桂心三丙

五味子三丙

白木二丙

秦艽二丙

防己二丙

椒二丙

茯苓西四丙

附子一丙

細辛二丙

黃芩二丙

右二十二味切絳袋貯以酒三斗五升浸秋冬七日春夏五
日一服四合日二細細加之以知為度得食羊鹿鹿車肉膠雞亦得
食忌海藻菘菜猪肉冷水桃李雀肉生葱心生菜薰蒸酢物並

出第六卷中

風毒脚弱痺方六首

千金療惡風毒氣腳弱無力頑痺四肢不仁失音不能言毒氣
衝心有人病者但一病相當即服第一服此麻黃湯次服第二
第三第四方

麻黃一兩去節

防風二丙

大棗二十枚擘

當歸二丙

茯苓二丙

升麻二丙

葛根二丙

白朮二丙

芍藥二丙

杏仁三卜枚去皮尖

甘草二丙

桂心二丙

右十四味切以水九升清酒二升合煮取二升半分四服日三
夜一覆令小汗粉之莫令見風忌海藻菘菜生葱桃李雀肉酢物
第二服獨活湯方

獨活四丙

乾地黃三丙

芍藥二丙

葛根二丙

桂心二兩

生薑五兩

麻黃二兩去節

甘草二兩

右八味切以水八升清酒二升合煮取二升五合去滓分四服日三夜一犯之一世不愈忌海藻菘菜生葱蕪荑脚弱特忌食瓠子蕺菜

第三服兼補厚朴湯并治諸氣欬嗽逆氣嘔吐方

吳茱萸升方三兩

半夏七兩洗

乾地黃二兩

生薑一斤

芍藥二兩

當歸二兩

人參二兩

桂心二兩

厚朴二兩

芍藥二兩

右十二味切以水二斗煮豬蹄一具取一斗二升去上肥內清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十里久忌羊肉

鴆蕪荑生葱海藻菘菜

又第四服風引獨活湯兼補方

獨活四兩

人參二兩

附子炮一兩

大豆升

桂心二兩

防風二兩

芍藥二兩

當歸二兩

甘草三兩

黃耆二兩

乾薑二兩

甘草二兩

升麻半兩

桂心二兩

防風二兩

芍藥二兩

細辛一兩

蜀椒一兩

右十三味切以水九升清酒三升合煮取三升半去滓分四服相去二十里久忌海藻菘菜猪肉冷水生葱醋物

又療腳弱神驗防風湯方

防風二兩

獨活二兩

黃芩二兩

首芋二兩

葛根二兩

芍藥二兩

細辛一兩

烏頭三枚炮

茯苓三兩

石膏二兩

桂心一兩

生薑三兩

烏頭三枚炮

茯苓三兩

甘草二兩

桂心二兩

防風二兩

芍藥二兩

細辛一兩

蜀椒一兩

右十七味切以竹瀝一斗煮取四升去滓分六服一日一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人腳弱先常服竹瀝湯四劑

未覺增損作此方後覺得力云脉沉細駛風在內者作此湯也忌海藻菘菜豬肉冷水生葱生菜醋物

又越婢湯療風婢脚弱方

麻黃六兩去節 石膏半斤碎 白朮四兩 大附子一枚炮

生薑三兩

大棗十五枚擘

甘草二兩炙

右七味切以水七升先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取二升分三服覆取汗一方用附子二枚忌海藻菘菜豬肉冷水桃李雀肉等並出第十卷中此仲景方本云趙婢加杏湯加附子一枚多又無附子胡洽云若惡風者冷痰者加白朮

大小續命湯中風方二首

唐侍郎大續命湯主手足痙急及不隨此方療若腳氣上文中風四肢壯熱如火寧急或縱不隨氣衝脣中方

當歸二兩

芍藥一兩 芒硝一兩 桂心一兩 麻黃二兩去節

芍藥一兩

石膏一兩碎綿裹 生薑二兩 人參一兩

黃芩一兩

杏仁四十枚去皮尖入甘草一兩炙

右十二味切以水九升煮取三升去滓分四服忌海藻菘菜生葱等深師同

又小續命湯療中風口不能言咽中如塞或緩或急身體不自收冒昧不知痛處拘急不得轉側方

麻黃二兩去節

甘草一兩炙

桂心一兩

石膏二兩碎綿裹

芍藥二兩

乾薑分

黃芩一兩

當歸分

杏仁二十枚去尖皮兩入

右九味切以水九升煮取二升去滓分二服薄取汁莫見風

不差復作禁如藥法并療久聲效失聲上氣嘔逆面目腫皆愈服湯已多體虛宜兼補忌海藻菘菜生葱等

不仁不能行方三首

千金風引湯療兩脚疼痺腫或不仁拘急屈不得行方

麻黃二
去節

吳茱萸碎一
本枝去兩皮尖碎

獨活二

秦艽一
根去兩皮

石膏碎二
西

杏人本枝去兩皮尖碎

白朮三
根去兩皮

茯苓一
根去兩皮

桂心一
兩

人參一
根去兩皮尖碎

細辛一
根去兩皮

乾薑一
根去兩皮

防風一
兩

防已一
兩

芎芻一
根去兩皮

甘草一
根去兩皮

附子炮一
兩

右十七味切以水一斗六升煮取三升分三服取汗佳忌海

藻菘菜生葱生菜桃李雀肉醋物等

又小風引湯主中風腰脚疼痛弱者方

獨活一
兩

防風一
兩

當歸二
根

芍藥三
根

大豆升一
升

人參一
根

乾薑一
根

附子炮一枚

生石斛一
兩

甘草二
根

丹參一
根

山茱萸一
根

右十味切以水九升酒三升煮取三升去滓分四服服別如

人行十里久已海藻菘菜豬肉冷水醋等一方無乾薑石斛
有桂心黃芩

又金牙側子酒療風濕痺不仁腳弱不能行常用古方今新出

側子炮

牛膝

丹參

山茱萸

蒴藋根

杜仲去皮

細辛

石斛各四

防風

乾薑

椒汗

獨活

當歸

秦艽

桂心

芎芻

當歸

白朮

茵芋炙各三分

五加皮分

薏苡人一升

右二十味並細切綃袋盛清酒四五升漬五六宿初服三合

日再服稍加以知爲度患目昏頭旋者彌精忘猪肉冷水生

葱生菜桃李雀肉等並出第七卷中

方半無金芽
未詳其名

因腳氣續生諸病方四首

千金云雖患腳氣不妨乳動石發皆須服壓石藥療之夫因腳氣續生諸病者則以餘藥對之或大小便不利則以豬苓茯苓

及諸利小便藥療之大便極堅者則用五桑麻人等丸療之遍體腫滿成水病者則取療水方中諸療水之藥療之餘皆倣此更無拘忌出第七卷中

又猪苓散主虛滿通身腫利三焦通水道方

茯苓

葛莖歷熬人參 防風

澤瀉

甘草炙 桂心 白朮

狼毒

乾薑各赤小豆二分 蔴蓉半分 猪苓三分 女萎五合熬

大戟分

五味子分

右十七味搗篩酒服方守七日三夜一老一小錢七以小便利爲度忌海藻菘菜生葱桃李少佳肉醋物等

又茯苓丸生水脹甄權爲安康公處得差方

茯苓

白朮

椒目分

葶苈六分

澤瀉

芫花熬

防己各五分

赤小豆

前胡

桂心分

甘遂分

芒消五分

右十二味

搗末蜜和丸如梧子大湯服五丸日一稍加以知爲度

忌桃李

鷄肉生魚醋物並第二十卷中

又淮南五朵丸療祕症及辟飲食不生肌膚虛損不足三焦不調和

榮衛利脉藏補三焦方

大黃

一斤熬三斗半下

前胡各二兩

半夏洗

蓴蓉

芍藥

茯苓

細辛

當歸

葶苈

熬各

右九味搗篩蜜和搗萬杵食後服十五丸如梧子日三服忌

羊肉

鴨生菜醋物

一斤有黃芩

又麻人凡癥大便堅不利而渴方

麻子仁升

枳實各八兩

杏仁去皮熬

芍藥八

人升枳實各八兩

大黃一
厚朴一尺
炙

分

右六味搗篩蜜和丸如梧子飲服五丸日三加至十九一本方藥六兩並出第十五卷中

此本仲景傷寒論脾約丸方時後無杏仁散此又兼湯煎

之法春秋宜服散湯方六首

千金八風散療風虛面青黑色不見日月光脚氣彈弱淮經

面青黑腫不見日月光主肝腎治肝方

從苔八

烏頭一八炮鍾乳四分

研

署預四分

澤瀉四分

黃耆四分來門冬四分五味子二分

龍膽四分

遠志皮四分茺綠子四分細辛四分

牛膝四分

杜仲四分昌蒲四分柏子人四分

山茱萸四分防風四分知母四分

秦艽四分石帝四分柏子人四分

乾地黃四分茯苓四分

附子五分白术四分甘草五分

石斛六分

天雄六分草薢四分炮

人參五分

菊花分

巴戟天去芎芍藥分附子三分黃耆二分

桂心分細辛三分桔梗分

白飲分

人參分芍藥分牛膝四分署預分

細辛三分桔梗分

姜蕤分

姜蕤分秦艽分烏喙四分

牛膝四分

天雄分

天雄炮分蓆苔分單薢分

分

菊花分

杜荆子分天雄炮分蓆苔分單薢分

分

茯苓四分

遠志四分炮分山茱萸分黃芩分

分

石斛三分

白朮三分昌蒲四分炮石三分沉鬚

分

厚朴三分

龍胆二分蜀樹三分汗

分

右三十三味搗篩酒服方寸匕日三不知加至二匕忌豬肉
冷水羊肉鴨海藻菘菜蕪荑桃李韭肉生菜醋物等
又大人風散療諸緩風濕痺腳弱方

右三十二味擣篩溫酒服半方寸匕日三不知稍增趣令微
覺爲度忌豬羊肉冷水桃李雀肉醋物鴟生葱生菜海藻

菘菜

薑無芍藥牛膝
一木有甘草乾

又凡脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殂故
脚氣之人皆不得大補亦不可大瀉終不得畏虛故預止湯不
服也如此者皆死不療世間大有病人親朋故友遠來問疾其
人曾不經一事未讀一方自騁了了詐作明能談說異端或
言是虛或言是實或云是風或云是盪或這是水或云是痰紛
紜謬說種種不同破懷病人心意莫知孰是遷延未定時不待
人欵然致禍各自散走是故大湏好人及好名醫識疾深淺探
臍方書博覽古今是事明解者看病不爾大悞人事竊悲某如
此者衆故一一顯析具述病之由狀令來世病者讀之以自防備
也但有一也夏憲積思喜怒悲歡復隨風濕結氣欬時嘔吐食以
变大小便不利時洩利重下溺血上氣吐下乍寒乍熱卧不安
席小便赤黃時時惡夢夢與死人共飲食入塚神室魂飛魄散
筋極則傷肝傷肝則腰背相引難可俛仰氣極則傷肺傷肺則
小便有血日不明髓極則陰痿不起住而不卒骨極則傷腎傷
腎則短氣不可以立陰疼惡寒甚者知縮陰下生瘡濕痒搔之
不欲止汗出此皆為腎病甚者多遭風毒四肢頑痺手足浮腫
名曰脚弱一名脚氣醫所不療此皆主之方

天門冬

三十半去心搗
壓取汁盡

枸杞根

切二斤半淨洗水兩石五

升煮取

斗清

酥鍊

三升

生地黃

切三斗半搗壓

摩骨一具六水一

白蜜

三升

右六味並大斗銅器中微火先煎門冬地黃汁減半乃合煎
取大斗二斗下後散藥煎取一斗內銅器中重金煎令隱掌可
丸平旦空腹酒服如梧子二十九日二趙加至五十丸搗四時王

相日合之忌生冷醋滑雞猪魚鮓葱蒜油面蕪荑等物
散藥如左

茯苓 柏子人

桂心桂

白朮

姜蕤 冒蒲

遠志志

澤瀉

署預

人參

石斛

牛膝

杜仲 枳實灸

細辛

蔓荆子

獨活

續斷 巴戟

狗脊

黑者

黃耆

五加皮

草薢

甘草

薏苡仁

胡麻人 大豆卷

各二兩

阿膠

炙十兩

蜀樹汗

鹿角膠

炙五兩

石南

茯神

二兩

阿膠

大棗

一百枚

右三十八味搗絹下篩內煎中有牛髓鹿髓各加三升大佳小

便此去柏子人加秦艽二兩乾地黃六兩陰痿失精去姜蕤
加五味子二兩頭風去柏子人加菊花二兩防風二兩小便
利陰氣弱去絅辛防風加山茱萸二兩腹中冷去防風加
乾薑二兩無佗疾依方合之凡此前至九月下旬採藥立冬
日合而服之至五月上旬止若十二月臘日合者經夏至七
月下旬即服之若停經夏不壞當於舍北陰處入地深六尺
填沙置藥沙中上加少土覆之即經夏不壞也女人先患熱
者得服冷者勿服忌羊肉飭生菜生葱醋物海藻菘菜桃李
雀肉青魚鮮等

又大驚甲湯療脚弱風毒癰氣上及傷寒惡風溫毒及山水
瘴氣熱毒四肢痺弱方

散藥甲丸

防風一兩

麻黃一兩

去節

白朮一兩

升麻一兩

大棗二十枚

吳茱萸五

知母一兩

升麻一兩

大棗一兩

桂心桂一兩

貝齒七枚

茯苓兩

橘皮一兩

芎藭粥一兩

杏仁一兩去皮尖碎

犀角半兩

生薑三兩

人參一兩

赤小豆三合

青木香半兩

鹿麝香研三鉢

羚羊角一分

麥門冬去心一兩

大黃半兩

薤白十四枚

烏頭七枚炮

石膏一兩碎

雄黃二分研

半夏洗十四枚

當歸一兩

姜蕤一兩

芍藥兩

甘草一兩炙

當歸一兩

右三十一味切以水二斗煮取四升去滓分六服相去十里久得下止一方用大黃二分畏下可用一分也一方用羚羊角二分毒盛可用三分也忌海藻菘菜不覓菜桃李雀肉醋物羊肉錫等一方有山萸翼方無知母升麻橘皮芍藥當歸姜蕤

又小鼈申湯療身體虛脹如微腫肩心痞滿有氣壯熱少腹厚重兩脚弱方

鼈甲三兩

升麻三兩

黃芩三兩

麻黃二兩去節

羚羊角三兩

前胡四兩

桂心三兩

烏梅二七枚擘

杏仁三兩去皮失人

薤白二兩一熬

右十味切以水一斗煮取一升七合去滓分三服此常用若體

強壯湏利者加大黃二兩忌覓菜生葱又療風虛腳弱手足拘急掣疼痺不能行動脚跌腫上膝少腹堅如繩約氣息常如憂患不能食飲者皆由五勞七傷腎氣不足受風濕故也宜服內補石斛秦艽散方

石斛四分

秦艽五分

山茱萸三分

蜀椒二分汗

五味子二分

麻黃三分去節

桔梗三分

附子炮

白芷三分

白朮三分

獨活

人參三分

天門冬四分

杜仲四分

當歸五分

杜仲五分

莽草三分

當歸五分

乾薑五分

防風五分

細辛三分

右二十三物搗篩爲散酒服方寸匕日再服不知加至二七虛人三建皆炮實人亦可生用風氣者本因腎虛既得病後毒氣外滿則灸洩其氣內滿則藥配之當其救急理必如此至於風消退而體虛弱餘毒未除不可便止宜服此散推陳致新極爲良妙此旣人情可解者無可疑焉尼桃李雀肉猪肉冷水生薑、生米鯉魚並出第十七卷中

脚氣嘔逆不下食方二首

文仲瓜飲療脚氣嘔逆不得食方

生瓜一枚四破水九升
熬取五升去滓

白朮四兩

甘草一兩炙

生薑二兩

右四味切三物內瓜汁中煮取二升去滓溫分三服已

桃李雀內海藻菘菜出第十九卷中生瓜恐是木瓜

延年茯苓飲生姜脚氣腫氣急上氣心悶熱煩嘔逆不下食方

茯苓三兩

紫蘇葉兩

杏人三兩去兩橘皮

兩

升麻三兩

柴胡兩

生姜四兩

檳榔十一枚并皮子碎

右九味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服如人行八里久足醋物出第十九卷中

脚氣疼不仁方二首

病源此由風濕毒氣與血氣相搏正氣與邪氣交擊而正氣不宣散故疼痛在膚腠血氣則滯隔則皮膚厚搔之如隔衣物不竟知名爲不仁也出第十三卷中

蘇恭療初患脚足皮膚舒緩足上不仁膝下疼痛眉眼動左臂下氣每飽食即發隔上熱臍下冷心虛陰汗且疼兼補煮散方

黃耆

防風

當帰

人參

桂心

獨活

芎藭

草薢

防己 各六

茯苓

白术

丹参 各八

附子 生

甘草 炙各四兩

杏仁 去皮尖

生地黃

生薑

礫石 如小豆二十分碎

白朮

右十八味並切分之為三十服別以生薑一兩生地黃一兩杏人一枚碎以水二升煮取七合布綏去滓一服之常以日晚或夜中服之不妨公事如逆嘔者加半夏一兩如前加減法已心猪肉冷水海藻菘菜生葱桃李雀肉醋物羊肉蕪荑及錫三日以後並無禁忌

又側子酒主脚氣春夏發入秋腫消氣定但苦腳弱不能屈伸足上不仁手指脹悶不得屈伸四肢腰頸背皆廢者服此酒方

側子 生

乾薑 各五兩

丹參

牛膝 各六

金牙 暈
碎綿

礫石

生石斛

乾石南 各六

獨活 六兩

草薢

生菜蔓

生地黃 各十兩

防風

茯苓 各四

五加皮

薏苡仁 各一

茵芋 炙

椒 各一

桂心

天雄 生

人參

芎藭

當歸

白朮

右二十五味切絇袋貯清酒六七斗漬之七日成一眼一小盞日二三服量性多少稍加以婢為度若婦人服去石南丈夫若冷著孔公孽鍾乳等多至一二斤少至七八兩服此酒時湧隨病內外灸三兩處以洩氣忌猪肉冷水醋物生葱桃李雀肉生菜蕪荑等並出第一卷中

脚氣衝心煩悶方二十二首

廣濟療腳氣衝心悶洗脚漬湯方

糜穰 金中

右一味多煮取濃汁去滓內椒目一斗更煎十餘沸漬脚三

兩度如冷溫清洗差止無所忌

又療脚氣急上衝心悶欲死者方

松榔人細末三顆 生薑汁合 童子小便二升新者
不須煖

右三味搗頭服湏更即氣退若未全差更服最佳利三兩

行無所忌

又療脚氣心煩悶氣急卧不安方

半夏一升湯洗去滑 生薑八分桂心三分 檳榔人一兩

右四味切以水八升煮減半內檳榔人末前取二升八合絞去滓分溫三服服別相去如人行五六里進一服微利為度

尾羊肉生葱粘食鴟等物

又療脚氣攻心悶脹脹氣急欲死者方

吳茱萸半升切合 木瓜切合 檳榔細碎竹葉 牡丹

右四味以水一斗煮取三升分三服得快利即愈忌生菜熟

麯蕎麥蒜物等

又療腎虛風腳氣衝心亦氣下墮小便數滯冷腰疼時時心悶

氣急欲絕四肢無力射干丸方

射干

昆布八分通草四分犀角六分

杏仁一分去皮熬 漢防己分旋覆花一分 青木香八分

旋復花四分白頭翁四分獨活六分葶苈子入分熬

右十二味搗篩蜜和丸如梧子酒下二十丸漸加至三十丸日

再服不利空腹服羹枳榔牽根皮下更佳忌生菜熟麯蕎麥

蒜姜曲粘膩醋物並出茅卷中

崔氏旋復花湯療腳氣衝心欲死者服之救病因急此方最先

赤茯苓七枚

橘皮兩

生薑三

前胡四

乾薑一

擘

白前一

香豉七合

綿裹文一升

右十一味切以水八升煮取二升四合分三服相去十里久
以下氣小便利為度忌生葱酢物

又治腳氣癆痺不仁兩脚緩弱腳腫無力重者少暖氣滿膏中
痞塞見食即嘔或兩手大拇指不遂或兩腳大拇指不遂或小便
澀第一療氣滿嘔逆不下食旋復飲子方

旋復花

橘皮

生薑

紫蘇莖

茯苓

杏豉綿裹

大棗

擘

齊氣下訖

右七味切以水八升煮取五升四合分三服服別相去十里
久日一劑凡服五劑上氣即下小便澀者加桑根白皮四兩

慎生冷猪肉蒜麪魚粘食如其服此飲二三劑氣下訖即湏
服大犀角湯第一方十四味者是也服當小便利為度如其
膏膈中氣滿者加半夏四兩湯洗侍腹內氣和腳腫欲消皮
膚猶如隔帛者宜服犀角麻黃湯一二劑五日後然服之忌

生葱酢物

又大犀角湯療腳氣毒衝心變成水身體遍腫悶絕死者方

犀角

屑

桑根白皮

四

白朮

兩

桂心

二

白朮

兩

桂心

二

桂心

四

桂心

兩

桂心

四

桂心

兩

桂心

十枚

橘皮

兩

桑根白皮

四

白朮

兩

桂心

二

白朮

兩

桂心

二

白朮

兩

桂心

四

桂心

兩

桂心

四

桂心

兩

桂心

十枚

生薑

一

桑根白皮

四

白朮

兩

桂心

二

白朮

兩

桂心

二

白朮

兩

桂心

四

桂心

兩

桂心

四

桂心

兩

桂心

十枚

右十三味切以水九升浸一宿煮取二升七合或水一斗煮
取三升分為三服服相去如人行十里久以下氣利小便為
度忌酢物桃李雀肉生葱等

又犀角麻黃湯方

犀角

兩

麻黃

二

兩

桂草

一

兩

茯苓

二

兩

甘草

一

兩

桂草

生薑 分

細辛 一兩

桂心 一兩

右十五味切以水一斗先煮。麻黃去沫訖取汁八升下諸藥煎。取二升七合分三服。相去十里夕服訖。翌日待三日後若其皮膚不仁差即停不差宜更服之。不得過三劑。即老訖脚中無力者宜服獨活。羣角湯三二劑即愈。已。海藻松菜醋物。猪肉冷水桃李雀肉生葱生菜等。

又獨活羣角湯

獨活 三兩
側子 炮一兩
生薑 三兩
桂心 半兩
甘草 二兩
當帰 二兩
芍藥 三兩
茯苓 四兩

石斛 二兩
丹參 二兩
防己 二兩
芎藭 二兩

白芷 二兩
川芎 二兩

右十四味切以水一斗煮取二升七合去滓分三服相去十里久服訖任卧不須取汗。又服三劑隔五日一服初服此

藥覺腰內氣散兩脚有力行動無妨或可即停又可常服香豉酒炙三里穴絕骨各三百壯忌海藻菘菜猪肉冷水生葱酢物等。

又香豉酒方

取香豉一斗以酒三斗浸三日取飲任性多少利即減之不利任性其中用橘皮生薑調適香味任意服盡後作以毫為度並出第六卷中。

文仲療脚氣心煩不下食方

牛乳一小升 杏仁四十九枚皮橘皮一分 生薑 切

右四味合煎取八合空心頓服令盡虛人或微利亦無害有人服驗備急同

又毒氣攻心欲死者方。與蘇徐木瓜二物相加減用

吳茱萸四

淡竹葉半升

切一

右二味以水一斗煮取二升去滓分五服兼主上氣腫滿蘇
恭云大快比加檳榔人四十枚_{末之}更快於本方備急同徐王用尋常
氣滿日服一劑檳榔七十枚合皮碎橘皮一兩厚朴炙吳茱萸各三兩生薑四兩

水三升煮取一升二合分二服此湯性溫去冷脹亦蘇家之法

備急同

又若毒氣攻心手足脈絕此亦難濟不得已作此湯十愈七八

方千金治毒氣入腹因
閼欲死腹張茱萸湯方

吳茱萸半升木瓜二枚切

右二味以水一斗三升煮取三升分三服或以吐汗便活蘇恭
云服得活甚易但鑽擊急少時熱悶耳此方是為起死是高
麗老師方與徐王方相似故應神妙備急千金蘇徐同方云無木
瓜可取吳茱萸一色煮服又方加青木香兩犀角二兩亦云此湯
起死人

又腳氣冷毒悶心下堅背膊痛上氣欲死者方

吳茱萸半升

檳榔四十枚去皮取碎

青木香二兩

犀角

三兩

骨

右六味切以水一斗煮取三升分三服大効破毒氣尤良忌羊
肉鴆備急同

又腳氣入腹心悶者方

濃者煮大豆汁飲一大升不止更飲大驗備急同

又療腳氣入心悶絕欲死者

半夏三兩洗切生薑汁二升

右二味內半夏煮取一升八合分四服極効心羊肉鴆備急
同並出第九卷中

蘇恭去若風熱輕但毒氣入胃唯心悶煩熱索水灑膏面乾嘔
好叫喚欲斷絕者服此犀角湯効方

犀角屑 青木香

羚羊角屑 人參

竹茹

沉香

射干

麥門冬

茯苓各三兩

麝香

雞舌香各二兩

石膏八兩碎

右十二味切以水一升煮取二升二合分四服相去六七里晚再服如覺眼明心悟若強人作三服此謂救死已試大驗若嘔逆不下食水擣水即吐出者加半夏四兩生薑一兩橘皮一兩加水一升半煮取二升三分已心五辛羊肉湯洗物唐侍中同出第二

卷中

近效救脚氣衝心此方甚効

枳榔人穀

右一味搗篩取童子小便半升微溫和未強半頓服如一炊火不轉動更取半准前服令盡得通即好甚良

又療腳氣擡肩喘并腳氣衝心方

烏豆二升

作大

右一味以水五大斗煮甚酌有一半即休分向兩故淹毫中以兩脚各於一毫中浸透人從膝向下持之持百遍以來必差如無淹毫取故毫不滲者亦得極重不過更浸一度

心差房給事用極効

又加減青木香丸方

崑崙青木香六分

大腹枳榔人

桂心四分

芍藥六分

枳實七分

大黃十分

右六味搗篩蜜和為丸如梧子大以酒若飲任性服十五丸日二服稍稍加至大便微微通軟為度忌生葱已前方療一切腳氣發上衝祕悶有所不快即服三兩日取宣通亦療卒心痛腰膝間冷腰水服亦佳

又療腳氣上衝心狂亂悶者方

赤茯苓十二分 漢防己八兩 茄菜十分 桔梗人十二分

甘草八分 有李人十分 枳實八分 冬著牛膝十六分

春著大黃八分

右九味搗篩密和丸如梧子空腹清酒服十五丸日再服漸加至二十丸以微通利為度利多減丸冬則去大黃加牛膝若體中虛弱去大黃加牛膝服亦得其藥比貢州土上好者惡藥服無益忌海藻、菘菜酢物生冷油膾雜向熟麥新炊飯及陳臭難消之物一切勿食

又療脚氣衝心肺氣急及水氣卧不得立驗方

曹州苦蘿子四分 好者紙上熬令紫色別搗如

杏人四分 去尖皮取人切碎甘草四分 海蛤四分 別

郁李人

麻子大升搗

漢防己五分

吳茱萸二分

枳榔人分 大黃八分

右九味搗篩為散合研令調和取蒸餅中塗膏二分去皮攪和白蜜少許更於日中搗一千二百杵方止空腹一服十五丸如梧子漸漸加至下洩為度服良久待丸散後可食忌海藻

菘菜

又淮前然常服方

白蒺藜子

取一大升切諫去角去浮去皮根

五味子

八分 牛膝八分

杏仁一小升去皮尖兩切碎熬黃

人參八分 不傳車前子二分 破矣

桑根白皮兩分 通草一兩

右十味搗篩蜜和丸如梧子空腹一服十五丸漸漸加至二十五丸日再服亦得酒飲任情服良久待散可食忌海藻菘菜牛肉熟麪潘珍侍御襄成錄留

嶺南瘴氣腳氣酒湯散方十三首

千金夫脚氣之疾先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺疼痛

或兩脛腫滿行起屈弱或上入少腹不仁或時冷時熱小便祕
濕喘息氣衝喉氣急欲死食嘔不下氣上逆者皆其候也若先
覺此證先與犀角旋復花湯方

犀角(屑) 旋復花(各)

橘皮(三)

茯苓(兩)

大棗(二十枚擘)

杏豉(一升)

紫蘇莖(捲生姜)

桂心(兩)

桑根白皮(各)

右八味切以水八升煮取二升七合分三服相去十里久服
之以氣下小便利為度如其不下服後大犀角湯尼醋物

備急同

又大犀角湯方

犀角(屑)

旋復花

白朮

桂心

防己

黃芩(各)

生薑(三兩)

香豉(綿裹一升)

橘皮(三)

茯苓(各三兩)

大棗(計枚)

前胡

桑根白皮(各四兩)

右十四味切以水九升煮取二升七合分三服相去十里久
取下氣為度若得氣下小便利脚腫即消能食若服湯訖
不下氣急不定仍服後湯尼桃李雀肉生葱醋物以上二
方並出崔氏文仲同

又方

甘草(炙)

犀角(屑)

防風(各)

桂心(兩)

杏人皮(二兩去大)

獨活

防己(各)

石膏(四兩碎)

芎藭(各二兩)

麻黃(去節)

生姜(各)

白朮(各二兩)

當歸(各二兩)

羚羊角(屑)

黃芩(各一兩)

右十五味切以水二斗先煮麻黃取八升汁下藥煎取三升分

三服相去十里久三服訖覆取汗五日後更服一劑取汗同前

忌海藻菘菜桃李雀肉生葱

又療脚氣初發從足起至膝脛腫骨疼者方

牛膝五兩

狗脊

姜桂各二分
薏苡仁一升

白芷三兩

麥門冬升

生石斛八分
厚朴一錢

枳實

桔梗三分

生地黃切一錢
柏子仁四兩

黃芩

遠志去心

荆子三分

右三十九味切以酒八升漬七日溫服一合 日四五衣一石
藥細研如粉別絹袋盛共藥同漬藥力和善主瘡極多凡
是風虛四體小覺有風病者皆須持服之無不療者服者
一依方合之不得輒信人大言浪有加減也忌猪肉冷水生
荀生菜桃李韭內蕪荑等並出第七卷中

又小金牙散療南方瘴癘疫氣腳弱風邪鬼注方

金牙五分

牛黃一分

蜀樹汗

由跋

草薢

黃芩

麝香

烏頭各一分

細辛三分

桂黃

朱砂

蜀樹汗

由跋

萎蕤三分

桂心

莽草各三

犀角三分

乾薑三分

蜈蚣一枚

黃連四分

大黃連四分

右十九味搗篩合牛黃麝香搗三十杵溫酒服錢五匕日三
夜二以知為度絳囊盛帶男左女右一方寸匕省病問孝不避
夜行塗單人中晨昏霧露亦塗之忌豬肉冷水生血物生菜
等出第十卷中

延年療得嶺南瘴氣熱煩短氣心悶氣欲絕方

香豉一升

梔子一枚擘

升麻二分

右三味切以水四升煮取一升半分為三服即定也

又嶺南瘴氣面脚腫下寒乍熱似瘧狀脚腫氣上心悶欬嗽攤緩

頑癥方

大麻仁一兩

升麻一兩

射干

昌蒲

甘草炙

麻黃去節大黃邊各一錢

豆蔻三分

芒消半兩

右九味切以水六升煮取二升去滓乃內芒消分三服微利一二行解毒熱忌羊肉鷄海藻菘菜並出第十九卷中蘇唐豉酒若能常飲此酒極利腰腳嶺南常服此酒必佳及卑濕處亦佳此又恐有脚氣似著即宜服之方

香豉升三斗 美酒香者一斗

右二味先取香豉三升三蒸三暴乾內一斗酒中漬三宿便可飲隨人多少用滓薄脚良

又方

大豆新者一斗九

蒸九暴

右一味以美酒三斗清三宿便可隨性多少飲盡復作常服甚佳

又方

香豉升三

犀角八兩

右二味其豉如前不能久蒸九暴三蒸三暴亦得用一生絹袋貯用好美酒九升漬之五日許其犀角末散著袋外每服常攬令犀角味入酒中服三合量性增減日三服其酒夏日勿作多恐壞不奈又可用此方豉三合橘皮生薑葱細切任意調和先熬冷香次下諸物熬熟以綿裹內鑄中著酒任意性飲之並出上卷中

外臺祕要方卷第十八

右迪功郎充兩浙東路提舉糸鹽司幹辦事張寔

校勘

