

濟生拔粹方

十一







調中益氣門

調中益氣湯

和中丸

喜食無厭散

檳榔丸

消積滯集香丸

黃耆當歸湯

消渴門

和血益氣湯

眼門

百點膏

黃芩黃連湯

蔓荊子湯

熟乾地黄丸

血陰腎氣丸

頭痛門

清空膏

徹青膏

白止散

安神湯

婦人門

涼血地黄湯

酒煮當歸丸

丁香膠艾湯

補經固真湯

衄血吐血門

吐血方

救脈湯

諸痛門

獨活湯

破血散痛湯

蒼朮復煎散

小兒門

益黃散

消毒救苦散





調中益氣門

調中益氣湯

和中丸

喜食無厭散

檳榔丸

消積滯集香丸

黃耆當歸湯

消渴門

和血益氣湯

眼門

百點膏

黃芩黃連湯

蔓荊子湯

熟乾地黄丸

血陰腎氣丸

頭痛門

清空膏

徹青膏

白芷散

安神湯

婦人門

涼血地黄湯

酒煮當歸丸

丁香膠艾湯

補經固真湯

衄血吐血門

吐血方

救脈湯

諸痛門

獨活湯

破血散痛湯

蒼朮復煎散

小兒門

益黃散

消毒救苦散





黍粘子湯

○腸澼下血門

升陽去熱和血湯

○馬刀瘡門

散腫潰堅湯

救苦勝靈丹

升陽托裏湯

保生救苦散

聖愈湯

○雜病門

朱砂安神丸

補氣湯

當歸六黃湯盜汗

發表解表升麻湯

蘭室秘藏藥目錄 濟生拔粹卷第十六



東垣先生試効  
調中益氣

治脉弦洪緩而沉則時瀉悶肢節痠痛沉重嗜卧  
無力不思飲食並皆治之

黃耆壹分 炙甘草半另 人參半另 有嗽者去柴胡叁分

橘皮壹分 枳實壹分 此諸者勿加枳實分木香壹分

升麻壹分 此味為上氣不足胃氣與

蒼朮半另 黃柏貳分酒洗

如顯燥熱是下元陰火蒸蒸然發也加

生地黄貳分 黃柏貳分

如大便虛坐不得或大便了而不了腹中常常逼迫日血虛

血澁加 當歸身叁分 无此證則去之

如身躄沉重雖小便數多亦加

茯苓貳分 蒼朮壹分 澤瀉半另 黃柏叁分 時暫從去濕也

如胃氣不和加

半夏半另 洗 生姜叁片 有嗽者去之 生地黄貳分 以製半夏壹毒

如痰厥頭痛非半夏不能除此是太陰脾所作也如兼躁熱

加黃柏貳分 生地黄貳分

如無已上證只服前藥

右件劉如麻豆都作一服水一大盞去滓帶熱食遠服之

如夏月瀉加白芍藥二分 春月腹中痛尤宜加如惡熱而瀉

或腹痛者更加 芍藥半另 生黃芩貳分

如惡寒腹中痛加中桂三分 去黃芩謂之桂枝芍藥湯亦於

芍藥湯中加之同煎



如冬月腹痛不可用芍藥蓋大寒之藥也只加

乾姜真八分或加半夏作茶以牛姜少許製之

如秋冬之月胃脘四道為衝脈所逆脇下太陽脈二道而

上行病名曰噎逆其證氣上衝咽不得息而喘息有音不得

卧用吳茱萸半升或香另半湯洗去苦觀厥氣多少而用之

亦於前藥中作一服服之

如夏月有此證為大熱也此病隨四時為寒熱溫涼也宜以

黃連酒洗酒黃柏酒洗酒知母各等分

右為細末熟湯為丸如桐子大每服一百丸或二百丸白湯

送下空心不令胃中停留以美肉食早饑壓之治飲食勞倦

所得之病乃虛勞七損證也常宜以甘溫平之甘多辛少是

其治也

**胃中寒食無味**滋形氣喜飲食方在脾胃論中進食丸是也

**和中丸**補胃進食

乾生姜 橘皮 人參各一分 乾木瓜一分 炙甘草一分

右為細末湯浸餅為丸如桐子大溫水送下

**積滯丸**消食破滯氣

檳榔 木香 人參各一分 橘皮五分 炙甘草一分

右為細末湯浸餅為丸如桐子大溫水下

**損傷滯集香丸**治傷生冷硬物不消

京三稜 廣茂 青皮 陳皮 川練子

益智 茴香 丁香各一分 巴豆和皮米炒

右為細末醋糊為丸每服五七十九生薑湯下食前

**治熱上攻頭目公身骨皆發熱**



當歸身壹分酒洗

黃芩半兩

右咬咀水煎服

消渴門

消渴消中自古只治燥只止渴悞矣殊不知足陽明主血所生病手陽明主津所生病此治津不足治在下焦急攻其陽無攻其陰

**治口乾舌乾小便數舌上赤脉此藥生津液除乾**

燥生肌肉

杏仁陸分 生甘草參分已上二味 石膏陸分治小便數也

酒黃連捌分治舌赤脉也 桃仁陸分 酒生地黃柒分

酒黃柏壹分 酒當歸稍津分 柴胡 炙甘草參分

升麻壹分 紅花少許 酒知母半分 麻黃參分 酒防己伍分

羌活半分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去滓稍執服食後忌酒醋濕麪房事

眼門

**張濟民病翳六年以至遮障瞳人因此藥見効**

黃連揀淨洗乾分剉如麻豆大水壹大椀熬至壹半再入下項藥 當歸身陸分

甘草陸分 防風捌分 麩仁去皮米參分

右各剉如麻豆大麩仁別研如泥同熬至滴在水中不散去沫入蜜少許再熬少時為度臨卧點尤効

**黃芩**

酒洗炒壹兩 黃連酒洗炒壹兩

草龍膽酒洗四椀炒四椀 酒生地黃各壹兩

右咬咀每服一錢水煎服



源勞役飲食不節內障眼病此方効之如神

黃耆 人參各青 升麻 升麻 蔓荊子 貳分半

黃柏 各四分 白芍 各四分

右吹咀每服三五錢水煎

**養血散**

治血弱陰虛不能養心致心火旺陽太甚偏頭腫

悶腫子散大視物則花法當養血涼血益血除風散火則愈

矣

熟乾地黄 壹兩

當歸身 酒洗焙五分

柴胡 捌分 人參 貳分 地骨皮 叁分 甘草 炙叁分 黃芩 半兩

黃連 叁分 枳殼 炒叁分 五味子 叁分 天門冬 去心叁分

生地黄 酒洗柒分半

右同為細末煉蜜為丸兼豆大每服一百丸茶清送下食遠

此壯水之主以鎮陽光

熟地黄 貳兩 牡丹皮 生地黄 酒洗 當歸稍 酒洗

五味子 乾山藥 柴胡 各伍分 山茱萸 半兩

茯苓 澤瀉 各貳分半

右同為細末煉蜜為丸桐子大朱砂為衣每服五七十九淡

鹽湯下空心

**頭痛門**

治偏正頭痛年深久不愈者善療風濕熱頭痛上雍損

目及腦痛不止

羌活 防風 黃連 炒各兩 柴胡 柒分 炙甘草 壹兩半

川芎 伍分 黃芩 叁兩 細葉子 者仕

右為極細末每服一錢匕熱盞內入茶少許湯調如膏法在

心內少用白湯送下臨臥



如苦頭痛每服加細辛一錢

如大陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛上羌活防風川芎甘草加半夏一兩半

如偏頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只白虎湯中加好吳白芷

生甘草 半分 炙甘草 半分 薄荷葉 叁分 藜蘆 壹分

右為細末食後茶清調下一錢或半錢

治頭痛

石膏 白芷 各一兩 薄荷葉 芒硝 各叁分 鬱金 壹分

右為極細末只含水鼻內噴之

治頭痛頭旋眼黑

羌活 壹兩 防風 半兩 柴胡 升麻 酒知母

酒生地黄 各半兩 酒黃柏 壹兩 黃耆 貳兩

炙甘草 貳分 生甘草 貳分

右咬咀每服秤半兩水一大盞煎至一盞半加蔓荊子半錢川芎二分再煎至一盞去滓臨卧熱服

婦人門

治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也 方在衛生堂醫書中

脾經中血海一穴在膝膕上內廉白肉際一寸中女子漏下惡血月事不調灸二壯

足大陰腎經中陰谷一穴在膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝取之婦人漏血不止少腹急引陰痛腹脹如



女子如妊娠可灸二疔

**酒煮當歸湯** 治癩疔白帶下脚氣脚以下如在冰雪中陰寒之

極者

當歸壹兩 茵香半兩 附子柴分燻去皮臍 高良薑柴分

右四味剉如麻豆大以上等乾酒一升半同煎至酒盡為度

木炭火上焙乾同為細末

炒黃鹽 丁香各半 全蝎叁分 柴胡貳分 升麻

木香各壹分 苦練半分 甘草叁分 玄胡索肆分

右與前四味同為細末酒煮白麩糊為丸桐子大每服二十

丸空心宿食消尽淡醋湯送下忌油膩冷物酒濕麩等

**白帶白濁** 治因崩白帶白濁之物雖多間有如屋漏水下時

有鮮紅血

當歸身壹分 熟地黄 白芍藥 川芎各半

阿膠烱陸分 丁香半 生艾葉壹分

右川芎地黃丁香為細末當歸酒洗剉艾亦剉都作一服水

五大盞先煎作一盞半去滓入膠烱再上火煎至一大盞帶

熱空心候宿食消尽服之二兩服愈

**補經固真湯** 一婦人白帶久矣諸藥不効診得心包尺脉極微

其白帶流而不止

炙甘草 柴胡各壹分 乾姜末叁分 橘皮半 人參一分

白茯苓拾陸个去 生黃芩貳分 郁里仁壹分去皮尖

右件除黃芩外以水三大盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至

一盞去滓空心帶熱服之候少時以早餅壓之

衄血吐血門



吐血以不愈以三稜針於氣街上出血立愈更服

五味子拾个 麥門冬 當歸身 生地黃

牡丹皮 人參各半 黃耆各半

右為鹿末都作一服水一盞去滓熱心熱服

兩寸脉孔或衄血或嘔血犀角末 方在雲岐脉訣中

**救急湯** 治吐血

升麻 柴胡 人參 蒼朮各半

當歸稍 熟地黃 白芍藥 黃耆各半

蘇木半兩 甘草 陳皮各半

右為末都作一服水煎去滓溫服食前

諸痛門

**治因勞役得腰痛如折沉重如山**

羌活 防風 獨活 肉桂 煨大黃

澤瀉各半 桃仁伍拾个 當歸稍 連翹各半 炙甘草貳分

酒防己 酒黃連各壹兩

右咬咀每服半兩酒半盞水一盞半同煎去滓熱服

**破血散** 治毒高損傷墜馬惡血流於脇下痛甚不能轉側

羌活 防風 中桂各壹兩 柴胡 連翹各壹兩

當歸稍貳分 麝香少許 蘇木壹兩 水蛭炒去烟 另研

右件分為二服每服酒一大盞水一大盞煎去滓調蛭麝二

味熱服

**治寒濕相合腦痛惡寒項筋骨骨脚眼痛膝膈痛**

脉沉洪 蒼朮肆兩 水蛭壹兩 煎至貳大

羌活壹分 升麻 澤瀉 柴胡 蒼朮



白朮

各半分 黃精 各三分

紅花 少許

右煎去滓稍執服之空心取微汗為効

忌酒濕麵

小兒門

夫外物驚宜鎮平以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水石安神丸忌防風九涼驚丸之類

**鎮心丸**

方在田氏保嬰內

**黃連安神丸**

方在發明內

**治胃中風熱**

黃耆 氣分

人參 壹分

生甘草

炙甘草 各半分

芍藥 壹分

陳皮 壹分

黃連 少許

右為細末每服一錢水煎食前

夫小兒斑疹始出之證必先見面燥腮赤目胞赤呵欠頻悶乍涼乍熱咳嗽噴足稍冷多睡驚並瘡疹之證或生膿胞或

生小水斑或生癰疹此二等不同蓋諸證皆太陽寒水起於

右腎之下前熱左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳道逆於面上是壬寒水逆尅丙丁熱

火故也

小兒瘡疹之由皆始生之時啼聲一發口中所含惡血隨吸而下還於右腎包絡之胞中其瘡之發下焦相火熾也二等之瘡皆出於足太陽寒水之經外為大寒內為二火交攻化血肉為膿寒為發寒邪可令內瀉二火又令濕氣上歸本位一二服瘡疹即愈已後再無二番瘡出之患而損生命者矣

**消斑散**

治斑疹悉具消化便令不出如已出稀者再不生

麻黃

羌活

防風 各五分

川芎

藁本

葛根

蒼朮

酒黃芩

生薑 半

柴胡 已上各二分



細辛 紅花 蘇木 橘皮 白朮 各壹分

升麻 生地黃 酒黃柏 各伍分 生甘草 壹分

當歸身 各壹分 黃連 各壹分 連翹 各壹分 吳茱萸 各壹分

右判如麻豆大每服五錢水二盞煎去滓熱服

因內傷必出斑營氣逆故也大禁牽牛巴豆食藥宜以半夏枳木大黃益智之類去其青瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡中驚嚏噴眼溢必出斑也

諸大膿胞小水斑癰疹三色皆營氣逆而寒復其表宜以四味升麻湯中加當歸身連翹此定法也

如肺或膿斑先顯喘咳或氣高而喘促加入參少黃芩以瀉伏火而補元氣

如心出小紅斑必先見溢驚身熱肌肉腫脉弦洪少加黃連

如命門出癰疹先必骨疼身熱其疼痛不敢動搖少加生地黃黃柏

辨小兒斑證 呵欠 嚏噴 睡中急驚 耳尖冷 眼溢

辨小兒傷寒 口熱 口中醋氣 妳辦不消 腹中疼痛

辨小兒驚風 如班子已出稠密身表熱急與此藥以防已後青乾

黑陷 黍粘子 炒香當歸身洗酒炙甘草 各壹分

柴胡 連翹 黃芩 各壹分 地骨皮 貳分

右同為鹿末每服秤一錢水煎去滓溫服空心藥畢且休与乳食

腸癖下血門

散如篩春二月中下一行腹中大作痛乃陽明氣街執毒所



作也當去濕毒和血而愈

生地黄 牡丹皮 生甘草各半 熟甘草

當歸身 蒼朮 秦艽 熟乾地黄 肉桂各三分

橘皮貳分 升麻柒分 白芍藥壹分半

右咬咀都作一服水四盞煎至一盞去滓稍熱服空心宿食消尽服之

馬刀瘡門

**飲進清飲湯** 治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或至肩

上或於脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頭或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或一瘡已破乃流膿水並皆治之臨卧服藥斟酌病人飲食多少大便硬軟以意料之

酒草龍膽半兩 炙甘草半分 升麻陸分

柴胡半兩 桔梗半兩 連翹叁分 葛根 白芍藥

黃連各貳分 昆布半兩 知母酒洗二次 當歸稍半分

黃芩稍壹分 生用 芫花根半兩 黃柏酒炒四次

京二稜叁分 廣茂叁分

右咬咀每服秤六錢或七錢水二盞先浸多半日煎至一盞去滓熱服於卧處伸足在高處頭微低每噉一口作十次噉至服畢依常安卧取藥在胃中停蓄也

另攢半料作細末煉蜜為丸如棗且大每服一百丸或百五十丸此藥湯留一口送了更加海藻半兩炒

入缺盆中乃手足少陽經分野其瘰癧者在於頭下或至頰車乃足陽明之分野受心脾之邪而作也今將二證合而治



之 或者一錢護皮毛開腠理虛乃活血脈亦瘡家聖藥也  
能補表之元氣消弱也通和陽氣泄火邪也

人參二錢補肺氣之藥也如氣短不調有喘者用之  
炙甘草半錢能調和諸藥瀉火益胃氣

升麻壹分 葛根半分 真滿盧半分 無去此膏味

此二味俱足陽明本經藥也

連翹一錢此一味十二經中血結氣聚必此散之瘡藥中不  
可無

牡丹皮二錢去腸胃留血滯血

當歸身 熟地黃 生地黃 各伍分

此三味諸藥中和血生血涼血藥也

白芍藥伍分 其味酸其氣寒能補中益肺之虛弱治腹中

痛必用

肉桂五分 能散結積陰瘡湯須當少用之一曰寒因熱用又

為寒陰覆蓋其瘡以辛熱以浮涼之氣

柴胡捌分 同連翹用乃少陽引用也

黍粘子伍分 無腫不用

若無馬刀挾癭瘡是不在少陽經也去柴胡一味手足太陽

脊強痛不可迴顧腰似折項似拔者加

羌活 防風各壹分 獨活半分

其防風一味辛溫若瘡在肩上雖無手足太陽經證亦當用

之為能散結去上部風寒病人身拘急者風也

昆布伍分 其味鹹苦若堅硬者宜用

廣茂慢五分 荆三稜伍分 若瘡在兩耳者用之



益智仁一分如吐沫吐食胃上寒者用之無則去之

大麥蘖壹分治腹中縮急兼能消食補胃

神麴末炒伍分為食不消化故也黃連伍分治煩悶

如有熱或脚腿無力加炒黃栢伍分

如有燥煩欲去衣者腎中伏火也更宜添加之無此證勿用

如服藥腹脹者加厚朴伍分無則勿用

右同為細末白湯浸餅和勻捻作餅子日乾搗如米粒大每

服秤二錢三錢白滾送下

如氣不順加橘皮甚者更加木香

如在陽明分野去柴胡黍粘子二味

如在少陽分野去獨活漏芦升麻葛根更加瞿麥穗三分

大抵用藥之法不惟瘡瘍諸疾病量人氣弱者當去苦寒之藥

多加人參黃耆甘草之類瀉火而先補其元氣

假令邪在上中下三處若在上焦加黃芩壹半酒洗壹半生用

黃連酒洗在中焦亦加黃連一半生用一半酒洗在下焦則

加酒洗黃栢酒洗知母酒防己之類選用之

如大便不通瀉其邪盛者急加酒洗大黃以利之

如因血燥大便燥乾者加桃仁酒洗大黃

如風結燥不行者加麻子仁大黃

如風澁而大便不行者加煨皂角仁大黃秦苳以利之

如風澁而有氣澁而不大便者加郁里仁大黃以除氣燥

如寒陰之病為寒結秘而大便不通以局方中半硫石或加

麻子仁乾姜冰冷與一兩乳間出黑頭瘡瘡頂塌下作黑眼子其



治法洪按之類

升麻

葛根

黃芩 各半

肉桂

當歸身

黃連

天甘草 各壹分

黃柏 各叁分

右咬咀都作一服水酒同煎去滓稍熱服

治因火燒或熱油燒燼者

生寒水石不計多少為細末用油調塗或乾用貼之立効

聖藥 諸惡瘡血出不止以寒水石細末擦之立止如神

雜病門

朱砂安神丸 治心煩懊懣心乱怔忡胃中氣乱心下痞悶食入

反出

朱砂 肆分 黃連 伍分 生甘草 貳分半

右為細末蒸餅為丸如黃米大每服十九唾津送下

補氣湯 治皮膚間有麻木此肝氣不行故也

黃耆 壹兩

白芍藥 壹兩

橘皮 不去白 澤瀉 半兩

炙甘草 壹兩

右咬咀每服一兩水二大盞煎去滓溫服

當歸六黃湯 治盜汗之聖藥也

當歸

生地黃

熟地黃

黃柏

黃芩

黃連

黃耆 加壹倍

各等分

右為鹿末每服三五錢煎如常小兒減半服之

發熱汗出 治遍身壯熱骨節疼痛

升麻 壹分

柴胡 柒分

當歸 伍分

羌活

蒼朮 各壹分

防風 捌分

甘草 柒分

藁朮 伍分

橘皮 叁分

冬加不去節麻黃 春加去節麻黃

右咬咀都作一服水煎去滓溫服後以葱醋湯發之

蘭室秘藏 畢



○頭風證

黃芩芍藥湯

大黃湯

芍藥湯

白朮黃耆湯

防風芍藥湯

白朮芍藥湯

蒼朮芍藥湯

阿子散

漿水散

黃連湯

芍藥黃連湯

導氣湯

加減平胃散

地榆芍藥湯

○厲風證

搗皮散

二聖散

○破傷風證

羌活防風湯

白朮防風湯

芎黃湯

太芎黃湯

羌活湯

防風湯

蜈蚣散

左龍丸

羌活湯

養血當歸地黃湯

○頭風證

消風散

泄青丸

○雷頭風證

升麻湯

○胎產證

黃龍湯

黃散

半夏湯

通積柴胡湯





黃芩芍藥湯

大黃湯

芍藥湯

白朮黃耆湯

防風芍藥湯

白朮芍藥湯

蒼朮芍藥湯

阿子散

漿水散

黃連湯

芍藥黃連湯

導氣湯

加減平胃散

地榆芍藥湯

厲風證

搥皮散

二聖散

破傷風證

羌活防風湯

白朮防風湯

芎黃湯

大芎黃湯

羌活湯

防風湯

蜈蚣散

左龍丸

羌活湯

養血當歸地黃湯

頭風證

消風散

泄青丸

雷頭風證

升麻湯

胎產證

黃龍湯

一黃散

半夏湯

通損柴胡湯





秦光湯

胡麻散

防風湯

一分散

血風湯

血運血結四物湯

沒藥散

加減四物湯

四物湯

紅花散

當歸散 惡物不下

生地黃散 吐血

麥門冬飲子 吐血

帶下證

苦練丸

衛生湯

大頭風證

黃芩黃連甘草湯

黑白散

瘡證

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃桂枝湯

桂枝黃芩湯

熱證

地黃丸

防風當歸飲子

金花丸

涼膈散

當歸涼氣湯

牛黃膏 熱入血室

白虎湯

眼證

地黃丸

地黃湯

四物湯

當歸散

洗眼藥

當歸

消渴證



黃連膏

八味丸

水腫方

水腫方

瘡瘍證

內疎黃連湯

內托復煎散

當歸黃耆湯

內消升麻湯

復元通氣散

五香湯

赤芍藥散

桃紅散

冰霜散 火鹿

乳香散 我癩

五黃散 枝瘡

花藥石散

截疔散

生肌散

平肌散

碧霞挺子

用藥加減例

迴瘡金銀花散

雄黃散

瘰癧證

桑椹膏

連翹湯

嬰麥飲子

咳嗽證

利膈丸

欬氣丸

虛損證

四君子湯

和血八物湯

十全散

牛膝丸

黑地黃丸

八味丸

地黃丸



吐證

桔梗湯

木香散

厚朴湯

心痛證

金鈴子散

煮黃丸

厚朴湯

藜木湯

木附湯

痢證

酒煮當歸丸

苦練丸

活法機要藥目錄 濟生拔粹卷第十七



臟腑泄痢其證多種大抵從風濕熱也是知寒少熱多故曰暴  
 泄非陰久泄非陽淺而使膿血知氣行而血止也宜大黃湯  
 下之是為重劑黃芩芍藥是為輕劑治法宜補宜泄宜止宜  
 止和則芍藥湯則呵子湯有暴下無聲身冷自汗小便澀滑  
 利大便不禁氣難喘息脈微嘔吐急以重藥溫之其效甚速是  
 也後重則宜下腹痛則宜和身重者除濕脈微者去濕膿血  
 稠粘以重藥竭之身冷自汗以毒藥溫之風邪內經者之  
 驚澀為痢常溫之狂表者發之在裏者下之在表者下之在  
 下者竭之身表熱者內疎之在裏者發之在表者下之去  
 者送之過者止之陰虛則白芍芍藥芍藥則芍藥芍藥則芍藥  
 黃連當歸通下為妙檳榔木香如泄痢而嘔者則以薑  
 橘之類別方藥法桂枝茯苓一焦則治以酸熱甚以重熱  
 藥若以芍藥藥小使或不利大便定沈困飲食減宜調胃  
 去濕去水去寒去毒二味水煎服或發熱惡寒腹不痛加黃  
 芩芍藥一二元元腫而惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連為主  
 桂枝湯佐之如煩燥或先便白膿者以芍藥芍藥芍藥芍藥  
 連不止上部血也如惡寒脈沉或白者以血將下痛亦黃  
 芩不能止此中部血也如惡寒脈沉者以血將下痛亦黃  
 止下部血也唯脈浮大者不可下

黃芩芍藥湯

方在寶鑑泄痢條下

未黃湯治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈



者

大黃 一兩

右剉細好酒一大盞同浸半日許煎至一盞半去大黃不用  
將酒分二服頓服之如未止再服以利為度復以藥湯和  
之痢止再服黃芩芍藥湯和之以徹其毒也

**白朮黃芩湯** 方在寶鑑內痢疾條下

**白朮黃芩湯** 服前藥痢疾雖除更宜此和之

白朮 一兩 黃芩 半兩 甘草 三分 一方無黃芩用黃芩半兩

右咬咀均作二服水煎服清

**防風芍藥湯** 治泄痢飧泄身熱脈弦腹痛而渴及頭痛微汗

防風 芍藥 黃芩 已上各壹兩

右咬咀每服半兩或一兩水煎

**白朮芍藥湯** 治太陰脾經受濕水泄注下体重微滿困弱無力

不欲飲食暴洩無數水穀不化宜此和之

白朮 芍藥 各一兩 甘草 伍分

右剉每服一兩水煎

**蒼朮芍藥湯** 治痢疾痛甚者

蒼朮 芍藥 黃芩 桂 各伍分

右剉每服一兩水煎

**阿膠散** 如腹痛漸已泄下微少宜止之

阿膠 子皮 木香 黃連 炙甘草 各三分

右為細末每服一錢以白朮芍藥湯調下如止之不已宜歸  
而送之也 阿膠散內加厚朴一兩竭其邪氣也

**漿水散** 治暴泄如水周身汗出身冷脈微而弱氣少不能

語甚者加吐止謂急病



半夏貳兩 附子半兩 乾生姜 炙甘草 桂各五分

右為細末每服三五錢漿水一盞煎至平和浮熱服

**黃連湯** 治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連貳兩 當歸各半 炙甘草貳分半

右改咀每服五錢水煎

**黃連解毒湯** 治大便後下血腹中痛者謂之熱毒下血

芍藥 黃連各半 當歸各半 大黃壹分 淡豉桂半分

炙甘草貳分

右改咀每服五錢水煎如痛甚者調木香檳榔末一錢服之

**導滯湯** 治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥壹兩 當歸伍分 大黃貳分 黃連壹分 黃芩貳分半

木香 檳榔各壹分

右為末每服五錢水煎

**加減平胃散** 方在室鑑內泄痢條下

**地榆芍藥湯** 治泄痢膿血乃至脫肛

蒼朮兩 地榆貳兩 卷柏參兩 芍藥參兩

右改咀每服一兩水煎病退止

五泄之病胃小腸大瘕二證皆以清涼飲子主之其泄自止厥

陰證加甘草以緩之少陰證裏急後重故加大黃又有大陰

陽明二證當進退大承氣湯主之太陰證不能食也當先補

而後泄之乃進藥法也先煎厚朴半兩製水煎二三服後未

口謂有宿食不消又加枳實一錢同煎二三服泄又未已如

稍進食尚有熱毒又加大黃二錢推過泄止住藥如泄未止



爲腸胃有又塵垢滑粘加芒硝半合宿垢去盡則愈也陽明  
證能食是也當先泄而後補謂退藥法也先用大承氣湯五  
錢水煎服如利過泄米以去芒硝後稍熱退減大黃一半再  
煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃去以等塵扑  
湯又煎二兩服如腹滿泄亦自愈後服厚朴湯數服則已

### 癩風證

癩風者榮氣熱附其氣不清鼻柱壞而色敗皮膚癢潰風寒客  
於脉而不去故名癩風又曰脉風俗曰癩治法刺肌肉百日  
汗出百日凡二百日鬚眉生而止先樺皮散從少至多服五  
七日交承漿穴七壯灸瘡愈再灸再愈三灸之後服一聖散  
油熱祛血之風邪戒房室二年病愈

治諸臟風毒遍身瘡疥及癩疹癢成瘡面上風刺粉

刺

樺皮肆兩荆芥穗貳兩

杏仁貳兩去皮尖用水一碗於鐵器內

炙甘草半兩枳殼肆兩去穢用炭火燒

右件除杏仁外餘藥爲末將杏子另研與諸藥和勻磁合內  
放之每服二錢食後溫水調下

治大風癩疾將皂角刺一二斤燒灰研細煎大黃半兩

調下一錢早晚服樺皮散中煎升麻湯下瀉青丸晚服二聖散  
此數等之藥皆爲緩疎泄血中之風熱也

七聖丸七宣丸皆治風壅邪熱潤利大腸中山風風痛癩風去  
便秘瀉皆可服之

### 破傷風證

風者百病之始也清淨則湊理閉拒雖有大風奇毒弗能爲



故破傷風者通於表裏分別陰陽同法寒證治人知有發  
表不知有攻裏和解此汗下和三法也  
肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入於  
瘡上灸乃瘡着白痂瘡口閉寒氣難消  
熱甚則生風也故表脈浮而無力大嘔  
有力陽明也在裏宜下脈浮而弦小嘔  
裏宜和解若明此三法而治不中病  
有未之有也

**治破傷風邪初傳在表**

羌活

防風

川芎

白朮

當歸

芍藥

甘草

地榆

細辛

右咬咀每服五錢水煎量緊慢  
大便秘則加大黃一兩緩緩令  
減用之熱則加大黃三兩  
熱甚更加黃芩二兩

**白朮防風湯** 若服前藥過有目汗

白朮

黃耆

防風

右咬咀每服五七錢水煎

破傷風藏府秘小便赤用熱  
下之先用芍黃湯三二服後  
用大芍黃湯下之

**芍黃湯**

川芎

黃芩

甘草

右咬咀水煎

**大芍黃湯**

川芎

羌活

黃芩

大黃

右咬咀水煎

**芍黃湯** 治半在表半在裏

羌活

菊花

麻黃

川芎

白茯苓

防風

石膏

前胡

黃芩

蔓荊子



右吹咀生委同煎日三

**防風湯** 治破傷風同傷寒表證

傳入裏宜急服此藥

防風

羌活

獨活

川芎 各等分

右吹咀之 服後宜調蜈蚣 以大効

**蜈蚣散**

蜈蚣 一對 鯽魚 五

左盤龍 伍分 炒烟 尽用

右為細末用防風湯調下如前 藥解表不已竟直轉入裏當服左龍丸服之漸漸看大便硬 狀加巴豆霜

**左龍丸**

治直視在裏者

左盤龍 伍分

白蠟 蚕 伍分 鯽魚 伍分

雄黃 一分 研

右同為細末燒餅為丸桐子大每服十五丸温酒下如裏證不已當於左龍丸內一半末加入 且霜半錢燒餅為丸桐

子大同左龍丸一處每服加一九漸 服至利為度若利後更服後藥若痞痞不已亦宜服後藥 治瀉也

**羌活湯**

羌活

獨活

地

防風 各一兩

右吹咀水煎如有熱加黃芩有涎加半 身若病日久氣血漸虛邪氣入胃全氣養血為度

**養血當歸地黃湯**

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷 伍分

細辛 伍分

右為細末水煎

頭風證

汗經風盛木自搖動梳頭有雪皮乃肺之證也 謂肺主皮毛實 油青丸主之虛則消風散主之

雷頭風證



夫雷頭風者震卦主之諸藥不效為與證不相對也

升麻湯 助蒼朮一匙 荷葉全一个

右為細末每服五錢水煎或燒荷葉一个研細用前藥調服亦可

胎產證

婦人童幼至天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆從厥陰論之天癸已絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰經無犯胃氣及上三焦為之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之證利大便則脉數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣如發渴而白虎氣弱則黃耆血刺痛而用以當歸腹中疼而加之芍藥大抵產病天行從增損柴胡雜證從增損

四物宜詳察脉證而用之

產前寒熱小柴胡湯中去半夏謂之黃龍湯

黃散治婦人有孕胎漏

生地黄 熟地黄 各等分

右為細末煎白朮枳殼湯調下

半夏湯治胎衣不下或子死腹中或子衝上而惡阻或血暴下

及胎乾不能產者

半夏 麴 一兩 桂 七分半 枳仁 三十个 大黃 伍分

右為細末先服四物湯二兩服以服半夏湯生薑同煎

續命湯治產後經水適斷感於異證手足攣搐咬牙昏

紫屬上焦

柴胡 八分 黃芩 四分 芍藥 三分 甘草 四分 石膏



如母 黃耆 五分 半夏 一兩

右為鹿末每服半兩生薑棗同煎

**秦艽湯** 前證已去次服此以去其風邪

秦艽 八分 芍藥 半兩 柴胡 八分 防風 黃耆 各四分

人參 半夏 各二分 炙甘草 四分

右為鹿末水煎

**荆芥散** 二三日後經水復行前證俱退宜此

小柴胡湯一料加荆芥穗五錢 枳殼 麩炒去穢伍分

右為鹿末同小柴胡煎法

**防風湯** 二三日後宜正脾胃之氣兼除風邪

蒼朮 四兩 防風 三兩 當歸 一兩 羌活 一兩半

右為鹿末水煎

**二分散** 治產後日久虛勞針灸小藥俱不効者

川芎 熟地黃 當歸 芍藥 白朮

茯苓 黃耆 已上各一兩 柴胡 人參 各六分

黃芩 半夏 甘草 各六分

右為鹿末水煎服清

**血風湯** 治產諸風痿痺無力 秦艽 羌活

防風 白芷 川芎 芍藥 當歸

地黃 白朮 茯苓 各等 加半夏 黃耆

右為細末一半為丸煉蜜如桐子大一半為散溫酒調下丸

藥五七十九

治血運血結或聚於膏中或偏於少腹或運於脇肋四物湯四

兩倍當歸川芎鬼箭紅花玄胡各一兩同為鹿末如四物







諸見血無寒衄血下血吐血溺血皆屬於熱

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮 天門冬

黃芩 芍藥 甘草 黃芩已上各等分

右為鹿末每服一兩水煎服微身涼惡風每一兩加桂半錢

**大飲子** 治衄血不止

麥門冬 生地黃 各等分

右為鹿末每服一兩水煎 又衄血先朱砂蛤粉 次木香黃連

黃芩 芍藥 甘草 黃芩已上各等分

黃芩 芍藥 甘草 黃芩已上各等分

**帶下證**

赤者熱入小腸白者熱入大腸其本濕熱寃結于脉不散故為

赤帶下也寃屈也結也

之後服苦練丸大玄胡散調下之熱去濕除病自愈也

月事不來先服降心火之劑後服局方中五補丸後以衛生

湯治脾養血氣可也

**苦練丸** 治赤白帶下

苦練碎酒浸 茴香炒 當歸各等分

右為細末酒煎 如桐子大每服五十九空心酒下

**衛生湯**

右為鹿末水煎空心 如虛者加人參一兩

**大頭風證**

夫大頭風證者是陽明邪熱太甚資質少陽相火而為之也

多在少陽或在陽明或在太陽視其腫勢在何部分隨經取之

濕熱為腫木盛為痛此邪見於頭多在前後先出治之大不



病之遠則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人此  
病之近而之內者是血病沉頭部分受邪見於無形之  
部當先緩而後急先緩者謂邪氣在上者無形之部分既者  
無形無所不至若用重劑速下過其病難已雖無續藥若急  
服之以食前或懸服皆失緩非則藥不能得除病當徐徐浸  
漬無形之邪以藥性味形神均急皆要不離緩急是也  
且以急者謂瀉劑已瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質  
之邪若不速下則損陰也此終治到為客邪當急去之是治  
客邪急也 且治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下若急下  
之不能解紛而益亂也 治主以急者謂陽分受陰邪陰分  
受陽邪止其氣急除去之也  
假令少陽病下利為病少陽為邪出於胃前後也陽明為邪者

首大腫也先以黃芩黃連其早湯通炒過對煎少少不住服  
或劑畢再下煨黍粘子新瓦上炒香同大黃煎成去滓內芒  
硝等及等分而時時呷之無令飲食在則得微利及邪氣已  
只服前藥亦不口再同前次之服之取大便利邪氣則止  
如無明證者加石膏 如少陽瀉者加菖蒲根  
得明行經其麻芒藥葛根甚早  
一陽行經荒法防風之類

瘧證

夏傷於暑秋必病瘧蓋傷而淺者近而暴傷之重者遠而疾瘧  
瘧者久瘧也其知夏傷於暑熱閉藏而不能發也于外邪  
氣內行至秋而發為瘧也何經受之隨其動而取之有中三

消毒丸

在室鑑內附



陽者有中三陰者經中邪氣其證各殊同傷寒論之也五藏皆有瘧其六爻異在太陽經謂之風瘧治多汗之在陽明經謂之熱瘧治多下在少陽之經謂之濕瘧當從大陰經論之

治瘧疾寒者宜熱藥熱者宜寒藥痛項強脈沉惡寒有汗桂枝羌活湯

挂枝 羌活 防風 甘草 各半兩

右為鹿末水煎 如吐者加半夏麴等分

治瘧疾頭痛項強脈浮惡風無汗者麻黃湯

麻黃 去節 二兩 桂枝 一分 杏仁 三拾個 去皮尖

右為末水煎 如吐者加半夏麴等分

治發熱前證而夜發者麻黃桂枝湯

麻黃 去節 二兩 甘草 一分 黃芩 五分 桂枝 一分 杏仁 三拾個 去皮尖

右為末水煎桃仁散血緩肝夜發乃陰經有邪此湯散血中

風寒也

治瘧疾惡寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也宜桂枝

黃芩 人參 各四分 半 甘草 一分

柴胡 二兩 石膏 知母 各伍分 桂枝 二分

右為鹿末水煎

從卯至午時發者宜大柴胡湯下之

從午至酉發者知其邪氣在內也宜大承氣湯下之

從酉至子時發者或至寅時者知其邪氣在血也宜桃仁承

氣湯下之微利後更以小柴胡湯制其邪氣可也

熱證

有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏熱有暴發而為熱



者乃以火不當通而所下也有服溫藥而為熱者有惡寒戰慄而熱者蓋諸熱之屬心火之象也治法小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之其熱之氣則汗發之發之不尽則逆制之制之不尽求其屬以衰之苦者以治五藏五藏屬陰而居於內辛者以治六府六府屬陽而在於外故內者下之外者發之又宜養血益陰其熱自愈

**地黃丸**方在前發明內附

如煩渴發熱虛煩悉病空心服地黃丸食後服**防風當歸散**

柴胡 人參 黃芩 甘草 滑石 各一兩

大黃 當歸 芍藥 防風 各半兩

右為鹿末生薑同煎 如痰實咳嗽加半夏

**金匱丸**治大便黃米穀完出驚悸瀉血淋閉欬血衄自汗頭

痛積熱肺痿

黃連 黃蘗 黃芩 山梔子仁 各一兩

右為細末滴水為丸桐子大溫水下

如大便結實加大黃自利不用大黃

如中外有熱者作散剉服名解毒湯

如腹滿嘔吐欲作利者解毒湯內加半夏茯苓厚朴各二錢

女同煎 如白膿下痢後重者加大黃二錢

**京大黃**在難知內附 加減于后

苦渴壅不利腫痛并涎嗽者加桔梗一兩荆芥穗半兩

苦嗽而嘔者加半夏半兩生薑煎

苦鼻衄嘔血者加當歸芍藥生地黃各半兩

若淋瀝者加滑石四兩茯苓一兩



治熱攻於上不利於下陽狂奔走罵詈不避親疎

大黃 當歸各一兩 甘草半兩 芒硝以分

右取粗生薑棗同煎

治熱入血室發狂不認人者

生薑一分 朱砂 射金鎊三分 腦子 甘草各一分

牡丹皮三分

右取粗生薑棗同煎如皂子大新水化下

治表證惡寒而渴證白虎湯也

若身熱而渴以手取之不甚熱為肺熱也日睛赤痛以或引之

若兩脇下肌熱脈浮弦者柴胡飲子主之

若脇肋熱者身熱者或日晡熱者皆為血熱也四順

飲子主之

若夜夢驚悸汗陰乃血熱也四順飲子兆仁承氣選而用之

若晝時驚悸汗陰乃血熱也四順飲子

若發熱惡寒無汗者柴胡證

晝則七傷二十下受氣也六抵則柴胡飲子

夜則七傷二十下受氣也六抵則四順飲子

眼證

眼之為病在府則為赤當除風散熱在經則為重宜養血安神  
若發者為天而治以病者在裏而難愈除風散熱者瀉青  
丸主之養血安神者定志丸婦人則乾地黃丸主之

治眼赤暴腫翳障

防風 羌活 黃芩 黃連以上各一分



右以咀水煎食後溫服

如大便秘澀加大黃一兩

如痛甚者加當歸地黃各一兩

如煩燥不得眠睡加梔子一兩

**地黃湯** 治眼久病昏澀因發而又不能愈者

防風 羌活 黃芩 黃連 地黃

當歸 人參 茯苓 已上各等分

右為鹿末水煎

**四物龍睛湯** 治目暴發方在元戎四物湯源下附

點眼藥則有**瞻光膏** 方在後冊雜方內附

洗眼藥則有**夜光膏** 方在室鑑內附 疔瘡藥在後雜方內附

消渴證

消渴之疾三焦受病也有上消有消中有消腎上消者肺也多

飲水而少食大便如常小便清利知其燥在上焦也治宜流

濕以潤其燥

消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱能消穀知其熱在中

焦也宜下之

消腎者初發為膏淋謂淋下如膏油之狀至病成而面色鰐

黑形瘦而耳焦小便濁而有脂液治法宜養血以肅清分其

清濁而自愈也

**黃連膏**

黃連末壹斤生地黃自然汁白蓮花藕汁牛乳汁各壹斤

右將汁熬成膏子劑黃連末為丸桐子大每服一十九少呷

溫水送下日進十服渴病立止



治清腎 方在發明內附

腫脹證

五臟六腑皆有脹經云平治權衡去宛陳剝開鬼門潔淨府平  
治權衡者察脉之浮沉也去宛陳剝者踈滌腸胃也開鬼門  
者發汗也潔淨府者利小便也蠱脹之病治以鷄屎醃酒調  
服水脹之病當開鬼門決潔淨府也

治水腫蟻蝕去頭尾與葡萄心同研露七日曝乾為末淡酒調  
下暑月用佳

又方棗一斛鍋內入水上有四指用大戟并狼苗蓋之適益合  
之煮熟為度去大戟不用旋旋喫無時忌棗決愈神効

瘡瘍證

瘡瘍者火之厲須分內外以治其本若其脉沉實當先踈其內

以絕其源也其脉浮大當先托裏恐邪氣入內也有內外之  
中者邪氣至盛逼絕經絡故發癰腫此因失托裏及失踈通  
又失和榮衛也治瘡之大要須明托裏踈通和榮衛之三法  
內之外者其脉沉實發熱煩躁外無熱赤痛深於內其邪氣  
深矣故先踈通臟腑以絕其源外之內者其脉浮數癰腫在  
外形證外顯恐邪氣極而內行故先托裏也內外之中者外  
無熾惡之氣內亦臟腑宣通知其在經絡和榮衛也用此三  
法之後雖未差必無變證亦可使邪氣收減而易痊愈

肉不變色根繫深大痛遠在內臟腑秘泄當急踈刺之

- 黃連
- 山梔子
- 芍藥
- 當歸
- 檳榔
- 木香
- 薄荷
- 連翹
- 黃芩
- 桔梗



甘草 已上各一兩

右為末水煎先喫一二服次後加大黃一錢再服加一錢以利為度

如有熱證止服黃連湯大便秘澀則加大黃

如竟無熱證煎後藥復煎散時服之如無熱證及大便不秘澀止服復煎散稍有熱證却服黃連湯秘則加大黃如此內外比且通榮衛和調則經絡自不遏絕矣

**內托復煎散** 治腫爛於外根盤不深形證在表其脈多浮痛在皮肉邪氣盛而必復於內須急內托以救其裏也

地骨皮 黃耆 防風 芍藥 黃芩  
白朮 茯苓 人參 甘草 當歸  
防己 已上各一兩 柳桂 淡味加伍分

右咬咀先煎蒼朮一斤用水五升煎至三升去蒼朮滓入前藥十二味再煎至三四升取清汁作三四服終日服之又煎蒼朮滓為湯去滓再依前煎十二味藥滓服之此除濕散鬱熱使胃氣和平如或未已再作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微利煩熱已退却服復煎散半料如此使榮衛俱行邪氣不能自侵也

**當歸黃耆湯** 治瘡瘍藏腑已行如痛不可忍著

當歸 黃耆 地黃 川芎 地骨皮  
芍藥 各等分

右咬咀水煎 如發熱加黃芩 如煩燥不能睡卧者加梔子 如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮

**內托復煎散** 右治血氣壯實若患癰疽大小便不通



升麻 大黃 枳實 當歸 芍藥 炙甘草

右咬咀水煎食前

**龍腦散** 治諸氣滯耳龍腦便癰瘡疽無頭止痛消腫

青皮 陳皮 甘草 川山甲 連翹 括婁根 加金銀花

右為細末熱酒調下

**聖藥湯** 治毒氣入腹托裏若有異證於內加減

丁香 木香 沉香 乳香 麝香 右為細末水煎空心

嘔者去麝加藿香葉一兩 渴者加人參一兩

**小兒疳積散** 治一切疳積疰疔初起增寒疼痛

金銀花 赤芍藥 大黃 瓜蒌 當歸 甘草 枳實

右為鹿末水酒各半煎

**神效散** 飲瘡生肌定血辟風邪

滑石 乳香 輕粉 小豆粉 寒水石 一方改小豆粉為定粉一兩

右為極細末乾貼

**冰霜散** 治火燒皮爛大痛

寒水石 牡蠣 朴硝 青黛 輕粉

右為細末新水或油調塗立止

**養神散** 治枝瘡神效 自然錫 醋蒸十遍

乳香 沒藥 麝香 當歸



右為細末每服五錢溫酒調下

**五寶散** 治杖痛定痛

黃丹 黃連 黃芩 黃蘗 大黃

乳香已上各等分

右為細末新水調成膏用絛絹帛上攤貼

**聖藥散** 治一切金瘡狗咬傷婦人敗血惡血奔心血運胎

死胎衣不下至死者以童子小便調下一錢取下惡物神效

硫黃明淨者四兩 花藥石一斤

右二味拌勻用紙筋和膠泥固濟瓦甌子一个入藥內密泥

封口了焙乾安在四方磚上磚上書八卦五行字用炭一秤

圍燒自己午時從下生火直至經宿火尽又經宿甌冷取研

極細磁盒內盛

**截瘡散** 治年深疔瘻瘡

黃連半兩 白斂 白芩 丹各一兩 輕粉一分

龍腦 麝香各半分另研 蜜化僧一兩

右為細末和勻乾糝或紙上以膏貼之

**三助散**

寒水石剉滑石各一兩 烏魚骨 龍骨各一兩

定粉 蜜化僧 白礬灰 乾烟脂各半兩

右為極細末乾糝用之

**平肌散** 治諸瘡久不斂

蜜陀僧 花藥石一物同體赤 白龍骨各一兩

乳香另研 輕粉各一兩 黃丹 黃連各二分中

右為極細末和勻乾糝

**聖藥散** 治惡瘡透丁不覺疼痛者



銅礬壹兩 硃砂壹分 蟾酥壹分

右為細末燒飯和作麥糝搗子每用刺不覺痛者須刺血出方解藥在內以膏貼之

用藥加減

如發背丁腫膿潰前後虛而頭痛於托裏藥內加五昧子

恍惚不寧加人參茯神 虛而發熱者加地黃括蕪根

潮熱者加柴胡地骨皮 渴不止者加知母赤小豆

虛煩者加枸杞天門冬 自利者加厚朴

膿多者加當歸川芎 痛甚者加芍藥乳香

肌肉淫生者加白欬官桂 有風邪者加獨活防風

心驚悸者加寸砂 口目瞤動者加羌活細辛

嘔逆者加丁香藿香葉 痰多者加半夏陳皮

**通倉金銀花散** 治瘡瘍痛甚則色變紫黑者

金銀花連枝葉剉 黃耆肆兩 甘草壹兩

右咬咀用酒一升同入壺瓶內閉口重湯內煮二兩時辰取出坐澤頓服之

**雄黃散** 治瘡有惡肉不能去者

雄黃壹分 巴豆不去皮研壹个 去皮半分

右二味共同研如泥入乳香沒藥各少許再研勻細少上惡肉自去矣

瘰癧證

夫瘰癧者結核是也或在耳後或在耳前或在耳下連及頤頰或在頸下連缺盆皆謂之瘰癧或在臂及脅之側或在兩脇皆謂之馬刀手足少陽主之



若結核或得耳有之或耳下頷下有之皆瘰癧也桑椹一  
熟黑色者必不裂取自然汁不犯銅鐵以文武火慢熬作薄  
膏子每日白沸湯煎一匙食後日三服

治馬方連翹湯

連翹

嬰麥花

各壹斤

大黃

各壹斤

或兩

右咬咀水煎服後十餘日可於臨泣穴灸二十七壯服五六  
日方効在他經者又一方加大黃木通五兩知貝一作母五兩雄  
黃七分攪椰半兩減甘草不用同前藥為細末熟水調下三  
五錢服之

連翹

壹斤

嬰麥穗

半斤

右為散末水煎臨卧服此藥經効多不能速驗宜待歲月之  
久除也

咳嗽證

咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動  
而為痰也咳嗽是有痰而有聲蓋因傷於肺氣而致動於脾  
濕因致而為嗽也治嗽者治痰為先治痰者下氣為上是  
以南星半夏勝其痰而咳嗽自愈也枳殼陳皮利其氣而痰  
自下也痰而能食者大承氣湯微下之痰而不能食者厚朴  
湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱痰嗽小柴胡湯四兩加石  
膏一兩知母半兩用之冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍  
加杏仁服之蜜煎生姜湯蜜煎橘湯燒生姜胡椒皆治無  
痰而嗽者此乃大例更當隨時隨證加減之

方在寶鑑內附

效氣元

治久嗽痰喘肺氣浮腫



邵李仁 青皮 去白陳皮 去白檳榔 木香

杏仁 去皮 馬兜苧 炒 人參 廣茂 當歸

澤瀉 茯苓 苦苧 炒 白朮 方已 在子

牽牛 取頭末 壹兩半

右為細末 生姜汁 麵糊為丸 桐子 大生姜湯下

治咳嗽諸方 在家珍內 并鑿鑑內者 更宜選用而用之

虛損證

虛損之疾 寒熱因虛而感也 感寒則增陽 陽虛則陰盛 故損則自上而下 治之宜以辛甘 淡過於胃 則不可治也 感熱則損陰 陰虛則陽盛 故損則自下而上 治之宜以苦酸 鹹過於脾 則不可治也 自上而損者 一損於肺 故皮聚而毛落 一損損於心 故血脈虛弱 不能榮於臟腑 婦人則月水不通 一損損

於胃 故飲食不為肌膚也 自下而損者 一損損於腎 故骨痿不能起於床 二損損於肝 故筋緩不能自收 持二損損於脾 故飲食不能消克也 故心肺損則色弊 肝腎損則形痿 脾胃損則穀不化也

治肺損皮聚而毛落 宜益氣 **四君子湯** 方在前難知內附

治心肺虛損皮聚而毛落 血脈虛損 婦人月水愆期 宜益氣和

血 **八珍湯** 方在前元戎內附

治心肺損及胃損 飲食不為肌膚 宜益氣和血 調飲食 **十全大**

方在前元戎內附

治腎肝損 骨痿不能起于床 宜益精筋 緩不能自收 持宜緩中

牛膝丸

牛膝 酒洗 草薢 杜仲 桑寄生 虎絲子



防風 胡芦巴 炒桂 破故紙 沙苑白疾藤

右等分為細末酒煮豬腰子為丸每服五七十九空心温酒下如腰痛不起者服之甚効

治陽盛陰虛肝腎不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色宜榮血養腎

蒼木權斤 熟地黄壹斤 乾姜春茶分 冬壹兩

右為細末蒸棗肉為丸兩寸大每服五七十九至百九諸飲下若加五味子為腎氣丸近類象形神品藥也

如陽盛陰虛心肺不足及男子婦人面無血色食少嗜卧肢躄困倦宜八味丸方在元戎內附

如形躄瘦弱無力多困未知陰陽先損夏月宜地黄丸春秋宜腎氣丸冬月宜八味丸

治病久虛弱厭厭不能食聖中丸方在前脾胃論中

吐證

吐證有二氣積寒也皆從二焦論之上焦在胃口上通於天氣主內而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下通於地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪其證食已暴吐渴欲飲水大便結燥氣上衝而胃發痛其治當降氣和中中焦吐者皆從於積積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脉浮而溼其證或先痛而後吐或先吐而後痛治法當以小毒藥去其積積去木香和其氣下焦吐者皆從於寒地道也其脉沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法當以毒藥通其秘塞温其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令



後氣結而自愈也

治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪宜先和中**消便湯**

桔梗 白朮各青半夏兩半麴兩陳皮去白白茯苓

枳實熬炒厚朴姜製炒香各壹兩

右咬咀水煎取清調木香散一錢隔夜空腹服之後氣漸下吐漸止然後去木香散為藥二兩薑青二兩半每一料中叩筭加之

如大便燥結食不盡下以大承氣湯去硝微下之少利再服

如大便復結依前再微下之

木香 檳榔各等分

右為細末煎藥調服

**厚朴**主翻胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾其藥味即

與萬病紫苑丸同方在元戎方內附 其加減于后

春夏再加黃連貳兩 秋冬再加厚朴貳兩

如治風於春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲茯苓各一兩半

如治風瀉不愈者依春秋加減外更加人參薑黃蒲茯苓各一

兩半 如失精者加菖蒲白茯苓為輔

如肝之積加柴胡蜀椒為輔

如心之積加黃連人參為輔

如脾之積加吳茱萸乾姜為輔

如腎之積加菖蒲茯苓為輔 秋冬久瀉不止加黃連茯苓

心痛證

諸心痛者皆少陰厥陰氣上衝心者有熱嚴心痛者身熱足寒



甚則煩燥而吐額自汗出知為熱也其脈浮大三四濇當灸火  
經及常論謂表裏俱瀉之是謂熱病汗不出引熱下行表汗  
通身而出者愈也灸畢服金鈴子散則愈痛止服枳木丸去  
其餘邪也有大實心中痛者因氣而食卒然發痛大便或秘  
久而止悶心曾高起按之愈痛不能飲食急以黃黃九利之  
利後以藁本湯去其邪也有寒厥心痛者手足逆而通身冷  
汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以木附湯溫  
之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救之是知久病無寒  
暴病非熱也

**金鈴子散** 治熱厥心痛或發或止久不愈者

金鈴子 玄胡 各壹兩

右為細末每服二三錢酒調下溫湯亦得

治大實心痛一症

厚朴丸同紫苑丸 方在陰證略例內 黃黃丸 方在陰證略例內

治大實心痛大便已利宜 **藁本湯** 止其痛也

藁本 半兩 蒼朮 壹兩

右為鹿朮水煎服清

治寒厥暴痛脈微氣弱宜 **木附湯** 溫之 方在雲岐脈論內附

証

男子七疝婦人瘕聚帶下皆任脈所主陰經也腎肝受病治法

同歸於

**疝瘕** 當歸 附子 苦練子 刺 茴香 各壹兩

右剉以酒二升同煮酒盡為度焙乾作細末入

丁香 木香 各貳 全蝎 貳拾貳个 玄胡 貳兩



右同為細末與前藥一起拌勻酒糊為丸每服三五十九至  
百九空心温酒下凡疝氣帶下皆屬於風全蝎治風之聖藥  
茴香苦練皆入小腸故以附子佐之丁香木香則導為用也  
治奔豚及小腹痛不可忍者**苦練丸**

苦練

茴香

各壹兩

黑附子 壹兩炮去皮臍

右用酒二升煮酒盡為度曝乾或陰乾搗為極細末每一兩

藥末入

全蝎

拾捌个

玄胡

伍分

丁香

拾伍个

石共為細末酒糊為丸桐子大每服百九空心酒下如痛甚  
煎當歸入酒下大効



*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '煎當歸', '全蝎', '玄胡', '丁香', '木香', '附子', '苦練', '茴香', '石', '桐子', '百九', '空心', '酒下', '大効']*







