

重修政和經史證類備用本草

十一





三種海藥餘

瓶香  
二十五種陳藏器餘

釵子股

宜南草

萬車香  
朝生暮落花

衝洞根

井口邊草  
千金鑊草

獨耳草  
斷罐草

燈花末  
狼杷草

百草灰  
故燒幕

靈床下鞋履  
蛇芮草

產死婦人塚上草  
萬一藤

董母草  
天羅勒

孝子衫襟灰  
故叢衣結

蛇芮草  
故燒幕

天羅勒  
萬一藤

狼杷草  
螺麌草

繼母草  
甲煎

金瘡小草

毛蓼  
金瘡小草

鬼釵草

本草十

二



附子味辛甘溫大熱有大毒  
主風寒欬逆邪氣溫陽  
瘡破癥聚血瘕寒濕踴  
弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤  
白堅肌骨強陰又墮胎爲百藥長生健爲山谷及廣漢

# 冬月採爲附子春採爲烏頭

地膽爲之使惡蛇畏防風黑豆甘草黃耆人參烏韭

云附子以八月上旬採八角者良凡用三建皆熟灰微炮令拆勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子皆湊甘草入參生薑相配者正制其毒故也

全按

陳藏器本草云附子醋浸削如小指內耳中去薑去皮炮令拆以蜜塗上炙之令密入內舍之勿咽其汁主喉痺

## 圖經

文具側子條下

## 陳藏器

附子無八角陶強名之古方多用

雷

## 公云

凡使先酒細認勿誤用有烏頭烏喙天雄側子木鼈子烏頭少有莖苗長身烏黑少有傍尖烏喙皮上蒼有大豆許者孕

八九箇周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮令皴坼即劈破用天雄身全矮無尖周匝四面有附孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴坼後去皮尖底用不然陰制用並得側子只是附子傍有小顆附如棗核者是宜生用治風癆神妙木鼈子只是諸喙附雄烏側中此穗者号曰木鼈子不入藥中用若服令人喪目若附子底平有九角如鐵色一箇箇重一兩即是氣全堪用夫修事十兩於文武火中炮令皴坼者去之用刀刮上孕子并去底尖微細劈破於屋下午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾用夫欲炮者灰火勿用雜木火只用柳木最妙若陰制使即生去尖皮底了薄切用東流水并黑豆浸五日夜然後漉出於日中曝令乾用凡使須陰制去皮尖了每十兩用生烏豆五兩東流水六升

## 聖惠方

治丁瘡腫甚者用附子末醋和

外臺

## 本草十

## 秘要

療偏風半身不遂冷癱症附子一兩生用無灰酒一升右咬咀內於酒中經一七日隔日飲之服一小合差

千金

## 翼

治大風冷痰癬脹滿諸癰等病用大附子一枚重半兩者二枚亦得炮之酒漬春夏秋三日服一合以差爲度日再服

## 又方

治口噤卒不開搗附子末無所不治內管中開口吹喉中差

## 經驗方

嘔逆蘇胃用大附子一箇生薑一千斤細剉煮研如麪糊米飲下之

## 後方

治大人久患口瘡生附子爲末醋入鹽一錢水一升前半外溫服立效

## 斗門方

治齶胃用附子一箇

## 躁不

止附子一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水一升前半外溫服立效

## 又方

治熱病吐下水及下利身冷脉微發

## 無

凝簡要濟衆治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一兩去皮臍

## 塗

消之腫孫用和治大瘡霍亂不止附子一枚重七錢炮去皮臍爲末每服四錢水兩盞益氣酒食

## 張文仲

療眼暴赤腫痛不得開又淚出不止附子赤皮未如蠶屎着眞中以定爲度

## 崔氏方

療耳聾風

牙關急不得開方取八角附子一枚醡漬之三宿令潤微削一頭內耳中灸上十四壯令氣通耳中即差。孫光口訣云治陰盛陽傷寒其人必躁熱而不欲飲水者是也宜服霧露散附子一枚燒爲灰存性爲末蜜水調下爲一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈。又方治頭痛附子炮石膏煅等分爲末入腦麝少許茶酒下半錢治風至驗以附子一箇生去皮臍用菉豆一合同入铫子內煮豆熟爲度去附子服豆即立差每箇附子可煮五服後爲末服之。

龍州烏頭



江寧府烏頭



成州烏頭



本草十

晉州烏頭



四

梓州草烏頭



邵州烏頭



**烏頭味辛甘溫大熱有大毒主風惡風洗洗出汙除寒濕痺效逆上氣破積聚寒熱消腫止瘀冷食不下心**

**腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸○射罔味苦有大毒療戶**

**症癥堅及頭中風痺痛一名奚毒一名即子一名烏喙上爲天雄**

目禹錫等謹按中蠱通用藥云射罔溫大熱

**○烏喙味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵山谷正月二月採陰乾長三寸已**

莽草爲之使反半夏桔梗貝母白斂白及惡藜蘆陶隱居云今採用四月烏頭與附子同根春時莖初生有腦形似烏鳥之頭故謂之烏頭有兩歧共蒂狀如牛角名烏喙喙即烏喙也亦以八月採搗笮莖取汁日煎爲射罔獵人以傳箭射禽獸中人亦死宜速解之唐徐洪云烏喙即烏頭異名也此物同苗或有三歧者然兩歧者少縱天雄附子有兩歧者仍依本名如烏頭兩歧即

本草十

五

响

目禹錫等謹按吳氏云

向

名烏喙天雄附子若有兩歧者復云何名之烏頭一名蕡一名千秋一名毒公一名果負一名耿子神農雷公桐君黃帝甘有毒正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與萬相似云烏喙神農雷公桐君黃帝有毒十月採形如烏頭有兩歧相合如烏之喙名曰烏喙也所畏惡使盡與烏頭同爾雅云芟董草注即烏頭也江東呼爲董音蘄崔寔四民月令云三月可採烏頭華性論云烏頭使遠志爲之使忌豉汁味苦辛大熱有大毒能治惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹疗痛痃癖氣塊益陽事中風洗洗惡寒除寒熱主胷中痰滿冷氣不下食治痃逆上氣治齒痛破積聚寒主強志又云烏喙使忌豉汁味苦辛大熱能治男子腎氣寒弱陰汗主療風溫濕邪痛治寒熱癰腫歲月不消者陳藏器云射罔本功外主癰瘡瘡根結核瘰疬毒腫及蛇咬先取藥塗肉四畔漸漸近瘡習習逐病可塗立殺人亦如殺走獸傳箭鏃射之十步倒也日華子云土附子味療辛熱有毒生去皮搗濾汁澄清旋添曬乾取膏名爲射罔獵人將作毒箭使用或中者以甘草藍青小豆葉浮萍水薺芽皆可禦也溫濕邪痛治寒熱癰腫歲月不消者陳藏器云射罔本功外主癰瘡瘡根結核瘰疬毒腫及蛇咬先取藥塗肉四畔漸漸近瘡習習逐病可塗立殺人亦如殺走獸傳箭鏃射之十步倒也日華子云土附子味療辛熱有毒生去皮搗濾汁澄清旋添曬乾取膏名爲射罔獵人將作毒箭使用或中者以甘草藍青小豆葉浮萍水薺芽皆可禦也

圖經

文具側子條下

聖惠方

治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍生搗羅繭醋調塗於故帛上傳之

外臺秘要

治風頭痛腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍生搗羅繭醋調塗於故帛上傳之

湏臾痛止

又方

治久疥癬方用川烏頭七枚生搗碎以水三大盞煎至一大盞去滓溫服

外炒令黃

末之絹袋盛酒三升浸溫服

千金方

治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾全烏頭

一味掘得承濕削如棗核大

### 又方

治沙風毒以經驗方

治一切冷氣去

塞耳旦易夜易不過三日愈

### 又方

射罔傳之佳

### 經驗方

冷氣去

風痰定遍身疼痛益元氣強精力固精益髓令人少病川烏頭一斤用五升許大瓷鉢子盛以童子小便浸逐日添注任令溢出浸二七

日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每箇作四片却用新汲井水淘七遍後浸之每日換七日通前浸二十一日取出焙乾

其藥潔白搗羅爲末酒黃麴糊丸菉豆大每服十九空塗蟹處

心鹽湯酒下少粥飲壓之如冷氣稍盛加丸數服之

### 經驗後方

治蛇虺蟻

治痢獨聖丸川烏頭一箇好者柴灰火燒煙欲盡取出地上蓋子合良以細研用酒蠶丸如大麻子每服三丸赤痢用黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下如白用甘草黑豆煎湯放冷吞下

頻易塗蟹處如瀉及肚疼水吞下每於空心服之忌熱物

### 梅師方

治蛇虺蟻

面浮腫頑麻川烏頭一小斤清油四兩蓋四兩一處鎰內熬令裂如桑椹色爲度去皮臍五靈脂四兩合一處爲末入白中搗令勻後蒸餅丸如梧桐子大空心溫酒鹽湯下二十丸亦治丈夫

風疾浸三宿取出切作片子穿一小坎以炭火燒令通赤用好青鹽醋三外同藥傾入熱坎子內盆合之經一宿取出去砂土用好青鹽

四兩研與前藥同炒令赤黃色杵爲末醋麴糊丸如梧子大空心冷酒下十五丸鹽湯

### 又方

治癱緩風手足蟬曳口眼喝斜語言蹇澁

亦得婦人亦宜

瘡得手移得步十九可以自梳頭

### 勝金方

治蠍蟻烏頭末少許頭醋調傳之

靈苑方

治馬汗入瘡腫痛漸甚宜急療之遲則毒深難

理以生烏頭末傅瘡口良久有黃水出立愈

廿治陷甲割甲成瘡連年不差川烏

修真秘訣

治瀉痢三神草湯下

孫兆口訣

治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼

兩一兩生一兩熟炒一兩燒存性研爲末以醋麴糊丸如菉豆大每

服五丸空心服瀉用井花水赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢

生薑甘草湯下

炒令轉色放冷再搗爲細散每一

錢水一盞一撮煎取半盞溫服

古今錄驗治癱攻腫若有瘻肉

唐李寶臣

爲妓人置董于液寶

臣飲之即暗三日死

唐武后

置董於食賀蘭氏食之暴死

衍義曰烏頭烏啄天雄附子側子凡五等皆一物也止以大小長圓大及半兩以上者其力全不勝風家即多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取敷散也此用烏頭附子之大略如此

餘三等則量其材而用之  
其炮製之法經方已著

## 天雄



天雄味辛甘溫大溫有大毒。主風寒濕痺歷節痛。拘攣緩急破積聚邪氣。金瘡強筋骨輕身健行。療頭面風去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦又墮胎。

名白當

生少室山谷二月採根陰乾。遠志爲之使惡腐婢同處居云今採用八月中旬旬天雄似附子細而長便是長者乃至三四寸許此與烏頭附子三種本並出建平故謂之三建今宜都恨山最好謂爲西建錢塘間者謂爲東建氣力劣弱不相似故曰西水猶勝東白也其用灰殺之時有冰強巨兩切者不佳唐本注云天雄附子烏頭等並以蜀道綿州龍州出者佳餘處

## 本草十

七

吉一

縱有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用陶以三物俱出建平故名之非也按國語賓董子肉注云烏頭也爾雅云芟董音斬草郭注云烏頭苗也此物本出蜀漢其本名董今訛爲建遂以建平釋之又石龍芮葉似董故名水董今復爲水茛亦作建音此豈復生建平耶檢字書又無茛字甄立言本草音義亦論之天雄附子側子並同用八月採造其烏頭四月上旬今云二月採恐非時也臣禹錫等

謹按淮南子云天雄雄雞志氣益注云取天雄三枚內雄雞腸中搗生食之令人勇樂性論云天雄君忌政汁大熱有大毒乾薑制用之能治風痰冷癰軟脚毒風能止氣喘促急殺禽蟲毒臣禹錫等云治一切風一切氣助陽道暖水藏補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四肢不遂破痃癖癥結排膿止痛續骨消瘀血補冷氣虛損霍亂轉筋背脊僵僂消風痰下脅膈水發汗止壅汗炮舍治喉癰凡丸散炮去皮膚用飲藥即和皮生使甚佳可以便驗又云天雄大長少角刺而虛烏喙似天雄而附子大短有角平穩而實烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名爲虎掌並是天雄一裔子母之類力氣乃有殊等即宿根與嫩者耳已上並忌政汁

下條并用並得別說云謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭而不生諸附子側子之類經年獨生長大者是也蜀人種之忌生此以爲不利如養蚕而爲白殼之類也

陳藏器天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴坼後去皮尖底用之不然陰制

峽州側子



側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒  
熱鼠瘻又墮胎

本草綱目

云此即附子邊角之大者脫取之昔時不

同根而本經分生三處當各有所宜故也方云少室天雄朗陵烏頭皆稱本土今則無別矣少室山連嵩高朗陵縣屬豫州汝南郡今在北國唐本云側子只是烏頭下共附子天雄同生小者側子與附子皆非正生謂從烏頭傍出也以小者爲側子大者爲附子今稱附子角爲側子理必不然若當陽已下江左及山南嵩高齊魯間附子復有角如大豆許蓼州已上劙南所出者附子之角曾微黍粟持此爲用誠亦難充比來京下皆用細附子有效未嘗取角若然方湏八角附子應言八角側子言取角用不近人情也

本草綱目

云側子即附子邊角之大者

注云昔多不用今以療脚氣甚效按陶云側子即附子邊角之大者削取之蘇云只是烏頭下共附子同生小者爲側子大者爲附子殊

本草十

八

無證據但云附子角小如黍粟難充於用故有此說今據附子邊果有角大如棗核及檳榔已來者形狀亦自是一顆仍不小是則烏頭傍出附子附子傍出側子明矣似烏頭爲烏頭兩歧者爲烏喙細長乃至三四寸者爲天雄根傍如芋散生者名附子傍連生者名側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾其花紫赤其實紫黑今以龍州綿州者爲佳作之法以生熟湯浸半日勿令減氣出以白灰裹之數易使乾又法以米粥及糟翹等並不及前法

吳氏

云側子

圖經曰

烏頭烏喙生朗陵山谷天雄

附子同譜性論云側子使能治冷風濕痺大風筋骨攀急

附子同譜性論

云側子使能

附子同譜性論

云側子使能

生少室山谷附子側子生犍

附子同譜性論

云側子使能

附子同譜性論


云側子使能

生少室山谷附子側子生犍

治山谷及廣漢今並出蜀土然四品都是一種所產其種出於龍州種之法冬至前先將肥腴陸田耕五七遍以猪糞糞之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三尺已來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑椹本只種附子一物至成熟後有此四物收時仍一處造釀方成釀之法先於六月內踏造大小麥翹至收採前半月預先用大麥煮成粥後將上件翹造醋候熟淋去糟其醋不用太酸酸則以水解之便將所收附子等去根湏於新潔甕內淹浸七日每日攬一遍足撈出以彌疎篩攤之令生白衣後向慢風日中曬之百十日以透乾爲度若猛日曬則皺而皮不附肉其長三寸者爲天雄割削附子傍尖芽角爲側子附子之絕小者亦名爲側子元種者母爲烏頭其餘大小者皆爲附子以八角者爲上方藥要用湊炮令裂去皮臍使之綿州彰明縣多種之惟赤水一

鄉者最佳然收採時月與本經所說不同蓋今時所種如此其內地  
 所出者與此殊別今亦稀用謹按本經冬採爲附子春採爲烏頭而  
 廣雅云奚毒附子也一歲爲前與側同子二歲爲烏喙三歲爲附子  
 四歲爲烏頭五歲爲天雄今一年種之便有此五物豈今人種蒔之  
 法用力倍至故爾繁盛也雖然藥力當緩於歲久者耳崔氏治寒疝  
 心腹脅引痛諸藥不可近者蜜煎烏頭主之以烏頭五枚大者去芒  
 角及皮四破以白蜜一斤煎令透潤取出焙乾搗篩又以熟蜜丸冷  
 盐湯吞二十九如梧子一枚除又功用煎烏頭蜜汁以桂枝湯五合解  
 之飲三合不知加五合其知者如醉以爲中病續傳信方治陰毒傷  
 寒煩躁迷悶不主悟人急者用大附子一箇可半兩者立劈作四片  
 生薑一大塊立劈作三片如中指長糯米一撮三味以水一升煎取  
 六合去滓如人體溫頓服厚衣覆之或汗出或不出候心神定即別  
 服水解散太白通關散之類不得與冷水如渴更將滓煎與喫今人多用  
 調服治遍身風癱側中毗摶者号曰木蠻子不入藥用若服之令人喪目

## 齊州半夏



本草十

九

陳藏器云

身風癱

遍

雷公云

生用治風癱

神妙也木蠻子只是諸喙附雄烏

側子

只是附子傍有小顆附子如棗核者是宜

冷酒

側子

只是附子如肉白者爲佳不厭陳久用之皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

肺氣主欬結新生者摩塗癰腫不消能除瘤癰氣虛而有痰氣加

而用之

目華子

云味癰辛治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘧

圖經曰

半夏生槐里川谷今在處有之以齊州者為佳二月生苗

葉根下相重生上大下小皮黃肉白五月八月內採根以灰裹二日

湯洗暴乾一云五月採者虛小八月採者實大然以圓白陳久者為

佳其平澤生者甚小名羊眼半夏又由跋絕類半夏而苗高近一二

尺許根如雞卵大多生林下或云即虎掌之小者足以相亂半夏主

胃冷嘔噦方藥之最要張仲景治反胃嘔吐

大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升以水一斗二升和揚之一百二十遍煮取三升半

溫服一升日再亦治膈間支飲又主嘔穀不得下眩悸半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤菝葜三兩切以水七升煎取一升半分溫

丸日三其餘主寒厥赤丸四逆嘔吐附子粳米湯及傷寒方用半夏

服之又主心下悸半夏麻黃丸等分篩末蜜丸如小豆每服三

丸外洗去滑培乾搗末小麦麪一升合和以水搜令熟丸如彈丸以

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦佳禁食鶏與羊肉

四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攬令濁將半夏投於

中洗三遍用之半夏上有隙延若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑

一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

同剉碎以水

外入壞子內與藥攢勿浸一宿去清水焙乾重碾令細每

服水二盞藥末二錢薑三片同煎至八分溫服至五服効

方治嘔逆大壓痰毒及治酒食所傷其功極驗

丸大入鹽半錢煎取一盞溫服能去嘔膈

壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功極驗

丸大入鹽半錢煎取一盞溫服能去嘔膈

吐不止冷在胃中半夏五兩洗過為末每服二錢白麪一兩

以水和搜切作碁子水煮熟為度用生薑醋調和服之

驗治喉痺半夏末方寸匕雞子一枚頭開竅子去內

以水和搜切作碁子水煮熟為度用生薑醋調和服之

驗令小滿內半夏末着中攢和雞子內以鑊子坐之於炭上煎藥成

置杯中稍暖熱之

金相公篤中方

治蠍瘻人取半夏

止半夏熟洗乾末之

生薑湯服一錢匕

呑下不差加之日再服又若

以火炮之為末貼臍亦佳

凡五絶皆以半夏一兩搗篩為末丸

如大豆內鼻中愈心溫者一日可治

豆內鼻孔中即愈此是扁鵲法

御藥院

治膈壅風痰半夏不計多少酸漿浸一宿溫湯洗五七遍去惡氣日中擦乾搗

# 方

治蠍瘻五孔皆相通半夏

一分為末以水調傅之

經驗後方

正胃半夏二兩天南星二兩右以爲末用水五

斗門方

# 方

治蠍瘻五孔皆相通半夏

一分為末以水調傅之

經驗後方

正胃半夏二兩天南星二兩右以爲末用水五

# 方

治蠍瘻五孔皆相通半夏

一分為末以水調傅之

經驗後方

正胃半夏二兩天南星二兩右以爲末用水五

# 雷公云

是咬着微酸不入藥用若修事半夏

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦

佳禁食鶏與羊肉

四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攢令濁將半夏投於

中洗三遍用之半夏上有隙延若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑

一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

# 本草十

一

吉二

# 雷公云

是咬着微酸不入藥用若修事半夏只

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦

佳禁食鶏與羊肉

四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攢令濁將半夏投於

中洗三遍用之半夏上有隙延若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑

一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

# 雷公云

是咬着微酸不入藥用若修事半夏只

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦

佳禁食鶏與羊肉

四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攢令濁將半夏投於

中洗三遍用之半夏上有隙延若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑

一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

# 雷公云

是咬着微酸不入藥用若修事半夏只

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦

佳禁食鶏與羊肉

四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攢令濁將半夏投於

中洗三遍用之半夏上有隙延若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑

一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

# 雷公云

是咬着微酸不入藥用若修事半夏只

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦

佳禁食鶏與羊肉

四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攢令濁將半夏投於

中洗三遍用之半夏上有隙延若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑

一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

# 雷公云

是咬着微酸不入藥用若修事半夏只

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦

佳禁食鶏與羊肉

四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攢令濁將半夏投於

中洗三遍用之半夏上有隙延若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑

一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

# 雷公云

是咬着微酸不入藥用若修事半夏只

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦

佳禁食鶏與羊肉

四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攢令濁將半夏投於

中洗三遍用之半夏上有隙延若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑

一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

# 雷公云

是咬着微酸不入藥用若修事半夏只

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦

佳禁食鶏與羊肉

四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攢令濁將半夏投於

中洗三遍用之半夏上有隙延若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑

一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

# 雷公云

是咬着微酸不入藥用若修事半夏只

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦

佳禁食鶏與羊肉

四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攢令濁將半夏投於

中洗三遍用之半夏上有隙延若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑

一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

# 雷公云

是咬着微酸不入藥用若修事半夏只

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦

佳禁食鶏與羊肉

四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攢令濁將半夏投於

中洗三遍用之半夏上有隙延若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑

一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

# 雷公云

是咬着微酸不入藥用若修事半夏只

水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺

病減欲更重合亦

&lt;

爲末漿水搜餅子日中乾之再爲末每五兩入生腦子一錢研勻以

漿水濃脚九雞頭大紗袋盛通風處陰乾每一丸好茶或薄荷湯下

## 紫靈元君

南嶽夫人內傳治卒死半夏末如大豆許吹鼻中

衍義曰

半夏今人惟知去痰不言益脾蓋能分水故也脾惡濕濕則濡而困困則不能制水經曰濕勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升瓷瓶中慢火燒爲熟水時時呷數日便已

## 江州虎掌



## 冀州虎掌



虎掌味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋癥拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及冤句二月八月採陰乾

蜀漆爲之使惡莽草

陶隱居

云近道亦有形似半夏但皆大四邊有子如虎

掌今用多破之或三四片爾方藥亦不正用也

唐本注

云此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝丫音鴉腋古協切莖根大者如拳小

者如雞卵都似扁柿四畔有圓牙看如虎掌故有此名其由跋是新

根猶大於半夏二三倍但四畔無子牙爾陶云虎掌似半夏即由來以

由跋爲半夏釋由跋苗全說焉尾南人至今猶用由跋爲半夏也

目

萬錫等著本圖經云虎掌使味甘不入湯服能治風眩目轉主疝瘕腸

痛主傷寒、時疾強陰

圖經曰虎掌生漢中山谷及冤句今河北州郡亦有之

初生根如豆大漸長大似半夏而扁累年者其

根圓及寸大者如雞卵周回生圓芽二三枚或五六枚三月四月生

苗高尺餘獨莖上有葉如爪五六出分布尖而圓一窠生七八莖時出

一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙莖作房傍開一口上下尖

中有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠

九月苗殘取根以湯入器中漬五七日湯冷乃易日換三四遍洗去

涎暴乾用之或再火炮今冀州人菜園中種之亦呼爲天南星江州

有一種草葉大如掌面青背紫四畔有芽如虎掌生三五葉爲一本冬青治心痛寒熱積氣不結花實與此名同故附見之

由跋主毒腫結熱

如烏囊而布地花紫色根似附子苦酒

本草十

士

張

摩塗腫亦效不入餘藥唐本注云由跋根尋陶所注乃是鳶尾根即鳶頭也由跋今南人以為半夏頓爾乖越非惟不識半夏亦不知由跋與鳶尾也今按陳藏器本草云半夏高一二尺生澤中熟地根如小指正圓所謂羊眼半夏也由跋苗高一二尺似苦蕎根如雞卵生林下所謂由跋也王禹錫等謹按蜀本圖經云春抽一莖莖端直八九葉根圓扁而肉白

高錫等謹按蜀本圖經

圖經

文具半夏條下

右由跋一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

鳶尾味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚大水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園

生九疑山谷五月採

陶隱居云方家云是射干苗無鳶尾之名主療亦異當別一種物方亦有用鳶

頭者即應是其根療體相似而本草不顯之唐本注云此草葉似射干而闊短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白有小毒嚼之載人咽喉與射干全別人家亦種所在有之射干花紅抽莖長根黃有曰今陶云由跋正說鳶尾根莖王禹錫等謹按蜀本云此草葉名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶根又圖經云葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數个相連今所在皆有九月十月採根日乾

本草十

十二

圖經

文具射干條下


陳藏器云鳶尾主飛尸游蠱薯喉中氣欲絕者以

根削去皮內喉中摩病處令血出為佳

右鳶尾一種古本所有政和監本脫

漏不載今照依嘉祐監本補之於此

大黃



大黃

軍

味苦寒

大寒無毒主下瘀血開寒熱破癥

瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調

中化食安和五臟

平胃下氣除痰寶腸間結熱心腹脹

滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結一名黃良生河

西山谷及隴西二月八月採根火乾

得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心

下悸氣得消石紫石英桃人療女子血閉黃芩爲之使無所畏

居云今採益州北部汶山及西山者雖非河西隴西好者猶作紫地

錦色味甚苦澁色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾亦有火乾者皮

小焦不如而耐蛀堪久此藥至勁利龜者便不中服最爲俗方所重

道家時用以去痰疾非養性所須也將軍之號當取其駿快矣

唐本

即不堪矣葉子莖並似羊蹄但龜長而厚其根細者亦似宿羊蹄大者乃如腕長二尺作時燒石使熱橫寸截著石上燙之一日微燥乃

繩穿眼之至乾爲佳幽并已北漸細氣力不如蜀中者今出宕州涼州西羌蜀地皆有其莖味酸堪生啖亦以解熱多食不利人陶稱蜀地

者不及隴西誤矣

金匱陳藏器本草云大黃用之當分別其力若取

陳去熱當取河西錦紋者凡有蒸有生有熟不得一槩用之

目禹錫

圖經云高六七尺莖脆

論云蜀大黃使去寒熱忌冷水

味苦甘消食鍊五藏通女子經候利水腫能破瘀實冷熱結聚宿食

蹄又云葉似蓖麻根如大芋傍生細根如牛蒡小者亦似羊

蹄

圖經云高六七尺莖脆

論云蜀大黃使去寒熱忌冷水

部

本草十

十三

二節

利大小腸貼熱毒腫主小兒寒熱時疾煩熱鈍破留血通宣一切氣調血脉利開節泄壅滯水氣四肢冷熱不調溫瘴熱疾利大小便并傳一切瘡癧

圖經曰

大黃生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀

離毒廓州馬蹄峽中者次川錦文昔佳其次秦隴來者謂之土蕃大黃正月內生青葉似蓖麻大者如扇根如芋大者如腕長一二尺傍生細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二月八月採根去黑皮火乾江淮出者曰土大黃二月開花結細實又鼎州出一種羊蹄大黃療瘡甚效初生苗葉如羊蹄累年長大即葉似蘇恭云作時燒石使熱橫寸截著石上燙之一日微燥乃繩穿眼之陸而狹尖四月內於押條上出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼爲金蕎麥三月採苗五月收實並乾九月採根破之亦有錦文曰乾之亦呼爲土大黃凡收大黃之法謂之牛舌大黃二者用之皆等本經稱大黃推陳致新其效最神形謂之牛舌大黃二者用之皆等本經稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多又有三物備急丸司空裴秀爲散用療心腹諸疾卒暴百病其方用大黃乾薑巴豆各一兩湏精新好者搗篩蜜和更搗一千杵丸如小豆服三丸老小斟量之爲散不及丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以緩水若酒服之若不下捧頭起灌令下喉湏臾差未知更與三丸腹當鳴轉即吐下便愈若口已噤亦湏折齒灌之藥入喉即差崔知悌療小兒無辜閃癖瘰癧或頭乾黃聳或乍痢乍

差諸狀多者皆大黃煎主之大黃九兩錦文新實者若微朽即不中  
用削去蒼皮乃秤搗篩爲散以上好米醋三升和之置銅碗中於大  
鑄中浮湯上炭火煮之火不用猛又以竹木籠攬藥候任丸乃停於  
小瓷器中貯兒年三歲一服七丸如梧子日再服常以下青赤膿爲  
度若不下膿或下膿少者稍稍加丸下膿若多丸又湏減病重者或至  
七八劑方盡根本大人小兒以意量之此藥惟下膿宿結不令兒利  
湏禁食毒物食乳者乳母亦同忌法崔元亮海上方治腰脚冷風氣  
以大黃二大兩切如棊子和少酥炒令酥盡入藥中切不得令黃焦  
則無力搗篩爲末每日空腹以水大三合入生薑兩片如錢煎十餘  
沸去薑取大黃末兩錢別置椀子中以薑湯調之空腹頓服如有餘  
薑湯徐徐呷之令盡當下冷膿及惡物等病即差止古人用毒藥攻  
病必隨人之虛實而處置非一切而用也姚僧垣初仕梁武帝因發  
熱欲服大黃僧垣曰大黃乃是使藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至  
委頓元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧垣曰脉洪  
而實此有宿妨非用大黃無差理帝從而遂愈以此言之今醫用一  
毒藥而攻衆病其偶中病便謂此方之神奇其差誤乃不言用藥之  
失如此者衆

**公云** 凡使細切內文如水旋斑緊重剉蒸從巳至未熟乾又灑臘水蒸從未至亥如此蒸七度熟乾却灑薄蜜水再蒸一伏時其大黃擘如烏膏樣於日中曝乾用之爲妙

本草十

十四

分爲二服 又方 热病狂語及諸黃用川大黃五兩剉炒微赤搗爲散用  
臘月雪水五升煎如膏每服不計時候冷水調下半匙  
**外臺秘要** 療癬方 大黃十兩杵篩醋三外和勻白蜜兩匙煎堪  
丸 如梧桐子大一服三十丸生薑湯吞下以利爲度  
**小者** 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等用錦  
紋大黃一兩杵羅爲末用頭醋半外同熬成膏丸  
減之 千金方

**如梧桐子大患者用溫醋七分盞化五丸服之良久下亦治馬墜內損**

**梧子大每服茶下十丸**如要微動喫十五丸冬月中最宜服並不搜攬人治卒外腎偏腫疼痛大黃末和醋塗之乾即止腰痛用大黃半兩更入生薑半兩同研小豆大粒

**之止血方** 治腹痛月大黃半兩、生薑半兩同七枚，小正力於鑄內炒令黃色投水兩碗至五更初頓服天明取下腰間惡血。物用盆器盛如雞肝樣即痛止。

**半盞前三五沸無時服** **廣利方** 治骨節熱積漸黃瘦大黃四分以童子小便五大合煎取四合去滓空腹分爲兩服如人

**傷寒類要** 痘急黃病大黃角切二兩水三升半浸一宿  
里再服 平旦煎絞汁一外半內芒消二兩絞服湏臾  
當快

**別說云**

謹按大黃收採時皆以火燒石博乾欲速貨賣更無生者用之不湏更多炮炙少蒸煮之類也

**衍義曰**

大黃損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足矣而不用補心湯更用瀉心湯何也答曰若心氣獨不足則不當須吐衄也此乃邪熱因不足而客之故吐衄以苦泄其熱就以苦補其心蓋兩全之有是證者用之無不效量虛實用藥

曹州蕁蘆



丹州蕁蘆



成德軍蕁蘆



本草十

十五

張

蕁蘆味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱

破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上

出面目浮腫身暴中風熱癆

音沸

痒利小腹久服令人虛

一名丁歷一名葷

音典

一名大室一名大適生橐城平

澤及田野立夏後採實陰乾得酒良

榆皮爲之使惡彊蟲石

者最勝今近道亦有母則公蕁子細黃至苦用之當熬今按此藥亦

療肺壅上氣嗽定喘促除胃中痰飲

目禹錫等

蜀本云苗似

蕁蘆春末生高二三尺花黃角生子黃細五月熟採子暴乾藥性論

亭歷注寶葉皆似芥一名狗蕁

云利小腸通水氣虛腫

**圖經曰**

蕁蘆生橐城平澤及田野

今京東陝西河北州郡皆

有之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸有似蕁根白枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色立夏後採實暴乾月令孟夏之月靡草死許慎鄭康成注皆云靡草蕁蕁蘆之屬是也至夏則枯死故此時採之張仲景治肺癰喘不得卧蕁蘆大棗瀉肺湯主之蕁蘆炒黃色搗末爲丸大如彈丸每服用大棗二十枚水三升煎之取二升然後內一彈丸更煎取一升頓服之支飲不得息亦主之

崔知悌方療上氣欬嗽長引氣不得卧或遍體氣腫或單面腫或足腫並主之草薢子三升微火熬搗篩爲散以清酒五升漬之冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬日二夜二量其氣力取微利一  
二爲度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其草薢單莖  
向上葉端出角角瓣且短又有一種苟芥草葉近根下作竒生角細  
長取時必須分別前件二種也又篋中方治嗽舍膏丸曹州草薢子  
一兩紙襯熬令黑知母一兩貝母一兩三物同搗篩以棗肉半兩別  
銷沙糖一兩半同入藥中和爲丸大如彈丸每服以新綿裹一丸舍  
之徐徐熱津甚者不過三丸今醫亦多用

使以糯米相合於焙上微微焙待米熟去米單搗用

令極細用生絹袋盛以清酒五升浸三日後每服抄一匙用粥飲調下日三四服

用甜草薢三兩隔帛炒令紫色搗如膏每服九如彈丸大以水一中盞入棗四枚煎至五分去滓非時服

治食飲不得息草薢子三兩熬令黃搗爲末以水三升煮大棗三十枚得汁一升內藥中每服如棗大煎取七合頓服

熬以酒五升浸七日日服三合

驗方 河東裴氏傳經効治水腫及暴腫草薢子一升泥即下漢防已末四兩取綠頭鴨就藥曰中截頭瀝血於臼

治腹脹積聚癥瘕草薢子一升

雷公云 凡使勿用赤頸子真相似草薢子只是味微甘苦草薢子入頸苦凡

本草十

十六

又方 治支飲久不差大腹水腫喘促不止

聖惠方 草薢一升隔帛炒令紫色搗治上氣喘急遍身浮腫用甜

外臺秘要 千金翼 治頭風搗草薢子以湯淋取汁洗頭止

又方 治支飲久不差大腹水腫喘促不止

千金方 治頭風搗草薢子以湯淋取汁洗頭止

續十全方 治一切毒入腹不可療及馬汗用草薢子一升炒研以水一升浸湯服取下惡血

氏 治水氣草薢三兩以物盛甌上蒸令熟即搗萬杵若丸得如梧桐子不湏蜜和一服五丸漸加至七丸以得微利即佳不可多服令

人不堪美食若氣發又服之得利氣下定即停此方治水氣無比蕭駒馬患水腫惟服此得差

傷寒類要 治腎

減服

治小兒水氣腹腫兼下痢膿血小便澁草薢子三兩炒大棗三十枚水三升去棗內草薢於棗汁煎丸如梧子飲下十九

治肺壅氣喘急不得卧草薢子二兩大棗二十枚以水一大升煎取一小升去棗內草薢於棗汁煎丸如梧子飲下十九

方 前取一小升去棗內草薢於棗汁煎丸如梧子飲下十九

減服

治小兒水氣腹腫兼下痢膿血小便澁草薢子半兩微炒搗如泥以棗肉和搗爲丸如葵丘大每服五丸棗湯下空心晚後量兒大小加

乾以草薢主之 子母秘錄 治小兒白秃草薢搗末以湯洗訖塗上

衍義曰 草薢用子子之味有甜苦兩等其形則一也經既言味辛故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其理甚明藥性論所說盡矣但不當言味酸

和州桔梗



解州桔梗



成州桔梗

桔梗味辛苦微温

有小毒主骨脣痛如刀刺腹滿腸

鳴幽幽驚恐悸氣

利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺

本草十

十七

二

溫中消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白  
藥一名梗草一名齊莞生嵩高山食及冤句二八月採根

暴乾

節皮爲之使得牡蠣遠志療恚怒得消石石膏療傷寒畏白

毒所謂亂人參者便是非此桔梗而葉甚相似但齊莞葉下光明滑澤無毛爲異葉生又不如人參相對者爾

唐本注云人參苗似五加閼短莖圓有三四極頭有五葉陶引齊莞亂人參謬矣且齊莞桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根

有心無心爲別爾

巨禹錫等謹按藥性論云桔梗呂味苦平無毒能治下痢破血去積氣消積聚痰涎主肺氣氣促嗽逆除腹中冷痛主

中惡及小兒驚癇

日華子

云下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟溫補虛消痰破癰瘕養血排膿補內漏及喉痺發毒以白粥解

圖經曰

桔梗生嵩山谷及冤句今在處有

之四如小指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長橢四葉相對而生嫩時亦可煮食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋後結子

八月採根細剉暴乾用葉名隱忍其根有心無心者乃齊莞也而齊

莞亦能解毒二物頗相亂但齊莞葉下光澤無毛爲異閑中桔梗根

黃頗似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊花葉古方亦單用之古今錄驗療卒中蠱下血如雞肝者晝夜出血石餘四藏皆損惟心未毀

或臯破待死者取桔梗搗屑以酒服方寸匕日三不能下藥以物抑口開灌之心中當煩湏臾自定服七日止當食猪肝腫以補之神良集驗方療胃中滿而振寒脉數咽燥不渴時時出濁唾腥臭久以吐膾如梗米粥是肺癰治之以桔梗甘草各二兩炙以水三升煮取一升分再服朝暮吐膾血則差

## 雷公云

凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是腥并兩畔附枝子於槐砧上細剉用百合水浸一伏時瀝出緩火熬令乾用每修事四兩用生百合五分搗作膏投於水中浸

## 惠方

治馬喉痺并毒氣壅塞用桔梗二兩去蘆頭剉以水三大盞煎至一盞去滓非時溫服

## 千金方

治喉閉并毒氣桔梗二兩水三升煮取一升頓服

## 又方

姪姍中惡

## 聖

心腹疼痛用桔梗一兩細剉水一中盞入生薑三片煎至六分去滓仍吞麝香如大豆許佳

## 经验後方

治骨膿風牙疼腫桔梗爲末棗穰和九寸七日四五亦止吐下血

## 百一方

若被打擊瘀血在腸內久不消時發動者取桔梗末熟水下刀圭

治瘻敷喘急不定桔梗一兩半搗羅爲散

## 外臺秘要

治卒客忤停尸不能言者

## 又方

中惡

用童子小便半升煎取四合去滓溫服

## 子母秘錄

治小兒卒客忤死燒

桔梗末三錢七飲服

## 簡要濟衆

客忤死燒

溫服食後細呷之亦治肺壅

## 梅師方

治卒蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕

藏府敗壞桔梗搗汁服七合佳

衍義曰

桔梗治肺熱氣奔促嗽逆肺癰排膿陶隱居云俗方用此乃名齊危今別有齊危所謂亂人參者便是非此桔梗也

唐本注云陶引齊危亂人參謬矣今詳之非也陶隱居所言其意

止以根言之所以言亂人參唐本注却以苗難之乃本注誤矣

## 本草十

## 十八

### 秦州茛菪



### 莨菪

音蕘

### 子味苦甘寒

有毒主齒痛出蟲肉蟬拘急使人健行見鬼療癲狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神一名橫唐一名行

# 唐生海濱川谷及雍州五月採子

陶隱居

云今處處有子形

療癲狂方用尋此乃不可多食過劑爾久服自無嫌通神健行足爲大益而仙經不見用今方家多作狼藉今按陳藏器本草云茛菪子主疚癥安心定志聰明耳目除邪逐風變白性溫不寒取子洗暴乾隔日空腹水下一指捻勿令子破即令人發狂亦用小便浸之令泣小便盡暴乾依前服之目禹錫等謹按蜀本圖經云葉似王不留行菘藍等莖葉有細毛花白子殼作瞿子形實扁細若粟米許青黃色所在皆有六月七月採子曰乾藥性論云茛菪亦可單用味苦辛微熱有大毒生能瀉人見鬼拾針狂亂熱炒止冷痢主齒痛呻牙孔子咬之蟲出石灰清煮一伏時掬出去芽暴乾以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴爲丸去一切冷氣積年氣痢甚溫暖熱發用菉豆汁解之焦炒碾細末治下部脫肛日華子云溫有毒甘草外麻犀角並能解之燒熏呻牙及洗陰汗關四月開花紫色苗莢莖有白毛五月結實有殼作瞿子狀如小石榴房中子至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾謹按本州今處處有之苗莖高二三尺葉似地黃王不留行紅藍等而三指又古方主卒癲狂亦多單用茛菪不知果性寒邪小品載治癲狂方經云茛菪性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄川王美人懷子而不乳意飲以浪蕩藥一撮以酒飲之旋乳且不乳豈熱藥所治云取茛菪三升作末酒一升漬數日出搗之以向汁和絞去滓湯上煎令可丸服如小豆三丸日三當覺口面急頭中有蟲行額及手足

## 本草十

十九

### 圖經曰

茛菪子生海濱川谷及雍

有赤色處如此並是差候未知再服取盡神良又篋中方主腸風茛菪煎取茛菪實一外治之暴乾搗篩生薑半斤取汁二物相合銀鍋中更以無灰酒二升投之上火煎令如稠鈎即旋投酒度用酒可及五升以來即止前令可丸大如梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若九時粘手則菟絲粉襯隔煎熬切戒火緊則藥易焦而失力矣初服微熱勿恠疾甚者服過三日當不利疾去利亦止絕有効雷公云凡使勿令使蒼冥子其形相似只是服無効時人多用醋爲度却用黃牛乳汁浸一宿至明看牛乳汁黑即是茛菪子大毒熟乾別搗重篩用勿誤服衝人心大煩悶眼生逼火別說謹按茛菪之功未見如所說而其毒有甚者二日而芽方生用者宜審之

草蒿

草蒿



草蒿味苦寒無毒主疥癩瘡瘍惡瘡殺蟲留熱在骨

節間明目一名青蒿一名方漬生華陰川澤

陶隱居云

即今青蒿人亦取雜香菜食之唐本注云此蒿生接傅金瘡大止血生肉止疼痛良今按陳藏器本草蒿主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗並搗絞汁服亦暴乾爲末小便中服如覺冷用酒煮又燒爲灰紙八九重淋取汁和石灰去息肉壓子目禹錫等謹按蜀本圖經云葉似茵陳蒿而背不白高四尺許四月五月採苗日乾江東人呼爲猢蒿爲其臭似猢北人呼爲青蒿爾雅云萬故釋曰萬一名故詩小雅云食野之萬陸機云青蒿也荆豫之間汝南汝陰皆云故孫炎云荆楚之間謂萬爲故郭云今人呼青蒿香中臭啖者爲故是也目華子云青蒿補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮黑不老兼去蒜髮心痛熱黃生搗汁服并傅之瀉痢飯飲調末五錢匕燒灰和石灰煎治惡瘡瘍并莖亦用又云臭蒿子涼無毒治勞下氣蟲煎洗又云臭蒿汗及邪氣鬼毒又名草蒿開胃止盜汗及邪氣鬼毒又名草蒿有之春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏高三四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月間採子陰乾根莖子葉並入藥用乾者炙作飲香尤佳青蒿亦名方漬凡使子勿使葉使根勿使莖四者若同反以成疾得童子小便浸之良治骨蒸熱勞爲最古方多單用者葛氏治金刃初傷取生青蒿搗傅上以帛裹創血止即愈崔元亮海上方療骨蒸鬼氣取童子小便五大斗澄過青蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉二物相和內好大釜中以猛火煎取三大斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二大斗即取猪膽十枚相和前一大斗半除火待冷以新甕器盛每欲服時取甘草二三兩熟炙搗末以前和搗一千杵爲丸空腹粥飲下二十九丸漸增至三十九丸止雷公云凡使唯中爲妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾採得葉不計多少用七歲兒童七箇溺浸七日七夜後漉出煦乾用之搗傅瘡上止血生肉最早春便生色白者是自然香醋淹爲菹益人治骨蒸以小便漬一兩宿乾未爲丸甚去熱勞又鬼氣取子爲末酒服之方寸匕差燒灰淋汁和石灰煎治惡瘡瘍醫百一方治蜂蟄人嚼青蒿傅瘡上即差斗門方治丈人勞瘦青蒿細剉水三斗童子小便五升同煎取二升半去滓入器中煎成膏丸如梧桐子大空心臨卧以溫酒吞下二十九丸衍義曰草蒿今青蒿也在處有之得春最早人別以爲蔬根赤葉謂之爲香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青猶青故氣芬芳恐古人所用以深青者爲勝不然諸蒿何嘗不青

本草十

二十

圖經曰

草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處

身補中不老明日熬風毒

人治蜂蟄人嚼青蒿傅瘡上即差夫婦

身補中不老明日熬風毒人治丈人勞瘦青蒿細剉水三斗童子小便五升同煎取二升半去滓入器中煎成膏丸如梧桐子大空心臨卧以溫酒吞下二十九丸

人治蜂蟄人嚼青蒿傅瘡上即差夫婦

身補中不老明日熬風毒人治丈人勞瘦青蒿細剉水三斗童子小便五升同煎取二升半去滓入器中煎成膏丸如梧桐子大空心臨卧以溫酒吞下二十九丸

人治蜂蟄人嚼青蒿傅瘡上即差夫婦

身補中不老明日熬風毒人治丈人勞瘦青蒿細剉水三斗童子小便五升同煎取二升半去滓入器中煎成膏丸如梧桐子大空心臨卧以溫酒吞下二十九丸

# 隨州旋覆花



旋覆花味鹹甘溫微冷利有小毒主結氣脇下滿驚

慚除水壅藏間寒熱補生下氣消腫上痰結唾如膠

漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵

瞼音利大腸通血脉益色澤一名戴椹一名金沸草

名盛椹其根主風濕生平澤川谷五月採花日乾三十

日成

陶隱居  
南來北國亦有形似芳窮惟合旋蓄膏用之餘無所入非此旋復花根也

唐本草

云旋覆根在中品

陶云苗似薑根似高良薑而細

此是山薑證不是旋復根今復道從北國來似芳窮芳窮與高良薑

音

此是山薑證不是旋復根今復道從北國來似芳窮芳窮與高良薑

本草十

主

全無髮鱗爾

目禹銀等譜按蜀本草

圖經云

旋復花葉似水蘇花黃如

菊

今所在皆有六月至九月採花

華子論

云旋復花使味甘無毒主

助脅氣下寒熱水腫主治膀胱宿水去逐大腹開胃止嘔逆不下食

明目治頭風通血脉止金瘡血

音福旋徐願反用根

日華子

云無毒

圖經曰

今所在有之二月已

後生苗多近水傍大似紅藍而無刺長一二尺已來葉如柳葉細

六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花七月八

月採花暴乾二十日成今近都人家園圃所蔣金錢花葉並如上

說極易繁盛恐即此旋復也張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣

不除有七物旋復代赭湯雜治婦人有三物旋復湯

得後去裏花葉殼皮并蒂子

外臺秘要

救急續筋法取旋復

花草根淨洗土搗量瘡

瘡中仍用滓

取花葉蒸從已至午時乾用

大少傳之日一

又方

破研筋斷者以旋復

根搗汁瀝瘡中仍用滓

封瘡上十五日即斷筋便續此方出蘇景中

治中風及壅滯以旋復花洗塵令淨搗末煉蜜丸如桐子大夜卧以茶湯下五丸至七丸

家療效

家療奴

經驗後方

治中風及壅滯以旋復

花治血瘡止血搗旋

治中風及壅滯以旋復

頭目風其味甘苦辛亦走散之藥也其旋花四月五月有花別一種非此花也第七卷已具之



解州藜蘆



解州藜蘆

黎蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭癆疥瘡惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息肉

馬刀爛瘡不入湯一名葱莽一名葱葵

音

一名山葱生

太山山谷三月採根陰乾

黃連爲之使反細辛芍藥五參惡

神農雷公辛有毒歧伯鹹有毒季氏大毒大寒扁鵲苦有毒大葉根小相連

君子

曰黎蘆生泰山山谷今陝西山南東西州郡皆有之三月生苗

葉青似初出櫻心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上

水溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥用今用者名葱白黎蘆根鬚甚少

只是三十莖生高山者爲佳均州土俗亦呼爲鹿葱此藥大吐上

膈風涎閭風癇病小兒鰕飼用錢匕一字則惡吐人又用通項令人嘔而古經本草云療嘔逆其效未詳今萱草亦謂之鹿葱其類全別

主療亦不同耳

雷公云

凡採得去頭用糯米泔汁煮從已至未出熟乾用之

治黑痣

面上用藜蘆灰五兩水一大碗淋灰汁於銅器中盛以重湯煮令如黑膏以針微撥破痣處點之良不過三遍神驗

治牙疼內藜蘆末於經驗後方治中風不語喉中如拽鋸聲口中牙孔中勿咽汁神效浮皮於脣子上陷一箇坑子內入陳醋二勺斗子四面用火逼令黃色同一處搗再研極細用生薑爲丸如赤豆大每服三丸溫酒下

百一方

治黃疸取藜蘆着灰中炮之小麥色搗爲末水服半錢匕小吐不過數服

斗門方

治疥癬用藜蘆細搗爲末

以生油塗傳之

# 簡要濟衆

治中風不省人事牙關緊急者熟蘆一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色搗爲末每服半錢溫水調下以吐出風涎爲効如人行三里未吐再服

衍義曰

熟蘆爲末細調治馬疥痒

鈎吻味辛溫有大毒

主金瘡乳瘻中惡風欬逆上氣水

腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥

蟲殺鳥獸

一名野葛

折之青烟出者名固活甚熱不

入湯生傳

附高山谷及會稽東野

半夏爲之使惡黃芩陶隱居云五符中亦云鈎吻是

野葛言其入口則鈎人喉吻或言吻作挽字牽挽入腸而絕之覈胡革切事而言乃是兩物野葛是根狀如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得集之今人用合膏服之無嫌鈎吻別是一草葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生旣極類黃精故以爲殺生之對也或云鈎吻是毛茛此本及後說參錯不同未詳云何又有一物名陰命赤色著木懸其子生山海中最有大毒入口能立殺人

唐李注

云野葛生桂州以

南村墟間巷間皆有彼人通名鈎吻亦謂苗名鈎吻根名野葛蔓生人或誤食其葉者皆致死而羊食其苗大肥物有相伏如此若巴豆

本草十

二十三

桔

鼠食則肥也陶云飛鳥不得集之妄矣其野葛以時新採者皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防己皮節斷者良正與白花藤根相類不深別者頗亦惑之其新取者折之無塵氣經年已後則有塵起根骨似枸杞有細孔者人折之則塵氣從孔中出今折枸杞根亦然經言折之青煙起者名固活爲良此亦不達之言也且黃精直生如龍膽澤漆兩葉或四五葉相對鈎吻蔓生葉如柿葉博物志云鈎吻葉似亮葵並非黃精之類毛茛是有毛石龍芮何干鈎吻目禹錫等謹按蜀本秦鈎吻主喉痺咽中塞聲齶欬逆氣溫中名除辛生寒石山二月八月採謹按鈎吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭鬼箭等並一名鬼督郵鬼督郵自是一物今鈎吻一名野葛則野葛自有一種明矣且藥有名同而體異者極多非獨此也據陶注云鈎吻葉似黃精而莖紫當心抽花黃色者是蘇云野葛出桂州葉似柿葉人食之即死者當別是一物爾又云苗名鈎吻根名野葛亦非通論按今市人皆以葉似黃精者爲鈎吻按雷公炮炙方云黃精勿令誤用鈎吻鈎吻葉似黃精而頭尖處有兩毛苦鈎是也吳氏云秦鈎吻一名毒根神農辛雷公有毒殺人生南越山或益州葉如葛赤莖大如箭根黃正月採洪方云鈎吻與食芹相似而生處無他草其莖有毛誤食之殺人表錄異云野葛毒草也俗呼爲胡蘋草誤食之則用羊血解之滴地生菌子收之名菌藥烈於野葛胡蔓葉細長光潤

陳藏器

云人食其葉飲冷水即死冷水發其毒也彼人以野葛銅人勿與冷水至肥大以冷水飲之至死懸尸於樹汁

滴地生菌子收之名菌藥烈於野葛胡蔓葉細長光潤

雷公云

凡使勿用地精苗莖與鈎吻同其鈎吻治人身一惡毒瘡

勑其地精煞入採得後細剉搗了研  
絞取自然汁入膏中用勿誤餌之

黃帝問天老

曰天地所生

者乎天老曰太陰之精名曰

鈎吻

不可食之入口則死

博物志

云鈎吻毒桂心

恭葉涕解之

## 滁州射干



射千味苦平微溫有毒主效通上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾

間效唾言語氣臭散胷中熱氣久服令人虛一名鳥扇一名鳥萋一名鳥吹一名草薑生南陽川谷

## 本草十

田野三月三日採根陰乾

蘭蕙居

云此即是烏萋根庭臺多種

射亦作夜音人言其葉是鳶尾而復又有鳶頭此蓋相似爾恐非鳥  
萋者即其葉名矣又別有射干相似而花白莖長似射人之執竿者  
故阮公詩云射干臨層城此不入藥用根亦無塊惟有其質唐本注  
云射干此說者是其鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似  
高良薑而肉白根即鳶頭陶說由跋都論此爾目錫等謹按蜀本  
云射干微寒圖經云高三尺花黃實黑根多鬚皮黃黑肉黃赤今  
所在皆有二月八月採根去皮日乾用之陳藏器云射干鳶尾按此  
二物相似人多不分射干總有三物佛經云夜干紹就此是惡獸似  
青黃狗食人郭云能緣木又阮公詩云夜干臨層城此即是樹今之射  
干殊高大者本草射干即人間所種為花卉亦名鳳翼葉如鳥翅秋  
生紅花赤點鳶尾亦人間多種苗低下於射干如鳶尾春夏生紫碧  
花者是也又注云據此猶錯夜干花黃根亦黃色藥性論云射干使  
有小毒能治喉痺水漿不入能通女人月閉治症氣消瘀血日華子  
云消痰破癥結胃膈滿腹脹氣喘痃癖開胃下食消腫毒鎮肝明目  
根潤亦有形似高良薑大小赤黃色淡硬五六七月採圖經曰射音夜平生南陽山谷田野  
多種植春生苗高二三尺葉似蠻薑而狹長橫張疎如翅膀狀故一  
名烏萋謂其葉耳葉中抽莖似萱草而強硬六月開花黃紅色瓣上  
有細文秋結實作房中子黑色根多皯皮黃黑肉黃赤三月三日採  
根陰乾陶隱居云療毒腫方多作夜干今射亦作夜音又云別有射

干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨層城是也此不入藥用蘇恭射干說是鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白根即鳶頭也又按荀子云西方有木焉名曰射干莖長四十生於高山之上而臨百仞之淵其莖非能長也所立者然也楊倞注云當是草而云木誤也今觀射干之形其莖梗疎長正如長竿狀得名由此耳而陶以夜音爲疑且古字音呼固多相通若漢官僕射主射而亦音夜非有別義也又射干多生山崖之間其莖雖細小亦類木梗故荀子名木而蘇謂陶說爲鳶尾鳶尾花亦不白其白者自是射干之類非鳶尾也鳶尾布地而生葉扁闊於射干蘇云花紫碧色根如高良薑者是也本經云生九嶷山谷今在處有大類薑也五月採一

云九月十月採根日乾

亥凍出日

乾用之

射干汁取下

亦可丸服之

外臺秘要

治喉痺射干一

肘後方

治小兒疝發時腫痛如刺用生

片含蘇汁差

衍義曰

射干此乃荀子所說西方之木名曰射干者也注復引本草曰不合以射干爲木殊不知五行止以水火木金土而言之故儒者以草木皆木也金鉉皆金也糞土皆土也灰火皆火也

水池皆水也由是言之即非佛經所說火宅喻之獸及阮公所云臨

層城者之木况本經亦曰一名草薑故知是草無疑今治

肺氣喉痺爲佳日華子曰大小似高良薑赤黃色此得之

## 本草十

二十五

三

### 興州蛇舍



蛇全

合是  
舍字

味苦微寒無毒

主驚癇寒熱亦氣除熱金

瘡疽痔瘻惡瘡頭癰

療心腹邪氣腹痛濕痺養胎

利小兒

一名蛇銜

生益州山谷八月採陰乾

陶隱居云即

有兩種並生石上當用細葉黃花者處處有之亦生黃土地不必皆

生石上也

唐本草

今按

陳藏器本草云蛇銜主蛇咬種之亦令無蛇今以

見古本草也草內蛇口中緣傷人亦不能有毒矣

目高錫等著蜀本圖經云生

石上及下濕地花黃白人家亦種之五月採苗生用

藥性論云蛇銜

目有毒能治丹癰治小兒寒熱日華子云蛇銜能治蛇蟲蜂虺所傷

及眼赤止血協風癰癧

圖經曰

蛇舍生益州山谷今近處亦有之

生土石上或下濕地蜀中人家亦

種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者為佳八月採

根陰乾古今錄驗方治赤癰用蛇銜草搗令極爛傳之差赤癰者由

冷濕搏於肌中甚即為熱乃成赤癰得天熱則劇冷則減是也古今

諸丹毒瘡腫方通用之又下有女青條云蛇銜根也生朱崖陶隱居

蘇恭皆以為若是蛇銜根不應獨生朱崖或云是雀瓢即蘿摩之別

名或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦稀識別故但附著於此

雷公云

凡使勿用有葉尖葉者号竟命草其味別空只酸澁不入用若誤服之吐血不止速服知時子解之採得後去

根莖只取葉細切

時後方

治金瘡亦搗傳之佳

又方

治蜈蚣蟻人蛇銜草舍草搗傳之

斗門

方

治產後漏痢用小龍牙根一握濃煎服之甚效蛇舍是也

抱朴子

云蛇銜膏連已斷之指

晉異苑

常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒熱熱發溫瘡鬼

毒肯中咬結止過療鬼蠱往来水脹洒酒惡寒鼠瘻一名

畏王札

云有田父見一蛇被傷又見蛇銜一草着其瘡上經日

傷蛇乃去田父因取其草以治瘡皆驗遂名曰蛇銜草

五草生益州川谷及漢中八月採根陰乾

畏王札

云出宜都建平

本草十

十六

細實黃者呼為雞骨常山用最勝唐本汪

云常山葉似茗狹長莖圓兩葉相當三月生白花青萼五月結實青圓三子為房生山谷間高

者不過三四尺臣禹錫等謹按蜀本

圖經云樹高三四尺根似荆根黃色而破今出金州房州梁州五月六月採葉名蜀漆也

藥性論云

常山忌葱味苦有小毒治諸瘡吐痰涎去寒熱用小麦竹葉三味合

煮小兒甚良主瘡酒酒寒熱不可進多令人大吐治頸下瘤瘻

謂病云得甘草吐瘡曰

蜀漆子云忌菘菜

云忌菘菜

云忌菘菜

宿至明漉出日乾熬搗少用勿令老人久病服之切忌也

外臺秘要

治瘡常山三兩以漿水三升浸經一宿煎取一

外欲發前頓服然後微吐

時後方

治瘡病常山三兩搗末以雞子白和丸如桐子大空腹三十丸

蜀漆根也亦治瘡

吐痰如雞骨者佳


海州蜀漆



海州蜀漆



明州蜀漆



蜀漆味辛平微温有毒主瘡及欬逆寒熱腹中癥堅

括樓爲之

江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾

括樓爲之

宿結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胷中邪結氣吐出之生  
使惡貴衆同處爾彼人採仍繁結作丸得時燥者佳  
山名故是同處爾彼人採仍繁結作丸得時燥者佳  
日微萎則把束暴使燥色青白堪用若陰乾便黑爛鬱壞矣陶云作  
藥性論云蜀漆使畏橐吾味苦有小毒常山苗也能主治瘡鬼瘧多  
九此乃捺餅非蜀漆也王禹錫等著蜀本圖經云五月採日乾之  
時不差去寒熱瘧治溫瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥下肥氣  
氣

本草十

二十七

西

圖經曰蜀漆

生江

積聚謂炳云桔梗爲使目華云蜀漆治癰痕又名  
雞屎草鴨屎草李含光云常山莖也八月九月採  
林山川谷及蜀漢常山苗也常山生益州山谷及漢中蜀漆根也江  
林山即益州江陽山名是同處耳今京西淮浙湖南州郡亦有之葉  
似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青萼五月結實青圓  
三子爲房苗高者不過三四尺根似荆黃色而海州出者葉似揪葉  
八月有花紅白色子碧色似山棟子而小五月採葉八月採根陰乾  
此二味爲治瘧之最要張仲景蜀漆散用蜀漆雲母龍骨等分杵末  
患者至發前以漿水和半錢服之溫瘧加蜀漆半分臨發時服一錢  
北今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用爲飲香其味如蜜  
又名蜜香草性亦涼飲之益人非此常山也

剉用拌水令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆五  
兩細剉又拌甘草水勻又蒸了任用勿食木筍  
人其他亦未見所長此草也慮歲久人或別有異論故預云餘如經

雷公云

根取莖并葉同拌甘草四兩細

衍義曰蜀漆常山苗

江寧府甘遂



甘遂味苦甘寒

大寒有毒

主大腹疝瘕腹滿面目浮腫

腫留熱皮中宿食

瘻音

破癥堅積聚利水穀道

下五水散膀胱

名重澤一名圭生中山川谷二月採根陰乾

瓜蒂爲之使惡遠志

反甘草

陶隱居

云中山在代郡先第一本出太山江東比來用京口

者大不相似赤皮者勝白皮者都下亦有名草甘遂殊惡蓋謂贊音薦

唐本注

云所謂草甘遂者乃蚤休也療體全別真甘遂苗似澤漆草甘遂苗一莖莖六七葉如蓖麻鬼臼葉生

食一外亦不能利大療癰疽蛇毒且貞甘遂皆以皮赤肉白作連珠實重者良亦無皮白者皮白乃是蚤休俗名重臺也

臣禹錫等謹按

藥性論云京甘遂生中山川谷今陝西江東亦有之或云京西出者

水主皮肌浮腫

目華子

云京西者上汴滻俗名重臺也

節切圖經曰最佳汴滻吳者爲次苗似澤漆莖短小而葉有汁根

唐本注

云皮赤肉白作連珠又似和皮甘草二月採根節切之陰乾以實重者

爲勝又有種草甘遂苗一莖莖端六七葉如蓖麻鬼臼葉用之殊

臣禹錫等謹按

惡生食一外亦不能下唐注云草甘遂即蚤休也蚤休自有條古方

亦單用下水小品療姪姪小腹滿大小便不利氣急已服豬苓散不

臣禹錫等謹按

亦單用下水小品療姪姪小腹滿大小便不利氣急已服豬苓散不

## 本草十

### 二十八

要

差者以甘遂散下之方泰山赤皮甘遂二兩擣篩以白蜜二兩和丸如大豆粒多覺心下煩得微下者日一服之下後還將豬苓散不得下

日再服漸加可至半錢匕以微下爲

度中間將散也

猪苓散見猪苓條中

雷公云

凡採得後去莖於

搗砧上細剉用生

甘草湯小薺自然汁二味攬浸三日其水如墨汁更濃出用

肘

東流水淘六七次令水清爲度濃出於土器中熬令脆用之

甘草湯小薺自然汁二味攬浸三日其水如墨汁更濃出用

東流水淘六七次令水清爲度濃出於土器中熬令脆用之

臣禹錫等謹按

後方

治卒腫滿身面皆洪大甘遂一分粉之猪腎一枚分爲七

鹽

鹽

楊氏產乳

治腹滿大小便不利氣急甘遂二分爲散分

入甘遂於中以火炙之令熟日一食至四五當覺腹脇鳴小便利

臣禹錫等謹按

甘遂今惟用連珠者然經中不言此

藥專於行水攻波爲用入藥湏斟酌

滁州白斂



**白斂味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛**

**除熱目中赤小兒驚癇溫瘡女子陰中腫痛下赤白**

**殺火毒一名莧核一名白草一名白根一名崑崙生衡**

**山山谷二月八月採根暴乾**

代赭爲之使反烏頭陶隱居云近道處有之作藤生根如白芷

謹按蜀本圖經云蔓生枝端有五葉今所在有之藥性論云白斂使

門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥殊不似白芷

自禹錫等

芷破片以竹穿之日乾生取根搗傅癰腫亦效唐本注云此根似天

殺火毒味苦平有毒惡烏頭能主氣壅腫用赤小豆葛草爲末雞子

白調塗一切腫毒治面上庖瘡子治溫瘡主寒熱結壅熱腫日華子

云止驚邪發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘡疾血痢湯火瘡

生肌止痛圖經曰白斂生衡山山谷今江淮郡及荆襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑

五月開花七月結實根如鷄卵三枚同窠皮赤黑肉白二月八

月採根破片暴乾今醫治風金瘡及面藥方多用之濠州有一種赤

斂功用與白斂同花實亦相類但表裏俱赤耳

蕊功治湯火灼爛亦相類但表裏俱赤耳

聖惠方治丁瘡以水調白斂末傅瘡上

外臺秘要

治丁瘡以水調白斂末傅瘡上

**時後方** 治發背白斂用白斂末傅之

**本草十**

**手九**

桔

**衍義曰** 白斂白及古今服餌方少有用者多見於斂瘡方中二物多相湏而行



**滁州青葙子**

**青葙子味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘡身痒殺**

**三蟲惡瘡疥癬瘻蝕下部瘡瘍子名草波明療瘡口**

**青一名草蕎一名蕎蕎**

**生平谷道傍三月採莖葉陰乾**

**五月六月採子**

陶隱居云處處有似麥柵花其子甚細後又有草蕎別本亦作草蕎今即主療殊相類形名又

相似極多足爲疑而實兩種也唐本注云此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大生下濕地四月五月採荆

襄人名爲崑崙草搗汁單服大療溫瘡目禹錫等謹按蜀本圖經云葉細軟長亦爲蔓今所在下濕地有藥性論云青葙子一名草

白及味苦平無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死

興州白及



可食木耳青色及  
仰生者不可食之

平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死

白及味苦平無毒能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲腫腫

主惡瘡疥瘍治下部蟲瘻瘡瀉病云今主理眼有青葙子丸又有一種花黃名陶珠

術苗相似

曰華子

云治五藏邪氣益腦髓明

圖經曰

青葙子生平

谷道傍今江

淮州郡近道亦有之二月內生青苗長三四尺葉闊似柳細軟莖似

葛青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁有似良苦根似

葛根而白直下獨莖生根六月八月採子又有

一種花黃名陶珠術苗亦相似恐不堪用之

子并鼠紬子其二件真似青葙子只是味不同其思

賞子味咀煎之有涎凡用先燎纖臼杵單搗用之

血不止以青葙子升三合蘿單中

本草十

如五十者人或識之謂其已百歲有餘尔

衍義曰

青葙子經中並不言治眼藥性論始言之能治肝藏熱毒

衝眼赤障青盲蕭炳亦云理眼日華子云益腦髓明耳目鎮

肝今人多用治眼

殊不與經意相當

雷公云

使思賞

魏略初平中有青牛先生常服青葙子年

八十者人或識之謂其已百歲有餘尔

廣利方

治鼻

出

雷公云

凡用勿

過

雷公云

使思賞

魏略初平中有青牛先生常服青葙子年

八十者人或識之謂其已百歲有餘尔

廣利方

治鼻

出

雷公云

使思賞

魏略初平中有青牛先生常服青葙子年

八十者人或識之謂其已百歲有餘尔

附胃中邪氣賊風鬼擊非

音肥

緩不收除白癬疥蟲

名

甘根一名連及草生北山川谷又冤句及越山

使惡理石畏紫石英爲之

李核杏人陶隱居云近道處處有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊唐本注云此物山野人患手足皯音軍拆嚼以塗之有效目禹錫等謹按蜀杏云反烏頭叉圖經云葉似初生拌音并擣音閭接也及藜蘆莖端生一臺四月開生紫花七月實熟黃黑色冬周根似菱三角白色角頭生芽今出申州二月八月採根用吳氏云神農苦黃帝辛季氏大寒雷公辛無毒莖葉如生薑藜蘆十月華直上紫赤根白連二月八月九月採藥性論云白及使能治結熱不消主陰下癰治面上黑皯令人肌滑日華子云味甘癩止驚邪瘡撲搘溫熱瘧疾血痢火瘡生肌止痛風痺圖經曰山川谷又冤句及越山今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許似并擣及藜蘆莖端生一臺葉兩指大青色夏開花紫七月結實二月七月採根今醫治金瘡不差及癰疽方中多用之治臚劙不正甚者白及爲末津調塗山根上立止

衍義

白及文具白蕨條下

本草十

三十一

鄧



并州大戟



信州大戟



滁州大戟



河中府大戟

大戟味苦其寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛

積聚中風皮膚疼痛通頸腋癰腫頭痛發汙利大小腸

一名印鉅生常山十二月採根陰乾

反甘草陶隱居云近道處處皆有至

狠賤也

目禹錫等謹按唐本

云畏昌蒲蘆草鼠屎蜀本

圖經云苗似

甘遂高大葉有白汁花黃根似細苦參皮黃黑肉黃白五月採苗二

月八月採根用

兩指

云舊印鉅注云今本草大戟也

藥性論云大

使反芫花海藻毒用昌蒲解之味苦辛有大毒破新陳下惡血癖塊

腹內雷鳴通月水善治瘀血能墮胎孕

目華子云小天戟

豆爲之使惡暑預鴉毒藥泄天行黃病溫瘡破癥結

圖經曰澤漆

大戟

根也生常山今近道多有之春生紅芽漸長作叢高一尺已來葉似

初生楊柳小團

三月四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細

苦參皮黃黑肉黃白色秋冬採根陰乾淮甸出者莖圓高三四尺花

黃葉至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥醫家用治隱疹風及風

毒脚腫並煮水熱淋日再三便愈李絳兵部手集方療水病無問年

月深淺雖復脉惡亦主之大戟當歸橘皮各一大兩切以水二大升

煮取七合頓服利水二三斗勿怪至重不過再服便

差禁毒食一年水下後更服永不作此方出張尚客

雷公云

凡

勿用附生者若服冷洩氣不禁即煎薺莞子湯解夫採得後於

搗砧上細剉與細剉海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉曬乾用之

太上八帝玄變經

大戟必寫

本草十

三十二

冀州澤漆



澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面

目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖

大戟苗也生太山川澤三月七月採莖葉陰

乾

小豆爲之使惡暑預陶隱居云此是大戟苗生時摘葉有白汁

故名澤漆亦能噉人肉

目禹錫等謹按蜀本

圖經云五月採日

乾用

藥性論

云澤漆使治人肌熱利小便

目華子云冷微毒止瘡疾

消瘀退熱此即大戟花川澤中有莖梗小有葉花黃葉似嫩菜四五

月採

圖經曰

澤漆大戟苗也生泰山川澤今冀州鼎州明州及近道亦有之生時摘葉有白汁出亦能噉人故以爲名

然張仲景治肺熱上氣脉沈者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五  
斗煮取一斗五升然後用半夏半升紫參生薑白前各五兩甘草黃

芩人參桂各三兩八物㕮咀之內澤漆汁

中煎取五升外每服五合日三至夜服盡

聖惠方

治十種水氣用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入酒一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀餉即止瓷器內收

每日空心溫酒調下一茶匙以愈爲度

### 絳州茵芋



茵芋味苦微溫有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如

瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛療久風濕走四肢脚

弱名莞草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾

陶隱居

云好者出彭城今近道亦有莖葉狀如莽草而細軟取用之

皆連細莖

方用甚稀惟以合療風酒散

目禹錫等謹按蜀本圖經云

### 本草十

三三

苗高三四尺葉似石榴短厚莖赤今出華州雍州四月採莖葉日乾  
鑿論云茵芋味苦辛有小毒能治五藏寒熱似瘧諸關節中風痺  
拘急攀痛治男子女人軟腳毒風治溫瘧發作有時日華子云治一  
切冷風筋骨怯弱羸顛入藥炙用出自海鹽形似石南樹生葉厚五  
六七月採

圖經曰

生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉

四月開細白花五月結實三月四月七月採葉連細莖陰乾用或云  
日乾胡洽治賊風手足枯痺四肢拘攀茵芋酒主之其方茵芋附子  
天雄烏頭秦艽女萎防風防己躰躅石南細辛桂心各一兩凡十二  
味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七日夏三日春秋五日藥成初服

一合日三漸增  
之以微痺爲度

褚者音兜味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月  
採

陶隱居

云狀如小芋子肉白皮黃近道亦有唐本注云赭魁大

者如斗小者如升葉似杜蘅蔓生草木上有小毒陶所說者乃  
土卵爾不堪藥用梁漢人名爲黃獨蒸食之非赭魁也目禹錫等謹

按蜀本圖經云苗蔓延生葉似蘿摩根若菝葜皮紫黑肉黃赤大者  
輪囷如升小者若拳今所在有之據本經云無毒而蘇云有小毒又  
云陶說者梁漢人蒸食之則無毒明矣乃陶說爲是也陳藏器云按  
土卵蔓生根如芋人以灰  
汁煮食之不聞有功也

淄州貫衆



貫衆味苦微寒

有毒

主頭中邪熱氣諸毒殺三蟲去

寸白破癥瘕除頭風止金瘡

花療惡瘡令人洩

一名貫節

一名貫渠

名首頭

一名虎

山谷及冤句少室山二月八月採根陰乾

圖經曰  
今陝西河東州郡及荆襄間多有

貫衆生玄山山谷及冤句少室山

圖經云苗似狗脊狀如雉尾根直多

枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭療頭風用之今所在山谷陰處有之

論云貫衆使主腹熱

赤小豆爲使殺寸白蟲

之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三稜葉綠色似小鷄羽又

名鳳尾草根紫黑色形如大瓜下有黑鬚毛又似老鴟爾雅云潔哥

若切貫衆郭璞注云葉圓銳莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是

也三月採根曬乾荆南人取根爲末水調服一錢七正鼻血有效

本草十

三十四

蘿蔔爲之使

閑居

云近道亦

薦等謹

目焉

論等謹

云樂廣雅云

樂

哥

有葉如大蕨其根形色毛芒全似老鴟頭故呼爲草鴟頭

云樂貫衆注葉貞銳莖毛黑布地冬不死一名貫渠廣雅云

利止其意如此然今人用時當以意斟酌不可使過與不及也仍須是有是證者方可用

與芫花全不相似也

云此藥苗似胡荽莖無刺花細黃色四五月收

原上今所在有之見用雍州者好

論

云蕘花使治敷逆上氣喉

中腫滿症氣蠱毒疚

論

以蕘花治利者以其行水也水去則

可使渴與不及也仍須是有是證者方可用

# 江寧府牙子



牙子味苦酸寒有毒

主邪氣致氣疥瘡惡瘍瘡瘻

去白蟲一名狼牙

一名狼齒一名狼子一名大牙生淮

南川谷及冤句八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人  
無羨爲之使惡地榆棗肌陶隱居云近道處有之其根牙亦似獸之  
牙齒也目錄等謹按蜀本圖經云苗似蛇苺而厚大深綠色根萌  
芽若獸之牙今所在有之二月三月採牙日乾藥性論云狼牙使味  
苦能治浮風瘡痒殺寸白蟲煎汁洗惡瘡目華子云殺腹藏一切蟲

## 太草十

三十五

兩

止赤白  
痢煎服

圖經曰

牙子即狼牙子生淮南州郡多有之苗似蛇苺而厚大深綠色根黑

若獸之齒牙故以名之三月八月採根日乾古方多用治蛇毒其法

取獨莖狼牙擣臘月豬脂和以傅上立差又楊炎南行方云六月以前用

用狼牙擣臘火炮令熱前用葉以後用根生咬咀以木葉裹之塘火炮令熱

用狼牙五兩細剉

瘡洗方用狼牙五兩細剉

水五外煮至三外溫洗之

食明日以漿水下

一合服盡差

又方治金瘡狼牙草莖葉

熟擣傅貼之兼止血

又方治婦人陰瘡

牙三兩咬咀以水四外煮去滓內苦酒如

雞子一杯以綿濡湯瀝患處日四五即愈

千金方治小兒陰瘡濃

煮狼牙草洗之

又治射工即水弩子也以狼牙葉冬取根搗令熟傅之

及已味苦平有毒主諸惡瘡疥瘡瘻蝕及牛馬諸瘡

陶

居云今人多用以合瘡膏甚驗唐本注云此草一莖莖頭四葉葉

隙著白花好生山谷陰虛軟地根似細辛而黑有毒入口使人吐血

今以當杜衡非也疥瘡必湏用之目錄等謹按蜀本圖經云二月

採根日乾之華子論云及已亦可單用能治瘡疥目華子云主頭瘡

白禿風瘡皮膚痒蟲可煎汁浸并傅

海州山躑躅



潤州羊躑躅



羊躑躅味辛溫有大毒主賊風在皮膚中溼溼痛溫瘡惡毒諸癰邪氣鬼疰蠱毒一名王支生太行山川谷及淮南山三月採花陰乾

南隱居云近道諸山皆有之花苗似鹿葱羊誤食其葉躑躅而死故云王支躑躅一名陶於梔子注云是躑躅生高三四尺葉似桃葉花似石榴花正似旋蓄花色黃者也今其苗樹生高二尺葉似桃花黃似瓜花三月四月採花日乾今所在有之

繫生論云羊躑躅惡諸石及麪不入湯服也

圖經曰

羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生苗似鹿葱葉似

本草十

三十六

勇

紅花葉高三四尺夏開花似凌霄山石榴旋蓄輩而正黃色羊誤食其葉則躑躅而死故以爲名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷徧生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥古大方多用躑躅如胡治治時行赤散及治五嗽四滿丸之類及治風諸酒方皆雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躑躅花今醫方接脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑躅花散甚勝

三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天行時氣鬼魅邪精等宜燒之又於水煮善洗水腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯治風瘡甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳草莖功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之宜南草謹按廣州記云生廣南山谷者莖長二尺許內有

薄片似帛大小如蟬翼主邪小男女以緋綃袋盛一片佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

蘡音挈車香味辛溫主鬼氣臭臭及蟲魚蛀蟲生彭城高數尺白花爾雅曰蘡車芹音乞輿郭注云香草也廣志

云黃葉白花也

海藥

按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主霍亂辟惡氣

衣甚好齊民要術云凡諸樹木蛀者煎此香令淋之善辟蛀蟲也

朝生暮落花主惡瘡疽疥癬蟻癩等並日乾末和生油塗之生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼爲狗溺臺又名鬼筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞

本草十

三七

二部

上黑菌尤佳更有燒作灰地經秋雨生菌重臺名仙人帽大主血

衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒功用同

陳家白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾

海藥

謹

廣州記云生嶺南及海隅苗蔓如土瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是着諸般毒悉皆吐出

井口邊草主小兒夜啼着母卧席下勿令母知

純耳草主溪毒射工絞取汁服滓傅瘡止血○百方

純耳多種未知何是松菜白葉者亦名純耳顏氏家訓馬覓一名純耳馬齒覓也又車前葉圓者亦名純耳


燈花未傳金瘡止血生肉令瘡黑卒燭花落有事不爾得錢之兆也

千金鏗草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傅瘡上生肌止

痛生江南高二三尺也

斷罐草主丁瘡合白牙堇恥六反羊  
帝菜也菜青苔半夏地骨皮蜂窠小兒癰繃帛並等分作灰五月五日和諸藥末服一錢七下根出也

### 狼杷草



狼杷草秋穗子並染皂黑人頭髮令人不老生山道傍圖經曰

狼杷草主療丈夫血痢不瘳婦人若患積年疳痢即用其根俗間頻服有效患血痢者取草二斤擣絞取汁一小升

本草十

三十八

內白麪半雞子許和之調令勻空腹頓服之極重者不過三服若無性者但收取苗陰乾搗為散患病者取散一方寸匕和蜜水半盞服之

其黑人頭髮令不老生道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療甚為精至謹用書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之百種陰乾燒作灰以井華水為團重燒令白以釀醋和為餅腋下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒令白刮傅瘡上

產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿回顧作浴湯洗之不過三度佳

孝子衫襟灰傅面點

靈床下鞋履主脚氣

蚕母草葉卷如實中有血蟲羽化爲蚕便能咬入生  
塞北草葉如葵以葉合和桂杵爲末傳人馬山行無  
復蚕來

故蓑衣結燒爲灰和油傳蠟蝮溺瘡佳  
故炊筭主人面白生白駁以月蝕夜和諸藥燒成灰和  
苦酒合爲泥傳之

天羅勒主溪毒接碎傳之瘡上天羅勒生江南平地  
毛蓼主癰腫疽癰癧瘻疔碎內瘡中引膿血生肌亦作  
湯洗瘡兼濯足治腳氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根  
不死也

本草十

三十九

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當黃  
水生平地葉似苦杖而小節赤高二尺種之辟蛇又  
有一種草莖圓似苧亦傳蛇毒○百一方東閣有草狀  
如苧莖方節

赤按傳蛇毒如搗却亦名蛇芮草二草惣能主蛇未知何  
者的是又有鼠芮草如昌蒲出山石上取根藥鼠立死爾

萬一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傳癰上藤蔓如小豆  
生嶺南亦名萬吉

螺麌草主癰腫風癰脚氣腫搗傅之亦煮湯洗腫處  
繼母草主惡瘡杵傳之生塞北川原有紫碧花花有角  
角上有刺萬之類也亦名繼母藉

甲煎味辛平無毒主疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蠍

所蟄疼小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傳之合諸藥及  
美果花燒成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同三年者  
治蟲雜瘡及口旁嚙瘡甲疽等瘡

金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄  
取葉搗碎傳之又預知石灰杵爲丸日乾臨時刮傳亦  
煮服斷血瘀及卒下血生江南落田野間下濕地高一  
二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一穎米也  
鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傳之亦杵絞  
汁服生池畔葉有極方莖子作釵脚着人衣如針比  
人呼爲鬼針

本草十

四十

二

重修政和經史證類備用本草卷第十





