

外臺秘要方

二十二

外臺祕要方卷第二十五

痢三十

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進



水穀痢方一十首

水痢方六首

久水痢不差腸垢方四首

冷痢方二十二首

冷痢食不消下方六首

白痢方八首

重下方六首

卒暴冷下部疼悶方二首

冷熱痢方七首

熱毒痢方三首

熱毒血痢方六首

赤痢方四首

久赤痢方二首

卒下血方七首

血痢方六首

久血痢方三首

蠱注痢方三首

腸蠱痢方一首

膿血痢方七首

赤白痢方六首

久赤白痢方四首

疝痢方六首

久疝痢及久痢成疝方九首

數十年痢方一十一首

休息痢方五首

腹壯不調痢方一首

洩痢不禁不斷及日數十行方三首

下焦虛寒及遠血近血方二首

下痢食完出及上入下出方一首

下痢腸滑方三首

大注痢及赤白困篤腸滑方二首

痢兼渴方二首

許仁則痢方七首

水穀痢方一十首

病源水穀痢者由體虛腠理開血氣虛春傷於風邪氣留連在肌肉之內後遇脾胃大腸虛弱而邪氣乘之故為水穀痢也脾與胃為表裏胃者脾之府也為水穀之海脾者胃之藏也其

候身之肌肉而脾氣主消水穀水穀消其精化為榮衛以養藏腑充實肌膚大腸肺之腑也為傳道之官化物出焉水穀之精化為血氣者行於經脈其糟粕行於大腸也肺與大腸為表裏而肺主氣其候身之皮毛春陽氣雖在表而血氣尚弱其飲食居處連動勞役血氣虛者則為風邪所傷客至肌肉之間後因脾胃氣虛風邪又乘虛而進入於腸胃其脾氣弱者不能剋制水穀故糟粕不結聚而變為痢也又新食竟取風名為胃風其狀惡風頭多汗膈下塞不通食飲不下腹脹形瘦腹大失衣則膜滿食寒則洞泄洞泄者痢無度也若胃氣竭者痢絕即死診其脈小手足寒難療也脈大手足溫易療也下白沫脈沉則生浮則死身不熱脈不懸絕滑大者生懸濇者死以藏期之也脈絕而手足寒時脈還手足溫者生脈不還者死脈緩時小結者生洪大數者死懸絕而澀者死細微而濇者生緊大而滑者死

得大絕脈者不死養生方云秋三月此謂容平天氣以急地氣以明早臥早起與雞俱興使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應也收養之道也逆之則傷肺冬為殭洩又云五月勿食未成核果及桃李發癰都爾發寒熱變黃疽又為洩痢出第十七卷中廣濟療赤白水穀冷熱等痢方

地榆分 白朮分五 赤石脂七分 厚朴分六
乾薑分六 熟艾分四 龍骨分七 甘草分四
黃連分十 烏梅分六 人參分六 當歸分五

右十二味搗篩為末蜜丸以米飲汁服二十九如梧桐子大日三服加至三十九出第四卷中忌海藻松菜猪肉生冷等集驗論黃帝問曰人若溇洩下痢者何也對曰春傷於風夏生溇洩腸辟久風亦為溇洩也

又療熱水穀下痢黃連阿膠湯方

黃連一兩 阿膠二兩 梔子三十枚 烏梅二十枚

右五味切以水七升煮取二升半分為再服神良備急同忌猪

肉冷水肘後名烏梅湯療熱下痢

又方 黃連一升 陳米一升

右二味以水七升煮取二升分再服肘後文仲同忌猪肉冷

水並出第四卷中

刪繁療中熱熱水穀下痢藍青丸方

藍青升三 黃連兩八 黃蘗兩四 阿膠五兩
白朮 地榆 地膚子 烏梅肉熬各三兩

右八味搗篩為散用藍汁和微火上煎取可為丸丸如杏子清白飲進三丸亦不得停留忌猪肉冷水桃李雀肉等出第四卷中

崔氏療水穀痢方

乾薑分三 雞子枚二 小豆二百粒炒 黃連分三

右四味搗篩三物內雞子黃白中熟攪令相得微火上炒令可丸一服五十九丸如小豆大旦以飲服差即停忌食脂膩生冷猪魚蒜葱出第三卷中

文仲療用仲夏熱多令人發水穀痢腸中鳴轉一瀉五六升水方

黃連法去毛 厚朴各三兩

右二味切以水三升煮取一升頓服之忌猪肉冷水出第三卷中必効療水穀痢方

小豆一升 臘二兩

右二味和頓服之即愈

又方 椶櫚皮煨

右一味研以水和服三方寸匕並出第二卷中

古今錄驗療熱水穀下痢方

黃連 阿膠各二兩 梔子二十枚

右三味切以水七升煮取二升分為三服忌猪肉冷水

又方

黃連 當歸 甘草各二兩 酸石榴皮三兩

右四味切以水三升煮取一升半分為三服忌海藻菘菜猪肉冷水並出第十卷中

水痢方六首

廣濟療水痢及霍亂崔氏方同云冷痢食不消化及有白膿日夜無節度但疑是冷悉主之方

白石脂 乾薑各八分

右二味搗篩為末以沸湯和少許麩薄糊和藥併手捻作丸如食法下不止加乾薑八兩忌如常法

又療水痢腹中氣方

茯苓分

白龍骨研八分

訶梨勒皮分

黃連分

酸石榴皮分

右五味搗篩為末蜜丸空心以飲服如梧子大三十九日二服差止忌猪肉油膩生冷等出第四卷中

文仲療水痢百起者馬蘭散方

馬蘭子

乾薑

黃連元無

右三味為散熟煮湯取一合許和二方寸匕入腹即斷冷熱皆治常用神効不得輕之忌猪肉冷水

又方

朽骨灰牛骨灰亦得

麴造六月六日

右二味等分為散空腹飲服一方寸匕無六月六日麴時用常麴亦得御傳並出第三卷中

經心錄主水痢方

雞子枚

黃臘兩

右二味熬熟食之宜空肚食之日三服住又方

黃連

倉米各三兩

右二味作散和雞子七枚令熟併捻作丸煮赤豆作漿粥服三十九日三服若渴但飲豆漿粥並出第二卷中

久水痢不差腸垢方四首

病源腸垢者腸間津液垢膩也由熱痢蘊積腸間虛滑所以因下痢而使腸垢也出第十七卷中

肘後療水下積久不差腸垢已出者方

烏梅二十枚碎

右一味以水二升煮取一升頓服之

又方

石榴一枚

右一味合皮搗絞取汁隨多少服之最良
備急療水下積久不差腸垢已出者方

赤石脂

桂心

乾薑

附子炮

右四味等分搗篩蜜丸如小豆每服三九日三服飲下忌猪
肉冷水生葱肘後同出第六卷中

文仲治久水痢難斷方

黃連二兩

黃蘗二兩

阿膠

二兩炙

右三味搗篩為散以苦酒蜜各半升煎內阿膠令烊又內諸
藥令可丸飲服三九日四此是古方極要

冷痢方二十二首

病源冷痢者由腸胃虛弱受於寒氣腸虛則泄故為冷痢也凡

痢色青色白色黑皆為冷也色黃色赤並是熱也故痢色白食
不消謂之寒中也診其脉沉則生浮則死出第十七卷中
廣濟療冷痢青白色腹內常鳴其痢行數甚踈出大多此是冷
痢宜服調中散

龍骨

人參

黃連

阿膠炙

黃蘗各一兩

右五味搗篩為散煮米飲服兩方寸匕日再服差停忌猪魚

冷水蒜炙肉粘食出第四卷中

肘後療水下痢色白食不消者為寒下方

黃連

乾薑

各三兩

右二味搗篩白酒一升半合煎令可丸飲服如梧子大二十
丸欲多作依此法也忌猪肉冷水

又方

右四味切以水三升煮取一升半分再服之忌猪肉冷水
海藻菘菜

又方

半夏洗 烏頭炮 甘草各

右三味搗篩蜜和丸如梧子飲服三九日再服忌猪羊肉海
藻菘菜錫等

又方

生薑汁半 白蜜半

右二味相和分再服之

又方

腥切二兩 乾薑末三兩

右二味以水六升半升著米一合煮作糜糜熟肉薑一食

令盡不差更作備急同

又方

酸石榴皮煨

右一味為末服方寸匕文仲同

又方

乾薑末二兩 雜麩升

右二味為燒餅熟食之盡更作不過三劑差文仲同

又療絕下白如鼻涕者方

龍骨 乾薑 附子炮

右三味等分搗篩蜜和丸如梧子飲下五丸漸至十丸

服服忌猪肉冷水文仲同

又方

黃連末 臘 阿膠各一

右三味先以酒半升令沸下膠臘令烊乃內黃連末頓服之
忌猪肉冷水痢血本云姚氏療辛注下并又方

灸臍下一寸五十壯良文仲同並出第二卷中

千金論曰凡五藏絕於內者下不自禁下甚者手足不仁也細
尋取之萬不失一下病體例略如此耳素問曰春傷於風夏為
膿血夏多滯下也夏傷於風秋必洞泄秋下水者患必是冷也
又療久冷痢下純白者此由積臥冷處經久病發遂令脾胃俱
冷日夜五六十行大小腹痛不可忍之凡白痢屬冷赤痢屬熱方

上好麴末

五升微
熬令香

右一味溫清淳酒令熟和麴末一升空腹一頓服之日三若
至食時搗蒜一升令至熟下薑椒末調如常食法惟須稠勿
加鹽以水和麴二升作索餅極熟爛煮之乾漉熟內蒜薑中

相和一頓食之少與餘食至飢時仍準前食麴末酒比至差
來少食餘食以此法療不過兩日必差
又烏梅丸療冷痢久下方

烏梅	三百粒	當歸	四兩	乾薑	十兩	桂心	六兩
附子	六兩	黃連	六兩	蜀椒	四兩	細辛	六兩
人參	六兩	黃蘗	六兩				

右十味異搗篩合治之若酒漬烏梅一宿去核蒸之如五斗
米下搗如泥盤中揉令相得蜜和搗二千杵食前飲服如梧
子十九日三稍增至二十九忌生冷猪肉冷水葱生菜此本仲景
傷寒論方
又舊療痢於貴勝用建脾丸多効令瘡積久冷痢先以溫脾湯
下訖後以建脾丸補之未有不効者貧家難以克辨亦不可將
息溫脾湯方療積久冷痢赤白者

大黃三兩 桂心三兩 附子炮 乾薑

人參各二兩
右五味切以水七升煮取二升半分為三服日再忌猪肉冷水
生葱並出第十五卷中

備急葛氏療痢色白食不消者為寒下方

豉一升 綿裹 薤白一把

右二味以水三升煮取二升及熟頓服之陶効方云療暴下
大去血痢姚療赤白下痢並効肘後同

又方

牛角一燒 鯁一燒

右一味搗篩白飲服方寸七日三肘後同

又方

好麴以

右一味搗篩煮米粥內麴方寸七日四五云此療日百行師

不救者肘後同並出第六卷中

古今錄驗白頭翁湯療寒急下及滯下方

白頭翁各二兩 乾薑各二兩 甘草一兩 當歸一兩

黃連各二兩 秦皮各二兩 石榴皮一兩

右七味切以水八升煮取三升分為四服忌海藻菘菜猪肉

冷水出第十卷中

近効療冷痢方

肉豆蔻五顆 合皮碎 甘草二兩

右二味切以水三升煮取一升半頓服之戶部李尚書處得

云療冷痢極者有効自用得力

又療久冷痢方

赤石脂搗作末和麴作餅飢空腹服一椀以下不過
兩頓差老人尤佳體中先熱者不可服之以上二方新附

文仲治青下白下薑附散方

乾薑

附子炮

皂莢炙去

右三味等分搗篩為散飲服方寸匕不過再服即愈亦可丸服小品肘後同

又治冷痢薑艾餛飩子方

乾薑末

熟艾

右二味等分作麩餛飩如酸棗大棗熟服四五十枚日二服腹脹者炙厚朴煮汁服藥此熟服訖即須食飯大效曾有產婦冷痢加白膏服之立差腹痛亦定

冷痢食不消下方六首

廣濟療脾胃氣微不能下食五內中冷及微下痢方

白木

神麴末

甘草炙

乾薑

枳實

白木

神麴末

乾薑

右五味搗篩蜜和丸空腹以溫酒服如梧桐子大二九日服漸加至三十九腹中痛者加當歸忌熱麩海藻菘菜桃李雀肉等出第四卷中

文仲華他治老小下痢柴立不能食食不化入口即出命在旦夕久痢神驗方

黃連末

雞子

亂髮灰

醇苦酒

蜜

雞子

白臘

雞子黃

校

右六味於銅器中炭火上先內苦酒蜜臘雞子黃攪調乃內黃連末髮灰又攪煎視可搏出為丸久因者一日一夜盡之可可者二日盡之時後同出第三卷中

延年增損黃連丸主腹內冷食不消及冷痢兼補方

黃連

黃耆

龍骨

當歸

甘草

乾薑

厚朴

地榆

白木

人參各一分

右十味搗篩蜜丸如梧子飲酒任下服十五丸日再服加至

二十九丸忌猪肉冷水桃李雀肉生葱海藻松菜蔣孝璋處

又地榆丸主冷痢不消食腹中脹痛氣滿不能食方

地榆各六兩

赤石脂各七兩

白木五兩

乾薑各六兩

龍骨各六兩

當歸各五兩

熟艾各五兩

烏梅肉各六兩

右十一味搗篩蜜和丸如梧子以飲服二十九日二服加至二

十五丸忌猪肉冷水海藻松菜生油膩桃李雀肉等並

出第七卷中

吳茱萸師療冷痢下膿血絞臍痛食不消腹脹方

吳茱萸

乾薑各六兩

赤石脂

麴末各八兩

厚朴各八兩

當歸各四兩

右六味搗篩蜜和丸如梧子空腹以飲下四十九日再

又療冷氣久痢臍下痛出白膿食不消方

吳茱萸

人參

桔梗

甘草各四兩

枳實各三兩

附子各八兩

麴味各二兩

右九味搗篩蜜和丸如梧子空腹飲下七九日二服漸加之

文中云溫脾丸療久寒氣逆脹滿面目痿黃食不消化

白痢方八首

病源白帶痢者腸虛而冷氣客之薄於腸間津液凝滯成白故

為白帶痢出第十七卷中

廣濟療白膿痢方

甘草各六分

厚朴各十二分

枳實各八分

茯苓各八分

右五味切以水五升煮取一升六合絞去滓分為二服日再
忌生冷油膩小豆粘食海藻松菜醋物等
又療心腹脹滿不能下食及痢白膿方

厚朴五兩 豆蔻一兩 甘草一兩 乾薑一兩
右四味切以水五升煮取一升六合絞去滓分為二服日再
忌生冷油膩海藻松菜並出第四卷中
千金大桃花湯主冷白帶痢腸痛方

赤石脂八兩 乾薑 當歸 龍骨各三兩
附子炮 牡蠣各二兩 芍藥 甘草各一兩
人參半兩 白朮半兩

右十味切以水一斗二升煮白朮取九升內藥煮取三升分
為三服膿者加厚朴三兩嘔者加橘皮二兩忌桃李雀肉海
藻松菜猪肉冷水等

又方

龍骨六兩 厚朴三兩 赤石脂五兩 當歸一兩
右四味切以水七升煮取二升半分為三服日再服熱加白
頭翁十分 牡蠣三兩
延年烏梅肉丸主冷白膿痢食不消方

烏梅肉熬 熟艾 黃蘗 甘草各八分
右四味搗篩蜜丸如梧子以飲服十五丸日三服忌海藻松
菜出第七卷中

必効白痢方

麻子汁

右一味以汁煮取棗豆空腹飽服極効
又方

黃連末

右一味以水和每服三匕即愈並出第二卷中
古今錄驗療白帶下晝夜無復數龍骨湯方

龍骨

牡蠣各三兩

烏梅肉

熟艾

白頭翁

乾薑各一兩

女萎

黃連

當歸各三兩

甘草各六兩

右十味切以水七升煮取三升二合分服日三夜一斷便止
忌海藻菘菜猪肉冷水出第十卷中

重下方六首

病源此謂令赤白帶下也令人下部疼重故名重下去膿如
雞子白日夜數十行繞臍痛也出第十七卷中
肘後療重下方

黃連切升

右一味以酒五升煮取一升半分溫再服臍當小絞痛則差

又方

鼠尾草

右一味以濃煮煎如薄飴糖服五合至一升日三赤下用赤
花者白下用白花者佳也文仲備急同

文仲隱居効驗方主下部絞痛重下赤白方

當歸

黃蘗

黃連

乾薑

各二兩

右四味搗篩取烏梅汁服方寸匕日三若腹中絞痛加當
歸下赤加黃連下白加乾薑大効神良祕之備急同忌猪

肉出第三卷中

備急療重下方此即赤白痢下也令人下部疼重故名重下葛氏方

豉熬令

右一味搗服一合日再三服無比又熬豉令焦水一升淋取汁
服冷則用酒淋日三服之肘後文仲同出第六卷中

古今錄驗重下下赤者方

取獺赤糞下白取白糞燒和

右一味以飲清旦空腹服一小杯三日飲之即愈
又療得毒病後得重下赤白絞痛方

石鍾乳研兩 黃連 防風 附子炮

黃蘗 蜀椒汗 當歸 乾薑各二兩

右八味切以水六升煮取二升半分三服適寒溫服已心猪
肉冷水並出第十卷中

卒暴冷下部疼悶方二首

千金瘰癧卒暴冷下部疼悶方

燒磚令熱大酢沃之三重布覆坐上取差

又方

黍米半 臘 羊脂 膠各二兩

右四味合煮作粥一頓令盡即差並出第十五卷中

冷熱痢方七首

病源夫冷熱利者由腸胃虛弱宿有寒而為客熱所傷冷熱相
乘其痢乍黃乍白是也若熱搏於血血滲腸間則變為血痢也
而冷伏腸內搏津液則變凝白則成白帶亦變赤白痢也其湯
熨鍼石別有正方補養宣導等今附於後養生方導引法云泄
下有寒者微一作引氣以息內腹徐吹息以鼻引氣氣足復
前即愈其有熱者微呼以去之也出第十七卷中

刪繁下煎冷熱不調暴下赤白痢香豉湯方

香豉一升 白木兩 薤白切一 蜀升麻兩

右四味切以水七升煮取二升半分為三服忌桃李雀肉芋

出第四卷中

古今錄驗生春石榴漿療冷熱不調下或滯或水或赤白青黃者方

酸石榴五枚

右一味合殼舂絞取二升汁分服五合稍稍服二升盡即斷小兒以意服二三合佳千金同出第十卷中

吳奘師無問冷熱新舊痢方

黃連

黃蘗

乾薑

甘草

炙

艾三胡熟

烏梅肉熬各八分

附子一枚

棗

臘子雞一枚

大

右八味搗篩以蜜和臘於鐺中鎔之其著蜜須候服鎔盡如乾益蜜丸空腹以飲服四十九日二漸加至五六十九日忌海藻菘菜猪肉冷水

近効療痢無問冷熱神驗黃連丸方

黃連大兩

茯苓二兩

阿膠小兩

炙

右三味先搗黃連茯苓為末以少許水鎔阿膠和為丸仍衆手丸之暴乾量患輕重空腹以飲下三四十丸漸漸加至六十九

不過五六服必差常用之極効

又療若下無問冷熱及膿血痢悉主之方

生犀角屑

黃蘗各二兩

黃連

苦參

各三兩

右四味搗篩為散以糯米煮作飲莫令生每日空腹服一方寸七日再服便差勿輕之此方於度支王郎中處得曾用極効

肘後有當歸云便待即家方產後痛佳

崔氏治痢無問冷熱赤白久新并疳温劉祕監積年患痢每服此即愈方

阿膠

二兩一兩炙八

吳黃連

一兩

乾薑

二兩

入黃無食子

二枚

刺腸

滑甚一枚

右四味搗篩為末以醋鎔膠清頓和丸如梧子飲服二十五丸日再漸加至三十九丸老小者以意斟酌禁茹常法出第三

卷中

下熱痢以粥飲下

文仲治無問冷熱及五色痢入口即定方

黃連四

黃蘗

當歸

黃芩各二

阿膠二兩

熟艾一兩

右六味搗篩為散以醃醋二升煮膠烱下藥煮令可丸如大豆飲服七八十九日二夜一服特宜老人若產婦痢加蒲黃一兩蜜和為丸大神驗効出第三卷中

熱毒痢方三首

肘後若下色黃者協毒熱下也療之方

梔子十四枚

右一味搗篩蜜和丸如梧子飲服三九日再服出第二卷中
千金療熱毒痢方

苦參

橘皮

獨活

阿膠炙

藍青

黃連

鬼箭羽二云

黃蘗

甘草炙

右九味等分搗篩以蜜烱膠和併手丸如梧子乾以飲服十九日三稍加之卒下症痢者大良忌猪肉冷水海藻松菜出第十五卷中

文仲治熱痢久不差者黃連丸方

黃連末以雞子白和丸如梧子飲服十九至二十九日三

熱毒血痢方六首

廣濟療熱毒痢血其痢行數甚數痢出不多腹中刺痛此是熱痢宜生犀角散方

生犀角末

酸石榴皮熬

枳實熱

冷黃

右三味各異搗篩為散以飲服兩方寸匕日再差停忌熱食物又療熱毒痢血片臍下絞刺痛方

升麻

地榆

菴根

黃芩各六分

犀角分四 生地黄分八 枳子分七 欬菴白分八

右九味切以水六升煮取一升五合絞去滓分溫三服日再
忌諸熱物並出第四卷中
千金大熱毒純血痢療不可差者方

黃連兩六

右一味切以水七升煮取二升半夜露著星月下旦空腹
頓服之卧將息不差加黃連二兩更作服之仍不差者以疴
痢法療之佳忌如常法

又療熱毒下黑血五內攪切痛日夜百行氣絕欲死方

黃連升 龍骨各二 阿膠分

乾薑當歸 赤石脂各三 附子一兩

右八味切以水一斗煮取五升分為五服余以正觀三年七月

十二月忽得此痢至十五日將絕處此方藥入口即定忌猪肉

冷水桃李雀肉並出第十五卷中

古今錄驗療熱毒下血及豆汁犀角煎方

犀角屑 人參當歸 黃連兩四

蜜合

右五味切以水五升煮取一升去滓內蜜煎三沸分為三服

日三忌猪肉冷水出第十卷中

文仲治熱毒痢血犀角散方

生犀兩三 石榴皮塊三兩 黃連兩三 乾薑兩二

地榆兩二

右五味搗篩為散以米飲服三方寸七日二服出第三卷中

赤痢方四首

病源此由腸胃虛弱為風邪所傷則成痢挾熱熱乘於血則血

流滲入腸與痢相雜下故為赤痢也出第十七卷中
集驗療下赤痢方

林米把

鯽魚鮓

二兩細切

薤白

一虎口細切

右三味以合煮如作粥法噉之古今錄驗同出第四卷中
千金療赤滯下方

成煎猪膏

合

清酒

右二味以緩火煎十沸滴寒温頓服之取差止

又論曰凡痢病通已生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯醬粉鹹
食所食諸食皆須大熟爛為佳亦不得傷飽此將息之大經也
若將息失所聖人不救也並出第十五卷中
必効療赤痢方

香淡豉

黄連

右二味以水一升半浸豉一日濾取汁碎黄連薄綿裹豉汁

中煎取強半升空腹頓服即上桑泉蔣尉云効出第二卷中
崔氏治赤痢黄連丸方

陳倉米

黄連

乾薑

右三味搗篩為末緩火炒令色變以內二顆雞子白中熟和
丸如梧子大空腹服五十九丸以好無灰酒温一盞下之至晚
間痢赤色當變白明旦即差更服如前出第三卷中

久赤痢方二首

病源久赤痢者由體虛熱乘於血血滲腸間故痢赤腸胃虛
不平復其熱不退故經久不差胃氣逆則變為嘔噦也胃虛穀
氣衰蟲動侵食則變為匿也出第十七卷中
千金療下赤連年方

地榆

鼠尾草

右二味切以水二升煮取一升分為二服如不差取屋塵水盡

去滓服一升日二服古今錄驗服屋塵汁一小盃餘同此是徐
平方療下血二十年者若不止重服即愈肘後同
又方

鼠尾草 薔薇根 秦皮用榭皮亦得
右三味等分水淹煎去滓以銅器重釜煎成丸如梧子服五
六九日三稍增差止亦可濃汁服半升出第十五卷中

卒下血方七首
深師治卒下血晝夜七八行方

黃連 黃蘗各四兩
右二味切以淳苦酒五升煮取一升半分為二服亦療下痢
忌猪肉冷水

又療卒下血蒲黃散方

蒲黃合三兩 當歸一兩 鹿茸一枚

右三味搗篩為散飲服方寸匕先食日三並出第一十六卷中
集驗療卒下血不止方

草龍膽虎口
右一味切以水五升煮取二升半分為五服如不差更服出
第四卷中

葛氏療卒下血方

小豆升
右一味搗碎水三升和絞取汁飲之姚云立止
又方

黃連兩半 黃蘗兩 梔子枚

右三味切以酒二升漬一宿去滓煮三沸頓服之忌猪肉冷水
並出第十六卷中

崔氏治卒下血不止方

竈突中塵升黃連兩五地榆兩三
右三味搗篩為散粥飲服方寸匕日再服重者夜一
近効治卒下血不問丈夫婦人立効牛角鯁一具燒赤散方

右一味為細散食前濃煮豉汁和二錢匕重者日三神驗

血痢方六首

病源血痢者熱毒折於血血滲入大腸故也血之隨氣循環經絡通行藏腑常無停積毒熱氣兼之遇腸虛者血滲入於腸腸虛則洩故為血痢也身熱者死身寒者生診其關上脉乳大便去血暴下血數升也出第十七卷中

廣濟療血痢黃連丸方

黃連 白龍骨炙 禹餘糧 伏龍肝各八
代赭汗 乾薑各六

右六味搗篩蜜和丸飲服二十九如梧子漸加至四十九差止忌

猪肉冷水熟食

又療痢鮮血方

菴根 黃連 地榆各八 梔子十四
薤白切 香豉各八 犀角六分

右七味切以水八升煮取二升分為三服日再忌猪肉冷水

並出第四卷中

必効療患熱血痢方

粳米研升

右一味研碎令米盡取汁可一大升於新磁瓶中盛取油絹蜜
閉頭繫內著井水中令至明飲之傳與人無不差者出第二卷中
古今錄驗療血痢及膿血方

黃連兩三

右一味切以清水三升漬一宿旦煎取一升半去滓分為二服服令須臾盡忌猪肉冷水文仲同

又療下痢鮮血方

乾地黄

犀角屑

右三味搗篩蜜丸如彈子大每服一丸水一升煎取五合去滓溫服之

又療下血痢地膚散方

地膚

地榆根

黃芩

右三味搗篩為散以水服方寸七日三並出第二卷中

久血痢方三首

病源此由體虛受熱折於血血滲入腸故成血痢熱不歇胃虛不復故痢血久不差多變嘔噦及為濕匿出第十七卷中

崔氏療痢血數十年方

右一味以水一斗攪令清澄二服一升三服止出第三卷中

小品療下血連歲不愈方

黃連

右一味搗末以雞子白和為餅子微火炙令黃黑復搗篩飲服方寸七日三有効下清血痿黃失色醫不能療者皆差忌

猪肉肘後同

文仲治七八十老人患積痢不斷兼不能飲食方

上黨人參

鹿角

去上取白鹿角末以合黃

右二味搗篩為散平旦以粥清服方寸七日再並出第三卷中

蠱注痢方三首

病源此由歲時寒暑不調則有濕毒之氣傷人隨經脈血氣漸至於藏腑大腸虛者毒氣乘之毒氣挾熱與血相搏則成血痢

也毒氣侵食於臟腑如病蠱注之狀痢血雜膿瘕黑有片如雞肝與血雜下是也出第十七卷中

肘後療若時歲蠱注毒下者方
又方
右四味搗篩為散以酒服方寸匕日三不止更服忌猪肉冷水

黃連 黃蘗等
右二味搗末蜜丸如梧子大飲服十九日四服忌猪肉冷水並出第二卷中

古今錄驗療純痢血如鵝鴨肝并協蠱毒方

舊根 升麻 犀角 桔梗
黃蘗 黃芩各三 地榆 蘘荷根各四
右八味切以酒三升漬一伏時服一升日一服千金同未差更

作出第六卷中

腸蠱痢方一首

病源腸蠱痢者冷熱之氣入在腸間先下赤後下白連年不愈侵傷於臟腑下血雜白如病蠱之狀名為腸蠱也出第十七卷中

肘後凡病下應先下白後下赤若先下赤後下白為腸蠱方
牛膝三兩搗碎以酒一升漬經宿每服一兩杯日二三服姚同出第二卷中

膿血痢方七首

病源夫春陽氣在表人運動勞役腠理則開血氣虛者傷於風至夏又熱氣乘之血性得熱則流散也其遇大腸虛而血滲入焉與腸間津液相搏積熱蘊結血化為膿腸虛則泄故成膿血痢也所以夏月多苦膿血痢者腸胃虛也秋冬診其脾脈微滑者為內潰多下血膿又脈懸絕則死滑大則生脈微小者生實

急者死脉沉細度遲者生數疾大而有熱者死出第十七卷中
肘後療熱病以下痢膿血藥皮湯方

黃蘗二兩 梔子枚七 黃連兩四 阿膠兩二
右四味切以水六升煮取二升分為三服又一方加烏梅二
十枚文仲同忌猪肉冷水出第二卷中

文仲治熱痢及下黃赤水及黃膿血四肢煩皮上冷者方

黃連八兩 熟艾兩一 黃蘗兩四 黃芩兩三
右四味搗篩為末以黃臘二兩安一升蜜中煮令消及煖
和藥白飲服六七十丸如小豆日二夜一即漸大驗
又下以下痢服血方

赤石脂綿裹 烏梅十枚 乾薑兩四 粳米升一
右四味切以水七升煮取令熟藥成服七合日三肘後同
並出第三卷中

剛繁療下焦熱或痢下膿血須痛瘡惱或不出赤石脂湯方

赤石脂兩八 烏梅二十枚 乾薑兩二 粟米升一
蜀椒汗 升麻兩三 乾薑兩二 白朮

右八味切以水一斗二升煮米熟去滓取七升下諸藥煮
取五合服之忌桃李雀肉出第四卷中
備急葛氏云若挾熱者多下赤腹雜血方

黃連 竈突中塵各半

右二味末之酒服方寸七日三服姚氏同忌猪肉冷水出第
六卷中肘後云以棗膏和分

古今錄驗療腸澼瀉便膿血乾薑散方

乾薑 黃連 桂心各一

右三味搗篩服方寸匕著糜中食日三多膿加薑多血加
桂有驗忌猪肉冷水生葱

又療中寒下痢膿血附子散方

蜀附子一枚

炮

乾薑各三分

右三味下篩為散先食以酒服方寸匕日二并療婦人漏下忌如前並出第三卷中

赤白痢方六首

病源凡痢皆由榮衛不足腸胃虛弱冷熱之氣乘虛而入客於腸間腸虛則泄故為痢也然其痢而赤白者是熱乘於血血滲腸內則赤也冷氣入腸傳於腸間津液凝滯則白也冷熱相交故赤白相雜重者狀如膿沸而血雜之輕者白膿上有赤脈薄血狀如魚腦世謂之魚腦痢也出第十七卷中

文仲鹿茸散治青黃白黑魚腦痢日五十行方

鹿茸二分

石榴皮二兩

乾薑六分棗核中人枚

赤地利云赤蜀如三指

右五味搗篩為散先食飲服方寸匕日三夜一若下數者可五六服肘後同

小品久卒赤白下方

燒馬屎一九作灰分服酒水隨意服已試良肘後同
深師療赤白下者黃連湯方

黃連

黃蘗

乾薑

石榴皮

阿膠各三兩

甘草一兩

右六味切以水七升煮取二升分為三服日再忌海藻菘菜猪肉冷水出第二十六卷中
延年駐車丸主赤白冷熱痢腹痛方

黃連六兩

乾薑二兩

當歸三兩

阿膠各三兩

右四味搗篩三年酢八合消膠令鎔和併手九如大豆以飲服三十九日再忌生冷滑猪肉冷水肘後同出第七卷中

救急療赤白痢無問新舊入口即斷方

香豉心好不是謂合豉其心中勿浪用而且

右一味以取豉燻令乾香擣為末大者一大升豉心為四服服別以酒一大升小兒小升豉心還依劑為四服和之即下小兒量氣丸與之出第九卷中

必効主赤白痢方

黃連二兩 阿膠四兩

右二味以好酒二大升合黃連煎十五沸漉出滓然後內膠令烱温分三服忌猪肉冷水出第二卷中

久赤白痢方四首

病源久赤白痢者是冷熱乘於血血滲腸間與津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連滯久不差也凡痢久不差脾胃虛弱則變嘔噦胃弱氣逆故嘔也氣逆而外有冷折之不

通故噦亦變為噎蟲食人五臟也三月九蟲常居人腸胃腸胃虛則動上食於五臟則心懊懷而悶齒斷唇白並生瘡下食於腸則肛門傷爛而穀道開也輕者可治重者致死出第十七卷中

崔氏馬蘭子散療赤白痢服內疴痛并久水穀痢色白如泔澱悉主之極重者不過三四日必差方

馬蘭子一分 地榆根皮八分 厚朴八分 熟艾八分
赤石脂一分 龍骨一分 茯苓一分 當歸一分

右八味擣篩為散一服方寸匕加至四五匕日再夜一白飲服出第三卷中

文仲療赤白痢五六年者方

燒大劑燒 瘡瘡

右一味取溼服五六合即差肘後同

又卒腹痛下赤白數日不絕方

雞子一枚

取殼却頭

胡粉末

令滿殼燒成

右二味以酒服之肘後同並出第三卷中

近効療赤白痢日數十行無問老小方

甘草二兩

右一味切以漿水四升煮取一升去滓頓服之

疝痢方六首

必効療冷疝痢方

取良苧子熬令黃色

右一味搗為末和臘月猪脂更搗令熟為丸綿裹如棗許

大以內下部中因痢出即更內新者不過三度即差出第二卷中

古今錄驗療五疝蒸下痢方

苦參三兩

青箱

甘草三兩各

右三味切以水四升煮取二升半分三灌即愈凡蒸但服生

地黃汁即差忌海藻菘菜

又方

青黛

丁香

黃連

各等

右三味搗篩用甘淀和為丸口中含之若下部有瘡

以綿裹肉下部日服五六十九含之令下差

又方

丁香

麝香研

石黛

石鹽

山榆人

小蘗皮

桂心

乾薑

青礬石燒

頭髮灰

右十味搗為散著瘡上乾者和臘月猪膏煖著療時行病

後食羊肉及肥膩或酒或房而得久蒸絡變為疝必復攻下

部不可輕之忌生葱

又療疔湿痢方

青箱

雄黄研

石硫黄研

蕪荑

雷丸

苦參

狼牙

藜蘆

右八味搗篩為散取如杏人大內下部中忌生葱狸肉

又療疔湿痢神効方

黃連

零陵香

犀角

丁香

鹿射香

牛黃

右六味以水洗黃連零陵香丁香澄取清水去滓更以

水添滿九升內黃連零陵丁香犀角煮兩沸然後著牛

黃射香煎一沸取一升分作三服如一日服不盡二日服亦

得已忌生冷酢滑猪肉魚三日內不得食菜並出第十卷中疾

師以九升先以一分煮黍

久疔痢及久痢成疔方九首

廣濟療久患疔痢不差尤子樊名散方

兀子樊名

鹿射香

吳白樊名

雲母粉

桂心

龍骨

無食子

黃連

右八味搗篩為散空腹以生薑汁和三錢上服日再煮薑湯

下亦得已生菜熟麪猪魚菜笋炙肉生葱蒜酢冷水

又療積年疔痢羸瘦面色痿黃方

石硫黄研

黃連

艾

蜜升

右四味以水二升先煮黃連艾取半升後內石硫黄末更煮

三五沸即絞去滓又內蜜更煮三五沸下分為三服忌猪魚蒜冷

水並出第四卷中

必効療積久痢成疔灌方

檉根

洗剝白皮搗絞取

麻子脂

如車脂

酢泔

取時勿令見風色

鼓合

右五味以水六升取椒豉和煎絞取汁二升和檗汁麻油泔
淀等三味分為兩分用一分灌隔一日更取餘者復灌其藥
欲用時溫溫即得忌酒肉油麪雞猪魚酒唯食羹飯葱白爛
羹蔓菁芥等五六十日外鹿脯多食下飯亦得神効
又療痢初較後膿血或變純白或成魚腦五十日以上或二三年
不差變成疳所下如泔淀方

生羊肝一具

右一味取大酢一年以上者米麥並中年深唯佳取羊肝則去
上膜柳葉切朝旦空腹取肝手拈取酢中出吞之覺心悶則止
不悶還服之一日之間能不食粥飯盡一具羊肝者大佳不
然除飽吞已外料理如生肝以薑蓋下飯如常法食之日食
一具肝不過二三具即永差後一月不得食熱麪油膩醬猪角雞
肉等

又療疳痢久不差羸瘦著牀欲死方

新出羊糞一升淨

右一味以水一升清經宿明旦絞汁頓服之至日午如得食羹
飯極重者不過三服

又療疳法丈夫婦人小兒久痢百方療不能差此方最効

丁香 鹿麝香 黃連各等分

右三味搗篩為散以杏核大取竹筒吹入下部小兒取孩子
量力減之不過三四迴差積年久疳痢不差表光州云常用
奇効備急同並出第三卷中

又療以痢變成疳下部竅生惡瘡惡寒壯熱者方

桃白皮切 槐白皮亦切 苦參切五 艾三月三日合煎

右五味以水五升煮取二升半去滓內熊膽棗許大攪令勻

取二升灌下部餘三分服

近効新附療久痢及疳痢諸方不差者此方必効

揀檮根白皮

不用多見狗及風

右一味細切搗如泥取細麩捻作餛飩如小棗勿令破熟煮

吞七枚重者不過七八服皆空腹服之忌油膩熱麩

又疳痢曉夜無度者方

取檮根濃汁一雞子殼許

右一味以和粟米泔一雞子殼許灌下部再度即差其驗若

神小孩兒減半用之醫人褚球錄上

數十年痢方一十一首

千金療下痢丸主數十年痢下下氣消穀令人能食夏月長將服之令人不霍亂方

黃連 黃蘗 桂心

乾薑一兩 吳茱萸二兩 蜀椒汗半 麩一升

烏梅半 大麥蘗半

右十味搗篩蜜和食已飲服如梧子十九日三服至二十九亦

可至三十九忌猪肉冷水生葱等

又療數十年下痢消穀下氣補羸烏梅肉丸方

麩好者一升 附子炮二 大麥蘗一 當歸三

桂心三 黃連 吳茱萸 烏梅肉熬令

乾薑各四 蜀椒汗一兩

右十味搗篩蜜和丸如梧子食已飲服十九日三忌猪肉冷

水生葱等

又四續丸主三十年疰痢骨立萎黃腸滑不療方

雲實五 蠟白者 附子炮二 女萎三

龍骨二

右五味搗篩為末以臘煎烱以丸藥如梧子飲服五九日
三不過五六服必差其雲實熬令香忌猪肉冷水等臘煎丸
入療三十年下痢所食之物皆不消化或青或黃四肢沉重起
即眩倒骨肉消盡兩足逆冷腹中執若轉筋起止須人扶陰冷
無子椒艾丸方

赤石脂別二兩 熟艾升一 乾薑兩三 蜀椒三百枚汗

烏梅漬三日取肉

右五味先搗篩薑椒為末將熟艾梅肉著一斛酒飯下蒸
令飯熟內乾薑椒末赤石脂末合搗三千杵蜜和丸如梧子
飲服十九日三不差至二十九加黃連一升艾一斤忌猪肉冷水
等物

又療三十年痢不止方
厚朴炙 乾薑 阿膠炙各二兩 黃連兩五

石榴皮 艾葉各三兩
右六味切以水七升煮取二升分再服忌猪肉冷水
又療積久三十年常下神効方
赤松木皮去上槿

右一味為散麩粥和一升服之日三即止不過服一斗永差
祕方三十年痢百日服差良並出第十五卷中
古今錄驗療三十歲寒下及霍亂諸藥所不能療并腸滑若
是蠱症所中方

蓼子 艾屑各二 龍膽 續斷

白朮各三 蜀椒法目 附子炮 桂心

苦參 乾薑 甘草炙 犀尾草各二

右十二味搗篩蜜和一歲兒服一丸如梧子三歲兒服二丸
五歲兒服三丸大人服五丸飲下療寒熱氣壅壅在胃中卒氣

痛繞臍神良忌桃李雀肉生葱猪肉冷水海藻菘菜
厚丘公療下痢三十年方

茯苓

乾薑

黃連等分

右三味搗篩為散蜜和丸如梧子飲服之一日漸增至百丸
若痢劇者加龍骨附子炮還令分等一服十九丸漸增之以知
為度忌猪肉冷水醋物等

又當歸湯療三十年下痢止諸痛方

當歸

生薑

大棗

右三味以水四升煮取一升半分作三服不差復作之

又云吾患痢三十餘年諸療無効唯服此方得愈也安石榴湯
療大症痢及白帶因篤欲死腸已滑醫所不能療方

乾薑

黃蘗

石榴

阿膠

右四味切以水三升煮取一升二合去滓內膠令烊頓服不差復

作療老小亦良人羸者稍稍服之不必頓盡須臾復服石榴

須預取之肘後同並出第二卷中一方無黃蘗藥用黃連

吳爽師療久痢方

龍骨

赤石脂

無食子

地榆

熟艾三分三操子

黃蘗各五分

右七味搗篩蜜和丸如梧子空腹飲服四十五丸日二服

稍加至六十九

休息痢方五首

病源休息利者胃管有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣
動於飲則飲動而腸虛受之故為痢也冷熱氣調其飲則靜
而痢亦休也腸胃虛弱易為冷熱其邪氣或動或靜故其痢下
發不止謂之休息痢也出第十七卷中
肘後療休息痢方

又方 黃連切 龍骨如鴨子 膠如掌 熟艾把
右四味以水五升煮三物取二升去滓乃內膠膠烱分再服濃
煮乾艾葉亦佳又當煮忍冬米和作飲飲之忌猪肉冷水

又方 乾地榆 附子一兩
右二味以酒一斗漬五宿飲一升日三服盡更作忌猪肉冷水

龍骨四兩
右一味搗如小豆以水五升煮取二升半冷之分為五服又以
米飲和為丸服十九文仲同並出第二卷中
文仲葛氏若久下經時不愈者此名為休息下療之方

取大骨
右一味炙令黃焦搗篩飲服方寸匕日三愈肘後備急同

胡洽麴蘗丸療數十年休息痢下不能食消穀下氣療虛羸方

麥蘗熬 七月七日麴熬 附子炮 桂心
烏梅肉煖燥各 人參 茯苓各四
右七味搗篩蜜和為丸如梧子食前飲服十九日三稍稍增之忌
猪肉冷水生葱大酢肘後備急同並出第三卷中

腹肚不調痢一首

廣濟療冷熱不調痢膿水方

- 人參 乾薑 枳實各 厚朴各
- 龍骨 赤石脂 黃連 苦參各六
- 黃芩各五

右九味搗篩蜜丸空腹以飲服如大豆十五丸日二漸加服者
亦得出第三卷中

洩痢不禁不斷及日數十行方三首

集驗結腸丸療熱毒下不斷不問久新悉療之方

- 苦參
- 橘皮
- 獨活
- 阿膠炙
- 芍藥
- 乾薑
- 黃蘗
- 甘草炙
- 鬼白各四

右九味搗篩蜜與膠共烱以和丸併手捻作丸如梧子暴燥以飲服十九日三不知稍加此方亦療諸症下及卒下悉効忌海藻菘菜等

又建脾丸療脾滑胃虛弱洩下不禁飲食不消雷鳴絞痛方

- 附子炮一兩
- 蜀椒汗一兩
- 桂心二兩
- 赤石脂
- 黃連
- 人參
- 乾薑
- 茯苓
- 大麥藥
- 陳麩熬
- 石斛
- 當歸各二兩
- 鍾乳研二兩

右十三味搗篩蜜和以酒服十九如梧子日三稍稍加之忌猪

肉冷水生葱酥出第四卷中

文仲療五勞及飽食房室傷胃令人大便數至溷而不能便日數十行劇者下血并婦人產後餘疾腹絞痛方

附子一枚

右一味以猪脂如雞子黃大煎附子裂為候削去上黑皮搗篩蜜和丸先食服如大豆三九日三稍加可至十九當長服之永不痢忌猪肉范汪同出第三卷中

下焦虛寒及遠血近血方二首

崔氏療下焦寒損或先見血後便轉此為遠血或痢不痢伏龍肝湯方

- 伏龍肝五合
- 龜心
- 甘草一兩
- 乾地黄五兩
- 燒亂髮二
- 黃芩
- 牛膝
- 乾薑
- 生榭脉
- 阿膠各二兩

右九味切以水七升煮七物取三升去滓下阿膠更煎取烊
乃下髮分作三服忌海藻菘菜蕪荑

又療下焦虛寒損或前便轉後見血此為近血或痢下或不痢
好因勞冷而發續斷湯方

續斷 當歸 桔梗 阿膠各二兩

桂心各三兩 乾薑 乾地黃 芍藥各四兩

蒲黃各二兩 甘草各二兩

右十味切以水九升煮八物取三升五合去滓下阿膠更烊
膠取沸下蒲黃分為三服忌猪肉海藻菘菜生葱蕪荑並
出第四卷中

下痢食完出及上入下出方一首

范汪溫中湯療寒下食完出方

甘草各二兩 乾薑各三兩 蜀椒八枚 附子一枚

右四味切以水二升煮取一升分再服若嘔內橘皮半兩小
與老皆取服之良忌海藻菘菜猪肉冷水出第十五卷中

下痢腸滑方三首

范汪苦酒白丸療赤白滯下腸已滑日數十行者方

女萎 半夏洗各二兩 附子炮 藜蘆各一兩

右四味擣合下篩和以十年苦酒頓丸如梧子若有下者
飲服三九日三不知稍稍增之忌猪羊狸肉餽出第十五卷中

集驗療下痢腸滑飲食及服藥皆完出猪肝丸方

猪肝一斤 黃連 阿膠各二兩 烏梅肉熟各二兩

胡粉七匙 子大

右五味擣下篩蜜和酒服十五丸如梧子日三稍加亦可散
服葛氏文仲胡洽同忌猪肉出第四卷中
千金療下痢絞痛腸滑不可差方

黃連兩六 阿膠 鼠尾草 當歸

乾薑略三

右五味切以酒七升煮取三升去滓温分三服若熱不絞痛去乾薑加當歸以水煮之忌猪肉冷水菘菜海藻出第十五卷中

大注痢及赤白困篤腸滑方一首

深師卒大注痢及赤白困篤下困篤欲死腸已滑方

乾薑兩二 黃蘗 石榴皮略一 阿膠兩二

漬豉升 前胡兩四

右六味切以水三升煮取三合去滓內膠頓服不差更作無毒宜老小羸人稍稍服之此湯兼療傷寒大下及赤白困篤亦皆主之出第二十六卷中

范汪療得病羸劣服藥不愈因作腸滑下痢膿血日數十行

腹中絞痛身熱如火頭痛如破其脉如濇方

黃連兩四 苦參兩二 阿膠兩一

右三味以水一斗煮取二升去滓適寒温服二合日三少少益至半升服湯盡者復合以愈為度曾試驗已猪肉冷水古今錄驗同

痢兼渴方二首

病源夫水穀之精化為血氣津液以養臟腑臟腑虛受風邪邪入於腸胃故痢則津液空竭臟腑虛燥故痢而兼渴也渴而引飲即痢不止翻溢水氣脾胃已虛不能耗消水水氣流溢浸漬肌肉則變成腫也出第十七卷中必効療痢兼渴方

麥門冬三兩 烏梅枚碎

右二味以水一大升半煮取強半絞去滓待冷細細咽之

即定仍言之出第二卷中
古今錄驗療熱渴痢方

冬瓜枚

右一味以黃土厚一尺火炮穩約以水爛去土淨洗絞取服之

許仁則痢方七首

許仁則云此病有數種有水痢有穀痢有血痢有膿痢有膿血相和痢有腸辟痢其水痢者本由脾氣熱消穀作水穀氣不得便生此痢穀痢者由脾氣冷穀氣不消而生此痢血痢者由毒熱在腹血流入腸致有此痢膿痢者由積冷所致膿血相和痢者由冷熱相擊便致此痢腸辟痢者由積冷在腸腸間垢澆不能自固便有此痢色數雖多其源是一皆緣飲食不節將息失宜也

又水痢之候心腹甚痛食無妨但食後即痢食皆化盡唯變作水

穀無期度多食多下少食少下有此狀者宜依後黃芩等五味散服之方

黃芩 黃連 黃蘗各五兩 黃耆四兩

龍骨兩

右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸匕日二服稍稍加至二三匕服老乃止忌猪肉冷水等

又穀痢之候痢無期度食不消化腹痛每過冷便發有此疾候者宜依後附子等五味散主之方

附子炮 細辛 白朮各五兩 乾薑四兩

神麴一分

右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍加至二三匕良忌猪肉冷水生菜桃李雀肉等

又血痢之候小腹絞痛無期度食不住如水但兼血而下有此

患者宜依後犀角五味散方

生犀角末五兩 阿膠炙四兩 黃蘗四兩 艾葉

乾薑各三兩

右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸七日再服稍稍加至二三日良

又膿痢之候腹亦刺痛食亦不大稀但大便兼膿遇冷而劇有此候者宜依後神麴等五味散服之方

麴末一斤 乾薑六兩 丁香 豆蔻各四兩

高良薑五兩

右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸七日再服稍稍加至二三日良

又膿血相和痢候二物正等食不甚稀每出二物與食相兼腹亦小痛有此候者宜依後黃耆等五味散服之方

黃耆日六兩 赤石脂八兩 厚朴炙五兩 乾薑

艾葉各三兩

右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸七日再服稍稍加至二三日良

又腸澼痢候食稀或稠便但似膿每便極滑痢有常期有如此者宜依後豆蔻子等八味散服之方

豆蔻子 丁香各三兩 細辛 附子炮

右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸七日再稍稍加至二

三三日良思生葱猪肉冷水

又前件諸痢患無新舊如藥療之暫是差還發此即縱以新藥止之終存其根本由腸胃中冷熱不調病根固結必須湯藥條之以洩病勢痢後更以藥物補助之有此候者宜依後附子

等六味湯以利之後服高良薑十味散以補之方

附子炮

細辛

甘草炙

人參各二兩

乾薑三兩

大黃五兩

右藥切以水七升煮取二升四合去滓分溫三服服如人行十里又一服此湯當得快利利中有惡物如魚腦狀或如桃李但異於常利勿怪之將息經三四日宜合後高良薑等十味散服之方

高良薑

細辛

黃耆

白朮

苦參各五兩

丁香二兩

人參

乾薑各四兩

豆蔻子三兩

赤石脂六兩

右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸七日再服之稍稍加至二三匕並出上卷中忌生菜桃李雀肉等吳昇同

外臺秘要方卷第二十五

右通功郎元兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張 寔 校勘

