

太平惠民和劑局方

二



# 太平惠民和劑局方卷二

## 治傷寒

(附)

中暑

人參取  
散治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼及寒壅敷擦鼻塞聲重風痰頭痛喉嚨寒熱並治之

柴胡去苗甘草濕桔梗人參去蘆

羌活去苗獨活去苗

茯苓去皮枳殼炒前胡去苗洗

右拾味各參拾兩爲麩末每服貳錢水一盞入生薑薄荷各少許同煎茶分去滓不拘時候寒多則熱服熱多則溫服小柴胡湯治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急背滿脇痛或煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘硬或過經未解或潮熱不除及差後勞復發熱疼痛婦人傷風頭痛煩熱經血通斷寒熱如瘧發作有時及產後傷風頭痛煩熱並宜服之

半夏湯洗茶次焙乾柴胡去蘆

人參

甘草炙

黃芩各參兩

右爲麩末每服參大錢水壹盞半生薑伍片棗壹箇擘破同煎至七分去滓稍熱服不拘時小兒分作貳服量大小加減小柴胡散治傷寒及時行疫癘頭痛項強壯熱惡寒腰背四肢拘急煩疼面赤咽乾嘔逆煩渴

麻黃去節

肉桂去麩皮

蒼朮去皮

川大黃

木通

瞿麥

山梔子去皮

甘草炙

川芎各壹兩

桂枝去皮用葉

川烏頭炮去皮腳

前胡

右爲麩末每服貳錢水壹盞入林檎粉拾數片新者亦得煎至七分去滓稍熱服不計時相次再服衣被蓋覆汗出爲度小柴胡散治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體夜鼻塞頭暈乾心

寒熱往來痰實欬嗽涕唾稠粘

赤芍藥

柴胡去苗

前胡去苗

石膏殼

乾葛各伍拾兩

升麻貳拾伍兩

黃芩

桑白皮各三拾柒兩半

荆芥穗去上參拾柒兩

荆芥穗參拾柒兩

右爲籠末每服貳錢水壹盞入生薑參片貳拾餘粒同煎染分去滓稍熱服小兒分作參服更量大小加減不計時候麻黃湯治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿無汗

麻黃去節參兩

甘草炙各壹兩

肉桂去龜皮一兩

杏仁尖炒別研膏

右爲籠末入杏仁膏令勻每服參錢水壹盞半煎至捌分去滓溫服以汗出爲度若病自汗者不可服不計時候小青龍湯治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱欬嗽微喘又治溢飲身體疼重及欬逆倚息不得安卧或因形寒飲冷內傷肺經欬嗽喘急嘔吐涎沫並宜服之

乾薑炮

細辛去葉

麻黃去節根

肉桂去龜皮

芍藥

甘草剉炒各五味子

半夏

湯洗柒次切作片貳兩半

右將柒味爲籠末入半夏令勻每服參錢水壹盞半煎至壹盞去滓溫服食後

治傷寒時行疫癘風溫濕溫一切不問陰陽兩感表裏未辨或外熱內寒或內熱外寒頭項腰脊拘急疼痛發熱寒寒肢節疼重嘔逆喘欬鼻塞聲重及食飲生冷傷在胃脘脣膈滿悶腹脹痛心下結痞手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利並宜服之

厚朴去龜皮姜汁炙

白朮

防風去蘆頭

吳茱萸七次

澤瀉

附子炮裂去皮

藁本云土

高良薑

細辛去苗

芍藥

獨活去蘆

半夏

湯洗柒次姜汁製

甘草炙去皮

草豆蔻仁拾箇

去皮

石菖蒲各半

右爲龜散每服肆錢水壹盞半煎取壹盞去滓熱服不計時  
候取遍身微汗即愈時氣不和空腹飲之以辟邪疫

**五續散** 調中順氣除風冷化痰飲治脾胃怕冷腹脇脹痛胃膈  
停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏痛有  
背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹  
撮痛經候不調或閉不通並宜服之

白芷

川芎

甘草炙

茯苓去皮

當歸去蘆

肉桂去龜皮

芍藥

半夏湯洗茶次

陳皮去白

枳殼去穰炒

麻黃去根節

各二兩

蒼朮米泔浸去皮

乾薑四兩

桔梗去頭兩

厚朴

去龜皮四兩

右除肉桂枳殼貳味別爲龜末外壹拾參味同爲龜末慢火  
炒令色轉搗冷次入桂枳殼末令勻每服參錢水壹盞半入  
生薑參片煎至壹中盞去滓稍熱服如冷氣奔衝心腸脣脛  
脹滿刺痛反胃嘔吐泄利清穀及痃癖癥瘕膀胱小腸氣痛  
即入煨生薑參片鹽少許同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風  
發熱項背強痛入葱白參寸豉染粒同煎若但覺惡寒或身  
不甚熱肢體拘急或手足厥冷即入炒茱萸染粒鹽少許同  
煎如寒熱不調效嗽喘滿入棗煎服婦人難產入醋壹合同  
煎服之並不拘時候

**升麻散** 治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體頑痠及瘡  
疹已發及未發疑貳之間並宜服之

升麻

白芍藥

甘草炙

葛根

各一兩

葛根拾伍兩

右爲龜末每服參錢用水壹盞半煎取壹中盞去滓稍熱服  
不計時候日貳參服以病氣去身清涼爲度小兒量力服之  
**葛根附子湯** 治傷寒溫病時行寒疫頭痛項強發熱寒肢體  
拘急骨節頑痠腰脊強痛骨膈煩悶

葛根四兩

麻黃去節參兩

肉桂去龜皮

甘草炙

黃芩

芍藥各二兩

肉桂去龜皮

右爲龜末每服參錢水壹盞半入棗壹枚剝破煎至捌分去滓稍熱服不拘時候取汗出爲度

治風化痰除頭目昏痛頸項強急往來寒熱肢體頑疼脣膈滿悶痰涎不利欬嗽喘滿涕唾稠黏及治時行寒疫壯軌寒風

旋覆花

去梗 麻黃

去節

前胡

去蘆各

參兩

荆芥穗

肆兩

甘草

炒

半夏

湯洗柒次薑汁浸

赤芍藥

各壹兩

右爲龜末每服參錢水壹盞半入生薑參片棗一箇同煎至捌分去滓溫服不計時候有寒邪則汗出如風盛則解利

大柴胡湯傷寒捨餘日邪氣結在裏寒熱往來大便祕澀腹滿脹痛語言譖妄心中痞鞭飲食不下或不大便伍陸日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱兼藏腑實脉有力者可服

枳實

去穰炒

柴胡

去蘆半斤

大黃

二兩

半夏

湯洗柒次切

大黃

二兩

半夏

湯洗柒次切

大黃

二兩

半夏

湯洗柒次切

大黃

二兩

赤芍藥

黃芩

各參兩

右伍味爲龜末入半夏拌勻每服參大錢以水壹盞半入生薑伍片棗壹枚煎至壹中盞濾去滓溫服食後臨卧此藥治傷寒內熱裏實若身體疼痛是表證未解不可服之

木防己湯治風濕相搏身體疼痛不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味此藥暖肌補中助陽氣止自汗

甘草

炒

貳兩

白朮

四兩

附子

炮去皮臍薄切片壹兩半

右橘白朮甘草爲龜末入附子令勻每服參錢水壹盞半入生薑伍片棗壹箇擘破同煎至壹盞去滓溫服食前

防己靈胥湯治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節頑痠時自汗出酒漸惡風不欲去衣及治風水客搏腰脚浮腫上輕下重不能屈伸

防己

肆兩

黃芪

伍兩

甘草

貳兩

白朮

參兩

右爲龜末每服參錢水壹盞半入生薑參片棗壹箇同煎至

壹盞去滓稍熱服不計時候服訖蓋覆溫卧令微汗差

**葛根湯** 治傷寒已經轉下又曾發汗內外俱虛邪氣未解表證不見身無大熱晝日煩躁不得眠睡夜即安靜不嘔不渴脉候沉微者宜服之又治暴中風冷久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒並皆治之

乾薑

壹兩

附子

生去皮臍細切壹枚

**竹葉石膏湯** 治傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心腎煩悶或得汗已解內無津液虛羸少氣胷中煩滿氣逆欲吐及諸虛煩熱並宜服之諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛頭亦不痛脉不緊數即不可汗下宜服此藥

人參

大蘆頭

甘草

炙

貳兩

石膏

壹斤

半夏

湯洗柒枚

麥門冬

去心五兩半

右爲麌末入半夏令勺每服參錢水兩盞入青竹葉生薑多

伍陸片煎至壹盞半濾去滓入粳米百餘粒再煎米熟去米

溫服不計時候

**五苓散** 治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止者宜服之又治霍亂吐利躁渴引飲

澤鴉

貳拾伍

白朮

猪苓

去皮

赤茯苓

各拾伍兩去皮

肉桂

拾兩去皮

右爲細末每服貳錢熱湯調下不計時候服訖多飲熱湯有汗出即愈又治瘀熱在裏身發黃疸濃煎茵陳蒿湯調下食前服之痘病發渴及中暑引飲亦可用水調服之小兒加白朮末少許服之如發上壅熱加綿黃耆人參末少許服之

**四逆湯** 治傷寒自利不呴嚥噦不止或吐利俱發小便或澀或利或汗出過多脉微欲死腹痛脹滿手足逆冷及一切虛寒厥並宜服之凡病傷寒有此證候皆由陽氣虛裏有寒雖更覺

頭痛體疼發熱惡寒四肢拘急表證悉具者未可攻表光宜服此藥助陽救裏

甘草炙半兩

乾薑一壹兩半附子生去皮臍細切

附子生去皮臍細切

半兩

右以甘草乾薑爲末入附子令勻每服參錢水壹盞半煎至壹中盞去滓溫服不計時候常服消暑氣分水穀

大順治治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草剉長寸半斤

杏仁去皮尖肉炒

桂去龍皮炙半斤

右先將甘草用白砂炒及捌分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候杏仁不作聲爲度用篩隔淨後入桂壹處撫羅爲散每服貳錢水壹中盞煎至柒分去滓溫服如煩躁井花水調下不計時候以沸湯點服亦得

白虎湯治傷寒大汗出後表證已解心腎大煩渴欲飲水及吐或下後柴拐日邪毒不解熱結在裏俱熱時時惡風大渴舌上乾躁而煩欲飲水數升者宜服之又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴

知母半斤

兩

甘草一壹兩半附子生去皮臍細切

附子

半兩

石膏煅參半

附子

半斤

右爲細末每服參錢水壹盞半入粳米參拾餘粒煎至壹盞瀝去滓溫服小兒量力少與之或加人參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋前可服春時及立秋後并亡血虛家並不可服

香薷圓治大人小兒傷暑伏熱躁渴脅悶頭目昏眩胃膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷去土

紫蘇莖葉去梗

附子

半兩

附子

半兩

藿香葉

附子

半兩

附子

半兩

附子

半兩

附子

右爲細末煉蜜和圓每兩作參拾圓每服壹圓至貳圓細嚼溫湯下或新汲水化下亦得小兒服半圓不計時候

治藏腑冷熱不調飲食不節或食腥鱠生冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食交亂於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而脉欲絕或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能主之

白扁豆微炒厚朴去皮姜汁炙熟

香薷去土壹斤

右荳末每參錢水壹盞入酒壹分煎七分去滓水中沉冷連嚥或服立有神効隨病不拘時治夏月不用白扁豆加黃連肆兩剉碎以生姜汁同研勻炒令黃色名曰黃連散治冒暑伏熱引飲過多脾胃傷冷飲食不化留膈痞悶嘔噦惡心頭目昏眩口乾煩渴肢體困倦全不思食或陰陽不和致成霍乱吐利轉筋煩躁引飲

枇杷葉去毛陳皮燜丁香各半兩厚朴去皮壹分

姜汁四兩

白茅根 麥門冬去心 乾木瓜

甘草炙各半兩

香薷參分

右件藥搗羅爲末每服貳錢水壹盞入生姜或片煎至柒分盛溫溫服溫水調下亦得如煩躁用新汲水調下不計時候小兒三歲已下可服半錢更量大小加減

僧伽耳散 治傷寒肺熱頭痛及風壅痰嗽咯血等疾

甘草炙六兩 人參

桔梗微炒

青皮去穰

白芷 乾葛

白朮各參兩

乾姜炮五分半

右爲細末每服貳錢水壹盞生姜或片棗貳箇煎柒分通口進如傷寒入豆豉同煎熱進大有神效不計時候一方無甘草

香薷治四時瘟疫傷寒

香附子

炒杏去毛紫蘇葉各四

甘草炙一兩

陳皮壹兩

不去白

右爲鹿末每服參錢水壹盞煎去滓分去滓熱服不拘時候日

參服若作細末只服三錢入鹽點服嘗有白髮老人授此方于一富人家其家合產

當大疫城中病者皆愈其後疫鬼間富人富人以次告死曰此皆數三人矣擣穎而退

治證并方見諸風類

大已寒圓治久寒積冷藏肺虛弱心腹病痛脇脹滿泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化陽氣暴衰陰氣獨勝手足厥冷傷寒陰盛神昏脉短四肢怠懶並宜服之

草撥

肉桂各四斤

乾姜炮

高良姜各六斤

右爲細末水煮麪糊爲圓如梧桐子大每服三粒米飲湯下食前服之

太陽丹治頭疼傷寒感風氣積偏正夾腦一切頭疼每服壹粒薄荷茶嚼下風壅痰盛咽膈不利亦宜服之

腦子或兩別研

川芎

甘草

白芷

各壹斤

石膏別研

大川烏

炮去皮

薄荷茶嚼下風壅痰盛咽膈不利亦宜服之

和解散治男子婦人四時傷寒頭痛增寒壯熱煩躁自汗咳嗽吐痢

厚朴大薑皮陳皮

各四兩

藁本

桔梗

甘草

各半斤

蒼朮

去皮

右同爲鹿末每服參錢水壹盞半入生姜參片棗茲枚煎至半分不計時候熱服

正氣散治傷寒陰證憎寒惡風正氣逐冷背膈噎塞脇脹脹心下堅痞吐痢嘔逆酸水欬逆怠惰嗜卧不思飲食

甘草炒

朱錢

陳皮

藿香去梗

白术

各壹兩

厚朴

半夏

同厚朴各二兩

研爛

同爲丸子微微炒

右爲細末每服貳錢生姜參片棗壹枚水壹盞煎至半分食前稍熱服又治久患瘧疾膈氣心痛日進參服常服順氣寬中辟除瘧疫壹方無

治丈夫五勞七傷渾身疼痛四肢拘急腰膝無力脾元氣虛不思飲食霍亂吐瀉四肢冷麻兼解毒傷寒療腳氣流注腫痛步行不得及虛勞等患並皆治之

五加皮

陳皮去白

乾姜炮

甘草

冬陸兩去皮

桔梗

羌活

黃芪

肉桂

去皮

蒼朮去皮以各兩

附子陸兩

大川烏

參兩去皮

右爲細末每服貳錢水壹盞姜貳片棗壹枚煎至陸分不拘時候熱益酒調服亦得

壯筋骨肢體輕健進食治男子婦人五勞七傷感冷冒寒氣弱虛多倦少力常服

天仙藤

青蒿子炒

桑白皮炒

香附子

炒

荆芥穗

前胡生姜汁炒

柴胡

桔梗

麻黃去根節

蒼朮炒

乾葛

陳皮

各一斤

茵香炒

秦艽

川芎

白芍藥

藁本

黃芪

半夏

姜汁炙羌活

各二斤半

甘草炒

肉桂去龜皮

白芷

厚朴

去龜皮姜汁炒

右或拾肆味爲龜末每服參大錢水壹盞半入生姜烏梅棗子煎至柒分去滓溫服併兩滓作服煎

雙參門大解暑毒

肉桂去龜皮

茯苓去皮

各等分

半夏醋伍升煮

甘草生

茯苓去皮

各半斤

右細末生姜汁作薄糊爲圓如梧子大每服伍拾粒水下易簡方云此藥合時須用好醋煎煮半夏姜汁作糊無見生水臻志修合用之神效中暑爲患藥下即甦傷暑發熱頭疼用之尤驗夏月常服止渴利便雖多飲水亦不爲害應是暑藥

皆不及此若痰飲停節並用姜湯嗽下入夏之後不可關絕

**辰砂** 治傷寒表裏未解頭痛發熱心曾鬱悶唇口乾焦神思昏沉狂言譫語如見神鬼及治瘧瘧煩悶未省者

**辰砂** 研

赤茯苓

各拾貳兩

白术

去芦

木猪苓

去黑皮

澤瀉

滑石

肉桂

八兩

右爲細末每服貳錢沸湯點服不拘時如中暑發渴小便赤澁用新汲水調下小兒五心煩熱焦躁多哭咬牙上擴欲爲驚狀每服半錢溫熟水調下

**砂仁** 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛肺疼鼻塞咽喉乾心曾煩滿寒熱往來痰盛咳嗽涕唾稠黏

柴胡

去芦

前胡

去芦

乾葛

石膏

煅

桑白皮

陸兩半

赤芍藥

各拾

升麻

伍兩

荆芥

去梗

柒兩半

黃芩

去黑皮

右咬咀每服參大錢水壹盞半生姜參片豉拾餘粒同煎壹盞去滓稍熱服不拘時小兒更量大小加減  
**縮脾飲** 解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多致煩躁者並宜服之

縮砂仁

各等分

乾葛

剉

白扁豆

去皮炒

各拾

兩

烏梅肉

淨

草果

煨去皮

甘草

各肆兩

右咬咀每服肆錢水壹大椀煎捌分去滓以水沉冷服以解煩或欲熱欲溫並任意服代熟水飲之極妙

**澤瀉** 治冒暑伏熱引飲過多陰陽氣逆霍亂嘔吐小便不利臟腑不調惡心頭暉並皆治之

澤瀉

各等分

白术

各等分

右咬咀每服壹貼水壹盞姜伍片灯心拾莖煎捌分去滓服不拘時每貼重半兩

**保命湯** 治四時傷寒不問陰陽二證繚覺疾作急服此藥立效

藁本

去芦

川芎

各肆兩

甘草

炒

三兩

蒼朮

洗剉炒

各肆兩

蒼朮

各肆兩

右㕮咀爲末每服參錢水壹盞半生薑叁片同煎紫分去滓熱服不拘時神妙不可具述

**人參順氣散** 治丈夫婦人風虛氣弱榮衛不和肢節疼痛身體沉重頭目旋暈肩背拘急手足冷麻半身不遂口眼喎斜痰涎不利言語蹇澀或脾胃不和心腹刺痛腎膈痞滿倦怠少力霍亂轉筋吐瀉不止胎前產後並宜服之

**乾薑**

人參各二兩

川芎

甘草

炙桑

**苦梗去节**

厚朴去蘿皮  
各四兩

白术

陳皮洗去白

**白芷**

麻黃去節  
各四兩

乾薑

去蘿皮  
叁兩半

右爲細末每服或錢水壹盞薑叁片棗壹枚薄荷伍葉同煎擗分不拘時如傷風感冷頭疼腰重咳嗽鼻塞加葱白煎治四時傷寒頭疼項強壯熱惡寒身體煩疼四肢倦怠行步喘乏及塞壅咳嗽鼻塞聲重涕唾稠粘涎壅盛氣急滿胸並宜服之

**荆芥**

白芷

陳皮

洗去白  
蒼朮

**麻黃**

去節  
各四兩

甘草

去節  
各四兩

右細末每貳大錢水壹大盞姜叁片烏梅壹箇同煎茶分不拘時溫服或茶酒調下欲發散風邪入連翹葱白叁寸同煎治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏疼肢體拘急不問風寒二證及內外之殊均可治療先用厚被蓋睡進此藥數服以薄粥湯之類佐之令四肢微汗濶然俟汗乾則徐徐去被謹避外風自然解散若元自有汗亦須溫潤以和解之或有餘熱則以參蘇飲數匙調之或尚頭疼則以濃煎薑葱白湯下聖蘇子三證既除則不必服藥但節其飲食適其寒溫自然平治大抵感冒古人不敢輕發汗者止由麻黃能開腠理用或不能得其宜則導泄真氣因而致虛變生寒證此藥乃平和之劑上能溫中解散表而已不致妄擾也兼能辟山嵐瘴氣四時瘟疫常服尤佳

半夏

湯洗  
水次

厚朴

上鹿皮  
姜又汗製

蒼术

米泔浸乙宿洗切炒

人參

各半兩

藿香葉

土洗去

草果

上皮膜

茯苓

去黑皮

人參

各半兩

甘草

分半兩

橘紅

紫分半

參蘇治感冒發熱頭疼或因痰飲凝節兼以爲熱並宜服之  
若因感冒發熱亦如服參胃湯法以被蓋卧連進數服微汗即  
愈而有餘熱更宜徐徐服之自然平治因痰飲發熱但連日頻  
進此藥以熱退爲期不可預止雖有前胡乾葛但能解肌耳既  
有枳殼橘紅輩自能寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔  
逆惡心開胃進食無以踰此母以性涼爲疑一切發熱皆能取  
效不必拘其所因也小兒室女亦宜服之

木香

半兩

紫蘇葉

乾葛

洗

半夏

湯洗去紫蘇姜

叶製炒

前胡

去苗

人參

茯苓

去皮各三分

枳殼

去穰斐炒

桔梗

去芦

甘草

炙

陳皮

去白各半兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半薑茶片棗壹箇煎陸分去滓微

熱服

不拘時候

湯

不用木香只捨味

桂木治四時瘟疫頭痛項強發熱增寒身體疼痛及傷風鼻  
塞聲重咳嗽頭昏並皆治之

蒼木

米泔浸乙宿切焙

藁本

去七

杏白芷

細辛

去葉土

羌活

去芦

川芎

目草

各乙兩

右爲細末每服參錢水壹盞生薑叁片葱白叁寸煎茶分溫  
服不拘時如覺傷風鼻塞只用葱茶調下

蜀金飲子治諸疾無不愈者常服固元陽益氣健脾進食和胃  
祛痰自然榮衛調暢寒暑不侵此藥療四時傷寒極有效

厚朴

去皮姜

蒼木

米泔浸甘草各半兩

陳皮

去白炒令黃

半斤

右爲龕末每服參錢空心以水壹盞薑錢貳片如茶法煎取  
捌分餘滓重煎兩度服食瘟疫時氣貳毒傷寒頭痛壯熱加  
連鬚葱白伍枚豉叁拾粒同煎服數劑汗出得安如未得汗  
以稀粥投之厚蓋衣服取汗立愈五勞七傷腳手心熱煩燥  
不安肢節酸疼加柴胡去蘆頭同煎麥陳發癰加姜製半夏  
煎本臟氣痛加茴香煎水氣腫滿加桑白皮煎婦人赤白帶  
下加黃耆煎酒傷加丁香食傷加高良薑四時渲瀉加肉豆  
蔻風疾加荆芥穗腿膝冷疼加牛膝渾身拘急及虛壅加地  
骨皮腿痺加兔絲子白痢加吳茱萸亦痢加黃連頭風加藁  
本轉筋霍亂加楠木皮已上功傳止加壹銖此藥不問老少  
胎前產後五勞七傷六極八邪耳鳴眼昏夢泄盜汗四肢沈  
重腿膝酸疼婦人宮壯久冷月水不調若能每日空心壹服  
即出顏容豐肌神調三焦壯筋骨祛冷氣快心曾神效莫述  
助勞  
治五勞七傷四時傷寒山嵐瘴瘧時行疫癘心神煩躁  
口苦舌乾增寒壯熱頭疼鼻塞腰脚酸倦背脊強急渾身疼痛  
地骨皮半前胡去心荆芥各貳兩香附子炒去毛

蒼朮去皮甘草燒各參麻黃去根節白芷各肆分半

川芎去半桔梗去芦當歸各半肉桂去皮乙丙

石膏九分陳皮去白天仙藤半分

右爲細末每服貳錢水壹盞烏梅半箇入鹽同煎服如要出  
汗加葱白薑錢煎連進參服常服溫益酒調熱益湯點亦得  
人參熟地  
解利四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼增  
寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴或傷風感寒  
頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘潮熱往  
來及痃氣勞七傷中脘氣滯心腹痞悶停廢嘔逆冷氣奔衝攻  
疰刺痛又治婦人血氣撮痛經候不調並宜服之

貝母去心

白茯苓炮

半夏煮

各乙丙枳殼去穰炒

蒼朮浸乙宿人參

白术培

白芷不見火

陳皮去白

秦艽

赤芍藥各兩

川芎

當歸去芦焙

肉桂去皮

乾薑炮各二兩半

柴胡去芦

麻黃去根節

桔梗去芦

甘草各四兩

厚朴曲兩姜浸

右件爲細末每服參錢水壹盞生薑叁片同煎至沸分通口  
稍熱服身體倦怠加烏梅壹箇咳嗽加棗貳枚同煎不拘時  
解四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼增寒惡風  
肢體倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴不思飲食又傷風感寒  
頭痛体熱鼻塞聲重咳嗽痰涎山嵐瘴氣時行疫癘並皆治之

川芎

蒼术

米泔浸

白朮各二兩

甘草

蜜

石膏煅

乾薑

各二兩

麻黃

去根節

叁兩

右件爲細末每服貳錢水壹盞生薑叁片同煎至沸分通口

分熱服不拘時候如要出汗併煎叁服被蓋汗出爲度

治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱日發陰弱者汗自  
出青薑寒酒酒惡風翕翕發熱鼻乾嘔

桂枝去皮

芍藥

各二兩半

甘草

乙兩

右爲龜末每服貳錢以水壹盞入生姜叁片棗叁枚擘破同  
煎取柒分去滓溫服不計時候惟春初可行自春末及夏至  
已前可加黃芩半兩夏至後加知母半兩石膏貳兩或升麻  
半兩若病人素虛寒者不用加減無汗休服

黃連去須

桂枝去皮

各二兩

甘草

乙兩

黃連

叁十粒

兩

好酒伍升

右黃連以酒煮乾爲度研爲細末用麪水煮糊搜和爲圓如  
梧桐子大每服參拾圓熟水吞下又療傷酒過多壯毒下血  
大便泄瀉用溫米飲吞下食前進壹日兩服

治四時傷寒癰瘍時氣頭疼壯熱腰背拘急五  
勞七傷山嵐瘴氣寒熱往來五膈氣噎咳嗽痰涎行步喘乏或  
霍亂吐瀉壯腑虛寒下痢亦白並宜服之

厚朴

去皮姜

霍香

去梗土

甘草

蜜

半夏

萸

蒼术米泔浸陳皮去白

右等分爲剉散每服參錢水壹盞半生薑參片棗子貳枚煎至捌分去滓食前稍熱服忌生冷時膩毒物若四方人不伏水土宜服之常服能辟嵐氣調和脾胃美飲食

川芎金頭散治丈夫婦人諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重傷風壯熱肢體煩疼肌肉蠕動膈熱痰盛婦人血風攻疰太陽穴疼但是感風氣悉皆治之

薄荷葉不見火辦兩

川芎

荆芥去梗各四兩

香附子炒八兩

防風去梗去兩

白芷

羌活

甘草炙各一兩

甘草炙各一兩

右件爲細末每服貳錢食後茶清調下常服清頭目

葛根葛根湯治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澁或出大便溏泄皆因坐卧濕處或因雨露所襲或因汗出衣衾冷濕久不得之腰下重疼兩脚疼痛腿膝或腫或不腫小便利反不渴悉能主之

蒼术

白术

甘草

甘草炙各一兩

甘草炙各一兩

乾薑溫各二兩

橘紅

丁香

丁香各一兩

丁香各一兩

右㕮咀每服肆錢水盞半棗壹枚薑參片煎七分食前溫服

赤茯苓赤茯苓散治冒暑伏熱頭目昏暉嘔吐瀉利口乾煩渴背寒而垢

甘草去皮各一兩

甘草生各一兩

寒食麵

生薑

生薑切碎搗勻各一斤

右爲細末每服貳錢新汲水或冷熟水調下不拘時候

桂枝桂枝湯治傷寒遍身疼痛百節拘急頭目昏痛肢體勞倦壯熱增寒神志不爽感冒瘟疫瘴氣常服碎

瘡瘍治勞倦

山藥陳壹兩

柴胡去蘆

前胡生姜製炒

人參

羌活

獨活

甘草

蒼术

米泔浸剉炒

乾葛

白芍藥

升麻

防風

去苗

藁本去戶

藿香去梗

白术

半夏姜汁製各一兩

立春已後不加減

立夏已後壹料加

柴胡

壹分

赤茯苓

當歸

各半兩

立秋

已後減柴胡壹分不用當歸茯苓只加

乾薑炮

肉桂

去龜皮

分

麻黃

去節

半兩

立冬已後並無加減

無當歸有黃芩

去黃芩

半兩

右爲細末每服參錢水壹盞半薑參片棗貳箇煎至壹盞熱服不計時候併進貳服如要表散加葱白參寸淡豆豉參拾粒同煎服以衣被蓋覆汗出而愈

茯苓

甘草

炙

陳皮

去白

人參

白朮

藿香

去上

厚朴

去皮剉生苗自然汁溫

宿炒紫色

貳兩

半夏

湯洗柒次  
壹兩

右爲細末每服貳錢水壹盞生薑參片棗子壹枚葱白參寸同煎至柒分溫服不拘時候

白朮治傷寒氣厥不知增寒壯熱鼻塞腦悶涕唾稠粘痰嗽壅滯或冒涉風濕增寒發熱骨節疼痛或中暑嘔吐眩暉及大病後將理失宜食復勞復病證如初又治五勞七傷氣虛頭眩精神恍惚睡卧不寧肢體倦怠潮熱盜汗脾胃虛損面色痿黃飲食不美口吐酸水臟腑泄泄腹內虛鳴反胃吐逆心腹絞痛久瘧久痢及膈氣咽塞上氣喘促坐卧不安或飲食并傷脅膈痞悶腹脹婦人胎前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省人事常服辟四時不正之氣及山嵐瘴疫神效不可具述

山藥

桔梗

茯苓

去皮

甘草

白朮

兩

乾薑

炮  
兩

右爲末每服貳錢水壹盞薑參片棗壹枚木瓜乾壹片紫蘇參葉煎柒分食前服若吐瀉入白梅煎喘入桑白皮杏仁鹽

傷寒再復入薄荷膈氣入木通參寸麝香少許中暑嘔逆入  
香薷產前產後血氣不和入荆芥煎霍亂入藿香煎氣厥入

鹽湯調下

人參順氣散治證服法並與前人參順氣散同

人參

桔梗

甘草多

乾葛

白朮

白芷

各乙兩

麻黃去根節半兩

乾姜半兩服法見前

藿香正氣散治傷寒頭疼增寒壯熱上喘咳嗽五勞七傷八般  
風痰五般兩氣心腹冷痛反胃嘔惡氣鴻霍亂藏腑虛鳴山嵐  
瘧瘧遍身虛腫婦人產前產後血氣刺痛小兒疳傷並宜治之

大腹皮

白芷

紫蘇

茯苓去皮

各乙兩

半夏麴

白朮

陳皮去白

厚朴肉桂

去鹿皮薑汁

苦梗

各或兩

藿香去土

甘草或兩半

右爲細末每服或水一盞姜分三片棗一枚同煎至七分

熱服如欲出汗衣被蓋再煎服

眩四肢拘攣咳嗽多痰脅滿氣短

甘草

麻黃根節不去

杏仁不去皮尖

右等分㕮咀爲末散每服伍錢水壹盞半姜錢伍片同煎至

壹盞去滓通口服以衣被蓋覆睡微汗爲度

桑蠶子解利四時溫疫傷寒身熱壯頭痛增寒項脊拘急渾  
身疼痛煩渴悶亂大小便澀滯卧少力全不思飲食及諸氣疾  
五勞七傷山嵐瘧瘧寒熱往來等疾並皆治之

柴胡去苦

甘草炙

乾姜各或兩

肉桂去龜皮

不見火

桔梗

防風

荆芥穗

五加皮各乙兩

芍藥半兩

麻黃去節

陳皮去白

蜜水浸乙宿

乙分

右爲細末每服或水一盞生姜三片同煎至捌分熱服不

拘時候常服和順三焦辟瘧氣進飲食

金匱要略篇中和氣調榮衛治飲食不節飢飽失時或冷物過多

或硬物壅駐或食畢便睡或驚憂恚怒或勞役動氣便欲飲食致令脾胃不和三脘痞滯內感風冷外受寒邪增寒壯熱遍躰疼痛脣膈滿悶霍亂嘔吐脾疼齶胃中酒不醒四時傷寒頭痛併進參服得汗即痊常服益脾溫胃散宿痰停飲能進食辟風寒暑溫霧露之氣

白扁豆炒

茯神

厚朴

去蘿皮剉薑汁炒

香薷

去梗

甘草

半兩

右爲細末每服或錢沸湯點服入鹽點亦得不拘時

治時令不正瘟疫妄行人多疾病此藥不問陰陽兩感或風寒溫痺皆可服之

川芎

甘草炙

麻黃

去根節升麻各四兩

乾葛十四兩赤芍藥

去梗

白芷

陳皮

去核

紫蘇

去梗

香附子

去毛各四兩

右爲細末每服參大錢水壹錢半生姜伍片煎至柒分去滓

熱服不以時候如發熱頭痛加連翹葱白參莖亦中滿氣实加枳殼數片同煎服雖產婦嬰兒老人皆可服餌如傷寒不

分表裏證以此導引經絡不致交動其功效非淺

水浸治伏暑傷冷冷冷不調霍亂吐利口乾煩渴並宜服之

巴豆

大者去心膜研取油

十五枚去皮

黃丹

炒研

羅過取

乙丙乙分

右同研勻用黃蠟籠作計別爲丸如梧桐子大每服伍圓以水浸少頃別以新汲水吞下不拘時候

治傷寒頭疼鼻塞流涕聲重咽乾脣膈滿悶頭痛如破

天南星

去皮切焙乾

生薑自然汁

草烏頭

炮去皮

荆芥穗各半兩

石膏

研乙丙

右爲細末每服茶末壹分生姜自然汁半呷薄荷葉水或盞同煎八分通口服

治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄寒熱交作

瘓喘咳嗽脣膈滿頭目暎

發財浮腫嗜卧倦怠小便赤澀

并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食婦人胎前產後並宜服之

縮砂仁

半夏

湯泡七次

杏仁

去皮尖人參

甘草

炙各壹兩

赤茯苓

去皮

藿香葉

搗去梗莖

白扁豆

姜汁略炒各四兩

木瓜

各二兩

香薷

厚朴

姜汁製各四兩

右剉每服肆錢水壹盞半生薑參片棗子壹枚煎至捌分去滓不拘時候服

太平惠民和劑局方卷之二

# 太平惠民和劑局方卷二

## 治一切氣

附一

積聚一脾胃

蘇合香圓療傳屍骨蒸殮瘰肺癆疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴癧赤白暴利瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病射香麝合圓方見後

白术

青木香

烏犀角

香附子炒去毛

朱砂

研水飛

訶梨勒煨取皮

白檀香

安息香

別末無灰酒乙升熬膏

沉香

麝香

丁香

華撥

各貳兩

薰陸香

別研壹兩

子大繖絹袋盛當心帶之一切邪神不敢近

治一切冷氣心腹疼痛胃膈噎塞脇肋脹心下堅痞腹中虛鳴噦逆惡心噫氣吞酸胃中冷逆嘔吐不止宿飲不消脅膈刺痛時吐清水可思飲食並皆治之

肉桂

去皮兩半

訶子

炮取皮

阿魏

細研白粉少許

搜和作餅壹分

餅

茯苓

白辰

當歸

湯洗切焙乾薑炮去皮

內豆蔻

去殼

仁

縮砂

五味子

微炒

川芎

丁香皮

益智子

去皮

白豆蔻

去皮各壹兩半

巴戟

去心麪炒

三棱

炮

檳榔

炮

草澄茄

酒半盞化蜜入蜜

芍藥

酒半盞化蜜入蜜

義炭

茴香

微炒各半兩

胡椒

各半兩

木香

酒半盞化蜜入蜜

沈香

乳香

另研

丁香

各壹兩

右件藥除安息香硝砂外並壹

柱羅爲細末用蜜參拾兩

安息香硝砂於蜜中煉熟剝上件藥杵壹貳斤下圓如雞

頭肉大每服壹丸細嚼溫酒下濃煎生姜湯下亦得食前服  
沉圓治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛腎膈寒凝逆  
惡心噫氣吞酸不思飲食胃中冷逆嘔吐不止及翻胃隔氣  
宿食留飲心痛霍亂婦人血氣心腹痛並皆治之

甘草炙

青皮去穰剉炒

丁香

白豆蔻仁

各五兩

沉香

木香

檳榔

肉豆蔻仁

各五兩

白术剉微炒

人參去薑

茯苓去皮

訶梨勒煨取皮

十兩

肉桂

去穰皮

乾薑炮製各

麝香別研

乙丙

炒生薑監湯下溫酒亦得空心食前服

沉圓治一切冷氣攻心腹刺痛胃膈噎塞嘔吐痰水噫  
氣吞酸口苦舌澀不思飲食及膀胱腎間冷氣攻衝腰背拘  
急臍腹絞痛手足逆冷小便滑數又治卒暴心痛霍亂吐利  
疝瘕氣痛婦人血氣刺痛並宜服之

天台烏藥

白芷

甘松洗曬

甘草

燭各貳斤半

薑黃去皮

檀香

乾薑炮

肉桂

去穰皮各貳拾兩

白豆蔻去皮

沉香各貳拾兩

薑附子去毛殼

五斤

右爲末煉蜜搜和每壹兩作貳拾丸每服壹圓嚼破炒生姜  
鹽湯下元氣發動炒茴香熟酒下空心食前服

理中丸治中焦不和脾胃宿冷心下虛痞腹中疼痛脇脹逆  
滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫醋吞酸口苦失味怠墮  
嗜卧全不思食又治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利心腹絞  
痛手足不和身熱不渴及腸鳴自利米穀不化

白朮

乾薑炮

人參

甘草

各貳拾兩

右爲末煉蜜爲丸每壹兩作壹拾圓每服壹圓食前沸湯化  
下嘴服亦得或圓如梧桐子大服並得大病新差多睡不止  
及新產內虛皆可服之常服溫脾暖胃消痰逐飲順二焦進  
飲食辟風寒濕冷邪氣

**治脾圓** 治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脹刺痛便利不調少力嗜卧體重節痛及治虛勞脾胃虛弱飲食不化心腹痞滿並宜服之此藥老幼氣弱皆可常服能溫和脾胃調進飲食

**厚朴** 去龜皮州碎以生姜半夏

平炒研細同炒 半夏 生薑汁製作成丸黃

壹半

**鼈甲** 火助大者壹枚黃泥外固以米醋貳碗化砂壹兩放鼈甲內慢火熬乾取貳兩細研

研細粉用

**神麴** 碎炒

炒微炒

**白朮** 剉炒

**肉桂** 去龜皮

各貳兩

**枳殼** 麸炒去穰

**三棱** 炮

**青皮** 去白炒

**人參** 各叁兩

**陳皮** 去白

**詞子** 炮去核

**檳榔** 各四兩

**當歸** 各壹兩半

**芍藥**

**甘草** 炒各壹兩

**乾薑** 炮

**赤茯苓** 去皮各叁三分

右爲細末蜜圓如小豆大每服貳拾圓加至參拾圓微嚼破溫水下不計時候

**紫蘇子圓** 治一切氣逆。脣膈噎悶心腹刺痛。腸肋脹滿。飲食不消。嘔逆欲吐。及治肺胃傷冷。咳嗽痰滿。或上氣奔急。不得

**安卧**

**紫蘇子** 揀淨

**陳皮** 去白各貳兩

**肉桂** 去皮

各壹兩半

**人參** 去芦

**高良薑** 炒各貳兩

各壹兩半

右伍味爲細末煉蜜和圓如彈子大每服壹圓細嚼溫酒下米飲亦得不計時候或作小圓服之亦得若食瓜膾生冷覺有所傷。噫氣生熱欲成霍亂者含化壹圓細細嚥汁服盡應時立愈。常服此藥永不患霍亂甚妙。

**養脾圓** 治脾胃虛冷。心腹絞痛。脣膈滿悶。脇肋虛脹。嘔逆惡心。噫氣吞酸。泄瀉腸鳴。米穀不化。肢體倦怠。不思飲食。

**大麥蘖** 炒去皮各貳斤

**白朮** 半斤

**甘草** 剉燶

各壹斤半

**縮砂** 各貳斤

去皮

**白朮** 半斤

**甘草** 剉燶

各壹斤半

右爲末。煉蜜和圓每兩作捌圓。每服壹圓細嚼生薑湯送下。食前服。此藥養胃進食。

**治因愁憂思慮飲食不節動氣傷神致陰陽不和**

脾圓 治因愁憂思慮飲食不節動氣傷神致陰陽不和。脾

臟生病結於胃膈遂成憂膈氣膈食膈飲膈勞膈之病若食生冷即發心胃痞滿氣不得通疼痛如刺及引背癆食即不下心下堅痛痛即欲吐得吐即已甚者手足逆冷上氣咳逆

### 喘息短氣

蜀椒去目并開口  
者微炒去汗

細辛去苗土肉桂去龜皮

遠志去心各三兩  
炮去汗

甘草炙各伍兩  
乾薑炮一兩

人參去芦肆兩

附子炮去皮臍壹兩半

右爲細末煉蜜和圓如彈子大每服壹圓含化嚥之胃膈喉中當熱藥力稍盡更服壹圓日參服夜貳服服藥次日即愈或圓如梧桐子大溫酒服之亦得食後服

靈芝亦名穀神散治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胃膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛可思飲食或多痰逆口苦呑酸胃滿短氣肢體怠惰面色萎黃如中焦虛痞不任攻擊藏氣虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常累受怯弱不能多食尤宜服之常服育神養氣和補脾胃進美飲食

枇杷葉去毛尽塗薑汁  
炙令香熟爲度

薏苡仁微炒

白茯苓去皮

人參去蘆

各一錢

縮砂去皮各壹兩

大腹子微炒隨風子如无拣實

甘草調子亦得

杜仲去皮用薑汁与酒合  
炙令香熟微微焦

石斛細剉酒藿香葉拌微炒

木香

沉香

丁香

陳皮各叁分  
去白

穀蘖微炒

檳榔炒

各半兩

五味子微炒

白豆蔻微炒去皮

青皮去穰

桑白皮微炒

各半兩

白朮微炒

神曲微炒

半夏湯洗七遍生姜壹分切作片子

与半夏同搗爛作餅炙黃各壹分

甘草炙壹兩半

右搗羅爲末每服貳錢水壹盞入生薑貳片肥棗參枝同煎至柒分溫服不計時候及療四時傷寒能調治陰陽使無變動剋日得安如療五噎入乾柿壹枚同煎拾服見効如療膈氣吐逆羸困入薤白參寸棗伍枚同煎婦人亦可服

理中湯脾胃不和中寒上衝胃腸逆滿心腹疼痛痰逆惡心或時嘔吐心下虛痞閹塞不通飲食減少短氣羸困溫中逐

水止汗去濕又腸胃冷濕泄注下水穀不分腹中雷鳴傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷胷痺心痛逆氣結氣並皆治之

人參

甘草炒

白朮

乾薑炮

各參兩

右龜末每參錢以水壹盞半煎中盞去滓稍熱服空心食前調和背陽調中順氣除邪養正治心腹暴痛胷痞滿短氣煩悶痰逆惡心飲食少味肢體多倦常服飲食增進腑藏和平肌膚光悅顏色光潤

麝香研半分

沉香貳兩

生龍腦研壹錢

甘草錢分

木香

白豆蔻仁各一兩

右爲細末入研藥勻每服半錢用沸湯點服或入生薑壹片鹽少許亦得酒食後服之大妙

白朮散治氣滯不勻胷膈虛痞宿冷不消心腹刺痛除脹滿喧塞止嘔吐惡心常服調順脾胃進美飲食

丁香

檀香

木香

白豆蔻仁各貳兩

藿香葉

甘草燃各捌兩

縮砂二兩

右爲末每服壹錢入鹽末壹字用沸湯點服不計時候

烏沉湯和一切氣除一切冷調中補五藏益精壯陽道暖腰膝去邪氣治吐瀉轉筋癲癥疼痛風水毒腫冷風麻痺又主中惡心腹痛蠭毒疰忤鬼氣宿食不消天行瘧疫膀胱腎間冷氣攻衝背膂俛仰不利及婦人血氣攻擊心腹撮痛並宜服之

天台烏曉伯沉香伍拾兩人參參兩

甘草

燃肆兩半

右爲末每服半錢入生薑叁片鹽少許沸湯點服空心食前五膈覽中散治因憂恚寒熱動氣傷神致陰陽不和腑藏生病結於胷膈之間遂成五膈之病一曰憂膈胷中氣結津液不通飲食不下羸瘦短氣二曰恚膈心下實滿噫噯醋心飲食不消大小便不利三曰氣膈胷脇逆滿喧塞不通噫聞食

水止汗去濕又腸胃冷濕泄注下水穀不分腹中雷鳴傷寒時氣裏塞外熱霍亂吐利手足厥冷胷脾心痛逆氣結氣並皆治之

人參

甘草炒

白朮

乾薑炮各參兩

右龜末每參錢以水壹盞半煎中盞去滓稍熱服空心食前調肺安胃湯調中順氣除邪養正治心腹暴痛胃膈痞滿短氣煩悶痰逆惡心食飲少味肢體多倦常服飲食增進肺藏和平肌膚光悅顏色光潤

麝香研半分

沉香貳兩

牛龍腦研壹錢

甘草錢分

木香

白豆蔻仁各一錢

各毛兩

右爲細末入研藥勻每服半錢用沸湯點服或入生薑壹片鹽少許亦得酒食後服之大妙

白朥散治氣滯不勻脅膈虛痞宿冷不消心腹刺痛除脹滿噎塞止嘔吐惡心常服調順脾胃進美飲食

枳殼去穰炒各拾兩

右爲細末每服貳錢水壹盞入生薑貳片棗半箇同煎茶分和滓熱服如不及煎入鹽少許沸湯點服亦得不拘時候建中湯治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋脹滿嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄利水穀不化肢體倦怠不思飲食

青州棗

厚朴各壹斤乾薑炮姜汁制

半夏湯洗去滑

甘草各伍兩

陳皮去白

草豆蔻去皮

麝香研

半夏湯洗去滑

白茯苓去皮各壹兩

白朮壹兩

甘草各伍兩

陳皮去白

右龜末每服貳錢水壹盞生薑叁片煎墜分去滓溫服食前治脾胃不和可思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味智胸膈氣嘔噦惡心噫氣吞酸面赤萎黃肌體瘦弱急嘔等症

體重節痛常多自利或發霍亂及五噎入痞膈氣反胃並宜服

蒼朮去蕪皮米泔浸日

各一斤貳兩

厚朴

大腹皮薑鹽汁炒半两

陳皮去白

各參斤貳兩

甘草炮

參一斤半兩

右爲細末每服貳錢以水壹盞入生薑貳片乾棗兩枚同煎至柒分去薑棗帶熱服空心食前入鹽壹捻沸湯點服亦得

常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣

(七氣湯) 治五藏不調二焦不和心腹痞悶脇肋脢脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀大便秘難雖年高氣弱並可服之又治背痛腰痛有妨飲食及脚氣上攻胃

腹滿悶大便不通

羌活去蘿

各一斤半兩

紫蘇莖梗去蘿

沉香

宣州木瓜

薄切焙乾

大腹皮炙焦黃

各壹兩

陳皮去白

木香

甘草炒

各參三分

右爲麞末入半夏令勺每服參錢水壹盞煎至陸分去滓溫服不計時

(七氣湯) 治虛冷上氣及寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時發時止發即欲死此藥主之

人參

甘草炙

肉桂去麞皮

半夏

湯洗柒盞切片焙乾五兩

右爲麞末入半夏令勺每服參錢水壹大盞入生薑參片煎柒分去滓稍熱服食前

(益智湯) 治傷寒陰盛心腹疼痛滿嘔吐泄利手足厥冷及一切冷氣衝心脅脰腹脹滿絞痛

川烏炮去皮

各一斤半兩

益智去皮

各一斤半兩

乾薑炮

半兩

青皮去白

壹兩

右件爲散每服參錢水或盛入鹽壹匙生薑伍片棗貳箇擘破同煎至捌分去滓溫服食前

(藿香正氣散) 治胃虛中寒停痰留飲噦逆嘔吐冒滿噫短氣倦怠不入飲食

丁香皮半兩

各一斤半兩

藿香葉壹兩

半夏湯浸洗柴炭微炒黃曲

貳兩

右爲散每服貳錢水壹盞生薑半片前藥分去滓溫服食前

治脾胃不調胃膈滿悶飲食不化嘔逆惡心或霍

嘔吐心腹刺痛腸鳴泄利水穀不分

草豆蔻去皮壹斤生薑切作片

甘草梢一兩

右件料勻入於銀器內用水過參指許以慢火熬令水盡燒令乾搗爲細末每服壹錢用沸湯點服不計時候夏月煎作熱水常服調中止逆除冷氣消飲食

積氣圓治陰陽不和藏腑虛弱寒冷之氣留滯於內使氣積不散脅脇支滿食即氣噎心腹脹氣刺氣急宿食不化心腹引痛噎氣吞酸停飲浸漬惡心嘔逆癥塊疼痛藏腑不調飲食不進往來寒熱漸覺羸瘦以致着床面黃肌熱精神困頓

巴豆壹粒去皮取霜

桃仁去皮尖炒別研

附子炮去皮

米醋伍升以硝砂大黃同發

大黃爲末壹兩

乾漆炒焦

木香壹錢

鼈甲醋炙大黃

三稜

煅梟熟搗碎

肉桂去龜皮研

胡砂研各貳兩

朱砂研飛

麝香研各半

右爲細末入研藥勻以醋膏爲圓如梧桐子大每服貳圓炒生薑湯溫下或木香湯亦得食後臨卧服更看虛實加減服之忌生硬冷物

丁香圓治積滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦噫醋吞酸脇肋刺痛胃膈痞悶或反胃惡心食飲不下氣上衝胃痞噎不通及癰酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食並治之常服消飲食行滯氣

猪牙皂角炮黑爲細末

好墨燒醋淬

肉桂去龜皮

乾薑炮

丁香

木香各壹兩

乾漆碎炒令揮

黑牽牛炒爲細末

川大黃別爲達摩丸炮

京三棱炮搗碎

青皮去白

巴豆霜先用醋煎硝砂令熱下

巴豆霜細末大黃末熬膏壹錢半

右以大黃硝砂巴豆膏和圓如菉豆大每服壹兩圓茶酒任下如要取化癥瘕癰癧塊用生薑湯下柴圓並食後臨卧服之

○ 消積滯牛乳。此飲宿食止痰逆惡心霍亂嘔吐治心腹脹悶。脇肋刺痛。胃膈痞滿。噎塞不通。常服順脾胃。進飲食。

五靈脂

兩拾貳

丁香

去皮一兩

木香

壹兩半

肉豆蔻

大如指頭。參伍拾箇

巴豆

去皮出油。半個。拾箇

右爲細末入巴豆令勻。麪糊和令得所。圓如黍米大。每服伍圓至柒圓。溫生薑湯下。橘皮湯亦得。食後服。如霍亂吐逆。煎桃葉湯放冷下。小兒吐逆不定。參歲兒服參圓。伍歲已下服肆圓。用生薑桃葉湯下。

○ 三棱頭圓。順氣寬中。消積滯化瘀。飲治中脘氣痞。心腹堅脹。脇下緊硬。胷中痞塞。喘滿短氣。噫氣不通。嘔吐痰逆。飲食不下。大便不調。或泄或秘。

杏仁

湯浸去皮尖。炒炒黃色。

硇砂

飛研。各壹兩。

神麴

碎炒。

蘿白子

微炒。各貳兩。

麥蘖

炒。各壹兩。

青皮

去

乾漆

炒。九

蘿白子

微炒。各貳兩。

右件爲末以三棱膏勻搜和圓如梧桐子大。每服拾伍圓至貳拾圓。溫米飲下。食後服。

○ 賢木香圓。寬中利膈行滯氣。消飲食。治胃膈噎塞。腹脹痛。心下堅痞。腸中水聲噏。鐵瘞逆。不思飲食。

補骨脂

炒香。草澄加。

檳榔

酸栗米。飯裏濕紙包火中

煨令紅。去殼。各肆拾兩。

木香

拾兩。

黑牽牛

赤伯。肆拾兩。炒香別。黑未壹伯。貳拾兩。

木香

拾兩。

右爲細末入牽牛末令勻。漸入清水和令得所。圓如菉豆大。每服貳拾圓。茶湯熱水任下。食後服。每酒食後可服伍圓。或參圓。小兒壹歲服壹圓。懷姪婦人不得服之。

○ 膽食圓。治脾胃俱虛。不能消化。水穀留膈。痞悶。腹脹時脹。連年累月。食減嗜卧。口苦無味。虛羸少氣。又治胃中有寒。飲食不下。反胃翻心霍亂。嘔吐及病後新虛。不勝穀氣。或因病氣衰食不復常。並宜服之。

烏梅

去核。焙乾。

乾薑

肆兩。

小麥蘖

炒。黃。各肆兩。未炒。

右件爲末煉蜜和搜爲圓如梧桐子大每服拾伍圓加至貳拾圓米飲下日貳服不計時候

**小獨聖圓**治脾胃不和飲食多傷心腸刺痛噦噦惡心噫痞吞酸乾噫食臭腹脹悶不思飲食

巴豆連皮秤半兩去皮心

肉桂去龜皮研碎

硝砂

壹兩

半夏湯洗朱次

丁皮舶上者

烏梅去核

乾薑

炮

當歸去蘆

三棱

各肆兩

右爲細末入巴豆硝砂勻水煮麪糊爲圓如麻子大每服參圓至伍圓用溫水下食後服常服化滯氣利膈止逆消食。白圓治心腹積聚久癥癖塊大如杯碗黃疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來捨心傍攻兩脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛積年食不消化或瘧疾連年不差及療一切諸風身體頑痺不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及療瘞拾貳種風寒拾陸種道戶注忤及癲癇或婦人諸疾斷續不生帶下淋瀝五邪失心愁憂思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹中一切諸疾有以懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不除愈。

川烏炮去皮

半兩

柴胡

去蘆

桔梗

十

吳茱萸

湯洗紫次

炒

葛蒲

紫苑去苗葉

及上

黃連

去鬚

乾薑炮

炮

肉桂去龜皮

茯苓去皮

及上

蜀椒

去目及開口

炒出汗

人參

厚朴去皮

及上

早茶

去皮

巴豆

去皮心膜出油炒研各半兩

湯下食後或臨卧服漸加至伍朱圓

**九痛圓**治九種心痛一蟲心痛二疰心痛三風心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛又治連年積冷流注心曾痛并療冷衝上氣落馬隨車瘀血等疾

狼毒各分香

附子炮去皮

乾薑炮

炮

巴豆去皮心膜炒乾取霜

人參

吳茱萸湯洗紫次

各壹兩

右陸味爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服空腹溫酒下壹圓卒中惡心腹脹痛口不能言者服貳圓立瘥

治男子婦人一切冷氣攻心腹脹滿刺痛醋吞酸痰逆嘔吐脣膈痞悶飲食不美又治五膈五噎一切氣疾常服除邪冷生胃氣

鹽貳兩半

丁皮壹兩

胡椒貳錢半

丁香

檀香半

乾薑炮

甘草錢貳兩

右茶末碎同搗用慢火燼令香熟乘熱入磁器內密蓋覆候冷研羅作細散密盛貯勿令泄氣味每服半錢至壹錢用沸湯點服不計時候

治男子婦人氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏正頭疼痛連腦顛吐逆惡心目瞑耳聾常服清頭目消風化痰暖胃

防風

天麻

半夏生

各半兩

天南星洗

乾薑

川烏各一枚川芎

甘草錢貳兩

右爲細末湯浸蒸餅和圓如雞頭大捻作餅子曝乾每服伍餅同荆芥參伍穗細嚼茶酒任下熟水亦得不拘時候

治丈夫元藏氣虛耗敗兩耳常鳴臍腹冷痛頭旋目暈四肢怠倦小便滑數泄瀉不止凡藏氣虛弱者悉宜服之

木香裹紙

茯苓

人參

附子炮去皮臍

各壹兩

右爲細末每服貳錢水壹大盞生薑貳片棗子壹箇鹽少許煎茶分空心食前服

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛禹壅痰實喘滿咽乾不利煩渴引飲頭目昏眩腰脚無力四肢倦怠咳嗽兼治風濕脚氣

前胡

五加皮

厚朴

姜浸

人參

黃耆大盞

當歸

紫蘇子

微炒

甘草炙

肉桂

不見火  
壹兩

陳皮去白

半夏麪

各壹兩

乾薑炮

人參

附子炮去尖

桔梗各半两炒

右拾伍味同作鹿末每服參錢水壹盞半入紫蘇參葉生薑參片棗壳枝煎至半分去滓食後服

錢家通

御保圓治心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下肺氣甚者白礬蛤粉各三分黃丹壹分同研爲散煎桑根白皮糯米飲調下參錢氣小喘止用桑白皮糯米飲下腎氣脇下痛最難治獨此藥能去之有人病項筋痛諸醫皆以爲風治之數月不差乃流入背膂又之又注右脇攀痛甚苦乃合服之投而差後常毋發又一投差

木香

胡椒各壹分

乾蝎蜜酒

巴豆去心皮別研

右爲細末入巴豆霜令勻湯釋蒸餅圓如麻子大朱砂爲衣每服參粒湯使如前

鐘頭陀魏圓治五種噎疾九般心痛痃癖氣塊冷氣攻刺及脾胃停寒胃滿脹腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣血刺等疾

茴香炒

青皮去白

甘草炒

蓬莪术炮

川芎

陳皮去白各半两

白芷半两

丁香皮炮

縮砂仁

肉桂去皮各半两

生薑肆兩切作片子用鹽半兩掩毫宿炒黑色

胡椒

阿魏醋浸壹宿以麪同爲糊

右搗爲末用阿魏糊和圓如雞頭大每藥圓壹斤用朱砂米錢爲衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下壹粒至貳粒婦人血氣醋湯下常服壹粒爛嚼茶酒任下

沉香丸治陰陽壅滯氣不升降脅痛痞塞心腹脹滿喘促短氣乾咳煩渴咳嗽痰涎口中氣味嗜卧減食又治胃痺留飲意醋聞酸脇下支結常覺妨悶及中寒咳逆脾濕漏泄兩脇虛鳴脣下撒痛皆能治之患腳氣人毒氣上衝心腸堅

漏版治浮腫者尤宜服之常服開胃消瘀散壅而食

香附去毛沉香十四分缩砂仁八分甘草

前二十刀

右為細末每服乙分入鹽少許沸湯點服凌旦霧路空心服食去邪惡氣使无瘴疫

小青湯

調中快氣治心腹刺痛

烏藥

十六分

甘草

七分

香附子

沙盆內斬去皮毛搗乾二十刀

右為細末每服乙分入鹽少許或不著鹽沸湯點服不拘時

醉霧路寒邪散鬲腕凝滯調順三焦和養禁衛治心胃痞悶噫醋吞酸嘔逆痰水津液不收兩脇刺痛眼中堅滿口苦无味可思飲食

丁香十二分沉香二分

木香乙分半

丁皮乙分

白豆蔻仁

九分半

石為細末別用甘草熬膏子為口每壹刃分作式百五十日

分服乙粒含化空心食

國漢

治虛中積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷因餓飽食醉酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大疼霍亂吐瀉大使頻併後重遲澀久痢赤白膿血相雜米穀不消愈而復發又治中酒嘔吐癥逆惡心喜睡頭旋脣膈痞四肢倦怠不欲飲食又治妊娠傷冷新產有傷若久有積寒喫熱藥不效者又治久病形羸桂薪歲月漸致虛弱而黃肌瘦飲食或進或退大便或秘或泄不拘久新積冷並悉治之大病不過三服便見痊愈此藥溫无毒並不燥熱不損胃氣亦不吐瀉止是磨化積聚消逐溫冷療飲食所傷快三焦滯氣旋丸如棗豆大每服三五粒量虛實加減溫水吞下不拘時候常服進飲食消酒毒令人不中酒又治小兒脾胃虛弱累有傷滯糞白鮮臭下痢水安每服伍粒黍米大乾薑湯下不拘時候前項疾證連縣月日用熟藥及取轉並不成效者

南木香

去蘆頭  
二刀半

肉豆蔻

子二十个  
去籠皮用滑皮仁

丁香

新來  
乙及半

川乾薑

乙刀半

粗出尽曲糊

巴豆

細出七十个  
去皮心

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味擣為細末與朱同拌研令細用好蠅匣和先將蠅六只溶化作汁以重錦去滓以好酒一升於良石器內莫蠅鎔數沸候酒冷其蠅自浮取蠅秤用凡春夏修合用清酒一兩於鍋內熱令末散香熟次下酒煮蠅四刃同化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清酒一刃半同前煮熟作汁和覆藥末成劑分作小錠子以油單紙包旋煎服此高殿前家方也

小聖羅治三院氣弱中焦積寒脾虛不磨飲食遲化藥物頻傷胃膈滿悶脹肋病刺嘔吐噦逆噫暗惡心腹脹腸鳴心腹疼痛噎塞膈氣飽胃吐食飲食減少

豇豆

義木

兼熱

縮砂

仁各二斤

草豆蔻

威靈

威靈草

京三棱

穿山甲

肉桂

去蘇皮  
各二斤

摩牛

香鹽十斤  
阿魏各三斤

阿魏

龍虎作研石  
三斤

甘松

甘松

右為末水煮麪糊口如梧子大每三十粒生薑搗皮湯下溫湯亦得不拘時此藥無利性不損氣脾胃虛寒者最宜服

噎塞嘶喉氣脾虛瀉利氣刺氣症中酒吐酒冷痰癰胃霍亂吐瀉並皆治療

資術子

炒

麥糵

炒百刀

丁香皮

三陌三

縮砂仁

各二斤

藿香

梗各二斤

甘松

各二斤

肉桂

去蘇皮  
各二斤

甘草

炒

陳皮

各二百五十刀

右為末煉蜜為圓如彈子大每服一粒鹽酒鹽湯嚼下婦人脾血氣如經月水不調並用炒薑酒爵下醋湯亦得大有神效忌生冷肥膩等物

能溫中快膈化積和氣治中酒吐酒嘔逆蘇酸氣  
雜飲食不下冷涎齶胃口渴遠年茶酒食後腹脹

僵黃赤白痢疾脾毒泄婦人脾血氣小兒痘氣並宜服之

甘松炒八十兩 益智仁炒六兩 香附子炒去毛 丁香皮

甘草

炒去毛一拾兩 蓬莪木根葉縮砂仁各二十兩

右爲末水浸蒸餅爲圓如豆大每服或拾圓溫酒薑湯熟水任下或氣脹滿磨烏藥水煎湯下或酒食過度頭疼惡心背膈痛先嚼貳拾圓後吞或拾圓生薑紫蘇湯下此藥性

溫平不動臟腑

連翹洗 治男子婦人脾胃不和氣滯積聚心腹脹滿乾嘔醋心飲食不下背膈噎塞脇肋疼痛酒積面黃四肢虛腫行步不能但是脾胃諸疾並宜服之

連翹洗

陳皮各一錢 伯青皮洗

蓬莪木炮

肉桂

去龜皮不見火

好墨

煅壹帖

檳榔

搗拾兩

牽牛子

張取末二

二棱

炮九兩

肉豆蔻

二十兩

右爲末麪糊爲圓如梧桐子大每服參拾圓生薑湯下久患赤白痢及大腸風秘脾毒瀉血黃連煎湯下婦人諸疾薑醋湯下不拘時孕婦莫服

酒瀉治飲酒過度頭旋惡心嘔吐不上及酒積停於胃間遇飲即吐久而成癖

雄黃

焯如壁箇卓英子大

巴豆

不出油

蝎梢各拾伍箇

右參味同研細入白麵秤重伍兩半滴水和如豌豆大候稍乾入麸內炒香將釐粒放水中如藥粒浮於水上即去麸不用每服貳粒溫酒下食後服尋常傷酒每服壹粒茶酒任下分氣紫蘇治男子婦人脾胃不和胃膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急心下脹悶飲食可思嘔逆不止

五味子

洗大梗

桑白皮

炙剉

陳皮

去白

桔梗

剉

草果仁

大腹皮

甘草

各三錢

右捌味㕮咀爲末秤貳拾斤淨入揀嫩枝葉乾紫蘇拾伍斤撲碎同壹處拌勻每服肆錢水壹大盞薑錢參片入鹽少

許同煎至半分去滓空心食前常服和胃進食

治大人小兒脾氣不順補虛進食

白茯苓去皮兩人參去芦去皮兩

訶子根去核半兩

白术肆兩

右爲末每壹大錢水壹盞薑叁片棗壹箇煎陸分空心溫服  
治脾經虛冷胃脘寒痰脅膈噎痞口淡舌澀心腹

撮痛嘔逆宿水勝下疼喘喘滿氣急倦怠少力全不思食常

服寬胸膈散滯氣消停寒美飲食

縮砂仁一十粒

香附兩

甘松五兩

丁香半兩

蓬莪术

壹十

木香二兩半

右爲細末別用甘草熬膏爲圓每兩作貳伯伍拾圓捏作餅  
子每服叁伍餅子細嚼生薑湯下溫酒亦得不拘時候

草果治脾寒瘧疾

紫蘇葉

草果仁

川芎

白芷

高良薑炒

青橘皮

白甘草炒

右等分爲末每服貳大錢水壹盞煎至柒分去滓熱服貳滓  
并煎當發日連進叁服無不效驗

溫中止嘔逆溫脾胃順二焦治寒痰聚結氣壅不通食即輒  
吐因鬲噎悶兩脇肋疔刺嘔吐噦逆噫醋惡心中痛短氣噎  
闊食臭及療留飲腸鳴濕泄冷瀉注下不正常服建脾胃美  
飲食辟寒邪養正氣

高良薑聯斤乾薑炮

白术略

肉桂

桂皮十八兩

右爲細末煉蜜爲圓每壹兩作壹拾貳圓每服壹圓細嚼生  
薑橘皮湯米飲亦得空心食前

豐澤園治本臟虛飲食不化或成痃癖或發心痛冷積水脾  
結聚疼痛一切冷氣等疾

附子

硝砂

木香

生薑

右用大附子伍拾箇各重半兩者去皮脐以尖刀子剝去心

子約容硝砂半錢实之却以附子末和麪作餅子裹附子用文武火煨令黃用木香如附子之半同爲細末以水爲圓如雞頭大復以生薑壳塊擘作兩片以藥在內溫紙裹令煨候薑熟白湯嚼下空心服

白朮治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞噯心忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳嗽此藥中和不熱久服養氣育神醒脾脫色順正辟邪

蓮子肉去皮薏苡仁

縮砂仁

桔梗

炒令深黃色各一斤

白扁豆姜汁浸半斤

白茯苓

人參

去芦各一斤

甘草炒

白朮

山藥

各二斤

右爲細末每服貳錢棗湯調下小兒量歲數加減服

紅薑治丈夫脾積氣滯脅膈滿悶面黃腹脹四肢無力酒積不食乾嘔不止背胛連心脣及兩乳痛婦人脾血積氣諸般血癆氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急不嗜飲食漸成脾勞不拘老少並宜服之

荆三稜浸軟切片

蓬莪米

青橘皮

陳皮去白各伍片

乾薑炮

胡椒各叁斤

右爲細末每服貳錢麪糊爲圓如梧桐子大礬紅爲衣每服參拾粒食後薑湯下小兒臨時加減與服

紫蘇治男女虛陽上攻氣不升降上盛下虛膈壅瘀多咽喉不利欬嗽虛煩引飲頭目昏眩腰痠腳弱肢體倦怠腹肚癆刺冷熱氣瀉大便風秘澀滯不通肢體浮腫有妨飲食

前胡去芦

厚朴去粗皮姜汁拌炒各半兩

肉桂去皮各一斤

右爲細末每服貳大錢水壳錢半入坐薑貳片棗子壳箇蘇伍葉同煎至捌分去滓熱服不拘時候常服清神順氣和五藏行滯氣進飲食去溫氣

治遠年日近脾疼鬱胃口吐酸水寒邪之氣留滯於

內停積不消，腎陽脹滿，攻束腰肌，惡心嘔逆，面黃肌瘦，四肢倦怠。又治婦人血氣刺痛，小腹連腰攻疰，重痛並能治之。

玄胡索

去皮

良薑

炒

乾薑

炮

茴香

炒

肉桂

各伍兩

牡蠣

煅性兩

甘草

炒拾兩

右爲細末，每服貳錢，熱酒調下。婦人淡醋湯調服，如不飲酒者，用鹽湯點下，並不拘時。

心氣飲 治男子婦人一切氣不和，多因憂愁思慮，怒氣傷神，或臨食憂懼，或事不隨意，使鬱抑之氣留滯不散，停於胃膈之間，不能流暢，致心胃痞悶，腸肋虛張，噎塞不通，噫氣吞酸，嘔噦，瘦或大腸虛秘，或因病之後，胃膈虛痞，不思飲食，並皆治之。

木香

不見火

桑白皮

各半兩

丁香皮

壹兩

大腹皮

灸

桔梗

去芦炒

麥門冬

子去心

草果仁

壹兩

大腹子

厚朴

去皮姜汁製

白术

人參

剉各半兩

香附子

炒去毛

紫蘇

去梗

陳皮

去白

藿香

各壹兩

甘草

炙兩

右㕮咀，每服二錢，水一盞，入生薑三片，棗子一枚，擘破去核，及灯心一粒，煎至茶分，去滓，溫服，不拘時候。

又方見後

奪命丹

散

治男子婦人脾胃積冷，中焦不和，心下虛痞，腹

中疼痛，嘔逆滿噎，塞不通，嘔吐冷痰，飲食不下，噫氣吞酸

舌無味

不思飲食。婦人久患血氣刺痛，不可忍者。

乾薑

割入巴豆半兩同炒

良薑

入班貓壹個同炒即去

各半兩

石菖蒲

不見火

糯米

式拾伍兩

右製淨爲細末，每服貳錢，用鹽少許，沸湯點不拘時，常服醒脾胃，進飲食。此藥大解酒毒，空心食前服，或溫酒調尤佳。

金匱圓

依林巢先生方，大半七年内正元覽淮

治腹內積聚癰塊，久患大如盆

及黃瘦宿水，朝暮咳嗽，積年冷氣時復腹下盤痛，絞結衝心，及兩脇徹背，連心痛，氣不息，氣違脣下，狀如蟲咬，不可忍，又治十種水氣反胃，吐食，嘔逆，飲食多噎，五般痔瘡，腹氣走注。

風有似蟲行手足煩熱夜卧不安輕語無度又冷小兒驚疳  
婦人五邪夢與鬼交沉重不思飲食昏昏如夢不曉人事欲  
死懼多或歌或哭不定月候不調心中如狂身體羸瘦莫辨  
其狀但服此藥萬無失一是病皆瘳更不細述

生乾地黃

炮具母去心

桂心

不見火

人參

洗去芦剉焙

紫苑

洗去苗剉焙

柴胡

去芦剉焙

乾薑

炮

枳殼

湯浸去殼炒

蜀椒

去目炒出汗

桔梗

洗去芦剉焙

厚朴

去皮剉

甘草

炙

芩芻

洗去芦剉焙

甘松

米泔浸一宿

菖蒲

米泔浸

白芍

米泔浸

烏頭

炮

吳茱萸

湯浸七遍

黃連

洗剉焙各半兩

巴豆

去心腹用醋煮三十沸研取壳兩分

大油

熬時須熟自數三十沸便傾出

草烏頭

炮

乾若沸過則乘无力

用甘遂

右爲細末以麪糊圓如梧桐子大每服伍圓小兒兩圓心中痰患癰瘍下心痛酸石榴皮湯下口瘡蜜湯下頭痛石膏湯葱茶下一切脾氣橘皮湯下水鴟氣鴟陳皮飲下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下胃膈噎悶通草湯下婦人血氣當歸酒下如不飲酒當歸煎湯下亦得疝氣嵐氣小腸氣及下墜附子湯下常服及應急諸般疾患只米飲茶酒熟水任下傷冷腹痛酒食所傷酒疸黃疸結氣痞塞鵝膝並用盐湯蓋酒下

治男子婦人上熱下虛之疾凡飲食過度致傷脾胃色無節耗損腎元水土交攻陰陽關閘遂使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆脣不快咽喉乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大便祕經裏急後重臍腹冷痛治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不差宜先服此藥却以所主藥治之無不效者

桑白皮

炒

骨碌

補炒去毛

草果仁

去皮剉

五加皮

酒浸半日炒

甘草

炒

枳殼

去核炒

陳皮

炒去白

紫胡

去芦

地骨皮

剉

甘草

各半兩

右爲麗散和勻再就蒸捲伏時臘乾每服貳錢紫蘇參葉姜  
錢參片水毫絨同前至柒分食後通口服常服調順榮衛通  
利三焦開禹化痰和五藏。痰嗽加半夏麴煎心肺虛加人  
參茯苓煎上膈熱加北豆蔻煎下部大段虛加少許炮附子  
煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸煎

木香

甘松

洗去泥甘草

降兩

蓬莪木

根兩

右爲細末水糊爲圓每服貳拾粒煎生薑橘皮湯下不計時  
心胃虛弱人最宜服常服寬中順氣進食

良薑

油炒

茴香炒

甘草

炙兩半

蒼朮

米泔浸壹宿

或熱酒

調下亦得

如脾寒用酒毫絨煎臨發時連進叁服兼

治四方之人不伏水土小兒臟寒脫肛並用薑參片棗毫絨去核  
煎服冒暑伏熱擦生薑冷水調下若行路早起棗毫絨去核  
包藥少許同生薑參片嚼下能辟四時非節疫癟砂瘡等瘻

嘔吐惡心不思飲食及療婦人血氣攻刺腹脹擗痛服之立効

亦考藥

乾薑

油各半

良薑油炒

甘草

炙兩半

或熱酒

調下亦得

如脾寒用酒毫絨煎臨發時連進叁服兼

治脾胃虛弱久寒積冷心氣脾痛冷痰翻胃脣腹刺痛  
腹刺痛腸脹腹脹嘔吐痰水噫氣吞酸中酒吐酒噦逆惡心  
頭痛煩渴倦怠嗜卧不思飲食

陳皮

去白

神曲

炒各半

草果

煨去皮半

夏麵

炒各半

甘草

炙兩半

丁皮

木香

白芍

各柒錢半

乾薑

炮兩

錢半

右爲細末每服壹錢鹽湯點服不拘時候常服溫平破瘀明  
胃建脾消酒進食

治脾胃不和心胸痞悶脇肋腹脹口苦無味嘔吐  
惡心可思飲食面色萎黃腸虛首利肌體瘦弱肺氣翻胃

白术

麸炒

甘草

炙兩

右爲細末每服或錢水壹盞煎至捌分空心食前服或沸湯  
點服亦得常服育神溫胃逐湿消痰不以四時並宜服之  
**鹽煎丸** 治男子婦人一切冷氣攻衝背腰及前後心連背督疼  
痛轉項拘急或脾胃虛冷不思飲食時發嘔吐霍亂轉筋臍腹  
冷疼泄瀉不止及膀胱成陣刺痛小腸氣吊內外腎疼又治婦  
人血氣刺痛血積血瘕繞脅撮痛並皆治之

草果仁

去皮

縮砂

取仁去殼

檳榔

炮剉

厚朴

去麌皮

肉豆蔻

煨

羌活

去芦

蒼朮

米泔浸宿

陳皮

去白

草蔻仁

去皮

枳殼

去殼

良薑

雨炒

菝葜

去皮

大麥芽

炒

茴香

炒

川芎

洗剉

甘草

鹽炙兩

右件碾爲細末每服貳錢水壹盞半入鹽壹字同煎至捌分

空心食前服之

神仙沉鬱圓

治一切氣痛不可忍者

要合

沒藥

研

血竭

研

沉香

剉

甘草

半兩

辰砂

各壹兩

木香

半兩

甘草

半兩

右爲末葵甘草爲膏搜和每服壹圓用薑鹽湯嚼下血氣醋  
湯下松滋令萬君擬寶此藥婦人產後血痛氣痛不可忍者  
只毫圓立愈萬君神祕之每有人病止指與半圓往往亦獲  
神效不可盡述

治脾胃不和飲食減少氣虛而復嘔逆霍亂吐瀉  
胃痺心痛逆氣短氣中滿虛痞膈塞不通或大病瘥後胃中有  
寒時加咳唾並宜服之

人參

甘草炒

乾薑炮

白术

青皮

陳皮

各一錢去白

右爲龜末每服參錢水壹盞半煎至毫中蓋去滓稍熱服空心食前或霍亂後氣虛未禁熱藥者尤宜服之

欲絕心鬲高起實痛作痛手不得近

枳實

去皮兩

白术

人參

去芦

甘草

炙多

白茯苓

去皮乾薑炮

各一錢

右擣羅爲細末煉蜜爲圓如雞子黃大每服壹圓熱湯化下連進貳參服肯中豁然不拘時候

治脾胃虛冷不思飲食及久病人脾虛全不食者只壹貳服頓覺能食

青橘皮

去穰陳橘皮

去白

高良薑

炮切肉桂

去龜皮

甘草

炙各一錢分

草果肉

川烏頭

炮各一錢

各一箇

訶子

煨去甘

右爲細末

每服貳錢水毫大盞生薑五片煎至七分

食前服

治一切冷氣攻衝心腹脇肋脹滿噫醋吞酸冒膈噎塞飲食減少常服隊氣和脾胃

川白薑

炒半

夏麴

白茯苓

附子炮熟去皮

訶子肉

乾山藥

沉香

白术

煨

木香

人參

去芦各一錢半

丁香

半兩

甘草

炮一錢

右爲細末每服貳大錢水壹中盞生薑叁片棗叁枚木瓜壹

片煎柒分食前服

治脾藏伏冷胃脘受寒嘔吐鬲痞心腹刺痛痰逆惡心寒嗽中滿藏腑虛滑飲食減少翻胃吐逆四肢逆冷但是沉寒痼冷無問久新功效不可具述

丁香

不見火

紅豆

去皮

青皮

去白

甘草

炙多

川烏

炮

去皮

陳皮

去白

乾薑

炮

良薑

炮去芦頭

益智

去皮

伍兩半

胡椒

去白

右件剉爲龜散每服貳錢水毫盞生薑叁片鹽毫捻煎至七

分量心食前稍熱服滓再煎病退即止極妙

治男子女人陰陽不和藏腑虛弱中脘氣滯宿寒  
留飲停積不消胃膈脹滿心脾引痛攻刺腹脇有妨飲食又  
治中酒吐酒停飲浸漬嘔逆惡心噫氣吞酸並皆治之

香附子剉去赤方藥

天台烏去末

良薑去芦用麻油炒

肉桂去皮各乙兩

甘草炙半兩

右爲細末每服貳錢入鹽少許用沸湯點服不拘時候

鹽圓<sup>一</sup>養脾溫胃去冷消痰大治心脾疼寬胃下氣進美飲

食療一切冷物所傷並皆治之

乾薑炮

良薑去芦頭

右件等分爲細末麪糊爲圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳  
拾圓食後橘皮湯下妊娠婦人不宜服

薑合圓<sup>一</sup>治男子婦人氣血虛弱久積陰冷留滯不化結聚成形  
心腹膨脹刺痛成陣上連胃脇或脾胃久虛內傷冷物壯鴉注  
下腹痛腸鳴或久痢純白時下青黑腸滑不禁又治胃脘停痰  
嘔吐吞酸痞塞不通可思飲食身體沉重面色癥黃或久患心  
脾痛服之永除根本

丁香不見火木香不見火人參各乙兩白术

炮

青皮去白

陳皮各乙兩

炮

附子炮去皮半厚朴

姜汁炙

肉豆蔻炮各乾薑

參兩

右件爲細末入硝砂捌碎薑汁麪打糊爲圓每壹兩作貳拾  
圓每服壹圓用老薑壹塊如拇指頭大切開作合子安藥於  
內用濕紙裹慢火煨壹頓飯久取出去紙和薑細嚼白湯送  
下孕婦不得服小兒壹粒分肆服老人小兒內有傷積服之  
無不神驗此藥不損臟腑

順氣水香散<sup>一</sup>治氣不升降嘔逆惡心胃膈痞悶脇肋脹滿及酒  
食所傷噫氣吞酸心脾刺痛大便不調面黃肌瘦可思飲食兼  
之血氣刺痛及一切冷氣並皆治之

丁皮 不見火 縮砂仁

良薑去芦

肉桂去龐皮

乾薑炮

甘草燼

陳皮去白

厚朴去龐皮

蒼朮米泔浸

桔梗去芦

茴香各三兩

右爲細末每服貳錢水壹盞薑參片棗貳枚煎至捌分稍熱服不拘時或入鹽少許沸湯點服常服寬中順氣和胃進食治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹脹滿嘔吐酸水脾疼泄瀉臟腑不調飲食減少應男子女人一切氣疾並宜服之

香附子炒去毛

陳皮去白

肉桂去龐皮

良薑去芦

青皮去白

甘草燼

茴香炒

蒼朮米泔浸

桔梗去芦

甘草燼

茴香炒

蒼朮米泔浸

右件搗爲細末每服貳錢入鹽少許沸湯點服或鹽酒調下

不拘時候常服溫脾胃進飲食

右件搗爲細末每服貳錢入鹽少許沸湯點服或鹽酒調下  
治一切氣疾心腹脹滿胃膈噎塞噫氣吞酸胃中痰逆  
嘔吐及宿酒不解可思飲食

縮砂仁搗兩

香附子炒去毛

甘草燼

蒼朮米泔浸

右爲細末每服壹錢用鹽湯點下常服快氣美食溫養脾胃  
或剉爲粗末入生薑同煎名小降氣湯

右件治脾胃虛弱久有傷滯中脘氣痞心腹膨脹脇下堅硬  
胃中痞塞噎氣不通嘔吐痰水可思飲食或心腹引痛氣刺氣  
急及癆食癥酒癭血瘕氣塊時發疼痛嘔噦酸水面黃肌瘦精  
神困倦四肢少力又治女人血氣不調小腹疼痛並皆治之  
豬胰乙具京三棱蓬莪木

已上貳味同猪胰入硝砂熬膏

末各四兩

透切磨爲

川練子去核山藥

檳榔

枳殼去稜炒

茴香炒

附子炮去皮

硝砂半兩

右件碾細莪术末入猪胰硝砂膏同醋糊爲圓如梧桐子大  
每服拾圓至拾伍圓生薑湯下婦人淡醋湯下不計時候

量虛實加減常服順氣寬中消積滲化痰飲

**金匱** 理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腹中疼痛或飲酒過多脣脢逆滿嘔塞不通亥刻無時嘔吐冷痰飲食不下憲醋吞酸口苦失味怠嗜嗜臥不思飲食又治傷寒時氣 外熱霍亂吐利心腹絞疼手足不和身熱不渴腸鳴自利米穀不化

**乾薑炮**

**甘草** 檏

**荳米** 米泔浸桔梗去芦

右件各等分剉爲細末煉蜜爲圓如彈子大每服壹圓食前沸湯嚼下又治脾胃留濕體重節痛面色萎黃肌肉消瘦常服溫脾暖胃消痰逐飲順三焦進美飲食辟風寒濕冷

**集香圓** 治一切氣疾胃膈痛悶脇肋脹滿心腹疼痛噫氣吞酸

嘔逆惡心可思飲食或因酒過傷脾胃不和並皆治之

**白豆蔻仁** 納砂仁

**不香不見火薑黃** 各肆兩

**丁香**

不見火  
陸內  
香附子  
炒去毛  
四兩刪錢

**麝香**

研  
刪錢

**甘草**

拾陸兩  
各肆兩  
入藥  
拾肆兩  
橘升前  
膏

右件除研藥碾爲細末入麝香拌勻用甘草膏搜和爲圓如梧桐子大每服壹圓細嚼嚥津不拘時候常服寬中順氣消宿酒進飲食磨積滯去癥塊

**異香散** 治腎氣不和腹脹脹痛悶嘔塞滿不快飲食難化噫吞酸一切氣痞腹中刺痛此藥能破癰瘕結聚大消宿冷沉積常服調五臟三焦和胃進食

**石蓮肉**

去皮  
破達義木  
櫟

**京三棱炮**

**益智仁** 炮

**甘草**

炒  
各陸兩  
青皮  
去白

**陳皮**

去白  
各參兩  
厚朴  
去皮  
姜  
茱萸  
兩

右件爲細末每服貳錢水壹盞生薑參片棗壹箇鹽壹捻煎至柒分通口服不計時候盐湯點或盐酒調皆可服

**內豆蔻圓** 治氣瀉脾胃氣虛弱飲食減少

**诃黎勒皮**

**龍骨**

**木香** 各參分

**丁香** 參兩

**肉豆蔻仁**

**縮砂仁** 各乙兩

**赤石脂**

**白礬灰** 各半兩

右件藥搗羅爲末粟米飲和搜圓如梧桐子大每服貳拾圓

米飲下不計時候

白段散治酒食所傷胃膈不快腹脇脹滿嘔吐酸水翻胃脾疼及食積氣塊攻刺腹脇不思飲食日漸羸瘦又治年高氣弱三焦堵塞常覺妨悶並宜服之

蓬莪术

煅

益智仁

京三棱

燬切

青皮

去白

白茯苓

炮四兩

甘草

燬參兩

右爲細末每服貳錢用水壹大盞棗壹枚擘破鹽少許同煎至半盞溫服不拘時候常服實胃利膈消酒食和胃

如神圓治一切冷熱氣消癆氣和脾胃補下元

天南星

炮

羌活

白芷

甘草

京三棱

燬浸

乾薑

附子

炮去

半夏

湯洗貳茶過姜汁炒令乾

右等分爲末醋煮麪糊圓如梧桐子大每服空心生姜鹽湯下貳拾圓至參拾圓患瀉二宜湯下參拾圓小兒赤痢甘草橘皮湯下參圓至伍圓量覓大小加減與服白痢乾姜湯下

丁香

木香各半兩

阜英

參一大枝

青橘皮

洗乙兩

義木參兩

四兩

三棱貳兩

高良薑

巴上同用米醋乙升於蜜瓶內煮

乾義木三

接足姜並乘熱或兩切碎同燒乾

右入百草霜參匙同碾爲細末麪糊爲圓如麻仁大每服伍圓茶圓至拾伍貳拾圓止食傷隨物下脾積氣陳楠皮湯下口吐酸水淡薑湯下齶吐藿香甘草湯下丈夫小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下嘔逆葛蒲湯下小兒疳氣史君子湯下更量虛实加減如欲宣轉可加圓數五更初冷茶清下利參伍行後以白粥補之孕婦不得服

分心氣飲治證與前分心氣飲同

木通

金節

赤芍藥

赤茯苓

肉桂

去龜皮

半夏湯

燒

桑白皮

微炒

大腹皮

陳皮

去蕊

青皮去白

甘草炙

羌活

各乙兩 紫蘇去粗便而兩

右為龜末每服三錢水壹盞生姜三片棗貳箇燈心伍莖同煎至柒分去滓溫服不拘時候常服消化滯氣升降陰陽調順三焦和脾進食

大黃酒浸治證與前木香分氣圓同

木香

丁皮

香附子

炒去蓬義木根毛

縮砂仁

甘草

各四兩

藿香葉

川薑黃

檀香

甘松

洗各乙兩

右拾味乾不見火搘羅為細末稀糊為圓如梧桐子大每服甚拾圓至參十圓生姜橘皮湯吞下不計時候脾胃虛弱人最宜服之常服寬中順氣進飲食

治一切氣逆胃膈噎悶偏脹脹滿又治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣

沉香

胡椒

各乙兩

木香

縮砂去穀

桂心

去龜皮二兩

丁皮

乾薑炮

蓬茂

茴香

炒

青皮

去白

陳皮

去穰炒

甘草

各四兩

右為細末每服貳錢薑蘇益湯調下婦人淡醋湯下  
治中脘不快心腹脹滿陰陽壅滯氣不升降胃膈噎塞喘促短氣乾噫煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜臥減食宿寒留飲停積不消脇下支結常覺妨悶專治脚氣上衝心腹堅痛肢體浮腫有妨飲食

紫蘇葉去梗厚朴

去龜皮

肉桂

去龜皮

半夏

湯洗七次去滑

川當歸

去芦

前胡

去芦洗

甘草

燉

各三兩

陳皮

去白三兩半

右爲㕮咀每服貳錢至參錢水壹大盞生薑叁片煎至柒分去滓溫服不拘時候常服消痰飲散滯氣進飲食

金匱要略治脾胃虛弱停寒留飲膈氣噎塞反胃吐食心胃痞滿脇肋虛脹胃脰刺痛牽引背膂食少多傷言微氣短口苦舌澀惡心嘔噦喜唾酸臭病泄痢腸胃虛滑或大病氣不

復常飲食無味形容憔悴酒後多痰並宜服之

枳殼

神麴

陳皮去白

麥蘖少

茴香

白薑炮

縮砂去皮

肉豆蔻

三棱炮

茯苓去皮

良薑

薏苡仁

益智去殼

胡椒

木香

白扁豆炒

丁香

白朮

紅豆

藿香去梗

蓬木炮

苦梗炒

人參

甘草炙

右各等分爲末煉蜜爲圓如彈子大每服壹粒細嚼白湯送下溫酒亦得空心食前常服養益脾胃大進飲食  
治男子婦人脾胃虛冷攻築心腹連脇肋刺痛背膈痞悶背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癰瘍塊硬帶下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止腰腹疼痛應一切虛冷不思飲食並宜服之

延胡索

三兩

蒼术

泔浸乙宿去皮

甘草

半斤

茯苓

白者去皮

蓬木

二棱

根

青皮

去白

丁皮

縮砂

去皮

檳榔

宿四兩

肉桂

去龜皮

乾薑

炮

各二兩

右搗羅爲末每服貳錢水壹盞連根葱白壹莖煎茶分空心

食前稍熱服

治男子婦人脾氣停滯風濕客搏脾經受濕氣不流行致頭面虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急腹脹如鼓繞脅脹悶有妨飲食上攻下疰來去不定舉動喘乏並皆治之

五加皮

各尋分

地骨皮

生薑皮

大腹皮

右爲龜木每服參錢水壹盞半煎至捌分去滓稍熱服之不

拘時候切忌生冷油腻堅硬等物

治榮衛氣虛藏附怯弱心腹脹滿全不思食腸鳴泄

右爲龜木每服參錢水壹盞半煎至捌分去滓稍熱服之不

瀉嘔噦吐逆太宜服之

人參

去芦

甘草

炙

茯苓

去皮

白朮

各等分

右爲細末每服貳錢水壹盞煎至柒分通口服不拘時入鹽少許白湯點亦得常服溫和脾胃進益飲食辟寒小瘴霧氣

鹽煎散治證與前鹽煎散同

良薑

炒

蒼术

去皮名

縮砂

去皮各一兩

茴香

炒

各伍兩

肉桂

去龜皮不見火

丁皮

各貳兩

橘紅

拾兩

甘草

炒

陸兩

青皮

去白

山藥

半斤

右細末每服貳錢水壹盞半入鹽壹字煎至捌分空心食前  
鹽煎圓治脾胃虛弱胃鬲痞悶脇肋脹滿心腹刺痛反胃  
吐食口苦吞酸脣滿短氣肢體怠墮面色萎黃及中焦痞不任  
攻擊藏腑虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常稟受怯弱不  
能飲食及久病泄痢腸胃虛滑並宜服之

人參

白朮

茯苓

去皮

肉桂

去龜皮

各三兩

縮砂

去皮

乾薑

胡椒

麥蘖

微炒

神曲

山藥

白扁豆

炒

右件等分爲末煉蜜爲圓如彈子大每服壹圓細嚼白湯送  
下溫酒亦得空心食前常服育神養氣和補脾胃進美飲食  
人參丁香散治大人小兒嘔吐不已粥飲湯藥不下凡嘔吐之  
病皆因三焦不調脾胃虛弱火熱失和邪正相干清濁不分陰  
陽錯亂停痰留飲不能運化胃鬲痞滿脣逆惡心腹脇脹痛短  
氣噎膈欬嘔痰水噫醋吞酸不思飲食漸至羸瘦及療女人妊娠  
阻病心中煩憤頭目眩重憎聞食氣嘔吐煩悶顛倒不安四肢  
困弱不自勝持多卧少起又治久病羸弱脾胃虛極中滿嘔  
逆全不入食並宜服之

白芍藥

半斤

當歸

去蘆

丁香

各二兩

肉桂

去龜皮

蓬木

人參

各貳兩

乾薑

炮

桃芩

去皮

香附

炒

白朮

甘草

炒

山藥各肆兩

右爲細末每服伍錢水盞蓋生薑參片同煎至柒分空心食前溫服小兒貳歲可服半錢水伍分盞生薑壹片同煎肆分已下溫服更宜量歲數加減與之常服和脾胃進飲食  
飲停積不消或因飲冷過度內傷脾氣嘔吐痰逆寒熱往來或時汗出又治腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴腸肋虛滿兼療傷寒陰盛四肢逆冷

人參肆兩

青皮去白 拾貳兩

甘草炙 恰兩

乾薑炮 陸兩

三稜煨 拾貳兩

芍藥壹斤

丁皮陸兩

茯苓去皮

蒼木

去皮 各半斤

右爲末每服貳錢水盞蓋生薑伍片棗參箇同煎至柒分食前空心溫服

葛根去皮 一斤 治脾胃不和可思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胃滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜臍體重節痛常多利或雜亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之

陳橘皮去白 厚朴去龐皮薑製炒香

甘草剉炒 各半斤

生薑

紅棗各半斤

蒼朮

去龐皮米泔浸一日炒 伍斤

右件剉碎拌勻以水浸過面上半寸許煮令水乾取出焙燥碾爲細末每服貳錢用鹽湯點空心食前常服調氣暖胃化宿食消瘀飲辟風寒冷濕四時非節之氣

周氏異方火腿圓與和劑方大不同但用修製須如法分兩最要勿停止是緩化不可偏勝此藥積滯不動臟腑其功用妙處在用藥之多切不可減常服健脾進食永無寒熱瀉痢之疾蓋消磨積滯以漸自然無疾遇酒食醉飽尤宜多服神效不可述

蟬蠅真者

巴豆百粒去皮研爲粉用紙數重裹槌油

透再易紙至油盡成白霜爲妙

乳香割研

杏仁柴枝去皮尖研

去皮尖研

丁香懷乾

右爲丸末每服參錢水壹盞半煎至捌分去滓食後溫服

順氣寬中治脅膈不塞心腹刺痛脇肋脹滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣疾並皆治之

木香不去火青皮不去白薑黃各參斤甘草剝炒蓬木剝洗鹽炒拾壹斤

右爲末每服壹錢沸湯點服不計時候

治脾胃不和中寒上氣脇肋脹滿心腹疼痛逆惡心或時嘔吐飲食減少十腮五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味並皆主之

白朮貳兩香附炒人參縮砂仁各壹兩

丁香炙麥蘖肉豆蔻白朮蔻

木香青皮各半兩甘草壹斤四半半夏湯泡半兩

藿香厚朴薑炒各半兩神曲炒草果各半兩

沉香陳皮各柒錢

右父咀每肆錢水貳大盞薑參片棗壹箇煎捌分去滓熱服

麝香含香圓方與木香流氣飲方同但無菖蒲藿香有沉

香枳殼大黃沉香陸沉枳殼去殼炒沙毒研大黃

枳殼麸炒郁李仁去皮皂角去皮半夏炒檳榔

右爲細末別用皂角肆兩用漿水壹碗搘揉敷膏更入熟蜜

少許和圓如梧桐子大每服伍拾圓食後溫生薑湯下

# 太立惠民和劑局方卷四

## 治痰飲

附

嗽嗽

治五飲酒癖一曰留飲停水在心下二曰癖飲水癖在兩脇下三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈上五藏間五曰流飲水在腸間動盪有聲皆由飲酒冒寒或飲水過多所致此藥並治之

乾薑

炮

肉桂

去皮

白朮

一斤

右參味搗篩蜜和圓如梧桐子大每服貳拾圓溫米飲下加至參拾圓食前服日貳服

治酒癖停飲痰水不消滿逆嘔吐目暗耳聾鼻癆腹痛腹中水聲

枳實

炒半兩

茱萸

去皮

乾薑

炮

各三兩

白朮

八兩

右同爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服伍拾圓溫米飲下不計時候

治風痰吐逆頭痛目眩脣煩滿飲食不入及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星

生

半夏

生

乙丙

天麻

半兩

頭白麪

三兩

右爲細末滴水爲圓如梧桐子大每服叁拾丸用水壹大盞先煎令沸下藥煮伍七沸候藥浮即熟漉出放溫別用生姜湯下不計時候服

治風化痰安神定志利咽膈清頭目止咳嗽除煩悶

白礬

枯過別

辰砂

飛研

各半兩

南星

炮

乙丙

半夏

洗七次姜汁

搗作丸

二兩

右以白礬半夏炮天南星爲末合和勻用生薑汁煮麪糊圓如梧桐子大別用朱砂末爲衣每服捨圓生薑湯下食後服亦治小兒風壅痰嗽壹歲兒服壹圓搗碎用生姜薄荷湯下

治痰熱安神除頭痛眩運心忪恍惚脣爛腮

滌唾稠黏亦實效嗽咽醫八利

阜英仁炒

天竺黃

白礬

光明者放石錢器內熬汁盡放冷研

半夏

湯洗七次用生姜或兩洗刮去皮同搗細作餅子炙微黃

四兩

生白龍腦半兩

辰砂

研飛去末

金精丸

貢拾片

右以半夏阜英子仁爲末與諸藥同拌研勻生薑汁煮麪爲糊爲圓如梧子大每十圓至十五圓生姜湯下食後臨卧服右合研以白麪糊爲圓如梧桐子大每服十圓溫生姜湯下食後臨卧服每服參拾圓亦得

治風壅痰火涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱  
神思昏憒心忪面熱痰壅稠黏

人參

上盧

乾薄荷葉

白茯苓去皮

白礬

南星

米泔浸乙升附磨乾各三十兩

半夏

湯洗七次爲末生姜汁搗和作餅六十四兩

右爲末用生姜汁煮麪糊和圓如梧桐子大每服三拾圓生姜湯下食後如痰盛躁熱薄荷湯下

治痰火除痰下氣治胃腸脹滿寒熱嘔噦心下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

桔梗

紅炒微炒

半夏

湯洗七次姜汁製陳皮去穰各一兩枳實炒赤黃

右爲末每服貳錢水壹中盞入生姜伍片同煎至七分去滓溫服不計時候

胡椒根治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘急逆氣虛痞胃膈噫膈腹脹痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水不止  
款冬花

去梗胡椒

甘草

炙

草梢

白朮

伍兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫湯下溫酒米飲亦得不拘寸候日二服

曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒氣不宣通所致無問久新輕重以至食飲不下語聲不出坐卧不安晝夜不止面目浮腫肩脇引痛並宜服之

肉桂

去龜皮

乾薑

阜英

去皮子炙黃各等分

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服拾伍圓溫酒下米飲亦得食後服

傳信方每錢下三兩蜜煎服日三五次禁葱薑油膾吃法更妙

大圓茶圓治肺虛客熱咳嗽氣急骨中煩憊肢體倦疲咽乾口燥渴欲引冷多唾涎沫或有鮮血肌瘦發熱減食嗜卧又治或因呼怒或即房勞肺胃致傷吐血嘔血並宜服之

麥門冬

去心丹參

貝母

炒

防風

去蘆頭頭

乾山藥

柏子仁

茯神

去木

杜仲

去龜皮炒

百部根

各半兩

五味子

各壹兩

人參

各壹分

右爲細末煉蜜和

好兩作貳拾肆圓每服壹圓水壹中盞煎至半分和滓溫服少少頻呷不拘時候

百部圓治肺氣不調咳嗽喘急骨膈煩悶脣乾口燥面目浮腫咽喉不利積久不差咯唾濃血者亦宜服之

天門冬

去心壹斤

杏仁

去皮尖

黃芪

百部根

各陸兩

萸囊根

拾陸兩

紫蘇

肉桂

去龜皮

右同爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服拾伍圓煎烏梅甘草湯溫下食後服

感以治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿冒膈煩悶癥實汗盛喉中呴呷鼻塞清涕頭痛眩冒肢體倦疼咽喉腫痛

款冬花

去梗

知母

桑葉

洗燒

各拾兩

半夏

湯洗赤鹽

甘草

去心拾兩

麻黃

去根節

阿膠

碎炒

如杏仁

去皮尖數炒

貝母

去心數炒

冬瓜子

拾兩

阿膠

碎炒

杏仁

去皮尖數炒

右爲龜末每服貳錢水一盞入生薑參片同煎至七分去滓食後溫服

治肺氣不足咳嗽上氣嘔瀉上迫喉咽閉塞短氣喘乏連唾不已寒從背起口中如含霜雪語無音聲甚者唾血腥臭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛痺面白色白

鍾乳

碎如米粒

桑白皮

麥門冬

去心

白石英

碎如米粒

人參

去蘆

五味子

揀

款冬花

去梗

肉桂

去蘆皮

紫苑

洗去土名貳兩

右除白石英鍾乳外同爲龜末與白石英等同拌令勻每服肆錢水貳盞入生薑伍片大棗壹枚擘破粳米參拾餘粒同煎至七分用綿籠去滓溫服食後

頭目眩痰氣不利牙呻有聲

紫蘇子

炒

赤芍

去皮

桑白皮

去白

杏仁

去皮尖

各一錢

甘草

炙半錢

右味爲末每服貳錢水壹盞煎至七分去滓溫服

治脾胃宿冷脣膈停痰嘔吐惡心吞酸噫醋心腹脹滿腸肋刺痛短氣噎悶不思飲食

肉豆蔻仁

水香

丁香

人參

陳皮

去白

藿香

葉半兩

半夏

陽洗水一盞

桑白皮

炒

右爲細末以生薑汁煮麵糊爲圓如小豆大每服貳拾圓生薑湯下不計時候

治脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐治脣膈痞滿腹脹痛短氣噎悶效嘔痰水噫醋吞酸噦逆惡心及治山嵐瘴氣

厚朴

去皮

甘草

炙

半夏

生微寒熟溫切作肆片

薑汁浸壹宿

以粟米炒黃

藿香葉

去蕪

陳皮

去白半兩

右爲龜散每服貳錢水壹盞入生薑芩片棗壹枚同煎七分去滓熱服不計時候日試二服

**二陳湯** 治痰飲爲患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或發爲寒熱或因食生冷脾胃不和

半夏煑先茶橘紅各伍兩 白茯苓參兩 甘草錢兩半

右爲㕮咀每服四錢用水壹盞生姜薑片烏梅一箇同煎六分去滓熱服不拘時候

**溫肺湯** 治肺虛久客寒飲發則喘嗽不能坐卧嘔吐痰沫可思飲食

白芍藥陸兩 五味子炒梗 乾薑炮

肉桂去龐皮

半夏煮熟焙 陳皮去白

杏仁

甘草炒少

細辛姑剉 芍藥洗

本件剉瓣散每服參大錢水壹盞半煎至糊分以絹糊汁食後服兩服滓再煎一服去白芍藥細辛二味可加減用蜜 去白芍藥細辛二味可加減用蜜

**麻黃散** 治丈夫婦人久近肺氣咳嗽喘急上衝坐卧不安癢延壅塞咳唾稠黏脚手冷暯心脇疼痛兼治傷寒咳喘膈上

詞子皮去核

款冬花去梗

甘草蜜炙

黃芩去根節

肉桂

蔭去皮不見火

杏仁去皮尖瓣炒

名五兩

人黃乙十兩

右爲細末每服或錢水壹盞入好茶壹錢同煎八分食後夜卧通口服如半夜不能煎但以茶末入茶和勻沸湯點或乾

嗽亦得忌魚酒炙煩肉腥臊物

**火燄散** 治肺胃俱傷氣奔於上客熱熏肺喉數氣急胷中煩憊涕唾稠黏或有鮮血上氣喘急不得安卧肢躰倦痛咽乾口燥飲食減少漸至瘦弱喘乏或墜墮恐懼度水跌卧或因斗怒醉飽房勞致傷肺胃吐血嘔血並皆治之

黃芪蜜炙

人參各壹兩

白茯苓去皮

赤蔴根各陸兩

杏仁去皮尖炒

杏仁去皮尖炒

皂角子炒

半夏洗去未姜汁

作麵四兩炒

右爲細末煉蜜圓如彈子大每服一圓食後細嚼用紫蘇湯送下如喘急用桑白皮湯下

**人參白皮湯** 治大人小兒二膈熱或傷風感冷搏於肺經語聲

不出疹涎不利咳嗽喘急

日夜不止啞唾稠黏

縮砂仁

诃子去核

蜜橘香去便

龍腦薄荷葉各二

百草煎

葛粉各兩

甘草伍兩

烏梅肉參兩

右爲末麪糊爲丸每服一二圓含化蘸津食後臨卧

治停痰留飲胃膈滿悶頭眩目暈好卧減食欬嗽

嘔吐氣短恶心或飲酒過多或引飲無度或過傷生冷痰涎併

多嘔噦恶心並宜服之

又方見後

青皮去白

良姜去芦炒乾姜炮

陳皮去白各伍兩

右爲細末醋打麪糊圓如梧桐子大每服三伍拾粒湯飲任

下不拘時

治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水脹肋脹痞頭旋

恶心不思飲食

又方見後

縮砂仁

神曲炒

草果二

橘紅

三分先七分後

白豆蔻仁

丁香

十兩甘草

半夏

四兩洗染少

用湯洗去礬一大匙

片用生姜自然

火焙燒為細末

再用生姜自然

搗成餅子日乾或

勿令色黑

沸湯點服

右爲細末每服壹錢先用生姜自然汁調成膏入炒鹽少許

治胃氣虛弱三焦痞澁不能宣行水穀故爲痰飲  
結聚胃膈之間令人頭目昏眩胃膈脹滿咳嗽氣急嘔吐腹脹  
伏於中脘亦令臂疼不牽腰腿沉重久而不散流入於脾脾惡  
溫得水則服脹則不能消化水穀又令腹中虛滿而不食也此  
藥主之

南星

每箇切作十數塊同半夏先用水浸一日每日易水  
次用白礬去兩研碎調入水內再浸一日洗淨焙乾

半夏

功破各一兩

乾薑炮

白朮

良姜

青皮陳皮各半兩

右爲細末用神麴一兩火麥蘖或兩同研取末打糊和藥為

丸大麥蘖或兩同研取末打糊和藥為

圓如梧桐子大每服五十圓至七十圓溫熟水下不拘時候常服溫脾胃去宿冷消雷滯化飲食辟霧露風冷山嵐瘴疠不正非時之氣但是酒癖停飲麥水不消累服湯藥不能作効者服之如神

○  
圓溫中散滯消飲進食治胃膈噎心腹冷疼大能煖化生李果食夏月不可翫此

縮砂仁乙兩高良姜

天南星

湯洗七分煎乾各四兩

右爲細末生姜自然汁煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五十圓至七十圓生姜湯下不拘時候

○  
治膈痰涎不利頭目昏運吐逆涎沫

附子乙枚六分童者

生硫黃

別研

天南星

生用

半夏各乙兩盆硝

玄精石

各半兩

右爲細末入細麪三兩令停水和爲丸如梧桐子大每服三十丸沸湯內煮令浮上出生姜湯送下食後

○  
破飲治一切停飲不散時嘔痰沫頭眩欲倒膈院不快

旋覆花八兩白朮乙兩

肉桂

去皮

乾姜各六兩

赤茯苓七錢枳實一錢

○  
治證而前溫中化痰圓同

乾姜炮

半夏

各

乙

兩

細辛去葉洗胡椒各半兩

白朮

二兩

右爲細末生姜汁打麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸熟水下五粒丸湯飲任下不拘時候

○  
治肺胃受寒欬嗽多痰骨滿短氣語塞不出晝夜不止飲食減少不以遠年日近並皆治之

半夏麪八分甘草

一錢

肉桂

去皮

各半兩

蜜

右爲細末每服一大分水一盞生姜四片同煎至七分通口服不拘時候

治肺胃虛寒久嗽不已。咽膈滿悶咳嗽痰涎。嘔逆惡心。腹脇脹滿。腰背倦痛。或虛勞冷嗽。及遠年日近一切嗽病。服諸藥不効者。並皆治之。

款冬花去梗人參去芦

五味子炒梗紫苑去芦洗

桑白皮去赤皮

右爲細末。煉蜜爲丸如雞頭大。每服一丸。食後細嚼淡姜湯送下。或每一大圓分作四小圓含化亦得。

獨皮去毛治肺胃虛弱。好食酸冷。寒痰停積。嘔逆惡心。涎唾稠黏。或積吐粥藥不下。手足逆冷。目眩身重。又治傷寒時氣。欲吐不吐。欲嘔不嘔。昏憤悶亂。或飲酒過多。中寒停飲。喉中涎声乾噦不止。

陳皮去白半夏各七兩

右二件剉爲籠散。每服三錢。生姜十片。水二盞。煎至一中去滓。溫服。不計時候。留兩服。滓併作一服。再煎服。

人參去頭治肺氣不足。欬嗽喘急。痰涎不利。肯萬煩悶。涕唾稠黏。脣乾口燥。及療風壅痰。失頭目昏眩。精神不爽。或肺胃俱虛。久嗽不已。漸成虛勞。肢體羸瘦。肯滿短氣。行動喘乏。飲食減少。或遠年日近。諸般欬嗽。並皆治之。

人參

款冬花去梗細辛去葉洗杏仁去皮尖炒

甘草

各四兩

知母六兩

肉桂去皮

桔梗各五兩

右爲細末。煉蜜為圓如雞頭大。每服一圓。食後細嚼淡姜湯送下。含化亦得。

定喘湯專治男子婦人久嗽。肺氣喘促。倚息不得睡。卧累年不瘥。漸致面白浮腫。

蟬蛻足蠅沙杏仁去皮尖馬兜零略二錢砒六分

右爲細末。蒸棗肉爲丸如葵子大。每服六七圓。臨睡用葱茶清放冷下。服後忌熱物半日。一本用知母六兩。一本用馬兜零。

治肺胃虛寒。欬嗽喘急。肯膈噎。腹脇脹滿。泊寒。

短氣喜欲飲冷咽隱痛及療肺痿勞嗽唾血腥臭乾嘔煩熱  
聲音不出肌肉消瘦倦怠減食

地骨皮

人參去蘆

阿膠炒

杏仁去皮尖炒

桑白皮

去蕊

知母

烏梅去核

甘草炙

瞿粟殼

去蒂蓋蜜炙

右等分㕮咀爲龕散每服參錢水壹盞半烏梅棗子各壹枚  
同煎至壹盞瀝去滓溫食後臨卧服兩滓留併煎作壹服  
新法陽治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹  
刺痛藏腑脹脹嘔吐痰水噫氣吞酸或中酒吐酒噦逆惡心頭  
疼煩渴倦怠嗜卧不思飲食並宜服之

青皮去白

乾薑炮

桔梗炒

陳皮去白

丁皮棟兩

甘草炒

倍兩半夏湯洗薑汁製

右爲細末每服壹錢入鹽壹捻沸湯點服不拘時候常服溫

加三瞧開胃建脾消柏酒進飲食

古今正統治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上喘氣急喉中  
延聲齧滿氣逆坐卧不安飲食不下及治肺感寒邪咳嗽聲重  
語音不出鼻塞頭昏並皆治之

人參切片

麻黃去節

甘草炙

阿膠炒

半夏麴

桑白皮

五味子

各壹錢瞿粟殼蜜制

右爲龕末入人參片拌勻每服參大錢水壹盞半入生薑參  
片同煎至柒分去滓食後溫服又治小兒久病肺氣喘急喉  
中涎聲脣膈不利嘔吐痰沫更量歲數加減服  
細辛五味子治肺經不足胃氣怯弱或冒風邪或停寒有飲  
咳嗽倚息不得安卧留滿迫塞短氣減食乾嘔作嗽嗽唾結痰  
或吐涎沫頭目昏眩身體疼重語聲不出鼻塞清涕頭面脚膝  
時帶虛浮痰咳不止痛引胃脇不問新久並宜服之

北細辛

去苗半夏洗茶次各壹兩

甘草

烏梅去核

五味子

瞿粟殼

去蒂蓋蜜炙

各壹兩

桑白皮炒

右爲籠散每服參錢水貳盞半生薑拾片煎至壹盞用紗帛  
慮去滓溫服留貳服滓併作壹服再煎

然令坐見陽治停痰留飲冒胸滿悶咳嗽嘔吐氣短惡心以致  
飲食不下並宜服之

茯苓去皮參兩 半夏湯浸茶一錢

右爲籠末每服肆大錢水壹大盞生薑藥片煎至柒分去滓  
空心服

人參薑湯治男子婦人脾胃氣弱嘔吐噦逆飲食不下手足  
逆冷涎痰稠粘又治以喘不喘欲嘔不嘔徹心憤憤悶亂不安  
或癰瘍諸疾水漿粥藥入口便吐服之立効久病翻胃服之百  
日痊安此藥溫脾胃化痰飲消宿冷止吐嘔

藿香去梗一錢 人參切片一錢 半夏湯洗茶一錢 薑汁製

右擣爲籠末入人參令勻每服參錢水壹盞半生薑拾片煎  
至壹盞去滓通口服孕婦忌

半夏圓治肺氣不調咳嗽喘滿痰涎壅塞心下堅滿短氣煩悶  
及風壅痰實頭目昏眩咽喉不利嘔吐惡心神思昏憤心忪而  
熱涕唾稠粘並皆治之

白薑桔過一錢 半夏湯洗去滑薑汁壹宿

右擣爲細末生薑自然汁爲圓如梧桐子大每服貳拾圓加  
至參拾圓食後臨卧時生薑湯下

杏參散除痰下氣治胃腸脹滿上氣喘急倚息不得睡卧神思  
昏憤宜服之

桃仁去皮尖一錢 人參去芦一錢 杏仁去皮尖一錢 桑白皮蜜炒微赤再一錢

右等分爲細末每服貳錢水壹盞半薑藥片棗壹箇煎至柒  
分溫服不拘時候

杏仁湯治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰  
飲停積悉皆治療

出易簡方

人參去芦半夏湯洗茶一錢 茯苓去皮一錢 茯苓去粉

官桂去皮不乾薑炮洗

細辛去苗葉甘草炙

五味子各等分

去火去苗

右㕮咀每服四錢水壹盞半杏仁去皮尖剗伍枚薑伍片煎至陸分去滓食前服若感冒得之加麻黃等分如脾胃素实者用嬰粟殼去筋碎剉以醋淹炒等分加之每服添烏梅壹箇煎服其効尤驗若嘔逆惡心者不可用此一方去杏仁人參倍加麻黃添芍藥如麻黃之數乾薑五味子各增一半名小青龍湯大治久年咳嗽痰涎壅盛夜不得睡仍專治脚氣喘急此方雖有麻黃既有官桂不致於發汗服之不妨二方加麻黃甘草杏仁五味子茯苓等分橘紅倍之尤爲切當又

三方用紫蘇葉桑白皮麻黃青皮五味子杏仁甘草等分生姜茶片烏梅一箇煎服久年咳嗽氣虛喘急皆得其宜二方

中有麻黃有汗人不宜服之

四四治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出痰不下此七氣所爲也或中脘痞滿氣

不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之

出易簡方

半夏伍兩

茯苓四兩

紫蘇葉貳兩

厚朴叁兩

右㕮咀每服四錢水壹盞半生薑茶片棗壹箇煎至陸分去滓熱服不拘時候若因思慮過度陰陽不分清濁相干小便白濁用此藥下青州白圓子最爲切當婦人惡阻尤宜服之一名厚朴半夏湯一名大七氣湯苟方有七氣湯用半夏伍兩人參官桂甘草各一兩生姜煎服大治七氣并心腹絞痛然藥味太甜恐未必能止疚順氣四治七情所傷中脘不快氣不升降腹肋脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草一兩煎服尤快好事者謂其耗氣則不然蓋有是病服是藥也



