

重刊孫真人備急千金要方

二十六

解食毒第一 論一首 方二十九首

論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中於毒毒藥不知方多遭其斃豈非枉橫耶然而大聖又設其法以救活之正為貪生嗜樂忽而不學一朝逢遇便自甘心竟不識其所以今述神農黃帝解毒方法好事者可少留意焉

治諸食中毒方

飲黃龍湯及犀角汁無不治也飲馬尿亦良

治飲食中毒煩瀉方

苦參二兩以酒一升半煮取一升頓服取吐食

治食百物中毒方

掘側傍地深一尺以水滿坑中取側等七枚燒令煙

以投坑中乃取水汁飲四五升即愈急者不可得但

掘地著水即取飲之

又方服生韭汁數升

合貝子一枚須臾吐食物瘥

治食六畜肉中毒方

各取六畜乾屎為末水服佳若是自死六畜肉毒水服黃蘗末方寸匕須臾復與佳

燒小豆一升為末服三方寸匕神良

水服龜底黃土方寸匕

治食生肉中毒方

掘地深三尺取下土二升以水五斗煮土五六沸服

上浮清者飲一升立愈

治食牛肉中毒方

狼牙燒灰水服方寸匕良 一升猪牙

又方 温湯服猪脂良 **又方** 水煎甘草汁飲之

治食牛馬肉中毒方

飲人乳汁良

治食馬肉血洞下欲死方

豉 貳伯粒 杏人 貳拾枚

右一味咬咀蒸五升米下飯熟擣之再服令盡

又方 蘆根汁飲以浴即解

治生食馬肝毒殺人方

牡鼠桑二七枚兩頭尖者是以水研飲之不瘥更作

治食野菜馬肝肉諸脯肉毒方

取頭垢如棗核大吞之起死人

又方 燒狗屎灰水和絞取汁飲之立愈

又方 燒猪骨為末水服方寸匕日三

治食百獸肝中毒方

類服猪脂一斤佳亦治陳肉毒

治食狗肉不消心中堅或腹脹口乾大渴心急發熱狂言

妄語或洞下方

杏人一升合皮研以沸湯二升和絞取汁分三服狗

肉完片皆出即靜良驗

治食猪肉中毒方

燒猪屎為末服方寸匕犬屎亦佳

治漏脯毒方 張文仲云茅室諸水迷脯為漏脯

擣韭汁服之良大豆汁亦得

治癰肉濕肺毒方 張

云肉閉在密器中細花者

燒狗屎為末水
密蓋不泄氣皆

方寸匕凡生肉孰肉皆不用深
火又肉汁在器中密蓋氣不泄者

亦殺人

治肺在黍米中毒方

麴一兩鹽兩搗

水一升煮服之良

治中射肉肺毒及餅

取貝子為末水

中毒方

人以雉肉作餅臃因

如豆佳不瘥又服
皆吐下治之方

犀角為末服方

得靜甚良

治食鵝鴨肉成病實

面赤不下食者方

服秫米泔良

治食魚中毒方

煮藕皮停極冷飲

之方驗附後方云治食魚
毒面腫煩亂者

治食魚中毒面腫煩

及食鱸魚中毒欲死者方

劉蘆根春取汁

飲良并治解毒亦可取蘆葉茸汁

飲之愈

治食魚鱸及生肉在腸中不化吐之不出便成癥瘕方

厚朴 大兩

上黃 貳兩

右二味以咀以酒一升煮取一升盡服立消人強者

大黃用酒二升煮取一升再服之

治食魚鱸不消方

大黃 叁兩切

朴 貳兩

右二味以酒一升煮取一升頓服之仲景方有
兩用後方云

猪肉遇冷不消必成
腹下之方亦無橘皮

又方 春馬鞭草飲汁一升即消生薑亦良用後方云亦
自服諸藥

又方 鮫魚皮燒灰水服無完皮壞力裝取之一名鮫魚皮

古今錄驗云治
食鱈魚傷毒

又方 魚皮燒灰水服方寸匕

又方 魚鱗燒灰水服方寸匕食諸鮑魚中毒亦用之

治食蟹中毒方

冬瓜汁服二升冬瓜亦可食

治食諸菜中毒方

甘草 貝齒 胡粉各等分

右三味治下篩水服方寸匕小兒尿乳汁共服二升

治食山中樹菌中毒方

人屎汁服一升良

解毒第一論一首 解毒二十八條

論曰甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同神妙有人中烏

頭巴豆毒甘草入腹即定中藥毒煎湯下咽便愈中野

葛毒十漿飲訖即止如此之事其驗如反掌要使人皆知

之然人皆不肯學誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒余每

試之大懸絕不及甘草又能加之為甘豆湯其驗尤奇有

人服玉壺丸治嘔不能已百藥與之不止藍汁入口即定

如此之事皆須知之此則成規更不須試練也解毒方中

條例極多若不指出一二學者不可卒知餘方例爾

石藥毒用白鴨屎 人參汁雄黃毒國防己

鐵粉毒用磁石 礬石毒用大豆汁 白蠟毒

防染毒用葵根汁

桂枝湯用白粥

廿一毒用大豆汁

大戟毒用葛蒲汁

躑躅毒用梳子汁

刺子毒用海醋

馬牙毒用清水

野羊毒用土漿

人糞汁

杏仁毒用藍子汁

百藥毒用甘草 薺老

大小豆汁 藍葉根實汁

金銀毒用水銀服數兩即

山雞子汁及屎白燒猪脂和

水淋雞屎汁煮葱白汁 鴨血及屎汁

芫花毒用防已 防風

甘草 桂汁

野葛毒用雞子清 葛根

甘草汁 鴨頭熱血

猪膏 雞屎 人屎

藜蘆毒用雄黃 溫湯

葱汁

烏頭天雄附子毒用大豆

遠志 防風 棗肉 飴糖

射罔毒用藍汁

大小豆汁 竹瀝 大麻子汁

藕支汁 六畜血 貝齒屑 蚯蚓屎

半夏毒用生薑汁及煮乾薑汁

葶苈毒用薺老 甘草 羊角 蟹汁 升麻

狼毒毒用杏仁 藍汁 白飲 鹽汁 木占斯

巴豆毒用煮黃連汁 大豆汁 生薑汁用後

葛蒲汁 煮寒水石汁

蜀椒毒用葵子汁 蒜 桂汁 豉汁 人尿 冷水

土漿 雞毛 燒吸煙及水調服

斑猫元青毒用猪膏 土漿 大豆汁 戎鹽 藍汁

鹽湯煮猪膏 巴豆

服藥過齊心亂者

藜荷汁 粳米

黃連 飴糖

解諸菌毒

掘地作坑以水沃中

解一切毒藥發不問草石

豉 參升

右二味以咀以水七升

雞腸草散 解諸毒方

雞腸草 參分 薺菀

當歸

右八味治下節水服方寸匕

全方共四

毒蟲所螫以針刺螫上而止者藥如小豆許於毒中令

濕差為射罔箭所中削竹如箠服長一尺五寸以綿纏

繞水沾令濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底止有好血

出即休若服藥有毒水服方寸匕毒解痛止愈

解一切毒方

薺菀 壹分

右二味七月七日取藍并花貳分

又方 中毒者取秦煎毛一二七枚燒灰服

解一切毒方

母猪屎水和服之又以二升二合和米粉飲之

解鴆毒及一切毒藥不止

甘草

蜜 各肆分

梁米粉 壹升

解諸毒

右三味以水五升煮甘草取二升去滓飲大熱內粉湯中攪令勻調內白蜜更煎令熟如薄粥適寒溫飲一升治食食若悶亂如卒中風或似熱盛在病服藥即劇方飲甘草汁藍青汁即愈

治野葛毒以死口噤者方

取青竹去兩節挂兩脇臍上內冷水注之暖即易須臾口開開即服藥立活惟須數易水

治鈎吻毒困欲死面青口噤逆冷身痺方附後方云鈎吻毒藥更食芥相

而所生之候無他草又

薺老八兩咬咀以水六升煮取二升冷如人體服五合日三夜一凡薺薺老惟令濃佳

又方煮桂汁飲之

噉葱淨佳葱淨法如前毒

治腹中有鐵方

白折炭刮取末并花水服二錢不過再服

解五石毒第二論二首二十八條方二十三首

論曰人不服石以庶事不佳惡瘡疥癬溫疫瘧疾年年常患寢食不安興居常惡寐止已事不康生子難育所以石在身中萬事休泰要不可服五石也人年二十已上可服石藥若素肥充亦勿妄服四十已上必須服之五十已上三年可服一劑六十已上二年可服一劑七十已上一年可服一劑

又曰人年五十已上精華消歇服石猶得其力六十已上轉惡服石難得力所以常須服石令人手足溫暖骨體充實能消生冷舉措輕便復耐寒暑不著諸病是以大須服

之凡石皆熟煉用之凡石之發當必惡寒頭痛心悶發
有時狀如溫瘧但有此兆無過取冷水淋之得寒乃止
切冷食惟酒須溫其諸解法備如後說其發背疽腫方見
前二十一卷中

又曰凡服石人甚不得雜食口味雖百品具陳終不用重
食其肉諸雜既重必有相賊聚積不消遂動諸石如法持
心將攝得所石藥為益善不可加余年二十八九嘗服五
六兩乳自是以來深深體悉至於將息節度頗識其性養
生之士宜留意詳焉然其乳石必須土地清白光潤羅紋
鳥翻一切皆成白可入服其非土地者慎勿服之多皆殺
人甚於鴆毒紫石白石極須外內映徹光淨皎然非此亦
不可服寒石五石更生散方舊說此藥方上古名賢無此

漢末有何侯者行用自皇甫士安已降有進餌者無不發
背解體而取顛覆余自有識性已來親見朝野仕人遭者
不一所以寧食野葛不服五石明其大大猛毒不可不慎
也有識者遇此方即須焚之勿久留也今但錄主對以防
先服者其方以從煙滅不復須存為含生害也

鍾乳對木又對枯婁其治主肺上通頭骨木動
鍾乳曾塞短氣鍾乳動木頭痛目疼又鍾乳雖不對海蛤
海蛤能動鍾乳鍾乳動則目疼短氣有時木動鍾乳直頭
痛胃寒然鍾乳與木為患不過此也雖所患不同其治一
矣發動之始要有所由始覺體中有異與上患相應宜速
服此方

葱白 半斤 豉 一升 人參 外 用 吳 甘 草 兩

右四味以咀先以水一斗五升煮葱白作湯澄取八升
內藥煮取三升分三服服後使人按摩搖動口中嚼
物然後仰卧覆以暖衣出去衣服湯熱飲即便冷淘
飯燥脯而已若服此不復服

白芍湯方

甘草各二兩 桂心各二兩 芍藥各二兩 葱白半斤
右四味合服如上法若服此已解肺家猶有客熱餘氣
復服

桂心湯方

桂心各二兩 麥門冬各二兩 人參各二兩
甘草各二兩 豉貳升 葱白半斤
右六味合服如前法此方後發身熱半日

杜仲湯

硫黃對防風又對細辛其治主脾腎通主腰脚防
風動硫黃煩熱脚疼腰痛或嗅忽無常或下利不禁防風
細辛能動硫黃而硫黃不能動彼始覺發便服此方

杜仲各二兩 枳實各二兩 甘草各二兩
李核人各二兩 香豉貳升 梔子人各二兩
右六味合服如上法若不解復服

大麥奴湯方

大麥奴肆兩 甘草各二兩 人參各二兩
芒消各二兩 桂心各二兩 麥門冬半斤
右六味合服如上法若服此已解脾腎猶有餘熱氣或

冷復服

人參湯方

人參各二兩

人參

乾薑

甘草

當歸各一兩 附子一兩

右五味合服如上法

生麥門冬湯

白石英煩熱腹脹白石英對附子其治十胃通主脾腎附子動
開或言語難手脚痠痛始覺發宜服此方

生麥門冬兩 甘草

麻黃各一兩 豉一升

右四味合服如上法不解重服

大黃湯

大黃 三兩

豉一升

甘草 二兩

梔子人 一枚

右凡五味合服如上法頻服得下便止不下服盡若熱
勢未除視瞻高而患渴復服

枳實湯

枳實根

大麥奴兩 甘草

豉一升

葱白 半斤

右五味合服如上法稍稍一兩合服之隱約得一升許
便可食少糜動口若已解胃中有餘熱復服

三消湯

芒消

桂心各一兩 通草

甘草 各一兩

白朮 壹兩

大棗 貳拾枚

李核人 貳拾壹枚

右七味合服如上法若腹脹去芒消用人參二兩

人參 壹兩 紫石英對人參其治主心肝通主腰脚人參動紫

石英 外基云云 紫石英 心急而痛或驚悸不得眠卧恍惚忘

設失性發狂昏昏欲眠或嗜憤喜嘔或瘥或劇下寒乍熱

或耳聾目暗又防風雖不對紫石英紫石英稍動防風

外基云云 防風 雖不對紫石英 紫石英 亦以痛熱

解五石毒

項強始覺服此方外其藥服麻黃湯

人參

白木各二兩

甘草外其藥

桂心各二兩

細辛壹兩

豉叁升

右六味合服如上法若嘔盛加大黃黃芩梔子各二兩若其心誤狂發猶未除服

生麥門冬湯方外其藥此方治與石發

生麥門冬

葱白各半斤

甘草叁兩

人參壹兩

豉貳升

右五味合服如上法濕牀暖覆牀下著火口中嚼物使身稍汗一日便解若心有餘熱更服

人參湯方

人參

防風

甘草各叁兩

桂心壹兩

生薑

白木各壹兩

右六味合服如上法

大麥麩方赤石脂對桔梗其治主心通主腎背枯梗動石

脂心痛寒噤手脚逆冷心中煩悶赤石脂動桔梗頭痛目

赤身壯熱始覺發宜溫清酒飲之隨能石須酒勢行則

解亦可服此方

大麥麩令汗出燥止勿令大焦春去皮細搗絹篩以

冷水和服之

千金翼云炒去皮淨洗蒸令氣味出為末

葱白散湯譽石無所偏對其治主胃發則令人心急口噤

骨節疼強或節節生瘡始覺發即服此方外其藥云服

葱白半斤

豉貳升

甘草貳兩

右三味以水六升煮取一升半分二服若散發身壯

生薑宜服

生麥門冬湯方

生麥門冬 伍兩 甘草 叁兩

人參 壹兩半 葱白 半斤

右六味服如解鍾乳湯法

木對鍾乳木發則頭痛目疼或舉身壯熱解如鍾乳法

附子對白石英亦對赤石脂附子發則嘔逆手脚疼體強

骨節痛或項強面目滿腫發則飲酒服麩自愈若不愈與

白石英同解

人參對紫石英與人參發則煩熱頭項強與紫石英同解

大黃黃芩湯 桔梗對赤石脂又對茯苓又對牡蠣桔梗發

則頭痛目赤身體壯熱解與赤石脂同茯苓發則壯熱煩

悶宜服此方

大黃 黃芩 梔子人 兩 豉 壹升 葱白 伍升

右五味以水六升煮取二升半分二服

牡蠣發則四肢壯熱心腹煩悶極渴解與赤石脂同

乾薑無所偏對

海蛤對枯薑海蛤先發則手足煩熱枯薑先發

則寒寒清淨出宜服此方

枯薑根 甘草 各壹兩 大黃 壹兩 梔子人 伍升

右四味合服如解鍾乳法

白石英發先腹脹後發熱 石硫黃發通身熱兼腰膝痛

礬石發徧身發熱兼口噤 牡蠣發頭痛而煩滿熱

茯苓發直頭痛

桔梗發頭面熱

海蛤發心中發熱

已上除海蛤外有六分

紫石英發下寒乍熱

赤石脂發心噤身熱頭自赤

已上二味宜酒

石硫黃礬石枯梗牡蠣茯苓此五物發宜浴白石英亦可
小浴其餘皆不宜浴礬石發宜用生熟湯茯苓發熱多攻
頭即以冷水洗身清之

浴法初熱先用暖水後用冷水浴時慎不可洗頭垂
冰可以二三升灌之丸藥宜浴便得解即佳不瘥可
餘治之

赤石脂紫石英發宜飲酒得酒即解凡藥發或有宜冷或
有宜飲酒不可一藥也

又一法云寒食散發動者二草藥氣力易盡石性沈滯獨
主胃中故今數發欲服之時以絹袋盛散一匕著四合酒
中塞其口一宿後飲盡之其酒用多少將御節度自如舊
法此則藥石之勢俱用石不住胃中何由而發事甚驗也

梔子散湯治食宿飯陳臭肉及糞宿菜發者方

梔子 參三茶枝 香鼓 參升 甘草 參兩

右三味咬咀以水八升煎取三升分三服亦可加入參
葱白

葱白散湯治因失食發及飲酒過醉發者方

葱白 青升 豉 貳升 乾薑 伍兩 甘草 貳兩

右四味咬咀以水七升煮取三升分三服不解服

理中湯方

人參 甘草 白朮 各參三兩 乾薑 貳兩

右四味以水六升煮取三升半分二服

湯 治因瞋怒太過發者方

人參

枳實

甘草 各四分

白朮

乾薑

枳實根 各四分

右六味以水九升煮取三升分二服若短氣者稍

稍數飲千金翼云上散發氣逆心腹絞痛不得氣息命在轉瀾者

情色過多發宜服黃耆湯方本無

將冷太過發則多壯熱以冷水洗浴然後用生熟湯五六

石灌之已食少暖食飲少熱酒行步自勞

將熱太過發則多心悶時時食少冷食若夏月大熱時散

發動多起於渴飲多所致水和少麩服之不瘥復作以瘥

為度

公 若大小便秘塞不通或淋瀝濁血陰中疼痛此

是熱氣所致用此法即愈

其法前以冷物熨小腹已次以熱物熨之又以冷物

熨之若小便數此亦是取冷所為暖將理自愈

治藥發下利者方

乾服豉即斷能多益佳

實 凡服散之後忽覺身體浮腫多是取冷過所致治之

檳榔三十枚搗碎以水八升煮取一升分再服千金

子搗作末下篩以酒煎其皮以湯煮并煮取貳升去滓內子末為再服

治凡散發瘡腫方

蔓菁子 炙 杏人

黃連

胡粉 各壹兩 水銀 貳兩

右五味別搗蔓菁子杏人如膏以猪脂合研令水銀成

以塗上日二夜一

治散發赤腫者方

生地黃伍兩大黃壹兩生商陸叁兩杏仁肆拾枚

右四味切醋漬一宿猪膏一升煎商陸令黑去滓摩腫

上日二夜一

治散發生細瘡者方

黃連各伍兩

右二味咬咀以水八升煮黃連取四升去滓內芒消令

烱漬布取帖瘡上數數易換多少皆著之

治散發瘡痛不可忍方

冷石二兩下篩為末粉瘡上日五六度即燥須臾痛

亦定

治服散勿發動方

乾薑五兩咬咀以水五升煮取二升去滓內蜜一合

和絞頓服不瘥重作

鴨通湯解散除熱方

白鴨通伍升湯貳斗半淋貳升豉叁升梔子貳拾

麻黃捌兩冷石貳兩甘草伍兩石膏叁兩

右七味五味咬咀以鴨通汁煮取六升去滓內豉三沸

分服五合若覺體冷小便快濶其間若熱猶盛小便赤

促服之不限五合宜小勞當漸進食不可令食少但勿

便多耳

解散治盛熱實大小便赤方

升麻 大黃 黃連 甘草

黃蘗各三兩 芍藥陸兩

黃芩 肆兩

枳子人 捌

竹葉切

破各青升

白鴨通伍合

右十一味以水三斗先煮鴨通竹葉取一斗一升去滓澄清取一斗次內藥煮取三升分三服若上氣者加杏仁五合腹滿加石膏二兩

下散法

治藥發熱困方千金翼云凡散藥發熱無賴下去之云諸用及金石等同用之

黍米三升作糜以成煎猪脂一斤和令調宿不食日空腹食之令飽晚當下藥神良不盡熱發更合服之

又方

肥猪肉伍斤

葱白

薤各半斤

右三味合煮治如食法宿不食日服之令盡不盡明日更服

又方

治發動數數患熱困厭藥下之方

猪腎脂一具不令中水以火炙承取汁適寒温一服

三合每日夜五六服多至五六升二日稍隨大便下

又方

作肥猪肉臠一升調如常法平曰空腹頓服令盡少

時腹中雷鳴鳴定藥下隨下以器盛取用水淘得石

不盡更作如前服之

蠱毒第四論一首 方二十首

論曰蠱毒千品種種不同或下鮮血或好卧閣室不欲光明或心性反常乍嗔乍喜或四肢沈重百節酸疼如此種種狀貌說不可盡亦有得之二三年乃死急者一月或百日即死其死時皆於九孔中或於脇下肉中出去所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蠱猶鬼狐狸老物精魅亦不敢著人養生之家大須慮此俗亦有灸法

中蠱於心下捺便大炷灸一百壯并主疔鬼亦灸得愈
當足小指尖上灸三壯當有物出酒上得者有酒出飯上
得者有飯出肉菜上得者有肉菜出即愈神驗皆於灸瘡
上出

凡中蠱毒令人小腹絞切痛如有物嚙或吐下血皆如爛
肉若不即治蝕人五臟盡乃死矣欲驗之法當令病人唾
水洗者是蠱不沈者非蠱也

凡人患積年時復大便黑如擦或堅或溥或微赤者皆是
蠱也

凡人忽患下血以斷下方治更增劇者此是中蠱也

凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蠱毒粗醫以斷
痢藥處之此大非也

世有拙醫見患蠱脹者偏身腫滿四肢如故小便不甚澀
以水病治之延日服水藥經五十餘日望得痊愈日復增
加奄至墮歿如此者不一學者當細尋方意消息用之萬
不失一醫方千卷不盡其理所以不可一一備述云耳
凡人中蠱有人行蠱毒以病人者若服藥知蠱主姓名當
使呼吸將去若欲知蠱主姓名者以敗鼓皮燒作末以飲
服方寸匕須臾自呼蠱主姓名可語令去則愈又有以蛇
涎合作蠱藥者飲食中使人得瘕病此一種積年乃死瘵
之各自有藥江南山間人有此不可不信之

太上五蠱圖治百蠱吐血傷中心腹結氣堅塞咽喉語聲
不出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去來無常狀如鬼祟
身體浮腫心悶煩疼寒戰夢與鬼交狐狸作魅卒得一痛

上义曾脇痛如刀刺經年累歲著牀不起悉主之方

雄黃 椒目 巴豆 莽草 羌花

真珠 外基用木香 鬼臼 礬石 礬石

附子 五分 獺肝 壹分 蜈蚣 貳枚 斑蝥 叁拾枚

右十二味為末蜜和更擣二千杵丸如小豆先食飲服
一丸餘密封勿泄藥氣十九為一劑如不中病後日增
一丸以下利為度當下蠱種種狀貌不可具述下後七
日將息服一劑二十年百病盡除忌五辛

太乙追命圓 治百病若中惡氣心腹脹滿不得喘息心痛
積聚腫脹疝瘕宿食不消吐逆嘔噎寒熱瘰癧蠱毒婦人
產後餘疾方

蜈蚣 壹枚 丹砂 附子 礬石 壹枚

雄黃 藜蘆 鬼臼 各壹分 巴豆 貳分

古八味為末蜜丸如麻子一服二九日一服傷寒一二
日服一丸當汗出綿裹兩丸塞兩耳中下痢服一丸一
丸塞下部蠱毒服二丸在外膏和摩病上在膈上吐膈
下利有瘡一丸塗之毒自出產後餘疾服一丸耳聾綿
裹塞耳

治人得藥雜蠱方

斑蝥 陸枚 桂心 藜蘆 各如大 金月 下土 如彈丸大

古四味治下篩水服一錢匕下蠱蛇蝮蝎蜈蚣毒俱出

萬病圓 治蠱注四肢浮腫肌骨消索欬逆腹大如水狀死
後轉易家人一名蠱脹方 小兒名蠱黃丸一名萬病丸

雄黃 巴豆 莽草 鬼臼 各壹分 蜈蚣 壹枚

右五味為末蜜和搗二千杵丸如小豆密封勿泄氣
勿食平日空腹一九一炊又不知更加一九當先下清
水次下蟲長數寸及下蛇又下蝦雞子或白如膏下後
作葱豉粥補之百種暖將息

治中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝病變無常處
方劑後古今錄驗方俱云用鐵精烏雞肝和丸如梧子以酒服三九日再用其甚者不過十日千金用後方疑千金

殺羊皮材伍犀角

芍藥

黃連

牡丹各壹兩

藜荷肆兩半

梔子入

茶散

右七味以水九升煮取三升分三服葛氏雜病

梔子用苦參升麻當歸

犀角圓治蠱毒白病腹暴痛飛尸惡氣腫方

犀角屑

鬼臼屑

桂心末

羚羊角屑各肆錢匕

天雄

莽草

真珠

雄黃各壹兩

貝子伍錢

蜈蚣伍節

巴豆伍枚

麝香貳分

射罔如雞子黃

大壹枚

右十二味為末合搗蜜丸如小豆服一九日二含咽不

知少增之卒得腹痛蠶尸服如大豆許一九若惡氣腫

以苦酒和塗上縛袋于盛藥繫左臂辟不祥鬼疰蠱毒

可以備急

治蠱毒方

苦根

藜荷根各叁兩

右二味以水四升煮取一升頓服射後方云治中

昔如爛肝者自知蠱主姓名

蛻皮交

亂髮灰各壹斤

生麻子汁伍升

桃根皮

柰樹北陰白

各伍兩

右五味先煮檲皮桃根取濃汁升和桑子汁髮灰等
令勻患人宿少食日服一大升須臾著盆水以雞翎攪
吐水中如牛涎攢胎及諸蟲並出

又方 檲樹北陰白皮一大握長五寸水二升煮取一升空

腹服即吐蟲出亦治中蠱下血

又方 蝟皮灰水服方寸匕亦出蟲

又方 大戟 五月五日挑白皮必效方云以東引者火烘之各肆分

斑猫膏分

右三味治下篩曰空腹以水一雞子許服八捻用二指

相著如開頓服之若指頭相離取藥太多恐能損人

方云服藥核大不進十日更一服必效方云服半方寸
其毒即出不出更一服李饒州云若以酒中得則以
酒服以食中
得以飲服之

治蛇蠱方 蛇毒入菜果中食之令人得病名曰蛇蠱

大豆末以酒漬絞取汁服半升

治諸熱毒或蠱毒鼻中及口中出血醫所不治者方

取人朵尖七枚燒作火色置水中研之頓服即愈亦
解百毒時氣熱病之毒服已溫覆取汗勿輕此方極

神驗

治蠱吐下血方

檲皮黃白寸長壹尺 蘆荻根伍寸如足大指

右二味咬咀以水二升煮取一升頓服極下蠱

治中蠱下血日數十行者方

巴豆貳朱 元青 藜蘆 附子 礬石各分

右五味為末別治巴豆合篩和相得以綿裹藥如大

許內下部中日三瘥

又方苦瓠一枚以水二升煮取一升稍稍服之當下蟲及

吐蝦蟇蝌蚪之狀一月後乃盡臨時量用之射後方

云用苦瓠

治下血狀如雞肝腹中攪痛難忍者方

茜根

升麻

犀角

桔梗

黃蘗

黃芩

地榆

白蘘荷

右八味咬咀以水九升煮取二升半分三服此蠱利血用之

又方桔梗

犀角各等分

右二味為末酒服方寸匕日三不能自服絞口與之藥下心中當煩須臾自靜有頃下服至七日止可食猪脾

臍自痛養治蠱下血如雞肝日夜不解欲死者皆可用

治腸蠱先下赤後下黃白沫連羊不瘥者方

牛膝一兩搥散切以淳清酒一升漬一宿平旦空腹

服之再服便愈

北地大酒治萬病蠱毒風氣寒熱方

烏頭

甘草

芎藭

黃芩

桂心

藜蘆

附子

白斂

桔梗

半夏

柏子人

前胡

麥門冬

右十二味七月翹十斤秫米一斛如醞酒法咬咀藥以

絹袋盛之沈於瓮底酒熟去糟漉取藥滓以青布袋盛

沈著酒底泥頭秋七日夏五日每日空腹服一合日

三以知為度藥有毒故以青布袋盛之服中二十日

大有病出其狀如漆五十日病愈愈有婦人年五十被
病連年腹中積聚冷熱不調時時切痛遠將絞急上氣
曾滿二十餘年服藥二七日所下三四升即愈又有女
人病偏枯絕產服二十日吐黑物大如刀帶長三尺許
即愈其年生子又有女人小得癩病服十八日出血二
升半愈有人被杖崩血內瘀臥著九年服藥十二日出
黑血一二升愈有人耳聾十七年服藥二十五日鼻中
出血三升耳中出黃水五升便愈古方二至熹平二年北
地太守臣光上然此偏主蠱毒有人中蠱毒者服無不
愈極難瘥者不過一七日所有效莫不備出曾有一女
人年四十餘偏枯羸瘦不能起長臥牀枕耳聾一無所
聞兩手不收已經二年余為合之遂得平復如舊有人

金方十四

十二

中蠱毒而先患風服茵芋酒傷多吐出蠱數十枚遂愈
何況此酒而不下蠱也嘉其功效有異常方故具述焉

胡臭漏腋第五 論一首 方十五首

論曰有天生胡臭有為人所染臭者天生臭者難治為人
所染者易治然須二年醋傳礬石散勿止并服五香丸乃
可得瘥勿言一度傳藥即瘥正亦傳藥時暫得一瘥耳五
香丸見前第一卷中凡胡臭人通忌食五蠱五辛治之終
身不瘥

石交散治胡臭方

石交 壹升

楓香 二升

丁香

薰陸香

青木香 各兩

礬石 二升

橘皮

陽起石 各兩

右八味治下篩以綿作袋子粗如指長四寸裝取藥便

毒胡臭

者身上一以絹袋盛著腋下先以布指令痛然然後挾之
又方三年苦酢和石灰傳之

治胡臭方

辛夷 芎藭 細辛 杜蘅 藁本各兩

右五味以咀以淳苦酒漬一宿煎取汁傳之欲傳取臨
卧時以麝為度

又方青木香 附子 白灰又只兩兩 礬石半兩

右四味為散著粉中常粉之 肘後無礬石

又方赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復

又方擗葉切二升以水五升煮取一升用洗腋下即以白

苦瓠燒令煙出熏之數數作用

又方辛夷 細辛 芎藭 青木香各分

金方子四下 廿三

右四味治下篩熏竟粉之

又方馬齒菜一束搗碎以蜜和作團以絹袋盛之以泥紙

裹厚半寸曝乾以火燒熟破取更以少許蜜和使熱

勿令冷先以生布指之夾藥腋下藥痛久忍之不能

然後以手中勒兩臂

又方牛脂 胡粉各等分

右二味煎令可丸塗腋下一宿即愈不過二劑
肘後方

塗

又方伏龍肝作泥傳之

又方治漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕臭

者方

乾枸杞根 乾薑後作薑根 甘草各半兩

商陸根

胡粉

消石

各壹兩

右件藥治下節以苦酒少少和塗膏微汁出易衣復重塗上不過二著便愈或一歲復發發復塗之

又方 水銀

胡粉外其基作粉霜

右二味以面脂研和塗之良驗

又方 石灰

參升

銀屑 壹升 一作銀屑

右二味合和絹囊盛汗出粉之妙

又方 正日以尿洗腋下神妙

又方 黃礬石燒令汁盡治為末絹袋盛粉之即瘥

脫肛第六方十二首

灸法二首

通方 肛門主肺肺熱應肛門熱則閉塞大行不通腫縮生瘻充

白蜜二升煎令燥冷水中調可得為丸長六七寸內

肛門中到身向上頭向下少時取烱斯須即通洞泄

猪肝散 肛門主大腸大腸寒應肛門寒則洞瀉肛門滯出

猪肝 壹斤 炙

黃連

阿膠

芎藭 各貳兩

艾葉 壹兩

烏梅肉

伍兩

右六味治下節温清酒一升服方寸匕半日再若不能酒與清白米飲亦得

經中散 治肛門滯出方

故屋東壁土

壹升 碎

皂莢

參批各長壹尺貳寸

右二味先擣土為散挹粉肛頭出處次取皂莢炙暖置

灑熨取入則止

又方 灸故麻履底按令入類按令入求瘥

明良散

又方 龜頭

故敗麻後底各壹枚

右二味燒龜頭擣為散傳肛門滯出頭次將復底按入即不出矣

又方 礞石肆兩

桂心壹尺

蝟皮壹枚

右三味治下篩飲服方寸匕日一服即縮慎舉重及急帶衣斷房室周年乃佳肘後方云治女人陰脫出外用龜頭壹枚為肆味

又方 女萎一升以器中燒坐上熏之即入

治脫肛方

蒲黃二兩以猪脂和傳肛上內之二三度即愈

治腸隨肛出轉黃不可入方

生括蔓根為粉以猪脂膏温塗隨手抑按自得縮入

治積冷利脫肛方

枳實一枚石上磨令滑澤鑽安柄蜜塗炙令暖熨之

冷更易取縮入止

又方 鐵精粉內上按令入即愈

治脫肛歷年不愈方

生鐵三斤以水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再

又方 死鼈頭一枚燒令煙絕治作膏以傳肛門上進以手

按之

灸法

病寒冷脫肛出灸臍中隨年壯

脫肛歷年不愈灸橫骨白壯○又灸龜尾七壯龜尾即後

瘦弱第七方十一首

瘦弱第七方十一首

治石瘦氣瘦勞瘦土瘦等方

海藻

龍膽

海蛤

通草

昆布

礬石

一作松蘿各參

麥麩身分

半夏貳分

右九味治下篩酒服方寸匕日二禁食魚猪肉五辛生菜諸難消之物十日知二十日愈

又方

小麥麩

壹斗

海藻

壹斤

特生礬石

拾兩

右三味以三年米醋漬小麥麩曝乾各搗為散合和服一方寸匕日四五服藥含極乃咽之禁薑五辛猪魚生菜大吹大讀誦大叫語等

又方

昆布

松蘿

海藻

各參兩

桂心

海蛤

通草

白斂

各貳兩

右七味治下篩酒服方寸匕日二

又方

海藻

海蛤

昆布

半夏

細辛

土瓜根

松蘿

通草

白斂

龍膽

右十味治下篩酒服方寸匕日再不得作重用力

又方

昆布

二兩

洗切如指

大醋漬

含咽汁盡愈

又方

海藻

壹斤

小麥麩

壹升

右二味以三年醋一升溲麩末曝乾往反醋盡合搗為散酒服方寸匕日三服忌勞力

五癭圓方

葛蒲

貳兩

海蛤

白斂

續斷

海藻

松蘿

桂心

蜀椒

到掛草

半夏

各壹兩

神麩

參兩

羊靨

白朮

右十二味治下篩以半羊髓脂為丸如梧子日服二九

又方

取鹿靨以佳酒浸令沒炙乾內酒中更炙之香含咽

汁味盡更易盡十具愈

灸法

癭惡氣灸天府五十壯千金翼云又灸胃堂百壯

癭上氣短氣灸肺輸百壯 癭上氣胃滿灸雲門五十壯

癭勞氣灸衝陽隨年壯 癭氣面腫灸通天五十壯

癭灸天瞿二百壯橫二間寸灸之○又灸中封隨年壯在

兩足趺上曲尺宛死中

諸癭灸肩髃左右相當宛死處男左十八壯右十七壯女

右十八壯左十七壯或再三取瘥止○又灸風池百壯俠

項兩邊○又灸兩耳後髮際一百壯○又灸頭衝一作頭

衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所注處灸之各隨年

壯千金翼云一云石壁月騰

凡肉瘤勿治治則殺人慎之肘後方云不得針灸

瘰癧治二三十年癭瘤及骨瘤脂瘤石瘤肉瘤膿瘤血

瘤或息肉大如杯杆升斗十年不瘥致有漏潰令人骨消

肉盡或堅或軟或潰令人驚悸寤寐不安身體瘦縮愈而

復發方

烏賊骨 石硫黃各一分 白石英 紫石英

鍾乳各一分 丹參各一分 琥珀 附子

胡鷲菜 大黃 乾薑各肆分

右十一味治下篩以韋囊盛勿泄氣若瘡濕即傅若瘡

乾猪脂和傅日三四以乾為度若汁不盡者至五劑十

劑止藥令人不痛若不消加芒消一二兩佳

治癭瘰方

昆布

桂心

逆流水柳鬚各二兩

海藻

乾薑各二兩

羊鬚菜拔陰乾

右六味為末蜜丸如小彈子大含一丸咽津

又方

礬石

芎藭

當歸

大黃

黃連

黃芩

白斂

芍藥各二兩 吳茱萸一分

右九味治下節雞子黃和塗故細布上隨瘡大小厚薄

帖之乾則易著藥孰當作膿脂細細從孔中出須探膿

血盡著生肉膏若膿不盡復起如故

生肉膏

治癰疽潰漏及金瘡百瘡方

當歸

附子

甘草

白芷

芎藭各二兩

薤白二兩

生地黄各二兩

右七味以猪脂三升半煎白芷黃土滓稍以傳之

日三

方

以狗屎煨雞子傳

云膿水如前方說傳生肉膏取

瘡方見前二十一卷

陰癰第八灸法十八首

二十七首

論曰癰有四腫有腸癰卵脹氣癰水癰腸癰卵脹難瘥氣

癰水癰針灸易治

桃人

蜘蛛各五枚

桂心

疾藜子

地膚子

澤瀉

防風

五味子

橘皮

茯苓

防葵

芍藥各二兩

牡丹皮

細辛

海藻各二兩

狐陰各二兩

右十六味為末蜜和丸如梧子服十九稍加至二十九

灸法

取楊柳枝如脚趾大長二丈二十枚水浸令極熟以

治癩

故布及氈掩腫處取熟柳枝更互柱之如此取瘥
作脹不能動方
牡丹皮 各壹兩

防風

右二味治下篩酒服方寸匕日二

灸法

治卒癩以蒲橫度口如廣折之一倍增之布著小腹大橫

文令度中央上當臍勿使偏僻灸度頭及中央合二處隨

年壯好自養勿舉重大語怒言大笑 又牽陰頭止上灸

莖頭所極 又牽下向穀道又灸所極 又牽向左右髀

直行灸莖所極各隨年壯 又灸足厥陰在左灸右在右

灸左三壯在足大趾本節開

如偏大上入腹灸三陰交在內踝上八寸隨年壯○如偏

大癩病灸脊并在肩解臂接處隨年壯○陰卵偏大癩病

灸關元百壯○又灸泉陰百壯二報在橫骨邊

男陰卵大癩病灸玉泉百壯報之穴在屈骨下陰以其處

卑多不灸之及泉陰穴亦在其外○又云灸足太陽五十

壯三報之 又灸足太陰五十壯在內踝上一夫○又云

灸大敦在足大趾三毛中隨年壯 又灸足大拇趾內側

去端一寸赤白肉際隨年壯雙灸之 又灸橫骨兩邊二

七壯使莖是

男癩灸手季指端七壯病在右可灸左左者灸右○癩病

陰卒腫者令並足令兩拇趾令爪相並以一艾灸兩爪端

小兒角一丸令頓上兩爪角各令半丸上爪指佳七壯愈

陰癩灸足大趾下理中十壯隨腫邊灸之用後方云灸足大趾第二

即下橫文正中夾五壯○男兒癩先將兒至確頭祝之曰姚氏云足失趾本二壯

坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝三七二十一枚灸訖便牽

小兒令雀頭下向者囊縫當陰頭灸縫上七壯即消已驗

艾炷獨簪頭許○大凡男癩當騎確軸以莖伸置軸上齊

陰莖頭前灸軸木上隨年壯

論曰有人自少至長陰下常有乾癬者宜依癬方主之有

五勞七傷而得陰下瘻濕搔之黃汁出者宜用補丸散主

之仍須傳藥治之亦有患妬精瘡者以妬精方治之夫妬

精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似甘瘡作曰

齊食之大痛甘即不痛也

寒濕湯凡虛熱石熱當路門冷濕傷肌執聚在裏變成

熱及水病腫滿腹大氣急大小便不利腫如皮紙盛水是

氣如老蠶色陰虛堅腫為瘡水出此皆腎熱虛損強取風

陰濕傷脾胃故也治之法內宜依方服諸利小便藥外以

此湯洗四肢竟以葱白膏傅之別以猪蹄湯洗莖上莖藜

子湯方

莖藜子

赤小豆

葱心青皮

菘菜子

葫蘆

巴豆

右六味以咀以水二斗煮取八升以淋洗腫處

猪蹄湯治服石發熱因勞損熱盛當風露卧莖藜方

猪蹄

菘藜

莖藜子

莖藜子

黃蘗

右五味以水一斗煮取三升冷浴陰至日三

葱白

松葉子

葶藶子

蒟蒻根

蒺藜子

丹參 各半升 猪膏 伍升

右七味以咀煎如前膏法去滓用之

治男子陰腫大如升斗核痛人所不能療者方

雄黃 壹兩研

礬石 貳兩研

甘草 壹尺切

右三味以水五升煮減半洗腫痛處集驗方無礬石

治陰腫皮膚癢方

熬桃人令香為末酒服方寸匕日三

有人陰冷冷氣漸入陰囊腫滿恐死日夜疼悶外其甚作夜即痛悶

不得眠方

取生椒擇令淨以布帛裹著丸囊人之厚半寸須更熱氣通日再易取消瘥止

方 擣莧菜根傳之

又方 釜月下土雞子白和傳

方 醋和熟灰熨之

又方 車前子為末飲服之

又方 醋和麪熨之

又方 煮大薊根汁服一升日三不過三劑愈

治陰腫痛方

灸大敦三壯

治卒陰痛如刺汗出如雨方

小蒜

韭根

楊柳根 各壹斤

右三味合燒以酒灌之及熟以氣蒸之即愈

治陰痛方

甘草

石蜜

右一味等分爲末和乳塗之

治妬精瘡方

用銀釵線裹以臘月猪脂熏黃火上暖以釵烙瘡令熟取乾槐枝燒滿塗之

又方麝香

黃礬

青礬各等分

右二味爲末小便後傳上不過二度

治陰蝕瘡方

蒲黃

水銀

右一味研成粉小便後即傳之瘡止

又方以肥猪肉五斤水三斗煮令極爛去肉以湯令極熱

便以漬瘡中冷即愈

金方中外

廿二

又方狼牙兩把切以水五升煮取一升溫洗之日五度

治陰蝕生瘡或癢方

雄黃

礬石

各一分

麝香半分

右三味治下篩爲粉粉瘡上即瘥

治陰惡瘡方

蜜煎甘草末塗之

高氏云此見有人患此瘡者以猪肉湯漬洗之并開

黃蘗黃連末塗之

治男女陰瘡方

石硫黃爲末以傳瘡上

治男女陰癢生瘡方

嚼胡麻傳之佳

治陰下生瘡洗湯方



地榆

黃蘗 各捌兩

右二味以水一斗五升煮取六升去滓滴冷
洗瘡日再或只煮黃蘗汁洗亦佳

重刊孫真人備急千金要方卷之二十四

