

Vertical columns of text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are faint and difficult to decipher due to the image quality.

脉訣一書世之宗和者尚矣其間  
複或有兩未諭焉余於暇日采撫前  
和為經以百家為緯講明指要條析  
目曰鑿家真經者理也發先哲未  
而揆之理經者正也約諸子異同  
歸之正詎視活法瞭然在目求之  
茲以和與來者之意也劉元賓自  
括有曰覽之者不知以我與和為  
余則曰不知是篇與元賓之書又  
宣壬戌七月既望三山楊士瀛登  
父序



鑿學真經 察脉摠括

三部九候論

臟腑部位論

診候論

脉病消息論

脉病逆順論

脉訣

臟腑定位

七表脉狀

八裏脉狀

七表主病

八裏主病

七表脉

浮脉病證

芤脉病證

滑脉病證

實脉病證

弦脈病證

緊脈病證

# 八裏脈

微脈病證

沉脈病證

緩脈病證

瀦脈病證

遲脈病證

伏脈病證

濡脈病證

弱脈病證

# 九道脈

## 附雜證脈

長脈證狀

短脈證狀

虛脈證狀

促脈證狀

結脈證狀

代脈證狀

牢脈證狀

動脈證狀

細脈證狀

○心部諸脈證

肝部諸脈證

腎部諸脈證

肺部諸脈證

脾部諸脈證

五臟平脈

○病脈大者順

病脈小者順

太衝尺脈

脾胃有脈

陰陽脈證順逆

溫汗下脈法

有孕無孕脈

胎婦脈

○察病截法

五臟所主

心病虛實證

肝病虛實證

腎病虛實證

肺病虛實證

脾病虛實證

○察色聽聲

面目察色

面色逆邪

口味

聲志

寤夢

○論崇脈

論絕脈

醫脈首經目錄終

列仁齋直指方論醫脈真經

三山名醫仁齋楊

建安儒醫翠峯詹



# 察脈總括

三部九候論

三才天地人三部寸關尺凡人左右手分寸關尺者六脈之要會也寸部屬陽取法於天尺部屬陰取法於地關部陰陽相半蓋取諸人合三部凡一寸九分寸在前尺在後而關處其中也從關至魚際陽得九分有奇數焉從關至尺澤陰得一寸有耦數焉故關前為陽其脈常浮而速關後為陰其脈常沉而遲關居兩境之間介乎一陰一陽上可以通天下可以通地陽出陰入以關為限也是以寸部脈病病在頭目胃膈之上關部脈病病在腹脇胃腕之中尺部脈病病在臍腹腰脚之下三部之內各有浮中沉是之謂九候候者隨其浮中沉舉按而消息之浮為陽陽脈行之於皮膚沉為陰陰脈行之於筋骨中為胃氣胃氣行乎肌肉之中浮者病在表沉者病在裏胃氣居中者其為人之本歟所謂魚際尺澤又不徒名也寸上一分掌骨後際如魚之頸際故曰魚際尺脈之外餘脈入而不出如入深澤故曰尺澤有其名必有其義云九部九候俱以曾氣為本

## 臟腑部位論

左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命此臟腑一定之位而男女不可易者也別而言之左手寸口心臟脈所出小腸為之府心與小腸合而居乎左寸一部也右手寸口肺臟脈所出大腸為之府肺與大腸合而居乎右寸一部也左手中關肝脈出焉膽者府也肝合於膽而居左手之關右手中關脾脈出焉胃者府也脾合於胃而居右手之關腎臟之脈出於左尺府曰膀胱腎與膀胱合即左手尺部取之命脈之脈出於右尺府曰二焦命

與三焦谷即右手尺部取之腑者陽也其脈在表臟者陰也其脈在裏浮之為陽脈諸陽王執沉之為陰脈諸陰主寒此臟腑之所以合氣而人身之所以具此陰陽也然左右手寸關尺之部五臟何以分定位耶曰心者君之火君取其尊火性上炎故居左手肝者心之母上生心火木應東方故居左關腎者肝之母上生肝木水性就下故居左尺肺為五臟華蓋覆之於上金生義而居右焉故居右寸其所以下生腎水者順水之性而生之也脾為中州中央之土下稟心包絡相火之氣上生肺金故居右關其所以為中也果非五臟之不可易者乎是固然尔胃與脾並位其應右關又何以氣行乎諸臟耶曰人以穀為生而受氣於穀穀入胃而傳氣於腑臟五臟六腑皆取氣於胃其清者為榮其濁者為衛榮行脈中衛行脈外周養一身凡春夏秋冬俱以胃氣為本古人所謂精氣血氣皆由穀氣而生肉雖多不使勝食氣者是尔况夫胃台土家之氣土者五行之主而

仁元六

仁元六

經中沉三候其中各有胃氣之脈存焉此其所以氣行諸臟也或者又曰小腸為受盛之府大腸為傳送之府膽者清淨之府胃者水穀之府膀胱津液之府府之名有五而謂六府何哉蓋三焦為右尺命脈之府自膈以上曰上焦位居膻中自膈以下曰中焦位居中脘自膈以下曰下焦腎間之動氣應焉是三者蒸化水穀引導陰陽分別清濁宣行榮衛所以主持諸氣有其名而無其形者也然而右尺之命脈與右腎之命門又若同而實異耳右尺之命脈即心主包絡者是三焦為之府取象於相火相行真心君火之命宣流氣血一名膻中上朝腦戶下接元陽正氣與子午相為流通蓋得陰中養陽之候難經有曰五臟六腑經十一耳其一經者心主脈也心主與三焦為表裏俱有名而無形復設圖而明之曰手厥陰心包絡之經者止謂此也若夫右腎之命門謂腎有兩物者是左為腎以藏志右為命門以藏精腎主納氣收血化精而運入命門長養骨髓故男則化

而為精。女則盈而為月事。兩者俱屬水而氣實相通。難經有曰：金門者諸神經之舍。元氣之所繫。男子以藏精，女子以繫胞者。此之謂也。學者但觀俗呼小便曰水，大便曰火，則知左尺膀胱，停潯腎水，右尺三焦焦熱穀食，腎合膀胱，左尺之脈純乎水，命合三焦，右尺之脈純乎火，水火之義不待辯而自明矣。然則右手尺部其經手厥陰，其臟心包絡，其腑三焦，其名命脈，決非命門。君子於此，宅見定焉。金匱玉函可隅，反而類推矣。雖然，左心小腸，肝膽腎，右肺大腸脾胃命，和擊而冠脈書之首者，人不可以易此也。復繼之曰：女人反此，背看之，是豈五臟六腑其果倒裝於人乎？吁！是論男女尺脈沉弱浮盛之不同耳。三陽從地，長地氣上騰，故男子尺脈常弱而沉，三陰從天，天氣下降，故女子尺脈常盛而浮。男子陽多而陰少，其脈多應於關上，所以寸盛而尺弱；女子陰多而陽少，其脈多應於關下，所以寸沉而尺盛。故男子不可以久瀉，女子不可以久吐。男得女脈為不足，

以陰主內，故病在內；女得男脈為太過，以陽主外，故病在四肢。左得之病在左，右得之病在右。不足者虛，太過者實，二者皆不得其平。夫是之謂反。反之為義，蓋男子尺脈當弱而今反盛，女子尺脈當盛而今反弱，故也。否則如褚澄所謂婦人左手寸下之關為脾，關下之尺為肺，右手寸下之關為肝，關下之尺為心，自附其說於反。此背看之例，寧不左道以惑衆耶？五臟六腑冠履易位，况望其不謬於診耶？世為神農學者，當以尺脈第二同斷病之語為的。大腸曰黃腸，小腸曰赤腸。

診候論

凡人平曰陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，血脈未亂，於斯時也，清明在躬，志氣如神。一診之餘，洞見所蘊，若有緩急，故不可以此為拘，亦須扶持端坐，平心定氣，勿動勿言，俟其定而後應之也。下指之法，三指齊按，不若一指隨部之為精。三指齊按，可以定寸關尺之大略，可以知浮沉遲數之大綱。至於每部各有浮

中沉之候。二部分而九候存焉。若一齊舉按於三指之間。則心無兩用矣。况夫心肺俱浮。肝腎俱沉。脾為中州。自分高下。而人之五指。中指差長。或伸或縮。舉按之次。又有輕重之不等乎。善診者。莫若但用一指。隨部舉按。尤得其精。凡三部之脈。大約一寸九分。人之長者。僅如之。而中人以下。多不及此分寸也。究其精微。關之部位。其肌肉隱隱而高。中取其關。而上下分之。則入雖長短不侔。而二部之分。亦隨其長短而自定矣。是必先按寸口。次及於關。又次及尺。每部下指。初則浮。按消息之。次則中。按消息之。又次則沉。按消息之。浮以診其腑。沉以診其臟。中以診其胃氣。於是舉指而上。復隱指而下。又復按指進退而消息之。心領意會。十得八九。然後三指齊按。候其前後往來。接續間斷。何如耳。肺之脈。取以二菽。在於皮膚。心之脈。取以六菽。在於血脉。候脾以九菽。按至肌肉。候肝以十二菽。按與筋平。若附骨而得。舉指來疾者。其惟腎家之脈乎。然而右尺之診。六腑之脈。又

卷之六

六

何以權輕重耶。曰。尺澤之診。雖當重手按之。而右尺象火。舉之則洪而上也。府與臟合氣。其下者為臟。其上者為府。諸府之脈。輕手取之可也。斷病之法。四時四季。以其當旺者為主。五臟六腑。候其盛衰之極者為病。據此之脈。驗彼之證。灼見其府臟受病之處。隨其虛實。而直指之。立談可以決病機矣。所貴先調我之氣。然後可以取病人之息。人以一呼一吸為一息。一息之間。脈四至者為平。或五至而均調。與四時相應者。亦為平。脈過則謂之至。不及則謂之損。至脈離經一息。六至損脈離經一息。兩至至脈奪精一息。八至損脈奪精一息。一至離經者。離其正經。脈氣之數也。奪精者。精氣消。神氣亂。精神散脫之候也。然則和平之脈。何如哉。曰。不大不小。不短不長。不縱不橫。不低不昂。不緩不急。不存不亡。三部止等。各得其常。而且五十動而不止。此五臟俱有氣者。此其所謂和平之脈也。否則尺寸參差。上下乖錯。心迷意惑。動失紀綱。寧不重貽古人之浩歎哉。雖然。亦慶其

脈與形氣相得乎否也。人有長短小大老幼強弱而脈如之。性有剛柔緩急燥靜仁鄙而脈亦如之。形氣不相得者病。形氣相得者危。形氣反者斃。脈乍疎乍數或離絕而不至者其斃可立待也。何則人長脈亦長。人短脈亦短。肥者脈沉。瘦者脈浮。老者脈衰。少者脈盛。性急者脈疾。性緩者脈遲。性剛者脈燥。性靜者脈和。凡此皆順。順則生也。其或人長而脈短。人短而脈長。人大而脈小。人小而脈大。人壯而脈弱。人羸而脈強。性急而脈緩。性緩而脈燥。凡此皆逆。逆者幾何而不殆哉。又况藜藿之腹與膏粱之腹不同。草布之軀與純錦之軀亦異。其於平時嗜好飲酒房勞與夫臨病之頃喜冷喜熱。寒濕熱燥五色所形五味所欲。萬不侔焉。經所謂以所喜者誘之。以所惡者攻之。尤貴明辯審思而執劑也。有能察其證之有表有裏。驗其氣之有虛有實。度其剛者之易為執。柔者之易為寒。實則瀉之。虛則補之。不實不虛調而平之。此則了然習次。智與神融。昌陽掃苓必有擇之精者。

脈病消息論

脈者血也。息者氣也。脈不自動。氣實使之。然則人之脈息其氣血之先乎。故氣血旺則脈盛。氣血少則脈衰。氣血執則脈數。氣血寒則脈遲。氣血槁則脈澁。氣血平則脈和。消息盈虛其驗如此。浮為風。為虛。沉為水。為實。舉為寒。為滯。數為熱。為煩。緊為痛。為癩。弦為勞。為瘡。洪為執。為狂。隔為滯。為聚。滑為吐。為實。為下。動為驚。為痛。為勞。拘急則弦風。結則緩氣聚。則實氣乏。則散急。弦風執。洪數伏。陽沉冷。微寒伏。積實拘澁。為霧露緊。為傷寒。傷暑者虛微。中濕者沉細。乳夫血而滯。血現濡虛損而弱。筋痿風則浮虛寒。則牢堅沉潛。水蓄支飲。急弦結甚。則積甚。結微則積微。澁則血少。而氣多。滑則血多。而氣少。以至陽弦。頭疼陰弦。腹痛陽微。自汗陰微。自下陽數。即吐陰數。即瀉陽微。心寒陰滑。食注。陰揚。即浮大之脈。為陽勝病。以晝加沉細之脈。為陰勝病。以夜作七表之脈。屬諸陽。肺病易治。八裏之脈。屬諸陰。臟病難醫。



知乎此則是脉之應是病者為可驗矣諸風掉眩皆屬於肝諸  
寒收引皆屬於腎諸氣奔鬱皆屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸  
執瞽瘧皆屬於火諸痛痺瘡皆屬於心數為病在腑遲為病在  
臟浮而盛者病在表沉而實者病在裏浮盛而緊者痛在外小  
實而緊者痛在內短而急者病在上長而緩者病在上下盛則  
氣高下盛則氣脹前大後小頭痛目眩前小後大胃滿氣短脉  
出魚際喘急逆氣呼吸不足胃中氣促上焦之病寸脉主之中  
焦之病關脉主之下焦之病尺脉主之其臟有證又以其臟之  
脈驗之積陰氣也陰沉而伏發有常處痛不離其部聚陽氣也  
陽浮而動發隨上下痛走注不常氣來實強謂之太過其病在  
外氣來虛微謂之不及其病在內內而不外心腹積也外而不  
內身有熱也下而不上腰足清也上而不下頭項痛也至如諸  
有水氣目下微腫蓋水者陰也腰者陰也目下亦陰也氣類相  
從有諸中必形諸外矣然而腎之與肺皆積水也其本在腎其

仁文夫

末在肺腎氣上逆則水氣乘於肺中故肺為喘而腎為水腫  
也知乎此則受病之處為可推矣冬傷於寒春必病溫春傷於  
風夏必飧泄夏傷於暑秋必痃瘰秋傷於濕冬必咳嗽喜則脉  
散而氣緩怒則脉激而氣上悲則脉縮而氣消恐則脉沉而氣  
下悲則上焦閉憂則脉澁而氣沉驚則脉動而氣亂寒則氣  
收執則氣泄思則氣結勞則氣耗久視傷血久卧傷氣久坐傷  
肉久立傷骨而久行傷筋體中有寒故筋急而掣痛體中有熱  
故緩弛而不收痺者逢寒則皮中癢如虫行痺者逢熱則四肢  
縱而不就寒傷形而不傷氣寒則衛氣不利也暑傷氣而不傷  
形熱則榮氣內消也大腸小腸有以寒作痛者有以熱為疼者  
有以熱不調而踈數者五色見面黃赤者為熱白者為寒青黑  
則痛無疑矣大凡邪客皮毛則腠理開腠理開則邪入於絡脉  
絡脉滿則邪入於經脉經脉滿則邪入於臟腑履霜堅冰有其  
漸也其若麻來乍大乍小乍短乍長乍去乍來錯雜無尋此則

素崇致之知乎此則得病之源為可究矣請讀其文則瀉之虛則  
補之陰陽相搏損益治之弦遲微弱者可溫浮盛洪緊者可汗  
弦而小緊以至滑實與肌肉相得者可下勿汗沉弱勿下虛細  
勿吐脈微此為大戒所貴乎識病標本當觀其臟其腑受邪邪  
氣盛者直攻之病在於血當調其榮病在於氣當調其衛暑燥  
勝則與之消暑除煩之劑寒氣盛則與之溫中散寒之劑因濕  
得病為之滲其濕挾風受邪為之祛其風體中有寒筋急變痛  
則治之以溫體中有熱萎緩不收則治之以寒用寒遠寒用熱  
遠熱寒者熱之熱者寒之散者收之抑者散之燥者潤之急者  
緩之堅者柔之脆者堅之有餘損之不足益之形不足則溫之  
以氣精不足則補之以味食酸以收之食甘以緩之食鹹以柔  
之食苦以堅之泄之食辛以潤之散之酸走筋故收甘走肉故  
緩鹹走血故柔苦走骨故堅辛走氣故散其高者因而越之以  
病在上而湧吐之也其下者引而竭之以病在下而利導之也

卷之九

九

詳觀本草度知其藥之療其病審問證狀庶知其病之用其藥  
證以脈辨藥因證尋其或上熱下冷上痞下利虛羸煩燥嘔吐  
內疼證候相反者又當精思審驗劑量增減而調護之知乎此  
則治病之方又有得其所謂活法者矣雖然浮與沉相若弦與  
緊皆同緩似乎遲滑似乎數至於牢之與革伏之與沉瀋之於  
微虛之於弱大抵相類有如脈書所謂一陰二陽沉滑而長一  
陽二陰長而沉瀋一陰二陽浮滑而長時乎一沉一陽二陰沉  
瀋而短時乎一浮者是三部之脈鮮有單行學者又當於此而  
究心也叔和有曰在心易了指下難明亦在乎人熟之而已苟  
能熟之則浮沉相搏中風出血浮滑相搏中風吐逆浮實交并  
中風下痢浮弦交并中風拘急浮中之緊中風體痛浮中之洪  
中風發熱舉一為例餘以此推其義可迎刃而解矣  
素問云夫不得卧而卧則喘者水氣客之也  
水者循津液而流也腎為水臟一津液主

與喘也。凡肚皮痛者，蓋脾虛不能制腎水，水氣流注肌肉之間，當用溫脾逐水等劑。○  
虛腫用藥固當溫脾調氣逐水，然此不可無  
活血之劑，蓋水淫肌肉之間，則血化為水，與  
之俱腐。凡虛腫者，箇箇而黃，身無血色，黯慘  
不澤，以此可知也。

脈病逆順論見直指方一卷內

# 脈訣

## 臟腑定位

左心小腸肝膽腎 一右肺大腸脾胃命 腎家之腑是膀胱  
命脈外診三焦病

七表脈狀

浮按不足舉之強 芤脈中空有外傍 滑體如珠行有力

實形逼逼壯而長 弦如平按絲弦狀 緊若牽繩急轉綱

洪舉按之皆滿指 此為七表屬諸陽

八裏脈狀

脈澁如有又如無 沉舉全無按有諸 羸緩息間三度至

澁來散細軟如虛 伏須附骨其形隱 弱軟而沉快快如

澁似操刀輕刮竹 陰家八裏載醫書

七表主病

浮主中風邪 失血 滑吐實利分明別 弦為拘急緊為疼

若是澁來多發熱

八裏主病

澁寒沉冷澁風結 滯血須知其脈細 伏則積毒久寒

濡弱病家虛敗極

## 脈

者陽也按之不足舉之有餘滿指浮上

浮脈病證

浮脈多因外中風

寸浮頭痛熱來攻

關浮腹脹胃虛泛

尺見二便秘不通

浮脈主風虛風熱浮腫脈浮者表虛也

浮者陽也浮大而軟尋之中空傍掌傍有中無

尋在浮擊

亦按之則

孔脈病證

為血熱妄流行

吐衄源流寸口經

關上腸癰腹中聚

血流下部人形

孔脈上為吐血血下為大小便血血熱流注腸胃

痛如塊則則重則則痛外證煩燥寒熱吐痰沫

或生熱中出體

滑者陽也往來流利如盤中珠重手則伏不進不退

滑脈病證

脈胚胎嘔吐時

寸實氣逆關胃衰

尺間停聚腸中痢

月信難通亦主之

滑主驅吐血實氣壅痰逆痰聚宿食

實者陽也舉按不絕逼逼而長其動有力

實脈病證

實為痢疾毒陽居

寸實胃中熱有餘

關實疝來兼痢痛

小便澀脹尺求諸

實脈主上壅下塞氣滯食積

弦者陽也按之不移舉之應手其來端直狀如絲弦

弦脈病證

脈勞瘵拘急然

寸寒痛搏胃前

關弦拘滯寒侵胃

尺脹臍間溢小便

弦主筋力虛拘急自汗盜汗寒熱結聚以之浮于筋脈

緊者陽也其來勁急按之則長舉之則牽繩轉索之狀

緊脈病證

脉訣

關為疼痛百骸同 寸驗於頭關腹中 尺部來臍下痛

熱寒帶數則須通

緊脈夫此或痛緊在外則惡寒中寒緊在內則伏陽狂病或生風熱或癰疽或身痛者均可汗乾緊腹痛者可下

洪者陽也按之極大舉之亦然騰騰而上其動滿指

洪脉病證

洪之為熱屬於陽 寸主心胃及脇傍 關則胃間多熱嘔

尺中尿澀脹臍囊

洪脈長而裏俱熱血熱頭痛咽燥口乾咽澀澀澀大小便不通



微者陰也指下依稀其來輕細若有若無

微脉病證

微而為痞本來寒 腹內疼兮冷氣頑 寸口上焦寒冷滯

關於心胃及臍間

微主上敗血冷冷氣血俱虛虛寒虛寒虛汗虛驚或胸膈痞膈或不能約制其血為胸中滿中之疾

沉者陰也輕手全無重手乃得其如綿裹砂之狀

沉脉病證

沉主水兮冷氣攻 寸寒飲在胃中 關沉氣短心疼滿

尺數小便腰脚疼

沉主水兮冷氣攻寸寒飲在胃中關沉氣短心疼滿尺數小便腰脚疼

緩者陰也徐徐而來指下和軟尋之如揚柳舞風小於遲脉特

一聞耳

緩脉病證

乃風邪蘊結餘 寸於肩項及皮膚 關中胃弱風攻腹

尺數濟寒足更膚

緩脈主風邪蘊結餘寸於肩項及皮膚關中胃弱風攻腹尺數濟寒足更膚

滑者陰也輕手候之似緊不緊其來細而滑有輕刀刮竹之狀

滑脉病證

滑脉病證

為血滯痺之形 寸端陽虛而木行 心血氣衰關脈

滑主血少氣喘血虛作痛及風寒溫入口而為年榮道並高氣虛精元壯女曰有字則主胎前胎息守則主胎血脈滑者然後發散其氣

者陰也重手按之隱隱且牢呼吸三至猶甚於緩但有力於緩

遲脈為寒本積陰 寸端心膈冷難禁 關處腹痛脾間冷

遲主氣寒相冷氣血俱寒皆虛

伏者陰也沉隱不出呼吸全無重指著骨略得之矣

伏脈病證 伏脈根於積毒中 寸為氣逆聚於胃 當關停滯兼溼泄

伏脈病證 伏脈根於積毒中 寸為氣逆聚於胃 當關停滯兼溼泄

濡者陰也虛軟無力應指散細輕手乍來重手却去

濡脈病證 濡脈真陽已久虛 汗多氣怯寸中濡 關處力乏偏羸弱

弱者陰也極軟而沉細快快不前按之似絕不絕舉之則無

弱脈病證 弱脈如綿筋已痿 陽虛寸弱汗淋漓 至關各執胃虛甚

弱脈如綿筋已痿 陽虛寸弱汗淋漓 至關各執胃虛甚

長者陽也舉按如竿過於本位

長脈證狀

長脈居中狀若竿 尋之太過度三關 胃間陽毒渾身熱

大抵通腸始得安

病下陽盛入裏三四日通腸始安 毒瀉毒蓄身則壯熱通腸則安

短者陰也狀如米粒條去忽來中間有兩頭無尋之不及本位

短脈證狀

短於筋上去來頻 中有傍無米粒形 宿食不消寒氣

長噓短氣下之醒

病上氣急息短腹中停寒宿食不消一焦氣壅下之即愈

虛者陰也狀如柳絮散慢而遲舉按不足

虛脈證狀

虛軟而遲散漫耶 肉皮之上襲楊花 血虛主熱心驚悸

多汗癰癩補病家

陽衰陰盛力之汗多恍惚易驚血虛生熱血氣俱弱小兒虛風經云云暑傷氣血不傷形脈亦虛也

促者陽也貫珠而上促於寸口出於魚際尋之數急時以止而

復來

促脈證狀

促來頻數出於魚 急度關前若貫珠 血瘀肺心斑發熾

漸加不退付長吁

病主脾熱氣衝心腹內已成熱後發出於外亦主面目生瘡蓋陽盛則促漸退皆生熱加必不能

數其促不已是為孤陽絕陰

結者陰也尋之狀如麻子旋引旋收聚而還散散而還聚時以

止而復來

結脈證狀

結若回旋脈在皮 聚而還散往來遲 脾間積氣連心脹

腸痛肢疼略瀉之

陰盛則結也 四肢為氣動 可也 必自思慮 要起驚而脈結

陰盛則結也 四肢為氣動 可也 必自思慮 要起驚而脈結

者陰也動中有止不能自運因而復動者長復止尋之良久

脈訣

則起如更代之代大抵形見於外

代脈證狀

形散枯瘁病家憂

搏起因而復止留

口不能言元氣絕

臟氣絕餘賦代之而動也真形不守形散枯瘁口不能言必短之脈

牢者陰也狀如弦革而浮輕手則來重手則散

牢脈證狀

似浮弦病主勞

脈多居表附皮毛

胃前氣促身紅腫

水火相刑命不

氣居於表表實裏虛氣促於胃前故不能喘息氣結於皮膚之閒故身熱紅腫此五勞七傷之脈也六經胃痿之危脈牢而疾則發熱來性若牢而堅則發寒連疾不常寒熱來性若牢而堅是為寒結

動者陰也其狀如豆兀兀然動於內不往不來尋之却有舉之

還無多在關部

動脈證狀

如豆子不流通

其動常微隱肉中

勞損崩中兼血而

內攻氣搏藥無功

細者陰也指下如絲如線乍往下來常有之特細耳

細脈證狀

則如絲脈其微

往來皮下抑何稀

脛痠腦冷精元泄

識者如何不見幾

細脈陰絕陽內外俱冷腰痠膝冷脈力乏胃弱虛濡微溼諸脈不專在神氣以養胃之劑兼之乃所以為用明之地

右七表八裏九道蓋法象乎二十四氣

心部諸脈證

心脈形吐利紅

驚悸汗臟中空

溢關胃痛心煩燥

煩疼面熱風

帶溜舌應舌強

無紫血少音鼻谷

寒虛惕驚中熱

急則波脈痛不通

主虛飢單胃弱



緊沉水逆刺心中 若邊三部俱大數 狂燥唇瘡熱極

肝部諸脈證

肝部失血眼如遮 肢體俱癱面目斜 眼痛赤昏大數

虛氣之眼生花 滑來血實頭風熱 沉實而虛瘰加

關溢筋疼頭目眩 緊為拘急按寒邪 血虛脇脹其來高

浮其筋痿手莫舉 目翳淚淚多怒氣 三關盛泄肝家

腎部諸脈證

腎部如何濁脈形 夢遺腸氣漏其精 急弦臍硬風攻腎

細弱精虛水道傾 滑實溲腸淋作痛 緊弦耳重不聞聲

散時髓冷腰間氣 沉緊腰疼跛驚行 前急熱多應下血

小便秘澀色駢駢 真元虛敗皮膚槁 三部俱冷積成

肺部諸脈證

肺部兼實大便難 卓不聞香溢轉乾 弦細骨蒸虛熱證

濡來關熱又憎寒 滑而實大當疏利 咽燥毛焦療不難

滑帶緊沉為咳嗽 急弦咯血熱來干 溢為胃滿腸鳴氣

弦緩腸中冷結看 發熱惡寒流卓浮 肺風三部各單

脾部諸脈證

脾部兼浮胃上虛 消中飢渴日焦枯 中風延出關中溢

心下疼疼實更麤 單滑痞妨兼熱嘔 微滑客熱關肌膚

沉為癖積纏胃脇 肝勝而弦必告阻 緊則脾中疼欲吐

高時食少轉清瘦 三關俱緩脾家熱 嘔臭斷宣未得蘇

五臟平脈

浮大而散心之常 肝脈來弦細又長 肺脈短浮脾緩大

沉濡而滑腎家鄉 病脈大者順

病脈大者順

傷寒發熱與狂顛 四體煩疼熱氣煎 水氣虛浮小腸氣

積成脹滿腹中堅 風寒留伏為頭痛 中毒流行發惡涎

咳嗽暴來并熱嘔 胃煩消渴瘴黃鮮 肝邪吐血因痰閉

脈訣

一墜壓傷中痛內纏 **實** **大** **無** **足** **慮** **細** **筋** **恐** **難** **痊**

病脉小者順

久嗽吐噎食難消 心腹虛寒上氣抽 氣快染邪為腹脹

中風口噤或筋攣 汗之不止加身冷 厥逆前寒重索裘

下痢泄瀉并霍亂 金瘡傷重血頻流 衄尿唾吐兼腸血

產後傾紅月信留 **細** **弱** **皆** **可** **治** **必** **難** **痊**

太衝尺脉

寸關無脉已沉昏 脚面猶兼尺脉存 此理恰如枝葉悴

尚餘生意在其根

脾胃有脉

尺中弱甚似無根 脾胃于今脉尚存 大腑色黃猶進食

斯人終不到泉門

陰陽脉證順逆

證屬於陽陰脉形 神丹執劑少安平 若還病候關陰證

陽脉回時又却生

温汗下脉法

大凡温藥脉 **浮** **緊** **須** **知** **汗** **可** **施** 脉若來長兼 **緊** **實**

此為可下不須疑

有孕無孕脉

婦人月信不通行 尺脉求之 **滑** **動** **頻** 斷絕其間無孕候

來而不絕定懷身

胎婦脉

少陰動甚主懷胎 血旺諸經氣轉摧 尺 **滑** **數** **分** **中** **不** **絕**

双關單 **滑** **胃** **難** **開** **浮** **沉** **二** **部** **俱** **平** **等** 流利相通疾往來

下脉切繩珠轉狀 離經腰痛產相催

察病截法

**浮** **主** **風** **或** **風** **薄** **不** **仁** **肝** **主** **風** **大** **傷** **風** **羸** **寒**

**傷** **於** **寒** **或** **中** **寒** **傷** **於** **寒** **或** **中** **寒** **傷** **於** **寒** **或** **中** **寒**

脉訣

脈訣

浮滑胃寒 浮而後脾寒 沉遲相冷 乍疎乍數寒熱

緊而數寒熱汗下 數胃熱煩渴熱嘔 數主熱 虛而數心煩疼

骨數結熱 數心下熱煩亦主消渴 諸脈數惟腎脈微滑主消渴 關脈數胃熱

心肝肺脈數潮熱 長滑胃熱 右尺大二三焦熱 關脈數胃熱

肝旺或細而絕下血 滑而堅血痺結 寸洪尺滑痺血挾熱為淋 微血崩

弦緊癥痛 沉弦痺痛 弦而鉤脇下刺痛 弦而滑主虫痛

弦而緊脇下痛 緊而缺刺痛 關脈石而缺氣痛 肺滑大咳嗽

緊而胃裏痛 關脈緊而細虫痛 寸口脈促氣逆喘急 緊而滑吐逆

肺洪急熱嗽 寸口脈促氣逆喘急 浮大腹滿喘息 浮之主中滿 弦而實積

肺滑急氣壅 寸口脈促氣逆喘急 浮大腹滿喘息 沉伏不往不來在中 沉伏霍亂

寸脈數吐 脾滑嘔吐 滑細嘔吐 沉細停飲 尺浮滑二便難

沉細停飲 脾脈大有涎 滑實宿食 沉滑宿食 尺浮滑二便難

短而滑消病食積 沉細積聚 浮之主中滿 弦而實積 尺浮滑二便難

結二積 肝疾筋暴急 沉伏不往不來在中 沉伏霍亂 尺浮滑二便難

肝急客忤 浮疾顛狂 沉伏霍亂 尺浮滑二便難

浮數二便澀 尺浮大二便澀 心脈盛腎脈虛赤滿漏精 諸脈微尺脈微虛勞

尺數小便赤澀腎弦小便多 心脈盛腎脈虛赤滿漏精 諸脈微尺脈微虛勞

心虛腎微而散少血漏精 脾脈弱手足乏力 脾滑而弱飲食不進

脾滑嘔吐或飲食停滯 肺橫隔氣不升降 肺滑而弱飲食不進

肝旺而衄頭旋目暈亦主血瘀 下部脈微男子失精婦人帶下

三部脈數形如釵股壘毒脈則生脈則不保

五臟各有本體之脈但三部皆要和軟則者胃氣

五臟所主

精神聲舌掌皆心

血脈澀便汗可尋

肝主爪筋兼眼泣

藏魂生血貫衝任

腎司耳骨背腰脚

齒唾精元水竇深

氣魄皮毛俱屬肺

腸喉鼻涕既聲音

肚臍唇口并肢體

涎沫於脾好酌斟

皆以五行生尅論

要令和順莫相侵

心藏神肝藏魂腎藏志肺藏魄脾藏意肝主筋絡於舌本系於牙關

心病虛實證

心虛恍惚且多驚

色少曾懷脹不停

膊胛背膺并脇痛

舌乾面赤實之形

肝病虛實證

肝實頭旋目怒紅

脇攻氣逆耳偏聾

如人將捕為虛證

筋脇拘攣兩眼蒙

腎病虛實證

腎痿厥逆少寒時

腰脊胃疼數小遺

旺則腹澎而體腫

尿黃汗泄面眸驚

肺病虛實證

肺盛填膈嗽喘嘈

背有股脛尻疼多

嗑乾咳血流清涕

弱狀無如氣乏何

脾病虛實證

脾衰肢弱吐多酸

脹泄腸鳴不任養

強候脚疼身體重

苦飢腹滿小便難

右五臟病證虛者補之實者瀉之

察色聽聲

四時明潤色安平

響亮之聲豈病音

聲色前知神聖事

良工揣度在曾察

面目紫色

目如赤白黑兼青

面無黃時病以寧

目若黑青并赤白

面無黃色陰難醒

面色逆邪

假如肝病面青時 白色當春未易醫 是謂肺金乘尅木 其餘倣此以推之

口味

肺辛心苦及肝酸 鹹腎甘脾酸舌端 所好即知其臟病 更將脈證細尋看

聲志

心喜笑兮肝怒呼 呻吟屬腎恐尤多 肺家聲哭憂為志 脾志乎思聲必歌

審夢

陰盛水兮陽火光 陰陽俱盛鬪而傷 下虛飛去上虛墮 喜怒憂思以臟詳

論崇脈

脈訣

崇家面色黯慘或斜視如淫凡脈乍大乍小乍浮乍沉乍長乍短乍有乍無或錯雜不倫或刮駛暴至或沉伏或雙弦或鈞喙或衮運或橫隔或促散或尺部大於寸關或關部大於尺寸是皆染崇得之刮駛鈞喙多見於脾洪運衮衮多見於肝橫隔促散多見於心肺大抵崇家心脈虛散肝脈洪盛尤可驗焉蓋心藏神肝藏魂心虛則驚惕昏迷神不守舍而邪氣得以入其魂爾

論絕脈

彈石之脈狀如硬蛇觸石辟辟而急腎氣絕也解索之脈狀如繩索解脫散於兩傍於尺見精血竭也雀喙狀如雞雀頻喙止而復來於尺見穀氣絕也屋漏狀如水滴地上又復賤起胃氣絕也蝦遊狀如蝦浮不動瞥去倏來神魂絕也尺脈連連如大蝦鬚者死亦魚翔狀如遊魚高之頭定尾搖命脈絕也金沸一脈如羹上肥涌涌而浮此陰陽之氣絕也所謂僵刀者如側刀刃其與彈石類焉若代若牢亦為危脈代者動中一止如更代之代牢似乎革經曰渾渾革至如湧泉謂出而不返也又曰牢而搏如

意立累然者死牢之與革無以異也前所論覆蓋二脉自關  
前進上出於魚際者謂之溢自關後退下入於尺澤者謂之覆  
是皆陰陽不守離經無根必死之脉也凡篤病六脉瀉刮按之  
無力若能用藥挽得胃氣脉回三部和緩瀉瀉而來必有生意  
或一向瀉刮而胃氣之脉不回是雖息數猶存終不能保其諸  
篤證但見右尺命脉和數而大厥疾其有廖乎

新刊仁齋直指方論醫脉真經

終

脉訣

新刊仁齋傷寒類書活人總括目錄

○卷之一

活人證治賦

○卷之二

傷寒總括

調理傷寒統論  
陰陽虛盛用藥寒溫辯義  
表裏虛實辯義  
六經用藥格法

○卷之三

傷寒證治

表裏汗下二證  
三陽三陰脈  
汗下溫正法  
變汗法  
三陽外證

變下法

變溫法

傷寒見風傷風見寒脈證

傷寒傷風脈證

三陽合病三陽明附

春溫夏熱

太陽陽明併病

風濕中溫

溫毒中暑

瘧病溫瘧疫癘

痰證傷食類傷寒

虛煩脚氣類傷寒

○卷之四

發熱

潮熱

寒熱

寒熱似瘧

熱多寒少

汗後寒熱

下後有熱勞食復附

惡風

惡寒

背惡寒

四逆

厥

頭痛

項強

咽痛

身痛

腹痛脹

奔豚動氣

腹滿

胃腸滿

脇疼

自汗

無汗

頭汗出

手足汗 不可下 不得汗 不可汗

○卷之五

懊懷 痞 結胃  
氣短 喘 咳嗽  
咳逆 乾嘔 嘔吐  
吐血 衄血 下膿  
發黃 發斑 舌白胎  
口燥咽乾 煩燥 渴  
漱水不嚥 可與水 小便自利  
遺溺 小便難 大便下利  
霍亂 失音

○卷之六

佛鬱 冒眩 心動悸

發狂 直視 譫語  
搖頭 戰慄 瘕瘕  
筋惕身瞤 不仁 不得眠  
多眠 瘥後昏沉 飲酒復  
尋衣摸空 百合 臟結  
兩感 虺厥狐惑 陰陽易陰陽交  
陰毒陽毒 陽證似陰陰證似陽

○卷之七

小柴胡湯加減法 傷寒諸篤證  
傷寒別名 傷寒戒忌 藥有寒溫相濟  
據脉 驚省 藥方  
產科

新刊仁齋傷寒類書活人總括目錄





大柴胡湯大承氣湯隨輕重而度用之不過除邪輔正而已。原韻四句汗下綱領表證脈浮裏證脈實有能察脈以辨其裏驗證以審其汗下治法無餘蘊矣。○脈微遲遲壞病虛煩咽乾諸血諸動氣並不可汗。○脈浮濇小便清或少嘔吐厥逆喉塞不可動氣並不可汗。○非汗候又不可下表裏無證但解和證非汗證又非下證加減為良解表加桂通裏加枳殼半表半裏證亦王之敗毒散和散散可以參用。○若經多日不大便目中不明或熱不止脈雖浮數可小承氣湯下之。○有浮脈後作裏煩內外俱見惟滲油以五苓散湯大便頭汗出微惡寒與小柴胡湯。○又桂枝人參湯即理中湯加桂枝可以解表攻裏皆主治表裏俱見之證。

③論隨變隨應不可拘以日數及榮衛府臟受病淺深

意曰脈以證別證因脈尋。○據脈以驗證問證而對脈證如此脈後則加減於其間證與脈大異則消息揣量俟其形見然湯脈浮長弦而盛陰家細微緩而沉。○太陽陽脈浮長少陰脈沉細。○微緩尺寸俱如此手六經足六經始證遠陽盛即下胃府。○便為陽盛入內之證即為陽明陽明即胃府也。○用初得若臟病直溫少陰陽受病則在胸陰受病則入臟發於陽則先屬太陽發於陰陰則先屬少陰。○此二經受病最多。○若初得病便作脈沉厥冷惡寒即是少陰用乾薑甘草湯。○四逆湯溫之。○少陰反發熱證麻黃細辛附子湯。○少陰屬腎太陽屬膀胱合為臟腑此二經受病最多者諺曰傷如脈浮多日以有表但病在太陽而究心寒編打下虛人是也。○如脈浮多日以有表但病在太陽而究心張氏云凡病至十餘日太陽證猶在而脈浮者但皮膚為衛血治太陽不可拘以日數。○桂枝麻黃各半湯主之。○皮膚為衛血

脈為榮榮行中衛行外。○衛行脈外在皮膚榮行脈中在血脈風傷榮氣其病深故用麻黃湯以發汗合而謂之大太陽表證也。○肌肉屬胃陰證屬臟胃入裏臟尤深者陽證之裏臟者陰證之裏入胃當下入臟當溫胃府為裏臟則又深於裏者矣。

④論一證之中有表有裏

豈不以惡寒一也外執屬陽無執屬陰。○大陽惡寒脈浮有熱用惡寒脈沉無熱用理中湯。○四逆湯。○大陰脈陰皆不惡寒然厥陰只有證大出汗熱不去中拘急肢厥下利厥逆惡寒者四逆發熱一也不渴為表見渴為裏。○表有熱不利厥逆惡寒身熱四肢厥脈滑白虎加人參湯欲知內有熱無熱但以身熱四肢厥脈滑白虎加人參湯欲知內有熱無熱但陽發熱有先溫乃汗之證。○太陽發熱下利腹滿身發熱先用桂枝湯有先解後攻之理。○太陽病不解熱結胸膈其人喜忘如狂而血自下下者愈若外不解可先與桂枝湯外已解但

小兒結急乃以桃  
仁承氣湯政之  
身亦作熱診之浮則腑候外應體痛自利沉

而得則臟家病起  
均是身體疼痛  
脈沉自利者裏不和用四逆湯○丹下

利手足溫少陰厥陰下利身熱大陰熱而心滿噦曰支飲涼而脇

堅嘔為裏水  
身熱乾嘔下利身冷熱而心下怔忡短氣微噦微利心下

痞滿引脇腹疼痛此為表已解而裏有水微腫體如火反欲被寒在骨

髓熱在皮膚身極冷猶惡衣寒在皮膚熱在骨髓表熱裏寒者

與陰旦湯寒已用小柴胡湯加桂○裏熱表寒者狀如熱厥脈

沉而滑先與白朮加人參湯熱已用桂枝麻黃各半湯○又少

陰惡寒而時煩不欲  
厚衣大柴胡湯下之

大抵無身熱無頭疼則溫以陰經之劑  
論病在三陰當溫病在胃膈可吐及合病

蓋諸陰經絡上至頭而不至頭故也理中湯其草乾姜湯四逆

湯溫之○性厥陰嘔吐涎沫有頭疼而無身熱用吳茱萸湯○

少陰有反發熱而無頭疼然其脈沉不可誤下以麻黃細辛附

子湯溫而表之○但陰證終無大熱亦無汗縱有微熱亦或下

利手足厥也○世俗不識陰證者每遇  
有痰妨有胃滿則吐其

膈上之忪  
瓜蒂散散施子破湯或益湯肺微者不可吐只用半夏

茯苓枳殼北  
三陽明俱可下惟合病惡寒者有表當汗

漢陳皮之劑  
大便後胃中燥大便堅小便數屬脾約負不惡

寒反惡熱大便利小便後胃中燥大便難亦屬調胃承氣湯○少陽陽明本少陽

病因發汗利小便後胃中燥大便難亦屬調胃承氣湯○少陽陽明本少陽

陽明即本經自病屬小承氣湯大承氣湯三者俱可下○惟大

枝各半湯○又喘將太陽陽明合病喘而胃滿者不可下可與

合病下利麻黃主喘故也○少陽陽明合病治併太陽在外解若歸根

入胃者本條用攻  
太陽證者可汗但見陽明證者一經但見

陽盛有桂枝之斃陰多戒承氣之衝  
桂枝下咽陽盛即斃以火

齊水也  
當下而汗為無陽為厥竭為譏語當汗而下為痞氣為

懊懣為結胸  
當下而汗則外泄其正氣內之邪氣乘虛而出

入焉又有伏陽證候而脈沉伏尤不可誤用熱藥溫之輕則變

證重則害人常須體認○下膈上竭者由其妄汗動血口鼻耳

目有血出也○懊懣者真氣內  
失下則血凝氣滯以執厥當下

虛客氣動膈懊懣煩躁之狀  
失汗則熱閉狂忘

有熱其脈沉滑指山時溫小承氣湯主之  
失汗則熱閉狂忘

而蓄膿  
當汗不下汗蓄熱化為毒血毒血如狂白迷譫語心忪語

小便多大便黑小腹結急皆血證也  
輕者犀角地黄湯重者桃

仁承氣湯三黃自抵當湯食取盡黑物為度○若外不解者用

新刊仁齋直指醫脈真經  
傷寒類書活人總括

在解後後條列經云血在下後脈數久便堅當解痰紅之毒無熱  
在下後脈數不解消穀易飢至六七少者熱壯與斷下轉加熱  
悶之凶止之則轉加熱悶而死矣

六論審證投藥不可輕用

嘗攷夫無汗煩燥而脈浮緊者可服青龍元汗脈緊為傷寒無汗而煩燥具脈浮緊此為傷風見傷寒證候與俱盛小青龙湯汗之無汗喜渴而脈單浮者勿

投白虎無汗脈浮表未解而陰氣盛雖渴不可用白虎太寒可

熱遠熱之為當用寒遠寒而後愈冬溫夏清用藥亦然謂如夏

次則五苓散非可輕進雖渴不可用五苓散恐利其小便胃愈

陽藥以甘辛湧泄為陰劑惟酸苦陽虛陰盛汗之則愈故用甘

氣動氣曰奔豚桂枝湯主之吐取歧行小蒂散掩子奔豚動氣用桂

心結不散氣與之搏即發與脈治法多利小便謹勿汗下或利

腎惡燥故去木加桂蓋嘔由薑主嘔家聖藥是生薑千金之藥與

七論脈證順逆及諸惡證不治

又當知陰病陽脈與汗後而平靜者活陽病陰脈兼汗已而疾

洪者亡陰病陽脈則不成陽病陰脈則不水得汗而脈靜者生

而煩加吐瀉腎證未易保治蓋真陽氣絕而虛陽獨川也

利反能食除中何以當陽陰證厥逆或氣出嘔悶或肢冷臍硬

下在胃不... 或口噤汗戰或肝弦土傷... 兩感之與臟結... 重喝桑衣而直... 經代脉... 論變例法當通變



斷之曰陽明無汗少陰反執取表以溫... 陽明反無汗皮上如虫... 少陰口燥陽明汗

多急攻其內者口燥自利心下痛則為積... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

惡寒而喘持煩不飲衣被為表寒裏熱... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

利心下痞下腹滿下縮囊皆陰證之下劑... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

入脈承氣湯下之... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

漏虛溫濟脉乃陽家之溫輩... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

通用桂枝加附子湯... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

為陰陽俱虛黃耆建中湯... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

湯大便不利汗後或下... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

發燥... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

又當識脉之所在... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

又當識脉之所在... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

又當識脉之所在... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

又當識脉之所在... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

又當識脉之所在... 少陰口燥陽明汗... 少陰口燥陽明汗

燥而不飲水者是露靈散主之。○厥有二證初得病身熱燥烈  
大小便秘以至於厥者為熱厥其脈沉滑可下之。○後身不  
熱大小便利常妻清而厥者為冷厥其脈沉遲可溫之。○又有發  
寒熱而厥者由色不澤脈弱胃氣不運者為冷厥其脈沉遲可溫之。○  
之汗解則生服藥無汗或脈不至者不治。○凡當汗當下者如  
更有他證則須切脈不可汗下且解其汗下者不治。○凡當汗當下者如  
如脈來微遲虛滑不可汗下且解其汗下者不治。○凡當汗當下者如  
下目與通和血脈脈間動氣不可汗下且解其汗下者不治。○凡當汗當下者如  
俟其脈不微遲虛滑不可汗下且解其汗下者不治。○凡當汗當下者如  
表裏而汗下之至若結胃當下厥冷則微即未可下且解其汗下者不治。○凡當汗當下者如  
湯之馬熱厥當下疑似未辨且以理中湯試之。○證勿向急則  
誤誤則不可救解戒之哉。○如厥者湯試之。○證勿向急則  
考多附為要藥血熱以小柴胡主之。○汗下溫法酌量而已。○傷  
寒流行病氣自毛髮中出也。○他病  
亦然小兒驚風發熱將產亦如是。

傷寒格法張長沙開其源朱奉議導其流前哲後賢發明秘  
妙吾儒之孔孟矣世有謂傷寒論其辭艱深亦有以問答繁  
多增益意度議活人書者多見其不知量也活人宗師張朱  
作古是篇刊布不敢名稱使學者稽為驗為決以溯古人之  
用心皆知起敬

增修仁齋傷寒類書活人總括卷之一

# 傷寒總括

調理傷寒統論

傷寒汗下溫之法最不可輕據脈以驗證問證而對脈太陽者陽證之表也陽明者陽證之裏也少陽者二陽三陰之間太陰少陰厥陰又居於裏總而謂之陰證也發於陽則太陽為之首發於陰則少陰為之先太陽惡寒而少陰亦惡寒但太陽之脈多浮少陰之脈沉細與其他證狀亦自異也發執惡寒身體疼痛或自汗或無汗是為表證可汗不惡寒反惡熱手掌心并腋下澀澀而汗口燥胃乾吐熱腹滿小便如常不白不少而大便秘鞭是為裏證可下厥冷拳默自利煩燥而無身熱頭疼是為陰證可溫單浮與浮洪浮數浮緊者此表病之脈滑實弦緊中間數盛者此裏病之脈沉而微細緩弱者此陰病之脈在表者邪搏於榮衛之間在裏者邪入於胃府之內胃府而下少陽居焉若傳次三陰則為邪氣入臟矣胃府如府庫之府故謂之裏之三陰之經曰臟大抵以剛劑溫之榮與衛均為表也亦可汗也然自汗者為傷風風傷衛氣衛行脈外其脈浮緩而病尚淺則以桂枝湯助陽而汗之輕無汗者為傷寒寒傷榮氣榮行脈中其脈浮緊而病稍深則以麻黃湯助陽而汗之重榮衛固為表也胃府亦可以為表也然以府臟而分表裏則在府者謂之表在臟者謂之裏胃取諸府可以表言若合榮衛府臟而分之則表者榮衛之所行裏者胃府之所主而臟則又深於裏者矣榮衛屬太陽經屬三陰經審脈問證辨名定經真知其為表邪則汗之真知其為裏邪則下之真知其為陰病則溫之表有邪則為陽虛陰盛而發表之藥溫裏有邪則為陰虛陽盛而攻裏之藥寒陰經受邪則為臟病而溫陰之藥執是二者貴乎得中否則寧可不及亦不可太過得中者上也不及者次也夫苟太過則斯為下矣蓋



得中者如此而汗知彼而下又如彼而溫桂枝承氣投之不差  
於理中發而必小重者用藥緊輕者用藥微不肯陰陽深合  
法度故曰得中者上也寧可不及者證與脈大同而小異名與  
證似異而實同當五分取汗而三分之劑散之當五分轉下而  
三分之劑導之當純剛溫裏而略溫之劑扶持之未可汗下者  
與之和解未可遽溫者且安其中若猶未也則增減於其間細  
細而加消詳徐徐而就條理雖未遽安亦無傳變故曰寧可不  
及者次也太過者粗工不知深淺輕舉妄動者為之或問證而  
知脈亦執脈而不對證或名實之不辨或日數之為拘遂有  
下太之失甚者漢曰不問陰陽當汗而反下則為痞為結  
自為懊懣當下而反汗則為識語為無陽動經為下厥上竭至  
於陽厥似陰之類誤以剛劑投之舌黑發狂悶亂可畏性命至  
貴可輕試哉故曰夫苟太過則斯為下矣大抵治傷寒有法與  
治他病不同條例審的藥進病除已劑少差生死立異古之人  
處方立論曰可汗曰可下曰可溫曰和解曰少與曰急下曰隨  
證滲泄與夫先溫其裏乃發其表先解其表乃攻其裏謂知音  
者若網在綱有條不紊此固得中者之事也若班固所謂有病  
不服藥常得中醫許仁則以為守過七日最為得計此非寧可  
不及之意乎王叔和善脈而且以承氣為戒初虞世善方而論  
傷寒一節且謂麻黃桂枝非深於其道則莫之敢為又非所以  
為太過者之戒乎論而至此則知古人之立論甚嚴而傷寒汗  
下溫之法其不可輕也信矣雖然汗下溫之法固自有定論也  
經云傷寒六七日目中不了了無表裏證脈雖浮亦有可下者  
少陰二三日無證亦有可汗者陰證四逆法當用溫而四逆散  
輩中有柴胡枳殼此豈厚誣哉曰醫在九流之中非圓機之士  
不足與語也何者脈雖浮而亦可下者無表裏證謂六七日大  
便難也藉使大便不難其敢輕下之乎少陰病亦有發汗者謂  
陰證初病便屬少陰而反發熱少陰本無熱今反發熱者是表

猶未解故用溫藥微取其汗也藉使身不發熱其敢輕汗之乎  
四逆湯用薑附四逆散用枳柴一熱一寒並主厥逆固不侔矣  
然傳經之邪與陰經受邪初病便厥者不同故四逆散用藥寒  
主先陽而後陰也四逆湯用藥熱主陽不足而陰有餘也其敢  
例視陰逆一切溫之乎不特此爾傷寒有始得病其脈沉數外  
證腹滿口燥煩渴即為陽盛入內之證醫法以下劑攻之不可  
槩以一二日太陽而發表也前所謂陰證傷寒初病以來便見  
脈沉厥冷惡寒更無頭痛即是少陰受病之證醫法以乾薑附  
子輩溫之又不可槩以三陰傳次先太陰而後少陰也若張氏  
之論日數則曰日數雖多但有表證而脈浮者猶可發汗日數  
雖少若有裏證而脈沉實者即須下之是日數之不可拘也如  
此孫思邈云服承氣得利謹不中補熱氣得補復成此所以言  
實熱也王叔和有曰虛熱不可大攻熱去則寒起此所以言虛  
熱也二人之言殊途同歸是虛實之不可不辨也如此又況寒  
溫熱同實而不同名暑濕風異種而有兼病異氣之相乘他邪  
之並作表證中之有不可汗裏證中之有不可下三陰可溫而  
攻積證者不同表裏俱見與半表裏無表裏者有異中暑熱病  
疑似難明傷寒傷風脈證互見陽明本多汗而有反無汗之形  
少陰本無汗而有反自汗之證或陰極發燥熱極發厥陰證似  
陽陽證似陰差之毫釐繆以千里又有痰證食積虛煩脚氣證  
似傷寒不可以傷寒之法拘之自非心領意會達變知幾體認  
之精發用之審則縱橫泛應幾何而不窮哉孔子曰可與適道  
未可與立可與立未可與權是說也亦在夫人權之而已矣

### 陰陽虛盛用藥寒溫辯義

外有脈內無脈為外實內虛外無脈內有脈為內實外虛虛實  
之義隨其脈之有無者言之人所共知也若夫傷寒一書所謂  
陰陽虛盛則精微之義不無辯析於其間四十八難曰病之虛  
實山者為虛入者為實蓋外有脈者表之真陽氣虛故陰邪以

盛出而乘陽是以脉浮於外其病在表法當汗之當其陰邪出  
表脉浮於外之時不可自惑以為陽脉盛也內有脉者裏之真  
陰氣虛故陽邪以盛入而乘陰是以脉實於內其病在裏法當  
下之當其陽熱入裏脉實於內之時不可自惑以為陰脉盛也  
是說非古人之立意也蓋使人知如此之為陰盛則抑陰而助  
陽如彼之為陽盛則抑陽而助陰陰盛而邪出於外者發表之  
藥當性温以助陽如桂枝湯之類是也陽盛而邪入於內者攻  
裏之藥當性寒以抑陽如承氣湯之類是也或曰陰出而乘於  
外是陽之不足也發汗則亡陽而汗之何哉是大不然陰邪搏  
於外不汗之則邪何由去桂枝之性温温之乃所以助陽陽有  
所助而長則陰邪之所由以消甘辛發散為陽者此也張氏所  
謂承氣入胃陰盛以亡者正恐陰盛出外而誤以承氣下之外  
得寒以助邪內攻虛而損正安得而不亡或者又曰陽入而乘  
於內是陰之不足也陰受病則當有以温養而下之何哉是又

不然陽邪入於內不下之則邪何從出承氣之性寒寒之乃所  
以抑陽陽有所抑而微則真陰之所由以長酸苦湧泄為陰者  
此也張氏所謂桂枝下咽陽成即斃者正恐陽盛入內而誤以  
桂枝汗之內得熱以助邪外撤虛而損正又安得而不斃觀古  
人發表之藥多温攻裏之藥多寒則知陰陽虛盛之意微非止  
為汗下設正所以為用藥寒温設也可不明辯哉

之須加黃芩升麻柴胡湯  
葦又二月用之須加官桂

### 表裏虛實辨義

傷寒治法內則審脉外則審證大要辯表裏虛實為先病在表  
有表虛有表實病在裏有裏實有裏虛又有表裏俱虛表裏俱  
實毫釐之分貴乎早辯表虛者脉浮而緩自汗惡風用桂枝湯  
以解肌表實者脉浮而緊無汗惡寒用麻黃湯以發汗裏實者  
脉伏而牢心腹痛結或大便堅小承氣湯大柴胡湯以下之裏  
虛者脉沉而弱自利厥冷理中湯四逆湯以温之至若表裏俱

虛則舉按脉虛如急救表裏之類下利身疲先與四逆湯清便  
自訖後與桂枝湯是也表裏俱實則舉按脉實如表裏俱見之  
類脉浮赤與五苓散誤下腹痛與桂枝大黃湯是也大抵出  
入傳變各有處所淺深輕重時刻異同精對無差立當見效

### 六經用藥格法

太陽屬膀胱非發汗不能愈必用桂枝麻黃以助陽却邪陽明  
屬胃非通泄不能痊必用大黃芒硝以疏利陽熱少陽屬膽無  
出入道柴胡半夏能利能汗消解血熱黃芩佐之太陰脾土性  
惡寒濕非乾薑白朮不能溫燥少陰腎水性惡寒燥非附子不  
能以溫厥陰肝木藏血榮筋非芍藥甘草不能滋養此用藥經  
常之道也然三陽汗下和解人皆知之至若太陰溫燥不行則  
亦當溫利如桂枝加大黃之類是太陰自陽明而出也少陰雖  
用附子亦有麻黃細辛之證是少陰自太陽而出也厥陰類例  
其間有用桂者是厥陰自少陽而出也其或太陽少陽二經鬱

五

閉則三陰皆自陽明出焉故三陰皆有下證如太陰腹滿時痛  
為有積少陰咽乾口燥為腎汁乾厥陰煩滿耳聾舌卷囊縮為  
毒氣入臟皆當下之知乎此則傷寒用藥之法隨變隨應而不  
窮矣雖然傷寒七日傳遍六經此約法也或首尾只在一經或  
間傳一二經而止又不可拘但據脉與外證驗之是為活法

是篇用字膀胱即太陽胃即陽明膽即少陽太陰曰脾少陰  
曰腎厥陰曰肝蓋取其音律正耳

傷寒內實大熱通利之後已得輕瘥且量進白粥兩三日未  
可遽與和胃之劑熱氣得之又復作也繼此旋以易簡溫膽  
湯入竹筴與之或二陳湯加前胡亦可矣二藥傷寒瘥後通  
用無熱者只守本方世俗以四君子湯為貴細循習用之不  
思內有白朮溫而閉氣往往因此而燥闕矣

# 傷寒證治

表裏汗下二證

發熱憎寒體痛時

脈浮解表定無疑

不憎寒却煩憎熱

多汗咽乾裏下之

○表證脈浮身體肢節疼痛惡風惡寒○裏證脈實而不浮不惡風寒反惡熱身不疼自汗譫語不大便或咽乾腹滿○表裏俱見證張氏用**五苓散**真人用**桂枝加大黃甘草湯**一塊

**生薑兩箇****芍藥六兩****甘草** 滿盞水煎存七分表裏傷寒

只一掃山陽樓

### 三陽三陰脈

陽屬膀胱胃膽間

陰居脾腎更連肝

浮長弦細沉微緩

審脈仍將外證看

### 三陽外證足之三陽

腰脊頭疼熱惡寒

目疼汗執鼻中乾

耳聾口苦時乾嘔

胃脇堅痰寒熱干

○太陽證腰脊強頭項痛發熱惡寒若傷風則鼻塞惡風○陽明證目疼身熱鼻乾不惡寒反惡熱自汗出不得卧內實大便難○少陽證耳聾脅脇痛或口苦咽乾目眩或往來寒熱而嘔○陽病體輕脈輕外證壯熱煩渴大小便秘頭面有汗昏漬氣亂揚手擲足

### 三陰外證足之三陰

腹滿肢溫利不煩

舌乾燥渴或憎寒

唇青舌卷多煩滿

筋急囊間縮又攣

○太陰證腹滿或痛手足溫自利不渴喉下乾○少陰證口燥舌乾而渴或口中和則惡寒常默默欲寐不欲見光明有時腹滿又有咽痛二證○厥陰證唇青舌卷煩滿筋急囊縮

婦人則或消渴飢不欲食食即吐衄。○陰病體重脈重外證厥冷唇青腹滿不渴大小便自利惺惺而靜引衣自蓋足攣而卧二陰病無身熱無頭痛其或渴者陰極發燥也。○陰證脈青舌黑或白胎或卷強者用生薑頻擦唇口續又易之薑能回陽生胃解毒溫血散氣擦之後陰消陽長黑轉而紅最為良法

汗下溫正法

○太陽傷風自汗惡風桂枝湯傷寒無汗惡寒麻黃湯風寒俱盛則以桂枝麻黃湯兼用自汗小便數者勿用桂枝可也

○少陽傷風自汗惡風桂枝湯兼用自汗小便數者勿用桂枝可也

○陽明不惡寒反惡熱自汗大便難用小承氣大柴胡汗多者胃汁乾急下大承氣無汗惡寒升麻湯有汗脈遲微惡寒為表未解桂枝湯無汗脈浮發喘麻黃湯○少陽並屬小柴胡湯柴胡湯薑冬月用之須加官桂○太陰自利不渴為臟

寒運中湯四逆湯陰證手足必微厥若手足溫便是太陰胃

膈脹滿欲嘔連中風腹痛脈浮桂枝湯腹滿時痛桂枝加芍藥湯痛甚桂枝加大黃湯○少陰脈沉口不乾舌不燥及背

惡寒者並用四逆湯小便白者亦用四逆始得病脈沉反發熱麻黃湯辛附子湯口燥咽乾而渴急下之用大承氣○厥

陰脈微浮為欲愈不浮未愈小建中湯脈浮緩如瘧狀者囊不縮亦欲愈桂枝芍藥各半湯脈沉短者囊必縮為毒氣入臟可也

○三陰中寒微則理中湯稍厥或中寒下利則乾薑白朮湯大段重者用四逆湯無

脈者用通脈四逆湯六經惟少陰難治大要以口燥而渴知其熱脈沉而遲別其寒然亦有表裏無熱但煩憤默默不欲見光明其脈沉細或時腹痛此可以四逆湯增加芍藥對之

增損理中湯亦可矣凡陰證白通湯四逆湯通脈四逆湯條例未

敢遽用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有清

散透用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有清

散透用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有清

散透用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有清

散透用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有清

散透用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有清

散透用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有清

散透用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有清

散透用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有清

散透用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有清

散透用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有清

熱盛而煩手足溫

風生寒脈緊浮全

不煩少熱肢微厥

寒證兼風浮緩然

○傷風見寒脈傷寒見風脈為榮衛俱受邪川○**大青龍湯**然  
大青龍不可輕用須是風寒俱盛又加煩躁一證方可與之  
叙易簡者謂二證交攻則難治○**麻黃湯**兼用尤為穩當

二陽合病

太陽合胃脈浮長

若是浮弦合少陽

膽合胃時弦不短

更將外證互推詳

○太陽陽明本太陽病若汗若下若利小便無津液胃中燥  
轉屬陽明故大便堅小便利是為脾約○**麻黃湯**主  
之若惡寒則用**升麻高麗湯**不惡寒反惡熱大便不秘可少  
與○**白芍湯**不惡寒反惡熱大便秘或譫語○**調胃承氣湯**下之  
喘而胃滿者不可下用**麻黃湯**○太陽少陽頸項強急脇下  
鞭滿目眩往來寒熱諸證並○**小柴胡湯**○少陽陽明本少陽

病因發汗利小便後胃中躁大便難屬**調胃承氣湯**○正陽

陽明本經風盛氣實也○**大柴胡湯**○**小承氣湯**主之○又三

陽合病腹滿身重面垢譫語遺尿口中不仁屬**白虎湯**或舌

乾口燥不仁皆惡寒者通用○太陽陽明少陽陽明正陽陽

明無表證者俱可下惟惡寒中寒為太陽陽明合病未過經

却屬表可發汗用**桂枝麻黃各半湯**蓋在經則汗過經則下

也○三陰無合病

太陽陽明併病

太陽已汗併陽明

不惡寒兮裏未寧

全入陽明須下劑

汗之猶在太陽經

○太陽陽明併病本太陽初病發汗而汗出不徹轉屬陽明  
續微汗自出不惡寒是併歸陽明也○若太陽證尚在隨後

**麻黃湯**○若太陽證已退但有陽明者**大承氣湯**下之

春溫夏熱

春溫浮緊易軀安

發熱頭疼渴嘔干

夏月傷寒為熱病

脈來洪盛瘧應難

**溫病**發於春間及夏至以前是也發熱咳嗽頭痛身疼口中

燥渴脈來浮緊特其病輕耳○熱多者**小柴胡湯**熱少者升

**麻湯**微熱不渴者**小柴胡湯**○渴者**小柴胡湯**去柴

**黃加人參**後重脈實煩渴**大柴胡湯**微利之以其實而大便

秘也虛煩用**竹葉湯**○嗽者**小柴胡湯**○夏月傷寒

是為**熱病**發熱頭疼肢體痛重或惡寒或惡熱其脈洪盛用

藥不可大溫如**桂枝湯**黃芩湯之屬須以**黃芩湯**佐之

○熱病三日外脈仍數邪猶在經絡未入臟腑者宜以**白朮湯**

**湯**三日至夏謂之晚發**白朮湯**○**白朮湯**

風溫濕溫

風溫熱汗脈多浮

喘渴癢眠體不收

腹滿脚寒頭目痛

濕溫濕熱汗頻流

**風溫**尺寸俱浮素傷於風因而傷熱風與熱搏即發風溫惟

其有風則四肢緩縱而不收也其證身熱自汗頭疼喘息發

渴昏睡或體重不仁謹勿發汗汗之則譫語燥擾自亂無精

張氏又云寸脈浮滑尺脈濡弱亦不可下下之則失津直視

若被火則發黃瘵癢狀如驚癇皆變逆之證耳○病在少陰

厥陰二經用**麻黃湯**○身灼熱**知母乾薑湯**○

○渴甚治**黃芩湯**○脈浮身重汗出**漢防己湯**誤汗用**防己**

**黃耆湯**救之○**龐氏用葛根龍膽湯**證治論用**小柴胡湯**未

醒者**柴胡桂枝湯**取微汗○**瘵瘵****金沸草散**咳嗽加**杏仁****細**

**辛****五味子**○**濕溫**寸濡而弱尺小而急素傷於濕因而中暑

濕與熱搏即發濕溫其狀曾腹滿頭目痛發壯熱苦妄言身

上汗多兩脛逆冷倦怠惡寒若妄發其汗使人不能言耳聾

不知痛起其身青面色變是重暈而醫殺之○濕溫病在大

陰經用**白朮湯**○**濕氣勝則**一身盡痛發



執身黃小便不利大便反快用**除濕湯**五苓散臍腑虛大便滑者**連中湯**加**蒼朮白茯苓**虛滑甚者**木附湯**○暑氣勝則壯熱煩躁小便不利大便閉澀用**香薷散**治**裏六和湯**臍腑閉而煩渴者**白虎加蒼朮湯**

風濕中濕

風濕浮兮額汗微

腫疼發熱喜重衣

身黃熱痛沉而緩

中濕腸疎小腑稀

**風濕**脈浮先傷濕而後傷風故也外證肢體腫痛不能轉側額上微汗怯寒而不欲去衣大便難小便利熱至日晡而劇

治法但微解肌若發正汗則風去濕在非徒無益而又害之

○治法微解肌用**麻黃杏仁薏苡甘草湯**加**白朮防己黃耆湯**

不嘔不渴脈虛浮渴者**桂枝附子湯**○濕多身痛小便不利

**甘草附子湯**煩渴小便不利**五苓散**○外不熱內不渴小便

自利**木附湯**緩弱昏迷腹滿身重自汗失音下利不熱**白通**

**湯**多加**白朮**少用**白朮**○身腫痛微喘惡風**杏白湯**○通用

**人參散**熱而煩渴者加**芍藥散**若欲下之小便必不利

可與**五苓散**○**中濕**脈沉而緩風雨襲虛澤潤蒸氣人多為

濕所傷也一身盡痛重者發黃關節煩疼發熱臍塞時或脹

滿大便利小便難其外證耳濕家不可汗汗之則發瘥熱而

瘥者死亦不可下下之則額汗胃滿微喘而噦小便不利全

濟亦難經云治濕之法不利小便非其治也○中濕小便不

利大便自利**甘草附子湯****五苓散**或**麻黃湯**加**茯苓**主之六

小便皆自利則與**木附湯**身體痛或臍塞**黃耆建中湯****小**

**中湯**寒濕交攻疼痛重者**湯**甚者**主料連中湯**加

**熟附子**○風寒氣濕合而為痺其何以為之治曰寒多則為

疼痛當用**湯**○**山子**風多則為走注當用**湯**

**頭中氣**則為堅立兩**湯**所不可關中濕則為重者

能以**湯**主之應手而愈

溫毒中暑

溫毒春間斑疹發瘡

嘔而咳悶透心腸

背寒面垢虛來脉

自汗焦煩是暑傷

**溫毒**者冬間感受寒毒毒氣至春而發也表證未退毒氣不

散所以發斑肌肉疹紋心下煩悶嘔逆咳嗽後必下利寸脉

洪數尺脉實大其為病重蓋陽氣盛耳○治法通用**玄參汁**

**亦主之**或用**敗毒散**加**紫草**咳悶而嘔清汁者為

**黃連解毒皮湯**○中暑脉虛弱或沉伏身熱

背寒面垢自汗煩燥大渴毛聳惡寒或昏倦怠而身不痛經

二云寒則腠理閉暑則腠理開開則洒然寒閉則熱而悶體認

不精以傷暑為熱病誤人多矣○內外俱熱口燥煩渴四肢

微冷而不痛**白虎湯**○痰逆惡寒**續命湯**熱悶不惡寒**小**

**石膏湯**○頭疼惡心煩躁心下不快**五苓散****喉症圓**○霍亂

吐瀉**香薷散**溫服○**信以方**中暑用**小柴胡湯**脉孔連腠理

開洒然毛聳口前開而板齒燥用**白虎加人參湯**○傷暑發

大熱頭痛自汗咽疼煩燥腹中執結諸藥不効者**小柴胡湯**

最良小便不利**五苓散**○熱病中暑濕溫雖皆因暑所致然

脉證不同當明辨之熱病者冬間感寒至暑氣盛而後發此

即夏月傷寒但熱多而脉洪盛是也中暑者病在太陽外證

與熱病相似但熱病脉盛肢節痛重中暑脉虛肢節不疼兼

面垢背寒而手足微冷是也濕溫者濕熱相搏致之病在大

陰其脉寸濡而弱尺小而急外證皆頭目痛身熱汗多

而足脛逆冷是也以上三證夏月病多有之須別其名庶無

毫釐千里之繆○凡夏月傷暑雖則熱毒作恙皆因脾胃虛

怯而得之胃虛然後伏暑伏暑然後煩燥其有飲水過多及

用解暑之藥太過傷動其中真氣內虧嘔吐不食自利不渴

六脉沉微按之隱隱是為裏寒外熱如陰盛隔陽之類不可

更泥中暑伏熱之說急以**白虎湯****香薷散**等藥治之或微

煩小便不利斷不可以為熱也又有冷藥過度胃寒停水潮熱而嘔或身熱微煩此亦陽浮外而不內可與

**陽**或加**前胡**脾胃素弱者**黃芩**主之雖然抑猶有戒也夏

月病多傷暑暑家脉虛面顰冷汗手足微寒苟不揣其裏熱之證妄以剛劑投之抱薪救焚不發黃則發斑甚至蓄血悶

亂而死矣可不溯源徂流而精審云○假如夏月泄瀉不止胃脘閉隔飲食不進或心腹痛滿大抵因暑得之泄瀉中滿

者**香薷散**加**縮砂**下**消言圓**心腹刺痛者**香薷散**加**縮砂**下

**蘇威圓**俱得其便○假如夏月下痢或赤或白煩渴嘔逆腹中攪痛小便不利是亦因暑致之可與**五苓散****香薷散****小宗明湯**

**黃龍圓**之屬若以此嘔證為脾胃虛寒則誤矣

○瘧病溫瘧疫癘

瘧甚風癰強體肢

後寒先熱名溫瘧

柔剛二證汗證推

疫癘之邪責四時

**瘧者**先傷於風又感寒溫致之發熱腹痛口噤頭搖瘰癧不

語項強背直腰身反張或目疼或目赤或閉目或反目或足冷或足溫或妄行其脉沉弦而遲亦或帶緊此為惡候不救

者多若脉如雨濺散出於指外者曰暮殂也傷風頭痛發熱常出微汗又自嘔逆汗之必發瘧新產血虛汗出傷風亦致

發瘧大發濕家汗亦作瘧熱而瘧者死瘧初發來多有腹痛之證內經曰戴眼反折瘰癧汗出如珠着身不流太陽絕也

其謂是乎○發熱無汗惡寒嚴語為剛瘧曰陽**高根湯****麻黃**

**高根湯**○發熱有汗不惡寒為柔瘧曰陰**桂枝湯**加**高根湯****桂**

**枝和棗高根湯**○二瘧通用**小續命湯**陽瘧去**附子**陰瘧去

**麻黃**○剛瘧**白朮**口噤咬齒脚攣卧不着席**大承氣湯**下之

○柔瘧**桂枝湯****白朮湯****白朮散****白朮散****白朮散****白朮散****白朮散**

**溫瘧**即瘧病也尺寸俱盛先熱後寒吐汗下後重感於寒得

之寒多者其脉弦遲熱多者其脉弦數寒熱乃陰陽之爭也

或者談論傷寒誤藥壞病吐汗下後續生寒熱則曰瘧未必死所幸分而成之不思古人一藥對一病藥進病除安有所謂分為寒熱者哉噫此可為智者道也。先熱後寒及寒熱相等並（小柴胡湯）先寒後熱（白虎湯）多寒但寒者（麻黃湯）多熱但熱而燥少與（白虎湯）或（白虎湯）多寒但寒者（麻黃湯）熱多痰多嘔不入食（二陳湯）加（通）虛人寒甚（七葉散）熱多痰多嘔不入食（二陳湯）加（通）小便秘嘔吐寒熱無時脈小緊者（大柴胡湯）下之。瘧脈自弦弦數多熱弦遲多寒遲弱可溫緊浮可汗緊實可下浮大而胃滿者可吐。經云夏傷於暑秋必病瘧固非傷寒之謂然壞傷寒有溫瘧一證若纏綿不已腹中必有癥瘕用藥對治或者殊途而同歸活人書以（法）取吐久不愈者服（瘧母圓）亦諸瘧中通用之劑耳惟癥瘕能生寒熱凡瘕皆有水惡血包裹而成也（瘧母圓）中有逐水破血之劑

為能下之痰水在上者（瀉心丸）中有（常山）為能吐之瘧家多蓄黃水若水不在於上焦則（常山）亦能下之也一法（常山）

（一）倍（常山）各半新汲水隔宿煎凌晨服又法（常山）等為細末研（常山）入（瘧圓）如桐子凌晨三十粒（瘧湯）

下此皆勝藥嘔者可與（二陳湯）痰飲中節致生寒熱者亦與（二陳湯）餘見似瘧條例。安瀉傳染老幼皆相似調治一也

寸濡弱尺弦緊或肝脈濡細是雖責邪四時然發汗吐下條例通行故曰明知逆順正行無問雖然陰陽表裏條例通行固也然其毒癘之氣蘊蓄于中亦須隨其溫涼權其輕重而利導之庶毒有所泄則易為力也。病源云挾毒癘之氣壯

熱煩毒發為心腹脹滿者不治。春感清邪在肝（升麻湯）熱煩毒發為心腹脹滿者不治。春感清邪在肝（升麻湯）

（湯）夏感寒邪在心（黃連湯）秋感熱邪在肺（白芩湯）加（黃芩湯）發黃瘧（茵陳湯）散

冬感溫邪在腎亦名冬溫（麻黃湯）上無正形因火而名

當隨經取之此大槩然耳。寒證者重數字。熒火圓。神明。可選用。內用。只可施之寒濕母惑於通用之說。溫疫通用。痰證傷食類傷寒。

有痰頭項皆和暢  
頭疼右數身不疼

外熱憎寒寸浮上  
左手脈平傷食狀

痰證寸口脈浮發熱憎寒惡風自汗胃膈妨滿氣上衝咽不能喘息頭不疼項不強為異耳。有熱用。非次頭疼者胃膈

滿發寒熱亦是痰證但脈緊而不大。瓜蒂吐之此不可謂痰證例無頭疼當以他證參之也。傷食右手關脈緊盛而數

頭痛發熱惡寒但身體不疼中脘痞悶噎噎食臭為異耳熱邪伏於脾胃則食不能消經云人迎緊盛傷於寒氣口緊盛

傷於食人迎主外風寒入之氣口主中飲食傷之是以有左右手之別。中脘痞悶嘔而熱者。加。寒

多不甚熱者。治中湯。心腹滿痛者。下之。胃膈實而嘔吐者食在上脘。吐之。夾食傷寒證候

按病源云下後六七日不大便煩熱腹滿而痛為胃中有乾糞挾宿食故也審如是則夾食傷寒即太陰積證腹滿時痛

者是大陰受病主胃膈脹嘔吐飧泄未氏以為飲食得之如曰太陰證飲食不節胃膈不快用

加。皆其治也今推明治法有表者與。去。多用。有表復有裏

者與。右表證已解但有裏證者。與之可也張氏云傷食。三五粒入湯劑中正此意耳

雖然夾食傷寒則脾胃已傷暴加轉下不可也。發其汗亦不可也識者於此又當權衡餘見霍亂條例。夾食傷寒便

見吐利厥逆而不挾表證者依陰病及霍亂等治之若吐利

厥逆而挾表證者即依先救裏後救表之法

○虛煩胸氣類傷寒

虛煩身首全無痛

轉筋惡食大便難

脉自和平多熱壅

胸氣酸疼而弱腫

**虛煩**諸虛煩熱也不惡寒身不痛頭不疼脉不浮不緊數為

異耳傷寒亦有虛煩見○重者**小續命湯**輕者**小宗清湯**嘔者

**大橘皮湯**並不可汗下○陰證虛煩外熱內寒肢節疼痛陰

**旦湯**○**麻黃**初病發熱憎寒頭痛嘔噦惡聞食臭肢節酸疼

大便艱難或胃滿腹痛卒起而脚轉筋屈弱拳痛腫重痺頑

為異耳○脚氣通用**三和散****降氣湯****大流氣散****烏真順氣散**

**分氣****蘇合散****木瓜散**只可**三仁圓****石南圓****枳殼散**用木瓜煎

湯調下○毒氣入腹衝心作痛吐涎者**降氣湯**下**養正丹**或

用**吳茱萸**製炒煎熟入**生薑汁**主之○寒多者**越婢湯****小續**

**命湯**加**生薑汁**○熱多者**人參羌活散****敗毒散**並加**木瓜**或

**追風毒刺散**加**大黃**○風多者**小續命湯**加獨活或越婢湯

○濕多者**除濕湯****五苓散**○痰多者**除濕湯**下**白圓**或挾表

者**養正丹**○煩燥者**竹瀝湯**或**麻黃**○大便秘者**神效圓**

**功圓****麻仁圓**或**五積散**加**大黃**○風毒腫痛**神效湯****神效散**

○筋急掣痛**神效湯**煎湯調**乳香****越痛散**○又法**香薷散**三

錢**川練子**兩箇取皮肉坐新瓦上焙**除其骨**碎三節和之新

汲水煎空心熱服脚氣風癩痛痒皆作效更加**川白**

脚氣證候真與傷寒無異或發熱頭痛或身體冷或寒熱

往來或自汗惡風或無汗惡寒或大小便秘泄腹痛下利胃

痛氣短怔忡煩悶嘔噦涎沫惡聞食臭大類傷寒但卒起腿

脚屈弱頑痺肢節攣急酸疼或歷節及踝脛間焮然赤腫為

異耳傷寒傳足六經脚氣亦傳足六經在太陽則頭痛項強

腰背酸重在陽明則口燥鼻乾惡熱譫語在少陽則耳聾口

苦胃脇俱疼在太陰則胃腹滿痞肢體浮腫在少陰則咳喘

恐傷咽痛面驚在厥陰則癱緩筋攣陰器脹痛六經所傳又有合病併病外證與傷寒並同凡遇發熱煩燥大便不通嘔歲痰涎而惡食者須審問之脈浮而弦者起於風風則汗而愈濡而弱者起於濕濕則溼而愈洪而數者起於熱熱則下而愈遲而澁者起於寒寒則溫而愈風寒暑濕證狀不同然風為走注寒為疼痛暑為熱煩濕為重着必有可驗之迹治法總要貴乎疎導大便但不可過劑其補湯淋洗則醫家之大戒也雖然脚氣漸入頸深非藥力相接不可也治之亦當究其源或因丹砂發動則為之解丹砂或因飲食釀成則為之消飲食氣觸而作者與之調氣續生他病者則以他病方藥理之所患氣實而死未有服藥致虛而殞甚者喘嗽上氣衝禁心疼嘔吐無已腹脇脹滿臍下頑痺不仁最為惡候大槩然爾所謂寒則溫之熱則寒之在表則散在裏則下太虛氣乏扶養其中是為不刊之法。千金烈法食鹽并竈中灰

等和炒熟重帛盛而熨

傷寒傳經之邪病至厥陰其脈微帶浮緩之狀是則脾氣將復邪無所容必寒熱作而得汗解若尺寸俱沉短此為毒氣入臟土敗木賊脾受肝邪必有囊縮舌卷耳聾不知人之證當急下之五救其一或脈來弦亦賊邪也。許學士云輕手脈浮為在表表實浮而兼有力但浮無力表中虛自汗惡風常淅淅重手脈沉為在裏裏實脈沉來有力重手無力大而虛此是裏虛理端的氣口緊盛食必傷人迎緊盛寒邪熾跌陽胃脈定死生太谿腎脈為根帶。治熱入血室血熱留滯小柴胡湯加生地黃治血結胃按之痛活人書海蛤散蓋血聚膈中則小腸必壅小便通則胃次之血散矣。凡小便或赤或澁皆其裏有熱也

發熱

發熱初陽冷必憎

陽明發熱汗之形

少陽脉細仍兼嘔

反熱而沉屬腎經

發熱多屬三陽太陰厥陰皆不發熱惟少陰有反熱二證然少陰發熱終是脉沉或下利手足冷也三陽發熱何以明之太陽發熱則惡寒陽明發熱則自汗少陽發熱必有乾嘔之證矣熱邪在表病屬太陽此表熱而裏不熱也熱邪在裏病屬陽明此裏熱盛而達於表也若表證未罷邪氣傳裏裏未作實病在表證裏證之間若傳經之邪至於少陽病在二陽三陰之間其熱皆輕於純在表純在裏者也然而陽明裏實熱盛固當攻之以寒太陽風寒外搏陰盛惡寒雖熱尤當溫散少陽和解雖屬小柴胡微熱不渴者又當加桂是無以權之雖然傷寒發熱病之常也脉陰陽俱虛熱不止者仆

下利發熱者殂汗後復熱其脉躁疾為陰陽交此皆不治之證其可例視之乎。太陽發熱惡風有汗惡寒無汗

麻黃湯。吐利發熱惡寒是為霍亂。發熱而渴自汗不惡寒是為風溫若誤汗之必身灼熱煩渴獨語各有本條。陽

明發熱汗出脉實。胃氣湯。脉浮。汗多者胃汁乾

急下之用。大承氣湯。少陽發熱脉細而嘔。小柴胡湯。少

陰反發熱有二證脉沉發熱者。麻黃細辛附子湯。若下利厥

逆裏寒外熱脉不出者。通脈四逆湯。身熱而不渴則為表

潮熱

熱潮屬胃下之和

大結胃家本例圖

咳逆利溇并表證

勿攻只用小柴胡

熱小柴胡湯。身熱而燥渴則為裏熱。白虎加人參湯。無表裏證發熱七八日脉雖浮數可。大承氣湯。下之若下後脉數不解消穀易飢不大便則為瘀血屬抵當湯。



潮熱屬陽明一日一發日晡而作也若非日晡所發是謂其熱不潮蓋陽明旺於未申故尔惟屬陽明故潮熱為可下之證苟其脈或弦或浮大便或澹或利小便艱澀外證猶有惡寒則其熱未全入府並不可下但以白朮芍藥湯和解之是必表證已退大便鞭結小便如常乃可攻也

○日晡潮熱屬陽明經脈實可下證用大承氣湯○大便溏利潮熱○表證潮熱並用小承氣湯

○咳逆潮熱○大便澹利潮熱○表證潮熱並用小承氣湯○腹滿不大便只用小承氣湯微利之勿令大泄○

日晡潮熱甚者循衣摸床獨語如怪直視微喘脈弦者可治脈濇者不治脈不實不虛但用小承氣湯

○冬陽明潮熱有時脈浮緊者無汗脈但浮必盜汗並用黃芩

寒熱

往來寒熱闔陰陽

大小柴胡及桂薑

結熱心煩仍喜嘔

渴而頭汗用之良

陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒寒熱往來者陰陽相勝邪正交爭而作也蓋陽不足則陰邪出於表而與之爭故陰勝而為寒陰不足則陽邪入於裏而與之爭故陽勝而為熱若邪氣在半表半裏之間則外與陽爭而為寒內與陰爭而為熱出入無拘所以乍往乍來而間作也大抵邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪在半表半裏則寒熱相半此又可以知其受病之處用藥固自有條然小柴胡湯最主寒熱寒多者加芍藥熱結者加黃芩脈不甚實而大便澀者加枳實寒熱相半只守本方是亦活法雖然寒熱之方來如波濤之洶湧其勢有不容遏者當遲之一二日俟少定而圖之經所謂其盛者可待衰而已是又不可不知

○病至十餘日結熱在裏往來寒熱大柴胡湯下之○心煩

喜嘔胃腸滿不欲食寒熱往來小柴胡湯或血氣弱膝理開邪交爭痰嘔甚者陳湯汗下後不嘔而渴頭汗出胃腸滿小便不利寒熱往來柴胡桂薑湯

寒熱似瘧

似瘧膀胱柱可醫

清便不嘔半麻枝

陽明實下浮須汗

血室柴胡小者奇

似瘧一名瘧狀作止有時非若寒熱往來或踈或數而作止無定時也凡感冒之人忽覺毛寒股慄筋節攣攣百骸鼓撼嘔不欲食其寒不可禦未幾復轉而發熱者此即溫瘧不必謂瘧脈自弦或洪數或緊實或虛緩或刮濇皆為瘧狀但以外證別之用藥固有本條然小柴胡湯如前斟酌加減亦是活法雖然血虛能生寒熱敗血亦作寒熱陰陽相勝雖一證各有一方其間當以小柴胡湯為佐

○太陽似瘧證脈洪浮與桂枝湯○清便自可不嘔日一二

發瘧其脈微緩微浮則欲愈也○陽明似瘧證煩熱汗出日晡發熱脈浮虛與桂枝湯脈實與承氣湯○病人熱入血室其血必結如瘧狀者小柴胡湯主之○瘧後寒熱或潮熱見瘧後昏沉條○諸瘧通用二陳湯熱多者加小柴胡湯寒多者加小柴胡湯○餘見溫瘧

熱多寒少

熱多寒少治膀胱

不嘔清便各半湯

尺脈若遲為血少

脈皆微弱號無陽

熱多寒少陽乘陰也其間三證並屬太陽脈浮緊者可汗或遲或弱皆和解之清便自可謂大便如常也

○不嘔清便自可桂枝湯○尺脈遲血少者先以

**小建中湯**以養血俟脈不遲即以小柴胡湯桂枝二越婢湯

**二葷主之**○諸脈皆微弱無陽者用桂枝二越婢湯不可

正汗



後食復發熱欲食加大黃粥飲傷飽或食肉或餅脯  
硬物不消皆復熱也傷食必有痞滿噎氣吞酸腹鳴下利等  
證可與生薑瀉心湯。下後身熱而心中結痛瀉心湯。飲  
酒復熱有本條

惡風

惡風汗出怯風吹

脈緩而浮但解肌

發汗亡陽成漏者

溫經之法莫遲疑

惡風者見風則怯密室之中無所惡也風傷衛氣衛虛則腠  
理不密由是而汗出焉證雖屬表不可發汗但微解肌而已  
衛者陽也惡風陽證也所以表怯而惡風蓋亦陽虛故陰邪  
出而乘之特其病在皮膚邪氣尚淺耳

○桂枝湯主之壯熱者與參蘇飲○發汗太

過衛虛亡陽汗漏不止而惡風者法當溫經用桂枝湯  
或小便難四肢微急難以屈伸並用桂枝湯○身熱惡

風項強脇滿手足溫而渴小柴胡湯○風濕惡風不欲去衣

骨節間煩疼掣痛不得屈伸汗出短氣小便不利或身微腫

甘草附子湯

惡寒

惡寒發熱屬於陽

陰病憎寒體自涼

浮數桂枝并越婢

沉而細者理中湯

惡寒者不見風而怯寒身雖灼熱亦不欲去衣被也此陰邪  
出而乘陽致之蓋寒傷榮氣榮行脉中居衛之下是為表邪  
已深法當發汗間有一二自汗則其表已虛但與解肌可也

然而發熱惡寒者屬陽無熱惡寒者屬陰在陽則發汗在陰  
則溫裏常須識之大要惡寒比皆為表證或裏證悉具而微惡

寒者是表猶未解當先解表俟不惡寒然後可以攻裏惡寒  
可愈○發於陽者脉

浮數桂枝湯桂枝越婢湯麻黃湯青龍湯酌量輕重用

○大陽證發熱或未發熱皆惡寒有汗用**桂枝湯**無汗用**麻黃湯**○陽明證固當下之惟惡寒中寒者係與太陽合病在經屬表可汗用**麻黃湯**若脈遲汗多微惡寒者表未解也雖陽明病可**桂枝湯**○少陽證頭汗出微惡寒**小柴胡湯**加**桂枝**○發熱微惡寒**柴胡桂枝湯**○汗後反惡寒者為虛**芍藥甘草湯****桂枝湯**○下後復發其汗心下痞而惡寒者表未解也當先解表用**桂枝湯**表解然後攻痞用**三黃瀉心湯**入生薑汁○發於陰者脈沉細**理中湯****四逆湯**○少陰證脈沉細用**理中湯****四逆湯**若下利惡寒而蹇手足溫者可治用**小建中湯**若惡寒而蹇時時自煩不欲厚衣可**大柴胡湯****湯**下之

背惡寒

背上憎寒值少陰

口和附子本條尋

舌乾口躁三陽合

白虎湯中好酌斟

背負陽腹抱陰背寒者陽弱也然背寒有陰陽二證何以別之少陰一證以其陰寒氣盛不能消耗津液故口中和三陽合病以其陽氣陷入津液為之乾焦故舌乾口燥陰寒陽熱識者以口中潤燥推之思過半矣

○口中和而背惡寒者屬少陰**四逆湯**○舌乾口躁內有熱證口中不仁而背惡寒者為三陽合病**白虎湯**經云腹滿身重面垢讖語遺尿口中不仁為三陽合病**白虎加人参湯**主之若自汗者亦用**白虎加人参湯**○又陽明證背微惡寒無大熱口中燥渴者亦用**白虎加人参湯**○中暑亦有背惡寒證但面垢自汗脈虛而伏自有本條○凡脾胃素虛之人遇暑月間或飲冷水或多喫茶或餐雪梨之屬易致生冷壞脾寒氣蓄聚陰上乘陽故寒從背起冷如掌大此當以溫藥主之

四逆

四逆須將腎證詳

病家手足但微涼

枳柴芍藥傳經劑

邪中陰經四逆湯

手足不温謂之四逆陰經之邪主之太陰受病手足自  
至少陰則有手足四逆之證四逆之與厥冷實相遠也或曰  
均是四逆耳而四逆湯散一寒一熱用藥何不類耶蓋手足  
自熱而至温由温而至四逆是傳經之邪非虛寒之候也四  
逆散主之若得病以來手足不温便成厥逆此則陰經受邪  
陽氣之不足也可以四逆湯温之臨診要當審此雖然吐利  
煩燥惡見四逆四逆下利惡寒而蹇並屬少陰又為不治之  
診故併及之。少陰四逆其人或欬或悸或小便不利或腹  
中痛滿或泄利下重並用四逆散。初病以來厥冷四逆即  
用四逆湯。濕温兩足脛逆冷有本條

厥

冷厥初來厥有源

熱深發厥初身熱

沉遲而弱冷常存

沉滑時平指爪温

陽氣伏藏陰氣越出陰陽不相順接所以厥也其手足逆冷

之證平蓋諸陽會於四末陽微而為陰所勝初病便厥者是  
為冷厥其脈沉遲按之則弱醒醒而靜惡寒引衣足多攣卧  
或身上粟形或下利清穀也熱伏於內先熱而後厥者是為  
熱厥脈必沉滑按之則數昏塞狂言發渴引飲露手揭衣或  
燥不得眠或大小便不利也外證皆可驗焉若先厥而後得  
熱是則陰邪退而陽氣復矣傷寒熱多厥少其病當愈厥多  
熱少其病則進下利發厥一條亦以厥者復熱為有瘳熱者  
復厥為已甚蓋下虛則厥陰實使之陽去陰消其可也雖然  
傷寒血證亦有四肢發厥以至昏迷悶絕者此又不可不知  
至若少陰下利惡寒而拳手足厥冷與夫臟厥一證皆為不  
治之診厥之為厥可無辯乎。冷厥初病便作四肢逆冷是  
變惡寒引衣自蓋不渴大小便滑泄外證默默而醒四逆湯

理中湯 通脈四逆湯 白通加猪膽湯 當歸四逆加芍藥湯  
可選用。又痰厥氣厥腎厥用烏頭湯。熱厥初病

身熱然後發厥其人畏熱揚手擲足煩燥飲水頭汗大便秘  
小便赤悌鬱昏憤蓋當下失下血氣不通故四肢逆冷所謂  
熱深則厥深所謂下證悉具而見厥逆者此也與**大陰發熱**  
**大陰發熱**或曰**白濁**。熱厥與冷厥相類但指爪時溫為異  
耳若疑似未明且以**四逆散**試之陽厥則有熱陰厥則無熱  
○寒熱而厥者一手或兩手無脉面色冒昧不澤急與**四逆**  
**散**并**四逆散**以**四逆散**入參謂而**通**可以為佐服無汗  
解則生投藥無汗或脉不至者不治。水氣厥者心下怔忡  
**大陰發熱**。邪氣結胃中而厥者脉乍緊乍結心煩滿飢  
不欲食**大陰發熱**吐之。臟厥者七八日逆冷下利發躁無時  
暫安不治。痰飲厥逆眩運少與**白豆豉**

頭痛

頭疼惡冷太陽先

濕暈塞兮痰膈滿

惡熱陽明膽細弦

厥陰乾嘔吐清涎

頭痛屬三陽湯明少陽皆有之而太陽則專主是也太陽專  
主頭痛則頭痛之屬表證者居多陽明少陽又次而輕耳三  
陰經絡上不至頭故無頭痛惟厥陰循喉嚨之後上連目系  
頂巔有頭痛乾嘔吐涎**吳家湯**一證却無身熱亦與陽證  
不同也雖然太陰少陰其經從足至胃並無頭疼是固然爾  
然風溫病在少陰濕溫病在大陰而頭反痛至於陰毒亦然  
是又其病則有其證脉絡相通不可拘也若夫頭痛劇甚入  
連於腦手足俱寒此則真痛神丹在手其能救乎

○太陽頭疼發熱惡寒無汗**麻黃湯**有汗**桂枝湯**已汗未汗

頭痛如破逆鬚葱白湯服之痛不止**葛根湯**○陽明頭

疼不惡寒反惡熱胃實氣實攻於頭也少與**承氣湯**○

少陽頭疼發熱脉弦細**小柴胡湯**○濕頭疼暈塞頭中寒濕

也**瓜蒂散**納鼻中黃水出則愈。痰涎頭疼曾膈痛發寒熱

脉繫不大**瓜蒂散**吐之可以痰證條參驗。厥陰頭疼乾嘔

若脈微浮為欲愈邪氣將復不愈用桂枝湯  
若發熱似瘧亦欲愈邪氣將復諸頭眩無  
熱如聖餅用生薑葱白煎湯下

項強

項強葛根主表強

表虛桂葛去麻黃

結胃須進陷胃劑

桂入括婁瘥反張

傷寒頸項強急太陽表證也當發散而解之若誤下太陽邪  
氣乘虛入裏則為結胃項強

○太陽病項背強無汗惡風為表實葛根湯項背強發熱汗  
出惡風為表虛桂枝湯加葛根湯○誤下太陽結胃  
項強葛根湯○太陽傷風復感寒濕身熱足寒頭搖口噤  
頸項強背反張其脈沉遲此為發瘥葛根湯○項  
強脇下滿葛根湯

咽痛

咽疼陽毒發成斑

肢冷咽瘡腎證者

脈緊無陽咽亦痛

脈微下利腎傷寒

咽喉不利或癢或瘡穀不入而嘔吐者毒氣上衝所致也陽  
毒必然發斑少陰四肢必冷其有下利者可與白通湯○

○入白通湯佐之其不下利或小便赤而去衣者可與白通湯  
○入白通湯使大便順導則黑臭之毒泄矣續以白通湯

煎湯調之甘草生薑解其毒也腎病咽痛下利身猶熱  
者未可用白通湯且與黃連雞子湯即黃連雞子湯去雞子

加白通湯

○陽毒咽痛發斑唾膿血脈洪數用藥有本條。少陰咽痛

咽瘡沈遲厥冷或吐利又陰陽脈俱緊反白汗為無陽法

當咽痛而後吐利亦屬少陰並不可汗下重刺汗出以白通湯

粉傳之咽痛用白通湯若沉冷甚者白通湯○

○咽疼通用白通湯上焦壅熱加枳



○腎傷寒一證乃非時暴寒中人伏於少陰之經  
頭疼腰痛其脈微弱初咽痛似傷寒次必下利非咽閉之比  
咽痛即是也下利或主  
之。證治論口蒼赤爛用蜜浸一宿取汁含服熱甚  
咽中閉塞傷寒六七日大下之寸脈沉  
遲尺脈不至咽喉不利唾膿血手足厥利不止者難治

身痛

身疼浮緊大陽臨

自利肝并腎帶沉

中濕毒陰與風濕

汗餘霍亂本條尋

○身方蓋云邪結在裏大便秘澁心腹痛鞭者可服若  
身體疼痛是表證未解不可與之然則身體疼痛不脈沉不  
自利大陽之表證明矣其或自利脈沉此則陰證之身痛臟  
家之裏病云身痛大抵

○大陽身痛脈浮緊無汗以汗之或尺脈遲者血不  
足也先用以養之俟其尺脈浮即用太陽  
病七八日脈細惡寒為陰陽俱虛吐汗下並不可至并其人  
素無熱可素有熱可中厥陰  
少陰身痛其脈沉必自利中濕一  
身盡痛不可汗下但利小便有本條。陰毒身痛如被杖腹  
中絞痛脈沉而疾有本條。風濕一身痛重但微汗不可大  
發汗有本條。發汗後身痛脈沉遲汗  
後身痛為寒邪在表脈沉遲為在裏用入榮安和  
真氣或用又汗後霍亂身痛不休少與

腹痛脹

腹痛腎分通脈湯

脾兼表證桂加黃

實寒使結虛致利

脹則腹皮梗夏良

陰邪在裏陽邪入裏與正氣搏則為腹痛所以痛者有異焉

脈實腹痛而大便秘者實痛也脈虛腸鳴而大便泄者虛痛也陰陽異證用藥不同大抵痛為邪氣實法當疏利陰受病則（金液散）（養正散）輩溫而利之。少陰腹痛四逆或發或悸或小便不利或泄利下重（四逆散）下利清穀脈微欲絕（通脈散）腹痛是有表復有裏為太陰太陽俱病用（桂枝湯）痛甚（桂枝加大黃湯）。實痛者關脈實煩燥腹滿大便秘結（瀉心散）（大承氣湯）胃中熱胃中邪氣腹痛欲嘔吐則用（小承氣湯）。虛痛者寸脈濇尺脈弦腸鳴泄利先與（小建中湯）不瘥（桂枝湯）。易簡用（建中湯）加（芍藥）腹中冷痛四肢厥逆用（四逆散）。腹脹者陰陽不和也（積實芍藥湯）最良

### 奔豚動氣

奔豚動氣數般方

左右高低細揣量

玄木理中并用桂

不堪汗下例中詳

動氣者臟氣不調。觸跳動隨臟所主而形見於臍之左右上下也大抵真氣內虛水結不散氣與之搏即發奔豚以其走痛衝突如豚之奔雖有發表攻裏之證汗之下之並不可也然而不言當臍動氣者何耶蓋胃為中州以主津液妄施汗下必先動脾是以不言而喻也舉此動氣非問證何以知之然則調理傷寒貴乎纖悉問證（動氣諸藥詳見不可汗不問條列中）

○太陽病下之後氣上衝者（桂枝湯）若不上衝不可與也若

從小腹上衝於心（桂枝湯）○發汗後臍下悸者欲作奔

豚（茯苓桂枝甘草大枣湯）○動氣通用（理中湯）去（芍藥）加（芍藥）蓋（芍藥）利

小便泄奔豚故也奔豚一名腎氣（白朮）燥腎閉氣是以去之

○吐汗下後心下逆滿氣上衝胃起即頭眩其脈沉緊誤汗

之則動經故其身振振搖動（茯苓桂枝白朮甘草湯）主之此方用

白朮者蓋以誤汗動經故用白朮閉其汗也。○奔豚動氣脈

沉弱肢體冷可與發汗也。○動氣證以誤論用柴胡湯後發熱

腹滿

腹滿脾家及胃家

三陽合病口頑脉

入邪吐汗下之後

腎證便堅承氣加

腹滿多屬太陰蓋脾為中央土所以主腹滿之候腹中常滿者裏實而可下時滿時減者裏虛不可下當以溫藥和之其有吐汗下後因成腹滿者此則邪氣乘虛而入或疎利或溫散或湧吐條例又不同焉審其邪氣之所起知其邪氣之所存斯可矣雖然太陰主腹滿固也陽熱為邪必腹滿而咽乾陰寒為邪必腹滿吐食而自利一熱一寒又不可以無別若夫腹滿而泄難以有瘳

○太陰腹滿吐食不可下漢書卷中主之誤下太陽因而

腹滿時痛為太陰太陽俱病漢書卷中重者漢書卷中大便

○陽明發熱腹滿微喘口苦咽乾或不大便讞語火迫者

亦有此證並小柴胡湯噦而小便難加大承氣又陽明腹大滿

不大便小柴胡湯微下之陽明脉遲腹滿時常潮熱亦用大承氣

○發黃證有本條○三陽合病腹滿身重難以轉側讞

語口中不仁白虎湯○吐後腹脹滿常不減者胃中之

邪下傳入胃擁而為實也少與調胃承氣湯○汗後腹脹滿

者胃虛而不能敷布諸氣壅滯也厚朴生薑半夏湯○

若滿而痛則小柴胡湯微下之○妄下後腹脹滿心煩而

卧起不安者表邪乘虛而入鬱於胃中也枳實芍藥湯○少

陰病六七日腹脹滿不大便以承氣湯急下之○腹脹通用瀉

瀉○腹皮痛者脾不勝水故水與氣搏於皮肉之間

觀其腸鳴漉漉可知矣小柴胡湯加白芍藥湯○腹脹

滿而短氣者邪在裏而為實也腹瀉滿而短氣者邪在裏而

為虛也見氣短條

○腹瀉用藥皆去白朮木溫燥而閉氣也

胃脘滿

胃滿多將表證看

半居表裏脇間堅

虛煩客熱須枳朮

瓜蒂拈來吐冷涎

胃滿者胃脘間氣塞滿悶非心下滿也脇滿者脇肋下氣脹  
填滿非腹中滿也胃滿多帶表證脇滿多在半表半裏之間

○太陽病下後脈促胃滿桂枝去芍藥湯病在衛氣芍藥入

榮其性利故去之○陽明喘而胃滿此猶帶表證不可下可

與麻黃湯○胃脇俱滿或脇下鞭痛此半表半裏之證並用

小柴胡湯和解之○胃中虛煩客熱或經汗下後煩熱窒塞

氣逆捨心並枳子豉湯吐之若氣乏則與枳子甘草湯若嘔

則與枳子生薑湯○胃中痰實宿寒瓜蒂散吐之○又陽明

病心下鞭滿不可下下之遂利不止而死法當湯吐詳見結

胃解題此則胃中虛而氣痞也或用半夏瀉心湯生薑瀉心

湯○孫用和云胃滿則諸瀉心湯審證用○邪氣留於胃中

法當湯吐其甚者因而越之是爾然有吐汗下後邪氣乘虛

入而為煩是則胃中客熱以枳子豉湯吐之此吐劑之輕者

也不經發汗吐下邪氣留聚煩滿痰突是則胃中宿寒以瓜

蒂散吐之此吐劑之重者也均之為吐又當權衡

脇疼

脇疼多屬少陽家

燥糞陽明並小柴

裏水痞堅須十棗

陰脇引痛臟中毒

脇肋痛滿者邪氣在半表半裏之間也邪方傳裏未留為實  
氣鬱不行法當和解若夫裏水痛堅非下之不可也

○少陽病脇痛耳聾寒熱乾嘔或脇下堅滿並用小柴胡湯

和解之○陽明病不解轉入少陽脇下堅滿乾嘔小柴胡湯

又陽明燥糞不大便脇下堅滿舌上胎滑小柴胡湯○太陽

病咳嗽乾嘔微利心下痞鞭引脇下痛身涼汗出或時頭暈

此為表解裏有水五苓散下之○病者脇下痛素不和化

於臍傍引小腹入陰筋俱作痛此為臍結不治

自汗

自汗傷風暑不消

風溫風濕衛難調

無陽霍亂并柔痊

更與陽明共九條

衛氣所以密腠理而固津液也衛為邪所干不能護衛於是而汗出焉寒傷榮氣汗獨無之惟風暑濕之邪有干於衛皆為自汗之證也若夫寒已入裏寒極生熱熱則榮衛通腠理開又為陽明自汗是其熱越而汗出矣治法各自有條然而汗出以至髮潤或汗出如油或汗出如珠凝而不流此皆不救他病見之亦然

○大陽傷風自汗脈浮緩者桂枝湯汗出而渴或小便難者

桂枝湯不渴者因表未解也自汗小便數者勿用桂枝惟加

芍藥湯主之自汗小便不數心煩微惡寒脈急桂枝加

參湯加人參參以調榮脚必伸也○大陽中暑汗出惡寒身

熱而渴香薷散白虎湯或用小柴胡湯○風溫多眠喘息自

汗若誤汗之必身灼熱讖語並用姜苓湯○風濕額上自汗

關節痛重但微解飢通用敗毒散條見○衛不和者臍無他

病時發熱自汗出桂枝湯○亡陽者大陽證發汗多漏不止

而惡風用桂枝加附子湯又少陰證尺寸脈緊反有汗出額

上手背冷汗為亡陽主咽痛吐利四肢疼急厥逆惡寒用四

逆湯汗多不止溫粉撲之若汗不止惡風煩躁不得卧先服

白朮牡蠣湯次服小建中湯咽痛通用甘草湯條見

○霍亂吐利汗出發熱惡寒手足拘急厥冷四逆湯又中暑

霍亂煩渴香薷散○柔痊大陽病身項反張口噤瘈瘲發熱

汗出桂枝湯○陽明汗多而渴發熱讖語大便硬瀉心散

若小便自利而汗出者為津液少不可攻但用桂枝湯若

汗多者膏汗乾急下天承氣湯陽明汗多而渴勿用白朮散

陽明反無汗脈浮而喘麻黃湯

無汗

無汗因寒中大陽

三陰剛痊證中詳

冬陽明病兼陰易

七例推尋各有方

腠理為風暑濕所干皆令自汗惟寒邪中經腠理密緻則津液內滲獨無汗焉此特傷寒在表然耳若陰病若水飲與夫亡陽又虛亦皆無汗隨證各自有條惟熱病脉躁盛而不得汗此陽亢也當汗無汗與麻黃湯三數劑而汗不出者此亦不可活也知其可進則進知其不可則已之君請擇斯二者○**黃李湯**證云陰病不得有汗蓋三陰證本無汗其或有汗者亡陽也○冬陽明脉浮緊者必發潮熱脉但浮者必有盜汗**黃李湯**主之○盜汗者邪氣方侵於裏尚連於表睡則衛氣行裏而表陽不緻因其表陽不緻故津液得泄覺則氣散而週於表腠理閉焉汗復止也是之謂盜汗此邪在半表半裏之間法當和表○餘證無汗治法各有本條

頭汗出

頭汗諸陽氣上蒸

身黃尿秘引漿頻

心忪水結讖言血

表裏柴胡小是珍

諸陽之經循於頭三陰則至頸而還也裏虛表實腠理密緻熱不得越故陽氣上騰津液上湊而汗出於頭抑亦胞虛內涸使然耳夫裏虛則不可下內涸則不可汗頭汗之證無所謂表邪汗之斷不可也若夫陽明熱入血室燥糞讖語俟其過經利之以**小承氣湯**是可無以權之哉大抵寒濕相搏與夫邪在半表半裏之間則有頭汗設或小便不利內外閉格頭汗則為陽脫設下濕家額上汗出而喘或小便不利大便自利亦為陽脫二者皆不可活臨診又當審斯

○發黃證頭汗及頸而止小便難引水漿此受濕也**茵陳湯**

**五苓散**主之○水結曾證心下忪滿無大熱頭汗出

**枳椇湯**○讖言頭汗是為血熱病屬陽明可

中懊懷而頭汗者**梔子散湯**○半在表半在裏及餘證並亦  
**柴胡桂枝湯**寒熱往來微惡寒為表脇下滿大便堅為裏○汗下  
後胃滿微結寒熱心煩嘔渴為表未解**柴胡桂枝乾薑湯**或

手足汗

手足如何汗不休

胃中熱聚液旁流

熱家燥糞為讖語

寒證難教水穀留

手足汗者熱聚於胃而津液之旁達也亦有寒聚於胃致之  
挾寒則水穀不分溫熱則燥糞讖語

○陽明病手足熱熱汗出讖語大便難此熱證也與**承氣湯**  
下之

○陽明中寒不能食小便不利手足濇然汗出大便初鞭後  
溏水穀不分則不可下少與**理中湯**

不得汗

汗之不得亦須蒸

躁盛還無未必生

身痒浮遲惟各半

陽明虛證若虫行

傷寒欲得汗與**麻黃湯**數劑而汗不出者不治熱病脉躁盛  
而不得汗諸陽之極亦不治二者蓋真病也亦有寒熱而厥  
忽兩手或一手無脉是猶重陰欲雨之時必濺濺然大汗而  
解其或投藥無汗而脉不至者亦不可活也是可以容易談  
哉雖然諸虛少血津液中乾亦不能作汗病人有挾宿恙如  
痰飲癥瘕之類又隔汗而不能出也少血者養血以汗之痰  
癖者開關散氣以汗之是為活法若夫汗出如油喘而不休  
未有能生者也

○服藥不得汗當用蒸法燒地令熱去其火以水洒之用

**栝蒌蠲飲湯**夾和鋪地厚三寸許上鋪席令病人仰卧衣  
被覆之上時周身至脚心皆汗出乃用温粉撲即移上床○  
身痒脉浮遲為氣虛亡陽不能作汗**桂枝湯**主之

。陽明反無汗皮中如虫行以久虛也（不可汗）。凡發汗須令上下周遍身上衣被如常腰以下厚蓋之若蓋覆不周汗出不匝不流必致肢體攣搐可與（不可汗）。

不可汗

不堪汗者脉微遲

温濕虛煩壞病推  
臍間動氣並如之

病在表而脉浮者可汗表證悉具若發渴若脉不浮是表猶帶裏也未可汗之傷寒不可汗條例最多其可汗者大抵脉證全在表也表固可汗然汗之太早太過或者津液泄而變生焉至於當下而誤汗則為亡陽為譏語為下厥上竭等證其害又又速耳設或誤汗則（不可汗）以救解之（不可汗）其甚者去（不可汗）。

（不可汗）有熱者去（不可汗）吁此救兵也謹之謹之（不可汗）。（不可汗）無陽證可以（不可汗）之（不可汗）劑微汗而温助之。

。脉微弱為亡陽不可汗用（不可汗）尺脉遲為血

少榮氣不足也不可發汗先與（不可汗）以養血俟其脉不遲即以此（不可汗）和解之。風温濕温

各有本條。虛煩似傷寒却不惡寒身不疼脉不緊並不可汗下可（不可汗）。壞病者吐汗下温不解知犯

何逆以法治之並不可汗可（不可汗）加減。經水適下表裏俱虛不可汗（不可汗）主之衄血下血雖脉浮緊無汗然衄

者欲愈下者亦欲愈不愈則用（不可汗）但不可發汗。腹中左右上下動氣築觸並不可汗下證治論用（不可汗）動

在左發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤為逆先服（不可汗）汗止以（不可汗）與之動在右發汗則衄而渴心苦煩飲

則吐先（不可汗）動在上發汗則氣上衝心（不可汗）動在下發汗則心中大煩骨節煩疼頭痛目暈入食即吐先

用（不可汗）止吐次（不可汗）。下利清穀用（不可汗）或大便不通者皆不可汗。惡寒脉浮此為表證若渴則邪欲入



裏不可汗。咽乾喉塞亡血淋家衄家瘡家動氣並不可汗  
證治論皆用**小柴胡湯**厥逆不可汗**當歸四逆湯**

不可下

不可攻浮及細虛

惡寒嘔吐與之俱

小便自利并清少

有表仍兼失氣無

病在裏而脉实者可下裏證悉具若惡寒若脉不實是裏猶  
帶表也未可下之傷寒不可下條例最多其可下者大抵脉  
證全在裏也裏固可下然下之太早太過或者水穀脫而變  
生焉至於當汗而誤下則為痞氣為懊憹為結胸等證其害  
人又速耳設或誤下則**五苓湯**以救解之或裏煩則少加  
**烏梅**或轉損厥逆則兼與**四逆湯**輩吁此救兵也謹之謹之  
。脉來細小固不可下若細小而牢緊又可下也

。脉浮病在表不可下結胸脉浮大不可下。脉細虛或遲  
緩或尺部瀋弱此凡皆為血氣衰不可下也。惡寒者表之

虛證雖陽明惡寒則與大陽合病屬表可汗不可下若少陰  
證惡寒則溫之。嘔吐者雖有陽明證謹不可下**小柴胡湯**加

**柴薑**主之。小便自利汗出者津液竭糞雖硬屬陽明但用

**承氣**而出也**猪膽汁**亦可導也。脾約證大便堅小便數者

**承氣**下可**五苓湯**汗之。少陰證小便白為下焦虛寒用**四逆湯**

。大便堅小便少者津液還入胃必先**鞭**後瀉不以自出惟  
小便如常乃可下之。有表證脉帶浮或惡寒或猶生寒熱

並不可下。不轉失氣謂不下泄也不下泄則先**鞭**後瀉不  
可下大抵陽明躁糞欲下之先與**小柴胡湯**若轉失氣則必

先瀉後**鞭**更進一劑不轉失氣則止又陽明讖語潮熱脉疾  
與**小柴胡湯**不轉失氣則與**承氣湯**若次日又不大便而

脉瀋則為裏虛**承氣湯**主之凡陽證而脉瀋謹不可下

。頭汗出為津液少胞中虛不可下唯陽明讖語血熱前汗

則可下。○諸虛少血厥逆  
喉閉嘔吐亡陽陰實動氣皆不可  
下。虛家附子湯。厥逆當歸  
四逆湯。咽喉閉塞烏頭湯。嘔吐  
半夏加吉皮湯。無陽陰失而大便鞭者下之必清穀腹痛但  
用蜜導。○左動氣下之則腹滿拍急氣愈動身雖熱反欲拳  
先有卓乾薑湯。次小建中湯。○右動氣下之則津液竭咽鼻  
乾頭眩心悸竹葉湯。○上動氣下之則握掌熱煩汗出欲灌  
水竹葉湯。○下動氣下之則腹滿清穀心痞頭眩甘草瀉心  
湯。

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之四

懊懷平仄兩音

懊懷心堅用陷胃

發黃須與茵陳

舌間胎白豉拖供  
燥糞陽明承氣攻

懊懷者懊惱鬱悶之狀蓋由表證誤下正氣內虛於是客氣乘虛入而動膈煩鬱微疾特未至結胃之甚也由懊懷而結胃亦不難矣

○短氣煩燥胃中懊懷心下因鞭則為結胃用陷胃湯○舌上白胎虛煩不得眠心下懊懷或飢不能食頭汗出此邪熱鬱於胃中也並陷胃湯吐之○陽明病下之後懊懷而煩胃中有燥糞此熱結於胃也陷胃湯攻之○陽明無汗小便不利心中懊懷者必發黃用茵陳湯是則胃中邪熱前後二部俱泄之也

痞

痞滿關沉痛不侵

惡寒勿下先投桂

關浮肝熱用連苓

痞利餘糧及瀉心

當汗誤下或病屬陰而反下之輕則為痞其狀心下滿而不痛按之則濡是其虛邪留滯故但滿而不痛也通用枳實湯最良若欲攻之亦須表證已解則可矣

○痞者關脈多沉枳實連中丸半夏瀉心湯主之

○尤妙○關脈浮而痞此為肝熱用三黃湯瀉其肝若或惡

寒汗出加附子名附子瀉心湯服湯後痞不去煩渴

小便不利加芍藥主之○下後復汗心下痞而惡寒者表未

解也不可攻痞當先與桂枝湯表解乃可攻痞用三黃湯表

未解而心下妨悶曰支結用枳實芍藥湯胃脇滿而微結

柴胡加芍藥湯表證在數下之協熱而利心下痞鞭表

裏俱病加芍藥湯○下利心下痞鞭乾噫食臭腹鳴

湯證治論用枳實芍藥湯若利不止則治

下焦用**承氣湯**又不止即利小便用**五苓散**發熱汗出不解嘔吐下利心中痞鞭用**大柴胡湯**下之此太陽證○吐汗下後噎氣死鞭定痛**承氣湯**若咳逆氣虛則先用**四逆湯**胃寒則先用**理中丸**後用**承氣湯**若虛煩心下痞薄氣上衝胃頭眩經脈動身振搖伏苓桂枝白朮甘草湯○**十棗湯**證須是身涼表解脇疼而痞則可用

結胃

結胃痛硬滿其中

大小隨名用陷胃

熱實多煩寒不熱

水兼浮脈豈容攻

○病發於陽而下之早或當汗而誤下外證項強心下滿硬而痛者結胃也結胃痛硬是為實邪在裏法當下之若脈浮大若表證若水氣戒不可下亦有不經下劑而心下鞭滿者此又有可吐可下不同焉經曰病人手足厥脈乍緊邪結胃中心滿而煩飢不入食當吐之是則病在胃中故也經曰陽明病心下鞭滿不可下下之遂利不止而死是則邪氣自表傳裏留於心下未全為實法當吐之故有此戒也審如是則經所謂高者因而越之是亦吐下界限判然天壤安可以結胃裏實例論之乎要之結胃治法大要審其邪氣所在而已矣或曰結胃證具加煩燥而不治者何此胃氣絕也胃氣既絕安能布藥力以勝邪也哉○凡病在胃膈者上腕澎湃痰壅氣促粥藥不能下咽

○結胃寸脈浮關尺皆沉或沉緊俱當下若脈浮大或有表證則先用**小柴胡湯**表已解即下之○大結胃不按而痛胃連臍腹痛硬不可近**大陷胃湯**陷胃湯太峻合用者只與**陷胃丸**○小結胃按之而痛只心下硬用**小陷胃湯**○熱實結

**胃丸**○小結胃按之而痛只心下硬用**小陷胃湯**○熱實結胃口燥腹煩渴心下痛少腹**大陷胃湯**○寒實結胃無熱證

**物白散****枳實理中湯丸**○水結胃心下怔忡頭汗出無大熱

**小柴胡湯****枳實理中湯丸**○水結胃心下怔忡頭汗出無大熱

**小柴胡湯****枳實理中湯丸**○水結胃心下怔忡頭汗出無大熱

一種但舌上胎滑時時下利陰筋引痛有本條。病人血結  
習此熱入血室見識語條下膿血條。結習先理其氣用  
**通導中法**凡結習理氣已平旋復大便澀者須利導之否  
則熱邪結為塊血。誤下後未成結習急與**通中湯**救解。  
陰毒陽毒隨氣逆上伏於習中亦有結習痛硬之證治法詳  
見本條

### 氣短

氣短裏實熱來潮

風濕波難汗自流

停水心間并裏水

太陽誤下結習不

氣短者呼吸短促而不能相續是也其間呼多吸少皆不救  
焉千金曰少氣不足以息者危金匱曰短氣不足以息者實  
大抵短氣為實亦有表裏虛實之差心腹脹滿而短氣者邪  
在裏而為實也心腹濡滿而短氣者邪在表而為虛也其或

怔忡氣短此則心下停水致之體認不精其差千里信矣說

○氣短潮熱腹滿而喘此為外欲解而裏實**小承氣湯**

**胡湯**○風濕相搏汗出短氣小便不利惡風不欲去衣其邪

在表**白朮白芍湯**○食少飲多水停心下亦令氣短**小半夏湯**

**湯**○身涼乾嘔短氣汗出不惡寒此表解而裏有水**十棗湯**

○誤下太陽短氣煩燥心中懊憹因鞭便為結習**太陽白湯**

**九**更發黃一證

### 喘

喘不熱熱解表家

汗多潮熱裏攻邪

滿習合病尤須汗

水嗽青龍否去麻

○經云肺氣實則喘逆上氣所以氣逆者邪氣為實耳傷寒發  
喘邪氣在表者心腹濡而不堅外證無汗法當汗之邪氣在  
裏者心腹脹而為滿外證有汗法當下之又有水氣作喘心  
下怔忡即水為邪是以有**小承氣湯**之證若經汗下逐水不獲

痊愈喘促上攻壅塞而不得息可以瓜蒂散從權吐之吁喘  
特病之常也其或直視譫語而喘汗出髮潤而喘身汗如油  
而喘皆不可救此邪氣內盛而正氣欲絕也臨機對境盡消  
息焉。麻黃專主喘喘家湯劑多用麻黃

○太陽證無汗而喘麻黃湯或誤下之利不止脈促有汗而  
喘葛根湯下之微喘者桂枝加厚朴杏子湯發汗

後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者麻黃杏仁湯

○陽明證汗出不惡寒氣短腹滿潮熱而喘小續命湯  
若脈浮無汗而喘即汗之用麻黃湯。太陽陽明合病喘

而胃滿勿下可麻黃湯。水氣喘喘乃太陽汗後飲水多而  
水停心下小續命湯去麻黃加杏仁主之小腹滿者小續命湯去

麻黃加杏仁。陰證喘則必促脈伏而厥反陰丹立小續命湯  
。鼻息鳴喘氣逆上衝孫用和用麻黃湯加杏仁久喘  
咳嗽感冒鼻涕易簡丸實湯

咳嗽

嗽家嘔喘屬膀胱

若是少陰煩下利

寒熱胃堅值少陽  
四肢沉重更清涼

○肺主氣氣逆而不下則嗽熱邪乘之氣則燥鬱寒邪乘之氣  
則冷滯水飲乘之又與氣搏熱寒水飲皆生痰壅嗽之所從

始乎陰陽治法固自有條其間水咳三證不可無辨小續命湯  
湯太陽之表水也小續命湯太陽之裏水也真武湯陰證之水

氣也常須識之雖然古人一藥對一病所主安在哉曰水與  
表寒相合而咳則小續命湯汗之水與裏寒相合而咳則真武湯

湯溫之裏瘕合水動肺而嗽焉小續命湯所以下之也  
○太陽病身熱嗽喘心下怔忡乾嘔微利此水氣在表小續命湯

龍湯小便不利小腹滿者去麻黃加杏仁發熱惡寒身體痛  
者只依本方若身涼咳嗽乾嘔微利心下痞滿引脇疼痛為

裏有水小續命湯。少陽病寒熱往來脅脇鞭滿而痛咳嗽

或微利去(人參生薑湯)加(桑葉子乾薑)○少陰病水

氣咳嗽四肢痛重腹痛下利或嘔(真武湯)加(桑葉子乾薑)細

辛少陰咳而四逆或腹痛或泄利或悸(四逆散)加(桑葉子乾

薑)少陰咳而嘔渴心煩不得眠下利(栝太湯)○熱咳(金沸草

散)或唾膿血(小柴胡)加(黃芩)或(梔子)入(生薑)煎湯○咳嗽頭

痛不惡寒身大熱若臍腹亦有熱而內作痛者須下之用(大

柴胡湯)張氏曰發汗不解腹滿痛者急下之可(大承氣湯)又

曰腹中滿痛此為實(大柴胡)下之○咳嗽中滿而嘔用(大柴

胡湯)解利以後胃寒不食則(理中湯)加(清麥)○(桑葉子乾

薑)痰多(陳湯)加(細辛)○(桑葉子)治嗽通用(大補元氣湯)

咳逆

咳逆垂危苦言自寒

不痊乳下應須灸

咳逆俗謂之噫古人謂之噦蓋胃氣本虛吐下太過或復與

之水以發其汗胃虛氣逆噫噦生焉病勢至此極矣雖然咳

逆出於胃寒固也其有水挾寒氣擊搏而成者則(茯苓)○(桑葉

逐水主噫(實連)○(丁香)下氣禦寒又有熱氣擁鬱氣不得通而

成者則(小柴胡)加(生薑)自有條例惟是噦而腹滿不得小便

或後部不通此為真病雖有神醫未如之何

○(瀉皮乾姜湯)○(羌活散)○(桑葉子乾薑湯)○(應陰散)主之以意

擇用不瘥即灸乳下其法婦人屈乳頭向下盡處骨間三壯

丈夫乳小以一指為率亦三壯男左女右艾貞如小豆許大

抵乳直下陷中有動脈處是詳見下膿血條○證治論嘔噦

手足逆冷(小續命湯)若加(芎藭)兩虛煩不安(大補元氣湯)○陽證

咳逆潮熱(小續命湯)加(生薑)○(桑葉子乾薑湯)○仍視其大小便何

部不調即通利之○(瀉)而腹滿大便不利(小續命湯)噦而腹

滿小便不利(瀉)○(陽明傷風脈弦浮小便難潮熱而噦

○(瀉)○(桑葉子乾薑湯)○(應陰散)○(桑葉子乾薑湯)○(應陰散)

○(瀉)○(桑葉子乾薑湯)○(應陰散)○(桑葉子乾薑湯)○(應陰散)

然以... 主之。又方... 抵咳逆不止者不可救藥。○水氣乘肺亦主噎逆微咳當以表水裏水法治之見咳嗽條

乾嘔

乾嘔身熱小書龍

涎沫柴黃汗桂供

下利白通并四逆

脇疼十棗裏之攻

乾嘔者嘔而無物出也。大抵熱在胃腕與穀氣并熱氣上熏心下痞結則嘔而無所出焉。少陰下利... 吐沫... 主涎沫也。汗出乾嘔... 主自汗也。邪去則嘔者定矣。若夫水氣二證又當以表裏分之。發熱欬喘而乾嘔者此則水氣在表與... 不發熱不惡寒脇痛咳利而乾嘔者此則水氣在裏與... 是又不可無別然而表水裏水皆有效。熱何耶曰水氣乘肺也。

○表不解心下水氣... 熱乾嘔微喘或利小書龍汗之。○乾嘔吐涎沫頭痛一云少陰一云厥陰並... 得湯反劇者則與... ○汗出頭痛乾嘔... ○少陰下利乾嘔脈微... 利不止乾嘔而煩厥逆無脈... ○身涼汗出脇疼乾嘔心下痞硬短氣欬而微利不惡寒無表證此裏有水

下之。○膈上有寒飲乾嘔亦屬少陰用... ○證治論乾嘔而利... ○胃中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦憤憤然無柰者... 數為胃熱緩寒生

嘔吐

嘔吐陽明氣逆行

數為胃熱緩寒生

太陽合病利不利

腎證二條各有評

表邪傳裏裏氣上逆則為嘔吐水穀不下是也。傷寒嘔吐有胃熱有胃寒有水氣有膿血辨是四者而已。胃熱者脈數或緊必有口苦舌乾煩渴之證。胃寒者脈弦而遲必有逆冷下



食大小便自利之證水氣者先渴後嘔膈滿怔忡若胃脘膿血則腥氣燥氣奔逆上衝經所謂嘔家有癰膿不須治膿盡自愈又謂服(白朮湯)吐者其後必吐膿血是矣大抵嘔吐皆有所出已下咽而出者嘔也未下咽而出者吐也吐特甚於嘔耳若槩以嘔無所出則其間所謂乾嘔者獨何耶嘔吐多屬陽明氣逆而上行戒不可下汗後水藥不入口者逆嘔而脈弱小便自利微熱而厥者虛極難調也(半薑湯)嘔家聖藥熱燥者(白朮湯)代之

○陽明嘔吐(小柴胡湯)加(半薑湯)主之陽證通用嘔而發熱(小柴胡湯)嘔而渴(猪苓湯)先嘔後渴此為欲解急與水解先渴後嘔為心下停水(赤茯苓湯)汗後或瘥後胃脘餘熱虛煩嘔吐(內蘗湯)加(半薑湯)吐汗下後虛煩不得眠而嘔(梔子生薑湯)○寸脈數煩熱而吐為胃熱(五苓散)(內蘗湯)(小柴胡湯)汗下後關脈遲緩而吐為胃寒(理中湯)(五苓散)加(半薑湯)寒多不飲水而吐(理中湯)去(木)加(半薑湯)○太陽少陽合病自利而嘔(黃芩加半夏薑湯)○太陽陽明合病當自利若不利但嘔(葛根加半夏湯)胃中有熱胃中有邪氣腹痛氣逆欲嘔(黃連湯)○太陽發熱汗出心下煩鬱痞鞭下利嘔吐(大柴胡湯)

○少陰嘔證(四逆湯)加(半薑湯)水氣或欬或悸身痛自利(白朮湯)去(附子)加(半薑湯)膈上寒飲乾嘔吐涎沫(四逆湯)若更吐利手足逆冷煩躁甚者(吳茱萸湯)又手足寒心中溫溫欲吐不得吐脈弦遲為胃中實可吐之或用(半身湯)入(半薑湯)並屬少陰○溫毒發斑心悶而嘔身熱足冷有本條○水逆證渴欲飲水水入即吐小腸不利故也(五苓散)(小柴胡湯)○金匱云諸嘔吐穀不下(半身湯)似嘔似噦似喘心中澹澹

(半夏湯)大小便不利(傷寒廣經吐下寒氣隔食入口即吐(黃芩湯)嘔吐膿血見吐血條(半夏湯)○嘔吐膿血見吐血條

吐血

吐血諸陽受熱邪

表之不發於鑿家

因而熱毒流於臟

地血二黃數劑嘉

諸陽受熱其邪在表當汗不汗致使熱毒入臟積於內遂成吐血蓋傷寒失汗則邪熱化為惡血或蘊毒不除亦能蒸腐其血凡眼閉目紅神昏語短心忪痛悶眩冒迷忘漱水燥煩嘔吐喘促驚狂讖語鼻衄唾紅背冷足寒骨熱膚闕四肢厥逆多汗頑痰胃脇小腹滿急大便黑而微利小便多而不禁此等皆瘀血證也男女均有此血脉婦人傷寒尤多見之以其得病於經水來去之期或受病中間經水適至耳血之為痛大抵夜重日輕或晝明了而暮讖語血屬陰從其類也前證不必悉具但見其一二分曉便作血證主張

然傷寒咯血猶難救療况吐血乎凡吐血皆非表恙初病猶可用工有陸續而來或經數時而復吐者斷不可救藥也

○方藥詳見解題通用羅胃汁一小盞入新汲水煎茅花主之血熱者黃芩白芍湯證治論用地血散犀角湯三黃湯

湯。大下後寸脉沉遲尺脉不至咽喉不利唾膿血者犀角湯升湯此有兩證一陽毒一少陰在陽毒則或用陽毒升湯

湯在少陰則或用生肌散加生肌散。服生肌散吐者其後必吐膿血犀角湯。非傷寒證而吐血者與給粉散

散若虛勞咳嗽吐血口苦咽乾真黃芩湯主之

衄血

衄血膀胱病欲瘳

脉微發表病家愁

緊而無汗麻黃進

浮緩熱以桂投

經絡熱盛陽氣擁重迫血妄行出於鼻者為衄其熱在表也是雖表熱邪猶在經然亦不可發汗汗之則額上陷脉微

直視而不得以古人戒之所以無汗用...者有汗用...者非治血也散其經中邪氣耳若邪氣不得發散擁迫於血而血復不止也大陽血而固為飲解或有衄血不止但頭面汗出其身無汗及發汗不至足者又為惡證當明辨之

○大陽證衄血及服...後致血者皆陽氣盛長病欲解也...衄而脈微不可發汗與...後致血者皆陽氣盛長病欲解也

○有汗而衄脈尚浮緩可再與...○衄而煩渴欲飲水水入即吐者先服...○陰證本無衄

若少陰厥而無汗強發汗必動血血從耳目口鼻而出是為下厥上竭不可治治要方用...○千金云凡時行衄血不可斷之如或過多即可斷以...吹入臍九竅出血通用○陽明發熱口燥漱水者必衄見漱水條謹不可汗

下膿血室必讖言  
濕毒無如腸垢鮮  
消穀養堅膈下蓄  
膀胱熱結六條全

○衝脈為血之海即血室也男女均有此血氣亦均有此衝脈衝之得熱血必妄行在男子則為下血讖語在婦人則於經水適來適去之時經氣尚虛邪乘虛入或熱退而胃滿讖語或蓄血而寒熱似瘧皆謂之熱入血室私竊怪夫世俗常談凡病皆先調氣而血之一字念不到焉其間一二亦知理血則曰婦人有之不思血氣即陰陽也負陰抱陽中兩間而為人誰獨無此血氣哉否則張朱之書所謂...  
○之類是特為婦人設耳然而血證之味何如曰挾血者脈來乍溢乍數閉灼明滅或沉細而隱伏也若夫血熱交攻則寸關洪盛大抵多於左手見之左手主血固如是爾經云血上逆則忘血下蓄則狂下焦蓄血小便必自利血結之處又當以此推之外證具于吐血汗解

○衝脈為血之海即血室也男女均有此血氣亦均有此衝脈衝之得熱血必妄行在男子則為下血讖語在婦人則於經水適來適去之時經氣尚虛邪乘虛入或熱退而胃滿讖語或蓄血而寒熱似瘧皆謂之熱入血室私竊怪夫世俗常談凡病皆先調氣而血之一字念不到焉其間一二亦知理血則曰婦人有之不思血氣即陰陽也負陰抱陽中兩間而為人誰獨無此血氣哉否則張朱之書所謂...  
○之類是特為婦人設耳然而血證之味何如曰挾血者脈來乍溢乍數閉灼明滅或沉細而隱伏也若夫血熱交攻則寸關洪盛大抵多於左手見之左手主血固如是爾經云血上逆則忘血下蓄則狂下焦蓄血小便必自利血結之處又當以此推之外證具于吐血汗解

○陽明病下血譫語或胃脘滿如結背暮夜如見怪狀此為  
熱入血室頭汗出者刺期門以瀉肝若不刺合用承氣湯  
加參黃芩以散熱也○腹痛身熱下膿血如魚腦如爛肉  
汁曰濕毒也○治要方用承氣湯加  
白腸垢或承氣湯○熱氣乘虛入於腸胃脘下有熱泄汗赤黃  
不解消穀易飢多日不大便必有瘀血○承氣湯  
或承氣湯加承氣湯○脾約證胃熱消穀有本條○下焦  
蓄血其人如狂小腹結急小便必自利與承氣湯或承氣湯  
加承氣湯○承氣湯大峻合用者只與承氣湯○太陽病不  
解執結膀胱其人如狂而血自下下者愈不愈用承氣湯○  
瘀血灸承氣湯半錢承氣湯倍之承氣湯又倍之新汲水煎入  
醋下○失血少血或尺脉遲或諸脉不出湯劑中須以承氣  
為佐

即三焦之府取穴以病人中指中節為寸令仰臥從臍  
心正中向上五寸以墨點定從墨點兩邊橫量各二寸半大  
約直兩乳是期門穴也針入四分此證治論穴法可與咳逆  
條參下穴參用

發黃

發黃尿秘引清漿

身熱盡痰為中濕

便黑尿多血證黃

臍乾腹滿胃風傷

發黃者濕氣在裏復於熱於脾胃蒸濕不散而得之或病屬  
陽而用溫內熱而被火亦發黃也濕氣勝則如熏黃而晦熱  
氣勝則如橘黃而明傷寒至於發黃單陽無陰病勢已極不  
可以尋常目之如所謂寸口無脉鼻出冷氣如所謂形如煙  
熏擡頭直視如所謂環口蠶黑柔汗發黃不治者亦多矣然  
而發黃之與瘀血大抵相類之何以辨之曰小便不利者為  
黃小便便利則瘀血也○千金云酒疸下之然為黑疸也

連根搗取汁效

○黃瘧證脈浮滑而緊數尿秘頭面汗出及頤而止渴引水

漿因黃湯或和胃黃湯或五苓散下消熱更宜黃湯○

血證發黃如狂小便多大便黑二便黃湯或黃湯○

當圓○太陽中濕發黃身熱盡痛頭汗目黃蓋寒濕在裏致

之可五苓散若欲解散則用麻黃湯○

湯餘見中濕條中濕與發黃不利小便非其治也○陽明傷

風發黃易飢氣短腹滿咽乾心脇痛小便難潮熱咳嗽咽

痛息短頭眩嗜卧脈弦浮大小柴胡湯○初發黃急用

瓜蒂散口含水搗一字許入鼻中出黃水次服茵陳五苓散

發斑

斑如溫毒黑膏良

裏實表虛因發出

熱病重陽別有方

若還發汗愈增瘡

病證屬陽誤投溫藥或當汗不汗或當下不下或汗下未解

陽熱內然蒸滲外迫熱毒入胃皆致發斑蓋熱必傷血血熱

不散裏實表虛由是熱氣乘虛出於皮膚輕則如疹子重則

如錦紋是爾斑家謹勿發汗汗之重令開泄瘡爛又加多也

凡斑畧見一二須早圖之日子稍延獨陽絕陰不可救藥其

發黑斑者熱劇胃爛無及矣然而斑之方萌與蚊迹類焉又

不可誤用藥也發斑多見於胸腹蚊迹多在手足之間關前

陽脈洪大病入昏瀆先紅後赤者斑也陽脈不洪病人自靜

先紅後黃者蚊也發斑屬陽陽毒具而陰脈形或大便自利

或佛鬱氣短而燥糞久不得通虛扁復生莫能施其巧

○溫毒發斑冬月冒寒至春間陽氣盛則發病經吐汗下而

表未解毒未消也葛根湯主之肌肉斑爛咳而心悶下利嘔吐

清汁下部瘡或口瘡黃連湯或高麗槲皮湯○熱病發斑

時氣發斑大青四物湯○續命湯○陽毒曰重陽發斑有

本條○咽痛者麻黃湯○發斑通用升麻湯○

○發斑通用升麻湯○

○發斑通用升麻湯○

散原用... 熱多者... 如... 黃連...  
物... 可擇用有... 證者少與... 氣湯...  
北用... 劑證治論用... 加... 須以...  
為... 血熱內結者與... 發斑小點...  
色常鮮紅者易治或如錦紋... 難治若初發色紅  
漸次微黯良久黯又轉甚面色肌肉... 斷不可救初發  
便如黑誌者亦然赤斑五死一生黑斑十死凡內外熱熾汗  
下不解煩悶咳嘔足冷耳聾便是發斑之證

舌白胎

舌胎大熱應難

懷胎協堅并中濕

利腹痰... 嘔惡寒  
更兼臟結六條者

病家邪氣在表舌上無胎自傳入裏津液結搏則舌生白膜  
如胎之狀是亦丹田有熱也熱初傳裏其舌胎滑熱氣漸深  
其舌胎滋熱聚於胃舌為之黃若舌間黑色則病已深而熱  
已極矣經云熱病口乾舌黑者不治蓋舌屬心心屬火黑者  
腎家賊熱所勝五臟反尅其能生乎

○尺寸脈緊口中熱氣而乾燥足冷膝目鼻中涕出舌上胎  
滑勿妄治也到七八日以來微執手足溫為欲解或七八日  
以上反大執者難治若腰痛者必欲利與... 若惡寒者  
必欲嘔與... 太陽誤下胃中空虛  
客熱動膈懷穢舌胎... 或陽明證具其脈浮緊下之  
而懷穢舌胎用藥同○陽明胎下鞭滿不大便而嘔舌上白  
胎... ○陽明中濕舌上生胎以丹田有熱胃中有寒  
濕也... 主之○臟結亦屬陽明舌上白胎有本條○古  
黃者法當下之舌黑者不治

口燥咽乾

口燥陽明... 寒

人參白朮... 咽乾

少陽專以柴胡治

腎證應須急下安

脾胃有熱津液涸少所以口燥舌乾然而口中乾燥汗之將何如曰汗之重無津液其咽乾者尤不可汗也治法固自有條或依條用藥而口中尚更不和則當以瘀血推之蓋焦煩漱水口燥唇乾血證有之矣。陽明口躁咽乾無大熱背微惡寒煩渴白虎加人參湯渴欲飲水者用藥同。少陽口燥咽乾小柴胡湯。少陰口燥咽乾而渴者急下之用承氣湯。血證口躁唇乾見漱水條。狐惑咽乾唇瘡聲啞有木條煩燥

煩燥來時熱氣升

陰為陽勝太陽經

陽明躁糞連臍痛

腎候陽虛陰燥乘

心主火腎主水心熱則煩腎熱則燥此通論也傷寒煩燥則有陰陽虛盛之別焉陰虛而陽勝則為煩陽虛而陰勝則為躁有先煩而漸加躁者有先躁而後復煩者煩其熱之輕燥其熱之甚也或邪在表或邪在裏或陽勝或陰勝或火邪條例不一當詳審而調理之設若結胃證具而煩燥吐利四逆而煩燥下利發熱厥逆而燥不得眠惡寒踈攣脈不出而燥此皆不治之證或者見幾而作聲之可乎

○太陽證煩燥寸關脈浮數身熱是也風寒俱盛其脈浮緊無汗而煩燥當汗不汗其人煩燥並用大青龍湯心中悸而煩燥小建中湯執六七日渴欲飲水五苓散無執但狂言煩燥五苓散水調服刺吐之自汗心煩小便數不可與桂枝湯

只用芍藥甘草湯服後汗出煩渴甚其脈洪大白虎加人參湯。陽明證煩燥以多日不大便有躁糞故遠臍痛而煩燥也以承氣湯隨輕重用。少陰證煩燥尺寸俱沉厥冷自利是也心煩不得卧黃連雞子湯黃連阿膠湯吐利厥逆煩躁欲死吳茱萸湯茯苓四逆湯下利咽痛心中煩滿黃芩湯

下利嘔嘔煩渴不得眠清冷湯惡寒而踈時時自煩欲去衣被

太陽病以火熏之而不得汗亦致煩燥或火

對其背令人汗出大熱入胃而煩燥並**黑豆煎湯**解之。汗後煩不得眠欲水者少與之小便不利與**五苓散**。下後甚煩夜靜不嘔不渴無表證脉沉微**黃芩附子湯**若兼燥懷即與**附子散湯**發汗若下之病仍不解而煩燥伏令**四逆湯**吐汗下後虛煩心下痞滿氣上衝胃頭眩經動身為振搖伏令**桂枝白朮甘草湯**虛煩附入胃滿條。瘥後胃弱不能勝穀亦致微煩減穀則愈仍與**小柴胡湯**。陰極發燥或陰毒用火熨灸及投熱藥以致發燥者並不可誤用涼藥燥甚仍與熱劑用**四逆湯****五苓散**。陰盛隔陽身冷大燥欲飲水不入口不得睡脉細沉緊有本條

### 渴

渴為浮脉太陽臨陽毒熱多并中暑

汗是陽明利少陰其人引飲喜盃深

熱氣薰蒸津液耗少所以發渴熱邪深淺條例不同然是渴者大抵裏有熱也或曰六經外證獨少陰曰渴厥陰曰煩何耶少陰屬腎主水熱氣既深腎水易竭安得而不渴厥陰屬肝心之母也病主消渴飲水多而小便少是其裏熱已極子氣乘母於是挾心火以為煩惟煩則消矣凡渴證用藥並去**半夏**以其性燥而逐水也若先嘔後渴則為欲解當與之水先渴後嘔則為水停心下屬**赤茯苓湯**故併述之

○太陽發渴則脉浮表不解心下水氣**小青龍湯**去**半夏**加

**芍藥**服**桂枝湯**汗出後煩渴甚者**白虎加人參湯**小便不利而渴**五苓散**身熱惡風手足溫脇滿而渴**小柴胡**去**半夏**

加**人參****芍藥**太陽病無汗而渴勿用**白虎湯**可**小柴胡**若

得汗後脉洪大而渴可少與**白虎湯**○風溫灼熱而渴**芍藥**

**根湯**○明發渴則有汗脇下鞭不大便而嘔舌上白苔

**柴胡**去**半夏**加**人參****芍藥**陽明病汗多而渴勿用**五苓散**

可**芍藥湯**若汗少小便不利脉浮而渴與**五苓散**一云

可**芍藥湯**若汗少小便不利脉浮而渴與**五苓散**一云



出小便不利渴引水漿黃湯。少陰發渴則自利咳而嘔引水飲清冷湯。下利而渴欲飲白頭翁湯。脈微細欲吐不吐心煩但寐小便白下利而渴四逆湯。陽毒大熱大渴黃芩湯主之。中暑渴者白虎加人參湯。若渴不已與酒漿黃連湯。渴欲飲水水入則吐曰水逆五苓散。

漱水不嚥

漱水陽明衄血時

頭疼口燥熱生肌

發狂痰血無寒熱

犀角桃仁類例推

唇燥口乾血證類有之必欲取水而灌漱也然漱水而不飲水何哉蓋渴者易為飲陽熱入裏胃中液乾患不與水耳惟夫上焦痰血下焦蓄血乘肺發燥渴證獨無是以漱水而不欲下咽也漱水條例惟血證有焉

○陽明身熱頭疼口躁漱水不欲入咽必衄血脈微者犀角

**地黃湯**

**藥石湯**

○無表證不寒熱胃脘滿唇燥口乾漱水不

嚥小便多此為痰血必發狂輕者犀角地黃湯。重者藥石湯

甚者葶藶散取盡黑物為度

可與水

可水除煩使胃和

常須少與勿令多

若還不與無由汗

強與還因水致痼

病非大渴不可與水渴不與水無由作汗則喘而殂也傷寒飲水是為欲愈之候若渴者與之過多或小渴而強與之飲腹中熱少一不能消停飲作害者多矣曰水結曰喘悸曰咳噎曰嘔噦曰腫滿曰下利曰小便不利安有不自水氣得之診視又當識此

○太陽病發汗後大汗出胃中燥不得眠其人欲飲水當少與之胃和則愈。厥陰病渴欲飲水者與水則愈。霍亂發熱頭痛身熱熱多飲水者與五苓散。嘔吐病在膈上後必

忘水者與**瀉陰湯**。○水逆證見嘔吐條。○水結證見頭汗出條。○飲水多水停心下氣上乘心則為悸水氣結於胃腸則為水結胃中虛冷則為嘔噦冷氣相搏為噎上迫於肺則為咳喘瀆入腸中則為下利邪熱所搏蓄於下焦則為小便不利小腹滿而裏急溢於皮膚則為腫重。○飲水過多者**五**

小便自利

小便自利血相干

蜜導陽明腎證寒

脾約讖言脚攣厥

太陽汗下大便難

小便自利非血證則腎虛也惟血證則小腹結而如狂惟腎與膀胱俱虛則不能約制水液是二者小便皆自利也若腎虛而挾熱焉故乍瀝乍旋謂之小便數

○傷寒下焦有熱小腹必滿應小便不利今反自利者此血證也法當下之又有病在太陽遍身發黃其脉沉結小腹雖

堅而小便不利此則非血若或小便自利其人如狂血證諦矣下之**瀉陰湯**。○陽明白汗應小便少而反自利者津液竭也糞雖硬但以**蜜導**亦可導。○少陰四逆小便

自利為虛寒用**四逆湯**或**真武湯**去茯苓若小便白亦是下焦寒與**四逆湯**。○小便數大便鞭此為脾約脾約**黃連湯**。○主之張氏云跌陽脉浮而瀆浮則胃氣強瀆則小便數是為

脾約跌陽胃脉也此證消穀引飲蓋胃壯而熱矣。○傷寒脉浮自汗小便數若胃不和而讖語少與調**胃承氣湯**。○太陽

便硬可與甘草乾薑湯**芍藥甘草湯**。○太陽吐汗下後小便數大便因鞭**小承氣**利之。○小便尿血證治論用**延胡索散**

遺溺

遺溺風濕戒利腸

腹瀉身重合口三陽

下焦不攝兼停血

腎絕狂言五證詳

水液之餘者入胞而後小便胞中虛寒不能約制水液加以邪氣乘之故旋溺自遺而不禁也

○風溫脈浮自汗體重多眠鼻鼾喘息恬不欲言誤下則小便不利直視失溲○三陽合病腹滿身重口中不仁面垢譫語遺尿並不可汗下少與**白朮湯**○膀胱瀦水下焦不攝則亦遺溺經云邪中下焦陰氣為慄足膝逆冷便溺妄出合用

**四逆湯**○下焦蓄血小腹結急小便自利不禁輕者**桃仁承氣湯**重則**抵當湯**○狂言直視遺尿腎絕不治

小便難

小便汗竭胃乾空

多汗陽明並戒通

引飲濕黃須要利

澁難虛熱客胞中

汗自外泄津液中乾此小便所以不通也或陰虛而陽湊之小腸伏熱亦令旋溺赤黃數且難矣素問曰陽入陰分則膀胱執而小便難其謂是乎多汗者以利小便為戒伏熱者以

涼劑行之若夫中濕發黃不利小便非其治也

○發汗多亡津液胃中乾小便不利及陽明汗多小便不利者並不得利之小便自利則愈○引飲過多下焦有熱小便

不利脈浮者**五苓散**脈沉者**猪苓湯**○中濕發黃家並與利

小便○小便難者陰虛而陽湊之故小便黃為下焦熱以**覆**

**散**筆利之**木通散**亦可太陽汗後漏不止而惡風四肢

急小便難**桂枝湯**加附子**湯**陽明中風脈浮弦大身黃暈乾氣

短腹滿潮熱時噦心脇痛嗜卧小便難**小柴胡湯**○表

有水氣身熱而咳表不解心下停水小腹滿小便不利**小**

**龍湯**去**麻黃**加**茯苓**汗下後發熱頭項強痛無汗心下滿微

泄小便不利**桂枝湯**去**芍藥**加**茯苓****白朮**嘔而發熱胃脇滿心

下怔忡小便不利**小柴胡**去**黃芩**加**茯苓**少陰病小便不利

四逆散加茯苓

○瘥後腰下有水氣**牡蠣澤瀉散**主之

大便下利

利惟膽胃負時殞

不渴脾寒渴腎虛

腸垢鴨溲并濕毒

讖言備載古人書

下利須別陰陽三陽下利身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身涼無熱此大槩也自利不渴小便色白脈微清穀厥冷惡寒凡此皆寒渴欲飲水尿色如常泄下赤黃發熱後重凡此皆熱要之風邪入胃木來勝土故大腸暴下其裏虛協熱者下利尤多或解散或和解或攻泄或溫中或固下焦或利小便隨證有條但不容發汗蓋邪氣內攻若外復泄其津液則胃氣轉虛必脹滿矣然則下利之脈何如曰身涼脈小者順身熱脈大者逆大則為虛微弱則自止滑而數者是又有宿食也若夫下利讖語而目直視下利厥燥而不得眠下利發熱汗不止或嘔不止下利厥冷無脈灸之身不溫而脈不回下利日十餘行其脈反實皆邪擁正氣而下脫五奪之最急者也雖有工巧將焉用哉

○太陽陽明合病下利頭疼目疼鼻乾脈浮長葛根湯○太

陽少陽合病下利頭疼胃滿乾嘔脈浮弦黃芩湯嘔者加半夏

夏生薑○少陽陽明合病下利身熱胃脇滿乾嘔往來寒熱

脈長大而弦為負負者死但長大而不弦為順又脈滑而數

則有宿食承氣湯下之遲而滑者亦少下之○太陰自和

不渴四逆湯理中湯宋世湯○少陰自利必渴腎虛引水自

救脈微者白通湯厥逆無脈白通加豬膽汁湯通脈四逆湯若

渴而嘔嗽心煩不得眠豬苓湯自利清水色青心下必痛口

中乾燥此不可溫須下之用大承氣湯三陰下利法當用溫

若自利清水心下痛口乾燥須下之下利發渴屬少陰固也

然三陽亦有飲水者乃有熱也○協熱利者曰腸垢臍下必

熱便中垢膩赤黃或飲水乃熱也黃芩湯白頭翁湯蘗皮湯

此證惟黃芩湯最妙凡協熱下利通用之○胃寒利者曰鴨溲

臍下必寒腹脹滿便中黃白青黑或清穀四逆湯或通利者腹必痛下膿血如魚腦如爛肉汁桃花湯而瀉黃連阿膠湯或用除煩湯白風湯加大心。下利譫語有燥屎也脉不微細可下之用小承氣湯。三部脉平心下硬而下利者腸胃有積結也急下之。下利心下痞者詳見痞條。陰毒陽毒亦有下利有木條。下利身痛腹滿清穀急救裏用四逆湯服藥後清穀止但身痛者急解表用桂枝湯。固下焦利小便方論見痞條風邪入胃下利熱則散冷則不與而散或加散。假如他病腸風失血崩中漏血之人繼而下利大腸裏急痛不可忍雖與散取積已行疎導其痛獨存者此非積也榮血虧少陽剛勝陰故爾後藥當以散為散榮氣一調其痛立止設或小便不通五苓散不能作效當以散加散與之自然快利或蘊熱血痢腹中痛甚疎通滌熱痛未得平亦當為之調血

霍亂

霍亂渴來用五苓

寒多不水理中尋

霍亂厥熱薑甘附

中暑焦煩腹痛浸

張氏但稱吐利者非霍亂也霍亂邪在中焦以飲食無節居處不常得之夾食傷寒陰陽乖隔上吐下利而燥擾痛悶是其候爾偏陽則多熱偏陰則多寒卒然而來危甚風燭許仁則謂濕霍亂死者少乾霍亂死者多蓋以所傷之物或因吐利而出泄泄盡則止其死少也夫上不得吐下不得利所傷之物擁閉正氣離隔陰陽煩燥喘脹其死多也夫飲食起居當以此為戒。霍亂吐利熱多而渴五苓散。寒多而不飲水理中湯。或有寒腹滿而痛四肢拘急轉筋下利者劉理中湯如生附子。吐利汗出發熱微寒手足厥冷拘急其脈沉細四逆湯。中暑霍亂煩燥大渴心腹撮痛四肢冷

冷汗出脚轉筋**霍亂散**千金云轉筋者用**理中湯**加**煨百藥**  
○汗後霍亂雖吐利已止而身痛不休少與**理中湯**吐利已  
止汗出四肢厥而拘急脉微欲絕**通脈四逆**加**續命湯**○霍  
亂通用**霍香****正氣散**腹痛加**送**痛甚去**霍香**加**參**小便不  
利加**茯苓**瀉而吐**除濕湯**加**送**吐而不瀉**除濕湯**去**蒼朮**  
加**送****丁香**○乾霍亂心腹作痛欲吐不吐欲下不下先以鹽  
湯一匙與頰服候吐出令透即以**理中湯**倍加**橘紅**與之凡  
氣痞下中不吐不瀉害人甚急可**醫合香圓**用**枳殼散**下或  
用**霍香正氣散**加**官送****茯苓**倍加**枳殼**大抵風雨寒濕邪自  
外入**霍香正氣散****除濕湯**為要飲食居處邪由內發**理中湯**  
主之其或吐瀉不止面青厥冷者**霍香正氣散**研開去**蒼朮****薑**  
湯調下○**大柴胡湯**一證云發熱汗出不解嘔吐下利而心  
中痞者**大柴胡**主之此則非霍亂也

失音

仁直

失音發瘥反張弓

風濕血迷并舌卷

狐惑唇瘡啞似聾

更兼中晝語難通

言心聲也而聲音道路出於喉嗌肺亦主之若風若痰若血  
若熱與夫邪毒之氣伏於心竅或滯於喉間皆令人失音或  
語短而聲寒溢也活人書惟有發瘥狐惑條例風濕而下諸  
家之正說附焉○瘥證口噤頭搖掣癱不語項強背直腰身  
反張有本條○狐惑即濕霍也虫食下部為狐下唇有瘡其  
咽乾虫食其脈為惑上唇有瘡其聲啞有不條○風濕內有  
一證緩弱昏迷腹滿身重自汗失音下利不禁**白濁湯**加**白**  
**木****實**○血證心忪語短眩冒迷忘詳見吐血下膿血條○  
厥陰舌卷囊縮毒氣入臟或有不語此用**小承氣湯**○伏暑  
發熱汗渴暑入心胞絡亦或不語此用**小承氣湯**熱渴甚者  
用**前****藥**湯○風濕喉噤不語**細辛****白朮**入膏通關次用**前**  
**星**略炮加**白****朮****細辛**熱煎與之○失音亦須調導大小便

佛鬱

佛鬱陽蒸聚體層

便堅為實噦為虛

二陽併病頭昏赤

火迫身黃惕惕如

佛鬱者陽氣蒸越形見於頭面體膚之間聚赤而不散也其證則有異焉大便鞭而氣短者實也汗下後而得噦者虛也若虛若實當詳審之

○小便不利時有微熱大便乍難佛鬱而不得卧此燥糞裏

實也承氣湯主之○吐下後極虛而汗之其人佛鬱復與之

水以發其汗因而得噦此胃中寒也建中散加茯苓○

太陽初得病發汗不撤併歸陽明續自微汗面色赤者陽氣

佛鬱也解肌湯主之或汗又不撤其脉緊滑與麻黃湯○陽

脉浮陰脉濡弱妄以火熏熨欲令汗出客熱得火內則驚惕

外則佛鬱蒸肌身目發黃小柴胡湯加梔子與之

冒眩

冒因虛極有寒傷

頭痛胃堅屬二陽

吐汗下餘苓桂朮

脉沉自利理中湯

冒者蒙冒之謂眩者眩運之謂上虛則眩諸虛極而乘寒則

冒二者皆相似眩其輕而冒其重也婦人新產血虛挾寒必

冒冒家自汗則愈若少陰病下利止而頭眩時時自冒者此

虛極而脫也其與諸逆發汗劇者言亂目眩設遇歧扁其能

起之乎

○太陽少陽併病頭項強痛或眩冒胃中痞鞭刺太傾戒不

得發汗少陽本證亦有目眩見本條○陽明傷風頭眩見發

黃條○吐汗下後虛煩脉微或沉緊心下痞脇下痛氣衝胃

喉眩冒身搖筋脉動惕久而成萎大承氣湯○白朮○白芍○

脉沉遲面微赤身微熱下利清穀者必發冒汗出證屬少陰

理中湯○桂枝湯○四逆湯○隨經重用○太陽病若下之不

愈因復發汗以此表裏俱虛其人必冒冒家汗自出而愈○  
又痰飲眩冒厥逆少與**易簡三三飲**感濕頭重眩暈**白米除**  
**眩湯**○金匱曰產婦亡血復汗寒多故冒又曰產婦厥冒其  
脉微弱不能食大便堅蓋血虛則厥厥而必冒皆是虛寒

心動悸

心悸三陽證自詳

糞堅譏語胃調湯

冒旋甘桂朮真武

小建中兼炙草方

動悸多生於停水或陽氣尚弱心下虛空正氣內動致之或  
汗下以後正氣內虛邪氣與之擊搏而然也此蓋心悸而氣  
動其與驚惕不同焉

○太陽病小便利者以飲水多故心下悸小便少者必膀胱  
裏急也並用**五苓散****小半夏**伏苓湯主之○陽明病壯熱往  
來心下悸小便不利心煩喜嘔**小柴胡湯**傷風往來寒熱或  
心下悸**小柴胡湯**○少陽病脉弦細頭痛發熱誤汗之必譏

語轉蕩胃胃和則愈胃不和則煩悸而大便鞭屬**調胃承氣**

**湯**然**調胃承氣湯**太峻證治論只用**小柴胡湯**糞鞭者可加

**大黃**煩燥者可入**芒硝**此少凡調胃承氣證以此法代之尤

為穩當○太陽發汗過多其人叉手自旋冒心下悸欲得按

者**桂枝湯**○太陽病發汗不解仍發熱心下悸頭眩肌

體瞤動振振欲擗地者**真武湯**主之或**理中湯**加**茯苓**○傷

寒二三日心中悸而煩與**小建中湯**經云先煩而後悸者為

熱先悸而後煩者為虛惟虛則**小建中**主之○少陽病耳聾

目赤胷滿而煩妄加吐下則悸而驚可與**小建中湯**有熱

證即以**小建中**繼之○傷寒脉結代心動悸**炙甘草湯**○少

陰四逆證其人或悸以**四逆散**加**芍藥**主之○心下水氣厥而

悸當先治水**茯苓甘草湯**然後治厥有本條不然水入胃必

下利也○傷寒多因吐下或火熏或溫針以致驚惕○太陽

病若下之胷滿煩驚小便不利譏語身重難以轉側用**柴胡**



**杜蘆龍骨湯**不可發汗。風溫妄用火熏以致發黃劇則如驚癇時時瘳飛此為逆也。**金匱風引湯**

發狂

發狂面赤屬重陽

葶蘆升麻及大黃

血證身黃仍漱水

尿多承氣地黃湯

陰邪併於陰則顛陽邪併於陽則狂傷寒熱毒在胃併入於心遂使神志昏亂言動急速而發狂也狂之發作少則不飢妄語妄笑妄佞妄辯妄起妄行弃衣而走登高而歌甚則踰垣上屋皆獨陽亢熱使之非吐下不能止亦有當汗不汗癢熱在裏下焦蓄血而如狂者小便必利特如狂而未至於狂耳其或重熨迫汗灼艾燒針令人煩燥卧起不安則謂之火邪驚狂凡是數者各有條例若夫狂言直視旋溺自遺其與汗後熱多脈躁狂言不食智者寒心焉

○重陽即陽毒脈實數狂走錯語煩燥乾嘔面赤咽痛潮熱

**發斑** **麻黃酒湯** **陽毒升麻湯** **梔子仁湯** **三黃湯** **大黃散** **升**

**麻黃湯**加**大黃**狂走者水調**瓜蒂末**吐痰**瓜蒂末**亦可吐

○血證如狂脈微而况身黃唇燥漱水不欲下咽無寒熱小

腹鞭滿小便利大便微利而黑輕者**承氣湯**重者**桃仁**

**承氣湯**或**抵當湯**取盡黑物為効張云太陽病不解熱結膀胱其人如狂而血自下下者愈若外不解可與**桂枝湯**外已

解但小腹結急乃以**桃仁承氣湯**攻之大抵傷寒當汗不汗

熱畜在裏熱化為血故喜忘如狂。陽狂**寒水石****黃連末**各

一錢冷水調下皆效發斑妄語未可下者**龍膽草**一物湯

○火邪驚狂者醫家以火熏熨迫汗及燒針灼艾而然也其

人亡陽煩燥卧起不安**金匱風引湯****柴胡加龍骨牡蠣湯**

**柴胡加龍骨牡蠣湯****柴胡加龍骨牡蠣湯**

又火劫腹滿微喘口乾咽爛或不大便讖語用**小柴胡湯****黑**

**小柴胡湯**

直視

直視無神不轉睛

衄兼少血汗猶輕

遺尿喘泔搖頭證

脉濇循衣並卒傾

水之精為志火之精為神五臟六腑之精皆上注於目病人邪氣極盛冒其正氣遂使神志不慧目不轉睛而為之直視傷寒至於直視證候最逆不救者多亦有反目倒窺眼睛上騰此則腎絕雖昌陽引年亦不及新矣

○衄血不可汗汗之則額上陷脉緊急直視不能眴不得眠

○少血者肝氣虛目力弱若又發汗亡陽則陰陽俱虛必至

直視二者雖逆猶未甚也○狂言遺尿反目直視腎絕不治

○直視讖語喘滿者不治下利者亦不治○搖頭直視形如

煙熏心絕不治○循衣摸床惕惕不安微喘直視日晡潮熱

下之後脉弦者生脉濇者不治弦為陽濇為陰是陽病見陰

脉邪盛而正脫也○無表裏證目中不了了睛不和大便難

身微熱此非直視蓋內實也**小承氣湯****大柴胡湯**

讖語

讖言脉數鄭聲虛

胃實身和熱有無

下利濕溫并血證

三陽合病各殊途

實則讖語虛則鄭聲經曰邪氣盛則實精氣奪則虛傷寒胃

中熱盛上乘於心心為執胃則神識昏迷呢喃謔妄此邪氣

盛而語言差也若汗後若病久本音失而正氣虧則鄭重語

散不知高下此精氣奪而聲不正也讖語為熱獨語亦熱若

狂語則其執加多至於言亂惡罵又劇甚而難制矣大抵大

熱入胃水涸糞燥必發讖語當下誤汗當汗過多亦發讖語

讖語屬陽見陰證者逆讖語喘滿氣逆而上奔也讖語下利

氣脫而下奪也真氣離絕謂之何哉

○讖語為實脉洪數大便秘小便赤手足溫少與**語胃氣痛**

**湯**陽實讖語脉短促者不治若逆冷而脉沉細者即死○鄭

聲為虛脈微細大小便自利手足冷用**白通湯**。胃實讖語身熱汗多胃中燥大便硬或潮熱少與**調胃承氣湯**。大小承

**氣湯**酌量用。身和讖語以發汗多亡陽津液不和致之不可下只與**柴胡桂枝湯**。下利讖語為有躁屎脈不微細即

須下之用**小承氣湯**讖語而利不止則不治又汗出讖語者風也須俟其過經乃下之。濕溫苦妄言證有本條。瘀血

讖語狂言漱水大便黑小便多遍身黃小腹滿緣當汗不汗蓄熱在裏熱化為血故爾輕者**犀角散**重者**桃仁承氣**

**湯**。熱入血室讖語晝靜夜讖如見鬼狀速與**小柴胡**。稍遲則熱入胃津液燥中焦上焦不榮必為血結胃當

針**期門**或脈遲身涼無熱胃滿如結胃狀亦刺**期門**若血熱犯於胃氣小腹急滿小便自利喜忘如狂晝夜讖語**承氣湯**

主之。三陽合病讖語脈滑實身重難以轉側口中不仁而垢遺尿不可汗下少與**白朮湯**。發少陽汗則讖語經云汗

之則讖語甚謂有少陽也下之則額上汗手足逆冷謂下之早也。太陽病八九日下之胃滿煩驚小便不利讖語身重

不可轉側**柴胡湯**。發汗多亡陽讖語不可下**柴胡桂枝湯**主之。火劫讖語口乾煩燥喘滿**小承氣**加**枳實**

搖頭

搖頭直視似煙熏

痊證反張并口噤

真病心家已絕根

頭中痛者戰而言

頭者諸陽之會陽脈有乖則頭為之搖動然有心絕而搖頭

者有風盛而搖頭者有裏痛而搖頭者形證皆不類焉蓋陰根於陽陽根於陰陰陽互根氣血所以周流而無間若心絕

則神去而陰竭陽獨無根不能自主是以頭搖經法謂陽反獨留形體如煙熏直視搖頭者此也至於太陽發痊則風盛

於上風主乎動是以頭搖經所謂獨搖頭卒口噤項背反張者此也言而搖頭者頭中有痛言則痛甚痛則必搖經所謂

搖頭言者裏痛也又謂言者裏痛也又謂言者裏痛也又謂言者裏痛也  
之均是搖頭耳折而分之曰實邪曰虛邪曰真病又當明其  
臧否云○搖頭直視形如煙熏心家絕也真病不治○太陽  
發屋搖頭噤口頷背反張身熱足冷有六條○搖頭言者其  
裏有痛言者虛也可與如聖研易簡言湯

戰慄

戰動於身慄動心

正邪勝負兩般尋

振振汗出將痊愈

鼓頷虛寒病已深

戰慄皆陰陽之爭戰者身為之搖也慄者心戰而揚也邪氣  
外與正氣爭則為戰邪氣內與正氣爭則為慄戰者正氣勝  
慄者邪氣勝戰則欲愈慄其已甚乎○振振汗解者蓋邪氣  
欲出其人不虛故邪與正爭發為振戰正氣勝則得汗而解  
矣○傷寒六七日欲愈必振振汗出而解其有身不戰而但  
鼓頷心慄者遂成寒逆此陰氣內盛正氣內虛不能勝邪反  
為邪所勝當以四逆湯併通心御之理至明矣經云  
陰中於邪心內慄也又云邪中下焦陰氣為慄足脛逆冷便  
溺妄出此合用四逆湯仍與養正丹

瘈瘲

瘈為引縮瘲為伸

熱極風生併在經

滌熱祛風猶可望

火熏發表定歸真

瘈則急而縮瘲則緩而伸病軀瘈瘲熱氣極矣熱極生風風  
主乎動故筋脈相引而伸縮不寧傷寒至於瘈瘲疾勢過甚  
診視調理難乎否乎內經曰太陽終者戴眼反折瘈瘲汗出  
不流瘈瘲之為絕證也如此○瘈瘲最難療理能用滌熱祛  
風之劑以折其熱間有可活之者滌熱如四逆湯祛風  
如桂枝湯葷是也○風溫毒以火熏必然發黃劇則狀如  
驚癇時瘈瘲經云一逆尚引日再逆促命期設或為證所誤  
只得與金匱風引湯火邪用黑神散解

筋惕身瞤

筋惕身瞤發汗多

酌量真武更無過

左邊動氣如輕汗

此證難繫柔命何

發汗過多津液涸少陽氣偏虛筋肉失其所養故惕惕瞤瞤而跳動也張氏特設**真武湯**以救之然本方不特溫經助陽而已其間**木****芍****藥**皆於胃氣有闕焉素問云脾中風則肌肉瞤蓋脾主肌肉胃為津液之海是雖過汗法當溫經助陽又不可不以胃氣為本也雖然已經吐下而復汗汗下而復燒針得之尤甚逆也經曰傷寒吐下後發汗脈微心脇痞痛虛煩眩冒氣上衝咽筋脈動惕者久而成痿又曰太陽汗後復下表裏俱虛更加燒針因胃煩面黃膚瞤者難治以至汗出如油口噤肉戰伸吟喘促者不治然則吐汗下可輕乎

○陽氣之柔者養筋發汗過多病軀無陽筋必戰動或虛人微取汗或傷風自汗妄用**大青龍湯**便有厥逆筋惕肉瞤之

證俱屬**真武湯**羸甚者去**芍藥**有熱證者去**附子**尤在酌量

用之○應發汗證而腹中左右上下有動氣者並不可汗若汗之即筋惕身瞤其左邊動氣者尤不可汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤其候最逆且先服**防風白朮湯**次服

**建中湯**十救一二○太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身重

欲擗地**真武湯**○吐下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脈

沉緊身振搖者**茯苓桂枝白朮甘草湯**久而成痿者通用若

心下滿痞兼與**枳實湯**加**茯苓甘草**

不仁

不仁口腹及膚皮

痛癢寒溫總不知

正氣重為邪氣伏

榮虛衛弱厥如尸

經曰諸乘寒則為厥醫冒不仁蓋其血氣虧少不能周流於一身於是正氣為邪氣所伏故肢體頑痺不知痛癢寒溫厥如尸而醫且冒也苟其不仁脈或浮洪發喘無已水漿不下

汗出如油是氣絕於命門束手待盡而已

○**桂枝湯**加**乾薑**或**桂枝湯**加**芍藥**各半湯以

意度用。少陰脉不至腎氣微精血少寒氣上奔血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令其身不仁是為尸厥

不得眠

不眠腎證利而煩

大汗膀胱胃裏乾

吐汗下餘煩懊懣

熱多熱少數般看

素問云胃不和則卧不安所以不和者津液乾焦熱邪煩燥陽獨盛而陰偏虛故爾蓋夜以陰為主陰氣盛則目閉而卧安惟夫陰為陽所勝故終夜煩擾而不得寧所謂陰虛則夜爭者此也若陽虛而陰勝焉又有夜靜晝煩之證耳

少陰下利而渴不得眠**猪苓湯**此停水也若二三日以上

心煩不得眠**黃連阿膠湯**主之。太陽發汗多或大汗出胃

中乾躁煩不得眠欲飲水者少與之胃和即愈若脉浮小便

不利而渴**五苓散**。吐汗下後心中懊懣虛煩顛倒不得眠

**梔子散湯**或**酸棗湯**。大熱乾嘔呻吟錯語不得眠**黃連**

**毒湯**凡陽毒熱病皆不得眠。下後發汗無大熱脉沉微不

嘔渴無表證夜靜晝煩而不得眠**乾薑附子湯**。陽勝陰則

狂眠亂夢用**梔子散湯**陰勝陽則驚悸昏沉用**酸棗湯**。瘥

後不得眠者熱氣與諸陽相并陰氣未復故也**梔子烏梅湯**

或**易簡溫膽湯**加**竹茹**此可通用

多眠

多眠神思苦沉昏

自汗風溫默默然

狐惑唇瘡沉細腎

太陽浮細亦癡眠

陰邪勝陽人多昏默昏昏閉口者陰司闔也默默不言者陰

主靜也多眠四證二者病在經若太陽惡寒其脉浮細是陽

氣未盡復也若狐惑淹沉素得之下利則其亡陽可知矣此

所以為陰勝歟

○風溫證尺寸俱浮自汗喘息腫重不收嘿嘿欲眠不可  
汗可**柴胡湯**病在少陰厥陰二經。狐惑證四肢沉重咽乾  
聲啞上下唇瘡害人甚急有本條。少陰證尺寸俱沉細但  
欲寐急與**四逆湯**復其陽氣又少陰欲吐不吐煩而多寐五  
六日自利而渴張氏無治法若小便白者可用**四逆湯**張氏  
又云少陰病脈微細沉多寐汗出不煩欲吐若變證五六日  
自利煩燥反不得寐者死少陰證變難辨難治貴在審詳。  
太陽證頭項痛惡寒嗜卧脈浮細或胃脇滿者**小柴胡湯**脈  
但浮**麻黃湯**○胃傷風發黃嗜卧有本條

瘧後昏沉

瘧後昏沉似怪妖

或時寒熱或時潮

語言錯謬精神少

毒在心胞汗未消

傷寒瘧後半月以來終不惺惺錯語少神或無寒熱或寒熱  
似瘧或潮熱頰赤鑿以風魅治之非也是由發汗不盡餘毒  
在心胞絡間致之

○瘧後昏沉不惺**麻黃湯**再取微汗○瘧後勞復食復

見下後有熱條○瘧後胃脘餘熱虛煩而嘔**小柴胡湯**加**生薑**

○瘧後喜唾不已膈上有寒**理中丸**○瘧後從腰以下有水

氣**桂枝湯**○瘧後日暮微煩以其病方瘧強與穀食而

不消也節飲食則愈

飲酒復

飲酒還教病復來

悶煩口燥舌生胎

妄言不寐仍乾嘔

解毒黃連湯妙哉

極陰變陽寒盛生熱古人以傷寒為大病大病之後可與酒  
乎有勞復而發熱者有食復而發熱者飲酒致劇其熱尤甚  
於勞食復也

○傷寒已得汗解因飲酒而復劇煩悶口燥乾嘔伸吟妄語  
不得睡**黃連解毒湯****龍膽瀉肝湯**或**百寶**為佐

尋衣摸空

尋衣妄語熱哺潮

脈瀆為陰終不救

下後陽弦病有膠

發黃須要小便流

華陀云病人手循衣縫不治間有一二活者幸也

○吐下後不解多日不大便日哺潮熱不惡寒獨語如見怪

劇者不識人循衣撮空怵惕不安微喘直視微者但發熱識

語並用**大承氣湯**下之若得大便後脈弦者生脈瀆者死弦

為陽瀆為陰是陽病見陰脈也○太陽病用火重之以致發

黃陽盛則欲衄陰虛小便難陰陽俱虛身體枯燥頭汗及頸

口乾咽爛腹滿微喘或不大便讖語甚者嘔噦循衣摸床此

證小便利則可治

百合

百合昏如祟物厭

或時喜食或時嫌

似寒不冷熱無熱

欲步難行卧不恬

百合者百脈一宗舉皆受病無所謂經絡傳次也皆因傷寒

虛勞大病之後臟腑不平變而成此其狀似寒無寒似熱無

熱意中欲食復不能食默默欲卧復不得卧強欲出行復不

能行崇朝口苦小便赤黃藥入即吐利也病源所載證狀一

同其脈微數每尿則頭痛者六十日愈若尿不頭痛但淅淅

如寒者四十日愈若尿則快然而但眩者二十日愈

○**百合知母湯****百合地黄湯****滑石代赭湯****雞子湯****百合洗方**

選用之

臟結

臟結無陽舌白胎

陰筋急痛引臍來

雖然飲食全如故

下利頻頻不可回

臟結者臟氣閉結而不復流布也一息不運機絨窮一毫不

續穹壤判臟其可結乎外證有如結胃但飲食如故時時下

利為異耳其脈寸浮關沉細而緊無陽舌胎陰筋引臍腹俱



痛是也病人脇下宿有痞氣連於臍傍痛引小腹而入陰筋者亦名臟結於此而圖其痊濟豈不難矣哉

○臟結無陽證不往來寒熱或寒而不熱其人反靜舌白胎者皆不可下也蓋其邪未全成熱猶帶表寒可刺**關元穴**仍

**与小柴胡湯加生薑**

兩感

兩感膀胱對少陰

頭疼口燥大而沉

胃脾肝膽二三日

脉證双傳准例尋

傷寒惟兩感不治兩感者半屬於陰半屬於陽臟腑俱受病也一日太陽少陰俱病則頭疼口乾煩滿而渴脉大而沉二日陽明太陰俱病則身熱臍乾譊語腹滿不食脉長一沉三日少陽厥陰俱病則耳聾囊縮厥冷水漿不入脉弦而沉或三日而僵或六日而仆張氏無治法但曰兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同雙鍾以意消息謂如下利不止身體

體疼痛急先救其裏與**四逆湯**如不利但身體疼痛急先救其表與**桂枝湯**此為治有先後其達權識變之論也謝後一釋張氏治有先後之說亦以為陽先受病在乎表則先解表陰先受病在乎裏則先救裏是亦一意然先表者裏不可緩先裏者表亦不可緩也歟

蛇厥狐惑

蛔厥烏梅及理中

臟寒胃冷吐長虫

咽乾聲啞名狐惑

濕匿唇瘡限數終

蛇厥證屬厥陰病家有寒妄發其汗或汗後身熱又復汗之以致胃中虛冷故長虫逆上飢不欲食食即吐虫其乍靜乍煩者虫或上而或止也虫聞食臭必出所以食則吐虫也張氏有言厥陰為病消渴氣上衝心飢不欲食食則吐蛔吐蛔既出於胃令復有消渴之證何哉蓋熱在上焦而中焦下焦虛寒無熱耳設或大便鞭結是亦蘊毒使然又不可指為燥

黃連用生梓理中湯加大黃入蜜以利之白朮乾薑所以助

太厚也。治法先服理中圓次用烏梅圓若誤下之利不止

則用四逆湯又法理中圓加茯苓枳殼烏梅渴者加枳實根

○狐惑與濕霍皆虫證也狀如傷寒多因傷寒下利變壞成

之蓋腹中有熱入食無多腸胃空虛故三虫求食而食人之

五臟也其候四肢沉重並惡飲食默默欲眠目不能閉舌白

齒晦面目間赤白黑色變易不常虫食下部為狐下唇有瘡

其咽乾虫食其臟為惑上唇有瘡其聲啞濕霍條例是雖調

理有方此越人所以望而驚也。治霍桃仁湯黃連軍角湯

雜黃銀散備用而已金液丹方狀治濕霍蓋硫黃能殺腹中

諸虫無陽者與之

陰陽易陰陽交

陽易陰根腫痛深

溫家脉躁重生熱

腹連腰膝痛為陰

陰與陽交汗莫禁

本湯方

男子陽易婦人陰易病新瘥而動淫慾也一各女勞復感於

情者亦然其候身重氣乏小腹絞痛頭不能舉足不能立四

肢拘急百節解散眼中生花熱上衝胃在男子則陰腫入裏

腹內攻刺在婦人則裏急腰腫引腹俱疼若手足拳攣其脉

離經皆不可活或榮衛虛精髓竭翁翁少氣著席不能動搖

者引歲月死吁內傷六氣外傷七情其為害若是歟

○損脉離經一呼一至是為不足至脉離經一呼二至是為

有餘○(病機)假鼠糞湯(白皮湯)乾薑湯(青竹茹湯)薑湯

本湯以意擇用○陰陽交者溫病不得發汗若汗之復生大

熱狂言不食其脉躁疾是也大抵不治若脉浮數則衣證猶

在可再汗之若脉沉實或狂語則為胃實陽盛又當下之發

汗後復熱者通用此例○再汗用(桂枝湯)○再下用(承氣湯)

陰毒陽毒

陰毒身如擊撲然

疾沉汗渴痛膈咽

身斑面赤多煩燥

陽毒狂言其數發

陰氣獨盛陽氣暴絕則為陰毒身冷有汗其脈沉細而疾是也沉而右有初病遽然而成者有服藥數日變而成者蓋以腎氣極損生冷傷脾內已伏陰外又感寒致之或先感外寒而後伏陰於內內外皆陰陽氣不守故爾陽氣獨盛陰氣暴絕則為陽毒身熱無汗其脈弦洪促數是也有初病遽然而成者有已經吐下變而成者蓋以酒麪過度丹砂僭燥腸胃極熱致之或病證屬陽誤投溫藥助熱為邪內外皆陽陰氣不守故爾陰陽二毒皆有頭疼微利之證抑陰用熱抑陽用寒固有條例然此二毒隨氣逆上結伏於胃中皆令人心下痞硬非常法所能通也當急作規摹以泄之陰毒泄則陽氣復陽毒泄則陰氣復陰陽升降榮衛流行自然大汗而解矣若心下已結延至六七日間斷不可活外證治法詳于後篇

○陰毒外證面目唇爪青黑口開氣短咽喉不利手足厥冷

身不甚熱痛重如打撲或數慄而寒頭目俱疼腰重背強毒

氣攻心心下堅悶腹中絞痛外腎並臍下冷硬額上及手背

間冷汗不止嘔吐下利燥渴陰極發燥精神恍惚言語醒醒

聲音鄭重舌上黑色陰病回陽服藥未透亦須外借火氣但

勿迫熯也生薑能解散寒邪發越陽氣亦要藥也○陰

毒沉細而疾身冷有汗陰毒甘草湯白朮散附子散正陽散

內桂散回陽丹返陰丹天雄散正元散退陰散金液丹可選

用之令陽氣復而大汗解矣○陰毒已泯則灸陰二

穴以手足和為効仍以前項藥濟之若六脈附骨疾勢困甚

者臍中用先陰法方訣詳具于後凡治陰毒得陽氣下

復者皆生煩燥切勿誤投涼藥躁甚與陰輩○陽毒外

證身量大熱面目俱赤無汗頭疼腰背四肢疼痛發斑如錦

紋心下結悶煩燥咽痛喘滿唾吐膿血下利赤黃小便赤

黃錯語驚狂或走甚者舌卷而焦黑暈如煙煤○陽毒發洪

黃錯語驚狂或走甚者舌卷而焦黑暈如煙煤○陽毒發洪



①三末熬成膏次入徐藥打和得所圓如皂子大**圓**每  
二圓**湯調下**

陽證似陰陰證似陽

陽證如陰冷四肢

滑沉尿亦大便秘

面紅煩燥身微熱

陰證如陽沉更微

陰極發燥熱極發物極則反也重陽必陰重陰必陽寒暑  
之變也四肢冷小便赤大便秘或重舌黑眼開言動脈沉而  
滑謂之陽證似陰面亦煩燥身有微熱眼閉穀熱脈沉而微  
謂之陰證似陽欲知的定當推原反本察色聽聲辨以六經  
參以外證徐徐焉據脈驗之數熱遲寒陰陽別矣。陽之體  
輕陰之體重陰家脈重陽家脈輕。陽盛且靜陰盛夜寧陽  
虛暮亂陰虛夜爭。陽證似陰**白**而熱極生寒則四肢逆  
冷水或用**承氣湯**。陰證似陽**四逆湯**加**葱白**主之陰盛則  
燥下虛則面赤寒則身微熱也

陰盛隔陽

○陰盛隔陽脈細沉疾身冷大煩燥皆卧泥水之中欲飲水而  
不欲入口者是飲水者非可服**靈應散****少煩散****丹****圓**亦効  
孫用和以半兩**黑附子**一枚燒存性候冷為末入真糯米一  
大錢匕和為二服每服水一盞**白**半匙煎六分冷服躁止得  
睡汗出皆藥之驗也

小柴胡湯加減法

傷寒諸方惟**小柴胡**為用最而諸家屢稱述之蓋以**柴胡**半

**實**能利能汗凡半表半裏之間以之和解皆可用也抑不知**小**

**柴胡**非特為表裏和解設其於解血熱消惡血誠有功焉蓋傷

寒發熱一二日間解撤不去其熱必至於傷血不問男女皆然

**小柴胡湯**內有**黃芩****柴胡**最行血熱所以屢獲奇功但藥性差

寒用之貴能加減今推明活法凡表發熱裏又有燥渴裏熱

證者是為內外俱熱**小柴胡**加**大黃**裏無熱證但發熱在表者

**小柴胡**加**桂枝**主解表可以溫血所謂陰盛惡寒甘辛發散者

此也**大黃**主攻裏可以瀉滌血熱所謂陽盛內熱酸苦湧泄者

此也是又別其解表以溫攻裏以寒之義若遇少陽本證及無

表裏證或表裏不分之證但依本方用之並不須加減此為正

訣虛者少與尤在酌量予每見後季數輩療治傷寒輒用**當歸**

其意蓋為調血計不思一滯中脘二動痰涎三壞胃氣而血熱

又非**當歸**之所能除惑之甚矣否則熱入血室張氏特以**小柴**

**胡**主之何哉雖然均是和解耳局方以**和**解散平穩之劑為和

解張氏以**小柴胡**差寒之劑為和解意安在哉蓋局方**和**解散

為尋常感冒和平解散設也若夫熱在半表半裏既不可汗又

不可下非**小柴胡**一劑孰能內和而外解之平然而季者亦不

可以輕心而用**小柴胡**也脈之不審證之不詳縱橫泛應執

**柴胡**以為公據脫遇浮熱似陽其不誤人性命幾希矣其甚者僅

以**小柴胡**收效一二而乃不遵格法輕用**大柴胡**立意一差禍

不旋踵吁可畏哉

傷寒諸篤證

搖頭直視形如煙熏心絕。唇脣反青四肢多汗肝絕。反目

直視狂言遺尿腎絕。汗出發潤喘而不休肺絕。環口黎黑

柔汗發黃脾絕。汗出如油喘促無已水漿不下形体不仁命

絕。大發溫家汗則成瘵。熱而瘵不治。發溫溫汗身青面赤。耳聾不語曰重暈。不治。發風溫汗必譫語。並不治。發風濕中濕汗並逆。發動氣汗不治。發少陰汗九竅出血曰下厥。上竭不治。發少陽汗則譫語。發汗只在頭面不至遍身鼻衄不止者逆。發汗不至足者逆。諸逆發汗劇者言亂目眩。並不治。當汗無汗服麻黃數劑汗不出者不治。汗出如珠不流不治。汗出如油口噤肉戰聲吟喘促不治。汗後嘔吐水藥不入口者逆。熱病脉躁盛而不得汗不治。汗後不為汗衰復大熱臍躁疾狂言不食曰陰陽交不治。忽冒昧無脉服藥後汗解則生。若無汗脉不至者不治。少陰厥逆無脉服藥通脉其脉漸續則生。暴出則不治。下利厥逆無脉灸之脉不回身不溫不治。少陰四逆下利惡寒而拳發躁無脉不治。○下利日十餘行其脉反實者逆。少陽陽明合病下利脉長大而弦曰負。不治。陽病見陰脉不治。發斑屬陽見陰脉不治。代脉不治。吐血衄血脉反浮大而牢不治。陰易陽易離經外腎腫腹中絞痛手足拳攣不治。欬逆上氣脉散者不治。○譫語脉反沉微四肢厥冷不治。脉陰陽俱虛熱不止者不治。○七八日以上發大熱難治。○舌木爛熱不止者逆。下利發熱或汗不止厥不止並不治。○下利發熱厥逆燥不得眠不治。○譫語直視或喘滿或下利並不治。○譫語屬陽見陰證者逆。○傷寒脉乍疎乍數不治。○發斑先赤後黯面色黧晦不治。○發斑大便自利不治。○發黃而變黑不治。○口乾舌黑不止者不治。○心下痞悶上氣喘逆者逆。○霍亂喘脹煩燥不治。○謔下濕家額汗喘促或小便不利大便自利不治。○頭汗內外開格小便不利此為陽脫不治。○腹滿咳逆不得小便不治。○腹大滿而下泄不治。若脉洪緊而滑尤可慮。○臍結如結。○舌白胎陰筋引臍腹痛時時下利不治。○結腎證具加煩燥不

治。腫脹七八日發厥膚冷煩燥下利無時斬安不治。少陰吐利厥逆煩燥不治。厥而下利反能食者曰除中不治。四肢厥逆臍下絞痛石硬眼定者逆。厥陰唇青舌卷黑而耳聾囊縮不治。頭連腦痛甚手足俱寒不治。陰毒陽毒過六七日不治。兩感不治。狐感咽乾聲啞唇瘡不治。赤斑五救其一。黑斑十救其一。尋衣摸空者逆。

### 傷寒別名

清便自調自可謂大小便如常也。大便秘而堅則曰鞭。小便不利小便少下利清穀皆謂水穀不分。得大便曰更衣。大便堅小便利曰脾約。下利曰飧洩。腸僻謂痔也。寒而利曰鴨溏熱而利曰腸垢。轉失氣謂氣轉而響時時失下即後分泄氣蓋腹中有積。大汗傷氣大下傷血或火邪逼迫驚狂或尺寸脈緊而反有汗或發汗後汗不止而漏風或陰病本無汗而反有汗或其脈浮遲微弱不能作汗皆曰亡陽。吐汗下溫針以後其病不解曰壞病曰何逆。瘥後更發熱曰遺熱。○脈相尅賊曰負。○兩手無脈曰雙伏一手無脈曰單伏。○左關脈曰人迎石關脈曰氣口足趺上動脈曰衝陽足後根上陷中動脈曰太谿。○婦人乳頭直下近腹處曰期門。○臍下一寸曰氣海二寸曰丹田三寸曰關元。○玄府即汗空也。○臍間動氣曰奔豚。○筋惕肉動曰瞤。○中暑曰中暈。○妄發濕溫汗曰重暈。○渴欲飲水水入即吐曰水逆。○心下停水怔忡身無大熱頭額微汗曰水結胃。○乾嘔曰乾哕逆曰噦。○目中不了了謂不明了也。○睛不和謂不和平如常也。○三日至夏方發病曰晚發。

### 傷寒戒忌

傷寒新瘥後但少喫糜粥常公稍飢不得飽食反此則復。○又不得早起不得梳頭洗面不得多言不得勞心費力反此則復。○瘥後百日内氣體未得平復犯房室者死。○忌食猪羊雞鴨



狗肉肥魚油臘諸骨汁及鹹臧鮓脯餅麩果物

藥有寒溫相濟

黃連湯用乾薑黃連柴胡桂薑湯用黃芩薑桂麻黃升麻湯用桂枝石膏返陰丹用附子膩粉陰旦湯用乾薑黃芩與夫桂枝石膏湯桂枝大黃湯乾薑黃連黃芩人參湯其藥性寒其藥性溫溫以調陰寒以調陽蓋使陰陽調而得其正其有陽證當下而表怯者陰證當溫而帶熱者皆可以前例推之亦當權其冷熱重輕為之增減斯可矣雖然古之分劑與今之分劑多寡又不同焉藥則秤三四錢為一服水則用一大盞取七分為一劑此亦通今之論也所謂利藥不嫌生溫湯須要孰又當權衡於此云

據脈

傷寒治法據脈為要問證次之證如此脈亦如此條例徑行若證熱而脈遲證寒而脈數切不可自惑於倉卒須是畧去外證專以脈為主領斟酌而調理之庶無差誤雖然偏陽之脈又何耶曰人稟陰陽二氣陰根於陽陽根於陰往來流通而無間斷者也一或偏勝百病生焉蓋偏陽則多熱偏陰則多寒偏陰則六脈虛濡按之無力頗有細澹輕澹之狀病主沉寒法當溫散人所易知若夫病軀內外有熱其脈不數不洪但指下急澹而小緊如枝條刮刮之狀此則為陽勝陰當用寒涼之劑以解陽熱愆伏之邪以行血熱疑結之毒不可錯認以為脈小脾虛誤以溫藥益其疾也縱或嘔逆亦是熱邪乘虛熱氣閉隔斷不可以溫脾之劑投之否則墮厝火積薪之轍矣凡病皆當審斯

警省

傷寒證候頃刻傳變傷寒治法繩尺謹嚴非可以輕心視之也其間種類不一條例浩繁是固難矣至於陰極發燥熱極發厥陰證如陽陽證如陰脚氣似乎傷寒中暑似乎熱病與夫蓄血一證上熱下冷乍關乍寒甚至四肢發厥昏迷悶絕凡此等類

尤當審思而明辨之若疑似未別體認未明姑且試探切不可妄投決病之劑方已雖微死生之係也謹之哉

藥方

本祖南陽活人書其詳見於傷寒百問

凡下證不得用圓子藥謂水銀礞石粉霜之類作圓以為轉下藥性有毒只取積滯傷動臟腑不能蕩滌邪熱以去病也

產婦傷寒

○小兒傷寒節度如大人法但分劑少異其間用藥小冷耳或問婦人傷寒可得問乎曰傷寒三百九十七條一百一十三方此張氏截然之筆削也於其證則有其藥焉嘗以男女為別哉要之月事去來產前產後男子所無請發明其蘊以解世俗之惑蓋婦人以血為主發熱惡寒經水適來經日熱除而曾痛讖語者是則邪氣結於胃脇當刺期門隨其尖而取之傷風經日續生寒熱發作似瘧而經水適斷者是則血結而不行當以

**小柴胡湯**散之所謂治之而愈者此也至如傷寒發熱經水適

來晝醒暮讖如見怪狀是則裏無留邪熱隨血散所謂不治自愈者此也前乎吐血下血兩條併以**犀角地黄湯****桃仁承氣湯**

**抵當湯**之類言之詳矣抑產前產後治法將何擇焉曰產前

安胎產後消瘀於是遵依條例斟酌輕重而調理之安胎者何

**桑寄生****阿膠****縮砂**為要藥他如**桂枝****半夏****桃仁****大黃**墮胎及燥

熱等輩則不可輕用也消瘀者何**川芎****蒲黃****赤芍藥****生地黄**為

要藥他如內補攔住敗血之劑則不可輕進也朱氏以**阿膠****桑**

**寄生****人參****茯苓****白朮**等而細末糯米飲調劑為孕婦安胎以**紅**

**花**一分官桂芍藥甘草半之薑棗同煎為解表消瘀以**葱白****生**

**薑**大劑濃汁為產前發散以**小柴胡湯**去**半夏**和**解熱**入子宮

郭稽中以**抵當****防風**一度**白芍**減半末之吐服主大便秘澀又

以**蜜酒**一法真可活人然則產婦證治觀此可以問津索塗矣

雖然知安胎則不可不調氣知消瘀則不可不扶虛

陳皮以調氣也當歸川芎黃耆人參以扶虛也退熱則柴胡黃芩  
苓解肌則紫蘇乾葛滋腸則麻仁枳殼助陽則乾薑良薑其間  
採撫雖未備古人之經然而甘辛為陽酸苦為陰皆不越古人  
之意姑存之篇末以便學者之觀覽云

小兒傷寒

或問小兒傷寒可得聞乎曰小兒傷寒與大人法度則同但分  
劑少異用藥少冷已略陳於前矣然而驚風瘡且亦嘗贅布此  
尤不可闕請發明藥證而條析之惡風惡寒者必畏人藏身引  
衣密隱是為表證可微取其汗也惡熱內實者必出頭露面揚  
手擲足煩渴燥糞揪衣氣籠是為裏證可略與疎利也至若頭  
額冷手足涼口中冷氣面色黯淡大便瀉青此則陰病裏虛當  
以溫藥救其裏也三者汗下溫之法可以類推矣發汗用  
桂枝湯微利用承氣湯溫裏用中湯散冷用甘草乾薑湯尋常感

風散或參蘇散傷風發熱人參羌活散或天麻防風圓壯

扶老升麻葛根湯潮熱者生犀散小柴胡湯加大黃小便不通

自瀉亦散五苓散甘露飲表裏俱熱如表裏俱見之證洗心散

主之咳嗽則人參潤肺散加紫蘇夾食則異香散柴胡圓葷然

亦視其小便或赤或白可以知裏熱之有無或清或濁可以知

裏熱之輕重幼而嬰孩則以虎口指紋之紅色驗之長而童孺

則以一指按其三關據左手入迎之緊響者斷之所謂七十二

證其證某方皆無越張朱格例特不過小小分劑而中病則止

也不然幼幼新書駢集小兒傷寒雖略率其源一二而終篇以

活人書為法果何意哉故附于卷末以備學者之觀覽云



圖書在版編目(CIP)數據

新刊仁齋直指方論 小兒方論 醫脈真經 傷寒類書  
活人總括/[宋]楊士瀛撰.—北京:北京圖書館出版社,  
2005.4

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2684-3

I. 新… II. 楊… III. 方書—中國—宋代  
IV.R289.344

中國版本圖書館CIP數據核字(2005)第013714號

ISBN 7-5013-2684-3



9 787501 326846 >

書名 新刊仁齋直指方論 小兒方論 醫脈真經 傷寒類書  
活人總括(全六冊)  
著者 [宋]楊士瀛 撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)  
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail: Btstxb@nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

造紙 華寶齋  
印刷 杭州富陽古籍印刷廠

開本 八

印張 一三三

版次 二〇〇五年四月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-2684-3 / K·1018  
定價 四二三〇圓

