


新刊仁齋直指方論

一



據上海圖書館藏宋景定元
年至五年環溪書院刻本影
印原書版框高十九·五釐
米寬十三·二釐米

金瓶撰活人總括嬰兒指
皆以活名識及脈書一以於是
歛肅而相告曰誠亦易也誰肯
傾困竭彙以徇人哉余曰亦
非有天平天將萬古濟人利物
之心故資我以心通意狀之學
既得於天還以事之且言造物
之心之期也或者隨光自耀
藏諸己而不溥諸人政怨玉毀
積中草木俱腐矣雖然人有四
百回病或出於前三冊之外者
可不原證擇方揭為直指之捷



徑乎明白易曉之謂直。若蹤以
示之謂指。剖前哲未言之蘊。摘
諸家已教之方。濟以家傳。考之
肘後。使讀者心目瞭然。對病識
證。因證得藥。猶繩墨誠陳。之
可欺。無幾仁意周流。疊之相續。
非深歎歎。余嘗慨而作曰。夫之
予人。以是物。必使之有以用。是
物有是物。而不能用。非惟味大
抑亦自弃。夫者也。併書此為
同志勉。景定甲子。良月朔。三山
楊士瀛登父序。

仁齋直指方論綱目

○卷第一

總論

○卷第二

證治提綱

○卷第三

風

寒

暑

濕

○卷第四

風緩

歷節風

脚氣

○卷第五

諸氣

○卷第六

心氣

脾胃

○卷第七

痰涎

附

水飲

嘔吐

○卷第八



○卷第九
咳嗽附喘嗽
聲音

○卷第十
虛勞附虛汗
勞瘵

○卷第十一
漏濁
夢泄

○卷第十二
眩暈
驚悸

○卷第十三
痰瘧
泄瀉

○卷第十四
吐瀉附霍亂
脫肛

○卷第十五
瀉痢
痢冷

○卷第十六
積熱
秘澁

○卷第十七
五疸
諸淋

○卷第十七

消渴

脹滿

虛腫

○卷第十八

身體

附腰

腎氣

附木腎

○卷第十九

腎臟風癢

頭風

○卷第二十

眼目

○卷第二十一

耳

鼻

唇舌

咽喉

齒

○卷二十二

癰疽

乳癰

癌

疔瘡

瘰癧

疔瘡

瘰癧

瘦瘤

○卷第二十三

腸癰

便毒

腸風

諸痔

○卷第二十四

癩疹風

丹毒

癩風

諸瘡

疥癬

○卷第二十五

諸蟲

蠱毒

挑生毒

諸毒

○卷第二十六

婦人

血氣

拾遺

小兒

後集

活人總括

醫學真經

仁齋直指方論綱目

新刊仁齋直指方論目錄

環溪書院刊行

○卷之一

○總論

五臟所主論

五臟虛實論

諸陰諸陽論

血榮氣衛論

脈病逆順論

男女則一論

問病論

易簡方論

○卷之二

○證治提綱

得病有因

治病當先救急

治病如操舟

用藥中病即止

經常用藥有功

論肝脾土病

病人尺脈洪大

水氣腎氣血氣風毒擒縱治法

治痢要訣

簡徑治痢

薑茶治痢

治禁口痢

瘧痢用藥

治瘧要訣

發瘧嘔吐用藥

瘧有水有血

瘧證寒熱有根

常山治瘧須用大黃為佐

寒熱以瘧

吐汗下治瘧

瘧後調理

退熱

柴胡退熱不及黃芩

退熱有法

小兒風證解熱有二

滯血發熱

佐助小柴胡湯

腎熱用五苓散

下後大腸熱腫墜

通利大便有法

飯後隨即大便

脾泄腎泄

腎泄

大便脫泄白膿

脫肛

小便不通

石淋

轉胞

孕婦胎熱似痢

下焦蓄血

產婦血塊築痛

身體血滯作痛

身體胃腹隱熱隱疼拘急足冷

血滯

血崩

吐血

治渴有法

酒家有病用藥

治傷寒筋傷肉腠

發產詳證

胃脇痛引背上面兩手浮腫

肚皮痛

胃堂氣隔

治嗽喘用膠

○卷之三

風

風論

諸風證治

心中風

肝中風

腎中風

肺中風

脾中風

胃中風

中風惡證

治卒中法 又法

小續命湯

排風湯

人參順氣散 拙良

烏藥順氣散

攝生飲

三生飲

附香飲

星香飲

大醒風湯

左經圓

鐵骨丹

鐵彈圓

拒風丹

麝香圓

增味五痺湯

瓜蒂散

稀涎散

鶴膝風擊方

急風方

烏龍丹

聖寶治瘥良方 又太陽風症證候

荆歸湯 方見瀾門

獨活酒 方見瀾門

寒

中寒方論

中寒證治

不換金正氣散

養胃湯

薑桂湯

附子理中湯

沉附湯

薑附湯

附子散

五丹圓

應夢人參散

敗毒散

傷寒證治格法 見瀾門

暑

中暑方論

中暑證治

五物香薷湯

香薷縮脾飲

香薷剉散

五苓散方見水

小柴胡湯方見血類

竹葉石膏湯

六和湯

二陳湯方見痰類

小半夏茯苓湯方見水

消暑圓

來復丹

大黃龍圓

道途中暑方

濕

中濕方論

中濕證治

加劑除濕湯

茯苓白朮湯

腎著湯

黃耆建中湯

不換金正氣散前見

神木圓方見痰類

生附除濕湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

朮附湯

五苓散方見水

茵陳湯

濕瀉身痛方

卷之四

風緩

風緩方論

風緩證治

排風湯方見風類

續命湯方見風類

蘇合香圓方見散類

白圓子方見身

安腎圓

不換金正氣散前見

大聖一粒金丹

大鐵彈圓

蝎附散

四斤圓方見

虎骨酒

鐵骨丹方見風類

鐵彈圓方見風類

歷節風

歷節風論

歷節風證治

虎骨散

壯骨圓

海桐皮散

獨活寄生湯方見腰膝

麝香圓方見風類

虎骨酒方見風類

硫黃酒

必用歷節風方返魂追命再造散神授圓

白虎風走注癢痛方

麝香圓方見風類

脚氣

脚氣方論

脚氣證治

二十四味輕脚圓

木瓜散

降氣湯

檳榔散

排風湯方見類

生木瓜圓

止嘔湯

檳榔壹物湯

海桐皮酒

杉節湯

三和散方見諸氣門

枳殼散

脾約圓

大黃湯

追風毒剉散

敗毒散方見寒類

竹茹湯方見積熱門

木香飲

降氣湯方見前

養正丹方見痼冷門

和劑流氣飲方見滿門

椒瓜圓

越婢湯

小續命湯方見風類

乾薑甘草湯

香薷剉散

獨活寄生湯方見痿門

石南圓

加劑除濕湯方見濕門

五苓散方見水

換腿圓

獨活湯

不老地仙丹

烏蛇圓

慈濟圓

四斤圓方見風

大流氣飲方見滿門

虎骨散方見風

金液丹方見風

安腎圓方見水

二陳湯方見

艾瓜圓方見

烏藥順氣散

不換金正氣散方見寒類

○卷之五

諸氣

諸氣方論

諸氣證治

和劑七氣湯

和劑治中湯方見胃門

沉香降氣湯

大沉香圓

三因七氣湯

易簡二陳湯

枳殼散方見

和劑流氣飲

指迷七氣湯

順氣木香散

三和散

五皮散

分氣紫蘇湯

蘇子降氣湯

蘇合香圓方見

秘傳降氣湯

五膈寬中散

紅圓子

異香散

調氣散

神保圓

蓬煎圓

生料五苓散

青木香圓

俞山人降氣湯

青娥圓

感應圓

麻仁圓

撞氣何魏圓

三枝煎圓

二薑圓

香橘湯

桔梗枳殼湯

薑桂散

沉香開膈散

良薑湯

白豆蔻散

如意圓

頂珠圓

楊氏麝香圓

橘皮一物湯

氣塊石燕散

分心氣飲真方

○卷之六

心氣

心疾方論

心疾證治

沉麝圓方見血類

和劑七氣湯方見氣類

沉香降氣湯方見氣類

大沉香圓

蘇合香圓方見散門

桂枝四七湯

勝金散

靈脂酒

生地黄膏

靈砂丹

五丹圓方見血類

薑桂飲

生薑枳殼湯

粘痛圓

心腹痛方

脾胃

脾疾方論

脾疾證治

良薑粘痛散

和劑抽刀散

調痛散

桂化散

穢跡脾疾方

沉麝圓方見血類

靈脂酒方見氣類

和劑七氣湯方見氣類

和劑流氣飲方見散門

獨桂湯

薑桂飲方見散門

檳榔散

金液丹

二物湯

乾薑甘草湯

治脾痛脹滿方

脾痛氣痛方

和胃證治

治中湯方見散門

沉香磨脾散

安胃散

人參開胃湯

助胃膏

宮方七香圓

丁香半夏圓

○痰涎

痰涎方論

痰涎證治

橘皮湯

前胡半夏湯

人參飲

星薑飲

二聖飲

大半夏湯

半夏圓

豁痰圓

神木圓

辰砂化痰圓

強中二薑圓

養正丹方見前

白圓子方見身

二陳湯方見

控痰良方

水飲

水飲方論

水飲證治

芎藭湯

大半夏湯方見前

小半夏茯苓湯

五苓散方見

桂苓湯

平肺湯

青木香圓

香龍湯

十棗湯

安腎圓

五皮散方見

三和散方見

消飲圓

倍木圓

嘔吐

嘔吐方論

嘔吐證治

附子理中湯方見

二薑湯

四逆湯

吳茱萸湯

小柴胡湯方見

大半夏湯方見

小半夏茯苓湯方見

治中湯

二陳湯方見

地黃湯

加減七氣湯

養正氣散

養胃湯方見

參橘湯

丁香煮散

附子散

養正丹方見

靈砂

蘇合香圓方見

感應圓方見

翻胃方

橘皮湯

蓮子散

溫胃散

○卷之八

○咳嗽

咳嗽方論

咳嗽證治

華蓋散

加減麻黃湯

溫肺湯

三拗湯

金沸草散

人參欬花膏

天麻防風圓

清肺湯

解毒雄黃圓方見續熱

黃連阿膠圓

不換金正氣散方見

大阿膠圓

桑皮散

小青龍湯方見

十棗湯方見水

真武湯

養正丹方見

補肺湯

理中圓

加味理中湯

養胃湯方見寒類

人參飲

養肺湯

寧嗽湯

冷嗽寒痰方

橘皮半夏湯

大七氣湯

白圓子方見身

人參潤肺散

南星散

加味半夏伏苓湯

人參芍歸湯

黃耆建中湯

消膿飲

人參胡桃湯方見

定肺湯方見

七寶散

雄黃散

蘇合香圓

咳逆方方見

○喘嗽

喘嗽方論

喘嗽證治

九寶湯

定肺湯

調降湯

杏蘇飲

五味子湯

人參胡桃湯

三拗湯方見咳

玉華散

小青龍湯方見水

神祕湯

小半夏湯方見

五苓散方見

四七湯

桔梗枳殼湯方見

指迷七氣湯方見

分氣紫蘇飲方見

二陳湯方見

安腎圓方見

八味圓方見

五靈圓

雄黃圓

控痰良方方見

虛勞喘嗽眩暈方

○聲耳音

聲音方論

聲音證治

星薑飲

荆蘇湯

金沸草散方見

人參欬花膏方見

二物湯

歸荊湯方見

小柴胡湯方見

不換金正氣散方見

三因七氣湯方見

犀角地黄湯

朱砂圓方見

二陳湯方見

金花散

密陀僧散方見

治屢桃仁湯

人參平補湯

山藥圓方見

杏仁煎

木通湯

○卷之九

○虛勞

虛勞方論

虛勞證治

十補湯方見

雙和湯

地骨皮散

枳殼散方見

加味人參紫苑散

大阿膠圓方見

紫蘇湯方見

巨蘇湯方見

意以湯方見

人參湯方見

人參飲方見

人參歸湯方見

地黃飲

大寧嗽湯

遠志圓

龍齒湯

養心湯

十四友圓方見

辰砂妙香散方見

麝香鹿茸圓

還少丹

黃耆十補湯

鹿茸大補湯

黃耆六一湯

當歸散

沉香蠶室散方見

治中湯方見

人參開胃湯方見

桃仁煎

神授圓

燒髮方

蘇合香圓方見

黃耆益損湯

○虛汗

虛汗方論

虛汗證治

建中湯

黃耆建中湯

當歸建中湯

桂枝附子湯

黃耆六一湯方見門

當歸散方見門

木苓湯

牡蠣散

龍膽散

防風散

溫粉止汗法

勞瘵

勞瘵論

勞瘵證治

芎歸血餘散

北斗符

鱉甲生犀散

虎牙圓

雄麝圓

五枝散

藍汁方

猫肝方

木香蛤蚧圓

參耆散

全蠶圓

神授圓方見門

服藥食忌

論瘵虫形狀

○卷之十

漏濁

漏濁方論

漏濁證治

約精圓

蓮子六一湯

清心蓮子飲

辰砂妙香散方見門

蠟冬圓方見門

五苓散方見門

雞清圓

寧生膏方見門

伏兔丹

平補圓方見門

牡蠣圓

金櫻子圓

小使然子圓方見門

桑螵蛸散

生料四君子湯方見門

龍齒補心湯

煉鹽方

山藥圓

還少丹方見門

鹿茸益精圓

家韭子圓

震靈丹方見門

二陳湯方見門

白圓子方見門

分清飲

蒼朮難名丹

夢泄

夢泄方論

夢泄證治

伏苓圓

蓮子六一湯方見漏門

雞清圓方見漏門

鹿角散

還心丹方見諸門

鹿茸益精圓方見漏門

家並子圓方見漏門

十補湯方見諸門

震靈丹方見諸門

○卷之十一

眩運

眩運方論

眩運證治

伏苓桂枝白朮甘草湯

理中湯方見諸門

來復丹方見諸門

養正丹方見諸門

芎朮除眩湯

乾薑甘草湯方見諸門

附子理中湯方見諸門

桂苓圓

香薷散方見諸門

消暑圓方見諸門

十四友圓方見諸門

安腎圓方見諸門

和劑七氣湯方見諸門

芎辛湯方見諸門

千金五苓圓方見諸門

香橘飲

蘇合香圓方見諸門

蘇沈沉麝圓

芎藭湯方見諸門

五苓散方見諸門

震靈丹方見諸門

黑錫丹方見諸門

二陳湯方見諸門

止瀉圓

白附子圓

人參前胡湯

驚悸

驚悸方論

驚悸證治

養心湯

寧志圓

參乳圓

十四友圓

朱產圓

蜜陀僧散

溫膽湯

加味四七湯

伏苓甘草湯

薑木湯

小半夏伏苓湯方見諸門

炙甘草湯

寧志膏

○卷之十二

痰癭

痰癭方論

痰癭證治

麻黃白朮湯

五積散

養胃湯

解毒雄黃圓

養正丹方見前

薑附湯方見前

附子理中湯方見前

草果飲

小柴胡湯方見前

香薷散

五物香薷湯

香薷縮脾飲方見前

常山飲

七寶煎散

加劑除濕湯方見前

木附湯方見前

柴胡桂薑湯

二陳湯

四獸湯

紅圓子

烏頭七葉湯

治瘴木香圓

地龍飲

觀音圓

芎歸鱉甲散

五勞圓

經效瘧丹

消癖圓

驅瘧湯

生熟飲

蒜丹圓

七物湯

截瘧丹

勝金圓

治瘧湯

久瘧方

六物湯

脾積圓

○卷之十三

吐瀉



霍亂

吐瀉方論

吐瀉證治

霍香正氣散方見前

五苓散方見前

良薑飲

治要除濕湯

胡椒湯

治中湯方見前

香薷散方見前

木瓜湯

四順附子湯

薑鹽飲

鹽湯法

蘇合香圓方見前

鹽麩方

泄瀉

泄瀉方論

泄瀉證治

理中湯

調中散

肉蔻散

治要除濕湯

香薷散方見前

平胃散

生料五苓散方見前

黃連阿膠圓方見前

洞泄方

藥皮湯

薑附湯方見前

木附湯方見前

大已寒圓

戊己圓

真人養臟湯

雞舌香散

三稜散

固腸散

實腸散

安腎圓

和劑七氣湯

靈丹

木香散

二神圓

當歸厚朴湯

○卷之十四

○瀉痢

瀉痢方論

瀉痢證治

敗毒散

不換金正氣散

治要除濕湯

理中湯

艾薑圓

人參豆蔻散

香薷坐散

五物香薷湯

六和湯

升麻湯

黃連阿膠圓

藥皮湯

香連圓

真人養臟湯

三稜散

感應圓

解毒燈黃圓

和劑流氣飲

大異香散

五臟管中散

牛乳湯

茱連圓

胃風湯

肉蔻散

附中理中湯

薑附湯

禁口痢方

斷下湯

固腸散

玉華白丹

赤石脂禹餘糧湯

治痢乳豆湯

熱痢方

○脫肛

脫肛方論

脫肛證治

蠟皮散

蟹頭散

磁石散

香荊散

釣腸圓

縮砂湯

黃連阿膠圓

鐵粉散

蒲黃膏

桑螺膏

椽斗膏

木賊散

獨虎散

石灰方

敗毒散

桑葉方

小兒灸法

瀉痢證

積熱

積熱方論

積熱證治

小柴胡湯方見

敗毒散方見

三黃湯

三黃圓

洗心散

四順清涼飲

八正散

甘露飲

木通散

甘豆湯

黃連湯

牛黃涼膈圓

解毒雄黃圓

酒蒸黃連圓

黃連阿膠圓方見

痼冷

痼冷方論

痼冷證治

十補湯

附子理中湯方見

沉附湯方見

薑附湯方見

麝香鹿茸圓

八味圓

黑錫丹

養止丹

靈砂

椒附散

治腎虛血寒方

秘泄

小便不通論

小便不通證治

草蜜湯

蒲黃湯

八正散方見

五苓散方見

麥香湯

平補圓

首香圓

批仁承氣湯方見

暖宮圓

掩臍法

轉胞方

大便秘泄方論

大便秘泄證治

大黃飲子

三黃湯方見

三黃圓方見

甘豆湯方見

金液丹方見

半硫圓

膠蜜湯

潤腸圓

膠蜜湯

木香逐氣圓

二香圓

獨

脾約麻仁圓方見

追風毒劉散見門 疎風散
寬快湯 降氣湯 桔梗枳殼湯方見
煨蒜方 掩臍法 蘇威圓
調導飲 熏方

○卷之十六

五疸

五疸方論 五疸證治 薑蜜湯
桂枝黃耆湯 必效散 一清飲
茵陳湯 五苓散方見 酒蒸黃連圓
山茵陳散 甘露飲 黃連阿膠圓方見
柴胡甘草湯 生髮方 紅圓子方見
二陳湯方見 辰砂妙香散 當歸白木湯
六物湯 土瓜方 小兒絲子圓
芎藭湯方見 加劑四君子湯 解熱方

諸淋

諸淋方論 諸淋證治 消石散
二神散 車前子散 血餘散方見
黃芩一物湯 八正散方見 琥珀飲
增味道赤散 車前草方 瞿麥湯
海金沙散 五苓散方見 茯苓調血湯
薑蜜湯方見 甘豆湯方見 導赤圓
秋石圓 滑石散 鵬砂散
木香湯 沙石淋方

○卷之十七

消渴

消渴方論

降心湯

猪肚圓 又方

止渴劉散

蠟苓圓

天花粉圓

天花散

小兒絲子圓

平補圓

消渴證治

生地黃膏

川黃連圓

衛生天花圓

蠶絲湯

瓜連圓

錢氏白朮散

枸杞子圓

雙補圓

茯苓丹

黃耆湯

玉泉圓

桑椹方 反二方

辰砂妙香散 方見

玉壺圓

伏神圓

八味圓 方見

殺虫方

脹滿

脹滿方論

大異香散

調氣散 方見

調降湯 方見

溫胃湯

蘇合香圓 方見

脹滿證治

五膈寬中散 方見

大半夏湯 方見

沉香降氣湯 方見

順氣木香散 方見

十膈散

車澄加圓

和劑流氣飲 方見

人參芎歸湯

枳殼劉散

虛腫

虛腫方論

十棗湯 方見

溫白圓

蘿蔔子飲

沉香降氣湯

薑寇散

消蠱湯

續斷飲

和劑流氣飲 方見

虛腫證治

安腎圓 方見

五苓散 方見

三和散 方見

神助散

桑皮散

加味枳朮湯

七絢方

外腎腫大莖物水泡通明方

青龍湯 方見

青木香圓 方見

集香湯

枳殼散 方見

行水圓

防風散

調榮飲

虛腫方

虛腫方

○卷之十八

身體

身疼方論

身疼證治

人參順氣散方見

左經圓方見

藜香圓方見

增味五痺湯方見

加劑除濕湯方見

生附除濕湯方見

五苓散方見

黃耆建中湯方見

大半夏湯方見

消痰伏苓圓

天仙飲

千金五套圓方見

白圓子

二陳湯方見

婆蒿根酒

消飲圓

倍木圓方見

沉香鱉甲散

十補湯方見

舒筋散

補髓丹

腰

腰痛論

腰痛證治

青娥圓

調氣散方見

安腎圓方見

獨活寄生湯

小續命湯方見

生附湯

薑附湯方見

甘豆湯方見

敗毒散方見

蘇沈沉麝圓方見

人參順氣散方見

烏藥順氣散方見

腎着湯方見

青木香圓方見

乳香越痛散

茴香酒

和劑七氣湯方見

麝香鹿茸圓方見

八味圓方見

十補湯方見

調肝散

沉香降氣湯

橘香圓

神麴酒

腰重痛方

腎氣

腎氣方論

腎氣證治

牡丹圓

養正丹方見

調氣散方見

沉附湯

桂薑湯

薑桂圓

茴香雀酒

川椒散

施子散

甘豆湯

海浮石散

金蓮散

五苓散方見氣門

柴胡桂枝湯

解毒雄黃圓方見熱門

枳殼散方見氣門

二物湯

青木香圓方見水門

五苓散方見氣門

金鈴散

煨棗方

蝎麝散

夫笑散

鹽煎散

全蝎延胡散

胡蘆巴散

葱白散

寸金圓

秘傳茱萸內消圓胡蘆巴圓

蠲痛圓

腰子散

茯苓桂枝湯

敵金圓

川練散方見木門

金山老艾瓜圓

腎氣方

木腎

木腎方論

木腎證治

川練散

金鈴散方見腎氣門

四神圓

○卷之十九

腎臟風癢

腎癢方論

腎癢證治

宣風散

不換金正氣散方見青木香圓

安腎圓方見水門

活血驅風散

疾梨散

烏荊圓方見風門

神授圓方見虛勞門

莖物腫爛法汁方

莖頭三立孔小漏瘡出血微膿妙方

乳香龍骨散

陰汗濕癢方

妬精瘡陰蝕瘡方

大學治腎臟風發瘡疥方

頭風

頭風方論

頭風證治

消風散

追風散

川芎茶調散

究原抽刀散

芎芷散

香茅散

二陳湯

如聖餅子

芎辛湯

活人葛根湯

桂枝葛根湯

頭風方

○卷之二十



眼目

眼目方論

眼目證治

人參羌活散

敗毒散

消風散

治眼壅赤腫方

磨光散

菩薩散

羌活散

菊花散

白疾梨散

開明散

海明散

蟬花無比散

蟬花散

治眼流氣飲

千金漏蘆湯

八珍飲

黃連解毒湯

瀉肝散

洗肝散

眼痛方

消毒麻仁圓

龍膽散

和劑流氣飲

楮實散

遠志圓

麥黃湯

生地黄圓

朱僧熟醫方

道人開障散

杏仁方

花草膏

蔓枯草散

神授錢太師方

鹽木散

仙木飲

觀音圓

羊肝圓

大仙飲

前巖開翳散

真珠退翳散

退翳散

五退散

還睛圓

明眼生熟地黄圓

駐景圓

山藥圓

菊睛圓

大流氣飲

千金神麴圓

湯泡散

水淋法

黃連滴眼方

滌風散

立消膏

薑液膏

南麴砂散

洗心散

爛眩方

甘石散

前巖點醫膏

傳眼方

雀盲散

治偷針方

鱗血方

通關散

○卷之二十一

耳

耳論

桂香散

地黄圓

耳鳴方

耳熱出汁方

耳聾方又貳方

耳痛方

蜈蚣入耳方

治膿耳妙方取上耳鳴妙方

青木香圓方見水

耳病證治

排風湯方見

益腎散

耳鳴暴聾方

膿耳方

雞峰方

虫入耳方

耳聾塞耳方反方

耳鳴妙方

治欬聾方

加味宣風散

芎芷散

蔓荊子散

疔耳方

久聾方

蟻入耳方

大治耳聾通神散

生料五苓散方見

鼻

鼻論

川芎三黃散

蘇子降氣湯氣喘

南星飲

鼻艱雄黃圓

霍香正氣散吐衄

黃連阿膠圓治鼻痛方

酒查鼻并鼻齧肉面粉刺雀斑方

酒查鼻流上肺風癢方

鼻病證治

敗毒散方見

衄血方又柴方

芎藭散

千金息肉方

治鼻痛方

治鼻痛方

生地黄湯

雞蘇圓

川椒散

通頂散

人參順氣散方見

甘露飲方見

酒查鼻方

鼻血方

口舌

唇舌方論

唇舌證治

升麻散

龍石散

萍草圓

甘露飲方見

鵬砂圓

舌腫大方又方

唇舌焦燥口破生瘡方

蠶麥圓方見

五福化毒丹

洗心散方見

牛黃涼膈圓方見

雞蘇圓方見

舌腫大方又方

口舌瘡腫方

口瘡方又方

生地黄膏

四順清涼飲方見

黃連阿膠圓方見

舌出方

口舌瘡腫方

口瘡方又方

咽喉

咽喉方論

山豆根圓

絳雪散

如聖湯

白藥散

咽喉證治

青解毒圓

玉屑無憂散

僵蚕圓

殺賊方又方

膽礬散

吹喉散

牛黃涼膈圓方見

遠志散

口瘡赤爛方

和劑七氣湯方見

喉閉方又方

玉鑰匙方

通關散又方

痰熱閉喉方

指迷七氣湯方見

喉風喉閉方

熱閉方又方

懸壘腫痛方又方

喉閉方

半夏桂甘湯

解毒雄黃圓方見

喉風喉痺方又方

喉癰閉方

喉痛方

齒

齒論

消風散方見

八味圓方見

皂莢散

刺槐散

雞虱圓

虫瘡方又方

麥病證治

溫風散

香椒散

二陳湯方見

鬱金散

椒鹽散

齒痛通用方

荆芥湯

安腎圓方見

開笑散

甘露飲方見

靈脂醋

虫蛀牙疼方

歸劑散



癰疽

齊峰川椒散
傳齒痛方
通用方又方

麝香散
牙疳臭方
牙癰方

牙疔痛方又方
牙宣出血方
酒齒痛方

癰疽論
癰疽證治
灸法又法

遠消方
拔毒散
蠲毒散

癰疽宣毒方又方
宣毒一醉膏
宣毒方又方

癰疽托毒排膿方
皂棘散
芎歸托裏散

癰疽毒入臟腑嘔吐惡食方
消腫散
癰疽腫毒傳藥方

妙勝散
夜明砂膏
退毒散

川烏散
星烏散
乳豆膏

收毒外消膏
乳香膏
退腫散

蜀葵膏
皂角膏
保安妙藥散

沉水膏
蠟峰散
四虎散

麝香散
蛇蝎散
湧泉膏

護肌膏
神功妙貼散
不換金正氣散見

大全內消散
小車蠟散
內消散

萬金一醉膏又方
粉乳托裏散
皂刺散

蠟礬圓
明膠酒
粉乳散

究原排膿內補散方見
貳香散
排膿內消散

加味不換金
神授香附湯
五香散

當歸酒
萬毒丸
黃耆托裏散

嬰麥散
道毒方
消毒散

清心散
癰疽腹痛方
紅內消散

加味八味圓
癰疽腹痛方
癰疽泄瀉方

癰疽腹痛方

癰疽泄瀉方

癰疽虛證寒戰方 山藥圓點見編

內托黃耆圓

特異萬靈散

洗瘡方

北艾湯 又方

桑皮散

癰疽方

瘡口大窠方 又方

消蝕散

消蝕方

茶蠟圓

斂瘡散

保安斂瘡方

硬瘡生肌方 又方

生肌散

六一膏

神應膏

神異膏

遇仙膏

癰疽方

神仙截法

將理法

灸法

保安灸甘草法

癰疽大便燥方

斂漏瘡

去水膏

收瘡口方

盪洗方

瘡口深大方

諸惡核方

發頤方

論熱背發大瘡

論暈癰疽發背

乳癰

乳癰方論

乳癰證治

究原五物湯

萬金一醉膏 見雜

乳癰方 又方

生薑甘桔湯

乳初腫方

傳乳方

癰

癰方論

癩

癩方論

癬

癬方論

癬證治

癬疽癩癬惡瘡方

癬方 又方

諸癬諸瘡方

洗癬癩瘡方 又方

瘡方

是瘡立應方

灸法

瘰癧方

丁瘡

丁瘡方論

丁瘡證治

諸丁瘡方 又陸方

瘰癧

瘰癧方論

瘰癧證治

是齋立應散

薄荷丹

必捷圓

神祕散

雄黃散

木鱉膏

粉乳托裏散 見

蠟礬圓 方見

山豆根方

解熱方

洗傳方

究原欬瘡口方

瘦癧

瘦癧方論

瘦癧證治

海藻圓

蠟礬圓 方見

針沙方

治小瘡方

六癧方

漏瘡

漏瘡方論

漏瘡證治

溫解散

猪腎酒

續斷散

保安炙甘草方 見

乳麝雲母膏

神授圓 方見

代赭石圓 方見

冷漏乳香圓

雄黃膏

黑靈散

血竭散

生地黃膏

蜂房散

蛇蛻散

艾牙散

平肌散

鐵屑膏

熏漏瘡方

洗漏瘡方

諸漏瘡方

惡核漏瘡方

傳漏瘡方

艾瘰方

腸癰

腸癰方論

腸癰證治

牡丹散

木通散

四聖散

薏苡湯

究原排膿內補散雲母膏

蠟礬圓

燒棗散

便毒

便毒方論

便毒證治

雙解湯

連翹湯

復元通氣散

退毒飲

五苓散

追風劉毒散

清涼飲

和劑流氣飲

究原排膿散

蠟礬圓

四聖散

傳方

皂角膏

膠方

蕉葉方

腸風

腸風論

腸風證治

不換金正氣散

敗毒散

酒蒸黃連圓

黃連阿膠圓

附子理子湯

理中湯

芎歸湯

小烏沉湯

枳殼散

參苓白朮散

四君子湯

烏荊圓

白圓子

不換金正氣散

猪臟圓

橄欖散

蒜連圓

法製香附方

黑散子

黑玉丹

腸風黑散

木賊散

槐角圓

真人養臟湯

黑聖散

鯽魚方

震靈丹

玉華白丹

黃龍圓

消風散

腸風父血方

腸風方

諸痔

諸痔方論

諸痔證治

清心湯

黃連阿膠圓

方見 枳殼散

追風劉毒散

清涼飲

五痔散

聖圓子

雞峯烏金散

槐角圓

蝟皮圓

收痔圓

蠟鑿圓

猪甲散

青蛙圓

穿山甲散

地榆散

皂刺圓

皂角煎圓

芎歸圓

乾葛湯

橘皮湯

代赭石圓

荆枳湯

芎歸湯

傳痔方

止血方

通用方

熏洗方

治諸痔方

逐瘀湯

治痔五聖丹

治痔諸膠膏

熏痔方

治痔方

傳藥

傳洗方

○卷之二十四

癩疹風

癩疹風論

癩疹證治

天麻散

加味羌活散

消風散

川芎茶調散

胡林散

人參羌活散

惺惺散

羌蚕散

傳藥

丹毒

丹毒方論

丹毒證治

藍葉散

防己散

朱黛散

人參羌活散

惺惺散

請丹冷熱證方

疎風解毒散

傳方

洗方

小兒風疹走帶方

癩風

附

癩風

癩風方論

癩風證治

通天再造散

本事神效追命散皂煉湯

皂角圓

硫黃酒

黑虎丹

烏蛇圓

雄朱散

雷圓散

蝦蟆圓

蔓荆圓

必用傷風方

蠟礬圓

千金治大風方

癩風灸法

癩風方

諸瘡

諸瘡方論

諸瘡證治

桑螵蛸散

乳香蠟油膏

傳洗方

臘脂散

苦練散

胡粉散

綠礬散

烏梅醋法

漆瘡方

滑石粉

紫草膏

檳榔散

赤豆散

烏羊膏

頭爛瘡方

竹葉膏

驢瘡方

麝香散

治陰汗濕瘡方

豆疔散

神降散

癩瘡發歇不止方

蠟礬圓

疎風解毒散

惡瘡方

諸瘡頭瘡方

頭瘡方

頭禿瘡方

頭痒頭腦方

治疔方

胎癩頭熱餅瘡方

諸惡瘡方

白禿頭方

疥癬

疥癬方論

疥癬證治

諸疥方

濕疥方

疥癬惡瘡方

大學全蝎散

諸癬妙方

王醫師癬方

亞癬方

久癬方

乾癬方

濕癬方

解方

牛皮癬方

遍身生皮癬方

卷之二十五

諸虫

請虫方論

請虫證治

煎美散

木香檳榔圓

錫灰圓

蝦蟆圓

雄砂圓

化虫散

貫衆酒

解毒雄黃圓見續門酒蠟膏

蠱毒

蠱毒方論

蠱毒證治

治蠱毒挑生神呪

保靈丹

聖惠圓

萬病解毒圓見續門

治蠱毒方

生漆圓

平胃散方見瀝門

東坡雄黃圓

廣南衛生治蠱毒單方見續門

七寶圓

治蠱毒挑生方

挑生

挑生方論

挑生證治

萬病解毒圓見續門

治挑生方

諸毒

立勝散方

蠟燭方

天蛇毒方

辟妖魅瘟瘡方

治挑生毒蠱毒野葛毒方

解諸藥毒殺腹內毒虫方

五絕欲死方

頭風方方

身虱方

獨勝散

卷之二十六

婦人

產婦傷寒方論 婦人方論 孕育備論
論王叔和劉元賓別男女法 論崩中帶下

血氣

血論 血疾證治 芎歸湯方見後

震靈丹方見 膠艾湯方見後 產寶固經圓方見後

芎方澤蘭圓方見後 當歸建中湯方見 大阿膠圓方見

金沸草散方見 真料治中湯方見 舌出血方

理中湯方見 芎方七氣湯方見 甘草乾薑湯方見後

木香理中湯 五丹圓 來復丹方見

黑錫丹方見 金液丹方見 養正丹方見

生料理中湯 蘇合香圓方見 參苓白朮散方見

枳殼散方見 四君子湯方見 小烏沉湯方見

枳梗枳殼湯方見 二陳湯方見 蘇沈沈麝圓

桂香圓 調榮湯 縮砂湯

交濟散 小柴胡湯 桃仁承氣湯

加減四物湯 半夏圓 黑散子

茅蘇湯 豆蘇湯 阿膠散

地黃煎 薏苡湯 艾薑湯

蒜連圓 人參湯 羅蔔飲

血餘散 小便出血方方見 法製香附方方見

燒鹽酒 桂枝酒 朱砂圓

咯血方 九竅出血方方見

瀉氣方方見 跌破出血方 頭破傷風方

失欠頰骨差方 脚筋冷縮頑痺方

新刊仁齋直指方論目錄

新刊仁齋直指方論卷之一

三山名醫仁齋楊士瀛

建安楊醫士瀛

編撰

校定

五臟所主論

夫在天之風在地為木在人為肝惟肝則主風在天之熱暵暑熯燥燠之用也在地為火在人為心惟心則主熱在天之濕在地為土在人為脾惟脾則主濕在天之燥在地為金在人為肺惟肺則主燥在天之寒在地為水在人為腎惟腎則主寒吁此天地自然之氣也氣之愆伏乘虛入人而人不能克百病之所由生故風喜傷肝熱喜傷心濕喜傷脾燥喜傷肺寒喜傷腎而暑喜傷心包絡心包絡曰膻中在胃屬間蓋心主暑故暑氣伏於三焦屬胃之關其或風氣之勝木邪乘土則脾病生焉熱氣之勝火邪乘金則肺病生焉濕氣之勝土邪乘水則腎病生焉燥氣之勝金邪乘木則肝病生焉寒氣大來心火亦為腎水所乘矣左關為人迎可以知風寒暑濕熱燥所從入之門右關為氣口可以別臟氣盛衰與食氣聚散盈虛之候若乃憂愁思慮易耗心神恚怒氣逆易損肝氣縱慾強志腎之戕形寒飲冷肺之害飢飽勞倦脾之傷外之六氣相乘內之七情相感凡是數者皆為五臟之邪因其所主而尋其其臟所受之處則得之矣

心主血所藏者神上應舌外應諸掌其聲音言其色赤其臭焦其味苦其液汗肝主筋所藏者魂上應眼外應爪甲其聲呼其色青其臭臊其味酸其液泣腎主骨所藏者精與志上應耳外應腰背其聲呻其色黑其臭腐其味鹹其液唾腎冷多唾腎熱多唾肺主氣所藏者魄上應鼻外應皮毛其聲哭其色白其臭腥其味辛其液涕脾主肌肉所藏者意與智上應口外應四肢其聲歌其色黃其臭香其味甘其液涎故心肺在上主脈氣也肝腎在下藏精血也脾居中州又所以為精血脈氣之養也心之平脈浮大而散肝之平脈弦細而長腎之平脈沉濡而滑肺之

平脈短濇而浮脾之平脈和緩而平者五臟本然之正脈也
春弦夏鈞和云夏洪取火脈來盛之義秋毛冬石以其四時
當旺者象之木火金水四時各旺七十有一日土為季脈每季
之月寄旺一十八日春則弦緩夏則洪緩秋則微緩冬則沉緩
合四季而論則亦七十有二日矣春弦者端直之狀細弱而長
是也夏鈞者浮大而散來疾去遲是也秋毛者稀軟之狀輕虛
以浮是也冬石者沉濡而滑舉指來疾是也土之脈溫厚氣行
乎臟腑之中平和不可得見其衰則現焉所謂弦鈞毛石蓋應
時而畧見耳其中須有穀神胃氣之和若弦如張弓弦鈞如操
帶鈞毛如風吹毛石來如奪索去如彈石此皆危脈也此絕無
胃氣也胃氣虧絕其能以乎若夫春得金脈夏得水脈秋得火
脈冬得土脈四季得木脈其與心之脈剋肺肺之脈剋肝肝之
脈剋脾脾之脈剋腎腎之脈剋心此皆賊邪也一臟無氣況可
以為人乎然則諸府之脈可得聞數曰小腸微洪大腸微濇膀胱
微沉胃微緩而澹微弦急此無他腑與臟合氣同氣相求則
有得其近似者矣抑古人所謂九臟者又何如耶曰形臟四一
者頭角二者耳目三者口齒四者胃中神臟五在心藏神在肝
藏魂在腎藏志在脾藏魄而脾藏意然臟者神之舍也若神之強
弱其候雖不同而為美為虛一也數實長洪其形雖不類而為
美為實一也諸脈皆弦吾知其病出於肝諸脈皆緩吾知其病
出於脾諸脈皆濇吾知其病出於肺諸脈皆浮洪病不在心乎脈
皆沉滑病不在腎乎若合腑臟而觀假如數在左寸數主熱也
沉之而得則熱入於心浮之而得則熱入小腸遲在左尺遲主
寒也沉之而得則寒入於腎浮之而得則寒入膀胱其餘以此
推之億此通變法也予得圓機之士與之論此哉

五臟病證虛實論

五臟各有所主至其病證莫不各有所主而見焉而亦莫不古

口乾煩燥掌熱心痛而喘膈上有動氣者心家病也。面青多怒
脇下痛硬逆目眩肢節痠急轉筋洩瀉難臍左有動氣者肝家
病也。肝乘脾被水氣故逆是脾陰下。筋於陰器故逆難。面黑
而恐呵欠呻吟齒痛骨疼耳鳴精泄足脛寒腰脊痛小腹急疼
痲泄而裏急後重臍下有動氣者腎家病也。面白善嚏憂愁欲
哭喘嗽氣逆咽喉不利洒淅惡寒時作寒熱臍右有動氣者肺
家病也。面黃善思善噫善噦中脘脹滿飲食不消身體腫重肢
節酸疼怠惰嗜卧四肢不收當臍動氣是非脾家之病也。東萊
先生有曰肝受病則目不能視腎受病則耳不能聽脾受病則
口不能食心受病則舌不能舉五臟病證以此觀之不待智者
而後知矣。然而心之惡熱者何熱則脈潰濁也。肝之惡風者何
風則筋燥急也。腎何以惡濕濕傷肌肉傷則痿腫也。五臟之病推
氣留滯也。脾何以惡濕濕傷肌肉傷則痿腫也。五臟之病推
原及本安有不從所受中來哉。是以臟氣有餘謂之實。臟氣不

足謂之虛。心實之候口乾喜笑身熱汗血痛滿乎胛脇膺背之

間肝實之候目赤多怒頭眩耳聾痛引乎兩脇小腹之下腎實

之候腰膝體腫少氣不言骨痛癢泄而小便黃肺實之候喘促

咳喘中氣鼻張脛股有疼而胃中滿脾氣一實必至肢體重着

而不舉腹脹便秘而苦飢故曰臟氣有餘謂之實者此也。心虛

則恍惚多驚憂煩少色咳唾舌強腰背酸疼肝虛則眼昏胃痛

筋脇拘攣心懼面青如人將捕腎虛則心懸如飢胃痛引脊痠

逆瘦變眦冷耳鳴肺虛則呼吸少氣鼻涕壅乾肺中聲鳴喘乏

咳血。肺中一有紅縷者此肺損為熱氣所傷也。若屬下痛而唾鮮
血者此熱氣傷肝也。其或吐逆泄利飢食不消腹脹腸鳴四肢
無力則脾虛之證生焉。故曰臟氣不足謂之虛者此也。大抵實
者瀉之。虛者補之。無過不及。以平為期。否則實實虛虛損不足
而益有餘。如東坡先生所謂。虛者瀉之。實者補之。實者瀉之。虛
者補之。間便。有死生禍福之異。曰。畏哉。至若心病而直視

面黃肝病而舌卷囊縮腎病而腰折骨枯肺病而毛焦氣出脾
病而臍突唇反此則五臟之氣絕也絕者無復生之理脫遇岐
扁亦味如之何雖然病亦有虛實之證不同耳邪氣盛則實精
氣奪則虛脈盛皮熱腹脹前後不通曰五實脈細皮寒氣少前
後泄利飲食不進曰五虛諸病出者為虛入者為實陰出乘陽
陽入乘陰言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實陰主靜
則緩陽主躁則急濡者為虛堅者為實癢者為虛痛者為實外
痛內快者外實內虛外快內痛者外虛內實其有心腹皮膚內
外俱痛則按之而止者虛也按之而痛者實也經所謂反虛則
熱脈虛則驚肉虛則重筋虛則急骨虛則痛髓虛則墮腸虛則
澹泄三陽實三陰虛汗不出三陰實三陽虛汗不止與夫脈浮
而緩自汗惡風法當解肌脈浮而緊無汗惡寒法當發汗此表
病之一虛一實脈伏而牢腹滿秘結法當下之脈沉而弱厥冷
自利法當溫之此裏病之一實一虛內實之證心下牢強腹中
痛滿前後不通乾嘔而無物出者死內虛之證厥逆煩燥而吐
利不止者亡是又不可不知也故併及之

諸陰諸陽論

稟五行之氣而為萬物之最靈者人也人稟五行之氣而生曰
陰與陽誰獨無是哉心為手少陰腎為足少陰肺為手太陰脾
為足太陰肝為足厥陰心包絡為手厥陰此手三陰足三陰之
經也小腸曰手太陽膀胱曰足太陽大腸曰手陽明胃曰足陽
明膽曰足少陽三焦曰手少陽此手三陽足三陽之經也陰六
陽六合而為人身之十二經是經者所以周環一身自上下
往來流通而無間斷也其脈則於兩手三部應焉故自其身者
言之腑為陽臟為陰外為陽內為陰上為陽下為陰頭戴陽足
履陰背負陽腹抱陰氣屬陽而陽為衛血屬陰而陰為榮陽根
於陰陰根於陽陰陽互相繫而不息陽動所以為陰之役使陰
靜所以為陽之鎮守呼出入與肺吸人肝與心呼者因陽出吸

者隨陰入呼吸之間脾受穀味是則一身之陰陽也自其脈者
推之關前為陽陽得九分關後為陰陰得一寸所以有主治之
分浮之實大沉之損小曰陽盛陰虛沉之實大浮之損小曰陰
盛陽虛所以有表裏之別脈居陽部而陰脈形脈居陰部而陽
脈見陽虛則陰出而乘之陰虛則陽入而乘之及所以見寒暑
則變之機至若陽生於尺動於寸陰生於寸動於尺牢長促數
之為陽虛短結代動細之為陰浮乳滑實勁緊洪之為表微沉
緩滑遲伏濡弱之為裏陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死是
則六脈之陰陽也自其病者求之寸口浮疾陽中之陽病主身
熱頭痛煩滿內執寸口沉細陽中之陰病主少氣汗出悲傷不
聊尺脈浮滑陰中之陽病主小腹痛滿大小便難尺脈沉細陰
中之陰病主兩股酸疼陰痿遺泄陰出於陽其病怒陽入於陰
其病靜肺病欲得寒掖衣氣麤又欲見人者為陽臟病欲得溫
惡聞人聲閉戶獨處者為陰肺病屬陽陽主動故其痛多走注
而不止臟病屬陰陰主靜故其痛有常處而不移陽病曰靜陰
病夜寧陽虛暮亂陰虛夜爭陰勝則寒陽勝則熱陰動則發熱
陽動則有汗賊風客邪陽受之飲食居室陰受之陽受風氣傷
風者先於上陰受濕氣傷濕者先於下其或邪居陽脈之間則
四肢熱盛而為狂邪入陰脈之內則六經凝滯而為痺無陽即
厥無陰即嘔陽微不能呼陰微不能吸陽病不能俯陰病不能
仰重陽者任重陰者顛脫陽者見鬼脫陰者目盲是則諸病之
陰陽也噫是固然矣抑古人所謂陰陽維蹇覆溢關格者又何
如哉曰脈有陽維陰維陽蹇陰蹇衝督任帶九此奇經八脈別
道而行如設溝渠以備水潦之溢非自生蓋諸經溢而出流
入之也維者總持諸脈之綱維陰陽不相維則愆然失志蹇者
蹇足行走之關要督言其都陽脈之會也任取其姪生養之原
也衝者陰脈之通自足至頭通受諸經之氣血帶者廻繞於身
總束諸脈取束帶之義焉故陽維之病若寒熱陰維之病若心

通陽蹻之病陽急而在奔陰蹻之病陰急而足直衝病則氣逆而裏急督病則脊強而折厥任病則男疝氣而女帶瘕帶病則腹脹滿而腰溶溶其衝任二經是又婦人乳血月候之所從出奇經之脈其如是乎關前為陽脈當九分而浮若連併而上至魚際者為溢溢則外關內隔是為陰乘關後為陰脈當一寸而沉若連併而下入尺澤者為覆覆則內關外隔是為陽乘寸脈皆虛為陽虧尺脈皆虛為陰虧寸脈下不至關為陽絕尺脈上不至關為陰絕虧猶庶幾絕與關隔其危脈也覆溢虧絕其如是乎雖然人事不可不知也暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁不意氣多厥逆七情所發病家謹焉甘辛之劑以之助陽酸苦之劑以之助陰有志活人者又當識此

血榮氣衛論

人之一身所以得全其性命者氣與血也蓋氣取諸陽血取諸陰人生之初具此陰陽則亦具此血氣血氣者其人身之根本乎血何以為榮榮行脈中滋榮之義也氣何以為衛衛行脈外護衛之意也然則榮與衛豈獨無所自來哉曰人受穀氣於胃胃為水穀之海漕海然絡長養百骸而五臟六腑皆取其氣故清者為榮濁者為衛榮衛二氣周流不息一日一夜脈行五十度平日以來復會于肺口所謂陰陽相貫如環之無端則是二氣者常相隨而不相離也夫惟血榮氣衛常相流通則於人何病之有一室礙焉百病由此而生矣故氣之作恙發而為寒熱恚怒喜憂愁聚而為積痞疝癥癰瘰疔上為頭旋中為五鬲下為臍間動氣或喘促或咳噎聚則中滿逆則足寒九此者氣使之然也血之為患其妄行則吐衄其衰弱則虛勞蓄之在上其人忘蓄之在下其人狂達寒則筋不榮而攣急按熱則毒內瘵而發黃在小便者為淋痛在大便者為腸風其於婦人月事道遠漏下崩中病猶不一九此者血使之然也夫血盛則水也氣盛則風也風行水上則有血氣之象蓋氣者血之帥也血者氣之

血行氣止則血止氣溫則血滑氣寒則血凝氣有一息之不運則血有一息之不行病出於血調其氣猶可以導達病原於氣區區調血何如焉故人之一身調氣為上調血次之是亦先陽後陰之意也若夫血有敗瘀滯沉平諸經則氣之道路未免有所壅遏又當審所先而決去之經所謂先去其血而後調之又不可不通其變矣然而調氣之劑以之調血而兩得調血之劑以之調氣而重張如木香如官桂如細辛如厚朴以至烏藥香之類治氣可也治血亦可也若以當歸地黃等藥論之施之血證無以逾此然其性纏滯每於胃氣有虧焉胃氣既虧則五臟六腑之氣亦餒矣善用藥者其間劑量而佐助之大九治病當藏本末假如嘔吐痰涎胃虛不食以致發熱若其涼劑退熱則胃氣愈虛熱愈不退惟先以助胃止吐為本其熱自退縱熱不退但得胃氣已正亦可旋與解熱之劑又有傷寒發大熱屢經寒涼疎轉其熱仍前因用和調胃氣自然無事雖然

心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏誠哉是言也學者苟知血之出於心而不知血之納於肝知氣之出於肺而不知氣之納於腎用藥摸稜往往南轅而北轍矣假如血氣作恙以芩連等劑行其心以巴豆大黃等劑逐其積而其痛獨存者血之所藏無以養也必佐以山豆或芍藥等劑則其痛止假如喘嗽氣鳴以葶藶等劑逐其積以白芍等劑其痛止假如痰而終不下降者氣之所藏無以收也必佐以

脈病逆順論

皮白而九人形盛脈細少氣不足以息者危形瘦脈大而芻中多氣者死形氣相得者生參伍不調者病誠哉是言脈病逆順之不可不察辨也蓋人有強弱盛衰之不等而脈實者

陰陽虛實之不同而病實應焉脈病形證相應而不相反每萬
舉而萬全少有乖張良工不能施其巧矣故脈之於病有利浮
大而不利沉小者有利沉小而不浮大者有大小無拘而以
浮沉滑澀堅軟為順逆者又有五行反尅而賊邪乘虛為深患
者請條析而縷陳之壯熱脈浮大而疾者生沉小者死顛癇脈
堅大而數者生沉細者死謔語脈洪大者生厥逆而脈微者死
暴忤脈實大者生虛濡而小伏者死諸藥中毒可洪大緊急不
可微小而不齊疝瘕積聚可堅急實強不可沉小而虛弱腹脹
者浮大則順虛小則逆頭痛者浮大則安短澇則危疝渴之診
貴乎數大緊實不貴乎微細浮短小急不可治水氣之診貴乎
浮而洪大不貴乎虛細沉微擊瘵痰血順則脈堅強反則脈小
弱中惡吐血反則脈沉細順則脈浮洪前所謂利浮大而不利
沉小者此也傷寒已得汗沉小之脈安浮大之脈危自汗漏不
止虛細之脈安躁盛之脈危中惡腹脹緊細則可洪急則否心
腹痠痛沉細則可堅洪則否厥逆之脈順則沉而澇逆則大而
浮痿緩之脈順則散而虛逆則堅而疾唾吐血順者小弱沉
滑逆者堅燥浮洪金瘡血多順者微細而虛逆者燥實而大久
嗽衄血羸瘦者其正則脈微其反則洪急大腸澀泄筋攣者其
正則脈細其反則堅洪泄瀉注穀下痢其正者緩細小結其反
者弦數浮洪金瘡與諸下血其正者細滑而沉其反者緊急疾
大發熱亦反蠶蝕肛陰可虛小而不可緊急產後出血可沉小
而不可疾浮前所謂利沉小而不浮大者此也傷寒脈躁盛
而不得汗者陽之極其治也難傷寒已得汗而脈躁盛者陰之
極其候即死中風口噤四肢不收脈浮遲而恬靜者存脈洪數
而氣麓者亡上氣喘急而目浮腫脈浮滑而手足溫者存脈澀
瀉而四肢厥者亡加刺即死心下牢強勝則脈緊急則沉濡水
病腹腫勝則脈實負則虛散病黃疸者勝則緩大負則弦急而
堅中惡者勝則洪緩負則急急而緩腹脹便血活者脈滑短

者脈絕腸癰腫結活者脈浮殂者脈沉膿血諸疾活以滑細殂以堅強腸澀下膿活以其沉殂以其浮有遲滑而無堅數則崩中漏下不必慮有滑實而無浮虛則月經閉塞何足憂諸腸澀身不熱而脈和滑者易愈身熱而脈弦澀者難痊諸咳嗽聲不焦而脈浮軟者易安弦絕沉堅或伏而大者難保逆而堅澀順而濡滑其於上氣為可推反則急堅正則虛緩其於厥逆為可驗耳聾之脈沉而滑者可瘳浮而澀者難瘳蠱毒之脈數而軟者可甦數而堅者難甦凡蠱毒類如蠱脹其人吐甚心下切痛如蠱而面日黃或吐血不止者皆死前所謂大小無拘而以

浮沉滑澀堅軟為順逆者此也心病面赤喜笑心煩掌熱口乾開目妄語臍上動氣脈當洪緊而數反得沉濡而微者水之尅火一不治肝病面青筋急多怒目痛目閉不欲見人臍左動氣脈當弦急而長反得浮濇而短者金之尅木二不治腎病面黑恐欠足寒逆氣腹痛飧泄後重腹下動氣脈當沉而滑反得緩

而大者土之尅水

二不治肺病

面赤喜笑

心煩掌熱

而大者土之尅水三不治肺病面白悲愁嘔哭吐衄交血喘咳寒熱臍右動氣脈當沉細而濇反得浮大而牢者火之尅金四不治五者脾病面黃善思善嗜體重節疼四肢不收怠惰喜卧腹滿泄利飲食不消當臍動氣脈來緩大者脾家正形也設或反是弦長而緊是非木邪之尅土乎前所謂五行反尅而賊邪乘虛為深患者此也雖然健人之脈病病人之脈健陽病得陰脈陰病得陽脈凡此皆反也而劉元賓以為形病脈和人不死張長沙以為陰病見陽脈者生其言豈厚誣哉經云脈病人不和猶可用力形和而脈病其死無疑况脈和之與脈健本自不同剛駛暴躁之謂健調平而有胃氣之謂和毫釐疑似之間學者當於此而致其辨矣經云忽陽病得陰脈陰病得陽脈者死此二者雖皆非正然張長沙之論特為傷寒設謂如傷寒心腹煩滿而脈浮大之類是爾腹滿病在大陰浮大之脈屬陽亦脾

二者可以殺其毒嗣此則以（理中湯）亦（厚朴散）各半溫胃益血常常服餌以消勝之如其不以溫和為主日從事於（雷瀉）之劑焉君子未保其往（活人書）云傷寒太陽證衄血者病欲愈熱結膀胱而血自下者亦欲愈以此觀之他病伏熱之人上焦瘀血而作吐者亦其病之有變也雖然血既吐而自止則可矣

問病論

東坡先生嘗曰吾平生求醫蓋於平時默驗其工拙至於有疾必先盡告以所患而後診視使醫者了然知厥疾之所在虛實冷熱先定于中則脉之疑似不能惑也故雖中醫療疾常愈吾求疾愈而已豈以困醫為事哉誠哉斯言真豈遠濟世之秘劑也何者脉之與證相依而行脉者所以剖其證之未明證者所以索其脉之猶隱據脉以驗證所謂得手應心者是爾問證以參脉所謂醫者意也是爾烏可舉一而廢一哉私竊怪夫近世以來多秘所患以求診以此驗醫者之能否醫亦不胥下問孟浪一診以自挾其所長甚者病家從前誤藥或飲食居處有所諱誨雖問之而不以盡告遂至索病於冥漠之間辨虛實冷熱於疑似之頃毫釐千里寧不委命一擲與人試彼乎此余於終篇所以特舉前輩格言以解世俗之惑不然難經有謂問其所欲五味以知其病之所起所在者又果何意邪（大人小兒諸病歷後飲食且煩旋進常若不足母使食氣傷胃其病復來大熱方退亦不可飽小兒傷乳熱悞則同）

論易簡方

易簡方論前後活人不知其幾近世之士類以春秋之法繩之曰易簡繩愆曰增廣易簡曰續易簡論借古人之盛名以自伸其臆說吁王氏何負於人哉余謂易簡方論後學指南四時治要議論似之自有入心權度存焉耳况王氏晚年劑量更定者不一日月薄餘何損於明若夫索藥洗垢矯而過焉或者公論之所不示也

楊氏直指方論一卷終

必至於嘔惡沉冷。溫藥頗施。必至於煩燥開熱。所貴酌量推度。毫無過用焉。是為活法。

經常用藥自有奇功

人有中年以上素挾風痰腹中時痛忽爾感冒雖已發散寒邪無復發熱頭眩之苦奈何風痰嘔吐俱作諸藥罔功但用伏苓二陳湯加南木香白豆蔻作劑入生薑烏梅同煎調蘇合香圓貳粒燕下白圓子貳拾圓連續兩服嘔止痰消自然思食繼是以此參川芎獨活白芍藥炙甘草調之若通小便則於內加麥門冬若通大便則於內加枳殼以嚥神蘇圓肆伍圓大小腑一通煩遂勿藥之喜

論肝脾主病

經曰人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食蓋肝脈可以知風寒之出入脾脈可以驗飲食之盈虧肝亦主血脾亦主痰以其脈之虛實而益損之以其病之關繫而對治之君請擇斯二者

病人尺脈洪大

此病在下部也當踈利而出之脈洪大主熱多是大小便不通或心腹結急臍下蓄血或腎氣攻刺發作奔豚或下焦停水外腎虛腫或風邪攻腎脚痺腰疼或腎臟風毒身下瘡癩皆隨證體認以對病之劑主之大槩通利為第一義臨診精思而熟審焉水氣腎氣血氣風毒每擒縱治法

此等證候先以青皮陳皮枳殼北梗半夏茯苓生薑白芍解其寒邪調其衛氣然從對酌用十棗湯吞香正丹輕者却口用神保圓夾青木香圓以五靈脂入烏梅濃蜜煎湯嚥下錢氏宣風散亦可以踈利風毒俟大便通快流行其痛已減繼是二陳湯加當歸川芎木香縮砂薑調理之

治痢要訣

痢出於積滯積物積也滯氣滯也物積欲出氣滯而不與之出所以以下墜裏急乍起乍止日夜九百餘度病家所請莫不疑其

止孰知物積氣滯致有如是之證耶。人但見有上項證候不
論色之赤白脈之大小壹皆以通利行之物積用巴豆大黃黃
氣滯用枳實下之。葶藶二者兼濟必能收功其間佐以
而成其阿膠尤大腸之要藥有熱毒留滯則能疎導無熱毒留
滯則能安平。市肆或無圓子即以炒阿膠。作劑入烏梅濃蜜同煎最能蕩滌惡穢積滯既去遍熱自疎
則糟粕入於大腸然後其人食流湯。可止則止矣。

簡徑治痢

諸熱痢血痢及痢後大腸裏痛用。截碎研細。清汁壹小
盞蜜水相半壹盞同煎。早午食前服。日哺以米飲下。
圓白粒無羅蔔羅蔔子代之。又法熱痢。蜜水各半煎服。仍煎木香。水各半煎服。冷痢。蜜水各半煎服。仍煎木香。為佐蜜最治痢。

薑茶治痢法

能助陽能助陰二者皆能消散又且調平陰陽况於暑毒
酒食毒皆能解之也不問赤白冷熱通用之。切如豆許
與茶等分用新水煎服東坡醫文潞公作效。

禁口痢

下痢禁口不食雖曰脾虛蓋亦熱氣閉隔心胃所致也俗用木
香則失之温用。則失之閉惟真料參苓白朮散加。未以道地種米飲乘熱調下或用。伏苓石蓮子肉入此。與之曾次一開自然思食。

瘧痢用常山罌粟殼

治瘧痢人皆薄之固也然下痢日久腹中無痛
由滯腸則豈容不。法當吐痰逐水又豈容不
之吐下於斯時也不有。之前其何以為對治乎

但中間有藥輔之耳。

治瘧要訣

凡瘧皆因腹中停蓄黃水惟水不行所以寒熱不歇此瘧家受病之處也治法暑瘧熱以香薷散加青皮枳實兩道同煎同煎後晨溫服寒瘧多寒以二陳湯加青皮枳實多用薑同煎侵晨吞神效圓五粒並飲取毒水則去其病根寒熱自解

發瘧嘔吐勿用常山

有中年人臟腑久虛大便常滑忽得瘧疾嘔吐異常惟專用人

參為能止嘔其他瘧劑並不可施遂以茯苓二陳湯加人參縮

砂而倍用白豆蔻送一二服病人自覺氣脈頗消於是寒熱不

作蓋白豆蔻能消能磨流行三焦榮衛一轉寒熱自平繼今遇

有嘔吐發瘧之證或其人素嘔而發瘧謹勿用常山惟以三羅

薑黃圓各研自然汁半盞入薑三四匙烏梅兩箇同煎吞局方

雜黃圓三四粒俟其利下惡血痰水即以人參川芎茯苓

細砂自草調之萬一嘔不止而熱不退却用自料小柴胡湯多

加生薑主治其或嘔吐大作而又發熱且先與治瘧生熟飲嘔

定以小柴胡湯繼之

瘧有水有血

水即水飲也血即瘀血也惟水飲所以作寒熱惟瘀血所以增

寒熱逐水利飲固也苟無行血藥品佐助其間何以收十

全之效耶繼自今瘧家或衄血或唾血或大便血然或月候適

來適去皆是血證當以常山食棗瀉心青皮烏梅自草作劑於

內加五靈脂為佐人參薑黃同煎以主治之

瘧證寒熱不歇有根

凡瘧固當以風寒暑濕別而治之或汗或下或吐或溫活人書

之格法雖虛而不可違矣然嘗見瘧之經久而不歇其故何耶

有根在也根者何曰飲曰水曰敗血是爾惟辨為瘧之母惟敗

血為暑熱之毒惟飲與水管生寒熱故暑之脈虛水與飲之脈

沉脉瘧之脈結聚挾水飲者為之逐水消飲結癖者脇必痛為之攻癖若敗血暑毒隨證而疎利之寒熱不除吾未之信

常山治瘧須用大黃為佐

瘧家多蓄痰涎黃水常山為能吐之利之是固然爾其有純熱發瘧或纏熱內實之證投以常山大便點滴而下似泄不泄須用大黃為佐大泄數行然後獲愈或曰豆豉相依而行亦能泄也是又不然豆豉工於下積苟欲蕩滌血熱不可以無大黃凡瘧方來與正發不可服藥服藥在於未發兩時之先否則藥病交爭轉為深害

寒熱似瘧

此傷寒一證而實非瘧瘧也其人肝脈浮盛頭痛怯風大抵下柴胡湯加青皮柴胡湯主之嘔者多用白薑渴者多加烏梅其或傷暑熱之小柴胡湯加香薷入白薑烏梅同煎可也抑猶有說焉寒熱之根非通利不能除也萬一其根未鋤又當以承氣湯

神效圓章與之是亦先解後攻之意

吐汗下治瘧

治瘧總要不過吐汗下而已當下而下不盡腹中尚有餘痛或大便一泄之後不復再泄但時時點滴而出者須再下之大黃以佐常山可也當汗而汗不匝或頭汗至胃而手足無汗者須周決一身而汗之白朮以佐柴胡可也所謂吐者須出盡其水飲若作吐劑常山言容較哉能於二者究竟焉收效必矣

瘧後調理

瘧之為厲大抵連綿有病瘧以後或飲食失節或恚傷中或梳洗感風又再發者何以處之曰熱多者二陳湯加青皮熱少者二陳湯加青皮白朮堅守胃氣而已二藥並用生薑為梅蜜水同煎空心進劑其間幹運更用白豆圓藥疎利大便以泄毒氣其何厲之有或服已藥過多以致腹痛可用承氣湯承氣湯和解之承氣湯解諸藥毒

退熱

退熱用涼藥不可十分盡或餘熱些少未去不足開心自然無事否則熱去則寒起古人戒之一方多用**白芍**因**芍藥**少用**白芍**未水煎病後和胃收斂浮陽屢試得效

柴胡退熱不及黃苓

苦藥非瞑眩不疾非變世俗治熱例用**柴胡**最為穩當至若**黃苓**一輩則指為大寒不敢用之不思藥病不相當鮮克有濟縱今退熱而熱不去者須用**黃苓**

退熱有法

凡壯熱煩燥用**柴胡****黃苓****大黃**解利之其熱下輕而不退盡用**黃芩****山芩****烏梅**作劑或用**黃連****生地黃****赤茯苓**同煎臨熟入**薄荷**其效亦速蓋**山芩****生地黃**皆能調血心血一調其熱自退

小兒風證解熱有二

痰盛搐掣大便秘結當以**枳殼****大黃****靈脂****甘草**利之小便赤澀心熱狂吼當以**犀角****羚羊**入燈心行之既利大腸矣小便矣而風證乍作面色乍紅常有**憊憊**之狀何耶表熱表邪猶未解也入**參****苓****芍**加**青皮****紫蘇****薄荷**主之**參****蘇**亦可矣

滯血發熱

其人脈濇必有漱水之證必有嘔惡痰涎之證必有兩脚厥冷之證亦必有小腹結急之證或唾紅或鼻衄此皆滯血作熱之明驗也用藥不止於**柴胡****黃苓**當以**山芩****白芍****桃仁****五靈脂****甘**佐之**大黃**便秘結者於中更加**大黃**濃密使滯血一通黑物流利則熱不復作

佐助小柴胡湯

傷寒留蓄惡血內外俱熱昏澁譫語亦有目龍虛鳴之證與少陽經受病相似如服**小柴胡湯**不效當以**黃芩**壹分**赤茯苓**半

分判細入**參**煎與之男女通用凡大小產熱入血室

湯力所不及者於內加**五靈脂**仍以**黃連赤茯苓湯**佐之蓋心
主血**黃連**伏心清心涼血之劑所以收功若夫踈利血毒則
活人書**桃仁承氣湯**有餘勇矣

腎熱用五苓散

腎氣內虛邪熱流入於腎經其脈洪大小便頻數所出溢少赤
濁而痛此不可以**牽牛**行之治法**聖藥**煎湯調**黃連五苓**
散滲泄其熱邪水竇一通勿藥自喜

下後大腸熱腫墜重

諸有裏熱法當通利大便然下後腸頭熱腫而墜重者此更有
熱有瘀血挾氣而蓄在下焦也更用**黃連黃芩大黃**輩下之於
內以炒**黃連**炒**黃芩**為佐多入濃**薑**并**烏梅**同煎薑錢
四五片可也

通利大便行法

凡通利大便若用**大黃****芒硝**等藥而大便不通者陰陽關隔水
火不升降故也有熱者**承氣湯**夾**黃圓**薄荷泡湯下無熱者
養正夾**黃圓**橘皮煎湯下

飯後隨即大便

脾腎交濟所以有水穀之分脾氣雖強而腎氣不足故飲食下
咽而大腑為之養泄也治法**神圓**用**故紙****肉豆蔻**修合或不
換金**正氣散**吞**養正**主之蓋脾腎之氣交通則水穀自然化
化此所謂妙合而凝者也

脾泄腎泄

有脾泄有腎泄脾泄者肢體重著中脘有妨面色虛黃腹肚微
滿腎泄者膚膝怯冷腰脊酸軟上咳面驚臍腹乍痛治脾泄用
養正**白朮****厚朴****茯苓****澤瀉****木香****生肉****豆蔻**輩治腎泄用**補骨脂**及**故**
養正**養正****用****葦**

腎泄

諸有泄瀉用**不換金正氣散**除暴瀉之類以去風濕以安腸胃

轉胞

轉胞證候孕婦多有之患在忍縮小便或喜食煎煖或飽後為熱所迫遂使小腸之氣逆而不通大腸之氣與之俱滯外水不能入膀胱內水不能出膀胱淋瀝急數每欲尿時痛不可言大便亦裏急頻併似痢非痢必以手從臍間按至臍下庶可立出小便否則逆上出而不禁甚者因此腹脹浮腫治法用涼藥踈利小腸中熱仍與通泄大腸迨其腹中攪痛大便大下則溺胞隨即歸正於是小便順流見附婦人摘奇方

孕婦胎熱似痢

孕婦七八箇月傷暑傷熱以致子煩胎氣迫近於上咽喉窒礙心腹脹滿下墜似痢每登廁時坐一炊久忽爾氣下方得大便一通世俗率用痢藥不知病在胎熱子煩可用赤芍湯下黃連或用炒黃芩各壹分或用伏苓半之分作兩劑煎服俟其大便調導却以用白伏苓繼之若用白伏苓非其治也

下焦蓄血

血之為病有渴煩燥迷忘驚狂痰嘔汗多骨熱肢冷此外證然爾何以知其蓄在下焦曰臍下結急外熱內痛尺脈洪而數也

產婦血塊築痛

此候因產斷趕血未盡所致世俗收生多就踏板趕血不思生產之時已坐草近地久矣產畢臟腑虛空又且近地趕血冷濕乘之風邪入之使敢疼疑為血塊是謂血母衝築硬痛非用香乘之風邪入之使敢疼疑為血塊是謂血母衝築硬痛非用香乘之風邪入之使敢疼疑為血塊是謂血母衝築硬痛非用香

散其塊自消散

身體血帶作痛

散其塊自消散法醋連進兩服冷濕風邪一

身體疼痛非濕則痰固也人有快刀鋸之驚而又發在其中為
風寒水濕所傷致使心竅凝滯於是經絡壅閉血不流行腸肉
骨節為之刺痛治法當歸川芎芍藥白芷靈脂大黃甘草利之
黑物小片而下其痛有瘳

身體胃腹隱熱隱疼拘急足冷

此血之為病也以其飲酒嗜慾伏熱受暑得之惟熱毒暑毒酒
毒為能傷血瘀血未去新血不榮身體所以隱痛拘急其裏熱
足冷者血之證也用柴胡黃芩青皮枳殼靈脂桃仁木通白草
作劑多入大黃以利之俟其流利已盡小腹略無結急即以當
歸川芎壹倍橘皮半夏枳殼北梗木通白草半之調其氣血於
是有瘳血屬於心木通以通其心竅心竅既通經絡之流行可
知矣

血帶

人之一身不離乎氣血凡病經多日療治不痊須當為之調血
血之外證痰嘔燥渴昏潰迷忘常喜湯水漱口不問男女老少
血之一字請加意焉用藥川芎蓬朮桃仁靈脂生地黃北大黃
為要嘔甚者多加生薑以此先利其宿痰嗣是茯苓伏神川芎
白芍調理之

血崩

素問云陰虛陽搏謂之崩此即血得熱則宣流之意也四物湯
可以助陰紅酒以散瘀可以抑陽其間更以茯苓二陳湯和之
使陰陽兩得其平血自循於經終矣若夫衝任不固下元久虛
以致血無關鎖則用膠艾湯加當歸木香麝香下震靈丹為妙

吐血

血隨氣行氣逆而上奔則血不循於經絡而湧吐矣人知吐血
出於上焦有熱因也然能用柴胡黃芩桑葉菊花等輩而不能
用滋陰以潤黃連生薑烏梅佐之又不能用通利圓子以開其
中疏導其大便則氣如何而下降血如何而下行吾恐逆奔而

上有不可得而止之者。若夫依前治法，血止而後，又當以人參、川芎、當歸、茯苓、補皮、白朮、白芍、為之調理。虛則加木芍、熱則加柴胡、壅則加桑皮、刺芥。尤在權衡。

治渴有法

凡病人兼有燥渴之證，用烏梅、瓜蒌、梨、蜜、竹、葉、數輩皆不作效。遂致引飲過多，兩脚浮腫。此證不可以為裏熱，蓋腎水不上，升心火不下降故也。須用交感丹為主，却以烏梅、濃茶、白蜜、煎湯，嚥之。腎水一升，心火一降，其渴自止，脚亦不復腫矣。

酒家有病勿用溫藥

有人飲酒過多，因酒作病，胃脘不快，其氣捫隔，服無數一陳湯，竟無寸效。由是不喜飲食，復以調氣散投之，致發大熱。自後只用薄荷、薄荷、蘇圓、麻仁圓，日就痊愈。乃知胃脘閉隔，熱在上焦，使然耳。又有人酷好飲酒，復感寒邪，服不換金、正氣散，以致內熱愈熾，煩渴且悶，汗出如雨，身體怯寒。續後以小柴胡湯加枳殼、白芍藥解之，遂即愈。退熱救急寬中芍藥調榮止汗頭然。

牽愈然則酒家抱病，其可妄以溫藥嘗試一中乎。

傷寒筋惕肉瞤治法

筋惕身瞤，發汗大過所致也。古人以真武湯主之。然真武湯能止其汗而不能定其瞤。瞤者動也，汗出表虛，外風必入於腠理。人知風以動之，所以惕惕而自瞤，而不知汗多則傷血，血虛無以榮筋，筋愈急而四體百骸愈為之瞤動。治法不用驅風，并發散等輩。惟人參、當歸、川芎、芍藥、半夏、茯苓、白芍、作劑，以五靈脂為佐入。生薑、烏梅、同煎，自有神效。右藥專於生血，生血乃所以收汗，其或大便秘澀，少加大黃以導之，血脈一和不反掌而靜定矣。

發產詳證

江劉寶云：產寶所載方藥甚詳，獨無產後中風角弓反張一證。按產後中風，因懷胎時多嗜生冷，脾胃受濕，復經乳卧之後。

津液內竭。履地大旱。脫着不時。以致風邪乘虛入於足太陽之經。其證發熱。頭疼。或時不熱。喘息痰咳。言語不倫。漸覺牙關緊。急。十指微動。如摸物之狀。加以項背強直。或啞或叫。目睛直視。腸滑不禁。身如反弓。轉側不仁。如此十無一。生活人書謂太陽發瘥。是爾凡產後初得發熱。常須審視。若唇急舌蹇。手指微動。便以中風藥品急治之用。藥錄謂獨活酒附在濕門。獨活散。防風散。續命湯。見附婦人方中。男女通用。

胃腸痛引背。上頭面。兩手浮腫。

腎虛不能納氣。歸元氣逆而上奔。故胃腸滿痛。以手摩澤。痛走背。上又從背摩澤。則其氣循脇。泄於後分。而痛不作矣。此氣之為病。固也。奈何腎虛又不能行水。故水隨氣奔。上乘於肺。頭面兩手浮腫。氣短而喘。由是血化為水。與之俱滯。况其人舊來有風。曰風曰水曰血曰氣。四者合而為病。其痛非常。如切香。之類。不能施其巧治法。將何如。曰先以二。...

加... 武拾... 拾粒升降水火引導大便次用... 取盡大便黑物即收全功

吐皮痛

腎虛不能行水。加之酒麪無度。醉後輒睡。酒與水交聚於腹中。而... 每復纏滯其氣。是以水滲於肚皮。而作痛矣。治法... 壹分... 腎氣復自然向安。

腎氣痛

有肺經伏熱。而氣隔者。有痰水在上。而氣隔者。大藥以... 氣者... 效胃煩活人書用...

諸風

風論

諸風

氣血痰水受病於內者也風寒暑濕致寇於外者也人之身血氣既虛陰陽不守飲食居處嗜慾無節衝風卧地調護不加於是經絡空疎腠理開微風邪乘其虛而入之中風諸風皆是物耳風之為病善行數變其中人也卒其眩人也暈激人之涎浮昏人之神亂挾熱則痿痺緩弛挾寒則急痛拘攣自其邪氣之入人也邪氣反緩正氣反急邪氣為鼠視為掣縱為搐搦不能收急則一身不能仰皆隨其邪氣所至表裏淺深而有證也種種雜多大要有四血氣偏虛半身不遂肌肉枯瘦骨間疼痛謂之偏枯神智不亂身體無痛四肢不舉一臂不隨謂之風痺

忽然迷仆舌強不語喉中窒塞噫噎有聲謂之風癇

風寒濕二氣合而為痺其人肉厚身頑不知痛癢風多則走注寒多則疼痛濕多則重着在筋則筋屈而不伸在脉則血凝而不流在肉則不仁在骨則癱重夫是之謂風痺傷風一證發熱煩燥頭眩面光惡風自汗蓋風能散氣故有汗也風家脈浮者病在表肺實者病在裏肺虛者病在臟脉促者病在上浮則發散實則疎導虛則溫之促於上而病人壯盛胃喉澎湃者則發散實則疎導虛則溫之促於上而病人壯盛胃喉澎湃者則發散實則疎導虛則溫之促於上而病人壯盛胃喉澎湃

血虛虛極而生風者若諸虛皆然天麻

關治法大要盡以清痰順氣為先順氣用南木香

消痰用

廢人治風良劑

氣頭以

風

陳散矣至若口開手散馮血遺尿眼合不開汗出不流吐沫氣
聲如鼾睡面緋面黑髮直頭搖手足口鼻清冷口噤而脈急
數皆為不治之證其餘諸風種類余於嬰兒驚風指要備論之

○請風證治

心中風

心風僵臥熱而瘖

唇赤其身有汗生

白黑青黃唇上見

停停時悚而醫驚

心中風僵臥不能傾側發熱失音其舌焦赤汗流唇赤者可
治灸心俞若唇上白黑青黃乃心壞為水面目停停時悚
動者並不治
俞二穴在第五椎骨下兩傍各一寸半五臟
俞沈子金翼所載與六十七難注同取分寸法男左手女右
手以中指第一節為一寸

肝中風

肝家踞怒不低頭

左脇偏疼筋急攷

額目展青為可療

目黃目白使人愁

肝中風踞坐不能低頭上視多怒左脇偏疼諸筋攣急頭目
瞤動其目青遠兩目連額微青面黃者可治灸肝俞若大勢
青黑其目一黃一白者不治
俞二穴在第九椎骨下兩傍
各一寸半

腎中風

腎中踞而腰脊疼

面浮耳黑賊風生

脇無黃跡能痊愈

直髮泥容日暮傾

腎中風踞坐腰脊痛引小腹面上浮腫其耳黑視左右脇未
有黃點黃赤者可治灸腎俞若脇上黃點而如十色鬚髮直
齒黃赤者不治
俞二穴在第十四椎骨下兩傍各一寸半

肺中風

肺風喘促痰壅

僵臥熱燥燥異常

口鼻之間頰裏白

毒末肺壞色夏黃

肺中風懼則膏滿氣短喘息時嗽燥悶汗出其鼻白目下及鼻四圍以至於口色由者可治灸肺俞若色黃乃肺壞為血其與尋衣摸空者並不治 **神命** 二穴在第三椎骨下兩傍各一寸半

脾中風

脾中風舌肌肉潤

踞而腹滿吐酸

唇并肢體通黃瘥

手足眸青療已難

脾中風踞坐腹滿皮肉潤動四肢放縱其唇黃身通黃土黃汁者可治灸臍俞若手足青且冷或目下青並不治 **神命** 二穴在第十一椎骨下兩傍各一寸半

胃中風

胃病根源飲食來

擡肩喘息氣難開

口張額汗腹中滿

浮診雙關脉大哉

胃中風腹滿填脹喘塞不通張口喘息額上多汗孫地仙所謂新食意取風為胃風是也或曰風中諸臟不關諸府是亦一說然胃為水穀之海五臟皆取氣於胃故並存之 **神命** 二穴在第十二椎骨下兩傍各一寸半

中風惡證

中風惡證細推求

口噤頭暈脉數衰

眼合不開并竅膠

面緋面黑手難收

口開吐沫氣鹿大

髮直搖頭汗不流

軒轅喉鳴兼鼻冷

遺尿瀉血並昏休

中風多是惡風自汗心風脉浮洪肝風脉浮弦腎風脉浮滑肺風脉浮濇脾風脉浮緩或以三部候之或以本臟取之不可一藥論也醫者當明辨之

藥法

- 圓白天南星
- 南木香
- 蒼朮
- 白羊脂
- 煉細辛

甘草 生

石昌蒲 細切

右件剉散分作二服水一盞半生薑七厚片煎取其半乘熱調合香圓三圓漉下痰盛者加金匱二枚炙治一切卒中不論中風中寒中暑中濕中氣及痰厥飲厥之類初作皆可用此先以夏月去弦皮或或為末搗以管子吹入鼻中俟其噴嚏即進煎藥牙噤者中指點南星細辛末并烏梅頭際自開

又法

南木香

生南星 七片

生薑 七片

石昌蒲 二十片

右煎取清汁乘熱調南木香末壹錢或合香圓三圓與之必拘攣不論寒裏淺深服之皆驗

麻黃 去節

人參

防己

官桂

黃芩

杏仁 去尖

白芍藥

苦菊

甘草 炙

防風 三兩半

附子 炮去皮

只兩半兩

右剉散每服參錢壹五厚片棗二枚水壹半煎壹盞溫服恍惚加白茯苓倍白芍藥煩燥大便秘

上去倍白芍藥加白芍藥大便利素有寒去黃芩加白芍藥胃肉冷疼加白芍藥嘔逆腹脹加人參半夏自干去麻黃

加白芍藥大便結熱去白芍藥加白芍藥痰多加南星炮切數片風虛加白芍藥身疼加白芍藥喘急加白芍藥白皮

蘇風湯治工蘇風諸風亦治風毒脚氣腫痛

白鮮皮

白朮

白芍藥

辣桂 去皮

當歸

川芎

杏仁 去尖

防風

甘草 炙

獨活

麻黃 去節

白茯苓 各三兩

右處末每服二錢水壹盞半薑四片煎一盞溫服

良方人參頭煎治諸風戰掉拳攣肢量喎邪麻痺疼痛

人參

黃芩

白朮

白芷

陳皮

枳殼炒

甘草

各壹兩

麻黃

去節

天台烏藥

各壹兩

人參

白薑

各半兩

右為末每二錢薑棗煎服

烏藥順氣散證治同前亦主脚氣

烏藥去心

麻黃去節

陳皮

各壹兩

川芎

枳殼炒

北梗

白芷

直僵蚕

炒去絲

甘草炒

各壹兩

白薑

炮

右為末每二錢薑棗煎服

烏藥順氣散治一切卒中不論中風中寒中暑中濕及痰厥欲厥氣

厥之類初作即用此

圓白南星

溫紙裹煨

南木香

半夏

用百沸湯洗

各壹錢半

辣細辛

蒼朮生

甘草生

細節石菖蒲

各壹錢

右對分貳服每服水壹半薑七厚片煎取其半乘熱調服合

香圓

方其諸

冬圓灌下

痰盛加灸

合

貳枚先以

皂角四

細

右為末管玉場此吹入鼻中俟噴嚏即進藥牙噤者烏藥

揉和圓薑末以中指顫擦目開

三聖散治卒中昏迷痰盛喉鳴口眼喎斜半身不遂但脈沉無

熱者可服

南星壹兩

川烏生

附子

生各去皮臍

南木香貳錢半

右咬咀每服三錢水壹壹半薑十厚片煎取半微溫服

附香散證治如前

附子生

四錢

木香貳錢

右咬咀分兩服每用水壹半薑十片煎取半微溫服虛人可用

星香散證治如前

南星捌錢

木香貳錢

右對分生服每用水壹半薑十片煎六分溫服氣盛人用此

寒

中寒論

寒者嚴凝殺厲之氣也。人以腎為根本，惟腎則受寒，惟寒則傷腎。腎氣一虛，寒邪交作，急痛拘攣，戰掉強直，昏迷厥冷，口噤失音，此中寒也。無汗惡寒，頭疼面慘，發熱拘急，手足微寒，此傷寒也。霍亂轉筋，洞泄下痢，乾嘔吐逆，積飲停痰，此寒邪入腸胃也。以至為咳，數為虛勞，為疝瘕，為脚氣，為帶漏，為遺精，為瘰癧，為諸痛，寒亦主之。人惟腎氣不充，踈於謹護，非特霜凝水沍之謂寒，或者炎天暑月，當風取涼，臥地受冷，使寒邪之氣自皮膚而入，達經絡，自經絡而入臟腑，如前數證皆得以此。然雖四出矣，溫腎禦寒如**參茸**、**薑**、**附子**、**烏**、**天**、**雄**、**龜**、**鹿**、**地**、**黃**、**人**、**參**、**白**、**朮**、**芍**、**藥**、**石**、**龍**、**中**、**物**、**然**、**寒**、**傷**、**榮**、**氣**、**從**、**知**、**溫**、**腎**、**而**、**不**、**知**、**溫**、**血**、**恐**、**未**、**必**、**有**、**十**、**全**、**之**、**功**、**是**、**則**、**宜**、**速**、**溫**、**血**、**之**、**上**、**藥**、**也**、**不**、**然**、**古**、**人**、**何**、**以**、**致**、**意**、**於**、**寒**、**以**、**血**、**云**。

中寒證治

不換金丹 解散寒邪

蒼朮炒

橘紅

半夏麩

厚朴製

藿香葉麩

甘草炙

右到散每服三錢，薑五片，棗二枚煎服。

參茸湯 治外感寒邪內傷生冷

蒼朮炒

厚朴製

半夏麩

人參

茯苓

草果

藿香各半兩

橘紅各錢半

甘草炙

右到散每服三錢，加**桂**半錢，薑七片，烏梅半箇煎服。

溫中散 寒生

乾薑

良薑各半兩

辣桂

木香

半夏麩

甘草炙

右到散每服三錢，薑五片，棗一箇煎服。

寒

治中寒中濕嘔逆虛弱

人參

白朮

乾薑炒

熟附子

各壹兩

甘草半斤

右以咀每三錢薑五片食前煎服少血加當歸

治虛寒無陽胃弱乾嘔

熟附子

乾薑炒

沉香

白朮

各壹分

甘草半斤

右到每三錢薑五片煎食前服

治中寒厥冷強直失音口噤吐沫或陰盛發燥

熟附子

乾薑炒

右以咀每服三錢水盞半煎半空心溫和服亦治洞泄嘔吐

治傷寒陰證唇青面黑身背強痛四肢厥冷及諸虛沉寒

熟附子二分

官桂

當歸

白朮各二分

乾薑炒

半夏麩 各壹分

右到每服三錢薑五片棗一枚食前煎服

治沉寒痼冷方見血證類

治傷寒身熱頭疼亦主痰嗽

人參

白朮

白芷

乾薑

北梗

青皮

各三分

甘草炒

壹兩

乾薑壹兩

右為末每服二錢薑五片煎服

傷寒熱證通用

人參

赤茯苓

川芎

北梗

羌活

獨活

前胡

柴胡

枳殼炒

甘草炒

右到散每服三錢薑五片煎服人參羌活散用藥亦同

活人摠括備述其詳

暑

大醒... 治諸風延潮痰厥語澁神昏

附子

南星

全蝎

川芎

防風

右劉散每二錢薑十片煎服氣不和加

南星

防風

甘草

附子

右劉每服三錢薑十片煎服氣虛人加

草烏

川烏

沒藥

乳香

獨活

羌活

麻黃

白朮

白芍

防風

羌活

黑豆

草烏

川烏

沒藥

乳香

羌活

獨活

木鱉子

天麻

巴戟

防風

羌活

獨活

羌活

右細末醋和豆為糊圓桐子大每服三十圓溫酒下

當歸

川烏

草烏

川芎

羌活

獨活

羌活

捕骨脂

烏蛇

川續斷

華陰細辛

直僵蚕

羌活

獨活

獨活

羌活

麻黃

白朮

白芍

防風

羌活

蒼朮

草薢

杜仲

羌活

獨活

羌活

獨活

牛膝

虎脛骨

川五靈脂

秦艽

羌活

獨活

羌活

白附子

川五靈脂

秦艽

羌活

獨活

羌活

獨活

全蝎

麝香

羌活

獨活

羌活

獨活

羌活

右細末

別研漸入

以浸藥酒調

飛麵黃糊

煎湯下

煎湯下

煎湯下

研築圓彈子

大每服壹圓

溫酒磨下

或

煎湯下

煎湯下

煎湯下

淋酒下

不拘時服

仍用

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

妙未服藥前

須以

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

大同炒

只用

柴筒并豆入

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

十四枚

微炒

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

貳錢

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

煎湯下

半為末糕糊圓麻子大每貳拾壹圓老酒下先去其風根

鐵彈丸 治諸風癱瘓

川烏 炮去皮

川五靈脂 四兩

乳香

沒藥 各壹兩 麝香 壹錢

右乳香以乾竹葉包裹用熨斗火熨過即研成末餘藥末之拌和再碾滴水為圓彈子大每壹圓薄荷酒磨下

聖丹 治一切風

川芎 四兩

防風 壹兩半 天麻

甘草 炒 壹兩

細辛

華撥 各半兩

右末煉蜜和杵每兩作三十圓每服壹圓細嚼荆芥酒下傷風鼻塞項強頭眩薑湯下

虎骨丸 治白虎瘧瘧風走注疼痛遍身癢痒如虫啣晝靜夜劇

川烏 炮去皮

全蝎 焙

地龍 半兩

黑豆 炒 壹兩

黑豆 炒 壹兩

右細末糯糊圓菘豆大每服七圓甚者十圓夜卧令膈空溫酒下微出冷汗便瘥

增味 治風寒濕合而為痺肌体麻痺不仁

羌活 防己 片子薑黃 白朮

海桐皮

當歸

白芍藥 各壹兩 甘草 炒 壹兩

古剉每服三錢薑干厚片煎服病在上食後病在下食前

瓜蒂散 吐法

右瓜蒂末壹錢熟水調下若風顛證須以瓜蒂散吐痰

治風涎潮塞上膈氣閉不通

猪牙皂角 四條 炮 實不吐 光明晉礬 壹兩

右細末輕者半錢重者三錢熟水調下但少吐之弱者不可

吐用 **南木香** 煎湯調下仍與 **白朮**

治痰歸經 **白朮** 亦能疎風順氣

治痰歸經 **白朮** 亦能疎風順氣

治痰歸經 **白朮** 亦能疎風順氣

風方

朱砂壹字

輕粉壹錢

巴豆去油壹錢

全蝎壹枚

蟬殼壹枚

右末之研和大人盡劑用薄荷泡湯調下小兒分半用乳汁調下或吐痰或泄毒物皆效

烏龍丸

治諸風癱瘓口眼喎斜語言蹇澀

真川烏半斤好五靈脂各壹兩

右末入腦麝半錢同研滴水圓小彈大陰乾每壹圓先薑汁研開次好酒調下空心吞前日兩服似鐵彈圓

廣濟丸

治風症昏迷吐沫抽掣背脊強直產後中產通斥

當歸 荆芥穗

右等分末之每貳錢水壹盞酒少許煎七分灌下如牙緊用銅匙斡以雞羽蘸藥入口或用童尿調下或以白蘭代當歸

亦效

又方

黑豆炒焦好酒浸之取清汁

右每酒壹盞煎到二錢煎七分溫服又連續進劑以瘳為度

大陽風症

始則發熱腹痛喘息涎浮次則牙緊頭搖十拍

微動漸加項背強直轉側不仁甚者昏困失音目睛直視滑泄不禁身腰反張如此則十不救一新產血虛汗出傷風亦作症

證允產後發熱若古蹇唇急手指微動便急作風症治之

易

方見在門

人為邪氣所干則發而為病若氣若血若痰若水若風若寒若暑若濕若燥表裏冷熱虛實各有受病之處用藥之法必究其原而後可以起病否則前賢所謂據不知竟廣終原野真一人獲之術亦疎耳是可以人試伎

手哉

風

中暑論

人有常言傷暑做出百般病其果厚誣哉蓋暑之入人伏於三焦腸胃之間至有兼旬累月而不可測識者如嘔吐如中滿如泄瀉如下痢如焦渴如發瘧如腹痛如下血以至諸熱等證苟因暑得之其根未除雖百藥遍嘗難施其巧夫人心胞絡與胃口相應胃氣稍虛或因飢胃暑故暑氣自口鼻而入凝之於牙頰連之於心胞絡如響應聲過暑以遠急漱口而勿嚥可也若覺暑毒逼塞咽喉尤當灌滌而吐之傷暑脈尚垢自汗身熱背寒煩悶大渴倦怠少氣毛聳惡寒或頭疼或霍亂或四肢厥冷但身體無痛經云熱則諸毛孔開故灑然惡寒體認不精妄以傷暑為傷寒誤人不小然而暑家何以脈虛暑能消氣氣消則血散脈安得而不虛其或六脈沉伏冷汗自出悶絕而昏不知人此則中暑證候又加重耳治法大要雖貴於驅暑尤貴於和中二者並行則其間雜證不戰而自屈若汗若下若用藥差冷古人戒之雖然夏月伏陰在內暑家氣虛脈虛或飲水過多或冷藥無度傷動其中嘔吐不食自利不渴此則外熱裏寒無惑乎傷暑伏熱之說非也

中暑證治

五物香薷湯 服暑和中通用

香薷

白扁豆

厚朴

白茯苓

甘草

右剉每服二錢水煎溫服

香薷散 服暑和中除煩止渴

香薷

白扁豆

厚朴

白茯苓

中暑

甘草 各兩 白扁豆 各兩 白乾葛 各兩

右剉每服二錢薑五厘片水煎微溫服

香薷散 解暑毒止霍亂

香薷 各兩 厚朴 各兩 茯苓 各兩 陳皮 各兩

甘草 各兩 良薑 各兩

右剉細每服二錢半鹽一捻水煎服

五苓散 治傷暑煩渴引飲過多小便赤澀心下水氣 方見水飲

治傷暑外熱內渴 方見血 於內更加生薑為妙

竹葉石膏湯 治伏暑內外熱熾煩燥大渴

石膏 各兩 半夏 各兩 麥門冬 各兩

人參 甘草 各兩

右蓬朮每服二錢薑五片青竹葉七片粳米百粒水煎服

治暑證身熱嘔吐不甚渴

人參 半夏 杏仁 甘草

縮砂仁 茯苓

扁豆 厚朴 藿香 宣木瓜

右剉每服三錢薑五片煎服內傷生冷通用

治傷暑復感冷及內傷生冷

半夏 薄荷 茯苓 甘草

右欬咀每服二錢薑七片小烏梅壹枚煎服感冷更添生薑

生薑 茯苓 甘草

治傷暑伏熱生痰以致頭痛中痞

生薑 茯苓 甘草

右末之用醋并薑汁調半生薑糊因桐子大每服七十圓熟

水下暑藥皆可下

治中暑昏迷吐瀉

透明硫黃 硝石 五靈脂

元精石

陳橘皮去白

青橘皮去白

右靈脂二搗皮為細末次入元精末及硫黃硝石末和畢以好醋打糊圓豌豆大每服五十圓空心米飲下或五苓散下或水研灌亦得

大黃龍圓治中暑昏潰眩暈分利陰陽

透明硫黃

硝石

各壹兩

白礬

各壹兩

雄黃

滑石

各半兩

飛羅白麵四兩

右為細末入麵拌和滴水圓桐子大每服十五圓至二三十

圓新汲水下昏塞者水研灌下如無**硝石**以**益硝代****來復黃**

龍大抵性温

道途中暑昏仆即扶起以手巾蘸熱湯煖其臍腹即漸蘇醒

次以**來復散**為末井水調下無藥則以**大黃**細研新水調與

之仍以**益**小許置鼻中或謂中暑最忌得冷**來復****黃龍**并蒜

以水調下者何蓋其藥性温因寒而發用也

濕

中濕論

天氣下降地氣上騰二氣薰蒸此即濕也豈必水流濕而後為

濕哉且風之撼動人知其為風寒之嚴凝人知其為寒暑之炎

熱人知其為暑惟濕之入人行住坐臥實薰染於冥冥之中人

居戴履受濕最多况夫濕能傷脾胃土一虧百病根源發軔於

此矣滯而為喘嗽瀆而為嘔吐滲而為泄瀉溢而為浮腫濕痰

熱則發黃濕遍體則重濕入關節則一身盡痛濕聚痰涎則昏

不知人至於為身熱為鼻塞為直視為鄭聲為虛汗為脚氣為

腹中脹臍下堅為小便難大便自利皆其證也濕家不可汗汗

之則發瘧熱而瘧者斃又不可下下之則額汗骨滿微喘而噦

小便淋瀝雖以有寒而濕之法通利小便為上益脾順氣次之

中濕論

則赤伏苓防已輩自有奇功大抵濕之為病易至沉深漸潤之
餘淪肌浹髓於斯時也須以木附薑獨作大劑與之藥力相接
病當漸解不可以日暮而責效焉要之治濕莫若白附薑木為快

中濕證治

並主之
加刺除濕湯治氣虛傷濕身重腰疼四肢微冷或嘔逆或唐泄

蒼木炒 白木 甘草炙 乾薑炮

伏苓各貳兩 橘紅 辣桂 厚朴各半兩

右剉每服二錢薑棗煎服

伏苓各貳兩 治受濕身體痛重

伏苓 乾薑炮 甘草炙 白木

辣桂 蒼木等分

右剉每二錢水煎服

治腎虛受濕小便自利腰冷而痛重

乾薑炮 伏苓各貳兩 甘草炙 白木各壹兩

右剉每二錢半水煎服加桂亦得

治傷濕鼻塞身痛

黃耆炙 辣桂各叁兩 甘草炙 白芍藥陸兩

右麓散每服二錢薑四片棗一枚煎食前服

治濕益脾順氣加伏苓生薑

治濕消飲助期 麥可用正氣散送下

治寒濕攻攻身體冷痛

附子青 蒼木製 白木 厚朴製

宣木瓜 甘草炙

右剉每服四錢水二盞薑十片煎一盞食前微溫服

治風濕相搏汗出氣短身體煩疼微腫惡風不欲

去衣

辣桂炙 白木 附子青 甘草炙

右劉散每服二錢半水盞半薑七片棗二枚煎一盞食前微
温服小便不利悸氣加**伏苓**痺加**防己**腰痛加**芍藥**

甘草附子湯治中濕小便不利大便自利

附子熟薑黃桑

白朮

甘草各二兩

辣桂各兩

右劉每服三錢薑七片煎食前微温服汗出加**防風**悸氣加

伏苓

木防風湯治傷濕大小便皆自利

白朮各兩

甘草各兩

附子熟

此水銀半

右劉細每服三錢薑七片水盞半煎一盞食前微温服

五苓散治濕證小便不利經云治濕之法不利小便非其治也

方見水

茵陳湯治濕氣痰熱發黃小便秘澀渴引水漿

茵陳蒿各兩

大黃半兩

小紅梔子枚

右劉每服三錢水煎服**五苓散**亦治發黃一藥水煎尤穩

濕瀉身痛方**五苓散**加**蒼朮**煎點隨意

新編仁齋直指論卷之三



