

太平惠民和劑局方

四



太平惠民和劑局方卷之七

治眼目疾

錦鳩圓治肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出怕日羞明隱澀  
疼痛瞻視茫茫多見黑花或生翳膜並皆治之

草決明子 蕤仁 去皮 羌活 去蘆 瞿麥 各二兩

細辛 去苗 杜蠟 洗火煨 黃連 去鬚 杜蒺藜 炒去尖角

防風 去蘆 肉桂 去麝皮 甘菊花 淨各 白茯苓 去皮

斑鳩 用一隻去皮毛腸筋爪 羆羊肝 黃貝 淨各

蔓菁子 煎洗 熟蒸 一伏時 日乾

右拾伍味為末煉蜜和并伍百下圓如梧桐子大每服拾伍  
圓至貳拾圓以溫水或溫酒下空心日午臨卧日參服如久  
患內外障眼服諸藥未効者漸加服伍拾圓必効暴赤眼疼

痛食後用荆芥湯下貳拾圓

雙料圓治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生障翳視物不明  
迎風有淚久服補肝腎增目力

車前子 熟乾地黄 淨洗酒酒蒸焙 兔絲子 酒浸別研

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓溫酒下空心晚

食前日貳服

蜜蒙花 淨 石決明 用鹽同東流水煮木賊  
開或痒或痛漸生翳膜視物不明及久患偏頭疼牽引兩眼漸  
覺細小昏澀隱痛并暴赤腫痛並皆瘥之

蜜蒙花 淨 石決明 用鹽同東流水煮木賊

杜蒺藜 炒去 羌活 去蘆 菊花 各等分

右為細末每服壹錢臘茶清調下食後日貳服

治大人小兒一切風熱毒上攻眼目暴發赤 或生  
瘡破痛隱澀羞明

羚羊角鈔 黃芩

升麻

甘草炙

車前子各拾兩 梔子仁

草龍膽各伍兩 決明子貳拾兩

右為末每壹錢食後溫熱水調下日進叁服小兒可服半錢

**秦皮散** 治大人小兒風毒赤眼腫痛痒澀眵淚昏暗羞明

秦皮

滑石性平者 黃連各十兩

右為細末每用半錢沸湯泡去滓溫熱頻洗

**慎圓** 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澀難開

推眵多淚怕日羞明時發腫赤或生障翳並宜服之

蔓荊子去白皮

人參

羌蔚子

決明子炒

白茯苓去皮

遠志去心

防風去蘆義

青箱子

地骨皮去土

柴胡去蘆

山藥

車前子

栝子仁炒

玄參

甘菊

甘草炙

細辛去苗

右為末蜜水煮糊圓如梧桐子大每服貳拾圓米飲下食後

日貳服

**菊睛圓** 治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠常見黑花

多有冷淚久服補不足強目力

枸杞子三兩

巴戟去一兩

甘菊花揀

茯苓酒浸去皮炒

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓至伍拾圓溫酒

或鹽湯下空心食前服

**普濟散** 治男子婦人風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明臉背腫痒

或時赤痛耳鳴頭眩

荆芥穗壹兩

蒼朮米泔浸壹宿

白蒺藜炒

防風壹兩

甘草炒

右並為細末不拘時入鹽少許沸湯或酒調下壹大錢神妙

**撥雲散** 治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮障怕日羞明

多生眵淚隱澀難開昨痒赤痛臉背紅爛瘰肉侵睛但是一切

風毒眼疾並皆治之

羌活

防風

柴胡

甘草

各一片

右為末每服貳錢水壺中盞煎至柒分食後臨睡時服薄荷茶調菊花苗湯下亦得忌藏鹽鮓醬濕麪炙燂發風毒等物

**草龍膽散** 治上焦受於風熱氣毒攻衝眼目暴赤礫澀羞明腫痛多吐迎風有努腎膜攀睛肉隱痛並治之 又方見後

川芎

不見火

香附

各四兩

龍膽草

各二兩

草決明子

微炒

甘草

炙

木賊

去節

菊花

去梗

右為細末每服貳錢用麥門冬熟水入砂糖少許同調食後服或米泔調服亦得食後或臨時服之

**蟬花散** 治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目昏膜遮睛赤腫疼痛昏暗視物不明隱澀難開多生眵眵內外障眼

蟬蛻

洗淨

穀精草

洗去土

白蒺藜

炒

菊花

去梗

防風

不見火

草決明

炒

密蒙花

去枝

羌活

黃芩

去土

蔓荆子

去皮

山梔子

去皮

甘草

炒

川芎

不見火

木賊草

淨洗

荆芥穗

各等分

右為末每服貳錢用茶清調服或用荆芥湯入茶少許調服亦得食後及臨卧時服

**養神膏** 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗疼痛隱澀難開昏眵赤腫怕日羞明不能遠視迎風有淚多見黑花並皆療之

腦子

研

麩仁

去殼

殼壓去油

右用生蜜陸錢重將腦子麩仁同搜和每用銅筋子或金銀釵股大小皆時復少許點之及治連眵赤爛以油紙塗藥貼

**流氣散** 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕日羞明推眵赤腫隱澀難開或生障瞖倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血風眼及時行暴赤腫眼胞紫黑應作眼病並宜服之

大黃

炮

川芎

菊花

去枝

牛蒡子

炒

細辛

少許

防風

去苗

山梔

去皮

白蒺藜

炒去刺

右為末每參錢食後米泔調服茶清亦得忌食發風毒等物  
**明眼** 治男子婦人肝藏積熱肝虛目暗膜入水輪漏睛  
眵淚眼見黑花視物不明混睛冷淚腎膜遮障及腎藏虛憊肝  
受虛熱及遠年日近暴熱赤眼風毒氣眼並皆治之兼治乾淚  
脚氣消中消渴及諸風氣等疾由腎氣虛敗者但服此能補肝  
益腎驅風明目其効不可具述

生乾地黃洗帶各 牛膝去蘆酒 石斛去苗  
枳殼炒 防風去土 杏仁去皮

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓空心食前温  
酒吞下或用飯飲鹽湯亦得忌一切動風毒等物  
**洗眼** 治遠年日近腎膜遮障攀睛努肉昏暗淚多瞻視  
不明或風氣攻注臉生風粟或連眵赤爛怕日羞明隱澀難開  
並能治之

朱砂別研 乳香別研 鵬砂別研 赤芍藥

當歸洗帶 雄黃研飛 麝香別研 黃連去鬚  
右搗羅為細末入研藥拌勻再搗煉蜜搜和為圓如皂夾子  
大每次用壹圓安淨盞內以沸湯泡開於無風處洗藥冷閉  
目少時候三兩時再煨令熱依前洗壹貼可洗參伍次不得  
犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不可洗之

**草龍膽散** 治眼暴赤腫痛風氣熱上衝睛疼連眵臉背赤爛  
肉侵睛時多熱淚及因叫怒逆損肝氣久勞瞻視役損眼九風  
砂塵土入眼澀痛致成內外障翳及一切眼患悉皆治之

羌活 草龍膽各陸 赤芍藥半斤 甘草炙  
防風去土 菊花去枝 茯苓去皮

右搗為末每服貳錢食後臨卧時温酒調下

**洗眼** 治肝經不足受客熱風壅上攻眼目赤澀睛疼臉爛怕  
日羞明夜卧多淚時行暴赤兩太陽穴疼頭旋昏眩視物不明  
漸生翳障並皆治之

**龍石散** 治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽隘腫塞疼痛妨悶  
每用少許搽貼患處熱津小兒瘡疹毒氣攻口齒先用五福化  
毒丹掃後仍再用此藥搽貼立効

朱砂研飛 錐石燒赤 生腦子研  
右為末每日伍茶次用夜臥貼妙

**如聖湯** 治風熱毒氣上攻咽喉痛喉痺腫塞妨悶及肺壅欬  
嗽咯唾膿血胃滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣息腥臭久久吐  
膿狀如米粥又治傷寒咽痛

苦桔梗壹兩 甘草貳兩  
右為末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓溫服小兒時時  
呷服食後臨臥

**鵬砂圓** 治大人小兒風壅膈熱咽喉腫痛舌頰生瘡口乾煩渴

麝香壹兩 鵬砂研 甘草浸汁熬 牙硝貳兩  
梅花腦別研 寒水石燒通赤紅

右為末用甘草膏子和搜每兩作肆百圓每服壹圓含化燕  
津常服化痰利膈生津止渴

**龍膠散** 治牙齒動搖風虫疼痛斷肉宣露及血臭氣常用令牙  
齒堅牢解骨槽毒氣

牛膝去老 木律四拾四 黃茄細切 郁李仁貳拾兩  
麝香壹兩 空皮子細切

已上五味搗碎入罐子內上用瓦子蓋口留壹小竅用  
鹽泥固濟燒令通赤候煙白色即住火取出以新上卷  
壹伏時取出後入下項藥

升麻 細辛去苗  
右件為細末每用少許搽患處須臾溫水漱口臨臥更貼少  
許燕津亦無妨

**玉膏散** 治咽喉腫痛舌頰生瘡腐毒壅塞熱盛喉閉或因  
誤吞硬物諸骨哽刺涎滿氣急或至悶亂不省人事並痔瘡之

玄參去蘆 荆芥穗 滑石研 黃連去蘆

縮砂去殼 白茯苓炒令黃 貫衆去蘆 甘草炙

山豆根各膏兩 寒水石研飛兩 鵬砂貳錢

右為細末每服壹錢乾摻舌上後以新水嚥下不拘時候

**如聖藥** 治急喉閉纏喉風飛颺單蛾雙蛾結喉重舌木舌

腮頰腫痛變經用藥不能吞水粥者 又方見後

流黃細研 川芎 臘茶 薄荷去枝梗

川烏炮 硝石研 生地黃各貳兩

右為細末烈生葱自然汁搜和為錠每服先用新汲水灌漱

吐出次嚼生薄荷伍柒葉微爛用藥壹錠同嚼極爛以井水

嚥下甚者連進叁服即愈重舌腮腫先服壹錠次以壹錠安

患處其病隨藥便消又治胃暑伏熱不省人事用生薄荷水

調研壹錠灌下即甦如行路常含壹錠即無伏熱之患口舌

生瘡不能合口并食熱物如上法服訖用水灌漱嚼薄荷拾

葉如泥吐出再水灌漱嚼藥壹錠含口內聚涎裹之覺涎滿

方吐出如此服叁錠便能食酒醋遇食鹹酸鮓脯炙烤喉中

生泡須搗破吐血方省薄荷數葉以壹錠同嚼井水吞下砂

淋熱淋小便出血同車前草柒葉生薑小塊研爛水調去滓

嚼藥壹錠以水送下此藥分陰陽去風熱化血為涎化涎為

水常帶隨身備急壹錠可活壹人命小兒只服半錠

**少效** 治大人小兒卒患喉痺閉塞不通腫痛生瘡語聲不快

風雍毒鼻衄出血

山藥生 腦子研 牙硝生 麝香研

甘草 鵬砂生 各

右為細末每服半錢如茶點服

**治風牙** 牙疔攻疔疼痛晝夜不止痛不可忍睡卧不安

牙斷宜露動搖欲脫或腮頰浮腫爛血出並能療之

良薑去蘆 草烏去皮 細辛去土葉 荆芥去梗



右件肆味各貳兩礫為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞燕良之用溫鹽湯灌漱其痛即止常使指牙用腐炭末壹半相和常用止牙宜辟口氣求無牙疾

**吹喉散** 治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶並能治之  
蒲黃一兩 盆硝八兩 青黛一兩半

右件用生薄荷汁壹升將盆硝青黛蒲黃壹處用瓷罐盛慢火熬令乾研細每用壹字或半錢摻於口內良久出涎吞之不妨或喉中腫痛用筒子入藥半錢許用力吹之無不立効

**如聖勝命散** 治證服餌與前如聖勝命散同品味小異

朴消四兩 川芎一兩 硫黃一兩半 貫眾二兩  
薄荷一兩 荊芥一兩 嫩茶各半兩

右件為末裂生葱自然汁搜和為錠服藥湯使如前方

**五香散** 治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

木香 沉香 雞舌香 薰陸香 各一兩

麝香 別研

右搗羅為末入麝香研令勻每服貳錢水壹中盞煎至陸分溫服不拘時候

**如神散** 治風牙疔牙攻疔疼痛日夜不止睡卧不安或牙齦動搖連頰浮腫不拘久近並皆治之

川椒去月及開口者 露蜂房微炙

右搗羅為細末每用壹錢水壹盞入鹽少許同煎至捌分乘熱漱之冷即吐出壹服立効

**玉池散** 治風疔牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露出血口氣等疾

當歸去蘆 藁本 地骨皮 防風

白芷 槐花炒 川芎 甘草炙

升麻 細辛去苗

右為末每用少許指牙痛甚即取貳錢水壹錢半黑豆半合生薑叁片煎至壹盞稍溫漱口候冷吐之

治風熱肺壅咽喉腫痛語聲不出或如有物哽  
荆芥穗半兩 桔梗二兩 甘草炙

右龍末肆錢水壹盞薑三片煎陸分去滓食後溫服

細辛治風 治風虫牙疼牙齦宣爛牙齒搖動腮頰浮腫皆能治之

紅椒去目炒 鶴虱 牙草 葶撥古方治牙疼

縮砂去殼 荊芥去梗 細辛去前 白芷

草烏各二兩

右搗為細末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得嚥少時  
用溫水漱口頻頻擦之立有神効

太平惠民和劑局方卷之七

# 治雜病

**考證** 瘧疾五種黃病十二時瘧疾十種水病八種大風十二種瘧痺并風入頭眼暗漠漠及上氣欬嗽喉中如水雞聲不得卧飲食不作肌膚五藏滯氣積聚不消壅閉不通心腹脹滿連及背背鼓脹氣堅結流入四肢或腹又心膈氣滿時定時發十年二十年不差下種下痢疥蟲蚘蟲寸白蟲諸蟲上下冷熱久積痰飲令人多眠睡消瘦無力陰入骨髓便成滯疾身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沈重不能久行久立婦人因產冷入子藏藏中不淨或閉塞不通胞中瘀血冷滯出流不盡時時疼痛為患或因吐斷產并小兒赤白下痢及狐臭耳聾鼻塞等病服此藥以參真為一劑服不過冬劑萬病悉除說無窮盡故以萬病

圓名之。瘧病未發前服壹圓未瘧如前更服

芍藥

肉桂 去麋皮

川椒 去目及閉口

乾薑 炮

防風 去蘆

巴豆 去心膜

當歸 去蘆

生角 角 鈔

桔梗

芫花 醋炒赤

茯苓 去皮

桑白皮 炒

人參 去蘆

黃芩

黃連 去鬚

禹餘糧 醋研 蒲黃 微炒

前胡 去芦

大戟 剉炒

葶藶 炒

麝香 研

細辛 去苗

雄黃 研飛

朱砂 研飛

紫苑 去芦

甘遂

牛黃 研 各壹兩

蜈蚣 十二節 去頭足 芫菁 二十八枚 入糯米同炒 候

石蜥蜴 去頭尾足

右為細末入研藥勻煉蜜為圓如小豆大若一歲已下小兒有疾者令乳母服兩小豆大亦以吐利為度近病及辛病用多服積久疾病即少服常服微瀉利為度卒病欲死服三圓取吐利即差卒中惡口噤服一圓將一合下利即差五注鬼

刺客忤服貳圓男女邪病歌哭腹大如妊身服貳圓日參夜  
壹間食服之蠱毒吐血腹痛如刺服貳圓不差更服瘧病未  
發前服壹圓未差更服諸有痰飲者服參圓冷癖服參圓日  
參服皆開食常令微溏利宿食不消服貳圓取利癥瘕積聚  
服貳圓日參服拘急心腹脹滿心痛服參圓上氣嘔逆胃滿  
不得臥服貳圓不差更服大痢服貳圓日參服疥濕服貳圓  
以壹圓如杏仁大和醋貳合灑下部中水病服參圓日再服  
開食服之差止人弱即隔日服頭痛惡寒服貳圓覆取汗傷  
寒天行服貳圓日參服問食服之小便不通服貳圓不差明  
日更服大便不通服參圓又內壹圓下部中即通耳聾聾耳  
以綿裹如塞之鼻衄服貳圓癰腫丁腫破腫內壹圓如  
麻子大日壹傳之根亦自出犯丁腫血出以猪脂和塗有孔  
內孔中差癩瘡以酢汁洗訖取藥和猪脂傳之漏瘡有孔以  
壹圓內孔中和猪脂傳上痔瘡塗綿筋上內孔中日別易差  
止癩癧以酢和塗上差癬瘡以布揩令汁出以酢和塗上日  
壹易瘡止曾背腰脇腫以醋和傳腫上日壹易又服貳圓諸  
冷瘡積年不瘥以酢和塗之惡刺以壹圓內瘡孔中即瘥蝮  
蛇螫以少許內螫處若毒入腹心煩欲絕者服參圓蜂螫以  
少許傳之差婦人諸疾胞衣不下服貳圓小兒驚癇服壹圓  
如米許以塗乳令啣之看兒大小加減小兒客忤服壹圓如  
米和乳塗乳頭令啣之以意量之蝎螫以少許傳之差小兒  
乳不消心腹脹滿服壹圓如米許塗乳頭令啣之即差

**偏寒圓**治腎經不足風冷乘之腰痛如折引背脊佻仰不利轉  
側亦難或因役用過多勞傷於腎或因寢冷濕地氣傷腰或因  
隊墮傷損因風寒客搏皆令腰痛並皆治之

威靈仙 去土

當歸

肉桂 去皮

右為末以酒煮麩糊為圓如梧子大每服拾伍圓溫酒或  
煎茴香湯下食前服婦人煎桂心湯下加至貳拾圓有孕婦

人不得服忌食茗

**集靈園** 治因藏府虛弱或多食甘肥致蛔蟲動作心腹攪痛發作腫聚往來上下痛有休止腹中煩熱口吐涎沫即是蛔咬宜服此藥若積年不差服之亦愈又療下部有蟲生疔疔痒痛

大黃

劉炒拾伍兩

木香

不見

檳榔

訶梨勒

附子

劉炒拾伍兩

燕美

炒研

鶴虱

炒乾薑

大為小煉蜜為圓如梧桐子大每服參拾圓食前橘皮湯下  
婦人煎湯下

**乳香** 治諸痔下血肛邊生肉或結核腫疼或生瘡痒痛或大便艱難肛腸脫出又治腸風下血無問新久及諸瘻根在臟腑悉能治之

乳殼

去核炒

牡礪

火煨

萹澄茄

去頭翅足糯

大黃

蒸焙

鶴虱

炒

白丁香

各半兩

右為末粟米糊圓如梧桐子大每服拾圓至拾伍圓如治腸風臘茶清下諸痔煎薤白湯下諸瘻煎鐵屑湯下並食前服

**解毒雄黃圓** 解毒治纏喉風及急喉痺卒然倒仆失音不語或牙關緊急不省人事

雄黃

研飛

巴豆

去皮出油

右為末醋煮麩糊為圓如菜豆大用熱茶清下菜園吐出頃涎立便蘇省未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥不下即以刀尺鐵匙斡開口灌之藥下喉嚨無有不活吐瀉此小無妨及治上膈壅熱痰涎不利咽喉腫痛赤眼癰腫一切毒熱並宜服之如小兒患喉嚨赤腫及驚熱痰涎壅塞服貳圓或參

圓重兒大小加減

**治一切瘧病** 發作有時先覺伸欠乃作寒慄鼓振顛顛額中外皆寒臍脊俱痛寒既已內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷或痰聚胸中煩滿欲嘔或先熱後寒或先寒後熱或寒多熱少或熱多寒少或寒熱相半或但熱不寒或但寒不熱或一日

一發或隔日一發或一發後六七日再發並能主之

甘草燼

菜豆末

薄荷葉鹽

定粉研

龍腦研

麝香研

金箔拾伍兩

信砒醋黃

朱砂研飛

壹兩壹分

右為末煉蜜搜和每兩作貳拾圓捏福以金箔為衣每服壹餅子以新汲水磨化日發者未發前服之間日者不發夜服隔數日發者前壹日夜服連日者凌晨服

**治藏寒**

蛔蟲動作上入膈中煩悶嘔吐時發時止得食

**治嘔常**

自吐蛔有此證候謂之蛔厥此藥主之又治久痢

烏梅叁伯箇

黃蘗炙

細辛去苗

肉桂去麋皮

附子炮去皮

人參去蘆

蜀椒去目及開口者

當歸去蘆

乾薑炮

黃連去蘆

右異搗篩合治之以醋浸烏梅壹宿去核蒸之伍斗米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與煉蜜杵貳阡下圓如梧桐

子大每服拾伍圓溫米飲下食前服

**神助散**

舊名葶藶散

治十種水氣面目四肢遍身俱腫以手按

之隨手而起欬嗽喘急不得安卧腹大腫脹口苦舌乾小便赤澁大便不利

澤瀉貳兩

椒目壹兩半

猪苓去黑皮

黑牽牛微炒取末

葶藶炒香別研

右為細末每服以葱白叁莖漿水壹盞煎至半盞入酒半盞調藥叁錢絕早面向東服如人行十里久以漿水葱白糞稀粥至葱爛入酒伍合熱啜量人啜多少須啜壹升許不得喫鹽并麪自早至午當利小便參肆升或大便利喘定腫減柒分隔日再服既平之後必須大將息及斷鹽房室等三年

**立效散**

治下焦結熱小便黃赤淋閉疼痛或有血出及大小便

俱出血者亦宜服之

山梔子去皮

瞿麥壹兩

甘草炙

右為末每服伍錢至柒分水一椀八連鬚葱根七箇灯心伍拾莖生姜伍柒片同煎至柒分時時溫服不拘時候

**必勝散**

治男子婦人血妄流溢吐血衄血嘔血咯血

熟乾地黄

小蘗并根用人參

蒲黃微炒

當歸去芦

芍藥

烏梅去核

右件藥搗羅為糞散每服伍錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時候

**納腸固**

治久新諸痔肛邊腫痛或生瘻痔時有膿血又治腸風

下血及肛門脫出並宜服之

括樓式枚

蝟皮兩箇到每鹿

雞冠花炒

胡桃取仁

白礬微抽

綠礬枯

白附子生用

天南星生用

枳殼去殼

附子去皮

訶子各去皮

半夏賦

右為細末以醋熬麪糊為圓如梧桐子大每服式拾圓空心

臨卧溫酒下遠年不差者服拾日見效久服永除根本小可

腸風等疾一二年內者只拾服差永不發動

**治腎氣**

不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起數

臍腹急痛畜作有時勞倦即發或尿如豆汁或便出砂石並皆

治之

芍藥

白朮

滑石

葵子

瞿麥各二兩

石韋去毛

木通各二兩

王不留行

當歸去芦

甘草炙

右為細末每服式錢煎小麥湯調下食前日二三服

**牡蠣散**

治諸虛不足及新病暴虛津液不固躄常自汗夜卧即

甚久而不止流滑枯瘦心忪驚惕短氣煩倦

黃芪去苗土

麻黃根洗各

牡蠣米泔浸刷去

右三味為糞散每服三小水一盞半小麥百餘粒同煎至捌

分去滓熱服日式服不拘時候

主灸百病

陳久黃艾

細篩隔去青滓再搗再篩如此叁次別以馬尾

右主灸百病世人着灸多無法度徒忍痛楚罕能愈疾今於聖惠千金外臺等方內撫取點穴分寸作炷大小壯數多少

等法如後

定分寸法

點灸穴法

作艾炷法

點火法

下火灸時法

治灸瘡不發法

淋洗灸瘡法

壯數多少法

推人神所在法

不以多少擇取葉入臼內用木杵輕搗令熟以

羅子隔之更用馬尾

取病人男左女右中指第二節內度兩橫紋

相去為乙寸應取穴及作炷分寸並依此法

凡點穴時須得身軀平直四肢毋令拳縮坐點母

令俛仰立點毋令傾側灸時孔穴不正无益於事

徒燒肌肉虛忍痛楚若坐點則坐灸之則點

則臥灸之立點則立灸之反此亦不得其穴

凡下火點灸須令艾炷根下廣三分長亦三分若

減壯人亦可稍增令大周

古來用艾病已入緩木火今即不用木火灸人不

犯諸患兼去久病以膏油點燈二上燒艾並點艾兼

至愈已素且無疼痛用蠟燭更佳又火珠耀日以

艾承之遂得火出此火灸病為良以艾引之

便得火出此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

此火亦佳

至灸元不着午前後乃可下火灸之時謂陰氣未

夫起風雪忽降猛雨炎暑雷電虹霓暫時且停候待清明即

思慮愁憂怒呼罵叫吁嗟歎息一切不祥已念之大吉

凡着灸瘡病歷春夏秋冬不較者灸瘡雖出

其疾不愈甲乙經云灸瘡不發者用故履底糸令熱對灸之二

日即發膿出自然愈疾今用赤皮葱三五莖法其葱青於瘡

通其瘡二三日自發立壞膿出疾愈

凡着灸瘡病歷春夏秋冬不較者灸瘡雖出

湯溫溫淋洗灸瘡周迴約一二寸已來今驅逐

風氣於瘡口內出兼令經脈往來不滯於瘡下自然瘡壞疾

愈若瘡瘡退火煎後用此煎搗東南枝梢青嫩挑皮二味等分

煎湯溫溫淋洗灸瘡此一二味備能護灸瘡中諸風若瘡肉

也若灸瘡瘡痛不可忍多時不愈者加

黃連四味等分煎湯淋洗立有神效

依扁鵲灸法有至伍伯壯

十壯者皆臨時消息之

推人神所在法一日足大指二日外踝三日股內四日腰五

腕九日尻十日背腰十一日鼻柱十二日髮際十三日牙齦

十四日胃脘十五日漏身十六日乳十七日氣膈十八日



腹內十九日足跟二十一日膝下二十一日手小指二十二日  
伏兔二十三日肝俞二十四日手陽明二十五日足陽明二  
十六日手足二十七日脾俞二十八日陰二十九日膝肌顯  
三十日關元下至足已上之神所在之日禁忌着衣若過病  
急切勿  
向此例

**治瘧疾**凡瘧疾蓋因外邪客於風府生冷之物內傷脾  
胃或先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日併發或間日  
一發寒則肢體顛掉熱則舉身如燒頭疼惡心煩渴引飲氣息  
喘急口苦咽乾脊脊酸疼腸鳴腹痛諸藥不治漸成勞瘵者此  
藥治之

知母 川常山 草果 甘草炙

良薑貳拾兩 烏梅壹斤

右件為齋散每服參錢水壹盞生薑伍片棗子壹枚煎至柒  
分去滓溫服

**對金飲子**治證并方見傷寒類

**清心蓮子散**治證并方見痼冷類

**槐角圓**治五種腸風瀉血糞前有血名外痔糞後有血名內痔  
大腸不收名脫肛穀道四面贅肉如豚名舉痔頭上有孔名瘻  
並皆治之

槐角去枝便 地榆 當歸酒浸壹 防風去蘆

黃芩 枳殼去穢炒

右為末酒糊圓如梧桐子大每服參拾丸米飲下不拘時候  
此藥治腸風瘡內小蟲裏急下膿血止痒痛消腫聚驅濕毒  
久服永除病源

**勝金圓**治一切瘧病發作有時蓋因外邪客於臟腑生冷之物  
內傷脾胃或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或寒少熱多  
或但熱不寒或但寒不熱或連日併發或間日而發或發後二  
五日再發寒則肢體顛掉熱則舉身如火頭痛惡心煩渴引飲  
氣息喘急口苦咽乾背脊痠疼腸鳴腹痛或痰聚胸中煩滿欲  
嘔並皆治之

檳榔 肆兩 常山 酒浸 煎

右為末水麩糊為圓如梧桐子大每服叁拾圓於發前壹日晚臨卧用冷酒吞下便睡不得喫熱物茶湯之類至四更盡再用冷酒吞下拾伍圓忌食一切熱羹湯粥食午間可食溫粥至晚方可食熱忌一切生冷魚腥等物。 ㊟用川常山拾陸兩為末雞卵拾伍隻取清為圓治證服餌一如前法

**腸風黑散** 治證與瀉痢類腸風黑散同

荆芥 燒 枳殼 去穢 兩炒用 槐花 燒 槐角 炒 甘草 炙 蝟皮 各壹兩半

右將合燒藥同入瓷瓶內黃泥固濟燒存叁分性出火氣同甘草枳殼搗羅為末每服入貳錢水壹盞煎至柒分空心溫服溫酒調下亦得

**神應黑散** 治證并方見瀉痢類

**備急圓** 療心腹諸卒暴自病中惡客忤心腹脹滿卒痛如刀所

刺氣急口噤

乾薑 壹兩 巴豆 夫皮油 大黃 各貳兩

右件為末煉蜜為圓如梧桐子大每服叁圓溫水下不拘時  
**青龍圓** 治大人小兒五藏積熱毒氣上攻胃膈煩悶咽喉腫痛赤眼癰腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡精神恍惚心忪悶亂坐卧不寧及傷暑毒面赤身熱心躁煩渴飲食不下

寒水石 研 石膏 研各 拾陸兩 青黛 捌兩

右件細研如粉入青黛和勻蒸餅柒箇水調為圓如雞頭大每服壹圓食後新汲水化下或細嚼用生薑水下亦得如中諸毒並宜服之及小兒驚風潮熱痰涎壅塞心胃煩躁類赤多渴睡卧不穩每叁歲兒可服半粒更量歲數加減與之

**千金圓** 治元陽虛弱寒氣攻衝膀胱小腸發腫作痛或在心脇

牽連小腹連屬陰間致身軀增寒撮痛  
楮實子 川練子 燒 巴豆 炒 全蝎 炒 當歸 去毒 兩

右為細末用浸當歸酒打麩糊和圓如雞頭實大空心溫酒  
鹽湯吞下二圓至三圓併進二服

**治遠年日近小腸疝氣偏墜播收臍下撮痛以致悶亂**  
及列腎腫硬日漸滋長陰間濕痒抓成瘡

吳茱萸去枝梗壹斤四兩用酒浸四兩用醋浸四兩用湯  
浸四兩用童子小便浸各履壹宿同焙乾

澤瀉去灰土 右為細末酒煮麩糊圓如梧桐子大每服伍拾圓空心食前  
鹽湯或酒吞下

**治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成寒疝陰癪偏**  
火上升臍腹疝痛膚囊腫脹或生瘡瘍時出黃水腰腿沉重足

脛腫滿行步艱辛服之內消不動臟腑方先枳實陳皮桃仁  
玄胡索川練子木香

山茱萸搗去核取 桔梗水浸壹伏時漉出  
白蒺藜炒去刺 川烏炮去皮 肉桂去粗皮 茴香舶上者淘去  
炒石磨炒  
食茱萸微炒 青皮去白 海藻洗焙

五味子淨揀 大腹皮酒洗 玄胡索各二兩 桃仁去皮小六及雙  
仁數炒別研  
枳實去穢熱 陳皮去白 川練子剉炒 木香壹兩半

**治陰癪腫脹或小腸氣痛**  
右為末酒糊圓如梧桐子大溫酒下三拾圓食前服

胡蘆巴炒一兩 大戟去皮炒 麝香別研  
壹錢 茴香服止者  
川練子各六兩 檳榔剉去痛練切 訶子炮去核酒浸  
蒸焙乾用  
附子炮去皮 木香各壹兩

右為末獨留川練子以好酒壹二升葱白柴枝長三四寸煮

川練子軟去核取肉和藥搗杵圓如梧桐子大空心溫酒下  
伍柒圓至拾圓薑湯亦得潮發疼痛炒姜熱酒下拾伍圓

**治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利**  
白牽牛貳兩 桑白皮微炒 白木木通去節

陳皮去白 右為細末每服貳錢薑湯調下空心服未覺再進常服導

不遺滯不損藏氣

治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜陰腫

小腹如郊上下痛不可忍或後結連濟故刺嘔惡悶亂並治之  
酒吞下小兒伍圓尚香湯下

# 治瘡腫傷折

治一切瘡腫傷折等病

蜀椒去目及閉口者

白芷

沒藥研

赤芍藥

肉桂去麋皮

當歸

鹽花研

麒麟竭研

葛蒲

白及

芎藭

草龍膽

木香

白欬

防風去芦义

厚朴去麋皮

麝香研

桔梗

柴胡去芦頭

松脂

人參

蒼朮洗浸

黃芩

夜合用皮

乳香

附子去皮臍

茯苓去皮

高良姜各半

硝石研如粉

甘草

雲母光明白薄者

桑白皮

水銀依膏凝如人

附子之類

黃芩研粉各四兩

栢葉不近道

槐枝

陳皮壹兩

清油津和兩

黃丹細研壹

黃芪去芦

右除雲母硝石麒麟竭沒藥麝香乳香黃丹鹽花搗味別研  
外並剉如豆大用上件清油於瓷器中浸所剉藥柒日以物  
封閉後用文火煎不住手攪三上火三下火每上候匝匝沸  
乃下火候沸定再上如此參次候白芷附子之類黃色為度  
勿令焦黑以綿或新布絞去滓却入鑊中再上火熬後下黃  
丹與別研藥搗味以柳篋不住手攪直至膏凝良久色變再  
上熬仍滴少許水中凝結不粘手為度先多置瓷器熱即傾

二熬仍濟少許水中凝結不粘手爲度先灸壹器熱即傾藥在內候如人體溫熱彈水銀在上每用膏藥即先刮去水銀治發背先以敗蒲壹斤用水三升煎五拾沸如人體溫將蒲水洗瘡拭乾貼藥壹兩分爲三服溫酒下未成膿者立差於外貼之妙癰外貼瘰癧骨疽毒穿至骨用藥壹兩分作三服溫酒下甚者即瀉出惡物兼外貼差腸癰以藥半兩分爲伍服甘草湯下未成膿者當時消已有膿者隨藥下膿出後每日酒下五圓如梧桐子大待膿止即住服凡眼貼兩太陽穴壁鏡咬蜘蛛咬外貼留瘡口發腦發鬚發眉發耳臍癰牙癰牙疼並外貼包裹即當時痛止箭頭所傷箭頭在內外貼每日喫少許爛菘豆箭頭自出虎豹所傷先以甘草湯洗然後貼膏每日換不過三次貼狗蛇咬生油下拾圓如梧桐子大仍須貼外難產三日不分免溫酒下壹分便生血運欲死以薑汗和小便半升溫酒下拾圓死者即返死胎在腹以榆白皮湯下半兩便生丈夫本藏氣苗香溫酒下壹分每日壹服不過二服差中毒藥酒洗襪溫下壹分每日壹服不過肆度瀉出惡物差瘤贅外貼消之一切腫癰外貼立差但有所苦並皆溫之藥到即差已上主療只忌羊血餘無所忌如人收此藥防身以蠟紙裹不令風乾可三拾年不損藥力

**小犀角圓**

治腸癰乳癰發背一切毒腫服之化爲水

巴豆

貳拾貳枚去皮膜  
代炒出油細研

大黃

熟焙壹分  
兩壹分 犀角 三兩

黃連

去鬚

梔子

去皮

乾姜

藍升麻

黃芩

防風

去芦

人參

當歸 去芦

黃芪

去苗

甘草

各壹兩

右爲細末入巴豆勻煉蜜搜和爲圓如梧桐子大每服三圓溫湯下利三兩行喫冷粥止之不利加至四伍圓初服取快利後漸減圓數取微溏泄爲度老小以意加減腫消及和潤乃止利下黃水覺腫處微皺色變即是消候一切腫毒皆內

消神驗不可論忌熱麪蒜猪肉蘆薈魚海藻松菜生冷黏食  
**何首烏散**治脾肺風毒攻衝遍身癩疥癢痒或生癰疹搔之成  
瘡有背拘倦肌肉頑痺手足皴裂風氣上攻頭面生瘡及治紫  
癍白癍頑麻等風

荆芥穗

蔓荆子

防風

甘草

威靈仙

何首烏

防風

甘草

右件各伍斤搗羅爲末每服壹錢食後溫酒調下沸湯亦得

**橫皮散**治肺藏風毒遍身瘡疥及癰疹癢痒搔之成瘡又治面

上風刺及婦人粉刺

杏仁

荆芥穗

各貳兩

枳殼

枳殼

甘草

右件藥除杏仁外餘藥都搗羅爲末却將杏仁別研令極細

次用諸藥末旋旋入研令勻每服二錢食後溫酒調下日進

三服瘡疥甚者每日頻服

**大嶽活血丹**治男子婦人外傷內損狗咬蟲傷驢撲馬隊手足

傷折一切疼痛腹中瘀血刺脇築心及左癱右緩走疰疼痛癰

腫痔漏婦人冷氣入腹血脈不通產後敗血灌注四肢次妹腫

痛血氣撮痛並宜服之

亂髮燒

亂髮燒

栗楔

栗楔

皂角刺

大黑豆

大黑豆

花桑枝

花桑枝

草麻仁

草麻仁

乳香

乳香

細墨

細墨

右陸味爲末入乳香膏內和杵三件卞圓如彈子大如乳香

膏少更入醋煮麩糊痛甚者每服壹圓輕可者服半圓用無

灰酒壹盞乳香壹豆大先磨香盡次磨藥盡煎三五沸臨卧

溫服以痛處就床卧如欲出汗以衣被蓋覆仍用藥塗磨損

痛處就床卧如欲出汗以衣被蓋覆仍用藥塗磨損

歲忌一切動風物應婦人諸疾服者更用當歸末壹錢依法煎服有孕者莫服

**玉龍膏** 摩風止痛消腫化毒治一切傷折瘡腫

栝樓大者壹兩去皮 黃蠟壹兩半 白芷淨煉坐半兩 麻油前頁者

麝香壹錢 松脂壹錢半 零香 藿香各壹兩

杏仁去皮尖 升麻 黃芪 赤芍藥

白及 白欬 甘草淨煉各壹分

右以油浸柒日却北出油先煉令香熟放冷入諸藥慢火煎黃色用絹濾去滓入銀石鍋內入蠟并麝香松脂熬少時以堯合器盛每用少許薄攤絹帛上貼若頭面風癬痒瘡腫疼痛並塗之令熱頻頻用之如耳鼻中肉鈴用紙捻子每日點之至壹月即愈如治灸瘡及小兒疔瘡塗之兼滅癩痕神效

**治一切金刃箭鏃傷中及打撲傷損猫狗咬傷或至死者急於傷處搽藥其血化為黃水再搽藥便活更不疼痛如**

內損血入藏腑熱煎童子小便入酒少許調壹大錢服之立效若牛舐腸出不損者急內入細絲桑白皮尖茸為線縫合肚皮縫上搽藥血止立活如無桑白皮用生麻縷亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後搽藥婦人產後敗血不盡血迷血運惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭暖急以童子小便調壹錢取下惡物如猪肝片終身不患血風血氣若膈上有血化為黃水即時吐出或隨小便出立効

硫黃上色明淨者搽 花蕊石搗為末

右貳味相伴令勻先用紙筋和膠泥固濟瓦罐子壹箇內可容藥候泥乾入藥內密泥封了焙籠內焙乾令透熱便安在四方磚上鋪上書八卦五行字用炭壹秤籠疊周匝自己午時從下生火令漸漸上徹有煙下火旋夾火上直至經宿人冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研以絹羅子羅至細

盛依前法使用

# 五行八卦之圖



**化毒排膿內補十宣散** 亦名折裏 治一切癰疽瘡癤未成者速散已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不犯刀仗服藥後疼痛頓減其効如神

**黃芪**

以綿上來者為勝半寸截破破絲擊以鹽湯潤透用盞盛蓋湯餅上一

**人參**

以新羅者為上擇團結重實滋潤者洗淨去蘆切焙乾用

**當歸**

取用中來者溫水洗薄切焙乾用油出各去兩

**厚朴**

用拉間者肉厚而之紫指之油出各去兩

**桔梗**

以有心味苦者為真無心味甘者養也主

**桂心**

用卷薄者古法帶皮桂每兩取三錢半合用

**芎藭**

以川中來者為上今多

**防風**

有新香者

**甘草**

生用

**白芷**

各壹兩

**桑降聖丹** 治打撲閃肋筋斷骨折攣急疼痛不能屈伸及禁

右拾味選藥貴精皆取淨曬焙極燥方秤除桂心外壹處搗羅為細末入桂令勻每服自參錢加至伍陸錢熱酒調下日夜各數服以多為妙服至瘡口合更服尤佳所以補前損杜後患也不飲酒人濃煎木香湯下然不若酒力之勝也或飲酒不多能勉強間用酒調并以木香湯解酒功效當不減於酒也大抵癰疽之作皆血氣凝滯風毒壅結所致治之不早則外壞肌肉內攻藏腑其害甚大纔覺便服倍加服數服之醉則其効尤速發散風毒流行經絡排膿止痛生肌長肉藥性平和老人小兒婦人室女皆可服之



衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩縱皮肉刺痛肩背拘急身體倦怠四肢少力

自然銅火煨醋淬格去火川烏頭生去皮骨碎補鹽去毛

白芍藥別研沒藥別研乳香別研當歸各乙兩

生乾地黄 川芎各乙兩半

右並生用為細末以生薑自然汁與蜜等分煉熟和圓每壹兩作肆圓每服壹圓旋碎水酒各半盞入蘇木少許同煎至八分去蘇木熱服空心食前

**千金烏頭湯**治癰疽發背丹毒惡腫時行熱毒發作赤色瘰癧初發頭目赤痛暴生障翳吹妳腫痛一切無名惡瘡雖覺所苦細微不可輕慢急服此藥並皆內消更不成膿若發背癰疽已成膿者當排日服之直至膿盡

漏蘆去蘆 麻黃去根節 升麻剉 赤芍藥生剉

黃芩去皮 甘草生剉 白欬淨洗 白及去鬚

枳殼米泔浸乙宿去白 生大黃乙十五兩

右咬咀每服肆錢水貳盞煎至壹盞紗帛濾去滓空心食前熱服以快利為度病人更自量增減服之立効

**滑肌散**治風邪客於肌中渾身瘙痒致生瘡疥及脾肺風毒攻衝偏身瘡疥皴裂乾濕發瘡日久不瘥並皆治之

前草七兩 輕粉乙錢

右為細末瘡濕用藥乾搽瘡乾用麻油調藥傅之

**神效疔瘡散**治癰疽發背腸癰妳癰無名腫毒痂作疼痛增寒壯熱類若傷寒不問老幼虛人並皆治之

忍冬草去梗 黃芪各五兩 當歸乙兩 甘草剉錢

右為細末每服貳錢酒壹盞半煎至壹盞若病在上食後服病在下食前服少頃再進第貳服留滓外傳未成膿者即消已成膿者即清

**紅玉散**治瘡口生肌肉止疼痛去惡水不問日近年深並治之

寒水石炭火燒通并候冷 黃丹半兩

右同研細乾搽瘡口內後用萬金膏貼每日乙上再土尤妙

**萬金膏** 治癰疽發背諸般瘡癤從高墜墮打撲傷損脚膝生瘡  
遠年賺瘡五般痔漏一切惡瘡並皆治之

龍骨 鱉甲 苦參 烏賊魚骨

黃蘗 草烏頭 黃連 猪牙皂角

黃芩 白斂 白及 木鱉子仁

當歸洗焙 厚朴去蘆皮 川芎 香白芷

沒藥別研 槐枝並同別研

乳香別研 黃丹乙兩半 清麻油俾兩冬月用半斤

右除黃丹外銀石器中將諸藥於油內慢火煎紫赤色去藥  
不用却入黃丹壹半放油內不住手攪令微黑更入餘黃丹  
不住手攪須是慢火熬令紫黑滴在水上不散及不黏手然  
後更別入黃丹少許再熬數沸如硬時却更入油些小以不

黏手為度用時量瘡大小攤紙上貼之

**接骨散** 治從高墜下馬逐傷折筋斷骨碎痛不可忍接骨續筋  
止痛活血

定粉 當歸 各乙分 鵬砂 乙錢半

右為細末每服貳錢煎蘇木湯調下服訖後時時喫蘇木湯  
**急風散** 治父新諸瘡破傷中風項強背直腰為反折口噤不語  
手足抽掣眼目上視喉中沸聲

丹砂 乙兩 草烏頭燒存性於米醋內淬令冷

麝香研 生烏豆同草烏乙分

右為細末和勻破傷風以酒壹小盞調半錢神効如出箭頭  
先用酒壹盞調服半錢却以藥貼箭瘡上

**油** 治濕疥侵淫流清遍體大作癩疥搔之水出小如  
粟粒痒痛難任肌膚濕潤經久不差

膩粉 硫黃研細

右為細末研勻以生油調藥塗之

**治重物壓逐或從高墜下作熱五內吐血下血出不禁**  
止或痰血在內曾腹脹滿喘麤氣短

當歸

大黃

右等分炒為末每式錢溫酒調下不計時候

**治肺藏風毒攻發皮膚血氣凝澁亦生疥癩瘙痒搔之**  
皮起作痂增展侵引連滯不差活血脈潤皮膚散風邪止瘙痒

蛇床子 半兩

黃連 去鬚

胡粉 結砂子

水銀 胡粉粉點水

右件藥以生麻油和稀滑每用藥時先以鹽漿水洗瘡令淨  
後以藥塗之乾即便換不過三五度差

**治癰疽瘡癤膿潰之後外觸風寒腫炊結硬膿水清稀**  
出而不絕內膿空虛惡汁臭敗瘡邊乾急好肌不生及療疔瘰  
惡瘡連滯不差下疔腫瘡侵潰不斂

檳榔

黃連 去鬚

木香 各等分

右為細末每用乾貼瘡上

**治小兒丹毒肉色變異或着四肢或在背脊遊走不定**  
熱疼痛拔毒消腫散熱定疼

石膏 各兩

甘草

黃蘗 各乙兩 寒水石 七兩

右為細末每用水調時復以雞翎刷掃以芭蕉自然汁調妙  
**治頸項瘰癧及發腋下初如梅子腫結硬強漸若連珠**  
不消不潰或穿穴膿潰肌汁不絕經久難差漸成癭疾並治之

琥珀 乙兩

木通

桂心

當歸

白芷

防風

松脂

朱砂 研

木鼈 去殼

麻油 式斤

丁香

木香 各二

右件藥先用琥珀丁香桂心朱砂木香伍味搗羅為末其餘  
藥並細剉以油浸一宿於鍋中以慢火煎候白芷焦黃瀝出  
次下松脂末瀝去滓再澄清油却安鍋中慢火熬下黃丹壹  
斤以柳木篋不住手攪令黑色滴入水中成珠子不散看硬

軟得所入琥珀等末攪令勻於瓷器內盛之每使時看大小用火煨紙上勻攤貼之

**丹參膏** 治乳腫乳癰毒氣焮作赤熱漸成攻刺疼痛及治乳核結硬不散通順經絡宣導壅滯

丹參

赤芍藥

白芷 各等分

右細剉以酒淹參宿入猪脂半斤微煎令白芷黃色濾去滓入黃臘乙兩每用少許時時塗之

**神效當歸膏** 治湯火傷初起癰將熱毒侵展焮赤疼痛毒氣壅盛腐化成膿斂瘡口生肌肉拔熱毒止疼痛

當歸

黃蠟 各乙兩 麻油 四兩

右件先將油煎令當歸焦黑去滓次入蠟急攪之放冷入瓷合內每使時故帛子攤貼之

**神效膏** 治風邪熱毒客搏皮膚身體生瘡痒痛及大疥作瘡焮赤疼痛侵淫清展肌汁不絕拔熱毒止痛生肌肉斂瘡口神效

猪脂

煉 六兩

松脂 半兩

膩粉

胡粉

黃連

各乙兩

甘草 乙兩

右件藥先以猪脂煎松脂次入黃蠟或兩濾去滓次下膩粉并四味攪勻傾於瓷器中每用藥少許塗之日三四易

**烏蛇膏** 治風邪毒氣外客皮膚黃發成腫所起不定遊走往來時發痒痛或風毒熱盛攻注成瘡焮赤多膿瘡遂緊急但是風腫並皆治之

吳茱萸

藁本

獨活

細辛

白殭蠶 去絲 半夏

漢椒 去目炒 防風

赤芍藥

當歸

桂心

川芎

香白芷 各半 烏蛇

黃蠟 各貳兩 乾蝎

附子 去皮尖 各乙兩

右件細剉以煉臘月猪脂式斤文火煎候白芷赤黑色為度綿濾去滓下臘入瓷器內盛每用取少許摩之令熱日參服

**白皮膏** 治內外諸痔腫核結硬或痒發無時或痛不可忍或肛边生瘡赤爛侵潰或鼠乳附核久不散

槐白皮

棟實 各伍兩

甘草

白芷 各貳兩

赤小豆 貳合

桃仁 陸拾枚

當歸 叁兩

右柴味咬咀以前煎成猪膏壹斤微火煎白芷黃藥成每用摩瘡上日再用

**神效公赤膏** 治八發癰疽一切惡瘡軟癰不問年月深遠已成膿未成膿貼之即效蛇虎蝎犬湯火刀斧所傷並可內服外貼發背先以溫水洗瘡拭乾用帛子攤藥貼仍用水下血氣未通酒下赤白帶下當歸酒下咳嗽喉閉纏喉風並綿裹含化一切風赤眼貼太陽穴後用山梔子湯下打撲傷損貼藥仍用搗皮湯下腰膝痛貼之鹽湯下唾血桑白皮湯下諸漏先以鹽湯洗其諸瘡癤並量大小以紙攤藥貼之並每服壹粒旋圓櫻桃大以蛤粉為衣其藥可收十年不壞愈久愈烈神效不可具述

玄參

白芷

川當歸 去芦

肉桂 去麋皮

大黃

赤芍藥

生乾地黄 各壹兩

右劉用麻油貳斤浸春伍日夏叁日秋柒日冬拾日濾去滓油熬得所次下黃丹壹斤以滴油在水中不散為度

澤蘭 製

附子 炮去皮

當歸 炒

蜀椒 炒去汗

甘草 炙

桂心 各三分

芎藭 陸分

右為細末貳錢溫酒調下日叁服忌海藻菘菜葱猪

**復元通氣散**

治瘡癰癰疽方作煨赤初發疼痛及膿已潰未潰

小腸氣腎攤便毒腰疼氣刺腿膝生瘡及婦人吹妳

舶上茴香 炒

川山甲 剉

南木香 不見火

延胡索 擦去

白牽牛 取

陳皮 去白

甘草 炒

右為細末每服壹大錢熱酒調病在上食後服病在下食前

服不飲酒人煎南木香湯調下

治一切瘡癰癰毒及腸癰背或赤腫而未破或已破而膿血不散渾身發熱疼痛不可堪忍若并治婦人妳癰切毒腫並宜服之

地蜈蚣 赤芍藥 當歸 甘草 各等分

右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時候

升麻湯治瘡疥發於四肢臂髀痛痒不常甚至增寒發熱攻刺疼痛浸淫浮腫又癩風入臟陰下濕痒耳鳴眼痛皆治之

乾薑 熟枳殼 乾葛 熟蒼朮

桔梗 升麻 各乙兩 當歸 熟半夏

茯苓 白芷 各貳錢 陳皮 甘草 各乙兩半

芍藥 柴錢半 大黃 半兩

右為剉散每服肆大錢水壹半姜叁片燈心拾伍葉煎至柒分去滓食前服

五香連翹湯治一切惡核癰癰疽惡腫等病出二因方

沉香 不見火 乳香 不見火 甘草 生 舶上青木香 各乙兩

連翹 去蒂 射干 升麻 桑寄生 无以升

獨活 今補家所賣者只是宿前胡或是生當歸不其用只用羌活活甚妙 木通 去節 各叁分

丁香 不見火 大黃 叁兩 麝香 真者別研 乙錢半

右咬咀每服肆大錢水貳盞煮取壹盞以上去滓取捌分清汁空心熱服半日以上未利再喫壹服以利下惡物為度未生肉前服不妨以折去熱毒之氣有竹瀝芒消恐泥法者不能斟酌故闕之智者當自添減

五香連翹湯方甚多當以三因為正李氏方今併存之

李氏方 用乳香甘草木香沉香連翹射干升麻桑寄生 獨活各叁分丁香白芷兩大便秘者加大黃三分

氏所以不用大黃者蓋恐心虛人老人不用服故臨時加也

乙兩兩酒浸服麝香或分乳香香骨香骨升麻連翹各半兩

太平惠民和劑局方卷之八

# 太平惠民和劑局方卷九

## 治婦人諸疾

外有治療諸方互見各類

**熟乾地黄圓** 治婦人風虛勞冷一切諸疾或風寒邪氣留滯經絡氣血冷澀不能溫潤肌膚或風寒客於腹內則脾胃冷弱不能剋消水穀或腸虛受冷大便時泄或子藏挾寒久不成胎月水不調下多下少或月前月後或淋瀝不止或閉斷不通結聚癥瘕面體少色飲食進退肌肉消瘦百節酸疼時發寒熱漸至羸損帶漏五色陰中冷痛時發腫痒月水將行臍腹先痛皮膚皴澀癢疹癢痒麻痺筋攣面生黧黧髮黃脫落目淚自出心忪目眩及產後勞損未復肌瘦寒熱顏色枯黑飲食無味漸成羸勞並皆療之

熟乾地黄酒浸 五味子揀淨 栝子仁微炒 芎藭各壹兩半

澤蘭去梗 禹餘糧火燒 細辛去苗 防風去蘆

肉苁蓉酒浸 白茯苓去皮 厚朴去蘆 白芷

乾薑炮 山藥去蘆 細辛去苗 卷栝去根

當歸酒浸 藁本去蘆 甘草炙 蜀椒去目及閉口

牛膝去苗 人參續斷 艾葉炒 蛇床子揀淨

蕪荑炒 杜仲去蘆 艾葉炒 赤石脂煨醋

石膏煨研 肉桂去皮 石斛去根 白朮各壹兩 紫石英煨醋

右件藥搗羅為末煉蜜和搗伍柒百杵圓如梧桐子大每服參拾圓溫酒或米飲下空心食前服常服養血補氣和順榮衛充實肌膚調勻月水長髮駐顏除風去冷令人有子溫平不熱無毒妊娠不宜服之

**澤蘭圓** 治產後勞傷胸臆虛羸未腹氣血不調胃體瘦弱困乏少力面色萎黃心常驚悸多汗嗜卧飲食不進產後百日内每日常服壯氣益血暖下藏進飲食

黃耆

澤蘭去梗

牛膝去苗 人參去蘆

赤石脂煨各

附子炮去

木香

藜蘆

白茯苓去皮

續斷各參分

肉桂去蘆皮

芍藥

白木

乾薑炮

當歸去蘆

甘草炙

熟乾地黄淨洗酒蒸

右為末煉蜜圓如梧桐子大每參拾圓温米飲下空心食前

**鍾乳膠圓**

補虛羸益血氣治衝任虛損月水不調臍腹疝痛

腰腿沉重四肢倦怠百節酸疼心忪恍惚憂恚不樂面少光澤

飲食無味除下藏風冷治帶下三十六疾崩中漏下五色子宮

久冷無子及數墮胎或因產勞損衝任血氣虛羸肌瘦嗜卧久

服補暖元藏潤澤肌膚長髮去野除頭風令人有子

鍾乳粉參兩

澤蘭二兩

蕪荑炒

麥門冬去心

山茱萸去蘆

艾葉炒

防風去蘆

栝子仁炒

人參去蘆

石膏研

石斛去根

熟乾地黄酒蒸

芎藭

甘草微炙

牛膝去蘆

白芷

山藥

當歸去蘆

桑本

細辛不見火

肉桂去蘆

右為細末煉蜜和為圓如梧桐子大每服參拾圓至伍拾圓

温酒或米飲下空心食前日貳服

**人參刺芥散**

治婦人血風勞氣身體疼痛頭昏目澀心忪煩倦

寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽曾滿精神不爽或月水不調臍腹疝

痛痠癢塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進或因產將理失節

淹延瘦瘵乍起乍卧甚即着床

荆芥穗

荊羊角燒

酸棗仁微炒

生乾地黄

枳殼炒

人參

鼈甲炙

肉桂去蘆皮

白木

柴胡各

甘草炙

芎藭

赤芍藥

牡丹皮

當歸

防風去苗

右為籠末每服參錢水壹盞半生薑參片煎至糊分去滓熱



附子

炮去皮

黃耆

去芦 各參三分

右為麤散每服肆錢水壹盞半入生薑半分棗叁枚擘破煎至壹盞濃去滓食前溫服

**安息香丹** 治衝任不足下焦火寒臍腹疝痛月事不勻或來多不斷或過期不來或崩中去血或帶下不止面色痿黃肌肉瘦瘁肢體沉重胃腸脹滿氣力衰乏飲食減少一切血氣虛寒並宜服之

吳茱萸

湯浸洗去毒

安息香

搗碎入好酒研盡濃去滓

栝子仁

炒

山茱萸

去核

延胡索

去皮

桃仁

去皮尖大麥炒

虎杖

各貳拾

當歸

葉

杜仲

去皮

附子

炮去皮脐

木香

各貳拾

澤蘭

葉

乾薑

炮

肉桂

去皮

艾葉

微炒

黃耆

去蘆

牡丹皮

各式

肉蓯蓉

酒浸焙

厚朴

去皮薑汁炙令熟

右為細末以前安息香膏入白麵同煮作糊和圓如梧桐子

大每服叁拾圓食前以溫酒下醋湯亦得

**吳茱萸湯** 治婦人藏氣本虛宿挾風冷留滯滿痛腹脇疝刺嘔吐惡心飲食減少身向虛浮惡寒戰慄或泄痢不止少氣羸困及因而生產藏氣暴虛邪冷內勝疝疾轉甚並皆治之

桔梗

去苗

防風

去苗

乾薑

炮

甘草

炙

當歸

去苗

細辛

去苗

熟乾地黄

各參三分

吳茱萸

湯洗洗去水

食前

**伏龍肝散** 治氣血勞傷衝任脉虛經血非時忽然崩下或如豆

汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝

即龍中上也

赤石脂

各壹兩

熟乾地黄

壹兩

艾葉

微炒

甘草

炙

肉桂

去皮

當歸

去苗

乾薑

炮

芎藭

各參分

麥門冬

去心

各壹兩

服不拘時日貳服常服除一切風虛勞宿病有孕不宜服  
**治婦人衝任本虛少腹挾寒或因產勞損子藏風寒**  
搏於血氣結生瘕聚塊硬發歇臍腹刺痛脇肋緊脹腰膝疼重  
拘攣腫滿背項疆急手足麻痺或月水不調或瘀滯澀閉或崩  
漏帶下少腹冷疼寒熱盜汗四肢酸痛面色痿黃多生野黴羸  
乏少力心多驚悸不欲飲食

延胡索

縮砂仁各半兩

赤芍藥

牡丹皮

各壹兩

山茱萸

乾薑炮各半兩

龍骨細研水飛

熟乾地黄

酒浸

檳榔

羌活各貳兩

藁本去土

五味子

人參

白芷

當歸去芦酒浸

乾山藥

澤瀉

續斷細者

肉桂去蘆皮

白茯苓

白朮

附子去皮臍

木香

牛膝

去苗酒浸壹

草薢炮為末炒熟各壹兩

石斛去根酒浸各壹兩

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服貳拾圓至參拾圓温

酒或醋湯下空心食前日貳服妊娠不宜服

**治婦人血氣不調腑藏怯弱風冷邪氣乘虛客搏臍腹**  
冷疼脇助時脹面色痿黃肌體羸瘦怠惰嗜卧不思飲食常服  
補虛損暖下藏逐癩冷進飲食

沉香

莪朮

訶梨勒煨去核

椒紅

微炒出

當歸去芦酒浸微炒

附子炮去皮臍

白朮各壹兩

麝香壹分別研

丁香

肉豆蔻炮

高良薑去芦麻油炒各半兩

右為細末入麝香勻酒煮麵糊圓如梧桐子大每服參拾圓  
用温酒下空心食前

**治婦人勞傷血氣腑藏虛損風冷邪氣乘虛客搏**  
肢體煩痛頭目昏重心多驚悸寒熱盜汗羸瘦少力飲食不進

丹參去芦頭

防風去蘆義

當歸去芦微炒

細辛去苗

藁本去芦洗

芎藭各半兩

人參

熟乾地黄

酒浸

白茯苓去皮

肉桂去蘆皮

白朮各壹兩

續斷

右為薤散每服肆錢水壹盞半入棗參枚擘破煎至七分去滓食前溫服

**治衝任虛損月候不調或來多不斷或過期不來或崩血過多不止又治曾經損娠瘀血停留少腹急痛發熱下利手掌煩熱唇乾口燥及治少腹有寒久不受胎**

阿膠

蛤粉炒

當歸

去蘆

人參

肉桂

去蘆皮

甘草

炒

芍藥

牡丹皮

各貳兩

半夏

湯洗

吳茱萸

湯洗

柴胡

炒

麥門冬

去心

右為薤末每服參錢水壹盞半入生薑伍片煎至捌分去滓熱服空心食前服

**治婦人帶下久虛胞絡傷敗月水不調漸成崩漏氣血虛竭面黃體瘦臍腹裏急腰膝疼重肢體煩痛心忪頭眩手足寒熱不思飲食**

桑寄生

栝葉

當歸

去蘆

厚朴

去蘆皮

乾薑

炮

白朮

醋浸

鼈甲

去

附子

去皮

禹餘糧

白石脂

各兩

狗脊

去毛

白芍藥

各參分

吳茱萸

湯洗

柴胡炒

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服參拾圓溫酒或米飲下空心食前服

**治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪煩赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦斬成骨蒸**

甘草

湯洗

當歸

去蘆

茯苓

去皮

芍藥

白朮

柴胡

去蘆

右為薤末每服貳錢水壹大盞燒生薑壹塊切破薄荷少許同煎至七分去滓熱服不拘時候

**補調衝任溫暖子宮治胞絡傷損宿受風寒久無子息**

或受胎不牢多致損墮服去下藏風冷令人有子

秦椒去目及開口者 熟乾地黄

當歸去芦剉 薑黃各壹兩 牡蒙

禹餘糧炒 醋碎朱通研 人參 栝子仁微炒

桑寄生 附子炮去 肉桂去麋皮 五味子去核

吳茱萸湯浸 石斛去根 甘草炙微赤 牛膝去苗酒浸

防風去苗 芎藭各壹兩

右為細末入研藥勻煉蜜圓如梧桐子大每服參拾圓至伍拾圓温酒或米飲下空心食前服纔覺妊娠即住服已懷孕者尤不宜服之

**小兒白帶** 治婦人衝任虛損子藏受寒久無子息及斷續不產

此因上熱下冷百病滋生或月水崩下帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因產乳不能將護路則太早或久坐濕地並冷風從下入血藏既虛風邪內乘或月水當行失於調攝傷動胞絡陰

陽不和上焦虛陽壅燥下藏邪冷結伏致使胎孕不成冷極傷敗月水不勻飲食減少夜多盜汗面生黧黯齒搖髮落脚膝疼重舉動少力並宜服之

覆盆子去梗 芎藭微炒 白龍骨 熟乾地黄

川椒去目及閉口者微炒 白薇各壹兩 蛇床子炒

乾薑炮 細辛去苗 當歸去苗 車前子

芎藭各半兩 遠志去心 桃仁去尖 白茯苓去皮

藁本去苗 人參 卷栢去根 白芷

肉桂去麋皮 麥門冬去心

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服參拾圓温酒或米飲下空心食前常服壯筋骨益血氣暖下藏除風冷令人有子

**藥石英圓** 治婦人久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損

胞內宿寒疾病經水不時暴下不止月內再行或月前月後及子藏積冷虛羸百病崩漏帶下參拾陸疾積聚癥瘕臍下冷痛

牡蠣海粉 白朮

芎藭各肆分 獨椒去目及

右并為散每服貳錢溫酒調服空心食前

**艾湯** 治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝漏下連日不斷  
臍腹疼痛及妊娠將攝失宜胎動不安腹痛下墜或勞傷胞絡  
胞阻漏血腰痛悶亂或因損動胎上搶心奔衝短氣及因產乳  
衝任氣虛不能約制經血淋瀝不斷延引日月漸成羸瘦

阿膠碎炒燥 芍藥

甘草炙 當歸

艾葉微炒 白芍藥

熟乾地黄各肆兩

右為釐末每服參錢水壹盞酒陸分煎至捌分瀝去滓稍熱  
服空心食前日參服甚者連夜併服

**養胎益血安和子藏** 治妊娠將理失宜或因勞役胎動  
不安腰腹痛重胞阻漏胎惡露時下子藏快疾久不成胎或受  
妊不能固養痿燥不長過年不產日月雖滿轉動無力或致損  
墮及臨產節適宜驚動太早產時未至惡露先下胎胞枯燥  
致令產難或橫或逆痛極悶亂連日不產子死腹中腹上冰冷  
口唇青黑吐出冷沫新產惡血上衝運悶不省喘促汗出及瘀  
血未盡臍腹疼痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面黃體瘦  
心忪盜汗飲食不進漸成羸勞入月常服壯氣養胎正順產理  
潤胎易產產後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實腑藏治風  
虛除痼冷

大麻仁去殼 貝母

黃芩 大豆黃卷

粳米

甘草微炙赤 乾薑炮

肉桂去麩皮

石斛去根

石膏細研 當歸土壹盞炒

秦椒微炒

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服壹圓並用溫酒或棗湯  
化下藥亦得空心食前服

**滑胎易產** 治妊娠曾因漏胎去血或臨產驚動太早  
產時未至穢露先下致使胎胞乾燥臨產艱難並宜服之

冬葵子

榆白皮

瞿麥各壹兩 木通半兩

白芍藥

食茱萸

厚朴

去麤皮薑汁炙

右件搗羅為末煉蜜為圓每壹兩貳錢分拾圓每服壹圓食前當歸酒研下

**半夏茯苓湯**

治妊娠惡阻心中憤悶頭目眩暈四肢怠墜百節煩疼曾身痰逆嘔吐惡心嫌聞食氣好致鹹酸多卧少起食不進食

旋復花

陳皮

桔梗

白芍藥

人參

甘草

芎藭

熟乾地黄

赤茯苓

去皮

半夏

湯洗十遍切焙

右為麤末每服貳錢水壹盞半生薑肆片同煎至捌分去滓稍熱服食前服次服茯苓圓即痰水消除便能食

**六神圓**

治妊娠阻病心中煩憤頭目眩暈憎聞食氣嘔逆吐悶顛倒不安四肢困弱不自勝持常服此藥消痰水令能食強力養胎當先服半夏茯苓湯次進此藥

葛根

枳實

白朮

甘草

赤茯苓

去皮

人參

乾薑

炮

肉桂

去麤皮

陳皮

半夏

湯洗茶過去滑切焙

右為細末煉蜜和為圓如梧桐子大每服叁拾圓温米飲空心下食前服

**催生丹**

治產婦生理不順產育艱難或橫或逆並宜服之神效

麝香

別研

乳香

別極極

母丁香

取末

兔腦

臘月者去

右拌勻以免腦和圓如雞頭穰大陰乾用油紙密封貼每服壹圓温水下即時產下隨男左女右手中握藥圓出是驗

**白帶湯**

治產後去血過多運悶不省及傷胎去血多朋中去血多金瘡去血多按牙齒去血多不止懸虛心煩眩暈頭重目暗耳聾滿塞舉頭欲倒並皆治之

當歸

去麤皮

芎藭

各四分

右為散每服叁錢水壹盞半煎至壹盞去滓稍熱服不拘時

頭痛惡心經脈不調赤白帶下乳生惡氣胎藏虛冷數曾墮胎崩中不定因此成疾室女經脈不並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏色退風冷消除萬病兼療丈夫五勞七傷虛損等病

澤蘭葉

石膏研各二兩

卷栢去根

白茯苓去皮

防風去蘆

厚朴去麩皮炙

細辛去苗

栢子仁微炒

桔梗

吳茱萸湯洗去核炒

乾薑炮

五味子揀淨

人參

藥本去苗

乾薑炮

川椒去目開口者微炒出泥

白芷

白木

黃芪去苗

川烏炮去皮臍

丹參各三分

蕪荑微炒赤

甘草炙

川芎

芍藥

當歸各一兩三分

白薇

阿膠碎炒燥

肉桂分一兩一分

生乾地黄一兩半

右為細末每服貳錢空心臨卧熱酒調下若急疾有患不拘時候日參服

**黑神散**治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胃痞滿或癰

腹堅脹撮疼及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾並皆治之

黑豆炒半升

熟乾地黄酒浸

當歸去蘆酒製

肉桂去蘆皮

乾薑炮

甘草炙

芍藥

蒲黃各四兩

右為細末每服貳錢酒半盞童子小便半盞同煎調下急患不拘時候連進貳服

**神效散**治婦人血風勞形容憔悴肢節困倦喘滿虛煩喑喑少氣發熱汗多口乾舌澀不思飲食

五加皮

牡丹皮

赤芍藥

當歸去蘆各一兩

右為末每服壹錢水壹盞將青銅錢壹文蘸油入藥煎采分溫服煎不得攪喫不得吹日參服常服能肥婦人其効妙甚

**滋血湯**治婦人勞傷過度致傷藏府衝任氣虛不能約制其經血或暴下謂之崩中或下鮮血或下瘀血連日不止淋瀝不斷

形羸氣劣倦怠困乏並能治之又方見後

赤石脂火煨 海螵蛸去殼 側柏去枝

痛煮糯米飲下寒熱往來四肢煩疼煎青蒿酒下婦人室女  
經血不通煎紅花酒下血暈不省人事童子小便和暖酒下  
催生雞子清和酒下血氣血塊攻刺心腹燒秤錘洋酒下傷  
寒及中風口噤煎麻黃湯下用被蓋出汗即愈心驚悸及頭  
疼薄荷酒下咳嗽煎桑白皮湯下血風攻注渾身癢痒頭面  
麻痺炒黑豆浸酒下產前產後常服不生諸疾神效

**安胎散** 治妊娠三月四月至九箇月惡阻病者心中憤悶頭重  
目眩四肢沉重懈怠不欲執作惡聞食氣欲啖鹹酸多睡少起  
嘔逆不食或胎動不安非時轉動腰腹疼痛或時下血及妊娠  
一切疾病並皆治之 又方見後

地榆 微炙赤 茯苓 去皮 熟乾地黄 洗酒酒

當歸 去蘆洗 川芎 白 白木 半夏 湯洗柒次

阿膠 炒碎 黃芪 去苗 白藥 各等分

右為麤散每服參錢水壹盞半煎至例分去滓溫服不拘時

如或惡食但以所思之物任意與之必愈按妊娠禁忌勿食  
雞鴨子鯉魚膾兔犬驢驘山羊肉魚子鱉卵雉雀桑椹又按  
胎教論云令母常居靜室多聽美言聽人講論詩書陳說禮  
樂耳不聽非言目不視惡事心不起邪念能令生子居厚福  
壽忠孝仁義聰明無疾斯乃聖人所留教論故隨方狀以書

**神仙散** 治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散積聚成塊

或成堅瘕及血氣攻注腹脇疼痛小腹急脹或時虛鳴面色痿  
黃肢體浮腫經候欲行先若重病或多或少帶下赤白崩漏不  
止驚悸健忘小便頻數或下白水時發虛熱盜汗羸瘦此藥不  
問胎前產後室女並宜服之常服安心神去邪氣逐敗血養新  
血令人有子

沒藥 別研 琥珀 別研 木香 煨令取 當歸 洗焙取末

辰砂 別研 麝香 別研 滴乳香 別研

右研令細和停滴冷熟水搗為圓每壹兩作壹拾伍圓每服



或當歸酒下貳拾圓食前服

**治產後一切血疾淋露不快兒枕不散積癥堅聚**  
按之攬手疼痛攻心困頓垂死者但灌藥無有不効驗不可言

五靈脂去沙 當歸去蘆 川芎  
乾地黄生者 良薑

已上各等分入沙合內赤石脂泚縫紙筋鹽泥固濟封  
合炭火拾斤煨通紅去火候冷開取合子看成黑糟乃  
取出細研入後藥 一本云用椽頭沙合

花乳石煨 琥珀研 乳香別研 硫黃研  
百草霜別研 各壹分半

右同為細末米醋煮糊圓如彈子大每服壹圓炭火燒通紅  
投生薑自然汁與無灰酒各壹合小便半盞研開頓服立効

**治婦人血氣久冷無子及數經墮胎皆因**  
衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行

或前或後或崩中漏下參拾陸疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白  
濁以上疾證皆令孕育不成以至絕嗣治產後百病百日内常  
服除宿血生新血令人有孕及生子充實亦治男子亡血諸疾

秦艽 石斛去根酒 藁本去蘆 甘草炙  
蠶布燒灰 桔梗各貳兩 京墨煨醋 茯苓去皮

人參去蘆 木香炮 桃仁去皮 熟乾地黄洗過  
香附炒去毛 澤蘭去便 當歸去蘆 肉桂去皮

乾薑炮 細辛去苗 川芎 牡丹皮各壹兩半  
山藥 川椒去目炒 蒼朮洗去 大豆黃卷炒

糯米炒 山藥川椒各云參兩  
右為細末煉蜜搜每兩作陸圓每服壹圓細嚼空心食前溫  
酒醋湯任下

**治產婦一切疾病產前胎死產難橫生逆生產後抱**  
衣不下衣帶先斷遍身疼痛口乾心悶非時不語如血暈眼花

大同煎至柒分去滓服之

**琥珀圓**治婦人或老或少產前產後百病及瘵三十六種血冷七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風十二痺等手足酸疼乳中毒結瘀血懷胎驚動傷犯不安死胎不出并衣不下並宜服之

琥珀 研

辰砂 別研

沉香

阿膠 碎炒

肉桂

去麋皮

石斛 去根

附子

炮去皮

五味子 揀淨

川芎

各半兩

牛膝 去苗酒浸壹宿

當歸

去苗炒

肉苁蓉 切酒浸壹宿焙

人參

續斷

沒藥

研各叁分

熟乾地黄

木香 各壹兩

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓空心暖酒調下午晚食前再服能生精血去惡血若人腹脇疼痛繞臍如刀刺及嘔逆上氣築心痰毒不思飲食用薑汁少許和酒服諸痢及赤白帶血冷崩中下血漏胎下血用生薑與艾剉炒令赤

色入酒同煎數沸去滓調服洩瀉不止陳米飲服澁尿諸淋煎通草燈心湯服血運不知人煎當歸酒調服上焦下冷瀉煎人參湯服徧身虛腫水氣煎赤小豆湯服產內二毒傷寒及中風角弓反張身如板硬煎麻黃湯服使被蓋出汗月經不通或間雜五色頻併而下斷續不止飲食無味肌膚瘦劣面赤唇焦乍寒乍熱四肢煩疼丑心燥熱黑黥徧身血斑赤腫走疰及血風勞傷無力用童子小便入薑汁少許調服常服以小便為妙若恐惡心和以半酒如懷胎人於難月壹日壹服至產下不覺疼痛或病人服至伍服拾服日倍飲是藥功成矣其功不能具載略述急用湯使于前

**血圓**治婦人血海虛冷百病變生氣血不調時發寒熱或下血過多或久閉不通崩中不止帶下赤白癥瘕癱塊攻刺疼痛小腹緊滿脇肋脹痛腰重脚弱而黃體虛飲食減少漸成勞瘵及經脈不調胎氣多損產前產後一切病患無不治療

延胡索

木香

琥珀

熟乾地黄洗焙

肉豆蔻

草果

各半兩

右細剉用烏雄雞壹隻湯擇去毛及腸肚將上件藥安放雞肚中用新菟餅好酒壹斗同煮令乾去雞骨以油單盛焙乾為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服叁拾圓胎前產後傷寒蜜糖酒下胎前氣悶壯熱炒薑酒下赤白帶下生薑地黃煎酒下產後敗血疰心童子小便炒薑酒吞下產後血塊癩瘰心腹疼痛懸胡索酒下胎前嘔逆薑湯下催生炒芍藥子酒下安胎鹽酒下室女紅脉當通不通四肢疼痛煎紅花酒下血氣攻刺心腹疼痛煎當歸酒下血暈椶櫚燒灰酒調吞下血邪研朱砂麝香酒下血悶煎烏梅湯研朱砂下子宮久冷温酒或棗湯下空腹日壹服血風勞人參酒吞下小腹疔痛炒茴香鹽酒下血散四肢遍身虛浮黃腫赤小豆酒下常服温酒醋湯任下並空心食前服

**白聖丹**

治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡風怯寒以逆煩滿抑急短氣心脇腰背腹肚與子藏相引痛漏下五色心常恐懼遇恚怒憂勞即發皆是內傷所致並皆治之

牡蠣

煨研

白聖

細辛

去苗

禹餘糧

煨醋研

烏賊魚骨

燒灰

白石脂

煨

龍骨

煨研各壹兩半

瞿麥穗

附子

炮去皮臍

芍藥

石韋

去毛

白斂

黃連

去鬚

茯苓

去皮

肉桂

去麋皮

白芷

當歸

去苗

乾薑

炮

人參

甘草

炙各壹兩

川椒

去自及閉口者炒出汗

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓至伍拾圓空心温酒下

**暖宮圓**

治證與前暖宮圓同

沙參

淨洗

地榆

黃芪

桔梗

白薇

酒浸

牛膝

酒浸

杜仲

去麋皮

厚朴

去麋皮

葉本去苗 白薑炮 甘草炙赤 吳各參兩 木更 湯先 茶次

紅花各半兩

右為末煉蜜搜和杵數斤下圓如彈子大每服壹圓血瘦塊痛綿灰酒下血氣痛炒白薑酒下血勞血虛枯瘦酒下血崩搜攔灰酒下血氣痛炒白薑酒下血風荆芥酒下血暈悶絕胎死腹中胞衣不下並用生地黄汁童子小便酒各壹盞煎或沸調下常服醋湯溫酒化下並空心食前服

**人參養血圓**

治女人稟受怯弱血氣虛損常服補衝任調血脉宣壅破積退邪熱除寒痺緩中下堅脹安神潤燥色通氣散悶兼治婦人懷身腹中絞痛口乾不食崩傷眩暈久產出月羸瘦不復常者

烏梅肉參兩 熟乾地黄伍兩 當歸去苗 人參

川芎 赤芍藥 芎藭微炒

右為細末蜜搜杵數斤下圓如梧桐子大每服伍拾圓至百

圓溫酒米湯下食前服

**養血散**

治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪煩赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏月事不利臍腹脹痛寒熱如瘧又治室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

乾漆炒 蘇木 鬼箭 蓬莪木炮

甘草半盞湯 當歸 桂心 牡丹皮

芍藥 陳皮去白 紅花 延胡索炒

沒藥別研令 烏藥各壹兩

右為末每服貳錢水壹盞煎至柒分不拘時候

**紅花當歸散**

治婦人血藏虛竭或積於血經候不行或斷續不定時作腹痛腰膝疼重攻刺小腹緊硬室女月經不通並宜服

劉寄奴草 當歸去蘆 牛膝酒浸 桂草 蘇木各壹兩 赤芍藥各兩

紫葳

紅花

蘇木

赤

芍藥

**治產後腸胃虛怯寒邪所侵** 凡產後月餘冷當風乘虛  
襲留於盲膜散於腹脇腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水  
穀不化洞瀉腸鳴或下赤白眩脇腹脹或走痛不定急宜服之

當歸

肉桂

川芎

白芍藥

附子炮

良薑

甘草

右為剉散每服參錢匕水參盞煎至壹盞去滓熱服

**旋覆湯**

治產後傷風感寒暑濕欬嗽喘滿痰涎壅塞坐卧不寧

旋覆花

五味子

前胡

蘇黃

赤芍藥

半夏麩

杏仁

茯苓

甘草

荆芥

去梗

右各等分為麩末每服肆大錢水壹盞半薑伍片棗壹枚煎

至柒分去滓食前服

**黑龍丹**

治證品味與前琥珀黑龍丹同

**人參當歸散**

治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱內熱

曰煩其證心胃煩滿吸吸短氣頭痛悶亂骨節疼痛喘時輒甚  
與大病後虛煩相類急宜服之

乾地黄

人參

當歸

肉桂

麥門冬

各壹兩  
去心

白芍藥

貳兩

右為麩散每服肆大錢水貳盞先將粳米壹合淡竹葉拾片

煎至壹盞去米葉入藥并棗參枚煎柒分去滓食前服地黄

宜用生乾者虛甚則用熟者

**當歸養血圓**

治產後惡血不散發歇疼痛及惡露不快臍腹堅

脹兼室女經候不勻赤白帶下心腹腰脚疼痛

當歸

牡丹皮

赤芍藥

延胡索

各貳兩  
炒

肉桂

壹兩

右為細末蜜圓如梧桐子大温酒米飲下參拾圓食前温服  
痛甚細嚼嚥下

**四神散**

治產後留血不消積聚作塊急切疼痛猶如遁尸及心

半夏湯洗桔梗炒

細辛去苗吳茱萸湯洗

右為麤末每服肆錢水壹盞半煎柴分去滓食前熱服

**乾地黃湯**

治產後虛渴不止少氣脚弱眼昏頭眩飲食無味

熟乾地黃淨洗酒浸蒸焙人參參兩麥門冬去心

括樓根肆兩甘草半兩

右為剉散每服肆錢水貳盞糯米壹撮生薑參片棗參枚煎柴分去滓食前服

**阿膠枳殼圓**

治產後虛羸大便秘澀

阿膠碎炒枳殼浸去穢炒滑石研飛為衣

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服貳拾圓溫水下半日來未通再服

**失笑散**

治產後心腹痛欲死百藥不効服此頓愈

蒲黃炒香五靈脂酒研淘去砂土

右先用醞醋調貳錢熬成膏入水壹盞煎柴分食前熱服

**續命四物湯**

治婦人氣血不足四肢惰怠乏力少氣瘵

治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和乍寒乍熱並皆服之

當歸 川芎 人參 乾薑炮

甘草炙 白芍藥各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞煎至陸分去滓熱服若產後寒熱腹中刺痛則有敗血當用五積散加醋煎及大聖散服之若所下過多猶有刺痛亦宜服此二藥

血氣作疼用四物湯加莪朮官桂等分名六合湯

血不止及姪婦胎動加熟艾乾薑甘草阿膠黃香等分名膠艾湯

治血痢止加膠艾治產後血搏口乾煩渴加括樓

麥門冬煩熱小便澀大便秘加大黃桃仁湯脇脹加厚朴枳

實虛煩不得睡加竹葉人參大渴煩燥加知母石膏

婦人血虚心腹疼痛不可忍者去地黃加乾薑名四神湯大率產後不問下血多少須日進黑神散參服下血少者

插舉高十丈天符地軸入地十丈令此地空闊產婦其家  
居無所妨礙無所畏忌諸神擁護百邪逐去急急如律令勅  
禁草法鋪草及氈褥訖即○鐵○湯湯非公所當是王一言  
得之銅一言得之鐵母子相生俱獲鐵急急如律令

禁水法欲產時貯水○南無三寶水 水在井中為井水  
水在河中為河水 水在器中為淨水 水在法中為真水  
自知非真莫當真水

以淨持濁 以正治邪 日遊月煞 五土將軍 青龍白虎  
朱雀玄武 招搖天狗 軒轅女媧 天吞地吞 懸尸閉肚  
六甲禁諱 十二神王 土符伏神 各安所在 不得動靜  
不得忌干 若有動靜 若有忌干 施以神呪 當攝汝形

阿佉尼阿毗羅莫多梨婆地梨沙訶

產前將護法

仙民曰由此推之凡人有勞動必擾亂氣血且少飲夫夏月多

按諸家產論云凡產婦入月切忌飲酒恐產時心神昏亂臨

產之時不可令傍人喧擾大小捨忙慮致驚動產母祇可令  
熟事產婆及穩審謹卓老成親密三兩人扶持產母初覺腹  
痛且宜任意坐卧勉強飲食恐致臨產氣力虛羸若腹痛漸  
甚唯且熟忍仍可按節次漸服滑胎榆白皮散壹二服服藥  
之法慎勿太早須得其時又傍人不得逼迫且須令人扶策  
徐徐而行若行步稍難即凭物而立須更扶策再行直至腹  
痛連腰相引作陣痛頻即服催生丹一服更且勉強扶行陣  
痛轉甚難以立認是產時將至即服催生符畢然後安詳上  
草上草之時慎勿傷早若太早則子在腹中難以轉側又須  
子細體候直待兒逼欲生然後令抱腰也抱腰之人不得傾  
斜則兒得順其理自然易產也又有臥產者亦待卧定背平  
着席體不偏曲則子不欠其道苟或不能依此節適必致產  
難縱或幸免必須變生諸疾

產後將護法







十三歲	庚申	西南黃衣	坤	離	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
十四歲	巳未	正南赤衣	離	坤	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
十五歲	戊午	正北黑衣	坎	乾	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
十六歲	丁巳	正東青衣	震	艮	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
十七歲	丙辰	東北黃衣	艮	震	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
十八歲	乙卯	西北黑衣	乾	坎	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
十九歲	甲寅	正西白衣	兌	巽	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
二十歲	癸丑	東南黃衣	巽	兌	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
廿一歲	壬子	西南黃衣	坤	離	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
廿二歲	辛亥	正南赤衣	離	坤	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
廿三歲	庚戌	正北黑衣	坎	乾	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
廿四歲	己酉	正東青衣	震	艮	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
廿五歲	戊申	東北黃衣	艮	震	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
廿六歲	丁未	西北白衣	乾	坎	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
廿七歲	丙午	正西白衣	兌	巽	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
廿八歲	乙巳	東南青衣	巽	兌	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	
廿九歲	甲辰	西南黃衣	坤	離	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日	

三十歲	癸卯	正南赤衣	離	坎	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
卅一歲	壬寅	正北黑衣	坎	乾	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
卅二歲	辛丑	正東青衣	震	艮	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
卅三歲	庚子	東北黃衣	艮	震	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
卅四歲	己亥	西北白衣	乾	坎	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
卅五歲	戊戌	正西白衣	兌	巽	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
卅六歲	丁酉	東南黃衣	巽	兌	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
卅七歲	丙申	西南黃衣	坤	離	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
卅八歲	乙未	正南赤衣	離	坤	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
卅九歲	甲午	正北黑衣	坎	乾	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
四十歲	癸巳	正東青衣	震	艮	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
四一歲	壬辰	東北黃衣	艮	震	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
四二歲	辛卯	西北黃衣	乾	坎	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
四三歲	庚寅	正西白衣	兌	巽	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
四四歲	己丑	東南黃衣	巽	兌	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
四五歲	戊子	西南黃衣	坤	離	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
四六歲	丁亥	正南赤衣	離	坤	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
四七歲	丙戌	正北黑衣	坎	乾	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
四八歲	乙酉	正東青衣	震	艮	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日
四九歲	甲申	東北黃衣	艮	震	方氣生	方害禍	方命絕	方肚閉	方症八	反亥月	懸日

逐日產母生子宜向方

子午卯酉日宜向南方

辰戌丑未日宜東南方

寅申巳亥日宜向西北方

逐月產母忌向方 忌月下凶方生產

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

雷公 寅亥申巳寅亥申巳寅亥申巳 犯之主兒煩悶

招搖 寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑 犯之主兒驚

咸池 辰丑戌未辰丑戌未辰丑戌未 犯之主兒啼

軒轅 卯子酉午卯子酉午卯子酉午 犯之主兒肚脹

曹隆 辰未戌丑辰未戌丑辰未戌丑 犯之主兒驚

白虎 戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉 犯之主兒驚

狂虎 午酉子酉午卯子卯午卯子酉 犯之主兒驚

天候 申巳寅亥申巳寅亥申巳寅亥 犯之主兒腹脹

天狗 辰巳午未申酉戌亥子丑寅卯 犯之主兒口噤

夫人 酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申 犯之主兒嘔吐

運鬼 艮乾坤巽艮乾坤巽艮乾坤巽 諸曆書不載

藏胎衣吉方 出廣濟曆

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

天德 丁坤壬辛乾甲癸艮丙乙巽庚 宜藏胎衣吉

月德 丙甲壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚 宜藏胎衣吉

月空 壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚 宜安產室吉

生氣 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 宜藏胞衣吉

逐日日遊神

癸巳甲午乙未丙申丁酉 在房內北 庚子辛丑壬寅 在房內

南癸卯 在房內西 甲辰乙巳丙午丁未 在房內東 六戌六巳

在房內中央 餘日 在房外吉



