



# 風緩

附

歷節風

脚氣

風緩方論

風緩者風邪深入而手足為之緩弛也夫人四肢百脉皆賴氣以  
 攣急遇熱則柔緩病在陽經氣行遲而關以縱病在陰經氣行  
 疾而關以收此物理之常然也然脾主肌肉四肢胃為水穀海  
 所以流布水穀之氣周養一身脾胃既虛肢體失其所養於是  
 風邪襲虛由腠理而入肌肉由肌肉而入脾胃安得不為之緩  
 廢乎若曰驅風之劑與助胃之劑不同亦顧吾活法用之何如  
 耳抑余聞人之一身筋骨為壯肝主筋骨腎主骨肝腎氣虛風邪  
 襲之亦有肢體緩弱之證然則先散其風而後益之於此尤當  
 加意

風緩證治

**排風湯**續命湯

方見風類

加製羊真

雞心大損

增薑煎先以

此散風毒邪氣

**蘇合香圓**

用沸湯泡生薑汁調開吞**百圓**子貳拾圓日貳

服治手足風緩或**百圓**

**安腎圓**夾用食前服方見嗽門○身

**不換金正氣散**

方見寒類

加**山言**煎食前吞**安腎圓**治脾

胃肝腎俱虛風入四體筋骨緩弱不仁仍早晨常服炒黑豆淋酒

**大聖一粒金丹**

治中風昏仆舌強涎潮癱瘓偏枯頑痺麻痺癩

癩倒地閉目作聲項強反張口噤直視

大川烏炮

大附子

炮去皮臍新羅白附子

各貳兩

川五靈脂

白僵蚕

炒去絲

白疾梨

炒去刺各壹兩

白礬枯

朱砂

沒藥

麝香

別研各半兩

右細末合和用松煙墨半兩新汲水磨汁搜圓每兩作陸圓  
 金箔貳伯片為衣令自乾每服壹圓以生薑半兩取自然汁  
 磨開溫酒半盞調服蓋取微汗為效

風緩



**大續揮圓**治中風癱緩口眼喎斜筋骨攣疾肢體麻木

自然銅燒紅醋淬柒次 虎脛骨酒浸 當歸酒浸焙

白附子炮 川烏皮去 五靈脂炒 麻黃去節

沒藥 乳香 全蝎焙 安息香

白芷 直僵蚕炒去絲 烏蛇肉酒浸焙乾

木鱉貳拾壹箇 去殼炒熟 朱砂 麝香各壹分

右為末以酒煮安息香入飛白麪為糊圓彈子大每壹圓溫

酒嚥下

**續命散**治肝腎氣虛風入筋骨手足緩弱

小附子去皮 生草烏頭炮去皮臍 蒼朮炒

牛膝酒浸焙 川芎 當歸 天麻各半兩

防已 白芷 黃耆蜜炙 全蝎焙

右末每壹錢黑豆淋酒調下兼用核桃肉研酒下食前服

**續命散**治風寒濕毒與血氣搏筋骨緩弱四肢酸疼痺

宣木瓜去穢切焙 天麻剉 牛膝剉

菴蓉洗切焙肆味各壹斤 熟附子 虎骨斷炙

右為末用浸藥酒調麪糊圓桐子大每服叁肆拾圓食前溫

酒或豆淋酒下

**續命散**加續命散參分乳香沒藥五靈脂各半兩麝香壹錢名大四

**續命散**用木瓜煎湯下亦治脚氣

**虎脛酒**治諸風緩弱及歷節風骨節酸疼

虎脛骨酥炙黃

右搥碎如米每骨壹升以酒叁升浸伍日空心服壹盞冷則

暖之

**續命散**方並是風類治諸風緩弛其他用藥風類其詳可

# 歷節風

歷節風論

風緩

歷節風之狀短氣自汗頭眩欲吐手指攣曲身體魁癭其腫如脫漸至摧落其痛如掣不能屈伸蓋由飲酒當風汗出入水或體虛膚空掩護不謹以致風寒濕之邪徧歷關節與血氣搏而有斯疾也其痛如掣者為寒多其腫如脫者為濕多肢節間黃汗出者為風多遍身走癢徹骨疼痛晝靜夜劇發如虫嚙者謂之白虎歷節治法當以溫藥解其風寒濕之毒或用和平則獨

歷節風證治

**虎骨散**治白虎歷節走注痒痛不得屈伸

虎脛骨

酒炙黃壹兩半

白花蛇

酒炙黃壹兩半

天麻

自然銅

服醋碎

防風

白附子

檳榔

官桂

當歸

羌活

牛膝

白芷

川芎

僵蚕

炒去絲各壹兩

全蝎

焙

地龍

去土

乳香

沒藥

雄黃

各半兩

麝香

壹分

右末每服貳錢食前以煖豆淋酒調下

**雄黃圓**治歷節風骨節疼痛攣急痺頑

安息香

五靈脂

天麻

各壹兩半

地龍

淨

白僵蚕

微炒各叁分

全蝎

微炒

雄黃

各半兩

麝香

壹分

烏蛇

酒浸取肉炙

天雄

炮去皮臍

當歸

川烏

炮去皮臍

川芎

南星

官桂

虎脛骨

酒炙黃各壹兩

川獨活

貳兩

右末煉蜜杵圓桐子大每服拾伍圓食前溫酒下

**海狗散**治歷節走注骨節疼痛

獨活

萆薢

鹽水

川芎

當歸

各叁分

桃仁

去皮焙

天麻

辣桂

牛膝

麻黃去節

枳殼製

海桐皮

白芍藥

川烏炮去

松節

防風

杜仲薑製

甘草炙各

麝香壹分

虎脰骨酒炙黃

右麗末每服貳錢薑伍片棗貳枚食前煎服

**獨活散**

治歷節風亦治脚氣方見腰膝門

**獨活散**

治白虎歷節遊走癢痛狀如虫噬方見風類

**獨活散**

治歷節諸風百節疼痛方見風類

**獨活散**

治惡風頭面肢體癢疹癩瘰

透明鋒芒硫黃

右每服叁錢乳鉢內研細入醇酒再研空心飲其清者滓又研細入酒飲之連日如是硫黃能殺惡虫自大便下

**獨活散**

治手指彎曲骨節間痛甚

單麻子去皮

黃連去鬚到如元

古用新水貳升於磁瓶內浸貳藥密封柒日取出逐日侵晨

面東以浸藥水吞壹粒柒日後添兩粒微利不妨以

療大風亦效

**獨活散** 治大風厲風

川大黃綿紋嫩者

獨生皂角刺壹兩半

右末每服貳錢臨夜冷酒調下以淨桶伺候泄虫如虫口黑色乃是多年虫口赤色是為方近三數日又進壹服直候無虫則絕根也癩疹若與醋則風疹食入

**獨活散**

治風寒濕合而為痺遍身或半身麻木不仁最能殺虫

**獨活散**

用增味五痺湯下空心服方見風類

**獨活散**

雞子指患處呪參遍願送冀堆頭蓋白虎是冀神愛喫雞子患者下飯用黃脚雞為妙亦可抱雞來壓之其癢自止

**獨活散**

治白虎風歷節風遊走疼痛遍身癢癢狀如虫齧晝靜

夜劇方見風類

# 脚氣

脚氣方論

腎司於下一身之根本繫焉脚者腎之外候也夫人為嗜欲所  
 戕苦不自覺腎氣內虛真元不守九驟立冷地久坐卑濕暴熱  
 灌水凌晨履霜感受四氣於冥冥之中不為脚氣者鮮矣脚氣  
 為病雖起於足實周乎身或壯熱頭痛或身體冷疼或百節拘  
 攣或十指疔注或轉筋急痛或小腹不仁以至胃滿喘息煩悶  
 怔忡昏憤羞明誤忘錯語腰痛下利嘔噦痰涎食氣惡聞見食  
 即吐大便小便多是秘澀自腿至膝自脛及踝歪弱頑痺攣急  
 酸疼或厥不燃或腫不腫皆其候也其自汗惡風無汗惡寒乍  
 寒乍熱傳足六經外證與傷寒類焉但卒然脚痛為異耳治法  
 究其所自來挾風者遊走有汗挾寒者掣痛攣疼挾暑者大渴  
 熱煩挾濕者腫滿重滯其間四氣兼有則推其多者解之對病  
 施藥固在權衡然古人以此名為緩風謂其感於風毒所致則  
 總治之法大要疏導大便使毒氣得泄而後愈但分劑不可過  
 焉其補湯淋洗皆醫家之大戒也雖然脚氣治法以疏利毒氣  
 為先蓋慮乎氣實而死矣然表裏之有異經冷熱之有異證或  
 因他病而後發或致他病之續生又不可以不通其變所謂寒  
 則溫之熱則寒之在表則散在裏則下太虛氣之扶養其中疑  
 陰蘊毒為之溫利是又胃中之活法矣其或療治不早使毒氣  
 入復衝心攻築作痛喘滿上氣嘔吐異常此則漸入顛深或者  
 自貽奄忽

脚氣證治

二十四味藥治脚氣通用

當歸 酒浸曬 川芎

葉解 薑水

羌活

杜仲 薑製炒 石南葉

薏苡仁

大雞心檳榔

華陰細辛

枳殼 各壹兩

蒼朮 炒

五加皮

防風

獨活

續斷洗燉

牛膝酒浸燉

威靈仙

海桐皮

木香

木瓜

麻黃去節

川五靈脂

沒藥別研

滴乳香半兩

右細末酒浸雪糕為圓桐子大每服伍拾圓細剉陳桂煎服

**總**食前煎湯下或**枳殼**木瓜煎湯下

**木瓜散**脚氣通用

大腹

紫蘇

羌活

木香

茯苓

陳皮

甘草各半兩

宣木瓜乾壹兩

右細末每冬錢壹兩煎服

**降氣湯**脚氣通用

半夏製

真蘇子微炒各伍兩

當歸

厚朴製

甘草炙

北前胡略煎

肉桂

陳皮各叁兩

右剉散每冬錢壹兩伍片棗兩枚煎服如無蘇子以蘇葉貳兩代之

脚氣

**檳榔散**治風毒脚氣腫痛

橘葉

杉木節口壹

右童子尿壹盞醇酒半盞煎陸分濃清棄執調檳榔末貳錢

食前服方見風類

**生木瓜圓**脚氣通用

宣州生木瓜

洗蒂切壹蓋取出核以酒洗其木瓜去皮研爛

右入酒末和圓桐子大日乾每服柒拾圓食前醇酒下

**止嘔湯**治脚氣嘔逆吐瀉轉筋

宣木瓜壹味細剉每服肆錢新水煎服神効

**檳榔散**治脚氣攻注手足不能舉

雞心大檳榔

右末每服叁錢用酒茶葉連梗搗皮壹全箇不去白薑伍

片煎湯乘熱調下治脚氣衝心痛悶用童尿煎服治脚心串

痛溫酒調下

**海桐皮** 治風毒脚氣膝腔疼痛

海桐皮

五加皮

川獨活

枳殼製

防風

杜仲薑製炒

牛膝酒浸炒

薏苡仁炒各壹

生地黃貳兩

右末用綿裹以醇酒壹斗春浸七日秋浸拾肆日每日空心溫服壹盞前壹盞

**杉葉湯** 治脚氣攻心痛悶脹滿不食

青皮

陳皮

天合烏藥

雞心檳榔

宣木瓜

乾杉木節

半夏製

枳殼製

縮砂仁

赤茯苓各半

丁香

茴香微炒

大腹皮

紫蘇子微炒

羅蔔子湯炒

北梗

甘草各壹分

右剉每參錢薑伍片煎

**三和散** 加木香 方見水煎門

方見水煎門

**和劑** 方見脹滿門

方見脹滿門

**分氣** 方見喘門

方見喘門

**烏藥** 方見

方見 風門 脚氣通用

**枳殼散** 疏導毒氣

枳殼製兩

甘草壹兩半

右末每服貳錢濃煎木瓜湯調下如要快利更加陳仁

**麻仁** 治脚氣大便秘澀

麻仁別研

杏仁浸去皮炒

各伍兩半

枳實製

厚朴製

芍藥各半片

大黃壹片蒸切

右末煉蜜圓桐子大每貳拾圓食後熱水下或散加大

**黃** 通用

**大黃湯** 治脚氣風熱煩悶發渴大便不通

木香

大黃各半兩

黑豆壹兩

升麻叁分

右剉每服參錢烏梅貳箇新水煎服

**追風** 治脚氣熱多證疏泄風毒

羌活壹兩

雞心檳榔 防風

桑白皮各半兩

風毒脚氣



郁李仁炒 大黃生

右剉散每服參錢黑豆百粒煎服熱甚大便秘更加大黃

**敗毒散** 方見寒類 治脚氣熱證或自汗惡風則加無汗惡寒

則加去節麻黃 又治風濕脚氣發熱癩腫加蒼朮 微

利為效

**防石湯** 治脚氣胃熱煩燥嘔吐 方見積熱門 加烏梅煎

**豆豉** 方見血類 加白芷 治諸脚氣

**木香散** 治脚氣入腹攻心嘔悶

南木香 甘草炙 青木香

宣木瓜 真橘皮 紫蘇葉 雞心檳榔 各壹兩

右剉散每服參錢薑伍片烏梅壹枚煎服

**通淋湯** 方見前 吞錢 方見癰冷門 治脚氣衝心築痛嘔吐

涎沫 通用 方見脹滿門

**椒心散** 治脚氣寒證

大生木瓜 剉常切蓋以 右研貳味為圓桐子大每肆拾圓温酒下扶虛用核桃肉煎

湯下

**麻黃湯** 治脚氣風多證

麻黃去節 燼石膏貳兩 白朮壹兩 熟附子

甘草各半兩 右剉散每服參錢薑伍片棗壹枚煎服

**白薑散** 多用薑片治脚氣寒多證加白 治脚氣風多證方見

**白芷湯** 方見脚疼門 加白 治寒證脚氣 方並見見冒門

**白朮散** 加白 煎吞 治暑證脚氣

**惡血** 治風毒脚腫生瘡或筋攣痛重

石南葉 薏苡仁 杏仁微 羌活 牽牛炒

大腹子 腫皮 川芎 川續斷 赤芍藥

石南葉 薏苡仁 杏仁微 羌活 牽牛炒

大腹子 腫皮 川芎 川續斷 赤芍藥

赤小豆

陳皮

當歸

麻黃

去節 各貳兩

五加皮

牛膝

宣木瓜

獨活

單辭

杜仲

各肆兩

右細末以酒浸蒸餅研糊圓桐子大每服叁拾圓煎末湯下

**加神除濕湯**

**加神**

方見濕門

**加神散**

方見水

治脚氣渴多證

**換腰圓** 治風濕脚氣緩弱痺痛上攻脊背

石南葉

南星

石斛

牛膝

羌活

薏苡仁

防風

單辭

黃耆

天麻

當歸

續斷

檳榔

宣木瓜

川芎

右末酒麩稀糊圓桐子大每伍拾圓食前橘皮煎湯下

**獨石湯**

羌活

麻黃

熟附子

生乾薑

川芎

牛膝

白芍藥

白伏苓

黃耆

人參

杜仲

甘草

辣桂

當歸

白木

木香

右麩末每服叁錢薑伍片棗貳枚同煎吞 **治血應痛圓**

**治血應痛圓**

蒼朮

香附

威靈仙

草烏頭

陳皮

狗脊

沒藥

右末酒麩稀糊圓桐子大每服貳拾圓用獨活湯下治腎受

風冷脚氣酸疼及久痢登廁風冷入於腸胃以致兩脚小

成鼓槌風而痢又不止用此兩藥俱效

**不若此丹**

治腎臟風毒輕脚壯筋

當歸

牛膝

菴蓉

虎骨

真川椒

川草薢

疾藜

川芎

白附子

黃耆

圓白南星

何首烏

羌活

獨活

杜仲

沒藥

防風

赤小豆

地龍去土

茴香炒

木鱉子去油 血竭

乳香別研

右細末酒麪稀糊圓桐子大每服肆拾圓木瓜煎湯下

**烏蛇圓**治風寒脚氣隱痛痒痺

烏蛇肆兩酒浸取肉焙

虎骨醋浸洗淨酒炙式兩

石斛令作末

黃松栢節酒浸研

巴戟去心

從蓉酒浸焙

官桂

防風

獨活

續斷

五加皮

薏苡仁

當歸

木香

川芎各半兩

乳香別生乾薑

右末酒麪稀糊圓桐子大每肆拾圓木瓜煎湯下

**藥圓**治脚氣遊走兩足轉上腰腿疼痛不能轉側

宣木瓜貳兩

川烏炮去皮

黃耆

蒺藜炒去刺

當歸

防風

草薢

牛膝

天台烏藥冬星壹兩

赤小豆

茴香炒

地龍去土

老白膠研碎

川五靈脂各叁分

右細末酒麪稀糊圓桐子大圓數肆拾食前紫蘇湯送下

**四斤圓**治脚氣緩弱隱疼及腎虛感受風寒濕痺方見風緩門

**大流氣散**加當歸下方見腫滿門

**虎骨散**方見腫滿門脚氣筋急掣痛用木瓜煎湯調下

**金液丹**方見牌疼門治凝陰蘊毒温而利之養正丹通用以

**木瓜丸**煎湯下

**陳湯**加續斷製續斷治脚氣痰多證方見瘧門無熱者

**陳湯**下養正丹又木瓜丸方見腎氣門

脚痛緩弱患在風濕風證以烏蛇圓加木瓜主之濕

證以木瓜加木瓜主之一匕收功容易事也

若夫腎虛為病脚弱而痛又當何如曰腎主骨故爾惟木瓜

最良以木瓜送下仍夾和木瓜佐之余每見脚氣

緩弱人多服四斤圓亦養正丹也然則腎氣充則骨氣強骨

氣強則無緩弱之患治法要當思其原

**四斤圓**

# 諸氣

## 諸氣方論

人以氣為主。一息不運。則機絨窮。一毫不續。則宮竅判。陰陽之所以升降者氣也。血脈之所以流行者亦氣也。榮衛之所以運轉者氣也。五臟六腑之所以相養相生者亦此氣也。盛則盈衰則虛。順則平逆則病。氣也者。獨非人身之根本乎。人有七情。病生七氣。七氣者。寒熱怒悲喜憂愁。或以為喜。怒憂思悲驚恐。皆通也。然則均調是氣。將何先焉。曰。氣結則生痰。痰盛則氣愈結。故調氣必先豁痰。如**二氣湯**以平其主。治而**官廷**佐之。蓋良法也。况夫冷則生氣。調氣雖用豁痰。亦不可無溫中之劑。其間用桂。又所以溫其中也。不然七氣相干。痰涎凝結。如絮如膜。甚如梅核。窒礙於咽喉之間。咯不出。嘔不下。或中滿。艱食。或上氣喘急。曰氣隔。曰氣滯。曰氣秘。曰氣中。以至五積六聚。山嵐瘴癘。心腹塊痛。發即欲絕。殆無往而不至矣。冷氣者。生冷疝。脾風。冷入胃。或血海虛冷。則生氣用**和劑七氣湯**。冷中湯。香飲。氣

**湯**。天沉香圓。痰結者。三因七氣湯。指迷七氣湯。見二陳湯。中滿者。痞滿不食。水氣腫脹。面目俱浮。痰散。加木香。大流氣。指迷七氣湯。順氣木香散。三和散。五皮散。加半夏。伏苓。上氣者。氣逆而上。呼吸喘促。分氣蘇湯。蘇子降氣湯。或醫蘇合香圓。以秘傳降氣湯送下。氣隔者。陰陽不和中。腕室塞。五隔吐噎。食不能下。五疝。寬中散。神劑七氣湯。加木香。縮砂。間以紅圓子佐之。氣滯者。滯於胃。膈則脹。滯於手足。則浮腫。滯於腰間。則墜痛。脹滿用**雲香散**。香浮氣湯。仍與神保圓。或少蓬煎圓。利之。浮腫片。三和散。五皮散。或五皮散。加桂。香木香圓。局方流氣散。加赤茯苓。腰痛。俞山人。修氣湯。局方七氣湯。加橘核。或陳桂煎湯。點調氣散。吞膏。煨丸。

諸氣

○氣秘者停宿不消腸胃留滯大便不通蘇合香圓夾和感應  
圓或湯氏麝香圓局方感圓並用蘇散散送下○氣疾之人

多因氣不歸元遂成氣中狀如中風仆倒昏迷牙關緊急只是  
無痰此為氣中不得誤用風藥及通關利膈等輩先以薑汁泡

湯調蘇合香圓次用七氣湯大流蘇散加白豆蔻通繼之氣順而  
蘇即以冷中湯加木香以和其中使氣歸常道若更不能調則

氣逆而嘔又有交證○五積者五臟之所積其病難醫六聚者  
六腑之所聚其病易治挾水為癖挾血為癥氣血水飲皆能結

塊輕者神保圓以麝香湯送下或少與蘇散圓蘇散圓蘇散圓  
蘇散圓重者如意圓頂珠圓酌量用○又一證漉漉作声腹中

纏滯他無所苦此為水飲消飲圓神保圓方亦見水飲類  
圓夾和用之○人有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常一種

婦人平時任氣易為七情所傷適月事經季不行一身百病胃  
臆氣填嘔惡全不入食入食則吐痰涎或一塊如核窒塞胃喉

而痛或一塊如卵築觸心下而疼或腹中塊物動而作痛攻刺  
腰背時發熱四肢乏力脚不能行小便白濁浮油帶下淋瀝

日就瘦弱全似虛勞然而穀雖不入果子雜物常喜食之却只  
是有孕諺所謂孕婦做得百般病者此也用藥但以二陳湯加

蘇散圓同煎半夏理氣消痰蘇散圓安胎順氣此通  
以開胃喉之隔服之自然安平若妄以剛劑溫胃胎氣必煩病

無由愈白濁一節謹勿燥滋二陳湯加白茯苓以下白圓子方  
並見痰涎類可也若夫七情所發逆氣填胃不惟核膜上塞咽

喉甚者攻擊涌悶欲絕產後尤多有之故曰產前安胎產後調  
氣男女或有胃喉間梅核作恙者觸事勿忘飲食勿忘

諸氣證治

七氣湯治七氣所傷痰涎結聚心腹刺痛不能飲食

半夏 兩

人參

辣桂

甘草 兩

右劉散每服參錢水大盞置任片棗三枚煎至七分食前服

**和劑降氣湯** 方見脾胃門

**沉香降氣湯** 治陰陽交滯心腹脹滿留飲停酸積冷諸證

沉香一兩 縮砂仁二兩 甘草二兩半 香附炒淨

右末每壹錢鹽壹點沸湯點下

**大沉香圓** 治一切冷氣攻心腹刺痛胃膈噎塞婦人血氣刺痛

並宜服之 方見心氣類

**因七氣湯** 證治如前有熱者可用此

半夏五兩 茯苓四兩 厚朴製 紫蘇葉二兩

右劉散每服肆錢水盪半薑柒片棗貳枚煎陸分不時服

**易簡一使湯** 方見痰涎門

**和劑流氣散** 調榮衛利三焦行痞滯消腫脹

橘紅 青皮 紫蘇葉 厚朴製

香附炒淨 甘草各四兩 木通二兩 大腹皮

丁皮 檳榔 辣桂 木香

草果仁 蓬朮煨 霍香葉各一兩半 麥門冬

人參 白朮 木瓜 赤茯苓

石菖蒲 白芷 半夏製 枳殼製

右劉散每服參錢薑肆片棗貳枚煎服 餘見水腫門

**指迷七氣湯** 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼

青皮 陳皮 桔梗 蓬朮

辣桂 藿香 益智仁略 香附一兩半

甘草炙 加半夏製

右劉散每服參錢水壹錢薑肆片棗壹枚煎柒分不時服

**順氣木香散** 治冷證腫脹泄瀉

良薑 乾薑炮 茴香炒 縮砂仁

辣桂 橘紅 厚朴薑汁 甘草燻

蒼朮炒 丁皮 桔梗各等分

諸氣

右末每貳錢半薑棗煎食前服

**三和散** 和暢三焦治痞脹浮腫

大腹皮炒 紫蘇葉 沉香 宣木瓜切焙

羌活各壹兩 白木 川芎 木香

甘草炒 陳橘皮去白 檳榔濕紙煨

右鹿末每貳錢煎服加赤茯苓可以和氣利水

**五皮散** 治皮膚水氣

大腹皮炒 桑白皮炒 伏苓皮 生薑皮

陳橘皮尋分

右鹿末每參錢煎服

**分氣養氣湯** 治腹脅疼痛氣促喘急

五味子去梗 桔梗生 伏苓 大腹皮

陳橘皮洗淨 草果仁 桑白皮炙剉 甘草炙

右捌味咀為鹿末秤貳拾斤淨入揀嫩枝葉乾紫蘇拾伍

斤搥碎同一處拌勻每服肆錢水壹大盞薑棗錢叁片入鹽少

許同煎至柒分去滓空心食前服常服和胃進食

**蘇子降氣湯** 治心腹脹滿喘促短急

蘇子半炒 半夏洗七次 甘草炙 前胡去芦

陳皮去白 厚朴姜汁製 桂皮一兩去麩 川當歸去芦

右為咀每服貳錢至叁錢水壹大盞生薑叁片煎至柒分

去滓溫服不拘時常服消痰飲散滯氣進飲食

**香薷散** 療疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白  
暴利痰血月閉疰瘵丁腫驚癇鬼忤中入小兒吐乳大人狐狸  
等疾方見嗽類

**五加皮湯** 治同前

五加皮半兩酒浸半 枳殼洗去 柴胡去芦洗

骨碎補剉 陳皮黃 地骨皮炒 桔梗半兩炒

桑白皮剉 陳皮黃 訶子半兩炒 甘草炒

諸氣

半夏半兩生為末生薑白草果去皮膜半兩

右為麤散和勻以攪盛就飯甌上蒸一伏時傾出攤令冷以

之每服貳錢紫蘇參葉薑錢參片水壹錢同煎柒分食後通

口服痰嗽加半夏麤煎心肺虛加人參茯苓煎上爛熱加北

黃芩煎下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑

婦人血虛加當歸煎

**五膈寬中散**治七氣留滯飲食不下穀脹氣脹通用

白豆蔻仁 丁香 木香 縮砂仁

甘草炙 青皮 陳皮各貳兩 川厚朴薑汁炙焙

香附各肆兩

右麤末每參錢薑參片鹽壹點煎服

**行圓子**治丈夫脾積氣滯胃膈滿悶酒積不食婦人脾血積氣

諸般血癥氣塊方見核六經門

**異香散**治腰脇脹疼痞悶噎塞噫氣吞酸一切氣痞腹中刺痛

蓬莪茂煨 益智仁 甘草燼 京三稜煨

青皮去白 陳皮去白 石蓮肉壹兩 厚朴去蘆皮薑

右為細末每服貳錢水壹盞薑參片棗壹枚鹽壹捻煎柒分

通口服不計時或鹽湯點或鹽酒調皆可服

**調氣散**治氣滯不勻消食不消

白豆蔻用七 丁香 檀香剉 木香各貳拾兩

藿香葉 甘草燼 縮砂仁貳斤半

右為細末每服壹錢入鹽壹字沸湯點服不計時或用薑棗

略煎服

**神保圓**

木香 胡椒各壹分 巴豆拾枚共 乾蝎柒枚

右件湯釋蒸餅圓如麻子大朱砂為衣每服參粒心膈痛柿

蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下肺氣

盛者白礬蛤粉各參分黃丹壹分同研為散煎桑根白皮糯

諸氣



米飲調參錢下喘止用桑皮糯米飲下腎氣脇下痛炒茴  
香酒下大酒不通蜜湯調檳榔末壹錢下氣噎木香湯下宿  
食不消茶酒漿飲任下諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治獨此  
藥輒能去之有人病項筋痛諸醫皆以為風治之數月不瘥  
乃流入背脊久之又注右脇攣痛甚苦乃合服之一投而瘥  
後嘗再發又一投瘥

**蓬煎圓**利大腑去積氣

船上茴香炒附子炮去枳殼浸壹宿去川練子去核

檳榔各貳山藥各貳礪砂半兩京三稜

蓬莪朮貳味各津兩醋煮猪胰壹斤入礪砂并三

右為末入膏內同醋麩糊為圓如梧桐子大每服拾圓至拾  
伍圓生薑湯下婦人淡醋湯下不拘時候更量虛實加減常  
服順氣寬中消積滯化痰飲

**生料五苓散**去水退腫

澤瀉劉貳拾猪苓去皮赤伏苓去皮白朮去芦各壹

桂去麩皮

右為細末每服貳錢熱湯調下不拘時又治痰熱在裏身發  
黃疸濃煎茵陳蒿湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦可  
用水調服小兒加**白朮末**少許如發虛熱加**綿黃耆****人參末**  
少許

**俞山人降氣湯**治氣不升降痰實喘滿

紫蘇子微炒前胡去芦厚朴薑汁浸壹半夏麩炙

甘草炙橘皮去白五加皮薑汁當歸洗去芦

桂心不見火黃耆去芦人參去芦附子炮去皮尖

桔梗炒羌活乾薑

右鹿末每服參錢水壹盞半紫蘇參葉薑薑參片棗子壹枚  
同煎柒分去滓食後服

**青娥圓**治氣滯不散黃治腰痛

破故紙

酒浸炒 剉兩 胡桃貳拾个 剉

杜仲拾陸兩 去皮 薑汁浸炒

右為細末蒜膏為圓每服參拾圓空心温酒下婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脉烏髮鬚益顏色

**感應圓** 治積冷傷胃腹脇脹痛

方見脈滿門

**麻仁圓** 順三焦潤五臟治大便秘塞不通年高入尤宜服之

白檳榔半生

羌活去蘆

木香各壹兩

肉桂去蘆皮

鬼絲子

酒浸去宿 別研為末

山茱萸

車前子

枳殼去穢 炒

防風去蘆頭 及叉枝

山藟各壹兩 兩半

麻仁別搗研

大黃半生

郁李仁去皮別搗 碎各肆兩

右為細末入別研藥勻煉蜜和圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓温水吞下臨卧服

**撞氣圓** 治五種噎疾九般心痛痰癖氣塊冷氣攻刺

茴香炒香

陳橘皮洗

青橘皮洗

川芎

丁香皮炒

蓬莪木炮

甘草各壹兩 縮砂仁

肉桂去蘆皮

白芷各半兩

生薑津兩切作片子用鹽 兩淹壹宿炒黑色

胡椒貳錢半

阿魏貳錢半醋浸去 宿以麩同為糝

右為末用阿魏糊和圓如雞頭大每藥圓壹斤用朱砂柒錢為衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下壹粒至貳粒婦人血氣醋湯下常服壹粒爛嚼茶酒任下

**三稜圓** 治中脘氣痞心腹堅脹胃中痞塞喘滿短氣大便不

調或泄或秘

京三稜生細剉半斤 好酒參升石 器內熬成膏

青橘皮去白

杏仁湯浸去皮 炒令黃

蘿蔔子微炒

乾漆各貳兩

神麩炒

麥蘖炒 各叁兩

礞砂研飛 壹兩

右為末以三稜膏搜和圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓温米飲下食後服

**薑圓** 養脾温胃去冷消痰大治心脾疼痛寬胃下氣一切冷物所傷

良薑去芦

乾薑炮

右件等分為細末麪糊為圓如梧桐子大每服拾伍至貳拾圓食後橘皮湯下孕婦不宜服

**香橘湯**治七情所傷中脘不決腹脇脹滿

香附炒

半夏製

橘紅各貳兩

甘草炒

右判散每參錢薑伍片棗貳枚煎服

**桔梗散**治諸氣痞結滿悶

枳殼製

桔梗各貳兩

甘草炒

右判散每肆錢水盞半薑伍片煎至中盞溫服

**薑桂散**治心中卒痛腹脇氣滯

辣桂

川白薑不炒

各壹兩

蓬莪木半兩

右末每壹錢溫酒調下

**沉香開胃散**治五膈五噎痞滿嘔吐心腹刺痛脇肋脹拒

沉香

荆三稜

蓬莪木

白豆蔻仁

萹澄茄

縮砂仁

草果仁

益智仁

川白薑

丁香

人參

丁皮各半兩

木香

白伏苓

香附炒

霍香葉

半夏麵

青皮

陳皮各壹兩

甘草炒

右麓末每參錢水盞半薑伍片棗貳枚煎至中盞食前服

**良薑湯**治冷氣腹痛

良薑

辣桂各壹兩

半夏製

木香

當歸

厚朴製

甘草炒

右麓散每參錢薑肆片水大盞煎陸分食前服

**白豆蔻仁**治七氣所傷滯於胃膈室於咽喉脹痛於心下噫氣

吞酸不能飲食

白豆蔻仁

硝砂

萹澄茄

丁香

木香

甘草炒

青皮

陳皮

辣桂各貳分

厚朴製

香附炒

各參分

右末每參錢水壹盞薑參片壹拾煎茶分不時服

**如意圓**治積聚塊痛疝瘕癥瘕等疾

沉香 木香 大丁香 草澄茄

史君子 辣桂 川白薑炒 桃仁炒

五靈脂炒 硃砂醋浸 雄黃 沒藥

大戟 牽牛炒取末 巴豆去油 荆三稜

蓬莪朮 肉豆蔻炮 各半兩

右末研細水煮麵糊圓麻子大每服貳圓加至參圓止溫酒

送下

**頂上圓**治積氣塊痛久年脾積瘕瘕之疾

木香 丁香 淡豉 硃砂醋浸半日

朱砂研細 巴豆去油 各一分半

右末陳米飯為圓桐子大輕者壹圓重者貳圓臨睡先嚼煨薑如指許嚥下次以冷熱水吞藥不得嚼破上項兩圓子請

酌量用

**揚氏麝香圓**治停宿積聚能尋諸處痛凡膀胱氣脇下痛最難

治此藥主之

麝香 一分 木香 胡椒 各一兩 全蝎 去毒微炒

巴豆去皮心 各四分

右為末湯泡蒸餅糊圓麻子大朱砂衣每參圓常服熱水下  
心腹痛研煨薑泡湯下血痛炒薑醋泡湯下腎氣脇疼茴香  
酒下大便秘蜜湯下

**攝一湯**治諸氣攻刺及感受風寒暑濕初證通用凡酒食

所傷中脘妨滿嘔吐吞酸悉療之

陳橘皮洗淨新汲水煎服屢效

**氣塊丸**治飲食傷冷心下結塊狀如伏梁又攻左脇

車螯殼 蛤蜊殼並燒灰存性 乾薑生

官桂 甘草各一分

諸氣

右為末每服貳錢臨發時沸湯點服車螯蛤蚧殼治塊

紫蘇莖葉兩三半夏製 枳殼製各一兩 青皮去白

陳橘紅 大腹皮 桑白皮炒 木通去節

赤茯苓 南木香 檳榔 蓬莪木煨

麥門冬去心 桔梗 辣桂 香附

藿香各一兩 甘草炙一兩

右劉散每服參錢水大盞薑參片棗貳枚燈心拾莖煎茶分

不時服里人瘴瘧經年虛腫腹脹食不知飽以此藥吞

圓見浮腫門 初則小便數次後則大便及通其病頓愈

新刊仁齋直指方卷之五

淡白芍藥 大腹皮 枳殼 桑白皮 木通 檳榔 蓬莪木 香附 辣桂 桔梗 麥門冬 甘草 藿香 參 錢 水 大 盞 薑 參 片 棗 貳 枚 燈 心 拾 莖 煎 茶 分 不 時 服 里 人 瘴 瘧 經 年 虛 腫 腹 脹 食 不 知 飽 以 此 藥 吞 圓 見 浮 腫 門 初 則 小 便 數 次 後 則 大 便 及 通 其 病 頓 愈

# 心氣

脾胃

心疼方論

紫芝奪朱相去一間耳而毫釐疑似實霄壤焉夫心為五官之主百骸之所以聽命者也心之正經果為風冷邪氣所干果為氣血痰水所犯則其痛掣背脹脇胃煩咽乾兩目赤黃手足俱青至節朝發而暮殂矣然心之包絡與胃口相應往往脾痛連心或陽虛陰厥亦令心下急痛或他臟之邪亦有客乘於心者是則心之別脉受焉如所謂九種心痛一虫二疰三風四悸五食六飲七冷八熱九去來者皆是也真心果痛不知能愈否乎然則執劑之法將何如曰熱者涼之寒者溫之感受風邪者散之順氣調血逐水豁痰此其要略耳蘇沈內翰有方目曰沉麝

**圖**凡心脾疼痛隨試輒効他如**延胡索****五靈脂****信延****當歸****乳香****沒藥****沉香****木香**等輩皆的對藥也臨機應變學者亦當察其微

心疼證治

**沉麝圓**治心脾氣血諸痛 方見血類

**和劑七氣湯**治七氣相干心下疼痛 方見氣類

**沉香降氣湯**治陰陽不和心腹刺痛 方見氣類 加此**乳香**為佐

**大沉香圓**治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香 乾薑炮 薑黃洗曬 辣桂

檀香 各肆兩 白豆蔻仁兩 白芷 甘草燼

甘松洗焙 天台烏藥各半斤 香附淨鹽

右末煉蜜圓如大彈子每壹圓食前薑湯嚥下或薑參片略煎服

**蘇合香圓**治卒心痛 方見喉門 用生薑搗皮湯調下

**桂枝四七湯**治風冷寒邪客搏心腹作痛

桂枝 白芍藥 半夏各一兩 白茯苓

心氣

厚朴製 枳殼製 甘草各半兩 人參

紫蘇各一分

右劉每服肆錢薑朮片棗貳枚食前煎服

**勝金丹** 治心下痛

桂枝 延胡索炒 五靈脂 當歸等分

右為末每服叁錢水壹盞酒叁分同煎食前服

**靈脂酒** 治心腹卒痛

川五靈脂去砂石略炒

右為末每貳錢溫酒調下加延胡索炒 尤妙

**生地黄膏** 治熱氣乘心作痛

石菖蒲半兩 北前胡 赤茯苓各三分

右為末蜜壹盞生地黄汁壹盞夾研為膏每服彈子大紫蘇煎湯食後調下

**靈砂丹** 治冷氣乘心作痛

好靈砂三分 川五靈脂二分

右研極細稀糕糊圓麻子大每服貳拾圓食前石菖蒲生薑煎湯下或用**五丹**方見血類或用**麥正丹**方見癩冷門須

審其脉證虛冷乃可用脾家必痛亦可擇用

**薑桂散** 治心腹刺痛

良薑 辣桂等分

右為末每服貳錢米湯乘熱調下

**生薑散湯** 治中脘氣滯心下引痛

辣桂壹兩 生薑母半兩 枳殼二兩

右為末每服叁錢新水煎服

**活痛圓** 治九種心痛

五靈脂 木香 當歸 蓬莪朮煨 生乾薑三分 各半兩

右為末煉蜜圓桐子大每貳拾圓食前橘皮煎湯下

心氣

心氣

心腹痛方

草果

延胡索

靈脂

沒藥

右末酒調壹貳錢腹痛手拈却



脾胃

脾疼方論

氣血痰水皆能作痛而食積傷脾風冷入脾與夫脾間虫動其為痛也居多氣血痰水食積風冷諸證之痛每每停聚而不散惟虫痛則乍作乍止來去無定又有嘔吐清沫之為可驗焉俗謂脾家疼痛出於胃虛大率用養脾之劑而不知受病各有自來苟不能推究其原則和養等劑掩護邪氣非徒無益而又害之况夫風冷入脾尤念慮之所不到至有在再歲月而不可揣度者有一田夫醉飽之餘露星取快一枕天明自此脾疼攻刺百藥罔功淹淹數載後遇至人授以和劑抽刀散温酒調下數服頓愈則知風露之根入胃良薑為能散其邪巴豆借氣為能伐其根觀此可以通一畢萬矣然而痛不復作養脾之劑獨不可繼是調理之乎療病如濯衣必去其垢汚而後可以加漿飾醫言意也請借是以為喻

脾疼證治

良薑抽痛散治脾疼妙甚

良薑切作大片先用良薑湯浸火炒少頃次入東餅當日良薑切作須無兩更者同炒以米醋洒同炒至菜更黑

右只用良薑為末每服壹錢温米飲調空心服

和劑抽刀散治脾胃積冷中滿疼痛

川白薑伍兩 石薑蒲伍兩半  
伍兩 同炒至巴豆 去巴豆  
良薑伍兩 糯米六兩  
伍兩 同炒至 炒黃

右為末每服貳錢空心温酒調下

調痛散治脾疼氣隔

木香 丁香 檀香 大香附

脾胃



天台烏藥 蓬朮根

辣桂

片薑黃

生白薑

白豆蔻仁

縮砂仁

甘草各一分

右劉每服貳錢半紫蘇肆葉煎服

**桂枝散**治脾積氣痛

香附伍兩炒去毛蓬朮醋煮

良薑

甘草各一兩

桂花一兩

右末每貳錢薑壹點沸湯熟調食前服

**穢跡脾瘕方**

香附淨

良薑等分

右為末每服貳錢空心陳米湯熟調服

**沉麝酒**治氣血攻刺脾疼

方見心疼痛類

**和劑七氣湯**治痰水攻脾作痛

方見氣門

**夾和劑流氣散**煎亦

得方見脹滿門

**蘇合香圓**

方見喉門

**夾和劑圓**

方見脹滿門

等分用**沉香降氣**

**湯下**方見諸氣門治食積脾痛

**獨桂湯**治風冷入脾逆氣上攻作痛

辣桂去麩皮

右細劉每貳錢食前煎服或為末紫蘇煎湯乘熱調下腹痛

通用

**薑桂散**治風冷入脾作痛

方見心疼痛類**薑桂散**治心腹痛方見

**瀆瀉散**治虫動脾痛乍去乍來嘔吐清沫

雞心大檳榔

貫衆各二分石菖蒲

木香各一分甘草炙一分

右劉每叁錢水煎空心吞**靈砂**拾圓或**金液丹**蓋靈砂金液

有**流瀉散**能殺虫也

**金液丹**壯陽道建胃氣除冷瘕殺諸虫

好硫黃

拾兩飛煉火砂石研細末入磁合水調服

合在上再通固濟慢火煮一日

右藥壹兩用蒸餅壹兩湯浸搗去水為圓桐子大每參拾圓空心米飲下

**二物湯**治脾痛

雞心大檳榔

良薑等分

右細剉每服參錢陳米百粒煎服

**乾薑甘草湯**治脾中冷痛嘔吐不食

川白薑微炒

甘草炙

右剉散每服貳錢大棗壹枚同煎食前溫服

**脾痛方**治脾痛脹滿

大草果一箇去殼

右剉用酒煎痛時服酒能飲壹盞以兩盞煎壹盞能飲兩盞

以參薑煎兩盞飲其中節也

**脾痛氣痛方**

良薑

陳皮各半兩丁香

石菖蒲

一七五方六

一五

甘草炙各一分

右剉散每服參錢水大盞煎捌分入雞舌香散貳錢再煎少

頃瀝清汁服

和胃證治

**治中湯**

方見嘔吐門

加肉豆蔻縮砂溫脾止痛

**沉香磨脾散**治脾胃虛寒腹中脹痛

人參

沉香各一分丁香

檀香

木香

白豆蔻

縮砂仁

半夏麴

辣桂

烏藥各半兩

藿香葉三分

甘草炙三分半

右細剉每參錢薑伍片棗貳枚煎服

**安胃散**開胃和中止嘔進食

人參

白朮

木香

檳榔

丁香

半夏麴

肉豆蔻煨

橘紅

藿香

白茯苓

青皮

甘草炙二分

脾痛

右劉散每參錢薑肆片煎服

**人參開胃湯**助胃進食

人參

橘紅

丁香

木香

藿香

神麩炒

麥蘖炒

白朮

茯苓

縮砂仁

蓮子肉

厚朴製

半夏麩

甘草等分

右劉散每參錢薑肆片煎服

**助胃膏**治嘔吐不食

人參

白朮

白茯苓

橘紅

縮砂仁各一

木香

丁香

肉豆蔻微煨

草果仁各半

白豆蔻仁青錢

右末煉蜜圓彈子大每壹圓薑參片煎湯下

**宮方七香圓**消食快膈和胃止痛

木香

丁香

檀香

甘松淨

丁皮

橘紅

縮砂仁

白豆蔻仁

三稜醋煮

蓬朮醋煮焙乾

大香附炒去毛

右為末研米糊圓黍豆大每參肆拾圓薑湯下

**丁香半夏圓**治脾胃宿冷嘔吐痰水噎悶吞酸

人參

丁香

木香

肉豆蔻

陳橘紅各一

藿香葉半兩

半夏湯洗藥次用薑汁

右細末薑汁煮麩糊圓小豆大每貳拾圓薑湯下

**千金五香圓**治胃虛膈滿宿滯不消停痰留飲頭眩臂疼碎露

露風冷嵐瘴之氣

南星每箇切

半夏切破各二兩

以水同浸三日逐日換水

良薑

乾薑炮

白朮

茯苓各一兩

丁香

木香

青皮

橘紅各半兩

右末用**神麩**壹兩**大麥蘖**貳兩同末為糊圓桐子大每伍柒

拾圓米湯下

# 痰涎

水飲 嘔吐

痰涎方論

惟氣與血能生諸病痰亦如之夫痰者津液之異名人之所恃以潤養肢體者也血氣和平關絡條暢則痰散而無氣脉閉塞腕竅凝滯則痰聚而有痰之所以發動者豈無自而然哉風搏寒凝暑煩濕滯以至諸熱蒸鬱飲食生冷煎炒腥羶鹹藏動風發氣等輩皆能致痰也是痰作恙為喘為嗽為瀉為嘔為眩暈為風癇為狂迷為松悸或吞酸或短氣或痞隔或腫脹或寒熱或疼痛痰實主之人知痛生於氣血孰知痰涎流注亦能纏滯而為痛乎如頭風證眉稜耳角俱痛殺以風藥不效投以痰藥收功如患眼證赤腫羞明而痛與之涼劑弗瘳與之痰劑獲愈如酒家手臂痛重時或麻痺

**二陳湯**加**片子薑黃**下**白圓子**

**蘇合香丸**每每就安如聞家胃骨撲傷刺痛無已散血之劑罔功續以自已溲便飲之須臾吐痰其痛立止此皆痰涎作痛之明證也然而頑痰滿胃上脘填塞其高者因而越之法當從權取吐或者津液不守所以痰多吐甚痰脫則精竭而斃矣療痰之法理氣為上和胃次之若風若寒若濕若熱如前數者亦當推尋所受之因和胃謂何涎者脾之液也脾胃一和痰涎自散故治痰多用**半夏**蓋**半夏**能利痰故也

痰涎證治

**橘皮湯**治胃膈停痰

半夏各五兩

茯苓

陳皮各三兩

細辛

青皮

桔梗

枳殼各

甘草各

人參

旋復花各五兩

右剉散每服三錢姜伍厚片煎服

**前胡半夏湯**治痰盛

痰涎

北前胡 半夏製 伏苓 各一分 陳皮  
木香 紫蘇 枳殼製 甘草 各一分

**人參飲** 治痰亦治嗽

人參 桔梗 半夏麩 五味子  
細辛 枳殼製 赤伏苓 各一分 甘草 半份

右判散每服參錢薑伍片煎服痰嗽加**紫苑**添**貝草**

**生薑湯** 治痰去風

圓白南星 半兩者薑 老生薑 各錢半

右各切片以水三盞磁器內煎取其半逐旋溫服

**二聖飲** 治風痰

南星 半夏 各兩

右用生薑壹斤擣取自然汁浸藥磁器盛之頓在鍋內隔湯熬炆令薑汁盡焙乾為末每挑二錢匕**生薑湯**少許煎湯

調下或用糕糊小圓薑湯下參拾圓入煨**白礬**少許同圓亦得

**大半夏湯** 治痰飲

半夏製 伏苓 生薑 等分

右剉碎每服參錢水貳錢煎至一小盞溫服如熱痰加**甘草**少許胃不和去**白草**加**陳皮**

**半夏圓** 消下痰涎

圓白半夏 老生薑 等分同搗研

右為末煮薑汁為糊圓桐子大每參拾圓薑湯下

**豁痰圓** 治頑痰壅盛

南星 各兩 半夏 兩 各制作大片用麩皂

白附子 川靈脂 直僵蚕 各一分 華陰細辛

白礬 各兩 全蝎 各半

右為末皂角漿煮麩糊為圓桐子大每貳參拾圓薑湯下

**神木圓** 治痰飲妙

茅山蒼朮 青斤米由

生油麻 研細取油 大棗 拾伍箇取肉

右末為圓桐子大日乾每伍葉拾圓空心溫湯下

**辰砂化疔驅風化痰**

辰砂 研細 白礬 各半兩 半夏 各半兩 南星 各半兩

右為末薑汁調麩黃糊圓桐子大別用朱砂衣每拾圓薑湯

下小兒風痰壹貳圓

**強中二圓** 溫脾胃消痰痰

良薑 乾薑 青皮 陳皮

大半夏 切開洗淨 南星 半兩

古為末薑汁調麩黃糊圓桐子大每叁拾圓薑湯下

**養神丹** 治腎虛氣不歸元痰涎上壅亦治寒痰每服貳拾圓用

降氣湯 送下

**陳湯吞白圓** 治痰飲一證眉心眉梁骨痛狀

加頭風

**陳湯** 加 **木片子薑黃** 製 **枳殼** 各少許治酒麩積

毒熱生痰攻眼腫痛

**陳湯** 喘嗽通用

號丹 白礬 各貳兩

右以錢王博刺壹大孔先入 **鹽** 次以 **白礬** 蓋頂用炭壹斤

煨至火盡礬枯丹黑出火毒研細者稀麩黃糊圓麻子大每服

拾伍圓沸湯泡生薑汁送下諸頑痰迷塞關竅不通聲音不

出以叁拾圓研末入 **全蝎** 少許用自然薑汁澄取清者調灌

真足吐痰立愈九端伏胃腸澎拜寸脈急數須從權吐之中

**解毒雜黃圓** 治見 **雜毒**

# 水飲

水飲方論

痰涎

水之與飲同出而異名也。人惟脾土有虧，故平日所飲水漿不能傳化，或停於心下，或聚於脇間，或注於經絡，或溢於膀胱。往因此而致病矣。孰謂血氣凝滯，能生諸疾，而水飲之不能為恙乎？惟水與飲漉漉有聲，為喘為嘔，為泄為痞，隔為脹，滿為眩運，為怔忡，為寒熱，為堅痛，為浮腫，為多唾，為短氣，為體重，氣為飲，隔為滿，腹鳴，骨痛，冷痺，則曰氣分，經脈不行，血化為水，四肢紅腫，則曰血分。凡此等類，皆水氣之所由作也。據病驗證，可不究其所受之原乎？然則療治之法，將何先？曰能以表裏虛實訂之，斯得矣。表有水者，其身涼，嘔嗽痞滿，引脇痛硬，下之汗之而愈。裏有水者，其身熱，嗽喘怔忡，乾嘔微利，下之而安。虛者，脈虛，心腹滿而濡，當以白朮、蒼朮為主。實者，脈實，心腹滿而硬，當以青木香、枳實為主。用枳實、厚朴、白朮、大柴胡湯，以導之。尋常水氣，心下怔忡，大半夏湯，小半夏湯，皆治之。五苓散，董通用可也。然而瘧家多積黃水，或於心下停滯，或於脇間結癖，惟癖為能生寒熱，所以瘧劑多用常山。蓋水在上焦，則吐之，水不在於上焦，則常山亦能破其癖而下其水也。若夫水腫證候，亦此種類，詳見于後，請旁參而互攷焉。

水飲證治

方夏湯 逐水利飲通用

川芎

半夏

茯苓

青皮

陳皮

枳殼

白朮

甘草

右劉散每服冬錢壹伍厚片煎服。川芎、半夏能逐水也。○喘

加去節、厚朴、嗽加炒、白朮、○嘔加、半夏、○泄加、蒼

朮、白朮、○痞隔加、枳殼、○脹滿加、縮砂、○眩運

加、半夏、○怔忡加、白朮、○寒熱疼痛下其癖浮腫體

重滲其濕餘以類推

大半夏湯 亦是痰飲門

治諸水氣

半夏五兩

茯苓各三兩

右劉散每服參錢水貳盞半煎盡秤生薑貳錢半研取汁入藥煎沸溫服

**五苓散** 流行水飲 方見藥門 每貳錢沸湯調下小便更不利加

**防已** 佐之

**桂枝湯** 治氣分前證

桂枝各三兩

白朮

麻黃去毒

細辛去苗

甘草各兩

枳殼製

乾薑炮

各壹兩半

右劉散每服參錢煎服

**桂枝湯** 治血分前證

桂枝

赤芍藥

當歸

川芎

赤芍藥

蓬莪朮

京三稜

檳榔

蒼朮炒

桑白皮炒

大腹皮

瞿麥穗

青皮

陳皮

甘草炒

各半兩

水飲

大黃各壹分

右劉散每服參錢薑伍片煎服

**平肺湯** 肺與腎皆以至陰積水喘噎咳嗽蓋水乘之

葶藶

桑白皮炒

北梗

枳殼製

紫蘇莖葉

半夏製

麻黃去毒

甘草半兩

右劉散每參錢薑伍片煎服治腎水用**胃大散**

**胃大散** 治表不解有水氣發熱乾嘔怔忡咳嗽微喘微利

麻黃去毒

細辛

芍藥

乾薑炮

甘草

桂枝

五味子貳兩

半夏製

右劉每服參錢水壹盞半煎盡溫服

**十藥湯** 治表解裏有水身涼汗出乾嘔短氣微嗽微利心下痞

滿引脇硬痛

芫花

大戟

甘遂各一分

石件異歸經末合和入乳鉢研良久以肥棗拾箇擘開用水



壹碗煮爛取汁壹盞調藥壯者服壹錢重弱者服半錢重平  
日溫服別用棗湯漱下通利即以糜粥自養未利明日再服  
半錢請酌量用

**安腎圓**

治腎氣不足膀胱虛冷

川烏炮去

辣桂各肆兩

白朮

石斛酒炒

白蔞剉去

茯苓酒浸

桃仁去皮尖

車釐

山藥

破故紙各拾兩

右末煉蜜圓如桐子每伍柒拾圓益湯空心服

**青木香圓**

行滯通水

青木香五兩

菓澄茄

補骨脂炒

檳榔各肆兩

牽牛

陸拾兩炒香  
取末參拾兩

右為末滴水圓菜豆大每貳拾圓熱水下

**和腸圓**

治皮膚水氣

方見諸氣類

**和腸圓**

和腸三焦治痞脹浮腫

方見諸氣類

**伏苓**

**伏苓**

伏苓

乾薑各叁兩

白朮剉兩

枳實半兩

右末煉蜜圓桐子大每拾伍圓米飲下

**白朮**

白朮肆兩

辣桂

乾薑各肆兩

右為末煉蜜圓桐子大每服貳拾圓米飲下此二藥可以溫

中消水

**嘔吐**

嘔吐方論

嘔吐出於胃氣之不和人所共知也然有胃寒有胃熱有痰水  
有宿食有膿血有氣攻又有所謂風邪入胃凡是數者可不一究  
其所自來哉寒而嘔吐則喜熱惡寒四肢清法當以剛壯溫  
之熱而嘔吐則喜冷惡熱煩燥中乾法當以溫涼解之痰水

者嘔吐怵怯先渴後嘔與之消痰逐水葷酒食證者胃腹脹滿  
醋悶吞酸與之消食去積黃腫氣燥氣重多惡心此膿血之聚  
經所謂嘔家有癰膿不須治膿盡自愈是爾七情內鬱離隔不  
平此氣攻之證經所謂諸鬱于胃則嘔吐是爾若夫風邪入胃  
人多不審率用參藥助之攔住寒邪於此尤關利害其或惡聞  
食臭渴水不下粥藥不納此則翻胃之垂絕者也辯之不早其  
何以為對治乎雖然足陽明之經胃之絡脉也陽明之氣下行  
則順今逆而上行謹不可泄固也然嘔吐者每每大便秘結上  
下壅滯氣不流行蓋思所以區畫而利導之他如汗後水藥不  
入口者逆嘔而脉弱小便復利身微熱而手足厥者虛寒之極  
也識者要焉

嘔吐證治

附子理中湯治寒證嘔吐方見寒類

二薑湯治寒證嘔吐

良薑 木香 丁香 各貳錢半

甘草 壹錢半

右劉散每服參錢水盞半煎半食前服

三姜湯治冷延嘔吐陰證乾嘔通用

吳茱萸 生薑 各錢

人參 參分 大棗 五箇

右劉細每服肆錢水盞半煎半食前服

小柴胡湯多加白薑治熱證嘔吐方見血脈

或加烏梅亦得

大半夏湯治痰證嘔吐

半夏 肆錢 人參 肆錢 切片

右每肆錢薑茶片蜜少許熟煎服

金匱云嘔家用半夏

以去其水水去則嘔止

**合中湯** 治食證嘔吐

人參 白木 乾薑 甘草

青皮 橘紅

右到每服參錢棗壹枚煎服積聚大便秘者加**大黃**二錢許

**陳湯** 方見塵類 加**縮砂** 丁香 治宿食嘔吐

**神黃湯** 治膿血嘔吐

生地黄 洗焙 川芎 各壹兩 半夏 製 甘草 炙 各叁分

南星 盪洗 芍藥 白芷 伏苓

北梗 前胡 知母 人參 各半兩

右到每服參錢半薑伍片烏梅壹箇煎服

**加減七氣湯** 治氣鬱嘔吐

半夏 製 人參 棘桂 厚朴 各壹兩

伏苓 言兩片 甘草 半兩

右到散每參錢半薑柒片棗壹枚煎服加**木香**亦得

**霍香正氣散** 治風邪入胃嘔吐

半夏 製 川厚朴 藿香葉 橘紅 各壹兩

甘草 炙

右到散每參錢薑柒片棗壹枚食前煎服又**養胃湯** 方見案

通用

**木香豆蔻散** 治翻胃嘔吐

人參 木香 肉豆蔻 各半兩

白豆蔻仁 青木 甘草 炙

右麩末每參錢薑棗煎服

**參橘湯** 治翻胃

人參 真橘紅 石蓮肉 各半 透明乳香 各錢半

右末每壹錢薑湯煎服

**丁香養氣散** 治翻胃嘔吐

丁香 石蓮肉 蘇合 北棗 生薑 各半

嘔吐

黃秫米半合洗

右水椀半煮稀粥去藥取粥食之

**附子散** 治弱證翻胃

大附子

壹枚作兩截中各刻一孔入酒肆拾枚並塞滿以竹筒合置專治火腐四圍碎薑汁半椀為度去皮切焙

右並末每壹錢半粟米壹捻北棗貳箇煎食前服

**養正丹**

大治停寒留飲聚涎翻胃嘔吐

方見病冷門

添薑煎下

**康湯**

嘔吐家多大便秘結虛冷者用**靈砂**或**養正丹**溫而利之又**蘇**

**合香散**

方見嗽門

用肆分**感應丸**

方見脹滿門

用陸分夾研作

細圓薑汁泡沸湯下此亦溫利若大便執結用蜜煮凝捻作指

錠納後部導之或用**真附子**壹枚取汁入**法附**少許以筆蘸滴

灌於後部或燒**白**於桶內熏穀道或用**連根葱白**壹握**藥**

伍拾粒搗細作餅焙熟和**輕粉**掩臍續以葱椒煎湯熏盪身下

**翻胃方**

**橘皮湯** 治翻胃嘔吐

真橘皮用日曬四方壁土炒香取橘皮為末

右每貳錢薑棗略前服

**蓮肉湯** 治翻胃

石蓮肉為末入些**肉豆蔻**末米湯乘熱調服貳方患痢禁

口通用

**溫胃散** 治久冷翻胃

真附子

壹斤大極慢火同煮至水盡取附子切焙

右為末每壹錢空心溫米湯調下

# 咳嗽



喘嗽 聲音

## 咳嗽方論

江流滔滔日夜無聲狂瀾激石不平則鳴所以咳嗽者痰塞胃脘氣逆不下衝擊而動肺耳然亦何以致此哉曰感風傷冷挾熱受濕痰血停水與夫肺實肺虛皆能壅痰而發嗽也夫肺為嬌臟外主一身之皮毛內為五臟之華蓋形寒飲冷最易得寒燥氣鬱蒸最易生熱惟其易為冷熱所以內外交侵動則邪氣窒塞矣此非不平而鳴乎感風者鼻塞聲重傷冷者淒清怯寒挾熱為佳煩受濕為纏滯痰血則膈間腥悶停水則心下怔忡或實或虛痰之黃白唾之稀稠從可知也治嗽大法肺脈浮為風邪所客以發散取之肺脈實為氣壅內熱以清利行之肺濡散為肺虛以補肺安之其間久嗽之人常經解利以致肺胃俱寒飲食不進則用溫中助胃加和平治嗽等輩至若酒色過度虛勞少血津液內耗心火自炎遂使燥熱乘肺咯唾膿血上氣涎潮其嗽連續而不已惟夫血不榮肌故邪在皮毛皆能入肺而自背得之尤速此則人參言歸所不可無一種傳注病涉邪惡五臟反尅毒害尤深近世率用蛤蚧天靈蓋桃柳皮月砂等藥實屬香燥合宜通神之劑然則咳嗽證治於此可以問津索途矣抑猶有說焉肺出氣也腎納氣也肺為氣之主腎為氣之藏凡咳嗽暴重動引百骸自覺氣從臍下逆奔而上者此腎虛不能收氣歸元也當以補腎固本為主之母徒從事於寧肺諸氣諸痰咳嗽喘壅之煩須用枳殼為佐枳殼不惟寬中又能行其氣氣下痰下他證自平

## 咳嗽證治

麻黃 去節 紫蘇子 炒 杏仁 炒 去皮尖 橘紅

麻黃 去節

紫蘇子 炒

杏仁 炒 去皮尖 橘紅

桑白皮炒 赤茯苓各壹兩 甘草炙

右細剉每服貳錢半薑棗煎食後服隨意加製半夏添姜煎

**加減麻黃湯**治肺感寒邪咳嗽

麻黃去節 辣桂 甘草炙 杏仁伍拾粒 陳皮去粗

陳皮 半夏製

右細剉拌和杏仁每叁錢杏仁薑棗肆片煎服

**溫肺湯**治肺虛感冷咳嗽嘔吐痰沫

乾薑 辣桂 甘草炙 半夏製

陳皮 北五味子 杏仁去皮 細辛

阿膠炒

右麗散每貳錢半薑棗煎服

**三拗湯**治寒燥不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃不去節 杏仁不去皮 甘草不炙

右剉散每貳錢半薑伍片煎服

**余蘇草散**治上壅執嗽

荆芥穗貳兩 旋覆花去梗 麻黃去節 北前胡各壹兩半

半夏製 赤芍藥 甘草炒

右細剉每貳錢半加炒葶藶半錢薑肆片煎服如咽喉焦燥

加朴消食後又治傷風鼻塞涕流壅嗽若聲啞嗽不止兼服

**人參身花膏**

**人參身花膏**

欵冬花 紫苑茸 人參

北五味子 桑白皮炒

右為末煉蜜圓小彈大含化壹圓或淡薑湯嚥下若身熱口

乾兼服天麻防風圓

**天麻防風圓**

人參 天麻 防風各壹兩 全蠍炒

直僵蚕炒 朱砂研 雄黃研 甘草各壹分

咳嗽

牛黃壹錢 麝香壹分

右細末煉蜜圓桐子大每貳圓紫蘇薄荷湯嚙下

前胡 荆芥 桑白皮炒 甘草炙

枳殼製 各壹分 知母 貝母去心炒 腦荷

赤茯苓 北梗 紫蘇 阿膠炒

杏仁去皮 天門冬去心 各半兩

右剉散每叁錢薑參片壹枚食後煎服如更內實與

黃連壹兩 治肺熱或咯血

黃連壹兩 赤茯苓壹兩 阿膠壹兩

右黃連茯苓同末水調阿膠和衆手圓桐子大每叁拾圓食後米飲下

不與金下氣散治傷濕咳嗽方見寒類加

天圓膠圓治肺虛客熱咳嗽咯血嘔血

阿膠炒熟 地黃半 白茯苓 北五味子

山藥各壹兩 貝母去心炒 百部 栢子仁

伏神 丹參 杜仲去蘊皮 麥門冬去心

遠志煨去心 人參 防風各壹分

右細末煉蜜圓彈子大每壹圓少水略煎食後臨卧服或

乘肺黑豆入煎汁與之

治上焦有熱壅血腥悶嗽聲連併氣不得透

腦荷 北梗 川芎 防風

桑白皮炒 黃芩 北前胡 柴胡

紫蘇 赤茯苓 枳殼製 各壹分 甘草炙 壹分半

右剉細每叁錢薑棗煎服或嚙亦

小青龍湯治表證水氣身熱喘乾嘔怔忡

咳嗽

氣身涼咳痞滿脇痛逆證方見水飲陰

**真武湯**治少陰腎證水飲與裏寒合而作嘔腹痛下利

白茯苓 白朮 芍藥各壹兩 熟附子半兩

右剉散每貳錢半加白芍藥 各半錢姜參片食

前服九年高氣弱久嗽通用仍間服卷中

**補肺湯**治肺虛氣乏久嗽

阿膠炒 真蘇子 北梗 半夏製

甘草各半兩 欵冬花 紫苑 細辛

杏仁去皮焙 陳皮 桑白皮炒 青皮

縮砂仁 五味子 石昌蒲 草果各壹分

右剉散每參錢姜肆片卷中 參葉煎服

**理中圓**補肺止寒嗽

人參 乾姜 白朮 甘草各等分

右末煉蜜圓彈子大每壹圓加炒白朮 煎服

**加味理中湯**治肺胃俱寒咳嗽

人參 白朮 乾姜不炒 甘草灸

半夏製 伏苓 橘紅 細辛

北五味子等分

右細剉每服貳錢半薑棗煎食前服曾經解利者通用

**養胃湯**方見寒類 **人參白朮膏**方見前 二藥兼服治肺胃俱寒

作嗽或煎人參飲嚥下 **大阿膠圓**亦可

**人參白朮**咳嗽痰壅通用

人參 北梗 半夏製 五味子

細辛 枳殼製 赤伏苓 杏仁各壹分

甘草灸半分

右細剉每參錢薑伍片卷中 半筒食後煎服

**養肺湯**治肺壅上氣痰嗽

人參 紫苑 赤伏苓 杏仁不去皮

咳嗽



真蘇子 陳皮 桑白皮炙 款冬花  
半夏麴 北梗 甘草炙等分

**寧嗽湯** 諸嗽通用  
右為麴末每冬錢薑肆片烏梅平箇食後煎服寒者加鹽

桑白皮炒 紫蘇 細辛 北五味子  
橘皮 半夏製 伏苓 杏仁去皮  
縮砂仁 枳殼製 北梗 甘草炒等分

右劉散每冬錢薑肆片烏梅半箇食後煎服  
**人參潤肺散** 治咳嗽喘急痰壅卓塞

麻黃去節 杏仁去皮炒 貝母去心炒 人參  
阿膠炒 甘草炙 橘紅 北梗各壹分  
右麴末每貳錢半冬葉煎服亦能發散小兒通用

**冷嗽寒痰方** 治寒痰冬葉煎服亦能發散小兒通用  
个同煎吞白圓冬拾粒

**加味** 治痰多咳嗽  
半夏製 伏苓壹兩半 陳皮 五味子各壹兩  
人參 細辛 甘草炙

右劉散每肆錢薑柒厚片煎服  
**南星散** 治風氣動痰發嗽  
生南星壹兩 枳殼製 細辛各半兩  
木香 甘草炙

右咬咀每服叁錢薑柒厚片慢火熟煎服  
**人參** 治虛勞少血津液內耗心火自炎燥熱乘肺咳嗽

咯血及血不榮肌動輒毛寒咳嗽  
當歸 川芎 白芍藥各貳分 人參  
半夏製 橘皮 赤伏苓 阿膠炒  
細辛 北五味子 甘草炙

右劉每服叁錢薑肆片棗貳箇煎服  
右劉每服叁錢薑肆片棗貳箇煎服

人參烏雞湯 大何參圓 方見前 兼服治腎虛勞嗽

人參胡桃湯 夾和定肺湯 方見前 治勞氣喘急

十寶散 治肺痿勞嗽久嗽

人參 欵冬花 鍾乳石 鵝管石 並生研

明礬 各貳錢 辣桂 甘草 各壹錢

右細末臨卧以少許嚥下兩次

養腎建中湯 方見濕門 加白芍 同煎空心吞

安腎圓 方見水飲門 治腎經虛寒咳嗽痰唾而色黯黑小腹動

氣作痛

消腫散 治肺有癰膿腥氣上衝嘔而咳嗽

生南星 壹兩 知母 貝母 去心炒 生地黃

阿膠 炒 川芎 桑白皮 炒 甘草 各叁分

防風 射干 北梗 天門冬 去心

腦荷 杏仁 不去皮 半夏 製 紫蘇葉

白芷 白及 各半兩

右剉散每肆錢薑柒片 薑壹箇食後煎服

雄黃散 治傳疰勞嗽肺管有虫令人喉癢

雄黃 安息香 各壹分 露蜂房 燒灰

桃仁 去皮炒 麝 少許

右為末每用壹錢白文藥入 研汁夾和臨卧含化仍燒

艾 以管子吸煙熏喉

蘇合香圓

安息香 貳兩 別為末用無蘇合香油 貳兩入安

白朮 丁香 青木香 白檀香

沉香 草撥 香附 苜子 煨取肉

烏犀 錫屑 朱砂 研水飛 各貳兩 薰陸香 龍腦 研 各壹兩

麝香 壹兩半

右為細末入研藥拌和用安息香膏并煉白蜜和劑每壹大

咳嗽

圓沸湯化下前氣血風類後諸痛嘔逆類並用此

蘇合香圓用

蘇合香圓用

噫逆即咳逆胃寒所致也

溫胃能解散胃中風邪

腎虛氣不歸元

方見諸虛門九咳嗽暴重覺氣從臍下逆奔而上者蓋

# 喘嗽

喘嗽方論

肺主氣也一呼一吸上升下降榮衛息數往來流通安有所謂喘惟夫邪氣伏藏凝涎浮湧呼不得呼吸不得吸於是上氣促急填塞肺腕激亂爭鳴如鼎之沸而喘之形狀具矣有肺虛挾寒而喘者有肺實挾熱而喘者有水氣乘肺而喘者有驚憂氣鬱肺脹而喘者又有胃絡不和喘出於陽明之氣逆真元耗損喘生於腎氣之上奔如是等類皆當審證而主治之肺虛肺寒必有氣乏表怯冷痰如冰之證法當溫補如自選回春之類是也肺實肺熱必有壅盛留滯外關上炎之狀法當清利如便如小半夏茯苓湯五苓散葶藶散葶陽明之氣下行今逆而

喘嗽

之寬中下氣如四逆湯桂枝湯葶陽明之氣下行今逆而上行古人以通利為戒如公孫龍散葶陽明之氣下行今逆而鎮墜助陽接真而愈者然亦不可峻驟且先與安胃圓

葶藶散

安胃圓

內金諸品非不主喘也如前治法大要究其受病之原至若傷寒發喘表汗裏下脚氣喘滿疏導收功此則但療本病其喘自安圓棧之士可以舉隅而反矣雖然喘有利下而愈者亦有因

瀉而殞者喘有數年沉痾而復發者亦有忽因他疾大喘而不救者汗出髮潤喘者為肺絕身汗如油喘者為命絕直視識語喘滿者不治諸有篤病正氣欲絕之時邪氣盛行多壅逆而為喘然則喘之危惡又安可以尋常目之

喘嗽證治

**元寶湯** 經年喘嗽通用常服屢效

- 麻黃 去節
- 橘紅
- 腦荷 各壹兩
- 辣桂
- 紫蘇
- 桑白皮 炒
- 杏仁 去皮尖
- 大腹子 連皮

甘草 炙 各半兩

右細剉每服參錢薑伍片烏梅薑醋水煎食後臨卧服或入童子小便半盞同煎尤妙

**定肺湯** 治上氣喘嗽

- 紫苑茸
- 北五味子
- 橘紅
- 杏仁 去皮尖
- 甘草 炙
- 真蘇子 炒
- 桑白皮 炒
- 半夏 製

枳殼 製等分

右細剉每參錢薑伍片紫蘇伍葉食後煎服

**調降湯** 治喘嗽

- 枳殼 製 壹兩
- 半夏 製
- 北梗
- 青皮
- 陳皮
- 真蘇子
- 檳榔
- 伏苓
- 葶藶 隔紙炒 各半兩
- 木香
- 白豆蔻仁
- 縮砂仁

紫蘇葉 各貳錢半 甘草 炙 叁分

右剉散每參錢薑伍片煎服

**杏蘇飲** 治上氣喘嗽浮腫

- 紫蘇葉 貳兩
- 五味子
- 大腹皮
- 烏梅肉
- 杏仁 去皮尖 各壹兩半
- 陳皮
- 北梗
- 麻黃 去節
- 桑白皮 炒
- 阿膠 各壹分
- 紫苑
- 甘草 炒 各壹兩

右咬咀每參錢薑伍片煎服

**五味子湯** 治寒喘

喘嗽

北五味子

杏仁去皮炒

橘紅各壹兩

麻黃去心壹兩半

甘草炙

生乾薑

辣桂各半兩

右麤末每服貳錢半蘇參葉煎服肺虛加炒阿膠喘甚加馬

人參治肺虛發喘氣乏

人參壹寸

胡桃肉貳箇去殼

右切碎薑錢伍片棗貳枚食後臨卧煎服蓋人參定喘帶皮

胡桃欽肺夷堅志方

三拗湯方見咳嗽門寒證喘者加生乾薑熱證喘者加生

瘦腦荷前單入少許

玉華散清肺定喘

甘草壹兩

桑白皮炒

炙門冬去心

馬兜零

半夏製

紫苑

杏仁去皮尖

貝母炮

百合

人參各半兩

百部

甘草各壹兩八分

右劉散每服貳錢半薑肆片大棗參枚煎服

喘嗽若小腹滿更加防已本方去麻黃加杏仁去皮參兩治水氣

神效湯治水氣乘肺動痰作喘身體微腫

葶藶隔紙炒杏仁去皮尖防已 郁李仁炒

真蘇子

陳皮

赤茯苓各半兩

右末煉蜜圓桐子大每參肆拾圓食後生薑紫蘇湯下

神效湯治水氣作喘

陳皮

北梗

紫蘇

人參

五味子

檳榔

桑白皮炒

半夏製

甘草炙等分

右劉散每服參錢薑伍片煎服

神效湯方見水飲門

神效湯治驚憂氣過上喘

神效湯方見水飲門

神效湯治驚憂氣過上喘

半夏製 伏苓製 厚朴製 紫蘇葉壹兩

右咬咀每服叁錢半薑柒片棗貳枚煎服

**消迷七氣湯** 方見身氣門

**二陳湯** 方見瘧類

**安腎圓** 方見水飲門 **八味圓** 見痢冷門 治腎虛上喘九

腎虛而喘須以**人參**為佐

**五靈圓** 治久喘

木香半兩 馬兜零去殼 葶藶微炒 川五靈脂貳兩半

右為細末煉蜜圓桐子大每貳拾圓杏仁三箇搥碎薑叁片煎湯下

煎湯下

**雄黃圓** 至誠修合治喘

雄黃研 白礬煨 木香 生葶藶各壹分

馬兜零去殼 雞內金 淡豆豉各叁錢半 信砒鋒芒者研生用壹錢半

右搥味各取實分數並細末研米漿煮糊圓如胡椒大每服

伍圓茶清稍冷臨卧送下加至七圓而止次日飲食勿用熱

**生嚼解** 治諸毒

**淫痰良方** 方見水飲門 治喘嗽

**靈砂** 壹兩 人參 木香各貳錢半

大香附并淨 大紅川椒去合口并子焙出汗各半兩

右細末糕糊圓麻子大每服貳拾圓空心食前橘皮湯下川

椒引氣歸元

# 聲耳立白

聲音方論

心為聲音之主肺為聲音之門腎為聲音之根風寒暑濕氣血痰熱邪氣有干於心肺者病在上脘隨證解之邪氣散則天籟鳴矣惟夫腎虛為病不能納諸氣以歸元故氣奔而上咳嗽痰

喘嗽

癰或喘或脹髓虛多唾足冷骨疼曾腹百骸俱為之牽制其嗽愈重其氣愈乏其聲愈乾君子當於受病之處圖之可也按錢氏方小兒吐瀉利其小便過多以致脾虛不食錢用益腎散作數數日以後忽爾不語錢知其脾氣已復腎氣尚虛投以益腎丸益腎相繼數劑於是能言余益信聲音之根出於腎也不誣矣。諸病不語或聲乾沉難以痊復餘見活人總括小兒疳症見小兒類

聲音證治

治風邪風毒纏喉不語

南星畧炮

生薑肆錢

橘皮叁錢

右剉每服叁錢紫蘇伍葉煎服

失音通用

荊芥

蘇葉

木通

橘紅

當歸

桂

石昌蒲

右等分剉煎肆錢服

兼服治傷風鼻塞流壅嗽聲啞熱證

通用方見喉門

治風寒邪氣留滯失音

辣桂半兩

石昌蒲貳錢

右剉每服貳錢半新水煎細呷

治風痊口噤不語項強背直身腰反張方附在濕門

治伏暑發熱汗渴暑入心胞不語方見血類加伏暑煎

治濕證聲啞加治寒證

聲啞

治氣隔聲沉

治血證心忪語短眩冒迷忘

生地黄肆兩

犀角

牡丹皮

芍藥各半兩

右剉每服肆錢入去皮尖赤粒煎服如無

**朱砂圓**治打撲驚悸血入心竅不語方見血類

**二圓**方見瘧類加**百圓**前吞**百圓**方見身治痰涎聲沉

**金櫻子**治失音亦治喉痺

槐花新瓦上炒香熟二更後床上仰臥隨意食之熱飲通用

**密陀僧**治大驚入心痰血窒塞瘖不能言亦治瘖風方見驚

**治瘖桃二湯**治狐惑虫食其臚上唇瘡其聲啞

桃仁浸去 槐子 艾葉各壹兩 大棗拾伍枚

右用水參麥煎至壹盞半分參次服

**人參平瀉湯**治腎虛聲不出

人參 川芎 當歸 熟地黄洗曬

白芍藥 白茯苓 兎絲子酒浸爛 北五味子

杜仲去籠皮剉薑 巴戟酒浸去 橘紅

半夏麩各半 牛膝酒浸焙 白朮 補骨脂炒

葫蘆巴炒 益智仁 甘草各壹兩 石昌蒲壹錢半

右剉細每服參錢壹伍片棗貳枚食前煎吞藥圓法拾粒  
方見漏濁門 五更頭腎氣開不得咳唾言訖默然再進上藥

功效勝常

**杏圓**治咳嗽暴重聲音不出

杏仁水浸去 冬蜜 砂糖 薑汁各壹盞

桑白皮去赤 木通 貝母去心各 北五味子

紫苑茸各壹 石昌蒲半兩

右後陸味剉以水伍升煎半去滓入**杏圓****糖圓**夾和微火煎  
取壹升半每服參合兩日夜服之

**木通湯**治諸風失音

木通 石昌蒲 防風 羌活

桑螵蛸 全蝎燒 直僵蚕炒 甘草各壹分

圓白南星畧炮半兩

右剉每服貳錢半藥圓伍葉薑伍片熟煎服





# 虛勞

附

虛汗 勞瘵

虛勞方論

蒙莊有言精大用則竭神大勞則憊。惜是可以論病矣。夫人所以根本。此性命者。氣與血也。若男若女。氣血均有。獨不能保而有之。終日役役。神倦力疲。飢飽越常。喜怒失節。形寒飲冷。縱慾恣情。遂使五臟氣血俱虛。此五勞之所從始也。六極七傷。類焉。故心家虛則便濁汗多。肝家虛則筋攣自眩。腎家虛則腰痛泄精。肺家虛則咳嗽。脾胃虛則嘔吐不食。日就羸黃。或乃胃熱消穀。飲食雖多。亦不生肌肉。而轉加瘦悴矣。前是數證。其間大抵心下引脇俱疼。蓋帶血不消。新血無以養之也。治法大要。潮熱者不可過用寒涼。秘結者不可驟與疎泄。咳嗽喘者不可妄施發散。咯血者不可錯認以為熱。但以滋養榮血為上。調平臟氣。次之。某病某藥。又於養血調氣之中而增益也。其或骨間有熱。以至四肢緩弱不舉。此則骨蒸。欲斯疾之有瘳也。難哉。雖然。當歸補腎丸。固養血之上藥也。亦當以益胃消痰輩佐之。蓋人以穀氣為本。所謂精氣血氣由穀氣而生。古人以五味五穀五藥養其病者。不無先後於其間也。當歸補腎丸。引痰。餘間諸虛不足。皆成勞瘵。此可療不可惡之疾也。其視傳症。壹種實。瘵焉。傳症者。挾邪精鬼怪之氣而作也。經曰。人有逢年月之厄。感鬼物之精。無夢不惡。沉默而不能的知。所若積歲漸至。委頓既往。復傳症於傍人。須用通神明去惡氣等劑療之。或者剽賊。剽犀。驅伐邪惡。飛丹煉石。引納清和。蓋為尸疰設也。前集咳嗽中亦略陳之。

又論

勞倦之疾。百脉空虚。非滋潤粘膩之物。以養之。不能實也。古方

用鹿角膠同煎牛乳治瘦弱血虛人參杏仁當歸熟地黃  
類正此意耳或者反施火火而消子燥熱等輩以致血氣乾  
涸心腎不交故火炎於上為痰嗽為咯血為心乾為五心熱水  
走於下為脚弱為遺精為赤白濁為小便滑數誤矣哉虛勞之  
脉大抵多弦或浮大或數皆虛勞之候也大者易治血氣未定  
可斂而正也弦者難治血氣已耗未易調補之若帶雙弦則為  
賊邪侵脾此尤難治加數劑則殆矣○**痰加**半夏發熱  
迴生或肚臍相對取背脊骨對正灸亦有驗艾柱亦不可多

虛勞諸治

**十補湯**

方見履冷門

虛勞通用嗽加**北五味子**痰加**半夏**發熱

加**柴胡**有汗加**白芍**虛寒加**乾薑**皆依元藥分兩稍不喜食則  
勿用

**健和湯**五勞六極七傷通用

白芍藥

當歸

川芎

黃耆

各半兩

熟地黃

洗

辣桂

甘草

各半兩

右鹿末每服參錢薑棗煎食前服或入**陳湯**同煎

**地骨皮散**治虛勞潮熱骨蒸壯熱

地骨皮

洗

秦膠

洗

柴胡

枳殼製

知母

生

當歸

柴胡

各半兩

川芎

半兩

甘草

各半兩

右鹿末每服參錢桃柳枝各柒寸薑棗三片烏梅壹箇同煎空

心臨卧各壹服潮熱甚加**大黃**微利之

**枳殼散**治虛勞大便秘澀

枳殼

洗

甘草

各半兩

杏仁

去皮

阿膠

炒

生地黃

各半兩

右細劉每服參錢薑伍片蜜參匙烏梅壹箇同煎先吞服

加味人參紫苑散治虛勞咳嗽

人參

北五味子

紫苑

陳皮

貝母 去心

紫蘇葉

桑白皮 炒

白伏苓 各壹兩

杏仁 去皮炒

甘草 各叁分

加川芎

半夏麴 各壹兩

阿膠 半兩

右龍末每服冬錢薑伍片棗貳枚烏梅壹箇食後煎服

**大阿膠圓**

方見嗽門 治虛勞嗽血咯血前血類等症

**意成湯**

人參湯 咳嗽門用人參 皆可煎湯嚼下肺熱加腦荷

**桑白皮**

人參湯 治虛勞少血肺熱嗽血 方見咳嗽門

地黃散 治骨蒸勞熱咯血

生地黄搗汁入生薑汁少許服之以熱退為度或利則止

**大寧湯** 勞嗽諸嗽通用神效

北五味子

伏苓

桑白皮 炒

紫蘇

細辛

橘皮

枳殼 製

杏仁 去皮炒

阿膠 炒

甘草 炙

罌粟殼 酥炒

半夏 製貳分

右判散每服冬錢薑伍片棗貳枚烏梅半箇食後煎服勞嗽

多加 圓

**遠志圓** 治虛勞驚悸神氣不寧

遠志 薑汁洗

伏神 去木

黃耆 炙

熟地黄 洗

人參 各壹兩

石昌蒲 半兩

當歸 叁分

右末粟米糊圓桐子大每貳拾圓米飲下

**龍齒湯** 治心怔驚悸常懷憂慮如人將捕小便或少或多或濁

半夏 製

辣桂 各貳兩

人參

白伏苓

甘草 炙

當歸

龍骨 研

北梗 炒

遠志 水浸

枳殼 各壹兩

黃耆 炙

伏神 去木

右末每冬錢薑伍片棗貳枚粳米百粒食前煎服

**養心湯** 治虛勞少血心虛多驚精神恍惚 方見

**養心湯** 治虛勞心氣不平小便頻濁 方見

鹿茸鹿茸圓子治勞損虛冷精血不足方見前冷門  
集驗鹿茸圓子治諸虛勞倦補養心腎滋益血氣

鹿茸炙 熟地黄 當歸酒浸焙 枸杞子

酸棗仁酒浸 遠志酒浸 附子炮 沉香

牛膝酒浸 山藥炮 茯苓酒浸 麝香半兩

右末煉蜜圓桐子大每伍拾圓空心鹽湯下

鹿茸鹿茸圓子補虛勞益心腎生精血

山藥炮 牛膝酒浸 白茯苓 山茱萸

舶上茴香炒 續斷 兔絲子酒浸

杜仲去膠皮 巴戟去心 茯苓酒浸

北五味子 栝實 遠志酒浸 熟地黄各壹兩

右末煉蜜圓桐子大每叁拾圓鹽湯下

黃耆十兩湯補虛勞養血氣

黃耆炙 當歸酒浸 熟地黄 伏神各半兩

白芍藥壹兩 人參 白朮 酸棗仁微炒

半夏製 陳皮 北五味子 肉桂

天台烏藥 甘草炙 麥門冬去心

木香 沉香各壹錢

右剉每服叁錢薑伍片棗貳枚食前煎服

鹿茸大補湯補虛損益氣血

人參 北五味子 當歸 白朮

白茯苓 熟地黄 白芍藥 黃耆炙

甘草炙 阿膠炒 續斷洗 半夏製

山藥炮 石斛 酸棗仁酒浸 栝子仁各壹兩

遠志酒浸 川白薑炮 辣桂半兩 鹿茸毛

右細剉每服叁錢半薑肆片棗貳枚食前煎服

黃耆六兩治虛勞自汗

黃耆炙 甘草炙 加白朮 白芍藥各壹兩

右麩末每服貳錢薑棗煎服

**當歸散**治虛汗盜汗

人參

當歸各壹分

右麩末分兩服以雄猪心壹箇新水煮熟取汁兩次煎藥空  
心臨卧服

**沉香散**治虛勞肢節疼痛方見身疼類

**參苓白朮散**治虛勞胃弱飲食不進

人參

白茯苓

白朮

甘草炒

山藥炮

白扁豆製

縮砂

桔梗炒

蓮子肉

薏苡仁各壹兩

右末每貳錢康薑薑煎服冷中湯方見嘔吐門**人參開胃湯**

方見脾疾門

**二陳湯**

方見癰疽類

可擇用

**桃仁散**治勞瘵傳尸骨蒸倦弱

大川椒出汗

生犀用

當歸

續斷各壹兩

桃仁去皮炒

鱉甲如多黃各

蛤蚧

壹對去頭足洗醃炙

木香

白礬煨

猪牙皂角

各半兩

安息香

蘇合香

雄黃各壹分

麝香壹銖

右末煉蜜圓桐子大每貳拾圓米飲下或用正**胡椒**泡湯下

**圓**治傳尸勞瘵最殺勞虫

正川椒

色紅而大者去合口并子以黃裨紙重托之於  
熱炒內瓶撥令出油取頓地上用砂盆蓋以火灰  
約壹時許

右碾末老酒浸白糕為糊圓桐子大每服參肆拾圓食前盪

湯下逐時常服滿壹斤瘵疾自瘥昔人服之日久取下勞虫

如小蛇狀即瘥此藥亦治痺疎通煎湯下治腰痛茴香酒下

治腎冷鹽湯下神妙

**圓**治勞瘵

生髮燒存性為末水調空心服此亦用枕骨之意蘇合香

**圓**方見諸氣門皆要藥也

黃耆益損湯治諸虛勞倦

肉桂

熟地黄

半夏製

甘草各參二分

石斛酒炒

當歸

川芎

黃耆參

白朮各壹兩

白芍藥各兩

北五味子兩

木香參錢半

右剉細每服參錢姜伍片棗貳枚食前煎服有熱加柴胡

# 虛汗

虛汗方論

汗者表虛而津液為之發油也夫人以衛氣固其表衛氣所以  
溫肌肉充皮膚肥腠理司開闔衛氣一虛則肌肉不溫皮膚不  
充腠理不肥而開闔失其司耳或昏或醒或浸而出者曰自汗  
睡困則出醒而復收者曰盜汗若風若暑若濕邪氣與衛氣相  
干以至喜怒驚恐嗜欲勞傷皆能致之表虛者與之黃耆芍藥  
**官桂**之劑邪氣相襲者與之微微解散之劑驚恐勞傷者養心

補腎之劑獨不可調理之乎然而人之一身負陰抱陽平則寧  
偏則病陰虛陽必湊故發熱汗出如水熱而湧陽虛陰必乘故  
發厥汗出如水溢而流要之汗者血之異名陽主氣氣為衛陰  
主血血為榮氣血二者俱不可一日緩矣抑余聞之汗出髮潤  
一不治也汗出如油二不治也汗凝如珠三不治也君子見幾  
辯之不可不早

虛汗證治

**建中湯**治表虛自汗

官桂參分 芍藥壹兩半 甘草炙半兩

右剉散每服肆錢姜伍片棗貳枚食前煎服本方加黃耆壹

兩名黃耆建中湯治虛勞自汗出當歸膏兩名當歸建中湯

治婦人血虛自汗其自汗漏不止者加遠志半兩熟地半兩

各連枝附子湯每服肆錢薑柒片棗貳枚空心中煎服

**六一湯**加白朮芍藥治諸虛自汗方見虛勞門

虛汗

當歸散 治虛汗盜汗

木芍湯 治虛汗盜汗

黃耆 防風 白茯苓 白朮

麻黃根節 甘草

右判細每服冬錢入小麥百粒同煎臨卧服加**牡蠣**亦得

**牡蠣散** 治諸虛體常自汗驚惕不寧

左顧牡蠣 麻黃根 黃耆

加白朮 甘草

右判每服冬錢**山麥**百餘粒同煎服

**龍膽散** 治盜汗有熱

龍膽草 防風 等分日服

右為末每服壹錢溫米飲調下臨卧服

**方風散** 治盜汗

川芎 壹分 人參 半分 防風 貳分

右為末每服壹錢臨卧米飲調下

**溫粉止汗法**

川芎 白芷 白朮 藁本 等分

右為末每藥末壹兩入米粉冬分夾和撲身無**藁本**亦得

# ○ 妙方瘵

勞瘵方論

瘵虫食人骨髓血枯精竭不救者多人能平時愛護元氣保有精血瘵不可得而傳惟夫縱慾多淫苦不自覺精血內耗邪氣外乘是不特男子有傷婦人亦不免矣然而氣虛腹餒最不可入勞瘵者之門而棄問疾衣服器用中皆能乘虛而染觸間有婦人入其房暗其人病者思之安氣隨入染患日久莫不化而為虫治療之法大抵以保養精血為上去虫次之**行平其**

間蓋尸疰者鬼氣也伏而未起故令淹經得枯骸枕骨治之魂  
氣飛越不復附人於是乎瘥外此則勞瘵也勞瘵者皆食人之  
類也其亦枕骨之亞乎要之發用以以前當以則弓當歸先立乎  
根本之地勞瘵者皆食人之類也其亦枕骨之亞乎要之發用以以前當以

勞瘵證治

治瘵疾先用此法以

室女頂門生髮小團并水洗去神風位隔後

真川芎半兩 當歸三錢 木香 桃仁水浸去皮

安息香 雄黃各壹錢 全蝎兩枚

江上大鯉魚頭生油煎黃狀龍炙服

右為末分作肆服每服并水壹大椀淨室中煎柒分入紅硬  
密真香末半錢燒北斗符入藥月初五更空心向北目天呪  
曰瘵神瘵神害我生人吾奉 帝勅服藥保身急急如律令  
念呪伍遍面北服藥專面南吸生氣入口腹中燒降真香置

床下午時又如前服藥

北斗符 勅二爪 念北斗呪 朱砂書符

甲子履散治瘵疾殺瘵虫取出惡物

天靈蓋量其男者地不赤可用女者色赤勿用以

忘如律令呪公靈雷公公靈降得即須應心 生驚甲蓋教夫

虎張牙用牙 安息香 雞心檳榔

桃仁水浸去皮 生犀角 木香

甘遂 降真香 乾漆水浸炒燥出

阿魏各壹錢 穿山甲與犀同出歸炙焦 雷貝貳錢

全蝎兩枚 新引生研和藥

右件為末每服半兩先用豉心肆拾玖粒東向桃李桑梅小  
稍各貳壹長柒寸生藥壹小握白連根洗五  
片石臼內同杵用井水壹椀半煎取壹蓋入童子



藥末煎取柒分入○壹字月初旬五更空心温服即以被覆汗恐汗中有細虫軟帛拭之即焚其帛少時必瀉虫以淨桶盛急針取虫付裂火焚之並收入磁器中瓦片傳○蓋之泥和灰扎埋深山絕人行處

**虎牙圓**治勞瘵瘦悴咳喘聲啞骨痿殺下瘵虫

紫河車再具虎牙子胎衣水洗净麝香半錢

大紅川椒去合黃連去黃芩去黃柏去黃蘗去黃蘗去黃蘗去

虎頭關骨酒浸黃狗頭取肉鹿茸酒浸生鱉甲去裙明阿膠各半兩

挑仁水浸去秦膠洗木香各半兩

雄黃各半兩安息香各半兩生髮各半兩

右細末以紫河車狗肉杵粘為圓桐子大每柒拾粒月首五更空心米湯下午時又服如無胎衣以雄猪肚代用修事同

**雄黃**治勞瘵殺瘵虫下惡物

雄黃各半兩雌黃各半兩青黛各半兩代赭石各半兩

朱砂研細大蝦蟇男子天靈蓋川巴豆肉肥者拾粒

安息香阿魏各貳錢麝香半錢

右細末軟糲飯頭揉和杵圓桐子大每貳拾粒挑仁拾肆箇去皮研煎湯月初五更空心下

**五毒散**取下傳尸勞虫

桃枝李枝梅枝桑枝

石榴枝並東向小枝青蒿壹小握苦練根約披

生藍青染葉葱白連根洗各寸截

右以童尿壹升半煎取其半去滓入○安息香○麝香○各

壹錢煎至壹盞○清調○末○○

錢○○末壹錢半○壹字分作貳服月頭五更空心進

壹服五更五點又進壹服約午前取下瘵虫淨桶盛急針取

入油鉢內煮仍傾油虫入磁器及扎埋山僻處

勞瘵

此方殺瘵虫惡虫皆化為水

生藍青葉 別取自然汁

右入 **雅黃** **白礬** **安息香** **紅礬** **降真香** 末各半錢 **麝香** 少許研

和月頭五更空心服藍青葉諸虫解諸毒瘵毒通用此方

**貓肝** 殺瘵虫

黑猫生取肝曬乾

右為末月首五更空心醇酒調服或用酒浸而食之

**木香** **心** **圓** 治勞瘵久嗽聲乾骨瘦瘵瘵

蛤蚧 洗淨 生鱉甲 去裙醋炙焦

白茯苓 川芎 當歸 北五味子

牛膝 各半 綿黃耆 柴胡 知母

貝母 去心 雞心橫柳 明阿膠 炒酥 巴戟 酒浸去

桃仁 酒浸 肉豆蔻 生 木香 秦膠 洗

羌活 破故紙 炒 生髮 各半

右細末煉蜜圓彈子大每壹圓煎棗湯空心嚼下

**參膏** 治勞瘵嗽喘咯血聲焦潮熱盜汗

柴胡 明阿膠 炒酥 黃耆 炙 白茯苓

紫苑茸 當歸 川芎 半夏 製

貝母 去心 枳殼 炙 北梗 秦膠 洗

甘草 各半 人參 北五味子 羌活

防風 杏仁 去皮 欵冬花 桑白皮 各半

生鱉甲 去裙炙

右麗末每服貳錢半棗煎食後少頃服

**全蠶** 治勞瘵虛熱嗽喘

知母 貝母 去心 杏仁 去皮 柴胡 炙

川芎 各半 當歸 明阿膠 炒酥

古麗截入厚磁器中用中等酒浸生宰於頭上去瘵病以蠶肉并血并藥用醇酒伍升同浸壹宿蜜紙封以早慢火

勞瘵

同煮候香熟取漿令病者隨意食之只留蠶甲并骨并藥焙  
乾為末以浸藥酒汁調米粉為糊圓桐子大每茶匙圓不時  
米飲下

**神效圓**

論治瘵疾瘵虫有効但隨時用飯頭圓服

之庶得藥味鮮凡服藥未戒其菜牛馬肉

瘵有數虫如蜈蚣如小蛇如蝦蟇如馬尾如亂絲如爛麩如  
蒼蠅如壁蚰虫上紫下白形銳足細而有口或如白蟻孔竅  
中皆出此皆勞瘵根毒若傳至冬人則如人形如鬼狀  
前方蠶甲生犀散已服後準柒日又再服之

增修仁齋直指方論卷之九



# 漏濁

附

夢泄

漏濁方論

精之主宰在心精之藏制在腎凡人酒色無度思慮過情心腎氣虛不能管攝往往小便頻數漏濁之所由生也因小便而出者曰尿精因見聞而出者曰漏精心不足而挾熱者為赤濁心不足而腎冷者為白濁陰不升陽不降上下中睽是以有清濁不分之證藥法品量條列于下要必體認之精而後發用之審歟外此又有脾精不禁小便漏濁淋瀝不止手足力乏腰背酸疼盡用**參朮**等劑以斂脾精斂脾謂何精生於穀也

漏濁證治

**芎藭圓** 治小便中泄精不止

白龍骨兩 新韭子冬蒸後搗碎者壹斤

右末酒調糯米為糊圓桐子大每服參拾圓空心鹽湯下

**蓮肉湯** 治心熱赤濁

石蓮肉連心用壹兩 甘草炙壹兩

右末每服貳錢食後燈心壹小撮煎湯調下

**清心蓮肉散** 治心中客熱煩躁赤濁肥脂

石蓮肉 白茯苓略壹 益智仁 遠志水浸取肉

麥門冬去心 人參各半兩 石昌蒲 車前子

白木 澤瀉 甘草各壹分

右剉散每服參錢添燈心壹錢煎服有熱加**芎藭**

**辰砂妙香散** 治小便赤濁又**五**

**參朮** 可夾和**辰砂妙香散** 每服壹錢用燈心并去

**心參朮** 煎湯調下男女通用

**雞清圓** 便濁通用

圓白半夏

漏濁

石思慮  
太遲

濁

右為末用雞子清圓桐子大稍乾以未煎末夾和慢火同炒圓子裂為度留未煎末養藥磁器密收每冬拾圓食前

**白伏苓**煎湯下或用鹽湯  
**平胃**調平心氣赤白濁通用方見心經門

**妙應**赤白濁通用

真龍骨 厚牡蠣以真草鞋重包

石菖蒲各半白伏苓三益智仁 石蓮肉五

縮砂仁各半川練子蒸去皮桑螵蛸焙兔絲子焙

右末以山藥碎炒末為糊圓桐子大每伍拾圓日間煎  
**赤白**湯下臨卧米湯下益湯下酒

**赤白**治心氣不足遺精白濁

遠志水浸取肉山藥炒地黃洗天門冬去心

龍慈研細麥門冬去心北五味子 車前子炒

白伏苓 伏神去木地骨皮各半辣桂陸

右末煉蜜圓桐子大每伍拾圓食前梗米湯下

**赤白**濁通用方見消渴門 赤濁心煎湯下白濁白

煎湯下女細魚干白豆花入魚肚內煮服連三午水

**平補**治腎虛心熱小便急而數澀而澀如水竇欲溼之狀又

且油濁方見消渴門 兼用辰妙香散佐之方見痘門

**杜**治精氣不禁白濁夢遺

圓白半夏各兩洗洗次每筒作兩片以水去皮煎

右不用水入煎過厚粉壹兩同末以山藥糊圓桐

子大留水養藥磁器密收每冬拾圓伏苓煎湯下

**真龍骨**治諸虛漏精白濁

厚牡蠣 桑螵蛸各壹兩

右以水淘濕將煎冬半置豆上蒸半日去豆焙乾

併為末入水壹兩末煎於枝去刺并洗

淨搥碎磁器內入水膏藥膏濃汁濾清調伏苓末為糊團搥  
子大每冬拾圓食前用五枚連殼搥碎以酒送下拾粒

**小兒疝子圓**用地五味子煎湯下治諸虛白濁方見在門

**桑螵蛸散**治心腎不和小便白濁或如米泔或為夢泄

桑螵蛸蒸過遠志水浸取肉石昌蒲

人參 白伏神 當歸 龍骨別研

鱉甲各半兩甘草炙

右為末每服貳錢人參煎湯調下夜臥服

**生丹**治心腎不和小便白濁方見在門貳藥夾和

每服貳錢用燈心壹撮同煎服治小便白濁

**龍齒**治諸虛不足虛熱潮來心神驚惕睡臥不寧小便

油濁 龍齒洗人參 當歸酒浸熟地黄洗

北梗 酸棗仁 白伏苓 白伏神去木

遠志水浸取肉枳殼去穢麥門冬去心

半夏麩白木 甘草炙肉桂貳錢半

綿黃耆炙右履末每服叁錢水盞半薑伍片粳米壹小撮同煎不時服

臨臥服

**陳皮**治漏精白濁

雪白益入內藥十分實以瓦蓋頂黃泥封

白伏苓 山藥各壹兩

右為末入鹽壹兩研和用沸湯浸棗取肉研夾煉蜜再研為

圓桐子大每服叁拾圓空心棗湯下蓋欲甘以濟鹹脾腎兩

得也

**山藥圓**

乾山藥兩北五味子 獲苓各肆兩鬼絲子酒浸

各肆兩

各肆兩

新刊仁齋直指方論

二

前用

濁

牛膝便後澤瀉

熟地黄各山茱萸

伏神去木巴戟去心

赤石脂各杜仲剉薑汁

右末煉蜜圓桐子大常服參拾圓鹽湯下

**白圓** 方見水 **白圓** 方見身 **白圓** 方見前 三藥

夾和每服柒拾圓食前前送下 方見虛勞 治虛勞羸瘦

治心腎俱虛漏精白濁 方見虛勞

治心虛腎冷漏精白濁

鹿茸去皮桑螵蛸洗肉蓯蓉 當歸

巴戟去心 兔絲子酒 杜仲剉 禹餘糧酒 赤石脂

川練子剉 益智仁 山茱萸

韭子剉 故紙炒 山茱萸 赤石脂

龍骨剉 滴乳香壹分

右細末酒調糯米糊圓桐子大每柒拾圓食前前送下

治陽氣衰敗白濁遺精

家韭子剉 菟絲子酒 茯苓 牛膝

熟地黄各 當歸各 巴戟去心 兔絲子酒

杜仲剉 石斛 桂心 乾薑生

右末酒調糯米為糊圓桐子大每服柒拾圓空心鹽湯下亦

治胞公遺尿

治腎經虛精滿濁不止 方見 用陳湯加白茯苓

送下 方見

治陰陽不調清濁相干小便渾濁 方見 用茯苓

煎湯下

治患虛過度清濁相干小便白濁

益腎仁剉 川草薢 石昌蒲去毛

天台烏藥 白茯苓剉 甘草

右末每服錢壹分許同煎食前服 每服四升水一中半



右厚朴姜  
汁制者為  
細末二分  
半膠炭  
研成研如  
粉一母二味  
夏應相子  
大果陽道  
下

治元陽氣弱 脾精不集 渴淋瀝腰痠力疲

蒼木去毒皮香斤 柏上茴香 川練子去皮取肉

川烏去毒 故紙去毒 白茯苓 龍骨別研

右末酒麩糊圓桐子大如 為衣每服伍拾圓空心前

湯下藥末 收斂脾精

# 夢泄

夢泄方論

邪客於陰神不守舍故心有所感夢而後泄也其候有三年少  
氣盛熱曠矜持強制情慾不自覺知此泄如瓶之滿而溢者也  
人或有一之是為無病勿藥可矣心家氣虛不能主宰或心受熱  
陽氣不收此泄如瓶之側而出者也人多有之其病猶輕合用  
和平之劑臟腑積弱真元久虧心不攝腎不攝精此泄如瓶  
之罅而漏者也人少有之其病最重須當大作補湯或謂夢泄  
尤甚於房勞此世俗習聞其說也獨不觀證候之有重輕乎外  
此又有一輩神氣消靡怪異橫生風邪乘其虛鬼氣干其正往  
往與妖魅交通是又厄運之不可曉者也法藥相助誠哉是言

天冬圓 治心虛夢泄

白茯苓

右為末每服錢錢錢錢錢錢下間用溫熱水調下空心食前

臨卧日冬服

反砂妙香散 方見痘門 治心

熱夢泄並用燈心壹握煎湯下

鹿角屑 鹿茸 白茯苓 人參

白伏神

桑蝶峭

龍骨

鹿茸

桑蝶峭

龍骨

白伏苓

當歸

新葦子

栢子仁去毒甘草各分

右末每服安眠錢半置任片東冬枝獲米百粒食前煎服

**聖藥**方見遺 **神效**方見遺 **大補**

虛損遺用神效送下方見遺 間用滴乳末泡湯下

**聖藥**封固下焦治夢泄不止方見遺 門空心又參地五味子

煎湯下

增修仁齋直指方論卷之十

# 眩運

眩運方論

眩言其黑運言其轉冒言其昏眩運之與冒眩其義一也其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟航之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一塗而取軌也風則有汗寒則掣痛暑則執悶濕則重滯此四氣乘虛而眩運也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥此七情攻虛而眩運也淫慾過度腎家不能納氣歸元使諸氣逆奔而上此眩運之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩運之生於血虛也又明矣以致新產之後血海虛損或痰滯不行皆能眩運是可推尋致病之因乎治法隨機應敵其間以升降鎮墜行焉最不可妄施汗下然而眩運欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂目眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自冒者此虛極而脫也識者將有采薪之憂

眩運證治

**伏苓甘草湯** 治氣上衝骨戰搖眩運

伏苓 二兩

桂枝 三分

白朮

甘草 炙各半兩

右剉散每服肆錢新水煎服風證加**川芎**濕證加**白朮**

**桑木寒證加**

**正丹** 治寒濕眩運仍吞**朱砂丹**

**正丹** 方見醫方門

**真木院眩湯** 治感濕感寒頭重眩運

附子 生

白朮

川芎 各半兩

官桂

甘草

炙各半兩

右剉每服冬錢肆分夏錢五分同煎食前服

**真木院眩湯** 方見醫方門 **附子寒中湯** 方見醫方門

桂枝湯治暑證眩暈

肉桂

茯苓 三分

右細末煉蜜圓每兩作捌圓每服壹圓用酒調下

暑圓通用 方見白虎湯門

十四支圓 方見白虎湯門 三藥夾和用和劑

七情湯 送下 方見氣門 治七情相干眩暈欲倒仍開用乳香泡

湯下

三才湯 方見頭風門 治痰飲厥逆眩暈

千金五寶圓 方見脾疼門 治痰飲結聚胃脘眩暈欲嘔

香薷散 治氣虛眩暈

木香

白木

半夏麴

橘皮

白茯苓

縮砂 各半兩

丁香

甘草 炙各壹分

右剉散每服參錢壹伍厚片同煎吞蘇合香圓 方見靈丹本

方加 各壹分 半兩治血虛眩暈

治一切血運每服壹圓研開用酒調下

加 治婦人血運眩暈不省人事

次用 佐之

加 治停飲眩暈心下悸氣

升降陰陽用之

以 泡湯下升降鎮墜功用兩全

鎮墜眩暈用之

治心氣不斂怔忡頭暈

及酒食所傷眩暈及血證眩暈

及酒食所傷眩暈吞 丸勝

治風證眩暈及血證眩暈

古為末煉蜜圓彈子大每服壹圓煎茶飲湯下

治風痰上厥眩暈頭昏

眩暈

白附子炮 南星炮 半夏湯洗米泔水 旋覆花

甘菊 天麻 川芎 橘紅

僵蚕炒去絲 乾薑各壹兩 全蝎半兩

右末用生薑半斤取汁打麪糊小圓每伍拾圓食後荆芥湯下

**人參頭煎湯** 治風痰頭運目眩

前胡 橘紅 半夏曲 木香

枳殼製 紫蘇葉 赤茯苓 南星炮

甘草炙 各半兩 人參壹錢

右灑末每叁錢薑茶厚片慢火熟煎服

**自製白圓** 方見身門 用叁拾圓蘇合香圓 叁粒全蝎壹箇

灸為末叁件研和以藥酒煎湯入生薑汁少許調下治諸

風眩暈搖掣語短嘔吐

# 驚馬悸

## 驚悸方論

人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所肇端也曰驚曰悸其可無辨乎驚者恐怖之謂悸者怔忡之謂心虛而驚悸則耳聞大聲目擊異物遇險臨危觸事喪志心為之忤使人有惕惕之狀是則為驚心虛而停水則胃中滲漉虛氣流動水既上乘心火惡之心不自安使人有怏怏之狀是則為悸驚者與之豁痰定驚之劑悸者與之逐水消飲之劑所謂扶虛不過調養心血和平心氣而已若一切以剛燥用工或者心火自炎又有熱生風之證

## 驚悸證治

**養心湯** 治心虛血少驚悸不寧

黃耆 白茯苓 伏神 半夏麴

當歸 川芎各半兩 遠志 枳殼 熟地

桐子仁 酸棗仁去皮 北五味子

眩暈

人參 各壹分 甘草 炙

右龍末每服參錢壹伍片棗貳枚煎食前服加續命散亦伏苓  
治停水怔悸

**續命散** 治心虛血虛多驚

人參 白伏苓 伏神 栝子仁

琥珀 當歸 酸棗仁 溫酒浸半日去

遠志 酒浸半日新布裹 乳香 朱砂 別研

石昌蒲 各壹分

右末煉蜜圓桐子大每參拾圓食後棗湯下

**失乳圓** 治心氣不足怔忡自汗

人參 半兩 當歸 壹兩 乳香 壹錢半

右末山藥煮糊圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下

**十四交圓** 治心血俱虛怔忡驚悸

栝子仁 研 遠志肉 薑汁 酸棗仁 湯浸去皮隔紙炒香

紫石英 煨 熟乾地黄 川當歸 白伏苓

白伏神 人參 黃耆 炙 阿膠 炒

棘桂 龍齒 研 朱砂 半兩

右細末煉蜜圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下

**朱砂圓** 治心病怔忡不止

白伏神 貳兩 沉香 半兩

右細末煉蜜圓小豆大每參拾圓人參煎湯下

**養心散** 治大驚入心敗血頑痰填塞心數暗不能言

蜜陀僧 即是

右每服挑壹大錢已無熱者用熱酒調下有熱者沸湯泡

**養心散** 調下亦治瘡風頗有奇效 出美聖心

**養心湯** 治心膽虛怯觸事多驚亦治水氣怔悸

半夏 製 枳殼 炒 白伏苓 各壹

橘紅 壹兩 甘草 炙

驚悸

右剉每服參錢半薑朮片棗貳枚刮青竹皮壹塊如錢大煎服或加...尤妙

**加味四七湯**治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏製貳兩 白茯苓 厚朴製各壹兩 伏神

紫蘇葉各壹兩 遠志薑汁蘸蒸取肉焙 甘草各半兩

右剉每服肆錢薑朮片各壹兩寸棗貳枚煎服

**伏苓白朮湯**治心下停水怔悸

伏苓 桂枝各貳兩 甘草各壹兩 生薑各兩

右剉每服肆錢水煎服

**曹禾湯**治虛證停飲怔忡

白薑生 白朮 伏苓 半夏麩各半兩

辣桂 甘草各壹分

右剉每服參錢薑朮煎服

**小柴胡湯**並主水氣心下怔忡方見宋錢門

**炙甘草湯**治心下動悸其脈結代動而時止曰代

甘草炙壹兩 人參半兩 生乾地黄兩 桂枝各壹分

麻仁 麥門冬去心各壹分 生薑各壹分 大棗別欸

右麓末每挑參大錢水壹盞半酒半盞煎至捌分入...

**膠壹片**俟膠消溫和服日進參劑不拘時

**...**治因驚失心

人參 酸棗仁湯浸去皮

辰砂半兩 滴乳香壹錢乳研

右末煉蜜和杵圓如彈子每壹圓薄荷湯化下

驚悸

# 痧瘧

痧瘧方論

風寒暑濕邪自外來飲食居處邪由內作此痧瘧感受之胚胎也豈特夏傷於暑秋必為瘧哉古人蓋以其受病最多者言之耳瘧候何如始而呵欠繼而足冷面色青黃身體拘急寒慄鼓頰腰脊俱疼寒去未幾內外皆熱頭痛而渴但欲飲冷嘔惡妨滿而不嗜食者其候也或內伏寒疫寒從背起冷如掌大瘧之寒熱其豈非陰陽二氣更相勝負而作耶邪併於陰則寒邪併於陽則熱陰盛則寒多陽盛則熱熾其寒也湯火不能溫其熱也冰水不能寒其衛氣與邪氣相值故邪正交爭而病以作衛氣與邪氣相離故汗出乃解而病以休衛氣晝行陽夜行陰得陽而外出故發於日間得陰而內搏故發於暮夜若乃邪氣內搏於五臟橫連於募原其道遠其行遲不能與衛氣交併故有隔日發有二四日一發衛氣之行疾行遲病作之有蚤有晏甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起則休作無定時矣瘧有數種

瘧瘧

一曰自感風而得惡風自汗煩燥頭疼轉而為瘧風陽氣也故先熱後寒可與解散風邪如

一證亦先熱後寒此為傷於寒病與類或

大暑則同熱多寒少

小暑胡湯熱少寒多

自感寒而得無汗惡寒身痛而慘轉而為瘧寒陰氣也故先寒後熱可與發散寒邪

類甚則

暑勝熱多得

名

陰氣微陽氣微發熱不寒裏實不吐煩渴且嘔肌肉消鏹盡用

加

暑證最便



煩疼嘔逆脹滿盡用五苓散治濕瀉加蒼朮治寒濕重寒多者未

前最良此瘡者久受陰濕陰盛陽虛陽不能制陰所以寒

多不執氣虛而油悽慘振振此治法減半此加以此

施之為膏食一名胃瘡此食無節制胸有傷致然也凡食

啖生冷鹹膩魚蟹肥膩中脘生痰皆為食瘡其狀苦飢而不能

食食則中滿嘔逆腰痛此治法減半此加以此作劑

或此散湯下此自有奇功此扶嵐瘴漢源蒸毒之氣

致然也自嶺以南地毒苦炎燥濕不常人多瘡瘡其狀血乘上

焦病欲來時令人迷困甚則發燥狂妄亦有啞不能言者皆由

敗血瘀於心毒凝聚於脾坡仙指為脾胃實熱所致又有甚於

傷暑之瘡耳治之須用涼膈疎通大腸此加此治法

此皆為要藥。如前數證經久不瘥真氣已耗邪氣

猶存則有所謂此者焉表裏俱虛真元未復疾雖暫止

小勞復來謂之此法當調養氣血此治法

不可無。彌年閱歲經吐汗下榮衛虧損邪氣伏藏脇間結為

癥瘕謂之此此證未可直攻急作此以扶其裏俟

其內氣已充繼此此下之取愈大抵瘡之初

得三數日間如火燎原不可嚮邇波濤洶湧未易回瀾當俟其

稍定而圖之經所謂其盛者可待衰而已瘡方來與正發及將

解不可投藥耗其真氣投藥當於未發以前兩時之先或遇發

日凌晨空心與之諸瘡之脈大約尺寸俱弦或浮數或緊實或

緩濡或虛遲或左手濡而右手盛或尺寸盛而關中濡不可定

名以為弦也總前治法弦數多熱者寒之弦遲多寒者溫之浮

弦浮緊浮數其邪在表者可汗弦實沉實數實其邪在裏者可

下若夫調胃氣利痰水分陰陽行三焦是又治法之綱領也渴

欲水漿藥入輒吐此煎湯效抑猶有說焉嘗讀二廣攝生見

其論議者瘡瘡若暑毒每用此之劑取此根源里有先湯暑

後發瘡沙年餘者受其腹中有瘡此治法

血如泥洲下極臭由是獲愈因知諸瘡皆有根在治法之外又當隨輕重而利導之實者與巴豆大黃虛者用養正丹輩不然常服於瘡每每作效何耶蓋瘡家多蓄黃水(常山)為能破其癬而下其水也

瘡瘡證治

麻黃 去節 官桂 青皮 陳皮

川芎

白芷

伏苓

加細辛

白木

檳榔

半夏麩

北梗

紫蘇

甘草 各等分

右劉散每服三錢薑肆片棗貳枚空心前服

五積散 感寒發瘡初作以此解散

蒼木 炒

陳皮 各錢

當歸

半夏 製

白芍藥

官桂

白芷

伏苓 各錢

甘草 炒

右劉散每服三錢水盞半葱白冬寸薑叁片煎半空心服

養胃湯 加治感寒發瘡

厚朴 製

伏苓

甘草 各錢

蒼木 炒

草果

半夏 製

藿香 各半兩

橘紅 各分

右劉散每服三錢水盞半薑伍片烏梅半筒煎半溫服

解毒消腫方見瘡類

養正丹 主寒瘡 方見瘡類

養正丹 治寒瘡

草果

川芎

白芷

紫蘇葉

良薑

甘草 各等分

青皮

右劉散每服三錢煎服

治暑瘧純熱方見血熱或寒熱等則加

香帶日兩 厚朴

右判散每冬錢伍片烏梅半箇煎服寒多者加

知母 烏梅肉半兩

右判散每冬錢伍片烏梅半箇煎服寒多者加

治暑瘧純熱方見血熱或寒熱等則加

治暑瘧純熱方見血熱或寒熱等則加

嫩黃川常山

知母

草果仁

甘草

良薑

烏梅肉半兩

右咬咀每冬錢水壹椀薑伍片棗壹枚煎半稍冷服

治暑瘧純熱方見血熱或寒熱等則加

川常山

雞心檳榔

青皮

草果仁

甘草

各半兩

草果仁

各半兩

右細判每冬錢水壹椀薑伍片棗壹枚煎半稍冷服

空心服

治暑瘧純熱方見血熱或寒熱等則加

治暑瘧純熱方見血熱或寒熱等則加

治暑瘧純熱方見血熱或寒熱等則加

柴胡

辣桂

枯婁根

乾薑

甘草

牡蠣

各半兩

黃芩

各半兩

內加半夏麩半兩

右判散每服冬錢壹量棗煎服

治暑瘧純熱方見血熱或寒熱等則加

陳皮

半夏

各半兩

伏苓

各半兩

甘草

各半兩

右咬咀每服冬錢壹量伍片烏梅半箇煎服寒多者加

多者加

治暑瘧純熱方見血熱或寒熱等則加

半夏

人參

伏苓

白朮

橘紅

草果

生薑

烏梅

大棗

甘草

右咬咀以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服肆錢水壹碗煎半溫服

**紅圓** 治食瘡食積氣滯腹脹

京三稜 水浸軟截碎

蓬莪木 機 青皮

陳皮 各伍兩 胡椒

乾薑 炮各叁兩

右為末米醋煮米粉糊圓桐子大藥紅為衣每伍拾圓二陳湯

**湯** 皆可下

**烏頭** 治久瘡但久瘡但寒及脾寒發瘡或寒重熱輕

大川烏頭 炮再浸九次去皮臍

右細剉分貳服每服薑柒厚片棗柒箇葱白三寸水大碗煎

半先喫棗稍冷服

又方用小烏頭壹枚修製一同烏頭皆能溫脾挾風則用小烏

寒甚則用小烏頭

**治瘡木香圓**

牽牛 壹斤湯去滓音焙為 雞心檳榔 陳橘紅各貳兩

青木香 人參 熟附子 厚朴製

官桂 去麩皮 京三稜 羌活 獨活

乾薑 炮 甘草 炙 川芎 川大黃 剉焙

芍藥 各半兩 肉豆寇 陸箇

右為末磁器密收臨用秤牽牛末壹兩諸藥末共壹兩研和

煉蜜圓桐子大每服貳拾圓湯及煎湯下以通利為度

**地龍** 治瘡瘻諸瘻大熱煩燥

生地龍 各條研細

右入生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱熾加

子少許

**雙圓** 取下暑毒瘡毒

圓白半夏生 烏梅肉 母丁香 川巴豆 各拾枚

右為末薑麩糊圓麻子大上下以厚紙蓋貼有油又再易紙

每服伍圓臨卧冷水下此方舟入於海角遇一白衣授之  
**言** 治勞瘵寒熱

當歸 川芎 芍藥 青皮  
陳皮 伏苓 半夏各壹分 鱉甲半兩

右判散每冬錢壹伍片棗貳箇小烏梅壹箇水煎服熱多加  
**治** 寒多加

**五勞圓** 治勞瘵瘡癰久病  
嫩黃常山冬兩半 桃仁去皮尖炒  
辣桂去粗皮 淡豉冬兩 烏梅肉貳兩半

右日乾為末煉蜜圓梧子大每冬肆拾圓空心溫酒下不飲  
者熱水入此酒下

**經效廣丹** 治瘵母結癖寒熱無已  
真阿魏 雄黃各壹錢半 朱砂壹錢半

右沸湯泡阿魏研散雄朱為末和之稀麪糊圓桐子大每壹  
圓人參前湯候冷空心服瘵瘡桃仁前湯冷服臨發磨壹圓  
傳鼻頭口畔

**消瘵圓** 治瘵母停水結癖腹脇堅痛  
元花 朱砂研細等分

右為末煉蜜圓小豆許每拾圓濃煎棗湯下去癖須用元花  
**大** 破水之劑下後即與養胃湯

**驅瘵湯** 治諸瘵久瘵  
草果仁 青皮 陳皮 人參  
伏苓 半夏 厚朴 蒼朮炒

雞心檳榔 白木 甘草各半兩 良薑壹分  
右判散每冬錢壹伍片棗貳枚烏梅壹箇空心煎服

**生熟** 治脾寒發瘵及寒多熱少  
草果 肉豆蔻各壹錢 川厚朴方寸許  
生薑 甘草各壹錢

右判散分貳服每服壹椀水貳棗壹烏梅煎半空心服

蘇州府截瘧消痰  
華丹 各書分 穿山中 各書分 土朱 半兩

右為末以獨頭蒜煨去皮研膏圓桐子大每拾圓 各書分

七物湯治諸瘧

常山 酒浸蒸 檳榔 草果 青皮

陳皮 川厚朴 各書分 甘草 各書分

右判細每服參錢壹伍片烏梅貳箇水壹椀煎半露壹宿來  
早溫服之如熱多加 各書分

截瘧 各書分 孫志修合

土朱 兩半 真綠豆粉 兩壹兩生入 信砒 有錄生者半

右用綠豆粉糊藥和冬件圓如麻子每服止貳圓新汲水研  
挑軟空心服是日飲食微和而已

勝金圓治一切瘧寒熱不一嘔惡頭疼煩渴喘息痰聚中滿

雞心檳榔 各書分 川常山 酒浸蒸

右為末水麪糊圓桐子大每服參拾圓於未發前半日冷酒  
下便睡不得喫熱湯飲次日又用冷酒下貳拾圓仍不得喫  
熱飲食又次日飲食無拘

治瘧方 各書分 貳貼加 各書分 貳錢分作兩服每服壹錢 各書分 柒片棗

貳枚烏梅 貳枚水壹椀煎陸分候微冷吞前件 各書分 柒圓次

日吞壹圓

六物湯治久瘧不已寒少熱多

嫩常山 各書分 柴胡 雞心檳榔

青皮 各書分 草果仁 甘草 各書分

右判分參服每服大軟烏梅貳箇好夏酒準壹椀許新水貳  
蓋煎半隔宿露空以紗蓋之次早拂明服若寒熱等加製厚  
朴貳錢略煖服是日飲食皆勿用熱

# 霍亂吐瀉

附 泄瀉

吐瀉方論

乾上坤下其卦為否陽隔陰而不降陰無陽而不升此否之所  
 以痞而不通也人具此陰陽揮霍變亂結搏於中卒然吐瀉或  
 瀉而不吐或吐而不瀉大抵心腹擾悶煩疼其視天地不交之  
 否異乎否乎霍亂之證心腹卒痛嘔吐下利發熱憎寒頭痛眩  
 暈先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐瀉俱作甚則  
 轉筋顛顛特反掌閉蓋足陽明屬胃以養宗筋暴吐暴下津液  
 驟亡宗筋失其所養故攣急甚則舌卷縮囊危甚風燭矣然亦  
 何以致此哉曰胃傷暑毒露卧卑濕當風取涼風冷邪氣入於  
 腸胃加以嗜嗜好肥腥飲啖生冷居處不節激而發焉於是邪正  
 相干中脘節閉氣不得通吐利暴作所謂脾胃受賊邪木來勝土

霍亂吐瀉

者此也治法霍亂吐瀉散加霍香白薑為上不惟可以溫散風  
 邪抑亦可以調理吐瀉其若傷暑所致未可遽投香散沉冷  
 之劑自合先治中脘如陳湯瀉積散中夏湯輩次則以香散溫  
 服散暑解煩昧者指為脾胃虛冷遽用參朮白朮芍藥白芍  
 之屬以壯胃溢腸不思風冷未散輒以參朮芍藥攔補寒邪邪  
 氣得之愈盛愈作縱得淹延或下痢或久瀉或腹脹虛浮或中  
 滿不食變證百出矣抑猶有說焉濕霍亂死者少乾霍亂死者  
 多許仁則嘗有是言矣蓋謂所傷之物因吐利而出泄泄盡則  
 止猶可幸免若上不得吐下不得利所傷之物擁閉正氣闕隔  
 陰陽燥擾喘脹其能生乎則知揮霍變亂如人被髮交爭必有  
 以挨之可也古方用參朮白朮芍藥正取陳利之意但多則太溫臭若  
 薑湯下

又論

治嘔吐莫先於助胃既助胃而後嘔吐者中脘挾風寒也治嘔

嗽莫先於調肺既調肺而復喘嗽者風寒在表或在裏也瀉痢之疾固腸斷下終不作效非腸胃間留蓄風寒邪氣之所致乎故必隨其感處解散於其先則其病其藥庶乎其對證矣解散風寒不換金止氣散為上其間增益則青皮官桂良薑藳薑擇用最良若欲其清解則紫蘇胡薄荷等輩劑量可也惟暑亦然每每隱伏作病或為熱嘔或為煩煩或為腹痛或泄痢不止暑中類多有之炎燠溫隆念慮又當及此此說雖詳于卷首敬用申之

吐瀉證治

霍香正氣散治霍亂吐瀉通用腹痛者加桂小便利者加伏

苓方見此藥能溫散風寒濕氣若暑證加香薷

五苓散治霍亂熱多發渴方見水

良薑散治霍亂神效

良薑 霍香 陳皮 甘草

右劉細每錢水煎服

又方

霍香葉 良薑 木瓜

右同煎治霍亂水瀉效

治霍亂湯

半夏 川厚朴 蒼木 陳皮 伏苓 甘草 霍香葉

右劉散每服錢壹柒片棗壹枚煎服霍亂瀉而不吐者加桂吐而不瀉者去苓加香吐瀉俱作兼腹痛者加

胡藿湯治霍亂吐瀉

胡椒 生綠豆

右末煎宣木瓜湯溫和調下

治飲食不節以致霍亂

能散風治

吐瀉



香薷散 治傷暑霍亂 方見醫門

木瓜湯 治吐瀉不止 轉筋痲痺

酸木瓜 壹兩 茴香 壹分 甘草 壹分 吳茱萸 半兩 湯

右剉散每肆錢 伍片 煎服 十葉空腹急煎服

四順附子湯 治吐瀉過多 手足逆冷 六脈沉細 氣小不語 急服

生附子 白薑 炮 人參 甘草 炒 各壹分

右剉每服肆錢 水煎 薑壹分 煎服 腹痛加 薑 小便不利加

茯苓 仍用炒薑 對或用 薑 方見醫門

薑 治乾霍亂 欲吐不吐 欲瀉不瀉 痰壅腹脹

薑 壹兩 生薑 半兩 切

右同炒令色變 以童尿 兩盞 煎壹盞 分為貳溫服

薑湯 治乾霍亂 心腹絞痛 欲吐不吐 欲下不下

先以薑湯壹盞 頓服 候吐出 令透不吐 再服 續以劉理中湯

倍加 薑 與之 或薑 散 加 官桂 伏苓 倍加 或蘇

合香丸 用 調下

霍亂不吐不瀉 氣痞于中 心腹絞痛 此證最惡

治霍亂吐瀉 心腹作痛

炒薑 貳碗 紙包 紗護 頸其背 前并腹肚 上載以熨斗 火熨氣

透則蘇 續又以炒薑 熨其背 則十分無事

霍亂吐瀉 臨時無藥 以 研細 塗心下 及兩脚心 即止

# 泄瀉

泄瀉方論

胃為水穀之海 其精英則流布以養臟腑 其糟粕則傳送以歸

大腸 腸胃虛弱 或挾風挾寒 或傷暑傷濕 傳冷蓄熱 冷熱不調

泄瀉諸證 皆能致之 挾風者 自汗惡風 痛引腰背 挾寒者 筋節

拘急 身體怯寒 備則 而 引火 漿 湯 者 肌肉 虛浮

吐瀉

肢體重著冷則腸鳴肚冷而手足清熱則煩燥肚熱而手足溫  
冷熱不調者由熱積於內不能去其積徒以冷藥水之熱氣無  
所發泄故冷與熱搏而下注其或冷積於中不能去其滯徒以  
熱藥壓之冷積不得宣行故熱與冷搏而成泄或瀉或澀裏急  
後重是其候也外此則傷食一證失飢傷飽胃不能消心腹膨  
脹所下酸臭可驗焉治法當究其感受之源然後為之固實不  
窒其源吾恐決潰四出莫知其然者矣雖然脾胃合氣以消水  
穀水穀既分安有所謂泄人皆以泄為脾恙而不知腎病有泄  
焉腎泄何如曰腹痛無定處似痢非痢骨弱面黃脚下時冷者  
是也前件諸方條例于后至五七泄利之後腹滿身疼是則為表  
裏俱病先當溫裏急與四逆散然後解表急以瀉心湯與之活  
人書言人詳矣抑猶有緒餘之論焉肝者脾之賊不能勝土古  
人慮之固也經曰肝腎氣虛為病泄瀉亦孰知腎者所以守司  
於下而肝者又明立要束之具束則不泄也不然泄瀉而面色  
青慘者古書謂肝經受寒所致特設當歸厚朴湯以主之果何  
意哉下利更難具實者人難言

泄瀉證治

理中湯治腸胃虛弱泄瀉有聲泄瀉類併

人參 白朮 乾薑炒 甘草炒  
各壹兩

加茯苓 川厚朴 各壹分

古制細每服叁錢空心煎服

調中散治腸虛泄瀉止嘔進食

霍香葉 縮砂 蓬朮 乾薑炒  
各壹兩

肉桂 茴香 草果 麥牙炒  
各壹兩

益智仁 橘紅 各叁分 蒼朮 神麩炒  
各壹兩

甜梗 各壹兩 甘草 各壹兩

右末每服叁錢薑棗并少煎服

內意散治脾胃虛弱泄瀉不食

大肉口苦青收則小...

右末每壹錢米飲調下

治寒熱濕瀉治風邪泄瀉加寒邪泄瀉加乾薑良薑通用

加大香見吐瀉門

治傷暑泄瀉更增伏苓

平胃散治傷濕泄瀉

橘紅 厚朴各半 蒼朮伍兩半 甘草各壹兩

右判細每服叁錢薑棗前服

又法以治對交用陳米前暑瀉濕瀉請證

又洞泄方末米飲下

治協熱泄瀉亦治血痢

藥皮參兩 黃芩式兩 黃連壹兩

右判每服肆錢水大盞煎七分入同半錢再煎少頃溫服

治冷證泄瀉方見寒類 通用

治虛冷腸鳴滑泄

良薑 乾薑各陸 肉桂 薑撥各肆兩

右末麩糊圓桐子大每伍拾圓米飲下

治冷熱不調泄瀉

吳茱萸炒 黃連去鬚 白芍藥等分

右末米糊圓桐子大每叁拾圓空心米飲下

治冷熱不調泄瀉裏急後重

黑薑去 木香 白芍藥各捌錢

訶子肉陸錢 人參 白朮 當歸各叁錢

甘草炙 肉桂各肆錢

右麩末每服貳錢薑棗前食前服先用煎湯下 威靈

治積食生冷久為冷積

治積食生冷久為冷積

治積食生冷久為冷積

治積食生冷久為冷積

治積食生冷久為冷積

良薑

欒桂

香附香附

益智仁

天台烏藥又名香肉

甘草大平半兩

右末每貳錢入少鹽泔湯點吞送下

三棱散酒食傷積用此

京三棱炮

蓬朮炮

益智仁

甘草炙

青皮各去白

白茯苓時兩

右末每貳錢少鹽煎吞送下

服法

白濁散治冷瀉腸滑及下痢頻併

罌粟殼去筋

陳米炒香兩

乾薑炮

甘草炙

肉豆蔻生

木香香

右末每貳錢薑棗煎食前服

實瀉散治泄瀉不止

川厚朴製

肉豆蔻

訶子炮

細砂

橘紅

蒼朮炒

茯苓各香兩

木香半兩

甘草炒

右末每貳錢薑棗煎服手足冷加炒送下

安腎丸

治腎泄腹痛無定數似痢非痢骨痛面黃

腰脚時冷用

送下

治腎泄證候同前

禹餘糧火

丁頭代赭石如土修製

赤石脂

紫石英各香兩

聖出火毒

的乳香別研沒藥

五靈脂各香兩

朱砂香兩

右並為細末糯米粉糊圓小雞頭大風乾每服壹圓用炒送下

入棗煎湯調送下

面黧齒脫得人怯笑送下

取熱汁調下

泄瀉

木香散治脾腎俱虛泄瀉

肉豆蔻煨故紙炒

木香

甘草 炙 各五分

白朮

白茯苓各半兩

右剉細每冬錢食前薑棗煎溫服

三神圓治脾腎俱虛泄瀉不食

破故紙肆兩

肉豆蔻貳兩生

右末用肥棗蒸爛取肉研膏艾和杵圓桐子大每服肆拾圓  
清米湯下若飯食後常一泄服此頓愈

當歸炒治肝經受寒面色青慘厥而泄利

當歸炒

厚朴製 各半兩

官桂參兩

良薑伍兩

右剉散每錢食前服

增修仁齋直指方論卷之十三





