

重修政和經史證類備用本草

二十一

重修政和經史證類備用本草卷第二十三

己酉新
增行義

成都唐慎微續證類

寰宇圖書館藏書

敕校勘

果部三品總五十三種

九種神農本經

白

十五種名醫別錄

墨

二種唐本先附

注云
唐附

十四種今附

皆醫家嘗用有
效注云今附

十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

本草二十三

張一

上豆蔻

豆蔻花山薑
花拘繆續注

藕實莖

石蓮子附荷
梶花葉續注

橘柚

自木部今移
核筋膜續注

栗

芰實

菱角核
葉根核
人續注

蓬虆

力軋
石蓮子附荷
梶花葉續注

葡萄

英子
帶續

中品

大棗

生棗及
葉附

仲思棗

今附苦
棗續注

雞頭實

英子
子續

芋

音
葉續

人續注

木瓜

模櫞
續注

柿

注

荔枝

枝子今
附

烏芋

茨菰鳴
茨續注

枇杷葉

注

甘蔗

音
柘

附

沙糖

附

椑

音
畢
柿
附

桃核人

花梶毛蠹皮
葉膠實附

安石榴

根
殼
附

梨

鹿梨
附

李核人

根
實
附

楊梅

今
附

胡桃

今
附



海松子

今附

柰

菴羅果

今

橄欖

音覽核中人附今附

榅桲

今附

榛子

今附

一十三種陳藏器餘

靈床上果子

無漏子

都角子

文林郎子

木威子

摩厨子

懸鈎

鈎栗

石都念子

君遷子

韶子

探子

諸果有毒

宜州豆蔻



山薑花



本草二十三

二

上品豆蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣生

南海

陰陽居

云味辛烈者爲好甚香可常含之其五和株素感功中物

益智熱拘音矩據音公溫甘蕉蕪音几

目並小冷爾唐金

云豆蔻苗似山薑花黃白苗根及子赤似杜若拘

據性冷陶云溫誤爾金

此草豆蔻也下氣止霍亂

蜀

蜀

蜀

空圖經云苗似杜若春花在穗端如芙蓉四房生於莖下白色花開即黃根似高良薑實若龍眼而無鱗甲中如石榴子莖葉子皆味辛而香十月收今苑中亦種之薑論云草豆蔻可單用能主一切冷氣氣除心頭痰水無別功又云山薑味辛溫去惡氣溫中中惡霍亂心腹冷痛功用如薑南人食之根及莖並如薑而大作樟木臭又有獵子薑黃色緊辛粹破血氣殊強此薑又云枸據生嶺南大薑甘橘屬也子大如蓋味辛酸性溫皮去氣除心頭痰水無別功又云山薑花暖無毒調中下氣消食殺酒毒亂調中補胃氣消酒毒又云山薑花暖無毒調中下氣消食殺酒毒頭深紅色葉漸殘花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多採以當果實尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治疊作朵不散落又以朱槿花同浸欲其色紅耳其作實者若龍眼子而銳皮無鱗甲中子若石榴瓣候熟採之暴乾根苗微作樟木氣其山薑花莖葉皆薑也但根不堪食足與豆蔻花相亂而微小耳花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色香辛可愛

圖經曰豆蔻即草豆蔻也生南海今嶺南皆有之苗似蘆葉似山薑杜若輩根似高良薑花作穗嫩葉卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸殘花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多採以當果實尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治疊作朵不散落又以朱槿花同浸欲其色紅耳其作實者若龍眼子而銳皮無鱗甲中子若石榴瓣候熟採之暴乾根苗微作樟木氣其山薑花莖葉皆薑也但根不堪食足與豆蔻花相亂而微小耳花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色香辛可愛

用其鱠醋最相宜也又以鹽殺治暴乾者煎湯服之極能除冷氣止霍亂消酒食毒甚佳

取皮用茱萸同於鍼上緩炒待茱萸微

黃黑即去茱萸取草豆蔻皮及子杵用之

爲末以米瓜生薑湯下半錢

海藥云

豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石

藥細破陰乾之

味近苦而有甘

衍義曰

豆蔻而名之若作果則味不和不知前人

之意編入菓部有何意義性溫而調散冷氣力甚速花性熱淹置京師然味不甚美微苦必爲能消酒毒故爲果花乾則色淡紫

千金方

治心腹脹滿短氣以草豆蔻二兩去皮

雷公云

凡使須去蒂并向裏子後

藕實



藕實莖味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾

本草二十三

三

久服輕身耐老不飢延年一名水芝一名蓮生汝南池澤八月採

閻隱居云此即今蓮子八月九月取堅黑者乾擣破之花及根並入神仙用今云莖恐即是根

不爾不應言甘也宋帝時太官作血鷗音曷庖人削藕皮誤落血中

遂皆散不凝醫乃用藕療血多効也唐本注云別錄云藕主熱渴散

血生肌久服令人心懽

王禹鵠等譯蜀本圖經云此生水中葉名荷

圓徑尺餘爾雅云荷芙蓉其莖茄其葉蕩其本莖其華菡萏其實蓮

其根藕其中的中薏是也爾雅釋曰芙蓉其總名也別名芙蓉江東

人呼荷菡萏蓮葉也的蓮實也薏中心也郭云莖莖下白蒻在泥中

者今江東人呼荷華爲芙蓉北方人便以藕爲荷亦以蓮爲荷蜀人

以藕爲茹或用其母爲華名或用根子爲母葉號此皆名相錯習俗

傳誤失其正體也陸機疏云蓮青皮裏白子爲的中有青爲薏味

甚苦故里語云苦如薏是也

樂性論云藕汁亦單用味甘能消瘀血

不散節擣汁主吐血不止口鼻並皆治之

王氏說云蓮生食之主霍亂後虛渴煩悶不能食其產後忌生冷物惟藕不同生冷爲能破血故

也又蒸食甚補五藏實下脾與蜜同食令人腹藏肥不生諸蟲亦可

体狼仙家有貯石蓮子及乾藕經千年者食之至妙矣

寒主五藏不足傷中氣絕利益十二經脉血氣生食微動氣蒸食之

良又熟去心爲末蠟蜜和九日服三十九令人不飢此方仙家用爾

尚生又或於山巖之中止息不逢陰雨經久不壞又諸鳥猿猴不食又鴈腹中者空腹食十枚身輕能登高涉遠鴈食糞於田野中經年

藏之石室內有得三百餘年者逢此食永不老矣其房荷葉皆破血

陳藏器

云藕實蓮也本功外食之宜蒸生則脹人腹中薏令人吐食

當去之經秋正黑者名石蓮入水必沈惟煎鹽鹵能浮之石蓮山海

間經百年不壞取得食之令人髮黑不老藕本功外消食止洩除煩解

酒毒厭食及病後熱渴

又云

荷韋味苦平無毒主安胎去惡血留好

血血痢煮服之即荷葉蒂也又葉及房主血脹腹痛產後胎衣不下

酒煮服之又主食野菌毒水煮服之鄭玄云芙蕖之莖曰荷的中薏

食之令人霍亂

東良

云蓮子心生取爲未以米飲調下三錢療血

渴疾產後渴疾服之立愈

日華子

云藕溫止霍亂開胃消食除煩止

渴口乾渴疾止怒令人喜破產後血悶生

研服亦不妨擣署金瘡并

傷折止暴痛煮食大開胃節冷解熱毒消瘀血產後血悶合地黃

痢治腰痛治泄精安心多食令人喜又名蓮的蓮子心止霍亂

又云

蓮子溫并石蓮益氣止渴助心止

渴落胞殺蕈毒并產後口乾

心肺燥煩悶入藥炙用之

又云

蓮子溫并石蓮益氣止渴助心止

渴疾產後渴疾服之立愈

又云

蓮子溫并石蓮益氣止渴助心止

渴落胞殺蕈毒并產後口乾

心肺燥煩悶入藥炙用之

又云

爾雅及陸機疏謂荷爲芙蕖江東呼荷其莖茄其葉蕷加遐或作蕷其

本莖生汝南池澤今處處

蓮蓮謂房也其根藕幽州人謂之光旁至深益大如人臂其中的蓮

中子謂青皮白子也中有青長二分爲薏中心苦者是也凡此數物

今人皆以中藥藕生食其莖主霍亂後虛渴煩悶不能食及解酒食

毒花鎮心益顏色入香尤佳荷葉止渴殺蕈毒今婦人藥多有用荷

爾雅及陸機疏謂荷爲芙蕖江東呼荷其莖茄其葉蕷加遐或作蕷其

本莖生汝南池澤今處處

蓮蓮謂房也其根藕幽州人謂之光旁至深益大如人臂其中的蓮

中子謂青皮白子也中有青長二分爲薏中心苦者是也凡此數物

今人皆以中藥藕生食其莖主霍亂後虛渴煩悶不能食及解酒食

毒花鎮心益顏色入香尤佳荷葉止渴殺蕈毒今婦人藥多有用荷

葉者葉中蒂謂之荷韋主安胎去惡血留好血實主益氣其的至秋

表皮黑而沈水者謂之石蓮陸機云可磨爲政如米飯輕身益氣令

人強健醫人炒末以止痢治腰痛又治噦逆以實人六枚炒赤黃色

研末冷熟水半盞和服便止惟苦薏不可食能令霍亂大抵功用主

血多效乃因宋太官作血衄庖人削藕皮

誤落血中遂散不疑自此醫家方用主血也

本草二十三

四

葉者葉中蒂謂之荷韋主安胎去惡血留好血實主益氣其的至秋表皮黑而沈水者謂之石蓮陸機云可磨爲政如米飯輕身益氣令人強健醫人炒末以止痢治腰痛又治噦逆以實人六枚炒赤黃色研末冷熟水半盞和服便止惟苦薏不可食能令霍亂大抵功用主血多效乃因宋太官作血衄庖人削藕皮誤落血中遂散不疑自此醫家方用主血也

蓋入生蜜一合

又方

治食蟹中毒以生藕汁或

煮乾蒜汁或冬瓜汁並佳

又方

治撲打墜

心悶亂疼痛以火乾荷葉五斤燒令盡細研

食前以童子熱一小便一小盞調三錢七日三服

又方

治耳目補中

脾米三合作粥候熟入蓮實攬勻食之

又方

治時氣煩渴

服方寸匕七日三服

又方

治墜馬積血心腹腫

主吐血咯血以荷葉焙

血無數乾藕根末酒

梅

師方 治產後餘血不盡奔上衝心

孫真人 食成霍亂

蓮子不去心

集驗方 治漆瘡取蓮葉

乾者一斤水一斗

救急方 治產後血不盡疼悶心痛荷

葉熬令香爲末煎水下方寸匕

的五月生蓮脆至秋表皮黑的成可食可摩

瘡上日再差詩疏

以爲飯如粟飯輕身養氣令人強健又可爲粥

煮取五外洗

葉熬令香爲末煎水下方寸匕

瘡上日再差詩疏

以爲飯如粟飯輕身養氣令人強健又可爲粥

唐書

姜撫言服常春藤使白髮還鬚則長生可致藤生太湖最良

終南往往有之不及也帝遣使者至太湖多取以賜中朝老臣又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝作湯餅賜大臣右驍衛將軍甘守誠能訂藥石曰常春者千歲藟也旱藕牡蒙也方家久

不用撫易

名以神之太清諸草木方

七月七日採蓮花八月八日採根八分九月九日採實九分陰乾擣

篩服方寸

七令人不老

華山記

華山頂有池生千

葉蓮花服之羽化

衍義曰

藕實就蓬中乾者為石蓮子取其肉於砂盆中乾擦去浮

上赤色留青心為末少入龍腦為湯點寧心志清神然亦

有粉紅千葉白千葉者皆不實如此是有四等也

其根惟白蓮為佳今禁中又生碧蓮示一端也

橘



柚



本草二十三

五

薛

橘柚味辛溫無毒主胃中瘕熱逆氣利水穀下氣止嘔欬除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀氣衝胃中吐逆霍亂止洟去寸白以服去貁下氣通

神輕身長年一名橘皮

生南山川谷生江南十月採

陶隱居

云此是說其皮功爾以東橘為好西江亦有而不如其皮小

冷療氣乃言勝橘北人亦用之並以陳者為良其肉味甘酸食之多

麥恐非益也今此雖用皮既是果類所以猶宜相從柚子皮乃可服而不復入藥用此應亦下氣

唐本注

云抽皮厚味甘不如橘皮味辛

而苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡甘今俗人或謂橙為柚非也按呂氏春秋云果之美者有雲夢之柚郭璞云柚似橙而大於橘孔安國云小曰橘大曰柚皆為甘也

金匱自本部今移目禹錫等謹按

藥性論

云橘皮苦辛能治胃膈間氣開胃主氣滯消痰延治上氣效妙陳藏器

云橘柚本功外中實冷酸者聚痰甜者潤肺皮堪入藥子非宜人其類有朱柑乳柑黃柑石柑沙柑橘類有朱橘乳橘塌橘山橘黃淡子此輩皮皆去氣調中實總堪食就中以乳柑為上本經合入果部宜加實字入木部非也嶺南有柚大如冬瓜孟诜

云橘止泄痢食之下食開胃膈痰實結氣下氣不如皮穰不可多食止氣性雖溫止渴又乾皮一斤橘為末蜜為丸每食前酒下三十九治下

煦冷氣又取陳皮一斤和杏仁五兩去皮尖熬加少蜜為丸每日食前飲下三十九下腹藏間虛冷氣腳氣衝心心下結硬悉主之

子云橘味甘酸止消渴開胃除肾中隔氣又云皮暖消痰止嗽破癥

瘕痃癖又云核治腰痛膀胱氣腎疼炒去殼酒服良橘囊上筋膜治渴及吐酒炒煎湯飲甚驗也

柚子無毒治妊娠人與食少圖

橘柚生南山川谷及江南今江浙荆襄湖嶺皆有之木高二丈葉與枳無辨刺出於莖間夏初生白花六月七月而成

實至冬而黃熟乃可取舊說小者為橘大者為柚又云柚似橙而實

酢大於橘孔安國注尚書厥包橘柚郭璞注爾雅柚條皆如此說又

閩中嶺外江南皆有柚比橘黃白色而大裏唐閒柚色青黃而實小

皆味酢皮厚不堪入藥今醫方乃用黃橘青橘兩物不言柚豈青橘

是抽之類乎然黃橘味辛青橘味苦李經二物通云味辛又云一名

橘皮又云十月採都是今黃橘也而今之青橘似黃橘而小與舊說

藥良古今方書用之最多亦有單服者取陳皮橘末蜜和丸食前酒

吞三十九橘子大主下焦積冷亦可并杏子人合丸治腸閒虛冷脚

氣衝心下結硬者悉主之而青橘主氣帶下食破積結及膈氣方

用之與黃橘全別凡橘核皆治腰及膀胱腎氣炒去皮酒服之良肉

不宜多食令人痰帶又乳柑橙子性皆冷並其類也多食亦不宜人

今人但取其核作塗面藥餘亦稀用故不悉載又有種枸音鉅亦音鉅

緣音俗如小瓜狀皮若橙而光澤可愛肉甚厚切如蘿蔔雖味短而

都下亦貴之

香氣大勝柑橘之類置衣笥中則數日香不歇古作五和粉素感切所用

陶隱居云性溫宜人今閩廣江西皆有彼人但謂之香橘子或將至

深者最妙用其橘皮年時後方

治卒失聲聲不出橘皮五兩水三升煮取一升外去滓頓服

毒濃煮橘皮飲汁

皮一宿渡出去穰又用鹽三分一處拌和匀候良久鉗子內炒微焦

爲末每服一錢半茶末半錢水一盞煎至七分放溫常服不用入茶

前沸湯熱下氣消痰化食橘皮半兩

微熬作末如茶法煎呷之

又方治婦人產後氣逆以青橘皮點亦妙

爲末葱白童子小便前服之

橘皮一宿渡出去穰培爲末非時溫酒下神驗

治腰痛不可忍橘子人炒研爲末每服一錢酒一盞煎至七分和滓空心服

兩湯浸去穰培爲末非時溫酒下神驗

治諸吃噫氣消痰化食橘皮二兩通熱頓服更加枳殼一兩去穰炒同煎之服效

尚書注

小曰橘大曰柚楊州

酸食皮汁止憊厥之疾

太草二十三

六

經驗後方治膈下冷氣及酒食飽滿常服青橘皮四

兩鹽一兩分作四分一分無用湯浸青橘

皮一宿渡出去穰培爲末非時溫酒下神驗

治諸吃噫氣消痰化食橘皮二兩通熱頓服更加枳殼一兩去穰炒同煎之服效

孫尚藥

橘皮一宿渡出去穰培爲末非時溫酒下神驗

治腰痛不可忍橘子人炒研爲末每服一錢酒一盞煎至七分和滓空心服

兩湯浸去穰培爲末非時溫酒下神驗

治諸吃噫氣消痰化食橘皮二兩通熱頓服更加枳殼一兩去穰炒同煎之服效

列子

吳楚有大木名櫟碧樹而冬生實丹而味

衍義曰

橘柚自是兩種故曰一名橘皮是元無柚字也豈有兩等

其意謂柚字所惑妄生分別亦以過矣且青橘與黃橘治療尚別矧抽爲別種也郭璞云柚似橙而大於橘此即是識橘柚者也今若不如此言之恐後世亦以抽皮爲橘皮是貽無窮之患矣去古既遠後之賢者亦可以意逆之耳橘惟用皮與核皮天下甚所須也仍湯浸去穰餘如經與注核皮二者須自收爲佳有人患氣嗽將朞或教以橘皮生薑倍乾坤麴等分爲末丸桐子大食後夜卧米飲服三十五丸兼舊患膀胱縁服此偕愈然亦取其陳皮入藥此六陳中一陳也腎壯腰痛膀胱氣痛微微炒核去殼爲末酒調服愈

大棗



大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二

本草二十三

七

經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百病補中益氣強力除煩悶療心下懸腸澼以服輕身長生不飢神仙一名乾棗一名美棗一名良棗八月採暴乾○三歲陳核中人燔音之味苦主腹痛邪氣○生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食○葉覆麻畫能令出汗生河東平澤

殺烏頭毒蜀蠵居云舊云河東猗氏縣棗特異今青州出者形大核細多膏甚甜鬱州玄市亦得之而鬱州者亦好小不及爾江東臨沂金城棗形大而虛少脂好者亦可用南棗大惡殆不堪敢道家方藥以棗爲佳餌其皮利肉補虛所以合湯皆擘之也唐本草云別錄云棗葉散服使人瘦久即嘔吐揩熱肺瘡良目書等語說云乾棗溫主補津液強志三年陳者核中人主惡氣卒疰忤又療耳聾聾塞不聞音聲香臭者取大棗十五枚去皮核革麻子三百顆去皮二味和擣綿裹塞耳臯日一度易三十餘日聞聲及香臭先治耳後治臯不可並塞之又方巴豆十粒去殼生用松脂同擣絲裏塞耳又云洗心腹邪氣和百藥毒通九竅補不足氣生者食之過多令人腹脹

蒸煮食補腸胃肥中益氣第一
兒患秋痢與蠶棗食良

損除腸胃僻氣和光粉燒治痢

牙齒有病人切忌啖之

凡棗亦不入藥小

宜合生葱食

棗葉溫無毒治小兒壯熱

煎湯浴和葛粉裹佛子

佳及治熱瘤也

圖經曰大棗乾棗也生棗並生河東今近北州郡皆有而

瓠也邊薯棗云子細薯今謂之鹿盧棗橘子兮切白棗云即今棗子白乃熟搣酸棗云木小實酢者遵羊棗云實小而圓紫黑色今俗呼之爲羊矢棗洗大棗云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄苦棗云

子味苦者皆無實棗云不著子者還味淡而審切棗云還味短味也而酸棗自見別條其餘種類非一今園圃皆種蒔之亦不能盡別其名又其極美者則有水棗御棗之類皆不堪入藥蓋肌實輕虛暴服之則枯敗推青州之種特佳雖晉絳大實亦不及青州者之肉厚也並八月採暴乾南都人煮而後暴及乾皮薄而皺味更甘於它棗謂之天蒸棗然不堪入藥又有仲思棗大而長有一二寸者正紫色細文小核味甘重北齊時有仲人仲思得之因以爲名隋大業中信都嘗獻數顆近世稀復有之又廣州有一種波斯棗木無傍枝直聳三丈至叢四向共生十餘枝葉如櫻櫛彼士亦呼爲海櫻木三五年一著子都類此棗但差小耳舶商亦有攜本國生者至南海與此地入食之云味極甘似此中天蒸棗之類然其核全別兩頭不尖雙卷而圓如小塊紫礦種之不生疑亦蒸熟者近亦少有將來者

本草二十三

八

食療云

棗和桂心白瓜人松樹皮爲丸久服香身并聖惠方

令髮易長東行棗根三尺橫安斂上蒸之兩頭汗出收之傅髮即長

又方

治傷中筋脉急上氣效

痔發疼痛肥大棗一枚

酥研令極熟傅棗兩微火煎入棗肉中泣盡

外臺秘要

痔發疼痛肥大棗一枚剥去皮取水銀掌中以

出梅師

治妊娠四五十四枝燒令焦爲末以小便服

孫真人宜食

又方生

滿脹作寒熱

常含一枝微微嚥之

利氣生津液

何晏

顏色美

神異經曰

安平好棗中山好栗魏郡

吳氏本草

棗主調中益脾氣令人好

志氣

九州論曰

好杏河內好稻真定好梨

濟佳令人愛氣生津液

何晏

縮氣味

御棗甘潤殊

於常棗可以安軀益氣力

衍義曰

北方荒中有棗林焉其高丈敷張枝條一里

志氣

不堪收暴

今人將乾棗去核於鑄鍋中微火緩逼乾為末量多少入生薑末爲湯點服調和胃氣又將煮棗肉和治脾胃丸藥尤佳又青州

食之可用

落酥者是又有牙棗先衆棗熟亦甘美但微酸尖長此二等止堪

食用又

御棗甘美輕脆後衆棗熟以其甘故多生蟲

今人所謂撲

大棗今先青州次晉州此二等可克

食之可

收暴

今人將乾棗去核於鑄鍋中微火緩逼乾為末量多少入生

薑末爲湯點服調和胃氣又將煮棗肉和治脾胃丸藥尤佳又青州

棗去皮核焙乾爲棗
圈達都下爲奇果

仲思棗味甘溫無毒主補虛益氣潤五藏去痰嗽冷氣久服令人肥健好顏色神仙不飢形如大棗長二寸正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思得此棗因以爲名隋大業中信都郡獻數顆又有千年棗生波斯國亦稍溫補非此之儕也

今附

目錄等

云棗

壺棗邊要棗擠白棗搣酸棗楊散齊棗遵羊棗洗大棗煮填棗蹶泄苦棗皆無實棗還味稔棗釋曰壺棗者棗形似壺也郭云今江東呼棗大而銳上者爲壺壺猶瓠也邊大而脣細者名邊要棗郭云子細腰今謂之鹿盧棗棗子白熟者名擠實小而味酢者名搣棗遵一名羊棗郭云實小而貞紫黑色今俗呼之爲羊矢棗洗最大之棗名也郭云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵厥狀者味苦之棗名也昔者無實之棗名也還味者短味也微黃並未詳陳士良云苦棗大寒無毒棗中苦者是也人多不食主傷寒熱伏在藏府狂蕩煩滿大小便秘潤取肉煮研爲蜜丸藥佳今處處有

本草二十三

九

葡萄



葡萄味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便生隴西五原燉煌山谷

陶隱居云魏國使人多齋來狀如五味子而甘美可

作酒云用其藤汁殊美好北國人多肥健耐寒蓋食斯乎不植淮南亦如橘之變於河北矣人說即此間蔓於唐安蔓於安恐如彼之枳橘耶唐本生云蔓與葡萄相似然蔓是千歲蘿葡萄作酒法總收子汁釀之自成酒蔓山葡萄並堪爲酒陶云用藤汁爲酒謬

色又有似馬乳者又有圓者皆以其形為名又有無核者七月八月

熟子釀為酒及漿別有法謹按蔓是山葡萄亦堪為酒孟說云葡

萄不問土地但收之釀酒皆得美好或云子不堪多食令人卒煩悶眼

閻根濃黃汁細細飲之止嘔噦及霍亂後惡心姪孕人子上衝心散

之即下其胎安樂論云葡萄君味甘酸除腸間水氣調中治淋通

小便段成式蜀本草云葡萄有黃

白黑三種成熟之時子實逼側也

京州郡皆有之苗作藤蔓而極長大盛者一二本綿被山谷間花極

細而黃白色其實有紫白二色而形之圓銳亦二種又有無核者皆

七月八月熟取其汁可以釀酒謹按史記云大宛以葡萄為酒富人

藏酒萬餘石久者十數歲不敗張騫使西域得其種而還種之中國

始有蓋比果之最珍者魏文帝詔群臣說葡萄云醉酒宿醒掩露而

食甘而不飴酸而不酢冷而不寒味長汁多除煩解憤他方之果寧

有匹之者今大原尚作此酒或寄至都下猶作葡萄香根苗中空相

通圃人將慎之欲得厚利暮溉其根而晨朝水浸子中矣故俗呼其

苗為木通逐水利小腸尤佳今醫家多暴收其實以治時氣發瘡

癰不出者研酒飲之甚效江東出一種實細而味酸謂之蔓子

謂胡人歲獻葡萄酒者是此瘡瘍不出食之盡

出多食皆昏人眼波斯國所出大者如鷄卵

衍義曰

葡萄先朝西夏持師子來獻使人兼賣葡萄遺州郡比中國者皆相似最難乾不乾不可收仍酸漸不可食李白所

謂胡人歲獻葡萄酒者是此瘡瘍不出食之盡

本草二十三

十

栗子



栗味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生
山陰九月採

開寶書

古今會稽最豐諸暨音既栗形大皮厚不及始豐皮薄而甜相傳有人患脚弱往

蒸暴之

馬王堆

云栗作粉勝於菱芡音儉嚼生者塗瘡上療筋骨斷

音段碎疼痛腫瘀血有效其皮名扶擣為散蜜和塗肉令急縮毛殼

療火丹療毒腫實飼孩兒令齒不生樹白皮水煮汁主溪毒

高錫

者如李小如桃李又有板栗佳栗二樹皆大又有茅栗似板栗而細其樹雖小然葉與諸栗不殊惟春生夏花秋實冬枯今所在有之

孟

云栗子生食治腰脚蒸炒食之令氣擁患風水氣不宜食又樹皮

蜀本草圖

云

葡萄

有黃

圖經曰

葡萄生隴西五原燉

孟說云

谷

白黑三種成熟之時子實逼側也

京州郡皆有之苗作藤蔓而極長大盛者一二本綿被山谷間花極

細

而黃白色其實有紫白二色而形之圓銳亦二種又有無核者皆

七

月

八

月

熟取其汁可以釀酒謹按史記云大宛以葡萄為酒富人

藏酒萬餘石久者十數歲不敗張騫使西域得其種而還種之中國

始有蓋比果之最珍者魏文帝詔群臣說葡萄云醉酒宿醒掩露而

食甘而不飴酸而不酢冷而不寒味長汁多除煩解憤他方之果寧

有匹之者今大原尚作此酒或寄至都下猶作葡萄香根苗中空相

通圃人將慎之欲得厚利暮溉其根而晨朝水浸子中矣故俗呼其

苗為木通逐水利小腸尤佳今醫家多暴收其實以治時氣發瘡

癰不出者研酒飲之甚效江東出一種實細而味酸謂之蔓子

謂胡人歲獻葡萄酒者是此瘡瘍不出食之盡

出多食皆昏人眼波斯國所出大者如鷄卵

主癰瘍毒謹按宜日中暴乾食即下氣補益不爾猶有木氣不補益
汁飲之止反胃消渴今所食生栗可於熱灰火中煨令汗出食之良
不得通熱熱則擁氣生即發氣故火煨殺其木氣耳良云栗有
數種其性一類三顆一球其中者栗搘也理筋骨風痛曰良云栗去

搘生食破冷痃癖日生七箇又生齶置可出箭頭亦置惡刺并傳

療癰腫毒痛樹皮煎汁治

沙蟲溪毒殼煮治渴血

最勝木棟類櫟花青黃色似胡桃花實有房彙若拳中子三五小者

苦桃李中子惟一二將熟則鱗拆子出凡栗之種類亦多詩云樹之

莘音棟栗陸機疏云栗五方皆有之周秦矣楊特饒吳越被城表裏

皆栗惟濮陽及范陽栗甜美味長他方者悉不及也倭韓國諸島上

栗大如雞子亦短味不美桂陽有莘而叢生實大如杏子中人皮子

形色與栗無異也但差小耳又有奧栗皆與栗同子圓而細或大即

莘也今此色惟江湖有之又有茅栗佳栗其實更小而木與栗不殊

但春生夏花秋實冬枯爲異耳栗房當心一子謂之栗櫟治血尤效

今衡山合活血丹用之果中栗最有益治腰脚宜生食之仍略暴乾

去其木氣惟患風水氣不宜食以其味鹹故也殼煮汁飲止反胃及

消渴木皮主瘡

毒醫家多用

五色無常治之煮栗

又方治熊虎爪甲所傷栗子爵傳之

外臺秘要治小兒疳瘡

時後方丹者惡粟子爵傳之

經驗後方治腎虛腰腳無

力生栗袋盛乾每日平

明喫十餘顆次喫猪腎粥

孫真人去栗味鹹腎病宜食

勝金方馬治

汗入肉血瘡用

行義曰栗散乾莫如曬欲生收莫如潤沙中藏至

栗肉嚼傳之

者難化熟即帶氣隔食生蟲往往致小兒病人亦不知所謂補腎氣

者以其味鹹又帶其氣爾湖北路有一種栗頂圓末尖謂之旋栗圖

經引詩言莘音櫟

栗者謂其象形也

本草 千三

十一

呂

成州蓬蘽



堅韌志信力有守又療暴中風身熱大驚久服輕身
不老一名覆盆一名陵蘿一名陰蘿生荆山平澤及

蓬蘽

力軌

味酸

性無毒

根

葉

花

子

根

葉

花

子

根

葉

菟荀

云李云即是人所食苺音戎爾今注是覆盆苗莖也

是覆盆苗莖也

云苺也按切韻苺是覆盆草也又藥者藤也今據蓬蘽之名明其藤

蔓也唐本注云蓬蘽覆盆一物異名本謂實而非根此亦誤矣示如

蜀漆與常山異條苟荀與薜蕪各用今此附入果部者蓋其子是覆盆也

盆也

陶言蓬蘽是根名乃昌容所服以易顏者蓋根苗相近爾李

是覆盆苗莖也

云諸家本草皆說是覆盆子根今觀採取之家按草木類所說自有蓬蘽似蠶荀子紅色其葉似野薔薇有刺食之酸甘恐諸家不識誤說是覆盆也

云諸家本草皆說是覆盆子根今觀採

蓬蘽覆盆苗莖也生荆山平澤及菟荀覆盆子舊不著所出州土今並處處有之而秦吳地尤多苗短不過尺莖葉皆有刺花白子赤黃如半彈丸大而下有莖承如柿蒂狀小兒多食其實五月採其苗葉採無時江南人謂之苺然其地所生差晚三月始有苗八九月花開十月而實成功用則同古方多用亦采其子取汁合膏塗髮不白按葉絞汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線便效昌容服之以易顏其法四五月候卦實成採之暴乾擣篩水服三錢匕安五藏益精強志倍力輕體不老久久益佳崔元亮海上方著此三名一名西國草一名畢擣加一名覆盆子治眼暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天行目暗等取西國草日暴乾擣令極爛薄綿裹之以飲男乳汁中浸如人行八九里久用點目中即仰卧不過三四日視物如少年禁酒油麪

花點燈正言此花也农取汁合膏塗髮不白食其子令人好顏色

葉絞汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線其類有三種四月熟

本草二十三

十一

陳藏器云

變白不老佛說云蘇蜜那

甘美如覆盆子者是也餘不堪入藥今人取茅苺當覆盆誤矣

唐本餘

耐寒濕

衍義曰蓬蘽非復盆也自別是一種雖枯敗而枝便不

散今人不見用此即賈山策中所言者是此也

覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月採

唐本餘

耐寒濕

實名李云是苺子乃似覆盆之形而以津汁爲味其核微細藥中用覆盆子小異此未詳孰是唐本云覆盆蓬蘽一物異名本謂實非根也李云苺子近之矣其根不入藥用然生處不同沃地則子大而甘瘠地則子細而酸此乃子有甘酸根無酸味陶景以根酸子甘將根入果重出子條殊爲孟浪今云蓬蘽乃覆盆之苗也覆盆子蓬蘽之子也陶注唐注皆非今用覆盆子補虛續絕強陰健陽悅澤肌膚安和藏腑溫中益力療勞損風虛補肝明目

云是蓬蘽子也陶云蓬蘽子津味與覆盆子小異而云未審乃慎之至也蘇云覆盆蓬蘽一物也而云剰出此條者亦非也今據蓬蘽即苺也按切韻苺音茂其子覆盆也又按藥者藤也今此云覆盆子則不言其蔓藤也前云蓬蘽則不言其子實也猶如苧蓐與薜蕪異條附子與烏頭殊用

云覆盆子臣微熱味甘辛能主男子腎精虛竭女子食之有子主陰虧能令堅長云云覆盆子味酸五月於麥田中得之良採得及烈日曬乾免燭不堪江東亦有名懸鉤子大小形異氣味功力同北土即無懸鉤南地無覆盆是土地有前後生

非兩種物耳

陳藏器

云策取汁合膏塗髮不白食其子令人好顏

色葉按綴取汁滴目中去瘡亦有蟲出如絲線

陳氏

云蓬蘽似蘆

莓大覆盆小其苗各別

山中人採來賣其味酸甘外如荔枝櫻桃許大軟紅可愛

失採則就枝生蛆益腎藏縮小便服之當覆其溺器如此取名食之

多熟收時五六分熟便可採烈日曝仍須薄綿蒙之今人取汁作煎

爲果仍少加蜜或熬爲稀湯點服

治肺虛寒採時着水則不堪煎

蓬蘽條下雷公云

凡使用東流水淘兩遍又晾乾方用爲妙也

衍義曰

覆盆子長條四五月紅熟秦州甚多永興華州亦有及時

失採則就枝生蛆益腎藏縮小便服之當覆其溺器如此取名食之

多熟收時五六分熟便可採烈日曝仍須薄綿蒙之今人取汁作煎

爲果仍少加蜜或熬爲稀湯點服

艾實



本草二十三

十三

艾音伎實味甘平無毒主安中補五藏不飢輕身一名菱

音陵

陶隱居

云廬江間最多皆取火燔以爲米充糧今多蒸暴蜜和

餌之斷穀長生水族中又有菰音孤首性冷恐非上品

被霜後食之令陰不強又不可雜白蜜食令生蟲也

唐本草

云艾作粉極白潤宜

人

周易圖經云生水中葉浮水上其花黃白色實有

二種一四角一兩角

李時珍云菱實仙家蒸作粉蜜和食之可休粮水

和薑飲一兩盞即消矣

圖經曰

艾菱實也舊不著所出州土今處

處有之葉浮水上花黃白色落

令人腹脹滿者可緩酒

李時珍云菱實仙家蒸作粉蜜和食之可休粮水

和薑飲一兩盞即消矣

而實生漸向水中乃熟實有二種一種四角一種兩角兩角中又有嫩皮而紫色者謂之浮菱食之尤美江淮及山東人曝其實人以為

米可以當糧道家蒸作粉蜜漬食之以斷穀水

果中此物最治病解丹石毒然性冷不可多食

含吳茱萸其津

周禮疏

屈到嗜艾

即菱角也

衍義曰

艾今世俗謂之菱

角所在有煮熟取液消其腹脹矣

食療

神仙家用發冷氣人

人食之代糧不益脾又有水菱亦芟也但大而脆可生食和合治療未聞其用有人食生芟多則利及難化是神性冷

橙子皮味苦辛溫作醬醋香美散腸胃惡氣消食去

胃中浮風氣其瓤味酸去惡心不可多食傷肝氣又以

瓠洗去酸汁細切和鹽蜜煎成煎食之去胃中浮風

其樹亦似橘樹而葉大其形圓大於橘而香皮厚而

皺八月熟今附虛熱癆瘦氣發瘰癧殺魚蟲毒不與獐肉同食發頭旋

惡心圖經文具橘云橙子暖無毒行風氣發

心圖經袖條下云橙子皮今人止爲果或取皮合湯待

衍義曰橙子皮今人止爲果或取皮合湯待賓未見入藥宿酒未醒食之速醒

櫻桃



櫻桃味甘主調中益脾氣令人好顏色美志

陶隱居云此即今朱

櫻味甘酸可食而所主又與前櫻桃相似恐醫家濫載之未必是今者爾又胡頰子凌冬不凋子亦應益人或云寒熱病不可食

唐本草

本草二十三

十四

薛

云葉擣傳蛇毒絞葉汁服防蛇毒內攻

目瘡等證云櫻桃

熱益氣多食無損又云此名櫻非桃也不可多食令人發閑風東行

根療寸白蛇蟲

陳氏良云櫻桃平無

云櫻桃排微毒多食令人吐

目瘡等證云櫻桃

中南都者最勝其實熟時深紅色者謂之朱櫻正黃明者謂之蠟櫻極大者有若彈丸核細而肉厚尤難得也食之調中益氣美顏色雖多無損但發虛熱耳惟有閑風人不可噉噉之立發其葉可擣傳蛇毒亦絞汁服東行根亦殺白寸蛇蟲其木多陰最先百果而熟故古多貴之謹按書傳引吳普本草曰櫻桃一名朱茱一名麥甘酣今本草無此名乃知有脫漏多矣又爾雅云楔吉黠荆桃郭璞云今之櫻桃而孟詭以爲櫻非

桃類未知何據

補中益氣主水穀痢止

泄精東引根治蛇蟲

止

司馬相如賦山朱櫻即櫻桃也

禮記謂之爾

謂之雅荆桃

櫻桃孟詭以爲櫻非桃類然非桃類蓋以其形

此唐王維詩云纔是寢園春薦後非干御苑鳥銜殘小兒食之纔過

多無不依熱此果在三月末四月初間熟得正陽之氣先諸果熟性故熱今西洛一種紫櫻至熟時正紫色皮裏間有細碎黃點此最珍

廷藥中不甚須也今亦上供朝

雞頭實



雞頭實味甘平無毒主濕腫脹脅漏補中除暴疾益精氣強志令目明眼轉身不飢而老神仙一名鴈喙

寶一名芟音儉生雷澤池澤八月採

蘭亭居云此即今蕎音葦子形上花似雞冠故名雞

頭仙方取此并蓮實合餌能令小兒不長正爾食之亦當益人唐本經云此實去皮作粉與菱音陵粉相似益人勝菱臣禹錫等謹按蜀圖經云此生水中葉大如荷皺而有刺花子若拳大形似雞頭實若石榴皮青黑肉白如菱米也孟詒云雞頭作粉食之甚妙是長生之藥與小兒食不能長大故駐年耳生食動風冷氣蒸之於烈日曬之其皮即開亦可春作粉根子良云此種雖生於水而有軟根名蕎菜主小腹結氣痛宜食

圖經曰

雞頭實生雷澤今處處有之生水澤中葉大如

本草二十三

十五

四

經驗後方

治益精氣強志

荷皺而有刺俗謂之雞頭盤花下結實其形類雞頭故以名之其莖叢之嫩者名蕎叢人採以爲菜茹八月採實服餌家取其實并中子擣爛暴乾再擣下篩熬金櫻子煎和丸服之云補下益人謂之水陸丹經傳謂其子爲蕎意聰利耳目以雞頭實三合煮令熟去殼研如膏入粳米一合煮粥空心食之

淮南子云

雞頭已瘦弱疾幽人謂之

衍義曰

雞頭實今天下皆有之河北公塘澤居人採得春去皮搗人爲粉蒸潔作餅可以代糧食多不益脾胃氣兼難消化

鴈莊子

徐無鬼篇有雞雍疏云雞雍雞頭草也服之延年

周禮

加邊之實菱芡栗脯



郢州梅實

品中梅實味酸平無毒主下氣除熱煩渴安心肢體痛

止下痢好唾口乾生

漢中川谷五月採火乾

核微熬之傷寒煩熱水漬飲汁生梅

子及白梅亦應相似今人多用白梅和藥以點誌蝕惡肉也服黃精

人云禁食梅實

云別錄云梅根療風痺出土者殺人梅實利

筋脉去痺

除煩熱

古今人多用蜜薰爲烏梅

云梅核人亦可單用味酸無毒能

在肉中嚼白梅封之刺即出又大便不通氣奔欲死以烏梅十顆置

湯中湏臾換去核杆爲丸如棗大內下部少時即通謹按擘破水漬

以少蜜相和止渴霍亂心腹不安及痢赤治瘧方多用之

云梅研傳之又云烏梅暖無毒除勞治骨蒸去煩悶盈腸止痢消酒毒治

止吐逆梅葉擣碎湯洗衣易脫也嵩陽子云清水揉梅葉洗蕉葛衣

經夏不脆余試之驗云梅子暖止渴多啖傷骨蝕脾胃令人

發熱根葉煎濃湯治休息痢并霍亂偏枯皮膚麻痺去黑點令人得睡又

建茶乾薑爲丸止休息痢大驗也

皆有之其生實酢而損齒傷骨發虛熱不宜多食之服黃精人尤不

相宜其葉者濃汁服之已休息痢根主風痺出土者不可用五月採

其黃實火熏乾作烏梅主傷寒煩熱及霍亂躁渴虛勞瘦羸產婦氣

痢等方中多用之南方療勞瘍劣弱者用烏梅十四枚豆豉二合桃

柳枝各一虎口握甘草三十長生薑一塊以童子小便二升煎七合溫服其餘藥使用之尤多又以鹽殺爲白梅亦入除痰藥中用又下

有楊梅條亦生江南嶺南且木若荔枝而葉細陰厚其實生青熟紅

肉在核上無皮殼南人淹藏以爲果寄至北方甚多今醫方鮮用故

附於此

聖惠方

主傷寒下部生蠆瘡用烏梅肉三兩炒令燥杵爲末煉蜜九如梧桐子大以石榴根皮煎湯食前下

十九又方 治痰厥頭痛以十箇煎取六盞合煎至七分去滓非時溫服吐即佳

又方 治瘡中新努肉出杵肉以蜜和捻作餅子如錢許大

垢已出以二十箇水一盞煎取六分去滓食前分爲二服肘後方同

又方 治瘡中新努肉出杵肉以蜜和捻作餅子如錢許大

厚以貼瘡差爲度

外臺秘要 治下部蟲齧杵梅桃葉一斛蒸之

葛氏 治赤白痢下部疼重以二十枚打碎水二升頓服

外合煮稍稍食之漸漸自消

經驗方 治馬汗入肉用烏梅和核爛杵爲末以頭醋和爲膏先將瘡口以針刺破但出紫血有

紅血出用帛拭乾以膏傳上以帛繫定

梅師 治傷寒四五日頭痛壯熱胷中煩痛烏梅十四箇鹽五合水一升煎取一半服

本草二十三

十六

圖經

曰 梅實生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺

弗

吐之簡要濟衆

治消渴止湏渴以烏梅肉二兩微炒爲末每服三錢水二盞煎取一盞去滓入豉二百粒煎至半盞

去滓臨卧時服

鬼遺方

治一切瘡內出以烏梅燒爲灰杵末傅上惡肉立盡極妙

益氣不飢

毛詩疏云

梅暴乾爲腊羹臘蘿

魏文帝

與軍士失道大渴而無水遂下

令曰前有梅林結子甘酸可以止渴

衍義曰

梅實食梅則津液泄水生木也津液泄故傷齒腎屬水外爲齒故也王叔和曰

膀胱腎合爲津慶此語雖鄙然理存焉

瀉之爲烏梅瀉乾藏密器中爲白梅

蜀州木瓜



本草二十三

十七

木瓜實味酸溫無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

山陰蘭亭尤多被人以爲良果最療轉筋如轉筋時但呼其名及書

上作木瓜字皆愈亦不可解俗人柱木瓜枝云利筋腰又有楨音冥櫧音櫧大而黃可進酒去痰又櫧子瀉斷痢禮云櫧梨曰櫧之鄭公

不識櫧乃云是梨之不臧者然古亦以櫧爲果今則不入例爾雅注

爾雅云楙木瓜注云實如小瓜酢可食然多食亦不益人又爾雅注

櫧似梨而酢涩按其樹枝狀如奈花作房生子形似括樛火乾甚香

後渴不止作飲服之又脚氣衝心取一顆去子煎服之嫩者更佳又

止嘔逆心膈痰垂涎按慎櫧一名蠻櫧本功外食之去惡心其氣

辛香致衣箱中殺蟲魚食之止心中酸水水痢櫧子本功外食之去

惡心酸咽止酒痰黃水小於搘擗而相似北土無之中都有鄭注體

云櫧梨之不臧者爲無功也按木瓜謹按枝葉煮之飲亦治霍亂不可多食損齒及骨又臍下絞痛木瓜兩片桑葉七片大棗三枚碎之以水二升煮取半升頓服之差又云櫧子平損齒及筋不可

食亦主霍亂轉筋煮汁食之與木瓜功稍等餘無有益人處江外常

爲果食之以水二升煮取半升頓服之差又云木瓜止吐瀉實及腳氣水腫冷熱痢心腹痛療渴區逆痰唾等根治脚氣又云楨櫧平無毒消痰解酒毒及治咽喉食止痢浸油梳頭治髮赤并白

圖經曰

木瓜舊不著所出州土陶隱居云山陰蘭亭尤多今處處有之而宣城者爲佳

其木狀若柰花生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳爾雅謂之林郭璞云實如小瓜酢可食不可多亦不益人宣州人種蒔尤

謹遍滿山谷始實成則紙花薄其上夜露日暴漸而變紅花文如生本州以充上貢焉又有一種楨楂木葉花實酷類木瓜陶云大

黃可進酒去痰者是也欲辨之看蒂間別有重蒂如乳者爲木瓜無

此者爲楨楂也木瓜大枝可作杖策之云利筋脉根葉者湯淋足腫

可以已廢又截其木乾之作桶以濯足尤益道家以

楨楂生壓汁合和甘松玄參末作濕香云甚爽神

勿誤用和圓子蔓子土伏子其色樣外形真似木瓜只氣味效并向

裏子各不同若木瓜皮薄微赤黃香甘酸不澁調藥衛助穀氣向裏

子頭尖一面方是真木瓜若和圓子色微黃蒂核龜子小圓味澁微

鹹傷人氣蔓子顆小亦似木瓜味絕澁不堪用土伏子似木瓜味絕

澁子如大樣油麻又苦澁不堪用若餌之令人目澁目赤多弄筋痛

凡使木瓜勿令犯鐵用銅刀削去硬皮并子薄切於日中煞却用黃

牛乳汁拌蒸從已至未其木瓜如膏煎却於日中薄摊曬乾用也

食療

筋煮汁飲之甚良脚膝筋

宿三五度熟裹便差煮木瓜時入一半酒同煮之

毛詩

投我以木瓜報

急痛煮木瓜令爛研作漿粥樣用裹痛處令即易一

之以瓊瑤庄云木瓜

木也可食之木

衍義曰木瓜得木之正故入筋以鉉霜塗之則失醋味受金之制故如是今人多取西京大木瓜爲佳其味和美至熟止青

白色入藥絕有功勝宣州者味淡此物入用故

益筋與血病腎腳膝無力此物不可闕也

本草二十三

十八

柿



柿味甘寒無毒主通鼻耳氣腸澼不足

隱居云柿有數種云今烏柿

火熏者性熱斬下又療狗齧瘡火燄皮逼切者亦好日乾者性冷龜心柿尤不可多食令人腹痛生柿彌冷又有押音卑色青惟堪生啖性冷復甚於柿散石熱家嚼之亦無嫌不入藥用唐本草云柿寒主補虛勞不足謹按乾柿厚腸胃澁肺主殺毒療金瘡火瘡生肉止痛軟熟柿解酒熱毒止口乾壓胃間熱

中建脾胃氣消宿血又紅柿補氣續經脈氣又

醉柿澁下瞧建脾胃氣消宿血作餅及糕與小兒食治秋痢又研柿先煮粥欲熟即下柿

更三兩沸與小兒飽食并妳母叟亦良又乾柿二斤酥一斤蜜半升

先和酥蜜鑑中消之下柿煎十數沸不津器貯之每日空腹服三五枚療男子女人脾虛腹肚薄食不消化面上黑點久服甚良陳藏器

云柿本功外日乾者溫補多食去面酐除腹中宿血創縣火乾者名烏柿人服藥口苦及欲吐逆食少許立止蒂煮服之止噫氣黃柿和米粉作糗蒸與小兒食之止下痢飲酒食紅柿令人心痛直至死亦令易醉陶云解酒毒矣



云柿冷潤心肺止渴滋腸療肺痿平潤聲喉殺蟲火柿性暖功用同前

柿之種亦多黃柿生近京都郡紅柿南北通有朱柿出華山似紅柿而皮薄更甘珍柿音卑柿出宣歙荆襄閩廣諸州但可生取不堪乾柿出宣州越州性甚溫人服藥口苦欲逆食少許當止並可斷下日乾者為白柿入藥微冷又黃柿可和米粉作糗小兒食之止痢又以酥蜜煎乾柿食之主脾虛薄食柿蒂者飲亦止曬木皮主下血不止暴乾更焙篩末米飲和二錢七服之不以上衝下脫兩服可止又有一定種小柿謂之軟棗俚俗暴乾貨之謂之牛柿至冷不可多食凡食柿不可與蟹同令人腹痛大瀉其枯葉至滑澤古人取以臨書俗傳柿有七絕壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可飴六嘉實七落葉肥

火

聖惠方

治耳聾塞以乾柿三枚細切梗米三合豉少許煮粥空心食之

產寶

治產後或患癥

逆氣亂心煩乾柿一箇碎之以水十分煮熟呷

衍義曰

柿如今之市買熬餅華州有一等朱柿比諸品中最深

紅色又一種塔柿亦大於諸柿性皆涼不至大寒食之引癆極甘故如是去皮掛大木株上使風日中自乾食之多動風火乾者味不佳生則澆以溫水養之需澆去可食逮至自然紅爛澆亦自去乾則性平

本草二十三

十九

重又牛心柿如牛之心蒸餅一重又牛心柿如牛之心蒸餅



芋

芋味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝

陶隱居

居云錢塘最多生則有毒發音枝不可食性滑下石服餌家所忌種芋三年不採成朶音呂芋又別有野芋名老芋形葉相似如一根並殺人人不識而食之垂死者佗人以土漿及糞汁與飲之得活矣唐本云芋有六種有青芋紫芋貞芋白芋連禪芋野芋其青芋細長毒多初煮要湏灰汁易水煮熟乃堪食爾白芋貞芋連禪芋紫芋毒少並正爾蒸煮取之又宜冷敢療熱止渴其真白連禪三芋兼肉作羹大佳蹲鵝之饒蓋謂此也野芋大毒不堪噉也云芋白色者無味紫色者破氣煮汁飲之止渴十月後曬乾收之

烏芋味苦甘微寒無毒主消渴脾熱溫中益氣一名



烏芋

江左唯有青白紫三芋而已。鵠至死不飢。注沈存中筆談。處士劉湯隱居王屋山嘗於齋中見墜地俄頃蜘蛛欲烈徐徐行入草疇芋梗微破以瘡就噬處磨之良久腹漸消輕躁如故自後人有為蜂螫者接芋梗傅之則愈。芋頭而生者為芋子八九月已後可食至時掘出置十數日却以好土勾埋至春猶好生則辛而涎多食滯氣困脾唐杜甫詩曰園收芋栗不全貧者是此以梗擦蜂螯處愈。

本草二十三

千

吉

冬月食不發病佗時月不可食又和鯽魚鱠魚作臘良久食令人虛勞無力又煮汁洗臍衣白如玉亦可浴去身上浮風慎風半日食之破血飲其汁止血渴芋有八九種功用相似野芋生溪澗非人所種者根葉相類耳取根醋摩傅蟲瘡疥癬入口毒人又有天荷亦相似而大也。云芋本功外食之令人肥白小者極滑吞之開胃及腸閉產後煮園圃中種者可食餘者有大毒不可容易食薑芋辛猝以生薑者又換水煮方可食和魚煮甚下氣調中補虛葉裹開了癰瘡毒止痛又不安。又鹽研傅蛇蟲咬并癰腫毒及署傅毒箭亦多大抵性效相近蜀川出者形圓而大狀若蹲鵠謂之芋魁彼人以爲濟世陽九是也江西閩中出者形長而大葉皆相類其細者如郊生於大魁傍食之尤美不可過多乃有損也。凡食芋並湏園圃藓之最盛可以當糧食而度饑年左思三都賦所謂徇蹲鵠之沃則字云齊人謂芋爲朶陶云種芋三年不採成苔二音相近蓋南北之呼不同耳古人亦單用作藥唐韋庄獨行方療癰氣取生芋子一斤壓破酒五升漬二七日空腹一杯神良。相似葉大如扇廣尺餘白芋毒微青芋多子貞芋連禪芋紫芋並毒少而根俱不堪生敢蒸煮冷取大治煩熱止渴今畿縣偏有諸山南。

唐本云

多食動宿冷其葉如荷葉而長根類於薯蕷而圓圖經云其類雖多葉蓋

圖經曰

芋本經不著所云芋冷破宿血去死肌其中有數種有芽芋紫芋出州土陶隱居注云錢塘最多今處處有之閩蜀淮甸尤殖此種類薛之最盛可以當糧食而度饑年左思三都賦所謂徇蹲鵠之沃則亦多大抵性效相近蜀川出者形圓而大狀若蹲鵠謂之芋魁彼人以爲濟世陽九是也江西閩中出者形長而大葉皆相類其細者如郊生於大魁傍食之尤美不可過多乃有損也。凡食芋並湏園圃藓之最盛可以當糧食而度饑年左思三都賦所謂徇蹲鵠之沃則字云齊人謂芋爲朶陶云種芋三年不採成苔二音相近蓋南北之呼不同耳古人亦單用作藥唐韋庄獨行方療癰氣取生芋子一斤壓破酒五升漬二七日空腹一杯神良。相似葉大如扇廣尺餘白芋毒微青芋多子貞芋連禪芋紫芋並毒少而根俱不堪生敢蒸煮冷取大治煩熱止渴今畿縣偏有諸山南。

史記

蜀卓氏云汶山之下沃野有蹲

吉

藉姑一名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴乾

蜀隱居

云今藉姑生水田中葉有梗

烏牙切

狀如澤瀉不正似芋其根

黃似芋子而小煮之亦可取疑其有烏者根極相似細而美葉耶異

狀如莧草呼為莧茨恐此也

唐本注

云此草一名槎牙一名茨菰音

孤主百毒產後血悶攻心欲死產難衣不出擣汁服一外生水中葉

似鉀普方切箭鏃澤瀉之類也千金方云下石淋

目瘡等證

云茨菰不可多食吳人常食之令人患腳又發腳氣癆緩風損齒令

人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔水

又云莧茨冷下丹石消風毒

除胷中實熱氣可作粉食明耳目止渴消疸黃若先有冷氣不可食

令人腹脹氣滿小兒秋食臍下當痛

日華子云莧茨無毒消風毒除

胷胃熱治黃疸開胃下食服金石藥人食之良又云茨菰冷有毒葉

研傳蛇蟲咬多食發虛熱及腸風痔瘻崩中帶下瘡瘍者

以生薑藥之佳懷孕人不可食又名薑尾草及烏芋矣

烏芋今鳬茨也舊不著所出州土苗似龍鱗而細正青色根黑如指

大皮厚有毛又有一種皮薄無毛者亦同田中人並食之亦以作粉

食之厚人腸胃不飢服丹石人尤宜蓋其能解毒耳爾雅謂之荳

行義曰烏芋今人謂之勒臍皮厚色黑肉硬白者謂之猪勒臍皮

薄澤色淡紫肉軟者謂之羊勒臍正二月人採食之此二

等藥罕用荒歲人多採以充糧

眉州枇杷葉



本草二十三

二十一

藝

枇杷葉味苦平無毒主卒喉不止下氣

蜀隱居云其葉不暇煮但

嚼食亦差人以作飲則小冷

唐本注

云用葉湏火炙布拭去毛不爾

射人肺令欬不已又主欬逆不下食

今注

實味甘寒無毒多食發痰

熱

蜀隱居按蜀本

樹高丈餘葉大如驥耳背有黃毛子

核大如小栗皮肉薄冬花春實四月五月

圖經云

生如小李黃色味甘酸核大如小栗皮肉薄冬花春實四月五月

熟凌冬不凋生江南山南今處處有

孟說

云枇杷溫利五藏久食亦

發熱黃子食之潤肺熱上膾若和熱炙肉及熱麵食之令人患熱毒

後口

黃病

蜀隱居論

云枇杷葉使味甘能主胃氣冷嘔噦不止

日華子云

枇杷葉舊不著所出州郡今襄漢吳蜀閩嶺皆有

把子平無毒治肺氣潤五藏下氣止吐逆并渴疾又云葉療婦人產

金秋之青條抱東陽之和氣肇寒葩之結霜成炎果乎纖露是也

其

實作核如黃梅皮肉甚薄味甘中核如小栗四月採葉暴乾治肺氣主渴疾用時湏火炙布拭去上黃毛去之難盡當用粟稈作刷刷之乃盡人以作飲則小冷其木白皮止吐逆不下食甚用使鹿布拭上毛令盡用甘草湯洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之酥盡為度

又煮汁飲之止渴偏理肺及肺風瘡肯面上瘡北二川皆有之以其形如枇杷故名之治肺熱嗽有功花白最先春也子大如彈九四五月熟色若黃杏微有毛肉薄性亦平與葉不同有婦人患肺熱久嗽身如矢肌瘦將成肺勞以枇杷葉木通款冬花紫菀杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製治訖同為末蜜丸如櫻桃大食後夜卧各含化一丸未終一劑而愈

雷公

兩乾者三葉重一兩者是氣足

凡使採得後杵濕者一葉重一

木白皮止吐逆不下食

甚用使鹿布拭上毛令盡用甘草湯洗一遍却用

綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之酥盡為度

食療

卒嘔惋不欲食

孫真人

咳嗽以葉去毛煎湯服之

衍義

枇杷葉江東西湖南

肺熱嗽有功花白最先春

北二川皆有之以其形如枇杷故名之治肺熱嗽有功花白最先春

也子大如彈九四五月熟色若黃杏微有毛肉薄性亦平與葉不同

有婦人患肺熱久嗽身如矢肌瘦將成肺勞以枇杷葉木通款冬花

紫菀杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製治訖同為末蜜丸如

櫻桃大食後夜卧各含化一丸未終一劑而愈

荔枝



本草二三

二十二

蘿

荔枝子味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南及巴中其樹高一二丈葉青陰凌冬不凋形如松子大殼朱若紅羅紋肉青白若水精甘美如蜜四五月熟百鳥食之皆肥矣

今圖經曰

荔枝子生嶺南及巴中今泉福漳嘉蜀渝涪州興化軍及二廣州郡皆有

之其品閩中第一蜀川次之嶺南為下扶南記云此木以荔枝為名者以其結實時枝弱而蒂牢不可摘取以刀斧剗音利取其枝故以為名耳其木高三丈自徑尺至干合抱頗類桂木冬青之屬葉蓬蓬然四時榮茂不凋其木性至堅勁工人取其根作阮咸槽及彈碁局木之大者子至百斛其花青白狀若冠之蕤纓實如松花之初生者殼若羅文初青漸紅肉淡白如肪玉味甘而多汁五六月盛熟時彼方皆燕會其下以賞之賓主極量取雖多亦不傷人小過度則飲蜜漿一盃便解荔枝始傳於漢世初惟出嶺南後出蜀中蜀都賦之所云旁挺龍目側生荔枝是也蜀中之品在唐尤盛白居易圖序論之詳矣今閩中四郡所出特奇而種類僅至三十餘品肌肉甚厚甘香瑩白非廣蜀之比也福唐歲貢白暴荔枝并蜜前荔枝肉俱為上方之珍果白暴湏佳實乃堪其市貨者多用雜色荔枝入鹽梅暴之成而皮深紅味亦少酸殊失本真凡經暴皆可經歲好者寄至都下及關陝河外諸處味猶不歇百果流布之盛皆不及此又有焦核荔

枝味更甜美或云是木生背陽結實不完就者白暴之尤佳又有綠色蠟色皆其品之奇者本土亦自難得其蜀嶺荔枝初生亦小酢肉

薄不堪暴花及根亦入藥崔元亮海上方治喉痺腫痛以荔枝花并根共十二分以水三升煮去滓舍細細嚥之差止

呴味酸子如卯廣州記云荔枝精者子如雞卵大殼朱肉白核如

肪脂甘而多汁

海藥云

謹按廣州記云生嶺南及波斯國樹似

美極益人也

勞悶並宜食之

嘉州已下渝州並有其實熟甘美荔枝熟人未採則百蟲不敢近人才採之烏鳥蝙蝠之類無不殘傷故採荔枝者日中

而衆採之荔枝子一日色變二日味變三日色味俱變古詩云色味不踰三日變貞安宇荔枝詩云香味三日變今瀘渝人食之多則發熱

瘡食療

微溫食之通神益智健氣及顏色多食則發熱

衍義曰

荔枝藥品中今未見用惟崔元亮方中收之果實中爲上品多食亦令人發虛熱此物喜雙實尤可愛

本朝有蔡君謨荔枝譜其說甚詳唐杜牧詩云一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來此是川蜀荔枝亦可生置之長安也以核慢火中燒存性爲末

新酒調一枚末服

治心痛及小腸氣

本草二十三

二十三

乳柑子味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利

小便多食令人脾冷發痼癖大腸洩又有沙柑青柑山柑體性相類惟山柑皮療咽喉痛效餘者皮不堪用其樹若橘樹其形似橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子生嶺南及江南今

無毒皮炙作湯可解酒毒及酒渴多食發陰汗

圖經

文具橘

目錄

云

伶

圖

經

袖條下

水一中盛煎三五沸

附

入鹽

如茶法服妙

食療

寒甚食之其皮不任藥用食

經驗後

多令人肺燥冷中發痃癖

方

獨醒湯柑子皮去瓤不計多

少倍乾爲末入鹽點半錢

衍義曰

乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦

橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分別橘與柑又緣方言各不同亦互有緊慢者脾胃冷

人食其肉多致藏寒或利

石蜜

乳糖味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利

也


出益州及西戎前煉沙糖爲之可作餅塊黃白色

云用水牛乳米粉和煎乃得成塊西戎來者佳江左亦有殆勝蜀者云用牛乳汁和沙糖煎之並作餅堅重此石蜜其實乳糖也前卷已有石蜜之名故注此條爲乳糖唐本先附目禹錫詩此石蜜治目中熱膜明目蜀中波斯者良東吳亦有並不如兩處者此皆前甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳和棗肉及巨勝末丸每食後含一兩丸潤肺氣助五藏津

衍義曰

石蜜川浙最佳其味厚其他次之前鍊成以銅象物達京都至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及紙裹外用石夾埋之仍不得見風遂免今人謂乳糖其作餅黃白色者今人又謂之捻糖易消化入藥至少

甘蔗



甘蔗音柘味甘平無毒主下氣和中助脾氣利大腸

居云今出江東爲勝廬陵亦有好者廣州一種數年生皆如大竹長丈餘取汁以爲沙糖甚益人又有荻蔗節疎而細亦可取也

本草二十三

二十四

本注云蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色名荻蔗出蜀及嶺南爲勝並煎爲沙糖今江東甚多而劣於蜀者亦甚甘美時用煎爲稀沙糖也今會稽作乳糖殆勝於蜀去煩止渴解酒毒

圖經曰

甘蔗舊不著所出州土陶隱居云今江東者爲勝廬陵亦有好者廣州一種數年生皆如大竹長丈餘今江浙閩廣蜀川所生大者亦高丈許葉有二種一種似荻節疎而細短謂之荻蔗一種似竹蔗長竿其汁以爲沙糖皆用竹蔗泉福吉廣州多作之鍊沙糖和牛乳爲石蜜即乳糖也惟蜀川作之荻蔗但甚敗或云亦可煎稀糖商人販貨至都下者荻蔗下後收莖竿其汁爲沙糖鍊沙糖和牛乳爲石蜜並好

蜀本圖

利大

小腸下氣痢補脾消痰止渴除心煩熱作沙糖潤心肺殺蟲解酒毒

臘月窖蔗坑中患天行熱狂人絞汁服甚良也

口痛搗取汁服之

肘後方

主卒乾嘔不息甘蔗汁溫令熱服半升日三又以生薑汁一升二味相和分爲三服

梅師方

主胃反朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者以甘蔗汁七升生薑汁一升二味相和分爲三服和中補脾利大腸解酒毒削甘蔗去皮食後喫之

張協都蔗賦

云挫斯蔗而療渴若漱醴而含蜜

衍義曰

甘蔗今川廣湖南北二浙江東西皆有自八九月已甚食收至三四月方酸壞石蜜沙糖霜皆自此出惟川浙者爲勝

沙糖味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之策

甘蔗汁煎作蜀地西戎江東並有之

唐本先附目禹錫

糖多食令人心痛不與鯽魚同食成疳蟲又不與葵同食生流涎又不與筍同食使筍不消成癥身重不能行履耳

甘蔗

條下

食療云

主心熱口乾多食生長蟲消肌肉損齒發疳蟲不可長食之

子母秘錄

治腹緊白

糖以酒二升煮服不過再差

行義曰

沙糖又次石蜜蔗汁清故費煎鍊致紫黑色治心肺大腸

則損齒土制水也及生蠶

蟲裸蟲屬土故因甘遂生

圖經

具文

椑
卑柿味甘寒無毒主壓石藥發熱利水解酒熟食

令人寒中去胃中熱生江淮南似柿而青黑閑居賦云

梁侯烏椑之柿是也

今附醫書

董安平華子云椑柿止渴潤心肺除腹藏冷熱佐漆甚妙不宜與蟹

同食令人腹疼并大瀉矣

圖經

條下

太草二三

二十五

桃核人



下品
桃核人味苦甘平無毒

蜜益潤喉邪氣殺小

蟲止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通

月水止痛七月採取人陰乾○

桃核殺惡鬼令人

海顏色味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下

三蟲悅澤人面三月三日採陰乾○

桃核味苦微

溫主殺百鬼精物療中惡腹痛殺精魅五毒不祥

一名桃奴一名梟景是實著樹不落實中者正月採

之○

桃主下血瘕寒積聚無子

帶下諸疾破

堅閉刮取毛用之

目禹錫等謹按本經月閑通用藥云桃毛平

桃蠹殺鬼邪

惡不祥食桃樹蟲也○莖白皮味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱○葉味苦辛平無毒主除戶蟲出瘡中蟲○膠鍊之主保中不飢忍風寒○實味酸多

食令人有熱生太山川谷

隱居

好當取解核種之爲佳又有山

挑其人不堪用桃人作酪乃言冷挑膠入仙家用三月三日採花亦供丹方所湏方言服三樹桃花盡則面色如桃花人亦無試之者服术人云禁食桃也

唐本經云桃膠味苦平無毒主下石淋破血中惡在杏花主下惡氣消腫滿利大小腸

禹錫等謹按本經月

云今處處有京口者示使挑符主中惡

孟詒云桃人溫殺三蟲止心痛又女人陰中生瘡如蟲癰疼痛者可生擣葉綿裏內陰中日三四易差又三月三日收花

痘瘡乾杵末以水服二錢七小兒半錢治心腹痛又禿瘡收未開花陰

乾與桑椹赤者等分作末以豬脂和先用灰汁洗去瘡即塗藥又

本草二十三

二十六

圖經曰

生泰山今處處皆桃核人并花實等

云挑能發丹石不可食之生者尤損人又白毛主惡鬼邪氣膠亦然又挑符及奴主精魅邪氣符者汁飲之奴者丸散服之桃人每夜嚼一顆和蜜塗手面良日華子云挑人溫殺三蟲止心痛又女人陰中生瘡如葉暖治惡氣小兒寒熱客忤挑毛療崩乾杵末以水服二錢七小兒半錢治心腹痛又禿瘡收未開花陰中破癖氣挑蠹食之肥悅人顏色也

云有之京東陝西出者尤大而美大都佳果多是圃人以他木接根上栽之遂至肥美殊失本性此等藥中不可用之當以一生者爲佳七月採核破之取人陰乾今都下市賈多取炒貨之云食之亦益人然亦多雜接實之核爲不堪也千金方桃人煎療婦人產後百病諸氣取桃人一千二百枚去雙人尖皮熬擣令極細以清酒一斗半研如麥粥法以極細爲佳內小頃瓷瓶中密以麪封之內湯中煮一復時藥成溫酒和服一匙日再其花三月三日採陰乾太清卉木方云酒漬桃花飲之除百疾益顏色崔元亮海上方治面上瘡黃水出并眼瘡一百五日收取桃花不計多少細末之食後以水半盞調服方寸七日三甚良其實已乾著木上經冬不落者名桃梟正月採之以中實者良胡治治中惡毒氣蠱症有挑奴湯是此也其實上毛刮取之以治女子崩中食桃木蟲名桃蠹食之悅人顏色莖白皮中惡方用之葉多用作湯導藥標嫩者名桃心尤勝張文仲治天行有支太醫挑葉湯熏身法水一石煮桃葉取七斗以爲鋪席自圍衣被蓋上安灸大椎則愈陳廩丘蒸法經云連發汙汗不出者死可蒸之如中風

法以問張苗苗曾有疾極汙出臥單簾中冷但苦寒倦四日凡八過發汙汗不出燒地桃葉蒸之則得大汗被中傅粉極燥便差後用此發汗得出蒸發者燒地良久掃除去火可以水小洒取蠶沙若桃葉拍葉糠及麥麸皆可趣用易得者牛馬糞亦可用但臭耳取桃葉欲落急擗客熱往來欲死不堪服藥泄骨中喘氣用桃皮亦主病集驗肺熱悶不止骨中喘令過此法舊云出阮河南也桃皮亦主病集驗肺熱悶不止骨中喘物以水四外煮取一升五合去滓以故布手巾內汁中薄膏溫四肢不盈數刻即歇又必効方主蠶毒用大戟桃白皮東引者以大火烘之斑貓去足翅熬三物等分搗節為散以冷水服半方寸匕其毒即出不出更一服盡並出此李饒州法云竒効若以酒中得則以酒服以食中得以飲服之桃膠入服食藥仙方著其法取膠二十斤絹袋盛櫟木灰汁一石中煮三五沸并袋出掛高處候乾再煮如此三度止暴乾節末蜜和空腹酒下梧桐子大二十九久服當仙去又主石淋古今錄驗著其方云取桃木膠如棗大夏以冷水三合冬以湯三合和為一服日三當下石石盡即止其實亦不可多食喜令人熱發人同於垍瘍子中煮一伏時後瀝出用手擘作兩片其心黃如金色用之花勿使千葉者能使人鼻衄不止目黃丸用揀令淨以絹袋盛於簷下懸令乾去塵了用鬼髑髏幼使乾桃子其鬼髑髏只是千葉挑花結子在樹上不落者乾然於十一月內採得可為神妙凡修出不出更一服盡並出此李饒州法云竒効若以酒中得則以酒服以食中得以飲服之桃膠入服食藥仙方著其法取膠二十斤絹袋盛櫟木灰汁一石中煮三五沸并袋出掛高處候乾再煮如此三度止暴乾節末蜜和空腹酒下梧桐子大二十九久服當仙去又主石淋古今錄驗著其方云取桃木膠如棗大夏以冷水三合冬以湯三合和為一服日三當下石石盡即止其實亦不可多食喜令人熱發人同於垍瘍子中煮一伏時後瀝出用手擘作兩片其心黃如金色用之花勿使千葉者能使人鼻衄不止目黃丸用揀令淨以絹袋盛於簷下懸令乾去塵了用鬼髑髏幼使乾桃子其鬼髑髏只是千葉挑花結子在樹上不落者乾然於十一月內採得可為神妙凡修

本草 千三

十七

梁

事以酒拌蒸從已至未焙乾以銅刀切焙取肉用千金翼同又方治伏梁氣在心下結聚不散用桃枝二寸枕之目青黃淋露骨立病變無常方以桃樹寄生二兩末如茶點服日四五服外臺秘要治霍亂腹痛吐切以水五外煮取一升分溫二服外三合分溫二服雙人留尖杵和為丸平旦井花水頓服令盡服訖量性飲酒令醉仍湧喫水能多最精隔日又服一劑百日不得食肉治偏風半身不遂及癆症方桃仁一千七百枚去雙人尖皮以好酒一斗三升浸經二十一日出日乾杵令細作丸每服二十九還將桃酒服之又方治三蟲絞藥取汁一升外飲又方容色又桃入服之長生千金翼同又方治少小聰耳桃人熟末以穀裹塞耳又方人有食桃病時已晚無復校吐病易上日

百種

又方

以五月五日取東向桃枝曰未出時作三寸木人着衣帶中令人不忘

肘後方

尸注鬼沫

病者葛云即是五戶之一注又挾諸鬼邪為祟其病變動及有六種至九十九種大略使人寒淋瀝沉沉默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復傳傍人乃至滅門覽如此候者便宜急治桃人五十枚碎研以水煮取四外一服盡當吐吐此病不盡三兩日不吐再服也

又方

卒心痛東引桃枝一把切以酒一升煎取半升頓服大效

又方

治卒心痛桃人面脂傅人

七枚去皮尖熟研水一合頓服良亦可治三十年患

以內二斗酒中六七日可

葛氏

卒中瘡瘍瘍瘍常對在兩脚杵桃葉以苦酒和傅皮亦得

方

治小兒夾癩杵桃人傅之亦治婦人陰腫癰痒

又方

蒸之內小口器中以下部搘上

又方

下部

坐蟲自出瘡已決洞者排皮葉杵水漬令濃去滓着盆中漬之有蟲出

梅師方

治腸痔大腸常血杵桃葉一斛灰和水服差又產後陰腫痛燒桃子燒作藥熟按塞兩耳出

又方

治熱病後下部生瘡濃黃桃白皮如稀餳內少許能膳研以綿蘸藥內下部瘡上煎取一

孫真人

桃味辛肺病宜食又挑味酸無毒多食令人有熱

外服

又方

治諸蟲入耳取挑葉熟按塞兩耳出

又方

治狂狗咬人取挑白皮一握水三升

中瘡又方主卒患瘰疬子不痛方

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內取樹皮貼上灸二七壯

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

醫心鏡主上氣咳嗽脣膈痞滿氣喘桃人三兩去皮

又方

備急鬼疰心痛方

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

戶鬼氣咳嗽脣膈痞滿氣喘桃人三兩去皮尖杵碎以水一升研取汁和粳米二合煮粥食之

又方

治氣血不通日漸消瘦桃人一兩

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

去皮尖杵碎以水一升研取汁和粳米二合煮粥空心食之

又方

治氣血不通日漸消瘦桃人一兩

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

戶鬼氣咳嗽脣膈痞滿氣喘桃人三兩去皮尖杵碎以水一升研取汁和粳米二合煮粥食之

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

是徐之才家秘方

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

樹蟲矢末水服方寸匕

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

小兒傷寒若得時氣桃葉三兩杵和水五升煮

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

沸取汁日五六遍淋之後燒雄鼠糞三枚服妙

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

治陰腫桃人擣傅之

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

又方

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

子母秘錄

主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內

傳

崔氏

主鬼疰心腹痛不可忍取東引桃枝削去蒼皮取
上白皮一握水二外煮取半外服令盡差如未定再服

真秘旨

食桃訖入水浴

抱朴子

桃膠以桑灰漬之服百病

晦夜之地

數月斷穀

荆楚歲時記

謝道通登羅浮山見數童子以朱書

貼戶

上鬼見

宋王微

桃飴越地通天液首化玉體

戎右掌戎車之兵革使詔贊王鼓傳王命于陳

強者其實毛

周禮

中會同充革車盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛

耳桃荔注鬼所畏也

毛詩

園有桃其實之殼今深山大谷之民熟以爲飯

哀公曰請用孔子先黍而後食

荔苔幕所以掃不祥

家語

孔子侍坐於哀公賜之桃與黍焉

五木之精也今之作桃符着門上厭邪氣此仙木也

東京賦云

度朔作梗守以曹鬱壘神荼副焉對探索葦注

桃左右皆掩口而笑公曰黍

東京賦云

上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃擣下閨百鬼無道理者縛

以葦索而飼虎今人作桃符板云左神荼右鬱壘者以此

治瘧

上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃擣下閨百鬼無道理者縛

用桃人一百箇去皮尖於乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入

黃丹三錢丸

當發日面北用溫酒吞下如不

飲酒井花水亦得五月五日午時合忌雞犬婦人見

衍義曰

桃核人桃品示多京畿有油桃光

兩同爲末再與桃人同擣令勻煉蜜丸如小豆大每

治瘧

服十九桃人湯下利下瘀血惡物便愈未利再服

本草二十三

二十九



杏核人

杏核人味苦溫冷利有毒主氣虛寒心竅驚澀心下煩熱風氣去來

時行頭痛解肌消心下急殺狗毒五月採之其兩者

殺人可以毒狗○花味苦無毒主補不足女子傷中

寒熱痺厥逆○實味酸不可多食傷筋骨生晉山川

谷

得火良惡黃芩黃耆葛根解錫毒畏襄草

開闢言

論

云處處有藥

能治腹痺不通發汗主溫病治心下急滿痛除心腹煩悶療肺氣嗽上氣喘促入天門久煎開心肺可和酪作湯益潤聲氣宿即動冷氣酒洗

云杏熟面妍者取人去皮擣和雞子白夜卧塗面明早以暖清核大綿裹舍細細咽之日五夜三謹按心腹中結伏氣杏人橘皮桂心訶梨勒皮爲丸空心服三十九無忌又燒令金盡研如泥綿裏內女人陰中治蟲疽

云杏人本功外殺蟲燒令金未盡細研如

脂物裏內蠶齒孔中亦主產內中蟲瘡癰不可忍者去人及諸畜瘡中風取人去皮熬令赤和桂末研如泥綿裏如指大舍之利喉咽去喉痺痰唾喉喉中熱結生瘡杏酪濃煎如膏服之閏五藏去痰嗽生

熟與俱得半生半熟殺人

云杏熟有毒不可多食傷神

杏名金杏相傳云種出濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏今近都多種之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及金杏杏子入藥今

本草二十三

二十

圖經曰

杏核人生晉川山谷今處處有之其實亦數種黃而圓

以東來者爲勝仍用家園種者山杏不堪入藥五月採破核去雙人者古方有單服杏人修治如法自朝蒸之至午而止便以慢火微烘至七日乃收貯之每旦腹空時不約多少任意噉之積久不止駐顏延年云是夏姬法然杏人能使人血溢少悞之必出血不已或至委頓故近人少有服者又有杏酥法去風虛除百病擣爛杏人一石以勿洩氣三十日看酒上酥出即掠取內甕器中貯之取其酒滓團如好酒二石研瀘取汁一石五斗入白蜜一斗五升攬勻封於新瓮中梨大置空屋中作格安之候成飴脯狀旦服一枚以前酒下其酒任性飲之杏花乾之亦入藥杏枝主墮傷取一握水一大升煮半下酒三合分再服大效其實不可多食傷神損筋骨劉禹錫傳信方治嗽補肺丸杏人二大外山者不中揀却雙人及陳臘以童子小便一斗浸之春夏七日秋冬二十七日并皮尖於砂盆子中研細瀘取汁煮令魚眼沸候軟如麪糊即成仍時以柳箇攬勿令著底後即以馬尾羅或鹿布下之日暴通丸即丸服之時食前後總湏服三十九五十丸任意茶酒下忌白水粥只是爲米泔耳自初浸至成常以紙蓋之以畏塵土也如無馬尾羅即以鹿布袋下之如取桑穰法公云

凡使須以沸湯浸少時去皮膜去尖摩作兩片用白火石并烏頭三合水旋添勿令闕免反血爲妙也

食療云

主熱風頭痛又燒令

瘡盡去皮以亂髮裹之咬於所患齒下其痛便止熏諸蟲出并去風便差重者不過再服

外臺秘要

治偏頭半身不

雷

遂兼失音不語生吞杏人七枚不去皮尖日別從一七漸加至七七收七七日周而復始食後即以竹瀝下之任意多少日料一升取盡

又方

如小豆許以器盛於飯中蒸之候飯熟出裹令患人側卧和綿捻一裹以油汁滴入耳中久又以一裹依前法

千金方

治咳嗽旦夕加重增寒壯熱少浸七日了瀝出去小便以燙水淘過於沙盆內研成泥別入甕瓶中以小便三升煎之如膏量其輕重食上熟水下一錢匕婦人室女服之更妙

方

治一切風虛常惡頭痛欲破者杏人去皮尖乾暴爲末水九外研瀝如作粥法緩火煎令如麻腐起取和羹粥酒內一匙服之每食前不很多少服七日後大汗出慎風冷猪魚鷄蒜大酢一劑後諸風減差春夏恐醉少作服之秋九月後煎之此法神妙可深秘之後

又方

治鼻中生瘡杵杏治鼻中生瘡杵杏人乳汁和傅之

又方

治破傷風腫厚傅杏人膏燃燭通灸

方

治喉痺杏人熬熟杵丸如彈子含燕其汁爲末帛裹舍之亦得

又方

治小兒大人效逆上氣杏人三升去皮尖炒令黃杵如膏蜜一升分爲三分內杏人杵令得所更內一分杵如膏又內一分杵熟止先食

汗盡三度差

又方

治喉痺杏人熬熟杵丸如彈子諸憲頭不出杵杏人博之

方

治心下堅或脹口乾忽發熱妄語杏人一升去皮水三升煎沸去滓取汁爲三服下肉爲度

又方

治赤黑爲末薄綿裹內耳中日三合人杵作膏傳之良治穀道赤痛熬杏人杵作膏傳之良

又方

治心下堅或脹口乾忽發熱妄語杏人一升去皮水三升煎沸去滓取汁爲三服下肉爲度

又方

治神其人作湯如白沫不欲好聲杏人一升熬去皮尖酥兩盞少許爲丸如梧桐子大空心米湯下十五丸

又方

治四度易之或亂髮裹塞之亦妙治野雞病杏人一兩去皮尖雙人搘碎水三升研瀝取汁於鑄中煎以杓攬勿住手候三分減二冷呷之不熟及熟呷即令人吐

金方

治主五痔下血不止去尖皮及雙人水三升研瀝取汁煎減半投米煮粥停冷空心食之

又方

治大薄荷一葉蜜一雞頭大水一中盞同煎取七分食後溫服甚者不過三劑差永不發動忘腥物

廣利方

治弩肉出生杏人七枚去皮細嚼吐於掌中及熱以綿裹筋頭將點弩肉上不過四五度差

子母秘錄

治小兒臍赤腫

杏人杵如脂內體

中相和傅臍腫上

必效方

治金瘡中風角弓反張以杏人碎之慈

令溜絞取脂服一小升兼以瘡上摩効

又方

治狐尿刺螫痛杏人細研煮一兩沸承熱以浸螫處數易之

塞上方

治墜馬撲損瘀血去滯分爲二服空心如人行三四里再服

外服

治狐尿刺螫痛杏人細研煮一兩沸外煎取一

傷寒類要

治溫病食勞以杏人五兩

準

治咽喉痒痛失音不語杏人桂心各一兩同研勻用

渥路公藥

治內煩悶取東引

盲云

杏人不用多食令人目盲

又方

治皮尖炒黃米飲服之差瀉或臍中出物皆不可治

左慈秘訣

杏金丹本出渾皇子亦名草金丹方服之壽二千二百年不死只是以杏人成丹輕重如金軟而可食因此立名從三皇後有得法者服之無有不得力奚仲呂望彭祖皆煉之彭祖曰寧可見此方不用封王寧可見此藥不用封侯老子曰草金丹是衆仙秘要服皆得力只爲作之者難世俗之人皆不信有神驗將聖人妄說作之者不肯精心索淨浪有惡物觸犯藥即不成徒勞損廢又何益矣其造不得肓龍瘠亞大病及惡心人女子小人知見丹亦不成丹成無忌只是夏姬服之壽年七百乃仙去煉草金丹法從寅月修杏搗人罕到者良又以寅月鑊斲樹下地間陽氣通暢至二月草生以鋤除草恐損地力至三月離樹五步作畦壠淘成撮引天之暴雨以湏遠裁棘遍

本草二十三

三十二

欄勿使人跡畜獸踐踏只元旱即泉源水洒潤其樹下初春有霜雪即樹下燒火以救之忍擯花苞萼至五月杏熟收取當月下旬自落者去核取人六斗以熱湯退皮去雙人取南流水三石和研取汁兩石八斗去滓并小美者示得取新鐵釜受三石已來作竈須具五嶽三台形用朱砂圖畫之其竈通四脚去地五寸着鎋不得絕稠恐下灰不得其釜用酥三斤以糠火及炭然釜少少磨三斤酥盡即內汁金中釜上安盆盆上鑄孔用錫絃懸車轄至釜底其孔以帛纏塞勿令泄氣初着糖火并乾牛糞火一日三動車轄以袞其汁五日有露液生十日白霜起又三日白霜盡即金花出若見此候即知丹霜成金中釜口次也丹滓亦能治冷疾服丹法如人喫一斗酒醉即喫五升裏一外者只喫半外下藥取滿日空心煖酒服三九至七日宿疾除愈聲喑痺跛躄氣野雞癭氣風癟瘡氣瘡腫萬病皆除愈頭白却黑齒落更生張先師云二兩爲一劑一劑延八十年兩劑延一百四十年三十年忌房室若爲人仙一千五百百年百日忌房室若居士上表十年已後泥爐造爲雷息之時亦不用車馬轟闔聲何以爲地仙五千年三年忌房室若爲天仙一萬年忌房室若看火候二十四氣五星五行陰陽十二時取此氣候用火丹乃成矣聖所服皆致長生久壽世人不能常服或言此藥無効若精神確志必就神仙長年矣

衍義曰

繫定至差無苦又湯去皮研一升以水一升半飴杏核人大傷人量所傷大小爛嚼沃破處以帛

復絞取稠汁入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中慢火熬成稀膏甕器盛食後夜卧入少酥沸湯點一匙七服治肺燥喘熱大腸秘潤澤五藏如無上證更入鹽點尤佳杏實本經別無治療日華子言多食傷神有數種皆熱小兒尤不可食多致瘡癰及上鬲熱煞蓄爲乾果其深赭色核大而褊者爲金杏此等須接其他皆不逮也如山杏輩只可收人又有白杏至熟色青白或微黃其味甘淡而不酸

安石榴



安石榴味甘酸無毒主咽燥渴損入肺不可多食酸實殼療下痢止漏精東行根療蛇蟲寸白

藥性論云石榴皮使味酸無毒能治筋骨風腰脚不遂行步攀急疼痛主漏陽止赤白下痢一方取汁止目淚下治漏精變故人多植之尤爲外國所重入藥惟根殼而已其味有甜醋藥家用醋者子爲服食者所忌

目禹錫等謹按蜀本圖經云子味甘酸其

薛

本草二十三

三十三

圖經

安石榴舊不著所出州土或云本生西域

石榴甜者謂之天漿能理乳石毒
陸機與弟雲書云張騫爲漢使外國十八年得塗林安石榴是也今處處有一名丹若廣雅謂之若榴木不甚高大枝柯附幹自地便生作叢極易息折其條盤土中便生花有黃赤二色實亦有甘酢二種甘者可食酢者入藥多食其實則損人肺東行根并殼入殺蟲及染鬚髮口齒等藥其花百葉者主心熱吐血及衄血等乾之作末吹鼻中立差崔元亮海上方療金瘡刀斧傷破血流以石灰一升石榴花半斤擣末取少許傅上搽少時血斷便差又治寸白蟲取醋石榴根切一升東南引者良水二升三合者取八合去滓著少米作稀粥空腹食之即蟲下又一種山石榴形頗相類而絕小不作房生青齊間甚多不入藥但蜜漬以當果或寄京下甚美

公云凡使皮葉根勿令犯鐵若使石榴殼不計乾濕先用漿水浸宿至明漉出其水如墨汁若使枝根葉並用漿水浸一宿治赤白痢下水穀宿食不消者爲寒

用方可

肘後方

可療酸石榴皮燒赤爲末服方寸匕

百一方

治腫以丁腫

雷

針刺四畔用榴末着瘡上以麴圍四畔灸以痛為度內未博上急裹經宿連根自出

經驗方

治腸滑久痢神妙無比以石榴

一箇劈破炭火簇燒令煙盡急取出不令作白灰用甕椀蓋一宿出火毒為末用醋石榴一瓣水一盞煎湯服二錢瀉亦治

真人云

食之損肺又方

治耳聾法以八九月取石榴一開上作孔如

蓋之然後搜麴裹却石榴無令醋出塘灰火中燒麴熟藥成入少黑李子仙沼子末取水滴點耳內不得輒轉腦中痛勿驚如此三夜又

點別耳依前法佳

又方

糞前有血令人面色黃石

根東生者取一握炙乾濃煎一大盞服之差婦人赤白帶下同治

中十全方

治寸白蟲以醋石榴東引根一握淨洗細剉用水三

一大團未絕根汁每日喫粥補外煎取半椀已下去滓五更初溫服盡至明取下蟲

斷小兒以意服之二三合

古今錄

駿者酸石榴有酸淡兩種旋開單葉花旋結實中子紅孫枝甚多

秋後經雨則自坼裂道家謂之三尸酒云三尸得此果則醉河陰縣最

多又有一種子白瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴飯爲丸梧桐子大食前熟米飲下三十至五十九以知爲度如寒滑

廣利方

治吐血衄血以百葉石榴花作末吹在鼻

一大團未絕根汁每服五合至二外盡即

衍義曰

安石榴有酸淡兩種旋開單葉花旋結實中子紅孫枝甚多

斗門方

治女子血脈不通用

一大箇劈破炭火簇燒令煙盡急取出不令作白灰用甕椀蓋一

孫

梨

加附子赤石脂各一倍

本草二十三

三四



梨味甘微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食

陶隱居

云梨種復殊多並皆冷利俗人以爲快果不入藥用食之多

損人也

唐本草

云梨削貼湯火瘡不爛止痛易差又主熱敷止渴葉

主霍亂吐痢不止煮汁服之

別本注

云梨有數種其消梨味甘

寒無毒主客熱中風不語又療傷寒熱發解石熱氣驚邪嗽消渴利大

小便又有青梨茅梨等並不任用又有桑梨惟堪蜜煮食主口乾生

食不益人冷中不可多食

不可多食又卒咳嗽以一

顆刺作五十孔每孔內以椒一粒以麴裏

於熱火灰中煨令熟出停冷去核食之又方去核內酥蜜裏燒令

熟食之又取梨肉內酥中煎停冷食之又擣汁一外酥一兩蜜一兩

地黃汁一外緩火煎細細含咽凡治嗽皆須待冷喘息定後方食熟

不可多食又卒咳嗽以一

顆刺作五十孔每孔內以椒一粒以麴裏

於熱火灰中煨令熟出停冷去核食之又方去核內酥蜜裏燒令

熟食之又取梨肉內酥中煎停冷食之又擣汁一外酥一兩蜜一兩

地黃汁一外緩火煎細細含咽凡治嗽皆須待冷喘息定後方食熟

食之反傷矣令嗽更極不可救如此者可作羊肉湯餅飽食之便卧少時又腎中痞塞結者可多食好生梨即通卒閑風失音不語者

生擣汁一合頓服之日再服止

同上

云梨冷無毒消

圖經曰

風療咳嗽氣喘熱狂又除賊風腎中熱結作漿吐風痰
梨舊不著所出州土今處處皆有而種類殊別醫家相承用乳梨鵝
薄而漿多味差短於乳梨其香則過之效嗽熱風痰實藥多用之其
餘水梨消梨紫煤梨赤梨甘棠梨兒梨之類甚多俱不聞入藥也梨
葉亦主霍亂吐下煮汁服亦可作煎治風徐王效驗方主小兒腹痛
大汗出名白寒疝農煮梨七合以意消息可作三四服飲之大良
崔元亮海上方療嗽單驗方取好梨去核擣汁一大茶椀著椒四十粒
前一沸去滓即內黑餳一大兩消訖細細含嚥立定又治卒患赤目
努肉坐卧痛者取好梨一顆擣絞取汁黃連三枝碎之以綿裹瀆令
色變仰卧注目中又有紫花梨癩心熱唐武宗有此疾百醫不效青
城山邢道人以此梨絞汁而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常山
忽有一株因纖實以進帝多食之解煩躁殊效歲久木枯不復有種
者今人不得而用之又江寧府信州出一種小梨名鹿梨葉如茶根
如小梅指彼處人取其皮治瘡癩及疥癬云甚效八月採近處亦有
但採其實作乾不聞入藥不可食大忌

本草二十三

三十五

三

技一大握水一升前取一升

錢相公

療蠻螋尿瘡黃水出
齶梨汁傳之乾即易

又方

治中水毒取梨葉一
把熟杵以酒一盞

服又云正月二月勿食梨

又方

治霍亂心痛利

風熱昏憊躁

小兒寒疝腹痛大汗出濃煮梨葉汁七

又方

治中水毒取梨葉一
把熟杵以酒一盞

合頓服以意消息可作三四度飲之

莊子

無汗方取梨葉

服比夢鎖言有一朝士見梁奉御訴之曰風疾已深請速歸去

朝士復見鄆州馬醫趙鄂者復訴之言疾危與梁

相對之說同矣曰只有一法請官人試熟消梨不限多少

莊子

橘多

之嚼而皆可於口

魏文詔曰

真定郡梨甘若蜜脆

衍義曰

食則

動脾少則不及病用梨之意須當斟酌

惟病酒煩渴人食之甚佳終不能却疾

林檎



林檎味酸甘溫不可多食發熱澀氣令人好睡發冷

瘦生瘡癰脉閉不行其樹似柰樹其形圓如柰六月

七月孰今在處有之

消渴陳上良云此有三種大長者為柰圓

小

中

大

者

林檎

主止

者

林檎

主止

者

林檎

主止

者林檎夏孰小者味澀為櫟秋孰味之或謂之來禽木似柰實比柰差圓六七月孰亦有甘酢二種甘者早孰而味脆美酢者差晚須孰攔乃堪取病消渴者宜食之亦不可多反令人心中生冷瘀今俗間醫人亦苟之入治傷寒藥謂之林檎散消渴好睡不可多食又林檎味苦酢平無毒食之開百脉林檎空心食療癰癩癰瘦桺林檎末以和醋傅上癬和移處就傳之

子母秘錄

治小兒痢林檎搗子杵取汁服以意多與服之差

又方

小兒閃癖頭髮堅黃

食療云

溫主穀痢行根治白蟲蛇蟲水痢以十枚半孰著一升煎取一升和外煎取一升

食醫心鏡

治水痢以水



蜀州李核人

本草二十三

三十六

三十六

李核人味苦平無毒主僵仆躄瘻血骨痛。根皮大寒主消渴止心煩逆奔氣。實味苦除痼調中。

居云李類又多京口有麥李麥秀時熟小而甜脆核不入藥今此用姑孰所出南居李解核如杏子者為佳凡實孰食之皆好不可合雀肉食又不可臨水上敢之李皮水煎含之療齒痛佳。別本注云李類甚多有綠李黃李紫李生李水李並堪食味極甘美其中人不入藥用有野李味苦名郁李子核入藥用之。目禹錫等謹按爾雅李座接慮李郭云今之麥李與麥同熟因名云李之子赤者名駁藥云休無實李癰瘕慮李駁赤李釋曰李之無實者名休郭云一名趙雲李核人臣治女子小腹腫滿主踴折骨疼肉傷利小腸下水氣除腫滿李根皮使苦李者入用味鹹治脚下氣主熱毒煩躁根煮汁止消渴。李子中人卒赤白下取李樹東面皮去皺皮炙令黃香以水三升煮汁去滓服之日再驗謹按生子亦去骨節間勞熱不可多食臨水食令人發瘻瘍又牛李有毒煮汁使濃含之治瘻齒脊骨有疽蟲可後灌此汁更空腹服一盞其子中人主鼓脹研和麵作餅子空腹食之少頃當渴矣。目華子李溫無毒益氣多食令人虛熱。又云李樹根涼無毒主赤白痢濃煎服華平無毒治小兒壯熱痘瘡驚癇作浴湯今處處有之李之類甚多見爾雅者有休無實李李之無實者一名趙李李座祖和切接慮李即今之麥李細實有溝道與麥同熟故名之。

駁赤李其子赤者是也又有青李綠李赤李房陵李朱仲李馬肝李黃李散見書傳美其味之可食陶隱居云皆不入藥用姑熟所出南居李解核如杏子者爲佳今不復識此醫家但用核若杏子形者根皮亦入藥用崔元亮海上方治面黑子取李核中人去皮細研以雞子白和如稀餳塗至晚每以淡漿洗之後塗胡粉不過五六日有効慎風

鏡 李味酸無毒主除固熱調中黃帝

云李不可和蜜食食之損五藏

衍義曰 李核人其窠大者高及丈今醫家少用實合漿水食令人霍亂澁氣而然今畿內小窯鎮一種最佳堪入貢又有御李子如櫻桃許大紅黃色先諸李熟此李品甚多然天下皆有之所以比賢士大夫盛德及天下者如桃李無處不芬芳也別本注云有野李味苦名郁李子核人入藥此自是郁李人別是一種在木部中第十四卷非野李也

楊梅味酸溫無毒主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨飲酒時服方寸匕止吐酒多食令人發熱其樹若荔枝樹而葉細陰青其形似水楊子而生青熟紅肉在核上無皮殼生江南嶺南山谷四月五月採

禹錫等
今附目

本草二十三

三七

丙

謹校孟詒云楊梅和五藏能滌腸胃除煩憤惡氣切不可多食甚能損齒及筋亦能治痢燒灰服之

皮根前湯洗惡瘡疥癩忌生葱

圖經 文具梅

實條下

食療

溫和五藏腹胃除煩憤惡氣去痰實亦不可以食損齒及筋

也甚能斷下痢又燒爲灰亦斷下痢甚酸美小有勝白梅又

白梅未乾者常含一枚其液亦通利五藏下少氣若多食之損筋骨其酸醋之物自是土使然若南方人北居杏亦不食北地人南蒸令人煩憤好食斯物也破即填小可即停之此藥之功神聖和盐核杵之如泥成挺子竹筒中收遇

經驗後方

主一切傷損不可者瘡止血生肌無瘢痕絕妙

者其甘實

胡桃



孫真人宜食肝病食醫心

胡桃味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮取瓢燒令黑末斷煙和松脂研傅療瘻瘍又和胡粉爲泥拔白鬚髮以內孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去五痔外青皮染髮及帛皆黑其樹皮止水痢可染褐仙方取青皮壓油和詹糖香塗毛髮色如漆生北土云張騫從西域將來其木春斫皮中出水承取沐頭至黑今附

動痰飲除風令人能食不得併漸漸食之通經脈潤血脉黑髮又服法初日一顆五日加一顆至二十顆止之常服滑肉細膩光潤能養一切老病疾

齒齦紺解之亦有房秋冬熟時採之性熱不可多食補下方亦用之取肉合破故搣篩蜜丸朝服梧桐子大三十九又療壓搣損傷搣肉和酒溫頓服便差崔元亮海上方療石淋便中有石子者胡桃肉一外細米煮漿粥一外相和頓服即差實上青皮染髮及帛皆黑其木皮中水春研取沐頭至黑此果本出羌胡漢張騫使西域還云潤肌肉益髮食酸

圖經曰 胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多陰實亦有房秋冬熟時採之性熱不可多食補下方亦用之取肉合破故搣篩蜜丸朝服梧桐子大三十九又療壓搣損傷搣肉和酒溫頓服便差崔元亮海上方療石淋便中有石子者胡桃肉一外細米煮漿粥一外相和頓服即差實上青皮染髮及帛皆黑其木皮中水春研取沐頭至黑此果本出羌胡漢張騫使西域還云潤肌肉益髮食酸

本草二十三

三十八

孫真人 食動疾

梅師方 治火燒瘡

衍義曰 胡桃發風陝洛之間甚多外有青皮包之胡桃乃核也核中穰爲胡桃肉須如此說用時須以湯剥去肉上薄皮過夏至則不堪食有人患酒搣風鼻上赤將橘子核微炒爲末每用一錢匕研胡桃肉一箇同以溫酒調服以知爲度

獮猴桃味酸甘寒無毒止暴渴解煩熱涼脾胃動溴辟壓丹石下石淋熱壅反胃者取汁和生薑汁服之一名藤梨一名木子一名獮猴梨生山谷藤生著樹葉圓有毛其形似雞卵大其皮褐色經霜始甘美可食枝葉殺蟲者汁飼狗療瘻也今附

陳藏器 味鹹溫無毒主骨節風癱緩不隨長年瘦白野雞肉痔病調中下氣皮中作帛藤中汁至滑下石淋主胃閑取汁和生薑

汁服

食療

候熟收之取瓢和蜜煎作煎去入煩熱久食亦得令人冷能止消渴

衍義曰

猕猴桃今來興軍南山甚多食之解實熱過多則令人藏條柔弱高二丈多附木而生淺山

傍道則有存者深山則多爲猴所食

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌變白

散水氣潤五藏不飢生新羅如小栗三角其中人香

美東夷食之當巢與中土松子不同

今附目錄

華子

云松子逐風

痺寒氣虛羸少氣補不足潤皮膚肥五藏東人以代麻腐食用似巴豆其味不厚多食發熱毒松子味甘美大溫無毒主諸風溫腸胃久服輕身延年不老味與甲占國偏桃人相似其偏桃人用與北桃人無異是也

柰味苦寒多食令人臚

音長閭

脹病入尤甚

陶隱居

云江南乃有而北國最

豐昌作脯不宜人有林檎相似而小亦恐非益人也令注有小毒主耐飢益心氣

華子

云柰主補中煦諸不足氣和脾卒

患食後氣不通生柰汁服之云柰冷無毒治飽食多肺壅氣脹柰子味苦寒澁無毒主忍飢益心氣多食虛脹

華子

圖經

文具林

橘條下

食醫心鏡

良云微寒

菴羅果味甘溫食之上渴動風氣天行病後及飽食後俱不可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病

樹生狀若林檎而極大

今附目錄

華子

無毒主婦人經脈不通丈夫營衛中

血脉不行久食令人不飢

華子

似茶葉可以作湯療渴疾

華子

也其狀亦梨先諸梨熟七夕

良云微寒

前後已堪嚼色黃如鵝梨

纔熟便飫軟入藥絕希用

泉州橄欖



橄

音攬
攬
覽

味酸甘溫無毒主消酒療鯁

音台
鯁
魚抬

毒人

恨食此魚肝迷悶者可煮汁服之必解其木作橄撥著魚皆浮出故知物有相畏如此也○核中人研傳脣吻燥痛其樹似木棟子樹而高端直其形似生訶子無稜瓣生嶺南八月九月採又有一種名波斯橄攬色類亦相似其形核作二瓣可以蜜漬食之生邕

今附圖經等謹按孟懿子云橄撥主鯁魚毒汗服之中此魚肝子州毒人立死惟此木能解生嶺南山谷樹大數圍實長寸許其子先

生者向下後生者漸高八月熟蜜藏
橄
甜
云云橄攬開胃下氣止渴
總而高且端直可參秋晚實成南人尤重之咀嚼之滿口香久不歇
生取及煮飲並解諸毒又誤食鯁鰐肝至迷悶者飲其汁立差山野
皆落木亦無損其枝節間有脂膏如桃膠南人挾得并其皮葉煎之
中生者子繁而木峻不可揃緣但刻其根下方寸許內塗於中夕子
如黑餳謂之橄糖用膠船著水益乾牢於膠漆邕州又
有種波斯橄攬與此無異但其核作三瓣可蜜漬食之

圖經曰

諸郡皆有之木似木
橄攬生嶺南今閩廣

本草二十三

四

云樹大圓實長寸許南方人以爲果生實味酸南州異物志曰橄攬子緣海浦嶼間生實大如軸頭皆反垂向下實先生者向下後生者漸高南方草木狀曰橄攬
海藥謹按異物志云生南海浦嶼間樹高丈餘其實如棗二月有花子大如棗八月熟生交趾生至八月乃熟甚香橄攬木高大難採以鹽擦木身則其實自落

衍義曰

橄攬味甘嚼汁嚥治魚鱗



楃梓

楃梓味酸甘微溫無毒主溫中下氣消食除心間醋水去臭辟衣魚生比土似楂子而小

今附圖經等謹按孟懿子云發毒熱秘

大小腸聚胷中痰壅不宜多食
滻血脉
云除煩渴治氣

圖經曰

楃梓舊不著所出州土今陳良云發毒熱秘

其實大抵類楂但膚慢而多毛味尤甘治脅中積食去醋水下氣止渴欲卧取一兩枚而寢生熟皆宜楂子處處有之孟州特多亦主霍亂轉筋並煮汁飲之可敵木瓜常食之亦去心間醋痰皮

楂末傳瘡止黃水實初熟時其氣氣馥入將致衣笥中亦香

藏器云

樹如林檎花白綠色

衍義曰

搯掉食之湏淨去上浮毛不爾搰人肺花亦香白色諸果中惟此多生蟲

少有不艸者圖經言欲臥取一兩故而寢如此恐太多痞塞胃脘

捺子味甘平無毒主益氣力寬腸胃令人不肌健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄭注禮云捺似栗而小關中鄜坊甚多

今附臣禹

錫等譜按同華子

云新羅捺子肥自人止飢調中開胃甚驗

圖經

文具栗條下

一十三種陳藏器餘

靈床上果子主人夜卧讌語食之差也

無漏子味甘溫無毒主溫中益氣除痰嗽補虛損好

本草二十三

甲

顏色令人肥健生波斯國如棗

云波斯棗

海藥

云

樹若栗木其實如橡子有三角消食止咳嗽虛羸悅人久服無所損也

都角子味酸澀平無毒久食益氣止洩生南方樹高

丈餘子如卵徐表南方記云都角樹二月花花連著

實也

海藥云

謹按徐表南州記云生廣南山谷二月開花至夏未結實如卵主益氣安神遺洩痔瘻溫腸久服無所損也

武林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是文林郎因以此爲名也

海藥云

又南山亦出彼人呼搰掉是味酸香微溫無毒主水瀉腸虛煩熱並宜食散酒氣也

木威子味酸平無毒主心中惡水水氣生嶺南山谷

樹葉似棟子如橄欖而堅亦似棗也

摩廚子味甘香平無毒主益氣潤五藏久服令人肥健
生西域及南海子如瓜可爲茹異物志云木有摩廚生
自斯調厥汁肥潤其澤如膏馨香潤射可以前敷彼術
之人仰以爲儲斯調國名也

海藥云

謹按異物志云生西域二月開花四月五月結實

如瓜許益氣安神養血生肌久服健人也

懸鈎根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒
下血婦人赤帶下少患痢不問赤白膿血腹痛並濃者服之
子如梅酸美入食之醒酒止渴除痰唾去酒毒莖上有刺
如鉤生江淮林澤取莖燒爲末服之亦主喉中塞也

鈎粟味甘平主不飢厚腸胃令人肥健子似粟而圓小

卷一百一十三

甲二

生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢鈎子又有雀
子小圓黑味甘久食不飢生高山子小圓黑又有櫧
音子小於橡子味苦澀止洩痢破血食之不飢令健
行木皮華者取汁與產婦飲之止血皮樹如栗冬月
不凋生江南子能除惡血止渴也

石都念子味酸小溫無毒主痰嗽噦氣生嶺南樹高
丈餘葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬爲粉
甘美益人隋朝植於西苑也

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海
南樹高丈餘子中有汁如乳汁吳郡賦云平仲君遷

海藥云

謹按劉斯交州記云其實中有乳汁甜美香好微寒無毒主消渴煩熱鎮心久服輕身亦得悅人顏色也

韶子味甘溫無毒主暴痢心腹冷生嶺南子如粟皮肉核如荔枝廣志云韶葉似栗有刺研皮內白脂如豬味甘酸亦云核如荔枝也

探子味甘澀平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去嗽子似梨生江南吳都賦云探櫧禦霜是也諸果有毒桃杏人雙有毒五月食未成核果令人發癰節及寒熱又秋夏果落地為惡蟲緣食之令人患九漏桃花食之令人患淋李人不可和雞子食之患內結不消

本草二十三

四三

重修政和經史證類備用本草卷第二十三

精



