

外臺秘要方

二十四

外臺祕要方卷第二十七

淋并大小便難

藏書印

閣

吳郡錢中立

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

諸淋方三十五首

五淋方三首

石淋方一十六首

血淋方五首

小便赤色如紅方三首

熱淋方三首

勞淋方三首

氣淋方五首

膏淋方二首

許仁則淋方二首

大便難方六首

大便不通方一十七首

大便祕澀不通方七首

大便失禁并關格大小便不通方二十二首

關格脹滿不通方四首

許仁則大便暴閉不通方二首

小便不通方一十三首

小便難及不利方九首

遺尿方六首

尿血方一十一首

胞轉方一十五首

小便血及九竅出血方一十二首

小便不禁方二首

小便數及多方五首

許仁則小便數多方四首

尿狀方六首

灸穴雜法一十二首

諸淋方三十五首

病源諸淋者由腎虛而膀胱熱故也膀胱與腎為表裏俱主水水入小腸下於胞行於陰為溲便也腎氣通於陰陰津液下流之道也若飲食不節喜怒不時虛實不調則腑藏不和致腎氣虛而膀胱熱也膀胱津液之腑熱則津液內溢而流於畢水道不通水不上不下傳積於胞腎虛則小便數膀胱熱則水下澀數而且澀則淋瀝不宣故謂之淋其狀小便出少起數少腹弦急痛引於臍又有石淋勞淋血淋氣淋膏淋諸淋形證各隨名其說於後章而以一方療之者故謂諸淋也其湯熨針石別有正方補養宣導令附於後養生方道引法云偃卧令兩足布膝

頭斜踵置鳩口內氣振腹鼻出氣去淋數小便又去石淋蓋中痛又云蹲踞高一尺許以兩手從外屈膝內入至足跌上急手握足五指極力一通令內曲必利晉體療淋也出第十四卷中廣濟療患淋來積年比醫療不能得損或十日五日一發即有可時今年因病更頻數今二十日來不定方

滑石 冬葵子各八分 瞿麥 石韋各五分

蒲黃分 陳橘皮四分 芍藥 茯苓

芒消各六分 子苓分

右十味搗節為散空腹煮後飲子服方寸匕日二服漸加至一七半不利已熱麩炙肉醋蒜等又飲子方

桑白皮分 通草 百合各八分 白茅根 新粉 右四味細剉以水四升煮取二升去滓溫下散藥口乾渴含

之亦得也

又療淋小便不通來六七日方

滑石^{五兩}

通草^{三兩}

瞿麥^{二兩}

冬葵子^兩

茅根^升

石韋^{三兩}

芒消^兩

右七味切以水九升煮取二升八合去滓內芒消分溫三服每服如人行六七里進一服以微利為度忌諸熱食物並出

第四卷中

范汪療淋方

取蘼蕪葶草滿兩手把以水煮服之可常作飲勿不飲也

又方

煮荒絲子服之如蘼蕪葶法

又方

露蜂房燒飲服之取如椀大者妙

又方

雞子二枚去白黃以鹽內殼中使備以三升水漬一升鼓絞取汁真殼中鹽投汁中攪令調盡服之

又方

滑石

海蛤

雞子殼^{各等分}

右三味搗篩為散以飲服半錢七日三服漸加至一錢七甚良

又方

取地麥草一名地膚草二七把以水二升煎之亦可長服一法日漬鼓汁飲之良

又療淋利小便葵子散方

葵子^{半升}

滑石^兩

石南葉^兩

地榆^兩

石韋^{二兩}

通草^兩

右六味搗節為散飲服方寸匕日三服良
又療淋莖中有石方

取雞屎白半升暴乾熬之令香搗節為散以酪酢
漿飲方寸匕日三服到二三日當下石便當於器中
尿石下為驗

又療淋師所不能療者神方

取萹上亭長生折斷腹腹中有白子如小米長二三
分取暑白板子上陰乾燥二三日藥成若有人患十
年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小盃
中水如棗許內藥盃中半食頃以瓜甲研當令扁扁
見於水中仰頭令人寫入咽喉中勿令近牙近則著
牙齒間不盡得入咽之也藥雖微小下喉自當覺至
下焦淋所有頃藥作大煩急不可堪者飲麥乾飯汁

藥勢止也若無麥乾飯汁但水亦可耳老小服三分
一耳藥當下淋疾如膿血連連爾石去者或如指頭
或青或黃男女服之皆水道去并療婦人產生後餘
疾積聚或成帶下服之皆愈此蟲正月二月為荒青
三月為玉不留行四月五月六月為萹上亭長七月
為斑猫九月十月為地膽隨時變耳亭長時頭當
赤身黑若藥不收淋不下以意節度更增服之並出

第六十五卷中

小品地膚湯療下焦諸結熱小便赤黃數起出少大痛或便血
者溫病後餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及步行
冒熱冷飲遂熱結下焦及散石熱動關格少腹堅胞脹如斗
大諸淋服之即通方

地膚草

知母

猪苓皮

瞿麥

黃芩 升麻 通草各二 海藻各一
葵子升 枳實二兩

右十味切以水九升煮取三升分二服大小行皆閉者加大黃三兩婦人房勞腎中有熱小便難不利腹滿痛脉沈細者加猪腎一具千金同崔氏云若加腎如水一斗半煮取一斗內煎煎

又療淋榆皮湯方
榆皮斤半 滑石二兩一 黃芩二兩一 甘草一
瞿麥各二 葵子升一

右六味切以水一斗煮取三升温服一升旦服忌海藻菘菜並出第四卷中
集驗療淋方

以比輪錢三百文以水一斗煮取三升飲之千金不傳神效肘後同千金治氣淋

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈父仲必效同

又方
燒頭髮灰服之良並出第五卷中文仲同
千金療淋痛方

滑石四 貝子枚三 茯苓 白朮
通草 芍藥各二

又方
右六味搗節為散酒服方寸匕日二服大良忌酢桃李雀肉等

葵子合五 茯苓 白朮 當歸各二
右四味切以水七升煮取三升分三服忌雀肉桃李酢物等
范汪同

又方

又方 栝樓 滑石 石韋去毛各二兩 右三味為散以大麥粥飲服方寸匕日三服良

又方 宿葵根西八 大麻根西五 甘草西二 石首魚頭石西四 通草西二 茅根斤三 貝子煨合 右七味切以水一斗二升煮取五升分為五服日三夜二服亦主石淋忌海藻菘菜神良

又方 取細白沙三升一味熬令極熱以酒三升淋取汁一合服之領服

又方 榆皮斤 車前子升 冬瓜子升 鯉魚齒 桃膠 地麥草 通草各二 瞿麥西四 又療卒淋方 灸外踝尖七壯

又方 取右石首魚頭石末水服方寸匕日三服

又方 鯉魚齒燒灰末酒服方寸匕日三服並出第二十一卷中

崔氏療淋散方 石韋洗刮去毛 大黃煨 魄研 滑石半兩 當歸 芍藥 黃芩 冬葵子 瞿麥各一 亂髮三團如雞子大燒灰 茯苓半兩 右十味搗篩為散服方寸匕日二服忌酒麪炙肉油膩蒜鮓

酢及熱物等出第四卷中

古今錄驗療淋瞿麥散方主薄甄

瞿麥去毛 石韋去毛 滑石 車前子

葵子各四

右五味搗篩冷水服方寸匕日三服增至三匕忌酒麪慎生
冷物也

又方

取生續斷絞汁一升服之

又療淋滑石湯方

滑石二 榆白皮二 石韋去毛 地麥草二

葵子二

右五味切以水一斗煮取四升分四服日再服甚良

又療淋榆皮湯方

瞿麥二 防葵一 榆白皮一 葵子升

滑石二 甘草二 黃芩一

右七味切以水一斗煮取三升分二服已心海藻菘菜

又方

取附船底苦大如鴨子以甌半水煎取一甌頓服日

三服並出第二十六卷中千金治氣淋

近効療淋方

葵子升

右一味以水三升煮取二升去滓分溫再服相去如人行
十里無所忌煎茅根飲之亦佳

又方

人參六 厚朴灸三分 粟米合

右三味切以水三升煮取七八合以新布絞去滓分溫三服

服別相去如人行七八里久忌食生冷等
又方

茯苓

地骨皮略三

甘草炙

黃芩

前胡

生薑略二

麥門冬

去心竹葉切

蒲黃西

右丸味切以水九升煮取二升六合去滓分為三服服別相去如人行七八里久忌熱麪油膩海藻松菜酢物等

五淋方三首

集驗論五淋者石淋氣淋膏淋勞淋熱淋也石淋之為病小便莖中痛尿不得卒出時自出痛引少腹膀胱裏急氣淋之為病小便難常有餘瀝言膏淋之為病尿似膏白出少腹膀胱裏急勞淋之為病倦即發痛引氣衝小便不利熱淋之為病熱即發其尿血後如豆汁狀畜作有時五淋各異療方用雜故不載也

並出第五卷中

范汪療五淋方

麝香五分 麝香五分 玳瑁二分 地膽二分 猪苓三分

右四味搗篩為散每服四分匕日進三服夜二服但少腹有熱者去猪苓服藥二日後以罌盛小便當有所下肉淋者下碎肉血淋者下如脉短繩若如肉膿氣淋者下如羹上肥石淋下石或下砂劇者十日即愈禁食羹猪肉生魚葱鹽醋以小麥汁服之良

又療五淋神良延命散方

滑石

礬石

燒半

石膏

車前子

露蜂房

子用之

貝子

搗者苦酒中二三

柏子人

魚齒

精合

雞矢白

白雞

胫裏黃皮熬

苦瓠

穰

時牛

陰頭毛

燒

芒消

各一分

婦人陰上毛二分一
右十四味搗節為散每服半錢本無燒七加至一錢七日三夜一服
以葵子飲下之三日愈甚者不過六七日愈小便以器盛之
當見石及諸物也並出第十五卷中
必効療五淋方

白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升去滓分
三四服肘後千金同出第三卷中
石淋方一十六首

病源石淋者淋而出石也腎主水水結則化為石故腎客砂石
腎虛為熱所來熱則成淋其病之狀小便則莖裏痛溺不能卒
出痛引少腹膀胱裏急砂石從小便道出甚者塞痛令悶絕出
第十四卷中
范汪療石淋方

又方
鼈甲燒灰搗節為散酒服方寸匕頻服數劑當去
石也肘後同

又方
取人家籬牆上連蔓律闕掘出見其根挽斷以杯
於坎中承其汁服之一升石自當出若不出更服一升
取車前子二升用絹囊盛之以水八升煮取三升去
滓頓服之移日又服石當下也宿不得食飲之神良
肘後千金同

又方
柏子人 芥子 滑石各等分
右三味搗節為散以麥汁飲服方寸匕日三服已効

又方

牛角燒灰服方寸匕日五六服任意飲酒

瞿麥子搗為末酒服方寸匕日三服到一二日當下石
又香薷搗作屑以酢漿飲服方寸匕日三至二三日
當下石小便於器中並出第十五卷中

小品療石淋方

浮石取滿一子搗為末以水三升苦酒一升煮取二
升澄清溫服一升不過再三服石即便出古今錄驗
千金崔氏同出第四卷中

集驗療石淋方

鯉魚齒一升貝齒一升搗篩以三歲苦酒和分為三
服宿不食日服一分日中服一分暮服一分古今錄
驗范汪同

文仲石淋方

桃膠如棗大夏月者三合冷水中冬天以湯三合和
之一服日三當下石石盡即止千金古今錄驗同

又方

濃煮車前草汁飲之良也古今錄驗同出第四卷中

古今錄驗療石淋及諸淋方

石首魚頭石^{十四枚}當歸^{等分}

右二味搗篩為散以水二升煮取一升頓服立愈單用魚頭
石亦佳

又石淋石韋散方

石韋^{去毛}滑石^{各三分}

又方 右二味搗篩為散用米汁若蜜服一升日二服范汪同

取生律葉搗絞取汁三升為三服無苦毒石自出范
汪同

又滑石散療石淋莖中疼痛瀝瀝晝夜百餘行內出石溺血方

滑石^{二分} 石韋^{去毛} 當歸 通草
地膽^{去足} 鐘乳^{研各二分} 車前子^{二分} 瞿麥
蛇床子^{二分} 細辛 蜂房^{炙各一分}

右十一味為散以葵汁麥粥服方寸匕日三服生葱生菜

又療石淋瀝瀝莖中痛晝夜百行或血出延命散方

滑石 牛角^炙 芒消^{各二分} 瞿麥^{三分}
車前子 露蜂房^炙 貝子^燒 柏子人
魚齒^炙 雞矢白 苦瓠子^燒 牛陰頭毛^{各一分}
婦人陰上毛^{二分} 本無

右十三味搗篩為散以葵汁服方寸匕日三服

又療石淋方

取雞子陳者一枚用淳苦酒一升以雞子合苦酒置
器中以油紙三四重密封頭不令水得入沉井中一
宿平旦取剝去皮吞其黃石消去也並出第二十六
卷中

血淋方五首

病源血淋者是熱淋之甚者則尿血謂之血淋心主血血之行
身通遍經絡循還腑藏勞熱甚者則散失其常經溢滲入胞
而成血淋也出第十四卷中

廣濟療血淋不絕雞蘇飲子方

雞蘇^握 竹葉^握 石膏^{八分} 生地黃^{二分}
蜀葵子^{湯成下}

右五味以水六升煮取二升去滓和葵子末分溫二服如人

行四五里久進一服不利忌蕪美蒜熱麩炙肉等餘無所忌
古今錄驗范汪同

又療血淋小便疼痛方

雞蘇_二 滑石_五 生地黃_半 小蘇根_一
竹葉_二 通草_五 石膏_五

右七味細剉以水九升煎取三升去滓分温三服如人行四
五里進一服不利忌蕪美熱麩蒜陳臭物並出第四卷中
千金療血淋方

石韋_去 當歸 芍藥 蒲黃_{各等}

右四味為散酒服方寸匕日三服肘後文仲同出第二十一
卷中

備急陶氏療淋下血二升者方

取紵麻根十枝以水五升煮取二升一服血止神驗尉

後古今錄驗同

又方

灸足大指前節上十壯良並出第六卷中

小便赤色如紅方三首

延年論曰療小便赤色如淺紅花汁此是憂愁驚恐心氣虛熱
客邪氣與熱傳於心所以故小便赤心主南方火王在四月五
月六月其色赤驚恐動於心心不受邪邪即傳於小腸滲入胞
中所以小便赤此為微邪其病猶輕今服丸子即得漸差心即
是火火惡於清清即是水水能滅於火既損心氣即不得食熱
及冷水并勿憂愁如不慎恐小便色赤如血漸即難愈今處乾
地黃丸補心神益脾氣散客熱自然調和小便色即自變如常
第一不得憂愁在心并勿食熱食及冷水等方

乾地黃 黃耆_{各六} 防風 遠志皮

茯神 枯樓 子苓各四分 鹿茸 炙五分
龍骨 炙四分 人參 五分 滑石 十二分 石韋 湯洗一宿
當歸 各二分 芍藥 蒲黃 甘草 炙

戎鹽 各三分 車前子 一分

右十八味搗篩為末以蜜及棗膏各半相和煎令消散和藥為丸如梧桐子大每食後少時以粥清下十九日二三稍加至十五二十九以知為度禁熱食及冷水海藻粉菜蕪菜酢許孝璋處

又茅根飲子療胞絡中虛熱時小便如血色方

茅根 升 茯苓 三分 人參 乾地黃 各二分

右四味切以水五升煮取一升五合去滓分温五六服中問任食一日令盡已心大蒜蕪菜大酢五辛熱麩等物文仲處文仲通草飲子主熱氣淋澁小便赤如紅花汁色方

廣濟療熱

車前草 物一 通草 切三分 葵根 物一 芒消 六分 湯

右四味以水七升煮取二升絞去滓內消分温三服服別相

去如人行六七里微利為度忌熱食出第四卷中

古今錄驗療淋小便數病膀胱中熱滑石散方

滑石 兩 枳樓 兩 石韋 二分 去毛

右三味搗節為散以大麥粥清服方寸匕日三並出第二十六卷中

近効療熱淋日夜數十度喫藥不差方

空腹服并花水三升必差韋特進鴻臚進用如神
効方喫水了後行六七百步甚良

勞淋方三首

病源勞淋者謂勞傷腎氣而生熱成淋也腎氣通於陰其狀
尿管重內數起不出引少腹痛小便不利勞倦即發也出第十
四卷中

千金夫勞淋之為病勞倦即發痛引

氣衝下方灸足太陰百壯在內踝上三寸三報之療
與氣淋同

又療五勞七傷八風十二痺以為淋勞結為血淋熱結為肉淋

小便不通並中痛及少腹急痛不可忍者方

滑石分

王不留行

冬葵子

車前子

桂心

甘遂

通草各二

石韋四分

右八味搗節為散以麻子粥五合和服方寸匕日三服尿清
差並出第二十一卷中

古今錄驗療石淋勞淋熱淋小便不利胞中滿急痛石韋散方

通草二

石韋二

王不留行二

滑石二

甘草炙

當歸各二

白朮

瞿麥

芍藥

葵子各二

右十味搗節為散先食以麥粥清服方寸匕日三服忌海
藻松菜桃李雀肉等出第二十六卷中

氣淋方五首

病源氣淋者腎虛膀胱熱氣脹所為也膀胱與腎為表裏膀胱

膀胱熱氣流入胞熱則生實令胞內氣脹則少腹滿腎氣不能制其小便故成淋其狀膀胱小便皆滿尿澀常有餘瀝是也亦曰氣癃診其少陰脉數者男子則氣淋出第十四卷中
千金瘳氣淋方

灸關元五十壯

又方

夾玉泉相去一寸半灸三十壯

又方

水三升煮致一升一沸去滓內鹽二合頓服之

又方

搗葵子末湯和服方寸匕

又方

空腹單茹蜀葵一滿口

膏淋方二首

病源膏淋者淋而有肥狀如膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎虛不能制於肥液故與小便俱出也出第十四卷中
千金瘳膏淋方

搗律草汁三升醋三合和空腹頓服當如大豆汁下一名膏律也

又膏淋之為病尿似膏自出瘳之一如氣淋也並出第二十一卷中

許仁則淋方二首

許仁則瘳小便淋澀方此病有數種有石淋有熱淋有氣淋氣淋者氣擁塞小便不通遂成氣淋此病日須依前瘳氣水氣法石淋者緣先服石石氣不散擁渴生熱故成石淋熱淋者體氣生熱更緣食飲將息傷熱熱氣灼灼遂成熱淋更無餘候但苦

體氣熱小便澀出處酸酒宜依後瞿麥等六味湯大戟鬼等五味散三淋俱服之方

瞿麥穗三升冬葵子一升榆白皮一升桑根皮一升

白茅根一升石菖蒲四兩

右藥切以水一斗煮取三升去滓分溫三服每服如人行十里久服三五劑後宜令大戟鬼五味散服佳

又方

大戟六兩石菖蒲三兩瞿麥穗四兩冬葵子一升

茯苓一升

右藥搗篩為散煮桑根白皮作飲子初服一方寸匕日再服稍加至三匕六日升同忌酢物出下卷中

大便難方六首

病源大便難者由五藏不調調陰陽偏有冷熱虛實三焦不和則

冷熱并結故也胃為水穀之海水穀之精化為榮衛其糟粕行之於大腸以出也五藏三焦既不調和冷熱擁澀結在腸胃之間其腸胃本實而又為冷熱之氣所并結聚不宣故令大便難也又云邪在腎亦令大便難所以爾者腎藏受邪虛而不能制小便則小便利津液枯燥腸胃乾澀故大便難又渴利之家大便亦難所以爾者為津液枯竭致令腸胃乾燥診其左手寸口人迎以前脉手少陰經也脉沉為陰陰實者病若閉悶大便不利腹滿四肢重身執若胃脹右手關上脉陰實者脾實也病若腸中怵怵一作伏如牢狀大便難脉緊而滑直大便亦難跗陽脉微弦法當腹滿不滿者必大便難而脚痛此虛寒從下向上也其湯熨針石別有正方補養宣通今附於後養生方導引法云偃卧直兩手捻左右脅除大便難腹痛腹中寒之內氣鼻出氣溫氣咽之數十病愈出第十四卷中

肘後療脾胃不和常患大便堅強難方

大黃 芍藥 厚朴炙各 枳實炙

麻子別研

右五味搗篩入麻子蜜和為丸如梧桐子大每服十九日三服稍稍增之以通利為度可常將之集驗備急古今錄驗同出第二卷中

千金療大便難方

灸承筋二穴三炷在臍中央陷中

又方

單用豉清醬清羊酪土瓜根汁並單灌之立出范

汪同

又練中丸主宿食不消大便難方

大黃西 葶藶熬 杏仁去皮 芒消各四

右四味搗篩為末鍊蜜為丸如桐子大每服十九日三服稍加之並出第十五卷中

備急心不得大便或十日一月方

葵子二升水四升煮取一升去滓一服不愈重作服

良姚方出第六卷中古今錄驗文仲范汪同已云蒜炙肉

古今錄驗麻子人丸療大便難小便利而反不渴者脾約方

麻人二升別 枳實半斤 芍藥半斤 杏仁一升去皮

大黃一斤 厚朴一尺

右六味搗篩為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服飲下十九日漸增至三十九日三服出第二十六卷中此本中景傷寒論方

大便不通方一十七首

病源大便不通者猶三焦五藏不和冷熱之氣不調熱氣偏入腸胃津液竭燥故令糟粕痞結擁塞不通也其湯熨針石別

有正方補養宣導今附於後養生方道寸引法云龜行氣伏衣被中覆口鼻頭面正卧不息九通微鼻出氣瘵閉塞不通出第十
四卷中

肘後療大便不通方

研麻子以米雜為粥食之

又方

用礬石如指大者道寸下部並出第六卷中

千金療大便不通方

灸第七椎兩傍各一寸七壯

又方

桃皮三升水五升煮取一升頓服

又方

水一升煮羊蹄根一把取半升頓服

又方

煮麻子取汁飲之

又方

常服蜜煎五合

又方

猪脂和陳葵子末為丸如梧桐子大每服飲下十九通即止

又方

常服車前子及苗並通也

又方

搗葵根汁服之良

又方

葵子一升牛酥一升猪脂亦得以水三升煮葵子取

一升內熱者大沸待冷分二服並出第十五卷中
必効療大便不通方

牛膠一條廣二寸長四寸葱白握

又方 右二味用水二升和煮消盡去滓頓服之千金同

漢瓜蒂七枚綿裹內下部如非腑將曹瓜亦得並出
第三卷中

崔氏療大便不通方丈夫婦人同

菖蒲末 石鹽末各一兩

又方 右二味相和取半匕和烏麻脂少許綿裹內下部中即通

古今錄驗療心腹脹滿大便不通方
猪脂一升溫酒一服令盡良並出第四卷中

芍藥分 黃芩分 杏仁去皮八分大黃分

芒消分
右五味擣節為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服十五丸
飲下加至二十九取通利為度經心錄同出二十六卷中
近効療大便不通方

用猪膽和少蜜於鐺中熬令熟稠丸如棗大內下部
中即差

大便祕澀不通方七首
千金療大便祕塞不通神方

猪羊膽無在

右一味以甬灌三合許令深入即出矢不盡須更更灌一方
加葵子汁和之又有椒鼓湯五合猪膏三合灌之佳臨時易
可得即用之經心錄同

又三黃湯療下焦熱結不得大便方

大黃兩 黃芩兩 甘草一椀 一椀子^十

右四味切以水五升煮取一升八合分三服若秘加芒消二

兩已心海深松葉並出第十五卷中

備急療卒大便閉澀不通方

晉氏云削瓜瓠如指大導下部中即効

又方

燒亂髮灰三指捻投水半升一服

又方

綿裹鹽作三丸如指大內下部中

又方

煎蜜丸強加乾薑末和丸如指導下部中姚云欲死者蜜三升微火煎如飴投冷水中令凝丸如大指長

三四寸導之良

又方

穿猪膽一枚內下部中倒瀉之姚云療七八日奔氣湯心欲死者須臾便通良范汪同

大便失禁并閉格大小便不通方二十二首

病源大便失禁者大腸與肚門虛冷滑故也肛門大腸之候也俱主行糟粕既虛弱冷滑氣不能溫制故使大便失禁

又閉格大小便不通謂之內閉小便不通謂之外格二便俱不通為閉格也由陰陽氣不和榮衛不通故也陰氣大盛陽氣不

得當之曰內閉陽氣大盛陰氣不得當之曰外格陰陽俱盛不得相營曰閉格閉格則陰陽之氣痞結腹內脹滿氣不行於大

小腸故閉格而大小便不通也又風邪在三焦三焦約者則小腸痛內閉大小便不通日不得前後而手足寒者為三陰俱逆

三日死也診其脉來浮牢且滑直者不得大小便也並出第十
四卷中

范汪療下部閉不通方

取烏梅五顆著湯漬須臾出核取熟擣之如彈丸
內下部中即通也肘後同

又方

取胡蘿蔔根一把擣末水和絞去滓強人服一升數用
有效兼療脚氣

又療大小便不通三陽實大便不通方

榆白皮^三西桂心^二滑石^二甘草^三
右四味以水一斗煮取三升分三服心海藻^三菘菜^三生葱^三集驗

同並出第十六卷中

集驗療閉格之病腸中轉痛不得大小便一日一夜不差欲死方

芒消^三兩紙^三重裹於炭火內燒令沸安一升水中
盡服之當先飲温湯一二升以來吐出乃飲芒消汁
也肘後同

千金療老人小兒大便失禁方

灸兩脚大姆指去爪甲一寸三壯

又方

灸大指竒間各三壯

又療大小便不通方

灸臍下一寸三壯

又方

灸橫文一百壯

又方

葵子^一升 竹葉^{青者}一把

又方 右三味以水一升煮一沸頓服之

又方 葵子升 榆白皮物
右三味以水五升煮取二升分二服

又方 水三升煮葵子一升去滓取一升內猪膏一升空肚
一服

又方 鹽半升合蜜三合同煎如飴出之著冷水中丸如棗
擲形如指大深內下部中立通並出第十五卷中
千金翼濡藏湯主大小便不通六七日腹中有燥壅寒熱煩迫
短氣汗出腹滿方
生薑根二斤 猪膏升 大黃二兩

右三味以水七升煮取五升去滓內膏煎取三升澄清強人
頓服之蓋人分再服出第七卷中

備急膏氏療卒閉格大小便不通支滿欲死二三日則殺人方
鹽以苦酒和塗中乾又易之必効同
陶氏卒大小便不通方

紙裹鹽燒投水中服之

姚氏風寒冷氣入腸急痛堅急如吹狀兼已大小便不通或小
腸有氣結如升大脹起名為閉格病
又療大小便不利方

苦參 滑石 且齒各等

右三味擣節為散每服飲下一匕或煮葵根汁服之弥佳文

仲同出第六卷中
古今錄驗療閉格大小便不通方

以水三升煮鹽三合使沸適寒溫以竹筒灌下部立
通行也

又療大小便不通方

通草^{四兩} 郁李人^{三兩} 車前子^{五合} 黃芩^{三兩}
朴消^{四兩} 瞿麥^{三兩}

又方 右六味切以水八升煮取二升去滓分三服經心錄同

取生上瓜根搗取汁以水解之於筒中吹內下部即
通祕方並出第二十六卷中

經心錄療閉格大小便不通方

芒消 烏梅 榆白皮^{各五兩} 芍藥^{五兩}
杏仁^{各四兩} 麻子^{人兩} 大黃^兩

右七味切以水七升煮取三升分為三服一方無烏梅加枳

實乾地黃各二兩

又療大小便不通方

滑石^{二兩} 葵子 榆白皮^{各一兩}

右三味下篩為散煮麻子汁一升半取二匕和服兩服即通
並出第二卷中

近効療大小便不通方

含消石吐去水

閉格脹滿不通方四首

千金療閉格脹滿不通方

芍藥^{六分} 芒消^{六分} 黃芩^{五分} 杏仁^{八分} 去
大黃^{八分}

右五味末之蜜和丸如桐子飲下十九日二服良

又方

獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部氣立通削薑裹鹽
導並佳

又方

乾薑 鹽 杏人

右三味等分搗道下之

又瘰脹滿閉格不通方

吳茱萸一升乾薑 大黃 桂心

當歸 芍藥 甘草炙 芍藥各二

雄黃三分 人參 細辛各四 真珠研分

桃白皮握

右十三味切以水一斗煮取三升去滓內雄黃真珠末酒一
升微火煎三沸已服一升得下止不必盡也每服如人行十
里久進之已心海藻菘菜生葱生菜生血物等並出第十五

卷中

許仁則大便暴閉不通方二首

許仁則論曰此病更無餘候但由飲食將息過熱熱氣緼積祕
塞若緣氣祕自須依前療氣法服巴三等三味丸及療水氣
葶麻等諸方取利若是風祕自依後服大黃等五味丸暴祕
之狀骨肉強痛體氣煩熱唇口乾焦大便不通宜依後大黃
芒消二味湯取利方

大黃研 芒消研

右藥先切大黃以水四升煮取二升去滓內芒消頗服之須
臾利良久不覺以熱飲投之若服此依前不利宜合後大麻
人等五味丸服之取快利矣

五味大黃丸方

大黃研 大麻子一升 芒消研 乾薑

桑根白皮各五
右五味先搗四味為散然後搗人合如其膏即投四味散和搗和之蜜搗之丸如梧子大切服十九日再服稍稍和得大便通為限各升同出下卷中主大便風秘不通

小便不通方一十三首

病源小便不通由膀胱與腎俱有熱故也腎主水膀胱為津液之府此二經為表裏而水行於小腸入胞者為小便腎與膀胱既熱熱入於胞熱氣大盛故結滯令小便不通少腹脹氣急甚者水氣上逆令心急腹滿乃至於死診其脈緊而滑者不得小便也出第十四卷中

廣濟療下冷疼小便不通雞蘇飲子方

- 雞蘇一兩 通草四兩 石膏一斤 冬葵子一斤
- 杏仁二兩 去滑石二兩 生地黄四兩

右七味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服如人行四五里進一服不利忌熱美熱麪炙肉蒼麥麩蒜陳臭物粘食等

又方

- 冬葵子五兩 通草三兩 茅根四兩 芒消成二兩湯
- 茯苓三兩 滑石五兩

右六味切以水九升煮取三升去滓內芒消分溫三服服別相去如人行六七里忌炙肉熱食醋蒜等物

又方

- 茯苓二分 大黃六分 芍藥 當歸
- 枳實多 白朮 人參各二 大麻人四分

右八味切以水六升煮取二升去滓分溫三服要者芒消亦得忌酢物桃李棗肉等並出第四卷中

崔氏療小便不通方

取熏黃如豆許末之內小孔中神良

又方

桑根白皮 猪苓 通草 各二

右三味切以水六升煮取二升分三服

又方

雞屎白如彈丸以苦酒和服即下不過三四瘵淋

又方

足大姆指竒間有青脉針挑血出灸三壯愈並出

第四卷中

救急主小便不通方

取印成髓七顆擣篩作末用青葱葉夫盛鹽菜開便孔內葉小頭於中吹之令鹽末入孔即通非常之效

又方

取嫩穀木稍濃汁可飲半升以來即愈

必効療小便不通或利不得服滑藥急悶欲絕方

隨三升大鑊中熬以布帛裏熨臍下按之小便當漸通也肘後同

古今錄驗療熱結小便不通利方

利滑石屑水和塗少腹及繞陰際乾復塗之肘後同

又方

取鹽填滿臍中大作艾炷灸令熱為度良肘後千金同並出第二十六卷中

近効療小便不通數而微腫方

取陳久筆頭燒作灰和水服之小便難及不利方九首

病源小便難者此是腎與膀胱熱故也此二經為表裏俱主水
水行於小腸入胞為小便熱氣在於藏腑水氣則澀其熱勢微
故但小便難也診其尺脈浮小便難亦脈濡小便難尺脈緩小
便難有餘瀝也出第十四卷中
集驗療小便難淋瀝湯方

滑石^兩 石韋^{三兩} 榆皮^升 葵子^升
通草^兩

右五味切以水一斗煮取三升分三服一方加黃芩三兩
又療淋小便不利陰痛石韋散方

石韋^{二兩} 瞿麥^兩 滑石^兩 車前子^兩
葵子^兩

右五味搗篩為散服方寸匕日三並出第五卷中
千金療小便不利莖中痛少腹急方

通草^兩 葶藶子^兩 茯苓^兩

右三味搗為散以水服方寸匕日三服忌醋物出第二十一
卷中

備急療小便不利莖中痛劇亦療婦人血結腹堅痛牛膝飲方
牛膝一名牛脣掘取根煮服之立差有驗肘後同

陶効方

秦朮^分 冬瓜子^兩

右二味搗為末酒服一匕日三服神良肘後同
文仲療小便不利方

桑螵蛸^{三十枚} 黃芩^兩

右二味切以水一升煮取四合頓服之良肘後同
又方

蒲黃 滑石^{各一分}

右二味為散酒服一七日三天驗肘後同
又療諸淋及小便常不利陰中痛日數十度起此皆勞損虛
熱所致長將散服方

石葶去毛 滑石 瞿麥 王不留行

葵子各二兩

右五味搗篩為散每服方寸匕日三服之姚方加滑石五
兩車前子三兩無王不留行備急同出第四卷中

古今錄驗療淋胞痛不得小便滑石散方

滑石 葵子 鍾乳各一兩 桂心

通草 王不留行各半兩

右六味搗篩為散先食訖以酒服方寸匕日三服忌生葱出

第二十六卷中

遺尿方六首

病源遺尿者此由膀胱虛冷不能約於水故也膀胱為足太
陽腎為足少陰二經為表裏腎主水腎氣下通於陰小便者
水液之餘也膀胱為津液之府府既虛冷陽氣衰弱不能
約於水故冷遺尿也診其脉來過寸口入魚遺尿肝脉微滑
亦遺尿左手關上脉沈為陰絕者無汗脉也苦遺尿尺脉
實少腹牢痛小便不禁尺中虛小便不禁腎病小便不禁脉
當沉滑而反浮大其色當黑反黃此土之尅水為逆不治其
湯尉針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法
云導踞高一尺許以兩手從外屈膝至跌上急手握足五趾極
力一通令內曲以利腰膈療遺尿也出第十四卷中

集驗療遺尿方

取雄雞腸燒灰為末用三指一撮服之朝暮服當愈
范汪同出第五卷中

千金瘕遺尿小便澀方

牡蠣^熬 鹿茸^炙 桑耳^炙 阿膠^炙

右四味切以水七升煮取二升分為二服作散以飲送之經

心錄同

又方

木防己^二 桑子^二 防風^三

右三味切以水五升煎取二升半分溫三服作散亦佳古今

錄驗同並出第二十一卷中

古今錄驗牡蠣湯瘕遺尿小便澀方

牡蠣^四 鹿茸^炙 阿膠^炙 桑螵蛸^二

右四味切以水五升煮取二升分再服

又方

桑耳^三 礬石^二 阿膠^二 龍骨^二

右四味為散空心飲服方寸匕日三

又方

桑耳^二 牡蠣^各 礬石^二

右三味搗篩為散酒服方寸匕日三服並出第二十六卷中

尿血方一十一首

千金瘕房損傷中尿血方

牡蠣^熬 車前子 桂心 黃芩

右四味等分搗篩為散飲服方寸匕日三服不知加至二

匕已生者心出第二十一卷中

崔氏療卒傷執行來尿血方

大黃^末 芒消^末

右二味冷水和頓服之立止三日內禁如藥法出第四卷中

古今錄驗療尿血鹿茸散方

鹿茸炙 當歸 乾地黄各二 葵子合 蒲黃合

右五味搗篩為散酒服方寸匕日三服忌蕪菜出第二十六

卷中

蘇燈療尿血方

車前草搗絞取汁五合空腹服之差

又方

水服亂髮灰方寸匕日三服肘後千金同

又方

服益母草汁一升差立止律草

又方

車前三升水五升煮取二升分三服

又方

棘刺二升水五升煮取二升分三服差

又方

膠三兩炙以水二升煮取一升四合分再服

又方

酒服蒲黃二方寸匕日二服水服亦得

又方

搗水筋汁服六七合日一服

胞轉方一十五首

病源胞轉者由是胞屈辟小便不通名為胞轉其病狀臍下急痛小便不通是也此病或由小便應下便強忍之或為寒熱所迫此二者俱全水氣上還氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內澀應出不得出外內相擁塞故令不通此病至四五日乃有致死者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或

小便急因疾走或忍尿入房亦皆令胞轉或胞落並致死出第
十四卷中

肘後療卒小便不通及胞轉方

取雞子中黃一枚服之不過三也備急同

又方

水上浮萍暴乾末服之小便不通利水脹流腫佳
千金翼同

又方

炙蟮蛸搗為末水服之方寸匕日三服良効

又療忍小便久致胞轉方

自取爪甲火燒服之備急同

又方

取梁上塵三指撮以水服之神効

又方

服蒲黃方寸匕日三服良

范汪療胞轉不得小便方

用蒲席捲人到三合頭至地三反則通肘後同

又方

雀矢半 車前子 滑石各四 通草

芍藥各二

右五味切以水七升煮取三升服五合日三先食便得之愈

又療胞轉欲死及失弱方

取三指舊清和竈突中黑如豆大內陰孔中三愈並出

第十五卷中

備急卒小便不通及胞轉方

車前草一斤水一斗煮取四升分四服小品同出第六

卷中

古今錄驗療胞轉小便不通亂髮散方

亂髮二斤洗去垢燒滑石半斤鯉魚齒一斤

右三味搗篩為散以飲服方寸匕日三服良

又療胞轉不得小便方

吸疥真琥珀兩葱白十四

右二味以水四升煮取三升去葱白末琥珀細篩下湯中溫

服一升日三服大利范汪同

又張苗說士程妻有客忍小便不時起胞轉大小便不得四五

日困篤欲死無脉服此差方

滑石二兩亂髮燒三兩

右二味搗下篩取生桃白皮一斤熟春以水合絞得汁二升

以汁服散方寸匕日三服即愈宜但淋者取亂髮三兩燒灰

滑石五兩合搗為散服方寸匕日三

又說不得小便者為胞轉成為寒熱氣所迫胞屈辟不得充張

津液不入其中為尿及在胞中尿不出方

當以葱葉除尖頭內入莖孔中吹之初漸漸以極大吹之令

氣入胞中得脹乘津液得入便愈也朱郁用此藥療郭虎

將十五歲男用

葵子升通草二甘草各二石韋一兩半

滑石四榆皮斤

右六味以水一斗煮取三升令服范汪同並出第二十六卷中

小便血及九竅出血方一十二首

小品療小便血菟絲丸方

菟絲子 蒲黃 乾地黄 白芷
荆實 葵子 敗醬 當歸

茯苓

芎藭 窮略二

右十味合搗為末以白蜜和凡如梧子大飲服二丸日三服不知加至五六丸劉洪記方已効常服忌酢物蕪美古今錄驗范汪同

又斷血諸方所云下血者其從腹裏出者悉為下血也有痔病血從孔邊出者別尋痔方出第四卷中

千金療小便出無方本云以下治虛勞尿白濁

灸脾俞百壯在第十椎

又方

灸三焦俞百壯在第十三椎

又方

灸腎俞百壯在第十四椎

又方

灸章門百壯在季肋端

又方

榆皮二斤水二斗煮取五升分十服佳

又方

搗乾羊骨下似篩水服方寸匕日三服

又治小便血方

生地黄八兩 柏葉把 黃芩三兩 阿膠二兩

右四味切以水七升煮取三升去滓內膠分三服並出第二

十卷中

文仲療小便出血方

生地黄汁升 生薑汁合

右二味相和頓服不差更作此法許令公處云極効肘後同

又方

又方

灸足第二指本第一文七壯立愈肘後同

龍骨末二方寸匕温酒一升服之日三服深師肘後
范汪陶氏同

又方

當歸四兩酒三升煮取一升頓服之肘後深師范汪
同並出第六卷中

小便不禁方二首

病源小便不禁者腎氣虛下焦受冷也腎主水其氣下通於
陰腎虛下焦冷不能温制其水液故小便不禁也出第十四
卷中

千金翼小便不禁多日便一二斗或如血色方

麥門冬心去乾地黄略茯苓八桑葉梨子 桂心

續斷略二甘草一兩 乾薑四兩

右七味切以水一斗煮取二升五合分三服忌海藻松菜生
葱等物

又又房散主小便多或不禁方

羌絲子酒漬蒲黃三兩黃連三兩 消石一兩

肉苁蓉二兩五味子三兩雞臍脛中黃皮三兩

右八味搗篩為散每服方寸匕日三服每服如人行三四
里又服並出第十五卷中

小便數及多方五首

病源小便數者膀胱與腎俱虛而有客熱乘之故也腎與膀
胱為表裏俱主水腎氣下通於陰此經既虛致受於客熱虛則
不能制水故令數小便熱則水行澀澀則小便不快故令數起
也診其脉附陽脉數者月中有熱即消穀引食大便必鞫小便

則數其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以西踵布膝除數尿出第十四卷中

范汪療小便數而多方
黃連分二 苦參分二 麥門冬去心一兩 土瓜根

龍膽各一分

右五味搗篩以蜜丸如梧子每服十九加至二十九良無苦

參有黃芩

又方

栝樓分 黃連分五

右二味搗篩為散每服方寸匕日三良

又方

瞿麥西 滑石西 葵子升 黃芩

甘草炙各一兩

右五味切以水六升煮取三升去滓一服六合

又方

桃人一味吹咀酒一升煮三沸去滓分為三服強人服盡之並出第十七卷中

集驗療小便數而多方

羊肺羹內少許羊肉合作之調和鹽如常食之法多

少任意不過三具効出第五卷中范汪同

許仁則小便數多方四首

許仁則論此病有兩種一者小便多而渴飲食漸加肌肉漸減之氣力少顏色此是消渴一者小便雖數而不至多又不渴飲食亦不異常或不至多能食但稍遇天寒冷即小便多更無別候皆是虛冷所致大都兩種俱緣腎氣膀胱冷渴不差使能殺人腎虛者必無所為害若候知是消渴小便數宜依後按契等

八味湯黃耆等十四味丸并竹根等十味飲小麥麩等十四味煎以次服之方

菝葜

土瓜根各五

黃耆

地骨皮

五味子各四

人參各三

石膏碎

牡蠣三兩真間不雜者熬

右藥切以水一斗煮取三升去滓分溫三服每服如人行十里久服一劑覺可重合服至五六劑佳隔五日服一劑劑數滿宜合後黃耆等十四味丸服之

又方

黃耆

黃連

土瓜根各五

苦參各三

玄參各六

栝樓

地骨皮

龍骨

菝葜

鹿茸各四

牡蠣熬

人參

桑螵蛸各三

五味子各一

右藥搗篩為末蜜和為丸用後竹根飲下之初服十五丸日二

服稍加至三十丸如梧桐子大忌猪肉冷水又竹根飲子方

筋竹根

生茅根

蘆根各五

菝葜各二

石膏碎

烏梅各十

生薑各一

小麥各三

竹瀝各二

白蜜各一

右藥以水五斗煮取一斗去滓內竹瀝及蜜著不津瓶貯之

用下前丸縱不下丸但覺口乾及渴即飲之不限多少冷煖

及前後如執月即逐日斟酌前法頓者心壞也如不能作此

飲且用烏牛乳下丸及解渴日服丸及飲夜中恐虛熱宜合

後小麥麩等十四味煎細細含嚥之

又小麥麩五升以水硬浸之別於水中揉挺令麩粉盡麩筋別

成一塊即止以此麩粉汁別器澄淨瀝却清汁即以稠粉盛

於練袋子中漉著令微生燥生莖根五挺徑三寸長二尺碎

搥於水中搥挺令膏根中粉汁盡別器澄傳盛貯一如小麥
麩法生括搗五斤搗如上法胡麻三升去皮熬令熟為散筋
竹根切一斤生茅根切一斤生盧根切一斤烏梅五十顆以上用
水五斗緩火煎取一升半去滓澄取清冬瓜汁二升生麥門冬
汁三升生薑汁一升牛乳一升白蜜二升先取竹根等汁和
冬瓜以下汁微火上煎減半次肉牛乳白蜜又煎六七沸投
小麥麩粉生薑粉括搗粉胡麻散於諸汁中煎和熟攪之勿
住手候如稠糖即成訖止火待冷貯別器中每夜含如此
初服一棗大稍稍加至一匙亦任性日日含之欲行九飲服
亦得出第十卷中味中凡十三

尿狀方六首

病源人有於眠腫不覺尿出者是其重腎陰氣偏盛陽氣偏
虛則膀胱腎氣俱冷不能溫制於水則小便多或不禁而遺尿

膀胱足太陽也為腎之府腎為足少陰為藏與膀胱合俱主水
凡人之陰陽日入而陽氣盡見陰受氣至夜半陰陽大會氣交
則卧睡小便者水液之餘也從膀胱入於胞為小便夜卧則陽
氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發水下不禁故於眠睡而不
覺尿出也出第十四卷中

千金療尿狀方

羊肚系盛水令滿息繫兩頭執煮開取水頃服之

三首

又方

雞脰脰一具并腸暴乾末酒服之男雌女雄也

又方

羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉晨朝空腹食之不過
四五頓差

又療尿淋方

又方

新炊熟瀆飯一盞馬尿淋處拌之收取與食之勿令知

垂兩手髀上盡指陷處灸七壯又灸臍橫文七壯並
出第二十一卷中

近効療尿淋方

取麻鞋乳帶及鼻根等唯不用底須七量以水七升
煮取二升分再服

灸穴雜法一十二首

千金翼灸五淋法

灸大敦三十壯

又石淋臍下三十六種疾不得小便法

灸關元三十壯一方云百壯

又血淋法

灸丹田穴隨年壯良

又法

灸復溜穴五十壯一云隨年壯

又尿黃法

灸石門穴五十壯

又遺尿法

灸遺道俠玉泉五寸隨年壯

又法

灸陽陵泉穴隨年壯

又失禁尿不自覺知法

灸陰陵泉穴隨年壯

又革中痛法

灸行間穴三十壯

又腹滿小便數法

灸屈骨端二十壯

又淋痛法

灸中封穴三十壯亦隨年壯

又小便不利及轉胞法

灸心下八寸七壯以上穴並出第二十七卷中

外臺秘要方卷第二十七

右從事郎高浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙孟校勘

