

衛生家寶產科備要

六

卷八二十三

六冊通一百九十八葉

衛生家寶產科備要卷第八

神經

形初保育

新刻
卷八

清芬堂
古本

惟

印

小兒初生將護法

巢氏病源小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風日則令肌膚脆軟便易損傷皆當以故絮著衣莫用新綿也天和暖無風之時令母將抱日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒不

卷八

致疾病若常藏在幃帳之內重衣溫暖譬如陰地之草木不見風日軟脆不任風寒又當薄衣薄衣之法當從秋習之不可以春夏卒減其衣不則令中風寒從秋習之以漸稍寒如此則必耐寒冬月但當著兩薄襦一複裳耳令不忍見其寒適當佳耳愛而暖之適所以害也又當消息無令汗出汗出則致虛損便受風寒晝夜寤寐皆當謹之其飲乳食

哺不能無痰癖當當節適乳哺若微不進切當將護之凡不能進乳哺則宜下之如此則終不致寒熱也又小兒始生氣尚盛無有虛勞微惡則須下之所損不足言及其愈病則致深益若不時下則成大疾疾成則難治矣其冬月下之難將護然有疾者不可不下夏月下之後腹中常當小脹滿故當節哺乳將護之數日間又哺哺之當令多少有常

卷八

二

下

劑兒稍大食哺亦當稍增若減少者此是腹中已有小不調也便當微將藥勿復哺之但當乳之甚者十許日輕者五六日自當如常若都不肯食哺而但飲乳者此是有癖爲疾重要當下之不可不下不下則致寒熱或吐而發癪或致下利此皆病重不早下之所爲也則難治先治其輕時兒不耗損而病速除矣小兒所以少病癪者其母懷娠時時勞

役運動骨血則氣強胎養盛故也若侍御多血氣微胎養弱則兒軟脆易傷故多病癪兒背頸著帽項衣取燥菊花爲枕枕之兒母乳兒三時摸兒項風池若壯熱者即須熨使微汗微汗不差便灸兩風池及背第三椎第五椎第七椎第九椎兩邊各二壯與風池凡爲十壯一歲兒七壯兒大者以意節度增壯數可至三十壯唯風池特令多十歲已上可

附辨

產八

三

下

百壯小兒常須謹護風池誤云疾養小兒謹護風池風池在頸項筋兩轆之邊有病乃治之疾微謹不欲妄針灸亦不用輒吐下聖惠乃云立夏後疾謹不欲妄針灸亦不欲輒吐下所必然者針灸傷經絡吐下動腑藏故也但當以除熱湯浴之除熱散粉之除熱赤膏摩之又以臍中膏塗之令兒在涼處勿禁水漿常以新水洗新生無疾謹不可逆針灸逆針灸則忍痛動其五脉

喜因成瘤河洛間土地多寒兒喜病癰其俗生兒三日喜逆灸以妨之又灸頰以防禁有噤者舌下脉急牙車解急其土地寒皆決舌下去血灸頰以治噤江東地溫無此疾古方既傳有逆針灸之法今人不詳南北之殊便按方用之多害於小兒是以田舍小兒任自然皆得無此夭又云春夏決定不得下小兒所以爾者小兒腑藏之氣軟弱易虛易實

下則下焦必虛益上焦生熱熱則增痰痰則成病自非當病不可下也

千金論生兒宜用其父故衣裹之生女宜以其母故衣皆勿用新帛爲善不可令衣過厚令兒傷皮膚害血脉發雜瘡而黃兒衣綿帛特忌厚熱謹之謹之

聖惠論凡小兒一朞之內造兒衣裳皆須用故綿及故帛爲之不得以綿衣蓋於頭面冬天可以裕衣蓋頭夏月宜用

單衣皆不得著面及乳母口鼻吹著兒
顛凡綿衣不得太厚及用新綿令兒壯
熱或即發癟特宜謹之也

聖惠論凡兒匍匐已後逢物即喫其母
雖至細意必亦不能盡覺春夏必飲滌
水冷物至秋初便皆疾作初則多啼不
食或好伏地面色青黃或時腹痛既不
解說唯反拗多啼或逢水漿便喫不可
制止或睡中驚啼或大便祕澀常人唯

知與紅雪釣藤飲子此二藥終日在口
然自不見其効况腹中滯結已多、吟熱

衝擊頗久二藥何能排去所以得秋氣
風吹着背心脚心便成瘡痢庸醫與冷
藥則傷滑不禁與澀藥則氣壅不行傷
損藏腑益令不食遂使虛熱衝上面黃
髮焦滯惡在內手足如火自然風水橫
溢四肢便腫如此將養十無一存但每
經春夏不問有病無病便須與四味飲

子多不三四劑即康強也

嬰孺論凡兒所以風者衣暖汗出風因而入也

張渙論嬰兒生後兩滿月即目瞳子成能笑識人乳母不得令生人抱之及不令見非常之物百辟任脉生能反復乳母當存節喜怒適其寒溫半辟尻骨已成乳母當教兒學坐二百日外掌骨成乳母當教兒地上匍匐三百日臍骨成

左八

六

下

乳母當教兒獨立周辟膝骨已成乳母當教兒行步上件並是定法蓋世人不能如法存節往往抱兒過時損傷筋骨切宜謹之爲吉

張渙論嬰兒冬月但當着夾衣及衲衣之類極寒即漸加以舊綿人家多愛子乃以綿衣過厚適所以爲害也

張渙論嬰兒須看稟受南北之殊用藥蓋地土寒溫不同此古人之最爲謹也

嬰童寶鑑論孩子春勿覆頂裏足致陽氣亡出故多發熱衣物夜露多生天癟三歲之中勿太飽勿太飢臥須覆肚食須飲水漿若能如此者則子少患而無夭傷矣

萬全方論田舍婦人產育皆不知小兒初生將護之法所養有絕無他疾者譬之凡草凡木生於深山大澤之中容易合抱至於奇材異果縱加培擁間有不

秀實者此豈貴賤之理有異哉蓋天之於物出於自然古人亦云小兒始生肌肉未成不可暖衣即令筋骨緩弱宜見風日若都不見風日即令肌膚脆軟便易傷損皆以絮著衣內勿用新綿天氣和暖無風之時令乳母抱兒日中嬉戲數見風日即血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒以田舍小兒較之此說尤長

擇乳母法

千金論乳母者其血氣爲乳汁也五情
善惡悉是血氣所生也其乳兒者皆宜
謹於喜怒夫乳母形色所宜其候甚多
不可求備但取不胡臭癰瘡氣嗽癟疥
癩瘻白禿瘻瘍藩脣耳聾聾鼻癲瘻無
此等疾者便可飲兒也但見其故灸癧
便知其先疾之源也

乳兒法

聖惠論凡爲乳母皆有節度如不禁忌

卷八

八

即令孩子百病並生如是自曉攝調可
致孩子無疾長壽是以春夏切不得衝
熱哺孩子必發熱疳并嘔逆秋冬勿以
冷乳哺孩子必令腹脹羸瘦乳母嗔怒
次不得哺孩子必患狂邪乳母醉後不
得哺孩子必患驚癇天癆急風等病乳
母有娠不得哺孩子必患胎黃及脊疳
乳母有疾不得哺孩子必患癲癇風病
乳母吐後不得哺孩子必令嘔逆羸瘦

乳母傷飽不得哺孩子必致多熱喘急

乳母雜忌法

聖惠論乳母忌食諸豆及醬熟麵韭蒜
蘿蔔等可與宿者煮羊肉鹿肉野雞鴨
鯽魚葱薤蔓菁蒿苣菠菜青麥莙荙
瓜等食若兒患疳即不得食羊肉及魚
又不得油膩手襯裏及抱兒又不得以
火炙襁褓熱時便與兒著令孩子染熱
病始終須謹大抵冬中切宜戒之若天

產八

十九

大寒以火炙衣被且拋向地上良久熟
接之冷暖得所即與孩子襯之無妨如
乳母有夫不能謹卓者切須防備儻新
有過犯氣息未定便即乳兒者必能殺
兒未滿月內所驅使人亦不得令有所
犯到於兒前惡氣觸兒兒若得疾必難
救療也

哺兒法

姚和衆云小孩初生七月助穀神以導

達腸胃研粟米煮粥飲厚薄如乳每日研與半粟殼

錢乙云小兒多因愛惜過當往三兩歲猶未與飲食致脾胃虛弱平生多病自半年以後宜煎陳米稀粥取粥面時時與之十月以後漸與稠粥爛飯以助中氣自然易養少病惟忌生冷油膩甜物之類

浴兒法

二十三

產人

十

千金論凡浴小兒湯極須令冷熱調和冷熱失所令兒驚亦致五臟疾也凡兒冬不可久浴浴久則傷寒夏不可久浴浴久則傷熱數浴皆冷則發癇若不浴又令兒毛落新生浴兒者以豬膽壹枚取汁投湯中以浴兒終身不患瘡疥勿以雜水浴之兒生三日宜用桃根湯浴桃根李根梅根各三兩枝亦得㕮咀之以水參斗煮二十沸去滓浴兒良去不

祥令兒終身無瘡疥治小兒驚辟惡氣
以金虎湯浴金壹斤虎頭骨壹枚以水
參頭煮爲湯浴但須浴即煮用之

拭兒口法

千金論曰小兒初生先以綿裹指拭兒
口中及舌上青泥惡血此謂之玉衡若
不急拭啼聲一發即入腹成百病矣千
金翼玄成痞病死

聖惠論凡兒初飲乳後以髮纏指沾清
水點拭了看齒根上有黃箭兩條便以
葷刀子割斷點豬乳便差如兒口難開
但先點豬乳自開

小兒集驗方云小兒初生每日以井華
水或微溫水將潔靜舊軟帕子裹乳每
手指蘸水撩拭小兒口中因而捺舌及
兩頰令稍寬舒即不生口噤積熱風疾
等病京畿與山東人多能之謂之捺兒
口拭畢仍用少研細入麝者乾坯子烟

脂塗口中令兒羹乳食

小兒集驗方云東平有一老嫗善與小

兒拭口使不生鍊銀云小兒上下脣與

齒斷相連處皆有一筋牽引若上脣

筋緊即生上燥下脣筋緊即生下燥

上燥生瘡滿頭或生眉間如有癬狀

瘡痒不已時復流出黃汁汁至處又生

瘡若下燥則起腰背漸至四肢亦如之癬

狀亦瘡痒黃汁不已若疾盛不治或

頭面上下相通累年不較又咬折或成

大瘍惟是每日早晨取溫水壹盞令

其乳母以故軟潔靜帕子包手第二

指蘸溫水拭兒口中渲染下又拭又捺

使兒口中淨及捺上下筋令寬舒即小

兒自美乳食諸疾不生亦永無鍊銀惟

使筋寬舒是法京畿見小兒失捺變爲

口噤不喫或不解捺而生鍊銀者不

可勝數

斷臍法

千金論曰凡斷臍不得以刀子割之須
令人隔單衣物咬斷兼以暖氣呵七遍
然後纏結所留臍帶令至兒足趺上短
則中寒令兒腹中不調常下痢若先斷
臍然後浴者則臍中水臍中水則發腹
痛其臍斷訖連臍帶中多有蟲宜急剔
撥去之不爾入兒腹成疾斷兒臍者當
令長陸寸長則傷肌短則傷藏若不以
時斷及接汁不盡則令暖氣漸微即自
生寒令兒臍風

二四九

產八

十三

文

嬰童寶鑑論小兒斷臍云凡小兒生下
可先浴而後斷臍及可以衣襯而口齧
之不然則刀斷如刀斷者則以前刀先
於懷中厭令暖方用又斷之則臍帶不
可令長只如子足長短短即中寒而傷
藏長即傷膚先斷而後洗即令水入臍
中孩子多天癟痛苦啼叫面青黑爲中

水患也。臍若短即腹中不調常下痢有
中寒之患。其臍不可傷動傷動即令久
不乾如不乾即傷外風。傷外風即口噤
小兒不可救也。

祕要指迷論曰。嬰兒初生剪去臍帶切
令剪刀暖不可傷冷及外風所侵。

灸臍法

聖惠云。小兒生一宿抱近明無風處看。
臍上有赤脉直上者。當時於脉盡頭灸。
產八

三壯赤散無患矣。

三

裹臍法

千金論凡裹臍法。椎治白練令柔軟方
四寸新綿厚半寸與帛等合之。調其緩
急急則令兒吐。唶兒生二十日乃解視
臍若十許日兒怒啼似衣中有刺者。此
或臍燥還刺其腹當解之。易衣更裹。裏
臍時閉戶下帳燃火令帳中溫暖換衣
示然仍以溫粉粉之。此謂冬時寒也。若

臍不愈燒絳帛末粉之若過一月臍有
汁不愈燒蝦蟇灰粉之日三四度

千金翼太

燒蝦蟇灰治末粉臍中又云若臍未愈乳兒大胞令兒風臍也

若臍中水及

中冷則令兒腹絞痛夭糾啼呼面目青
黑此是中水之過當灸粉絮以熨之不
時治護臍至腫者當隨輕重重者便灸
之乃可至八九十壯輕者臍不大腫但
出汁時時啼呼者擣當歸末和胡粉傳
之灸絮日熨之至一百日愈以啼呼止爲

三
產入
十一
候若兒糞青者冷也與臍中水同

甘草法

葛氏肘後方小兒新產出未可與朱蜜
取甘草如中指節炙碎以水貳合煮取
壹合以纏綿點兒口中可得一蜆殼止
兒當便吐胷中惡汁此後待兒飢渴更
與之若兩服並不吐盡壹合止若得吐
惡汁兒智惠無病

黃連法

小兒集驗方云凡小兒初生必有惡
汁留於胃次若不消去即會膈壅塞
易生蘊熱心驚癇瘲皆由此也故小兒
纔生一臘之內用好肥黃連數塊搗碎
每少許厚以綿包裹如妳頭狀湯內
浸成黃汁時復拈撫一二點在小兒
口內即惡汁自下乳食便美其後或
間以朱蜜與之若見惡汁已下即已
有只用空綿包別浸黃連蘸苦汁與
之者

豬乳法

千金論曰凡新生小兒一月內常飲豬
乳大佳

聖惠法凡取豬乳須令豬兒飲母次便
提豬兒後脚起離乳急持之即得空捋
無由得汁

張渙論嬰兒初生滿月內常時時旋取
豬乳滴口中最爲佳矣

藏衣法

外臺崔氏凡藏兒衣法兒衣先以清水洗之勿令沙土草污又以清酒洗之仍內錢壹文在衣中盛於新瓶內以青帛裹其瓶口上仍密蓋頭且置便宜處待滿三日然後依月吉地向陽高燥之處入地參尺埋之瓶上土厚壹尺柒寸雖須牢築令兒長壽有智惠若藏衣不謹爲豬狗所食者令

產八

十七

余

兒癲狂蟲蟻食者令兒病惡瘡犬鳥食者令兒兵死近社廟傍者令兒見鬼近深水洿池令兒溺死近故竈傍令兒驚惕近井傍者令兒病聾盲弃道路街巷者令兒絕嗣無子當門戶者令兒聲不出耳聾著水流下者令兒青盲弃於火裏者令兒生爛瘡著林木頭者令兒自絞死如此之忌皆須一謹之

外臺崔氏又安產婦及藏衣天德月空法

正月天德在丁月空在丙壬

二月天德在坤月空在甲庚

三月天德在壬月空在丙壬

四月天德在辛月空在甲庚

五月天德在乾月空在丙壬

六月天德在甲月空在甲庚

七月天德在癸月空在丙壬

八月天德在艮月空在甲庚

三九

九月天德在丙月空在丙壬

十月天德在乙月空在甲庚

十一月天德在巽月空在丙壬

十二月天德在庚月空在甲庚

產八

十八

四

凡藏兒衣皆依此法天德月空處埋之若有遇反支者宜以衣內新瓶盛密封塞口掛於宅外福德之上向陽高燥之處待過月然後依法埋藏之

大吉

外臺崔氏又法甲寅旬日十日不得藏埋兒衣以瓶盛密封安置空處度半日即藏埋之

外臺崔氏又法甲辰乙巳丙午丁未戊申此五日亦不藏兒衣還盛瓶中密塞勿令氣通掛著兒生處過此五日即埋之亦不得更過此日

外臺崔氏又法甲乙日生兒丙丁日藏衣吉丙丁日生兒戊己日藏衣吉戊

巳日生兒庚辛日藏衣吉庚辛日生兒壬癸日藏衣吉

子母祕錄藏衣法先用壹罐盛兒衣先以清水洗次以清酒洗次入大豆壹合次小豆壹合次城門土市門土獄門土葱園中土韭園中土各壹合重覆之上用五色帛各壹尺伍寸重重繫罐口上用鐵券朱書云大豆某胡去無辜小豆歷歷去子癖城門土

見公卿市門土足人行獄門土辟盜

兵葱韭園土剪復生與兒青令兒壽

命得長生與兒赤令兒身命皆清吉

與兒白令兒壽祿皆千百與兒皂令

兒長壽不衰老與兒黃令兒清淨去

百殃急急如律令將此令於壹尺貳

寸鐵葉上先用淨墨塗遍上以朱砂

寫此語令在上置在罐口上且放便

處待蒲三日然後於月吉向陽高燥

之處入地參尺埋之罐上令土厚壹

尺柒寸唯須牢築使兒長壽有智慧

剃頭法

外臺崔氏初剃兒頭良曰

寅丑日吉

丁未日凶

集驗

方京畿初剃小兒頭不擇日皆於

蒲月日剃之蓋風俗所尚前此產婦
未得出房滿月即與兒俱出以謂胎

髮穢惡多觸神竈小兒不安故此日

必剃頭而出剃頭於溫暖避風處剃之剃後須以生油杏仁膩粉頭上擦之以辟風邪其後小兒剃頭亦宜用此

禳謝法

外臺崔氏禳謝法

軒轅者乾神天丞相使者風伯犯之令兒驚吐可取梨枝陸寸埋生處大吉

三五

雷公者震神太陰使者天馬犯之令產八兒煩悶腹滿解之以三屠家肉爲餅於產處謝之大吉

三十一

咸池者坎神天之雨師使者犯之令兒啼不止用羊脯酒於生處謝之豐隆者艮神天之東明使者天僕也害氣犯之令兒乍寒乍熱大腹以白魚貳枚於生處謝之又大豆壹外投井中亦大吉

招搖者坤神天上使者犯之令兒驚

空嚼不止以酒餅生處謝之即愈
天候者巽神天一執法使者犯之令
兒腹脹張眼以白魚貳枚於生處
謝之吉

吳時者离神天一將軍遊擊使者犯
之令兒驚腹痛用馬脯伍寸於生
處謝之吉又以白魚伍枚并棗餅
埋其生處吉

大時吉兌神小時北斗使者犯之令

卷八

三十二

十一

甲

兒腹脹下痢解之以酒脯於生處
謝之又以大豆壹升投井中吉
犯月殺者令兒驚啼用丹雄雞血於
生處謝之吉

犯白虎者用稻米壹升雞子參枚於
生處謝之吉黍米亦得

犯大夫者用羊肝參枚及稻米壹升
於生處謝之吉又用雞彘羊脾黍
米亦得

犯日遊者令兒口噤色變欲死者用

三屠家肉麥飯於生處謝之吉

初生不作聲

千金論云兒生落地不作聲者取暖水
壹器灌之須臾當啼又云兒生不作聲
者此由難產少氣故也可取兒臍向身
却持之令氣入腹仍呵之至百度啼聲
自發亦可以葱白徐徐鞭之即啼兒始
生即當舉之遲晚則令中寒腹內雷鳴

乃先浴之然後斷臍

初生不喫妳

巢氏病源小兒難乳候凡小兒初生看
產人見兒出急以手料拭兒口無令惡
血得入兒口則兒腹內調和無有病疾
若料拭不及時則惡血穢露兒咽入腹
令心腹痞滿短氣兒不能飲乳謂之難
乳又兒在胎之時母取冷過度冷氣入
胞令兒着冷至兒生出則喜腹痛不肯

飲乳此則胎寒亦名難乳也

初生吐不止

錢乙論初生下拭掠兒口中穢惡不盡咽入喉中故吐凡初生急須拭掠口中令淨若啼聲一發則咽下多生諸病

初生有懸癰病

千金論曰小兒出腹六七日後其血氣收斂成肉則口舌喉頸裏清淨也若喉裏舌上有物如蘆籜盛水狀者名懸癰

三五

產八

二十一

文

有脹起者可以綿纏長針留刃處如粟米許大以刺決之令氣泄去青黃赤血汁也一刺之止消息一日未消者來日又刺之不過三刺自消盡餘小小未消三刺亦止自然得消也有着舌下如此者名重舌有着頰裏及上齶如此者名重齶有着齒斷上者名重斷皆刺去血也初生有重舌

巢氏病源小兒重舌候小兒重舌者心

脾熱故也心候於舌而主於血脾之絡
脉又出舌下心火脾土二藏母子也有
熱即血氣俱盛其狀附舌下近舌根生
形如舌而短故謂之重舌

葛氏肘後治卒重舌方

用燒蛇蛻皮爲末唾和塗舌上即
差又用金下土苦酒和塗舌上

初生着噤

巢氏病源小兒噤候小兒初生口裏忽
結聚生於舌上如黍粟大令兒不能取
乳名之曰噤此由在胎時熱入兒藏心
氣偏受熱故也

長樂朱端章以所藏諸家產科
經驗方編成八卷刻版南康郡

齊淳熙甲辰歲

十一月 初十日

印鑑

印鑑

印鑑

衛生家寶產科備要卷第八

印鑑

印鑑

印鑑

印鑑

此淳熙十一年長樂朱氏取諸家產

精方全

刻成書中寫轍懸字俱故

筆文丸皆作圓避欽宗嫌名也其所載產育寶慶集方陳直齋謂產
師聖有說無方醫學教授鄭稽中爲時良醫二方附諸論並爲完書今
攷師聖自序知鄭此李同的是書實成於師聖也當歸一味散注引王

子亨指迷論子亨名耽直齋書目載之今已失傳桃仁承氣湯謂麻
子常用之驗其常名安時今有傷寒採病傷乃世產育方葉東書
唐志載答殷產寶一卷今惟寶慶集方尚存宋樂大典中雖已佚幸借
地該矣猶賴此書傳之而采虞況備產濟用方諸論尤爲切要一得
好事重爲刊布俾得家置一編則活人之報當不小矣嘉慶辛酉夏
黃君堯圃自都門購歸出以相賞因識數語以爲奇書欣賀

明華

頃從陳仲魚處借得敏求記檢閣家有產科
備要八卷而載長樂云、與以故同特于十二月
初十日六字向淳熙甲辰歲立字在刻板南東郡
齋六字上殆少易原文入于記中爾當云楮墨
精好一夕受與余以收正同想之是宋板也爰重
誌數語以見述大雪中不令言祝以此蓋

嘉定錢大昕觀時年七十有四



圖書在版編目(CIP)數據

衛生家寶產科備要/[宋]朱端章撰.—北京:北京圖書出版社,2004.8
(中華再造善本)
ISBN 7-5013-2288-0

I.衛… II.朱… III.①中醫婦產科學—方書—中國—南宋②中醫兒科學—方書—中國—南宋 IV.R289.344.2

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第079284號

ISBN 7-5013-2288-0



9 787501 322886 >

書名 衛生家寶產科備要(全六冊)
著者 [宋]朱端章 撰

出版 北京圖書出版社(100034北京市西城區文津街七號)
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail:Btsfxb@public.f.nlc.gov.cn

Website:www.nlcpress.com

印刷 北京文津閣印務有限公司

開本 八
印張 五四·一五
版次 二〇〇四年八月第一版第一次印刷
印數 一一一〇〇

書號 ISBN 7-5013-2288-0/K·653
定價 一七四〇圓

