

重刊孫真人備急千金要方

二十七



備急千金要方卷之二十五

卒死第一方九十四首

灸法十首



卒死無脈無他形候陰陽俱竭故也治之方

牽牛臨鼻上一二百息牛越必瘥牛不肯舐者鹽汁塗面上牛即肯舐

又方牛馬屎絞取汁飲之無新者水和乾者亦得肘後方云此以人溺解之

又方灸鬚斗熨兩脇下解急方云又治尸厥

針灸法

針間使各百餘息又灸鼻下人中一名鬼客廳肘後方云治瘧死不自覺者方

慎燈火勿令人手動牽牛臨其上即覺若卒不能語

取東門上雞頭為末以酒服之

治卒驚死方

擣菘汁灌鼻孔中刺者灌兩耳張仲景云灌口中

治鬼魘不悟方

伏龍肝為末吹章中

又方皂莢為末如大豆許吹章中噴則氣通起死回生中無方云右

雜方

雄黃如棗大係左腋下令人終身不覺張仲景云男左女右

又方灸兩足大趾叢毛中各廿七壯肘後方云中惡

雜方

慈心黃刺鼻孔中血出愈肘後方云入七寸無效

方 大豆一七粒為末雞子黃并酒相和頓服
方 使人死其面上可愈肘後方云此扁鵲法

方 灸胃管五十壯愈
中惡并蠱毒方

冷水和伏龍肝如雞子大服之必吐

方 溫二升猪肪頓服之
方 車軋脂如雞子大酒服

方 卒忤方此病即今人所謂中惡者與卒死相擊亦相類為治皆自參取而用之

鹽八合以水三升煮取一升半分二服得吐即愈

方云治鬼擊 若小便不通筆頭七枚燒作灰末水和服之

即通

方 犢子桑半盞酒二升煮服之亦治霍亂肘後方云治鬼擊大牛亦

用同

方 書墨為末水服一錢匕

方 臘月野狐腸燒末以水服方寸匕死鼠灰亦佳

灸法 治卒忤死

灸手十指爪下各二壯餘治同上方備急方云治卒死又而張目反折者

灸人中二壯又灸肩井百壯又灸間使七壯又灸巨闕百壯

遺湯 治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死

脫口口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右

以酒有引之藥下復增取盡一升須臾立蘇方

麻黃參兩 桂心貳兩 甘草壹兩 杏仁柒拾粒

方 四味以咀以水八升煮取二升分三服肘後方云

中鬼擊及刀兵所傷血滿腹中不出煩滿欲絕方
雄黃粉酒服一刀圭日三服化為水

鬼擊病方

鬼擊之病得之無漸卒者人如刀刺狀骨節
腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻口

或吐血

雞屎白如棗

青花麻青也

方一味以酒七升煮取二升熱服須臾發汗若不汗熨
斗盛火灸兩脅下使熱汗出愈

又方艾如雞子大三枚以水五升煮取一升頓服

又方吹酢少許鼻中

灸法

灸人中一壯立愈不瘥更灸○又灸臍上一寸七壯及兩
踵白肉際取瘥又灸臍下一寸三壯

治五絕方

夫五絕者一日自縊二日墮墜三日墮墜
四日墮墜五日墮墜

取半夏一兩細下篩吹一大豆許內鼻中即活心下
溫者一日亦可治

治自縊死方

凡救自縊死者極須按定其心勿截繩手抱起徐徐
解之心下尚溫者以麝香覆口鼻兩人吹其兩耳

又方強臥以物塞兩耳竹筒內口中使兩人痛吹之寒口

傍無令氣得出半日死人即噫噫即勿吹也

又方膏皂夾細辛屑如胡豆大吹兩鼻中

又方刺雞冠血出滴者口中即活男雌女雄

又方雞屎白如棗大酒半盞和灌口及鼻中佳

又方皂莢為末以葱葉吹入兩鼻中逆出更吹

方梁上塵如大豆許各五二小竹筒中四人各捉一筒
同時吹兩耳兩鼻即活

又方 豕鼻口服耳中并捉一髮一撮如筆管大掣之立活

又方 雞血塗喉下又方 藍青汁灌之

又方 灸四肢大節陷大指本文名曰地袖各十壯

治熱腸方

取道上熱塵土以壅心上少冷即易氣通止

又方 令暈人仰卧以熱土壅臍上令人尿之臍中温即愈

又方 可飲熱湯亦可內少乾薑橘皮甘草煮飲之稍稍進

勿頓使飽但以熱土及熨灰土壅臍上佳

又方 濃煮麥取汁二升飲之即愈不嗟更灌

又方 張死人口令通以暖湯徐徐灌口中小舉死人頭

湯入腹須臾即蘇

又方 使人嘘其心令暖易人為之

又方 抱狗子若雞著心上熨之

又方 屋上南畔瓦熱熨心必易之

又方 灌地漿一盞即愈又方 地黃汁一盞服之

又方 水半升和麩一大抄服之

又方 落水死方

以甕中灰布地令厚五寸以甕側著灰上令死者伏

於甕上使頭小垂下抄鹽一方寸匕內竹管中吹下

孔中即當吐水水下因去甕下死者著灰中壅身使

出鼻口即活

掘地作坑數斛灰內坑中下死人覆灰濕撒即活

勿令大熱博人灰冷更易卒自即活

又方

取大甌傾之死人伏其上令死人口臨甌口然葉火

二七把燒甌中當死人心下令煙出小入死人鼻口

中鼻口中水出盡則活火盡復益之常以手候死人

身及甌勿令其熱當令火氣能使死人心下足得暖

卒無甌者於岸側削地如甌空下如甌燒令暖以死

人著上亦可用車轂為之勿令隱其腹令死人低頭

水得出并炒灰數斛令暖以粉身濕更易溫者

又方

但埋死人暖灰中頭足俱沒惟開七孔

又方

倒懸死人以好酒灌鼻中又灌下部又酢灌鼻亦得

又方

綿裹皂莢內下部中須更水出

又方

裹石灰內下部中水出盡則活

金方

五

倒懸解去衣去臍中垢極吹兩耳起乃止

又方

髮沙覆死人面上下有沙但出鼻口耳沙冷濕即易

又方

竈中灰二石埋死人從頭至足出七孔即活

又方

亞兩脚著生人兩肩上下死人背向生人背即負持走

行吐出水便活

又方

解死人衣灸臍中凡落水經一宿猶可活

治冬

月落水凍四肢直口噤尚有微氣者方

以大器中燂灰使暖盛以囊溥其心上冷即易心暖

氣通目得轉口乃開可溫漿粥稍稍吞之即活若不

先溫其心便持火炙身冷氣與火爭即死

燒方

燒後懸蹄以夜半時燒研細篩以猪脂和傅亦活

入水手足腫痛方

搗生胡硃薄之

酒醉中酒恐爛五臟方

以湯著槽中漬之冷復易夏亦用湯

方搗胡根汁飲一二升

方凡醉不得安卧不動必須使人搖轉不住特忌當風

席地及水洗飲水交接

治飲酒頭痛方

苧茹五兩以水八升煮取五升去滓入冷內破雞子

五枚攪勻更煮一沸飲一升使盡瘥

治飲酒腹滿不消方

煮鹽湯以竹管灌大孔中

金方五十一

六

治飲酒中毒方

煮大豆二沸飲汁二升

又方酒漬乾椹汁服之

治病酒方

葱白

鼓各壹升

右一味以水四升煮取二升頓服

治飲酒房勞虛受熱積日不食四月中熱飲酒不已酒入

心氣虛令人錯謬失常方

芍藥

人參

白薇

桔葉根

枳實

知母各兩甘草壹兩

生地黄

酸棗仁半升

茯神

參兩外薑作茯苓

半味以咀以水一斗煮取二升分三服

酒後月飲酒咽候爛舌上生瘡方

大麻人壹升 黃芩 貳兩用後用黃蘗

右一味為末蜜和丸含之 千金翼用黃蘗貳兩

治酒醉不醒方

飲葛根汁一斗二升取醒止連日服方不醒大醉

飲酒令人不醉方

柏子人 麻子人 各貳兩

右一味治下篩為一服進酒二倍

又方 葛花 小豆花 各等分

右一味合為末服三方寸匕飲時仍進葛根汁芹汁及

枇杷葉飲並能倍酒

又方 九月九日菊乾為末臨飲服方寸匕

黃方寸匕

又方 小豆花黃陰乾百日為末服之

又方 五月五日取井中倒生草枝陰乾為末酒服之

飲酒令無酒氣方

乾薑青根二七枚二編蒸為末取兩錢許酒後水服

治惡酒健噴方

空井中倒生草燒灰飲之勿令知

又方 取其人牀上塵和酒飲之

斷酒方

柳花 臘月鼠頭灰

右一味等分為末黃昏時酒服一杯

又方 酒七升著瓶中熟朱砂半兩著酒中急塞瓶口

猪圈中任猪搖動經七日取酒盡飲

又方 正月一日酒五升淋碓頭搗一下取飲之

又方 故甌中葉耳子七枚燒作灰黃昏時暖一杯酒啖之與病狂人飲也勿令知之後不喜飲酒也

又方 白猪乳汁一升飲之永不飲酒

又方 刮馬汗和酒與飲終身不飲

又方 虎屎中骨燒末和酒與飲

又方 鷓鴣屎燒灰水服方寸匕永斷

又方 取毛鷲一過吐毛水去毛頭服

又方 故紡車絃燒灰和酒與服

又方 驢駒衣燒灰酒飲方寸匕

又方 自死蟻蠟乾搗末和酒與飲永世聞酒名即嘔神驗

又方 酒各吐中肉七枚陰乾燒末服之

又方 酒漬汗靴替一宿平日空腹與飲即吐不喜見酒

又方 白狗乳汁酒服之 **又方** 臘月馬腦和酒服之

蛇蟲等毒第一論六首 方百二十二首

治因熱逐涼睡熟有蛇入口中挽不出方

以刀破蛇尾內生椒二兩枚裹著須臾即出後方

蛇尾即出苦無以刀割脫即出

治蛇入人口并七孔中者方

割母猪尾頭塗血著口中即出

又方 以患人手中指葉截二歲大猪尾以器盛血傍蛇瀉

血口中按出之

治卒為蛇繞不解方

以熱湯淋之無湯令人尿之

蠟螫方

服小蒜汁滓薄上 謝後方云治蝮蛇螫

其搗葵取汁服之

蛇螫方

人尿厚塗高裹即消

治蛇毒方

消蠟注瘡上不瘥更消注之

以母猪耳中垢傅之 用後方云牛耳中垢亦可

治蝮蛇毒方

令婦人騎度三過又令坐上

以射罔塗腫上血出即愈

生麻褚葉合搗以水絞去滓漬之

令婦人尿瘡上

蠟薄之乾復搗

治諸蛇毒方

雄黃

乾薑各等分

右二味為末和射罔著竹筒中帶行有急用之

雞屎二七枚燒作灰投酒中服之

以麩圍上令童男尿著中燒鐵令赤投中冷復燒者

二二度瘥

雄黃為末傅上日一易

鹽四兩水一斗煮十沸沸定以湯浸冷易之

搗紫葳取汁飲一升以滓封瘡上以少水灌之

梳中垢如指大長一寸尿和傅之

取合口椒胡荽苗等分搗傅之無不瘥

男子陰間毛一二七枚合豆之有汁即咽却

又方 用銅青傅瘡上

又方 搗大蒜和胡椒粉

又方 口嚼大豆葉塗之良

又方 猪脂和鹿角交塗之

又方 炙梳汗出熨之

入山草辟瘰蛇方

乾薑

麝香

雄黃各等分

右二味搗為粗散以小絳袋盛帶之男左女右蛇毒塗

瘡集驗方云如無麝香以射干和帶之

又方 而燒殺羊角使煙出蛇則去矣

治蛇螫人瘡已愈餘毒在肉中流淫痛癢方

大蒜

小蒜各等分

右二味各搗以熱湯淋以汁灌瘡大良

治蛇骨刺人毒痛方

鐵精如大豆許內管中吹內瘡中良

又方 燒死鼠為末傅之

治眾蛇螫方

灸上三七壯無艾以火頭稱瘡孔大小燻之

治虎咬瘡方

濃煮葛根汁洗十數遍及搗為散以葛根汁服方寸

匕日五其甚者夜二

又方 青布急卷為繩止一物燒一頭燃內竹筒中注瘡口

熏之妙

又方 煮鐵令濃洗瘡

又方 罌粟子塗之良

研虎法

凡入山燒水牛殺羊角虎狼蛇皆走

論曰凡見一切毒螫之物
之若輒殺之於後必遭螫

不得起惡心向之亦不得殺
治亦難瘥慎之慎之

治蠍毒方

凡蠍有雌雄雄者痛
雄者用井底泥塗之濕

在一處雌者痛牽諸處若是
則易雌者用當瓦屋溝下泥

又方

取齒中殘飯傳之又猪
和水塗上立愈

脂封之又射罔封之又

治蠍螫方

若著手足以冷水漬之
水浸故布搦之小暖則勿

小微暖則易之著餘處者以

又方

生烏頭為末唾和傳之

治蜂螫毒方

取瓦子摩其上唾一二七遍置瓦子故處

治蜂螫方

猪脂

蜜各伍合

蠟貳兩

右二味和煎如膏候冷以塗之

又方

焯蛙房為末膏和塗之

燒牛屎灰苦酒和塗之

又方

蒜垢塗之

薄酢沃地取泥塗之

又方

人尿塗之

以人尿新者洗之

凡蠟螫蟲人影著處便令人病瘡其狀身中忽痛
痛如芒刺亦如刺蟲所螫後批細瘡癩作癢如葉

手狀四邊赤中央有白膿如蠶亦令人皮肉急舉身惡寒壯熱劇者連起竟腰脇骨治之法初得之摩犀角塗上止其毒治如火丹法余以武德中六月得此疾經五六日覺心悶不佳以他法治不愈又有人教畫地作蠅螻形以刀子細細畫取蠅螻腹中土就中以唾和成泥塗之再塗即愈方知天下萬物相感莫曉其由矣

治蠅螻方

殺羊鬣燒灰臘月猪脂和封之

又方擣鼓封之

又方酢和胡粉塗之

治蠅螻方

燒鹿角為末以苦酒和傳瘡上已有汁者燒道傍弊蒲席傳之

金方

十二

又方槐白皮半斤切以苦酒升漬半日刮去瘡處以洗

日五六遍仍以赤小豆為末以苦酒和傳之燥復易

小兒以水和

又方嚼大麥以傳之日二

又方熟嚼梨葉以水和塗燥復易之

又方爛擣馬鞭草以傳上燥則易之

又方取吳茱萸東行根下土和塗之

治二種射工蟲毒方

論曰江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮其蟲形如甲蟲

外臺云正黑如大飛生有一長角在口前如弩擔臨其角端曲如上

以氣為矢因水勢以射人人或聞其在水中秘密作聲

更須得水沒其口便射人此蟲畏鷓鴣能食之其初以

先惡寒瘰癧寒熱筋急仍似傷寒亦如中戶便不成
兩日小蘇脯夕輒劇寒熱悶亂是其證始得二四日當
治之治之稍遲者七日皆死初未有瘡但惡寒瘰癧及成
瘡似蠟螻亦似瘰癧瘡射工中瘡有二種其一種瘡正
黑如蠟子皮周邊悉赤或衣犯之如有芒刺痛其一種作
瘡久久穿或晡間寒熱其一種如火灼燥起似此者最急
數日殺人 備急方云有四種其一種突起如蠟

治射工中人寒熱或發瘡偏在一處有異於常者方

又方取鬼臼葉一把漬苦酒中熟搗絞取汁服一升日三

又方取生吳茱萸葉一握斷去前後取握中熟搗以水

又方取蜈蚣大者一枚火炙治為末苦酒和以傅瘡上

金方卷之十一

十一

又方取赤苋菜熟搗絞取汁每服一升日四五服

又方白雞菜取白頭者二枚湯和塗中毒處

又方升麻 參兩 犀角 烏扇根 各貳兩

右二味以水四升煮取一升半去滓分再服相去

如一炊頃盡更作

治射工中人已有瘡者方

取芥子爛搗苦酒和厚塗瘡上平日痛便止

又方取狼牙葉冬取根搗令熟薄所中處又飲四五合汁

治射工中人三種瘡方

升麻 貳兩 烏扇根 參兩

右二味以水三升煮取一升適寒溫盡服滓薄上

又方治江南毒氣惡核射工中人暴腫生瘡方

甲香 犀角 龍甲 升麻 薰陸香

烏嬰 丁香 沈香 黃連 青木香

羚羊角 黃芩 甘草 牡蠣各肆分 吳茱萸各肆分

黃藥陸分

右十六味治下篩中射工毒及諸毒皆水服方寸七日
三并以水和少許洗之仍以雞子白和塗腫上乾則易

高膏治射工惡核卒中惡毒方

野葛青升 巴豆 烏頭 蜀椒各伍分 茵芋

躑躅 附子 丹砂各壹分 雄黃 大黃各兩

右十味治下篩以不中水猪膏二斤煎三上三下去滓
內丹砂雄黃末攪至凝以棗核大摩痛上勿近眼凡合
名膏皆母令產婦女人小兒雞犬六畜見之惟宜清淨

沙虱毒方

斑蝥二枚 一枚 一枚 熬為末服一大枚燒令煙絕為末著

瘡中

又方 大蒜十枚止一物合皮安熱灰中炮令熟去皮刀斷
蒜頭取熟柱所著毒處

又方 麝香 大蒜

右二味合擣以羊脂和著小筒中帶欲用取傳瘡上

又方 雄黃 朱砂 恒山各等分

右三味取五月五日日中時令童子合之取傳瘡上

治石蛭方 山水中陰濕草木上石蛭著人則穿人

凡行山路草木中常以臘月猪膏和爛塗脚脛及足
趾間跌上及著鞋鞋蛭不得著人也已著者以

道即愈

治水毒方

論曰凡山水有毒蟲人涉水中人似射工而無物其診法初得之惡寒微似頭痛目匡疼心中煩懊四肢振擗腰背百節皆強兩膝痛或翕翕而熱但欲睡日醒暮劇手足逆冷至肘膝二三日腹中生蟲食人下部肚中有瘡不痛不癢令人不覺不急治過六七日下部出膿潰蟲上食人五臟熱盛毒煩下利不禁八九日雖良醫不能治矣覺得之急早視其下部若有瘡正赤如截肉者陽毒最急若瘡如鰓魚者為陰毒猶小緩要皆殺人不過二十日也欲知是中水與非者當作五六升湯以小蒜五升投湯中消息勿令大熱去滓以浴之是水毒身體當發赤斑無異者非也當以他病治之

治人忽中水毒手足指冷或至肘膝者方

吳茱萸 壹升

生薑 切壹升半

犀角

升麻

橘皮 各貳兩

烏梅 拾肆枚

右六味咀咀以水七升煮取一升分二服

又方 浮萍草曝乾為末酒服方寸匕

又方 取梅若桃葉搗絞取汁三升許或乾以少水絞取汁飲之小兒不能飲以汁傅乳頭飲之

又方 搗蒼耳汁服一升又以綿裹杖沾汁導下部日二

又方 搗蓼一把以酒和絞取汁一升飲之不過二服

肘後作
利本草

又方 搗藍一把水解以塗浴面目身體令徧

又方 搗蛇莓根為末水飲之并導下部生者用汁凡夏時
行常多齋此藥膏入水以方寸匕投水上流無所畏
又辟射工凡洗浴以少許投水盆中即無毒
治猫鬼野道病歌哭不自由方

五月五日自死赤蛇燒作灰以井花水服方寸匕日
一〇針灸方身第十四卷中

又方 臘月死猫兒頭燒灰水服一錢七日一

治猫鬼眼見猫狸及耳雜有所聞方

相思子 草麻子 巴豆各青 朱砂末 蠟各肆錢

右五味合搗為丸先取麻子許大含之即以灰圍患人
前頭著一斗交火吐藥火中沸即盡火上作十字其猫
鬼並昏日死矣

治蜘蛛咬毒方

人豕傳又油淀傳又炮薑貼之又糊孫栗傳之

又方 烏麻油和胡粉如泥塗上乾則易之

治馬齧人及踰人作瘡毒腫熱痛方

馬鞭梢貫寸長 鼠屎貫柒枚

右二味合燒為末以猪膏和塗之立愈外基方云云治瘡
愈者肘後方云云用馬
鞭皮燒末猪膏和塗

治馬齧人陰卵脫出方

推內入以桑皮細作線縫之破烏雞取肝細剉以封
之且忍勿小便即愈

治犬馬齧及馬骨刺傷人及馬血入舊瘡中方

取灰汁熱漬瘡常以汁器有火數易汁勿令爛

三數日漬之有腫者多石灰燻之日一消止
治馬血入瘡中方

服人糞如雞子大復以糞傅瘡上

又方取婦人月水傅之神良

治剥死馬馬骨傷人毒攻欲死方

便取馬腸中屎以塗之大良外聖方云取其屎燒灰服方寸匕

治馬汗馬毛入人瘡中腫痛欲死方

以水漬瘡數易水便愈又以石灰傅之

又方飲醇酒取醉即愈

又方燒雞毛作末以酒服方寸匕

又方以沸湯令得所浸洗之取瘡

論曰凡春末夏初大多發狂必誠小弱持杖以預防之防

金方卷一

十七

而不免者莫出於灸百日之中一日不觸者方得免難若
初見瘡瘻痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦
夕凡狂犬咬人著訖即令人狂精神已別何以得知但看
灸時一度火下即覺心中醒然惺惺了了方知咬已即狂
是以深須知此此病至重世皆輕之不以為意坐是死者
常年有之吾初學醫未以為業有人遭此將以見問吾了
不知報答以是經吾手而死者不一自此銳意學之一解
已來治者皆愈方知世無良醫枉死者半此言非虛故將
來學者非止此法餘一方皆須沈思留心作意懇勤學之
乃得通曉莫以粗解一兩種法即謂知訖極自誤也聊因
方末申此一二言不盡意耳

又曰凡制犬咬人七日輒應一發二七日不發則脫也要

過百日乃得免耳每到七日輒當搗韭汁飲一二升又當終身禁食大肉蠶蛹食此則發死不可救矣瘡未愈之禁食生魚及諸肥膩冷食但於飯下蒸魚及於肥器中食便發不宜飲酒能過一年乃佳集驗方云若重發者生食之不必令其人知初得蠶毒便為之則於後不發也

治補犬毒方

頭髮

猬皮各等分

右二味燒灰水和飲一杯口噤者折齒內藥

又方 搗地榆絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煮汁飲之亦可為末服方寸匕日二兼傳上過百日止

又方 搗韭絞取汁飲一升日二瘡愈止亦治愈後復發者

又方 刮虎牙若骨服方寸匕小品方云刮狼牙或虎骨末服已發狂如獬犬者服即愈

金華子

十八

又方 燒虎骨傳瘡及裂又微熨杏人搗研取汁服之良又取燈盞殘油灌瘡口此皆禁酒猪肉魚生菜

又方 用韭根故梳二枚以水二升煮取一升頓服

又方 挑東南枝白皮一握水二升煮取一升分二服出

又方 取獬犬腦傳上後不復發

又方 蝦蟇交粥飲服之

又方 服葭若子七枚日一

又方 梅子末酒服之

又方 以豆醬清塗之日三四

治狂大嚙人方

蛇脯一枚炙土頭搗末服五分七日三

又方 搗葭若根和鹽傳日二 **又方** 青布浸汁服二升

又方 飲驢尿一二升

治凡犬嚙人方

燻杏人五合令黑碎研成膏傅之

又方取竈中熱灰以物磨中帛裹繫之

又方燒自死蛇一枚令焦為末內瘡孔中

又方鼠屎為末以臘月猪膏和傅之外其方云用鼠屎

又方飲生薑汁一升治狂犬云非汁亦佳已瘡後復發者

又方水洗瘡任血出勿止之水洗不住取血自止以綿裹

之瘡

又方以沸湯和灰塗瘡上

又方以頭垢少少內瘡中

又方以熱牛屎塗之佳

治小兒狗咬方

月一日以水一升灌之勿令狗主打狗若月盡日三

方九十九

十九

升水灌之

灸法

凡狗犬所咬未盡其惡血毒者灸上一百壯已後當日灸

一壯若不血出刺出其血百日灸乃止禁飲酒及猪犬肉

治猪醫方

松脂煉作餅上貼上

又方屋雷中泥塗

被打及諸傷損第二論一首 方九十三首

論曰凡被打損血悶捨心氣絕不能言可擘開口氣中令

下咽即醒又墮車落馬及車碾木打已死者以死人安著

以手袖掩其口鼻眼上一食頃活眼開與熱小便二升

治被打擊頭眼青腫方

大驚

又肥猪肉令熟熨上腫後方云云治血聚

又方 墙上朽骨唾於石上研末塗之乾即易

又方 炙猪肝貼之 **又方** 新殺羊肉乘熱封之

又方 大豆黃為末水和塗之

治被打傷破腹中有瘀血方

蒲黃壹升 當歸 桂心各貳兩

右三味治下篩以酒服方寸匕日三夜一

又方 劉寄奴 延胡索 骨碎補各壹兩

右三味以水二升煎取七合復內酒及小便各一

合熱溫頓服

又方 蠶蟲 水蛭各壹拾枚

桃人伍拾枚 桂心貳兩 大黃伍兩

右六味以酒水各五升煮取三升分五服

又方 生地黄汁三升酒一升半煮取一升七合分三服

治從高墮下瘀血脹 **又方** 莢若子為末傳瘡上

白馬蹄燒 治被打腹中瘀血并治婦人瘀血化血為水方

白馬蹄燒令煙盡擣篩酒服方寸匕日三夜一

治被毆擊損傷聚血腹滿煩悶方

豉一升以水三升煮三沸分再服不瘥重作更取麻

子煮如豉法不瘥更煮豉如上法

治有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲胸中氣塞短氣方

甘草壹兩 茯苓貳兩 杜拾枚

右三味以水二升煮取九合分二服

治從高墮下傷折疼痛煩躁喘不得臥方

取鼠屎燒末以猪膏和塗痛上即急裹之肘後心方
治從高墮下及為木石所逐或因落馬凡傷損血脈凝滯
氣絕欲死無不治之方

取淨土五升蒸令溜分半以故布數重裹之以熨病
上勿令大熱恐破肉冷則易之取痛止即已凡有損
傷皆以此法治之神效已死不能言者亦活三十年
者亦瘥

治墮車馬間馬鞍及諸物隱體肉斷方
以酢和麩塗之

當歸散治落馬墮車諸傷腕折臂脚痛不止方

當歸 桂心 蜀椒 附子 各貳分
澤蘭 壹分 芎藭 陸分 甘草 伍分

重方五五

十一

右七味並熬令香治下篩酒服方寸匕日二凡是傷損
皆服之十日愈小兒亦同救急方云治墮馬落車後打
此散呼吸之間不復大
痛十三日筋骨相連

黃耆散治腕折方

黃耆 芍藥 各叁兩 當歸 乾地黄
附子 續斷 桂心 乾薑

通草 各貳兩 大黃 壹兩 蜀椒 壹合 烏頭 半兩

右十二味治下篩先食酒服五分匕日二千金並翼
無大黃

治折骨斷筋方

乾地黄 當歸 羌活 苦參 各貳分

右四味治下篩酒服方寸匕日二

治腕折骨損痛不可忍者方

以大麻根及葉搗取汁飲一升無生麻葉乾麻汁服亦主墜墮搗打瘀血心腹滿短氣

治被傷筋絕方

取蠶頭中腦及足中髓熬之內磨中筋即續生

治腕折四肢骨碎及筋傷蹉跌方

主地黃不限多少熟搗用薄所損傷處肘後方云小兒可以累傷動以竹片夾裹令漏轉冷急勿令轉動一日可十易三四次若血聚在折處以刀子破去血

治四肢骨碎筋傷蹉跌方

以水二升漬豉三升取汁服之

鹿角散治同前

右酒服方寸匕日二

肘後方治從高墮下若為重物所動連得瘀血者

又方筋骨傷初破時以熱馬屎傳之無礙

右方十五下

廿二

又方大豆二升水五升煮取一升以淳酒六七升合和豆

汁服之一日盡如湯沃雪肘後方云浴墮連搗血無大豆用小豆佳

又方

羊腦壹兩

髮交

胡粉

胡桃脂兩半

右四味搗和調如膏傳上生布裹

治頭破腦出中風口噤方

大豆一斗熬去腥勿使太熟搗為末熟蒸氣備合甑

下盆中以酒一斗淋之溫服一升覆取汗傳杏仁膏

磨上

治被傷風入四體角弓反張口噤不能言或產婦墮

胎凡得此者大重不過五劑

方見第八卷中

治丈夫從高墮下傷五臟微者唾血甚者吐血及金瘡

中皆主之方

阿膠

艾葉

乾薑各一兩芍藥各二兩

右四味以水八升煮取三升去滓內膠令消分二服羸人分三服兼治女人產後崩傷下血過多虛喘腹中絞痛下血不止者服之悉愈

大膠艾湯治男子傷絕或從高墮下傷五臟微者唾血及金瘡傷經者方

阿膠

艾葉

甘草

當歸

芍藥

乾薑各一兩

芍藥

乾地黃各一兩

右八味以水八升煮取三升去滓內膠令烊分再服羸人分三服此湯治婦人產後崩傷下血過多虛喘欲死腹中激痛下血不止者神良

續命湯治為兵杖所加木石所逐血在背脊及脇中痛不得氣息方

青竹刮取茹

亂髮各如雞子大貳枚

右二味於炭火上炙令焦燥合搗下篩以酒一升煮三沸上一服盡之二服愈

治墮馬落草及樹間崩血腹滿短氣方

大豆五升以水一斗煮取一升去豆一服令盡劇者不過二作

治墮落車馬間心腹積血唾吐無數方

乾藕根為末以酒服方寸匕日三如無取新藕汁服

懸方

桃人拾肆枚

大棗貳拾枚

大黃

治墮馬落草及木車馬

消石

甘草 各壹兩

蒲黃 壹兩半

右六味咬咀以水三升煮取一升絞去滓適寒溫盡服之當下下不止清麻汁一杯飲之即止

又方

治腹中疼血痛在腹中不出滿痛短氣大小便不通

桃人

當歸

桂心

芒消

大黃

芍藥

當歸

桂心

甘草

蒲黃

芒消

右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

又方

治墮落瘀血方

桃人

水蛭

當歸

甘草

桂心

當歸

芒消

大黃

右八味咬咀以水八升煮取三升絞去滓適寒溫服一

升日二服

金方共五

共四

又方

桃人

蜜蟲

蜜蟲

水蛭

大黃

桂心

右六味咬咀以酒水各五升合煎得三升適寒溫飲一

升日二服

又方

治脫折瘀血方

桃人

亂髮

大黃

右三味以布方廣四寸以繞亂髮燒之咬咀大黃桃人

以酒三升煮取一升盡服血盡出時後云仲景方用大

大在亂髮如雞子大交用切甘草壹枚如指大以童

拾政技敗蒲葦壹握長參寸切甘草壹枚如指大以童

子小便量多前湯成內酒壹大瓠次下入黃分溫為

三眼別到敗蒲葦半領煎湯以浴衣被重覆服藥須通

利數行痛楚即愈血也 大黃 陸拾枚 桂心 壹兩

右二味以酒六升煮取三升分二服當下血

又方 治從高墮下有瘀血方

蒲黃 附子 壹兩

右二味為末酒服方寸匕日三不知增之以意消息

又方 治脫折瘀血方

蒲黃 當歸 貳兩

右二味治下篩先食酒服方寸匕日三

又方 重蟲 貳拾枚 牡丹 壹兩

右二味治下篩酒服方寸匕血化為水備急方云治以宿血在諸骨節

及外不去者貳味等分

又方 取葶藶草汁飲之子亦可服

又方 凡被打及產後惡血及一切血皆煮續骨木汁二升

金方五十九 廿五

飲之

治從高墮下崩中方

當歸 大黃 各貳分

右二味治下篩酒服方寸匕日三

治枝瘡方

石灰 新猪血 壹升

右二味和為丸孰燒之破更丸燒二遍止為末博上

又方 釜月下土為細末以油和塗訖臥羊皮上

又方 服小便利

治竹木刺在皮中不出方

羊屎燥者燒作灰和猪脂塗刺上若不出重塗乃言不覺刺出時一云用乾羊屎末

又方 蓋微灰水服方寸匕日二服十日刺出

又方 酸棗核燒末服之 **又方** 鑿柄燒灰酒服二寸匕

又方 頭垢塗之即出

治刺在肉中不出方

莫山瞿麥汁飲之日三瘥止

又方 用牛膝根莖生者併搗以薄之即出瘡已合猶出也

又方 白茅根燒末以膏和塗之亦治瘡因風致腫者

又方 鹿角燒末以水和塗之立出父者不過一夕

又方 嚼白梅以塗之 用後方用烏梅

又方 溫小便漬之

治父刺不出方

服王不留行即出兼取根為末貼之

治惡刺方

苦瓠開口內小兒尿煮兩三沸浸病上

又方 葇若根火煮浸之冷復易神方也

又方 李葉棗葉搗絞取汁點上即效

又方 濃煮大豆汁漬取瘥

治惡刺并狐兔刺方

以烏父驢尿漬之

又方 溫白馬尿漬之

治因瘡腫痛劇者數日死或中風寒或中水或中狐兔刺

主之方

燒黍穰若牛馬屎若生桑條取得多煙之物燒桑汁

出愈

方 熟蠟內瘡中新瘡亦善

方 以皂莢公英草摘取根莖白汁塗之惟多塗為佳瘡止

余以自觀九年七月十五日夜左手中指背觸着馬
掛至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高夫色
如熟小豆色首聞長者之論有此治方試復為之手
下即愈痛亦即除瘡亦即磨不過十日尋得平復此
大神效故疏之蜀人各耳
菜關中名苟乳如苟切

瘡中水腫方

白灰 胡粉 炭各等分

右二味脂和塗瘡孔上水出則痛止

治手足卒中刺中水毒方

擣韭及藍青置上以火炙執徹即愈

治瘡因風致腫方

櫟木根皮一斤濃煮內鹽一把漬之

金方子 廿七

治破傷風腫方

厚塗杏仁膏燃麻燭遙炙之

治因瘡腫痛者皆中水及中風寒所作腫入腹則殺人方

溫桑灰汁漬冷復溫之當令執神秘

治刺傷中風水方

服黑牛執家一服二升二服即止

方 蠟一兩執灸剝薄裹上令水出愈

方 魚目燒灰傳之 **方** 孰煮韭搗之

方 刮箭羽下漆塗之

治瘡犯露腫方 凡八月九月中刺手足
犯惡露腫殺人不可

生桑枝二枚內燻灰中推引令極熱斫斷正以枝類

挂瘡口上熱盡即易之盡二枚則瘡自爛仍取

搗綿裹著熱灰中使極熱去綿取薤白薄瘡上以布帛急裹之若有腫者便作用薤白最佳

治擦瘡方

生柳葉二斤細切以水一斗五升煮取七升滴寒溫洗之日二肘後方云老柳皮尤妙

又方以礬石下滓泥塗之取瘡止大驗

又方濃煮鼠查葉以洗擦上亦可擣葉取汁塗之

又方爛擣七姑草封之救急方云七姑草和芒消塗之

又方貫衆為末以塗上乾以油和之即愈

又方蓮葉燥者一斤以水一斗煮取五升洗瘡上日再

又方羊乳汁塗之又方芒消五兩湯浸以洗之

又方取猪膏塗之又方礬石著湯中令消洗之

又方直噉猪肉嚼擦瘡塗之

火瘡等病第四論一首 呪法一首 方七十一首

論曰凡火燒損慎勿以冷水洗之火瘡得冷熱氣更深轉入骨壞人筋骨難痊初被火燒急向火更炙雖大痛強忍之一食久即不痛神驗治火燒悶絕不識人以新尿冷飲之及冷水和蜜飲之口噤絞開與之然後以下方治之

治火瘡方

拖子續拾遺

白欬

黃今各伍兩

右三味咬咀以水五升油一升合煎令水氣歇去滓待冷以淋之令溜去火熱毒則肌得實也作一日任意用膏傳湯散治之

又方熬油麻為末和拖子人塗之惟厚為佳已成瘡者

白煨灰粉之即燥立瘥

治火燒瘡方

死鼠頭一枚以臘月猪膏煎令消盡以傅乾即傅之瘥不作癩神效亦治小兒火瘡

治火瘡敗壞方

拍白皮切以心風月猪膏合淹相得煮四五沸色變去滓傳瘡上用後方云用白皮

又方拍白皮

蛇衝 生地黃 苦竹葉 各等分 拖子人

右六味咬咀以羊髓半升煎三上三下去滓塗上瘥止

治火爛瘡膏方

甘草各貳兩 拍白皮 雞子 竹葉

右三味咬咀以猪脂一斤半煎三上三下去滓冷以傅之後方用山土地黃雞子

治拍白皮瘡無塗之

火所傷方

以女人精汁塗之瘥

女人皮爛瘡方

附子 貳兩 甘草 壹兩 羊脂 伍兩 松脂 雞子

五味咬咀以不中水猪膏五兩煎塗之

治火所損晝夜啼呼止痛滅癩方

松脂 各貳分 猪膏 蠟 各壹分

脂破鈿中切脂嚼爛著松明上少傾就火以盃承汁傳之按明是肥松木煎出

凡灸瘡不瘳
取車軋脂塗

味合煎心

凡灸瘡不瘳

石灰一兩

數沸以暖濕

藥貼瘡上名

治灸瘡腫急

搗龜下黃

治灸瘡中風冷腫痛方

但向火灸之

治灸瘡生

薤白

右四味以明合煎

治灸瘡膿壞

薤白

右四味先煎薤白

入胡粉內膏中令調塗故布貼上日二

白蜜

右一味相和塗之

治灸瘡血出不止

黃歸各壹兩 胡麻外基用羊脂各陸分

搗膏五合煎去滓傅之

松脂

紙貼之日二

日別灸上六七壯自瘳

為細末綿篩猪脂和令相得微火上煎

先洗瘡訖以布裹灰覆瘡上三過便以

之又搗薤傅之

以水和煮令熱漬之

瘡得熱則瘡快至痛止日六七灸愈

內止痛方

白芷 壹兩 羊髓 壹斤

右四味以白芷色黃藥成土淨取傅之日二

胡粉

石灰 各壹兩 臘月猪脂

右四味先煎薤白令黃去之綿裹石灰煎數沸去之

入胡粉內膏中令調塗故布貼上日二

烏賊骨 貳枚 一方作壹兩

右一味相和塗之

治灸瘡血出不止

燒人屎灰以傅之

死蛇蝦蟆為末以猪脂和塗之

論曰治金瘡者無大小冬夏及始初傷血出便以石灰厚傅裹之既止痛又速愈無石灰亦可用若瘡甚深未宜速合者內少消石令瘡不時合也凡金瘡出血其人必渴當忍之噉燥食并肥膩之物以止渴慎勿鹹食若多飲粥及漿犯即血動溢出殺人又忌嗔怒六言突思想陰陽行動作勞多食酸鹹飲酒執羹臙葷瘡瘻後猶爾山百日半年乃可復常也

治金瘡大散方

五月五日午日使四人出四方各於一里內採一大草木葉菜每種各半把勿令滿脫一事日正午寺

金方

卅

切碓擣并石灰極令爛熟一石草斷一斗石灰生一
大實中桑樹令可受藥取藥內孔中實藥令堅似
桑樹皮蔽之以麻擣石灰極密泥之令不洩氣又以
桑皮纏之使牢至九月九日午時取出陰乾百日藥
成擣之日曝令乾更擣絹篩貯却凡一切金瘡傷折
出血登時以藥封裹治使牢勿令動轉不過十日即
瘡不腫不膿不畏風若傷後數日始得藥須暖水洗
令血出然後傅之此藥大驗平時無事宜多合以備
倉卒金瘡之要無出於此雖突厥質汗黃末未能及
之附後方云用百草心五月五日作七月七日出

燒乾梅為炭擣末傅之一宿即瘡亦治打傷

石擣末傅之止痛斷血

又方取桑白汁塗桑白皮最之或石灰封之妙

又方麻葉三斤以水三升熟煮取一升半為一服

又方飲麻子汁數升小品方云治毒瘡所傷

又方蚯蚓屎以水服方寸匕日三

又方杏仁石灰為細末以猪脂和封之亦主犬馬金瘡止痛大良

治金瘡血出不止方

煮桑根十沸服一升即止

又方擣車前汁傅之血即絕連根取用亦效

又方柳絮封之

又方以人精塗之

內補散治金瘡出血多虛竭方

茯苓 甘草 芍藥各兩 蜀椒各兩 乾薑各兩

金方半五

當歸 芎藭 桂心 黃芩 吳茱萸

人參 厚朴 白芨古今錄驗作桑白皮 黃耆各兩

右十四味治下篩以酒服方寸匕日三

又方當歸各兩 乾薑各兩 芍藥 辛夷各兩 葶藶

右五味治下篩酒服方寸匕日三夜一

治金瘡內漏血不出方

牡州皮為散水服二指撮立止出血

治金瘡內漏方

還自取瘡中血著杯中水和服之愈

又方蒲黃貳兩 七月七日麻勃各兩

右一味酒服一錢匕日三夜一

一物湯治金瘡腹中瘀血方

大麻子 叁升 大葱白 貳茶椀

右使數人各持令熟著九升水煮取一升半頓服若不出不盡腹中有膿血更合服當吐膿血

內寒 治金瘡方

黃耆 當歸 芎藭 白芷

乾薑 黃芩 芍藥 續斷 各貳兩

附子 半兩 細辛 壹兩 鹿茸 叁兩

右十一味治下篩先食酒服五分匕日二稍增至方寸

治金瘡煩滿方

赤小豆一升以苦酒漬之熬令燥復漬滿三日令色黑服方寸匕日三

治金瘡苦痛方

楊木白皮熬令燥為末服方寸匕日二又以傅瘡愈

治金瘡若刺瘡痛不可忍百治不瘥者方

葱一把以水二升煮數沸取清洗止痛良

治金瘡煩痛大便不利方

大黃 黃芩

右二味為末蜜和丸如梧桐子大先食服十九日三

治金瘡不止令唾止痛呪法

呪曰某甲今日不良為某所傷上告天皇下告地土清血莫出濁血莫揚良藥百裹不如熟唾日二十七痛

唾之即止

我按先師本法男師在左女師在右上白東王六公

上西王母北斗七星黃姑織女請制水之法清淨日

不痕不膿不疼不痛羅肺得肺羅肝得肝
肉不任軀婢僕夫自來小兒為日不吉不良某甲
刃斧槊箭熊虎湯火所傷三唾三呵平復如故急
如律令此法不復須度受但存念稽急散誦之非
治百毒所傷亦治癰疽隨所患轉後語呼之良驗
切瘡毒並皆用之

續斷 治金瘡中筋骨方

續斷伍兩 細辛 蛇銜 地榆 乾地黄

當歸 芎藭 芍藥 從蓉各叁兩 人參

甘草 附子各貳兩 乾薑 蜀椒 桂心各壹兩半

右十五味治下篩酒服一方寸匕日三

金瘡腸出方

金方子五

礞石 滑石 鐵精各叁兩

石三味為末粉腸上後用礞石末飲服方寸匕日五夜

二腸即入

方 取人屎乾為末以粉腸即入

治便傷腸出不斷者方附後方云治腸出欲

作入麥粥取汁洗腸推內之常研米粥飲之二十日

稍稍作強藥百日後乃可瘥

膏 治金瘡火瘡灸瘡不能瘥者方

生地黄切壹斤 薑切壹斤 絞取汁叁合 薰陸香 松脂 杏仁

蠟各壹兩 羊腎脂各壹兩 烏麻油壹兩 石鹽壹兩 研如粉

右八味先下蠟微火令消次內羊脂令消次下油次下

松脂令消冷下杏仁次下薰陸次下地黄汁次下石鹽

以微火煎令地黃汁水氣盡以綿濾停凝一切諸瘡初
傷皆用傳之日二夜一頓生冷猪雞魚肉此膏治瘡法
先食惡肉不著加先從內瘡乃至平復無加不畏風不
膿大大要妙

治金瘡血出不止方

蒲黃壹斤

當歸貳兩

右二味治下篩酒服方寸匕日二

又方取葱葉炙取汁塗瘡上即止若為婦人所驚者取婦
人中衣火炙令熱以熨瘡上

又方取豉二升執湯漬食頃絞去滓內蒲黃二合頓服及
作紫湯服之 紫湯方在產婦篇中

治金瘡箭在肉中不出方

金方廿五

廿五

白斂

半夏

各等分

右二味治下篩酒服方寸匕日二淺瘡十日出深瘡二
十日出終不住肉中

治卒中箭不出或肉中有聚血方

取女人月經布燒灰屑酒服之

治箭鏃及諸刀刃在咽喉胃膈諸隱處不出者方

牡丹皮

壹分

白鹽

貳分用後作白斂

右二味治下篩以酒服方寸匕日二服出

又方取栝婁汁塗箭瘡上即出

又方酒服瞿麥方寸匕日二瘡

治毒箭所中方

搗藍汁一升飲之并以薄瘡 取青

取青

汁服之并淋瘡中鐵不出擣死鼠肝塗之鼠腦亦

又方煎地黄汁作丸服之百日箭出

又方多飲葛根汁并治一切金瘡

又方雄黃為末傅之當沸汁出愈

又方擣葛根汁飲之又葛白屑熬黃傅瘡止血

又方內臆臍中灸之 又方貝齒末服一錢匕大瘡

又方煮蘆根汁飲二升

治中射罔箭方

藍子魚合 升麻翻兩 王不留行 甘草各肆兩

右四味治下篩冷水服一方寸匕日三夜二又以水和

涂瘡乾易之

治針折入肉中方

廿五

刮象牙為末水和聚著折針上即出

又方以鼠腦塗之

又方礞石吸鐵者著上即出

