

濟生拔粹方

八



檳榔散

四

堂

黃黃丸

瓜蒂散

備急丸

金露丸

枳朮丸

內傷三陰可補例

當歸四逆湯

常歸四逆加吳茱萸生薑湯

吳茱萸湯

通脈四逆湯

理中丸

理中湯

附子散

陰毒甘草湯

火熯散

正陽散

天雄散

肉桂散

正元散

白朮散

五勝散

退陰散

溫中湯

韓祗和溫中例

七物理中丸

橘皮湯

白朮湯

厚朴丸

一麥湯

橘皮湯

厚朴湯

灰包熨法

白朮湯

神朮湯

調中丸

黃耆湯

陰陽二易治法

理中丸

活人狼鼠糞湯

燒棍散

青竹茹湯

竹皮湯

當歸白朮湯

妙香丸

代灸塗臍膏

羊肉湯

廻生神膏

少陰效逆

陰毒吃逆方

陰證發癰例

陰證發黃例

陰證下血例

急提益散

勻氣散

蜜導霹靂煎

海藏老人陰證略例藥目錄

濟生拔粹卷第十一

厥陰證略例

素古內傷二陰例

人之生也由五穀之精氣所化五味之備故能生形若傷於味亦能損形飲食過節腸胃不勝氣不及化故傷焉如氣口一盛脈得六至則傷于厥陰乃傷之輕者檳榔丸主之氣口二盛脈得七至則傷于少陰乃傷之重者黃丸主之氣口三盛脈得八九至則傷于太陰乃傷之尤重者故填寒悶亂心胃大痛兀兀欲吐得吐則已上部有脈下部無脈宜吐之以瓜蒂散其高者因而越之下者引而竭之如傷之太甚仲景二物備急丸下

**檳榔丸** 治飲食過多心腹膨悶

檳榔半兩 木香半兩 枳實半兩 牽牛半兩 陳皮半兩  
右為細末醋糊為丸桐子大每服二十丸生薑湯下

**黃丸** 治前證甚則兩脇虛脹

雄黃壹兩 巴豆半兩 去皮心膜研  
右二味入白麵二兩同和研勻滴水丸桐子大滾漿水煮十二丸熟漉入冷漿內令沉每一時用浸藥冷漿下一丸日盡十二丸也如利不必盡劑否則再服又治脇下痞癢痛如神

**瓜蒂散** 治大實大滿氣上衝上部有脈下部無脈填塞悶亂宜吐之

瓜蒂半兩 赤小豆半兩  
右為細末溫水少許調一錢匕以吐為度如傷之太重備急丸下之此急劑也

備急丸

乾薑半兩 大黃半兩 巴豆半兩 去皮心膜研如泥

右為細末煉蜜為丸桐子大溫水下二三以利為度漸加

**金靈丸** 治時疾內傷心下痞氣不降米穀不大黃 貳兩 枳實 半兩 桔梗 貳兩 牽牛 貳錢

右為細末薑糊為丸餅餅亦得如桐子大溫水下二三十九

**枳木丸** 治老弱虛弱食不消藏府受枳實 赤錢半 白朮 壹兩

右為細末荷葉裹燒飯為丸或薑浸餅餅丸亦得如桐子大  
每服二二十九米飲送下食後服

海藏內傷三陰例

潔古既有二陰可下之法亦必有二陰可補之法也予故舉此  
內傷三陰可溫之劑若飲冷內傷雖先損胃未知色脈各在何  
經若面青黑脈浮沉不一弦而弱者係在厥陰若面紅赤脈浮

沉不一細而微者傷在少陰若面黃紫脈浮沉不一緩而遲者  
傷在大陰也

傷在厥陰肝之經當歸四逆湯主之

當歸 桂 芍藥 細辛各壹兩 通草各壹兩

右剉如麻豆大每服秤二錢水一盞半棗二枚煎至七分去  
滓溫服如其人病有久寒者宜當歸四逆內加吳茱萸生薑  
湯主之

**當歸四逆加吳茱萸生薑湯**

當歸 壹兩 桂 芍藥 細辛各壹兩 大棗 捌个  
甘草 通草各壹兩 吳茱萸湯洗用

右剉如麻豆大每服秤三錢水一盞半煮至八分去滓溫服  
日三仲景法一劑分五服清酒煮

**吳茱萸湯**

吳茱萸乙兩半湯洗三次 人參除分 生姜壹兩 大棗三枚

右剉以水二大盞半煮至七分去滓分二服若急者陰毒甘  
草湯白朮散附子散止陽散肉桂散迴陽丹返陰丹至於陰  
盛隔陽霹靂散火熾散隨經部分選用之

**傷在少陰腎之經也** **通脈四逆湯** 主之

炙甘草貳兩 附子乙兩兩乾姜 貳兩炮

右剉每服秤三錢水乙盞半煮至七分去滓溫服未差若急  
更作一劑其脉續續有力者愈

如面赤者加連鬚葱白九寸同煎

如腹中痛者去葱白加芍藥二兩

如咽痛者去芍藥加桔梗一兩

如脉不出去去桔梗加人參二兩

**四逆湯** 上三味是也

**傷在太陰脾之經也** **理中丸** 主之

人參乙兩腹痛倍之 甘草炙 白朮 乾姜各乙兩

右為細末煉蜜為丸如鷄子黃大以湯數合和丸研碎溫服  
日二夜二腹中和熱益至三四丸煎熱粥飲投之微溫覆勿  
揭衣丸不及湯大便結者宜丸大便軟者宜湯

**理中湯**

人參貳兩 乾姜炮 甘草炙 白朮各三兩

右剉每服秤三錢水一盞半煮至七分去滓溫服日二

如腹痛者加人參一兩 如寒者加乾姜一兩半

如渴欲飲水者加白朮一兩半

如臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩

如吐者去朮加生姜三兩 如下多者還用朮

如悸者加茯苓二兩

如四肢拘急腹痛者或腹滿下利轉筋者去朮加附子一枚

生用仲景人參桂枝湯理中湯加桂治太陽未除下之成脇

熱痢心下痞

如寒證不能食者理中建中各半湯為一中湯以治之

表裏不解者理中湯加青皮陳皮名治中湯治胃膈病

柴葛湯證

食谷欲嘔屬陽明吳茱萸湯主之

少陰吐利手足厥逆煩燥欲死者吳茱萸湯主之

厥陰乾嘔吐涎沫頭痛極甚吳茱萸湯主之

四逆湯證

自利不渴者屬太陰以其藏寒故也宜四逆輩主之

太陰手足自溫脈浮者桂枝湯脈浮而遲表熱裏寒下利清

谷者宜四逆湯主之

屬少陰飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手

足寒脈弦遲者此留中實不可下也當吐之若膈上有寒飲

乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯主之

心陰病脈沉者急溫之宜四逆湯主之

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆

湯主之

下利腹脹滿身疼痛者先溫裏乃攻表溫裏宜四逆湯



屬厥陰嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者雖治宜瀉湯  
吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷四逆湯主之  
吐利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者  
四逆湯

病發熱頭痛身體不疼痛當救裏宜四逆湯主之

**通脈四逆湯證**

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反惡寒  
其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出通脈四  
逆湯

屬厥陰下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之

**當歸四逆湯證**

手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之

**白通湯并加豬膽汁湯證**

少陰病下利脈微者白通湯主之  
少陰病下利脈微與白通湯利不止厥逆无脈乾嘔煩者白  
通加豬膽汁湯主之服湯脈出者死續續者生

**真武湯證**

太陽病發汗出不解其人仍發熱心下悸眩身瞤動振振欲  
擗地者真武湯主之

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼  
痛自下利者為有水氣其人或小便利或下利或嘔者真武  
湯主之

**小建中湯證**

傷寒陽脈濇陰脈弦法常腹中急痛先與小建中湯服之

傷寒八九日風濕相搏身軀痠煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澗者桂枝附子湯主之

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

**附子湯證**

少陰病得之二三日口中和其背惡寒者當灸附子湯主之

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

傷寒八九日若其人大便堅小便自利木附湯主之

**木附湯證**

若下之後後發汗晝日煩燥不能眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱者薑附湯主之

自汗者木附湯無汗者薑附湯

**茯苓四逆湯證**

濟生書卷他

發汗若下病仍不解煩燥者茯苓四逆湯主之

**理中丸證**

霍亂頭痛發熱熱多欲飲水者五苓散寒多不用水者理中丸主之

大病差後喜睡久不了胃中有寒當以丸藥溫之宜用理中丸

**理中湯證**

胃痺心下痞留氣結胃滿脇下逆氣搶心理中湯主之

脾胃不和中寒上衝胃脇逆滿心腹疝痛痰逆惡心或時嘔

吐心下虛痞隔寒不通飲食減少短氣羸瘦溫中逐水止汗

去濕宜理中湯治之

腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴及傷寒時氣及裏

寒外熱霍亂吐利手足厥冷胃痺心痛逆氣並宜理中湯主

之。若有寒者加附子。

若肯痺脇下妨悶者加枳實半兩、茯苓半兩。

少陰病始得之及發熱脈沉者麻黃附子細辛湯微汗之。

若惡寒而倦時時自煩不欲厚衣者宜大柴胡湯下之。

若得二三日常見少陰死陽證者亦須微發汗宜麻黃附子

甘草湯。

若少陰證面赤者宜四逆加葱白主之。

陰盛隔陽傷寒其人必燥熱不欲飲水者宜

**孫兆口訣**

孫兆口訣

附子一枚燒灰存性為末蜜水調下為一服而愈此逼寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈。

**陰毒甘草湯**

治傷寒時氣初得病一二日便結成陰毒或服藥

後六七日

後六七日一至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利

毒氣攻心心下堅強氣短不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其

脈沉細陰毒二候身如被杖咽喉痛五六日可治至七日不可

治也。

甘草炙

升麻

當歸各五錢

雄黃半錢

蜀椒去目

鱉甲一兩半酥炙

桂枝五分

右以咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓服如人行五里

進一服溫覆汗毒從汗出愈未愈再服

**陰毒**

治陰毒傷寒唇青面黑身背強四肢冷

附子七錢半炮

裂去皮脂

桂心半兩

當歸半兩

炒半夏一錢半

乾薑一錢半炮

白朮半兩

右為細末每服二三錢水一中盞生薑半錢煎至六分去滓

不計時候熱服衣覆取汗如人行十里未汗再服

**心陽散**

治陰毒傷寒面青張口氣出心下硬身不熱尺額上有

汗煩渴不舌黑多睡四肢俱冷

附子一枚夫皂角一定酥乾薑式錢甘草式錢麝香一錢

右為細末每服一錢水一中盞煎至五分不計時和滓熱服

**獨靈散**

治陰隔陽煩燥不飲水

附子一枚炮熟取出用冷灰焙細研入真鴈茶天錢和勻

右為細末分作二服水一盞煎至六分臨熟入蜜半匙於溫

或冷服之須臾躁止得睡汗出即差

**火燭散**

治傷寒惡候

舶上硫黃 附子去皮 新蟻茶各一兩

右為細末先將好酒一升調藥分大心椀口中於火上攤薄

令乾合於瓦上每一椀下燒熟艾一拳大以瓦搯起瓦令火

着直至煙盡冷即刮取却細研入磁合盛每服二錢酒一盞

共煎七分有火焰起勿訝傷寒陰毒者四肢冷脉沉細或吐

或瀉五心煩燥胃中結硬或轉作伏陽在內湯水不下先喫

一服如吐却更進一服服後心中熱其病已差下至藏府中

表未解者渾身壯熱脉氣洪大宜用發表藥或表解者更不

發熱便得眠睡渾身有汗若少有痞結脉實方可下臚行藏

府藥漸用調和脾胃補治元氣之藥也

仲景傷寒脉浮自汗出小便數心煩微寒脚掌急與桂枝湯攻

表慢也得之便厥咽中乾躁煩吐逆作甘草乾薑湯與之以

復其陽 若厥愈足溫者更作為藥甘草湯與之其脚即伸

若胃氣不和謔語者少與調胃承氣湯宜消息用之

**桂散** 治傷寒服冷藥過度心腹脹滿四肢逆冷皆沉不識人變為陰毒惡證

肉桂各一分 赤芍藥 陳皮 前胡 當歸各壹兩

附子壹兩 白朮叁錢 木香叁錢 厚朴製叁錢 良薑叁錢

人參壹兩 吳茱萸半兩

右為鹿末每服五錢水一中盞棗二枚煎至六分去滓不拘時候稍熱服

**天雄散** 治陰毒傷寒身重背強腹中疝痛咽喉不利毒氣攻心

天雄壹兩炮去皮脂 麻黃半兩去節 當歸 白朮 半夏各半兩洗

川椒壹分去目炒 肉桂壹兩 厚朴壹兩製 生薑貳分 陳皮壹錢

右為鹿末每服五錢水一盞入生薑半錢棗二枚煎至五分去滓無時稍熱服如人行十里末汗再服

**白朮散** 治陰毒傷寒心間煩躁四肢逆冷

川烏頭壹兩炮去皮脂 桔梗壹兩 附子壹兩炮 白朮壹兩

細辛壹兩去芦 乾薑半兩炮

右為細末每服一錢水一中盞煎至六分稍熱和滓服無時始得陰毒候

陰毒本因腎氣虛寒因慾事或食生冷物而後傷風內既伏陰外又 或先感外寒而後伏陰內外皆陰則陽氣不守遂發

重服睛疼身軀倦怠而其熱四肢厥逆冷頰上及手背冷汗不止或多煩渴精神恍惚如有所失三二日間或

可起行不其覺重候之則六脈沉細而疾人部短小寸口或

無其... 涼藥... 濕轉其燥轉急有此證者急服... 陽... 陰... 藥則安惟補虛和氣而已宜服正元散... 退陰散五勝散... 證不宜發汗如氣正脉大身熱而未差用藥發汗無效或寸口小而尺脉微大亦同積陰感於下則微陽消於上故其候沉重四肢逆冷腹痛轉甚或喉不利或心下厥滿結硬躁渴虛汗不止或時狂言爪甲面色青黑六脉沉細而一息七至以來有此證者速宜於氣海關元二穴灸三二百壯以手足和暖為効仍服金液丹來復丹玉女散還陽散退陰散之類隨證用之沉困之候六脉附骨取之方有按之即無一息八至以上或不可數至此則藥餌難為功矣但於臍中灼艾半棗大二二百壯以來手足不和暖則以硫黃及熱藥助之若陰氣散陽氣來漸減熱藥而和治之

**正元散**

治傷寒始覺吹凍着四肢頭目百節疼痛急煎此服如人行五里再服或連三服汗出立差若患陰毒傷寒入退陰散半錢同煎或寒冷傷食頭昏氣滿及心腹諸疾服之無有不效

- 麻黃 陳皮 大黃 甘草 乾薑
- 肉桂 白芍藥 附子 半夏 吳茱萸各等分
- 右麻黃加一半茱萸減一半同為末每服一大錢水一盞生薑五片棗一枚煎至七分呷出汗以被蓋覆汗出愈陰毒不可用麻黃出汗

**退陰散**

治陰毒傷寒手足逆冷脉沉細頭痛腰重小小傷冷每服一字入正元散同煎入鹽一捻陰毒證效逆煎一服細細熱呷之便止

川烏頭 乾薑 各等分

右為鹿末炒令轉色放冷搗為細末每服一匙水一盞送下  
捻煎至平盞去滓溫服

**五勝散**治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沉困倦欬鼻塞不出  
飲食兼治傷寒夾冷氣慢陰毒

甘草

五味子

石膏

各乙

乾姜

半三兩

白朮

乙兩半

右為細末每服一匙入鹽少許煎至七分通口服如冷相夾  
入姜棗煎若治陰毒入艾葉少許同煎  
脈浮而緊者陽證也沉而緊者陰證也

韓祗和溫中例

夫傷寒之說始自黃帝以開其端至仲景方陳其條目後世膚  
淺之學莫知其數立言者只言病在表可發汗病在裏可下或  
云不可汗不可下即未嘗有溫中說仲景傷寒例尺寸俱沉細

太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥陰受病也

辨太陰證云太陰證脈浮可發汗宜桂枝湯又手足溫自利不

渴宜四逆湯又腹滿時痛桂枝加芍藥湯

辨少陰證云少陰病始得之發熱脈沉麻黃附子細辛湯又陰

病二三日麻黃附子甘草湯又少陰病脈沉急溫之宜四逆

湯又少陰病身軀疼痛手足寒骨節痛脈沉附子湯

辨厥陰證云厥陰病吐利手足逆冷煩躁欲死吳茱萸湯

今舉仲景論中數條最是三陰病之良法今世之用尚有未盡

證者愚嘗按自至和初歲迄於今二十餘年不以歲之太過不

及為則每至夏至巳前有病傷寒人十中七八兩手脈俱沉細

數多是背膈滿悶或嘔逆或氣寒或腹鳴或腹痛與仲景三陰

病說理同而證不同因茲不敢妄投仲景三陰藥才見脈沉及

腎臟滿便投下藥半之往往不救常斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者即胃中便快其病勢重者半日許滿依然或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯溫之多藥力大熱後必發煩躁因校量此形證今別立方以治之得多對證藥不可不傳焉  
病人但兩手脈沉細數或有力或無力或閉脈短及力小腎臟塞悶氣短不能相接者便可隨脈證投溫中藥以治之  
病人兩手脈沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脈短及力小於關尺者此陰盛陽虛也或腎臟滿悶腹中脹滿身體拘急手足逆冷急宜溫之

若立春以後至清明以前宜溫中湯主之清明以後芒種以前宜橘皮湯主之芒種以後至立秋以前宜七物理中丸主之

**橘皮湯**

丁皮乙兩 乾姜貳分 白朮 陳皮 丁香各半 厚朴乙兩  
右為細末每服二勺水一盞葱白二寸荊芥五穗煎至七分去滓投服未快手足尚逆嘔吐加舶上丁皮二勺乾姜二勺

**理中丸**

陳皮乙兩 藿香三勺 白朮 葛根絡 厚朴乙兩  
右為末每服二勺水一盞生薑一塊如棗大搥破同煎至七分去滓投服如二服未快手足尚逆嘔吐不定加半夏半兩丁香桂枝半兩每服加葱白二寸煎服

**七物理中丸**

白朮五勺 乾生薑貳分 人參半 桔梗七勺 葛根七勺  
藿香五勺

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸水送下



和滓熱服如二服未快手足尚逆嘔者加半夏煎乾姜半兩  
病人手脈沉細無力雖三部脈力停亦是陰氣盛也更不應  
候寸脈短治之或背脇滿悶身體拘急疼痛手足逆冷連宜  
溫中藥和之

若立春已後至清明已前宜厚朴丸主之清明已後至芒種  
已前宜白朮湯主之芒種已後至立秋已前宜橘皮湯主之

**厚朴丸**

當歸半兩 丁皮枝枝 厚朴乙兩 製製 細辛乙兩  
人參七分 甘草半兩 乾姜半兩

右為末煉蜜為丸彈子大每服一九水一盞煎至六分和滓  
熱服三服後脈尚細及寸脈尚細無力每服加葱白二寸同  
煎服

**白朮湯**

白朮 半夏 當歸 厚朴製  
乾姜炮已上各半兩 丁香七分

右為細末每服三勺水一盞生薑棗許大搥破同煎至七分  
去滓熱服三五服脈未有力寸脈尚小加細辛半兩每服加  
葱白二寸同煎服之

**橘皮湯**

橘皮半兩 藿香 葛根各二 半夏 厚朴製各

右為末每服二勺水一盞生薑如棗大同煎至七分去滓熱  
服三五服脈尚小手足逆冷加細辛半兩  
病人膏膈滿悶時時嘔吐逆肢節疼兩脇下痛腹中鳴此是  
停飲宜

**赤茯苓**

赤茯苓 木豬苓 白朮各半 滑石乙兩  
通草 白朮各半 薏仁各半 丁皮乙兩 陳皮五分 桂枝半兩

右為末每服三勺水一盞煎至七分去滓熱服小便未快加  
鹽麥七勺半嘔未止加半夏半兩浙浙惡寒甚每服加葱白  
三寸

### 灰包熨法

病人服前藥膏膈不滿悶者此上焦有陽也或藥力太過上焦  
有熱腹痛虛鳴時時疼痛此是被陽藥消逐得上焦陰氣併入  
下焦也雖是下焦積寒冷上焦陽盛更難投溫下焦藥也當用  
灰包法炭灰或桑柴灰二三升許入好醋拌和乾濕得所銚內  
炒令灰熱以帛包裹置臍下熨之頸腹灰包今常熱以腹不滿  
痛為度或初熨時病人不受者勿聽但令亟熨之不住灰包可  
也如灰包熨後得下利三兩行或小便二三升或微似有汗此  
是陰氣外出或下泄也勿疑之病輕者乃得愈後出餘氣而解

新集

卷之十

病人三部脈沉寸脈小於關尺此為陰盛當溫中藥以消陰氣

宜用藥

陳皮

人參

白朮

藿香

當歸

細辛之類是也

神木湯亦同治 陰躁而渴不可悞用涼藥若熱藥冷服內  
有伏陽則可若脈已虛按之全無力或病人素無食養只可  
溫服

海藏所製神木白朮一湯

神木湯治內飲冷外感寒邪無汗者

蒼朮

防風

甘草

乙兩

右咬咀生姜水煎加葱白三寸

如治吹妳煎成調六一散三五勺如神

如太陽證發熱惡寒脈浮而緊者加羌活

如太陽證脈浮緊中帶弦數者是有少陽也加柴胡

如太陽證脈浮緊中帶洪者是有陽明也加黃芩

已上三證約量每服加二錢匕不論三陽婦人服者加當歸

神木湯六氣加減例

太陽寒水司天加 桂枝 羌活

陽明燥金司天加 白芷 升麻

少陽相火司天加 黃芩 地黃

太陰濕土司天加 白朮 藁本

少陰君火司天加 細辛 獨活

厥陰風木司天加 川芎 防風

上神木湯六氣加減法非止為司天之氣設也至於歲之主氣與月建日時同前應見者皆當隨所見依上例而加減之

神木加藁本湯 每服內加二錢匕 以意消息

神木加木香湯 每服內加二錢匕 以意消息

**白朮湯** 治內傷冷物外感風邪有汗者

白朮 參兩 防風 貳兩 甘草 壹兩炙

右以咀每服秤三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服無時一日止一二服待二三日漸漸汗少為解

風溫證面赤自汗嘿嘿不欲語但欲寐兩手脈浮而緩或微弱

此證不宜發汗若汗之令人筋惕肉瞤或謔言獨語或煩燥

不卧若下之直視失溲便若火之發狂似驚癩一逆尚引日

再逆促命期活人本方葳蕤湯以有麻黃故不敢用宜上白

朮湯主之

若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡蠣

若腰背強硬者加羌活

若舌乾發渴者加人參

若身灼熱甚者加知母

若身重多汗者加黃耆

若內傷冷者不加

**黃耆湯** 治傷寒內感拘急二焦氣虛自汗及手足自汗或手背偏多或肢軀振搖腰腿沉重面赤目紅但欲眠睡頭面壯熱兩脇熱甚手足自溫兩手心熱自利不渴大便或難或如常度或口乾咽燥或渴欲飲湯不欲飲水或少欲飲水嘔噦胸作或心下滿悶腹中疼痛或時喜笑或時悲哭或時太息或語言錯亂失志世疑作謔言狂語者非也神不守室身始得病寤寐之間或恐或悸頭項不甚痛行步只如舊陰氣盛陽氣走也兩手脈浮沉不一或左右往來無定便有沉澆弱弦微五種陰脈形狀舉按全無力浮之損小沉之亦損小皆陰脈也宜先緩而後急

緩宜用黃耆湯

甚者加乾姜炮

人參

黃耆

味甘

白茯苓

白朮

白芍藥

各壹兩

甘草

炙

嘔吐者加藿香

兩半

生薑

兩兩如無以陳

一兩

右以咀生薑水煎量證大小加減多少用之可也如大便結者調中丸主之

**調中丸**

人參

白茯苓

去皮 乾生薑

白朮

甘草

各等分

右為細末煉蜜為丸每兩作十九或五九每服一二九水少許煎服之 若病重急治者黃耆湯內每服加乾姜一錢大便結者理中丸主之

**理中丸**

人參

白朮

甘草

乾薑

炮烈熱以

右等分煉蜜丸每兩作五九白湯化下水煎服亦得緩後治急也若尤急者無汗宜附子乾姜甘草湯

若自汗者宜附子白朮甘草湯量脈證可宜四逆湯具其法  
通脈四逆選而用之

論陰陽易分寒熱

陰陽各相易證仲景止用燒棍散言簡而意至有餘也故朱奉  
議立陰陽易為二條後人始知有寒熱之別也故執者有燒棍  
散而又有竹皮湯寒者有蝦鼠糞湯又有當歸白朮湯至於按  
正方妙香丸條下治雜病陰陽易藥中有牛黃腦麝之類是知  
治執證也豈可一途而取哉聖人立陰陽易條雖不盡者特舉  
其宏綱而已

海云若陰陽易證果得陰脈當隨證用之

若脈在厥陰當歸四逆湯送下 燒棍散

若脈在少陰通脈四逆湯送下 燒棍散

若脈在太陰四順理中丸送下 燒棍散

所用之藥各隨其經而効為之速也

燒棍散

右取婦人中棍近隱處剪燒灰以水和服方寸匕日一服小  
便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子棍襠燒灰用

活人蝦鼠糞湯

治傷寒病後男子陰易  
並白根乙卯蝦鼠糞十四枚

右二味以水五升煮取半升去滓再煎三沸溫溫盡服必有  
粘汗出為効未汗再服亦理諸般勞復鼠糞兩頭尖大者是也

竹皮湯

治交接勞復外腫腹中絞痛欲絕  
竹皮青刮一升

右一味煮用水三升至一升絞去滓服愈

婦人病未平復因有所動致熱氣上衝背手足拘急  
搐搦如中風狀宜此湯

芡菱根

無黃者乙兩

青竹茹

刮半斤陰竹是

右以水二升半煮取一升二合去滓分二三服

治婦人未平復因有所動小腹急痛腰膝痛四肢

不住舉動無熱發者

白木

當歸

桂枝

附子生

甘草

芍藥

黃耆

人參

各式各半

生姜

半兩

右剉以水三升煮取一升半去滓通口服一盞食頃再服溫

覆微汗差

辰砂

辰砂

研飛龍腦

膩粉

麝香

研各七

牛黃

半兩

金鉤

九十九

巴豆

參百乙十五个去皮心

膜炒熟研如泥去油

右合研勻煉蜜出滓黃蠟六兩入白沙蜜七錢半同煉勻為

丸每兩作三十九丸米飲調下

海藏治驗

完顏小將軍病寒熱間作腕後有斑三五點鼻中微血出兩手  
脉沉澹膏膈四肢按之殊無大熱此內傷寒也問之因暑臥歛  
角傷風又渴飲冰酪水此外感者輕內傷者重外從內病俱為  
陰也故先斑衄後顯內陰寒熱間作脾亦有之非往來少陽之  
寒熱也與調中湯數服而愈

許氏病湯厥怒狂罵詈親踈或哭或歌六脉舉按無身表如冰  
石發即叫呼聲高索古昔云奪食則已非不與之食予用大承  
氣湯下之得藏府數升狂稍寧數日復發復下如此五七次計  
大便數斗疾緩身溫脉生良愈此其奪食之法也

侯輔之病脉極沉細內寒外熱有背脊脇痲出十數點語狂  
乱或曰發痲謔語非熱乎余曰非也陽為陰逼上入于肺傳之  
皮毛故痲出神不守舍故錯語如狂非謔語也肌表雖熱以手  
按執須臾冷透如冰與姜附等藥數日約二十余兩後中大汗  
而愈後因再發脉又沉遲三四日不大便余與理中丸三日內  
約半斤其疾全愈侯公之狂非陽狂之狂乃失神之狂即陰也  
侯國華病傷寒四五日身微痲渴飲脰之沉弦欲絕厥陰脉也  
溫藥數日不已又以姜附等藥微回脉生因渴私飲水一盃脉  
復退但見頭不舉目不開門之則犯陰易若只與燒棍散則寒  
而不濟矣遂煎吳茱萸湯一大服調燒棍散連進二服作大汗  
兩晝夜而愈

弋唐臣嗜冷食遂成陰脉遲七八至一止後僅二至予亟與溫

陰脉之辨

十一

劑數服四五日不解遂續晝二夜一七日脉生大汗而解

秦一母病太陰病三日不解後嘔逆惡心而脉不浮文之與半  
硫九二三服不止復與黃耆建中湯脉中極緊無表裏皆中大  
執發渴引飲皆曰陽證欲飲之水余不與與姜附等藥緊脉反  
沉細陽猶未生以桂附薑烏之類酒丸以百九接之二日中十  
余服病人身熱煩燥不寧欲作汗也又以前丸接之覆以厚衣  
陽脉方出而作大汗翼日大小始通下瘀血一盆如豚肝然用  
胃風湯加桂附三服血止其寒甚如此亦世之未嘗見也

秦一婦服三生茶及冷物積而痲寒脉非浮非沉上下內外  
按極有力堅而不柔觸指突出膚表往來不可以至數名縱橫  
不可以巨細狀此陰證鼓擊脉也一身游行之火萃于背脊中寒  
氣逼之故搏大有力與真武四逆等藥佐以芍藥茴香酒糊丸

便不備上每百丸晝夜相接八九服丸至半千作汗而愈亦世罕有也

姬提領因目疾服涼劑數日遂得陰病臍腹下大痛幾至於斃與薑附等劑雖稍蘇痛不已遂於本方內倍芍藥服之愈

李良佐子病太陽證尺寸脈俱浮數按之無力余見其內陰與神木加乾薑湯愈後再病余視之見神不舒垂頭不欲語疑其有房過問之犯房過乎必頭重目暗曰唯與大建中三四服外陽內收脈反沉小始見陰候又與已寒加芍藥茴香等丸五六服三日內約服丸六七百脈復生又用大建中接之大汗作而解

### 陰證發癍

陽證發癍有四有傷寒發癍有時氣發癍有熱病發癍有溫毒發癍班班如錦文或發之面部或發之背脊或發之四末色紅

赤者胃熱也紫黑為胃爛也一則下早一則下之晚乃外感熱病而發癍也當服玄參升麻白虎等藥

陰證發癍亦出背脊又出手足亦稀少而微紅若作熱疾投之涼藥大悞矣此無根失守之火聚於背脊中上獨熏肺傳於皮膚而為癍點但如蚊蚋蚤虱咬形狀而非錦文也調中溫胃加以茴香芍藥以大建中之類其火自下癍自退可謂治本而不治標也

唐生者病因飲酪水及食生物下利紫黑血十余行脾胃受寒濕毒與六神平胃散半兩加白朮三錢以利腰臍間血一服愈案古云煩滿囊縮可灸陽陵泉在膝下一寸外廉是也陰病在內活人定以返陰丹當歸四逆湯及加吳茱萸生薑湯又以臍下一寸灸之及以臍下各四邊一寸三灸灸之極則一于石



門急灸之仍與前藥予恐不任藥與灸者別立代灸法

**代灸透骨膏**

附子 馬蘭子 蛇床子 木香 吳茱萸 肉桂  
右六味各等分為細末可用白麵一匙藥末一匙或用各半  
匙生薑自然汁煨成膏攤紙上圍二寸許貼臍下關元氣海  
白心至曉火方可代灸百壯腰痛亦用貼之

陰證發黃方在前元戎拾遺內附

趙宗顏因下之太過生黃脈沉細遲無力次第用藥至茵陳附  
子湯大効

趙秀才因下之早黃病脈寸微尺弱身冷次第用藥至茵陳四  
逆湯大効

傷寒病遇太陽太陰司天若下之太過往往變成陰黃一則寒

化太過水來犯土一則土氣不及水來凌之多變此疾一則茵

陳茯苓湯加當歸桂二則茵陳橘皮湯加薑朮半夏二則茵陳

附子湯四則茵陳四逆湯五則茵陳薑附湯六則茵陳吳茱萸

湯方在前拾遺內

內感傷寒勞役形壯飲冷失節中州變寒之病生黃非壞之而  
得只用建中理中太建中足矣不必用茵陳也

若男黃小便自利當與虛勞小建中湯

若黃疸色不變欲自利腹滿而喘不可除熱除熱必噦小半夏湯

韓氏曰產脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若

只用救逆効必遲矣與羊肉湯為効神速病人面色雖見陽是

客熱上焦中下一焦陰氣已盛若調得下焦有陽上焦陽氣下

降丹田知所歸宿矣氣有高下病有遠近證有中外治有輕重

各適其至所為病八九日汗下太過一脈沉細無力多眩暈此惡明與人腎皮有粒時戰如瘧宜肉湯主之

**肉湯方**

當歸

白芍藥

黑附子

詳錢油製

龍骨 半兩燒通赤

生薑 貳兩

牡蠣 壹兩

燒亦桂枝 朱鏡羊

右為鹿末每一服二兩羊肉四兩葱白五寸去黃心同剉爛以水五升壹升今之壹大蓋也熬至一半以來濾絞去滓分三服飲之

海云陽證大汗大下後亡陽于外亡血于內上而津脫下而液脫津液兩亡宜以此湯補之矧陰證者豈可不溫補哉此與傷寒太陽證振搖與真武湯一例外之陽病至此尚溫況之陰候豈得不補耶

陰證下血

陰證下血

胃中聚集之殘火腹裏積久之太陰上下兩絕脈絡部分陰陽不通用苦熱以定于中使辛熱以行于外升以甘溫降以辛潤化嚴肅為春溫變凜冽為和氣汗而愈也然餘毒土首猶有存者周身陽和尚未泰然胃中微燥而思涼飲因食冷物忽服涼劑陽氣復消陰餘再作脈退而小弦細而遲澀而為衄血唾血者有之心肺受邪也下而為便血溺血者有之腎汗受邪也三焦出血色紫不鮮此重登寒濕化毒凝泣水穀道路浸漬而成若見血證不詳本源便用涼折變乃生矣

陽證溢血 陰證下如豚肝

上而血者黃耆桂枝湯

白芍藥當歸湯

中而血者當歸建中湯

增損胃風湯

下而血者芍歸木附湯

桂附六合湯

若二血證在行陽一下五度見黃芩四君子湯主之  
若三血證在行陰一下五度見當歸四逆加吳茱萸主之  
**如生神膏**治男女陰毒傷寒外按法

牡蠣 煉粉 乾薑 炮裂各宜錢

右為細末男病用女唾調手內擦熱緊掩一卵上得汗出愈  
女病用男唾調手內擦熱緊掩一乳上得汗出愈卵與乳男  
女之根帶坎離之分也 陰證大小不通及諸雜病陰候大  
小不通者並宜此外治法數日不通為急非急勿用

**急提** 雜病非陰候者 草烏頭不以多少生用

右為極細末用葱一枝肥者削去鬚頭圍上有葱汁濕蘸之  
任穀道中

陰毒傷寒四肢逆者 吳茱萸不以多少

右為細末溫酒和勻生絹袋盛之執執熨脚心令通暢愈若  
以湯煎溫藥漆洗以接四肢亦可

少陰效逆

仲景有傷寒效逆上氣脈散者死謂其形損故也少陰渴逆者  
失下也陰消將盡陽逆上行使陰不內也為之惡候或兼以  
舌苔語言不正而反昏胃與咽痛者少陰也速下之宜大承  
氣湯

若湯極脈微將盡者不宜下宜瀉心湯養陰退陽而已如不  
用瀉心湯涼膈去硝清肺亦可

若飲水過多心下痞而渴逆者五苓散主之別無惡候是也  
夫效逆孫真入斷之為噦逆噦者乾嘔是已即非效逆也大效  
逆者多種或水漬於肺而心痞或連效不已而氣逆或

過多而氣噴或噦飲錯喉而氣飽或急食乾物而氣塞皆能  
作欬逆之聲世呼謂之吃忒是也皆氣不得下為火熱并之  
而使上至咽喉心噎而止也人或以紙撚鼻因嚏而止或詐  
寃盜物因恐而止或鼻聞食香調氣而止皆抑之駭之調之  
而使氣下也千金以喘嗽欬逆上氣者為病肺脉散者是心  
火形於肺金也心之肺謂之死陰死陰之屬不過三日死以  
其形見乎損傷故也此說甚優

陰證欬逆

且陽證欬逆者胃熱失下也陰氣先絕陽氣後亦將竭火獨炎  
上逆出陰氣而為欬逆

陰證者內已伏陰陰氣太甚腎水擅權肝氣不生胃火已病  
丁火又消所有遊行相火寒邪迫而萃集於胃中亦欲盡也  
故令人發熱大渴引飲并去蓋覆病人獨覺熱他人按執之  
身腠肌肉骨髓血脉皆寒此火即無根之火也故用丁香乾  
薑之類執藥溫胃其火自下欬逆方止非若涼膈瀉心以治  
陽證自上而下瀉退心火陰氣乃生陰證欬逆從嘔噦而生  
胃寒嘔噦不已渴逆繼之靈死治陰證欬逆

川烏頭 大者三個炮裂去皮脂

右為細末每服二錢黑豆二十一粒沙糖鷄頭仁大水煎承  
熱細細飲之

本事治陰毒吃逆方

川烏頭 乾薑 附子俱炮 肉桂 為藥

炙甘草 半夏

吳茱萸 陳皮

大黃

右各等分爲細末

服一錢水一盞生薑三五片煎至七分

去濁滓取清執服

許學士以退陰與正元

同煎以治陰證效逆

大鹽與蜜等分熬可以如蜜導煎上頭銳用寸許內穀道中

少許化開則通

海藏云

傷寒效逆脈散死

仲景之言不虛偽

大抵源流失下生

效逆喉中陰不內

便硬唯宜用瀉心

便硬尤宜大承氣

一藥神功作者誰

東垣潔古爲良制

活人陰證諸藥不効并湯水不下身冷脈絕氣息短不知人用

葱熨法莫若用醃醋拌麩炒執注布袋中蒸熨比上法尤速

一法用丁香單撥乾姜牡蠣燒粉手心中以唾津調如泥以手

掩其陰至煖汗出爲度

一法治水瀕偏大上下不定疼痛不止牡蠣不以多少鹽泥固

濟炭二斤煨令火盡冷取二兩乾姜一兩炮爲細末一味抄

勻冷水調得所塗病處小便大利即愈





