

新編婦人大全良方

五

新編婦人大全良方卷之六

婦人執勞方論第一

夫婦人執勞者由心肺壅熱傷於氣血氣血不調臟腑壅滯熱毒積蓄在內不得宣通之所致也其候心神煩躁頭赤頭疼眼澁唇乾四肢壯熱煩渴不止口舌生瘡神思昏沉多卧少起飲食無味舉體痠疼或時心怔或時盜汗肌膚日漸消瘦故名執勞也

黃耆散治婦人執勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲飲食

人參

黃耆

當歸各三分

北柴胡去土兩

黃耆

地骨皮

赤茯苓

麥門冬

生地黄

赤芍藥各二分

甘草一分

右以明每服肆錢水壹盞薑伍片煎分去滓溫服時

半夏散治婦人執勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛或時

寒熱痰逆嘔吐不思飲食

半夏

知母

苦梗

人參

赤茯苓

秦艽

赤芍藥

麥門冬

烏梅肉各二分

鼈甲醋炙

北柴胡

黃耆各二分

大腹皮各三分

甘草一分

右為粗末每服肆大錢水壹盞半生薑叁片煎至柒分去滓溫服無時候

疝肚丸治婦人執勞羸瘦

北柴胡

赤茯苓

人參

黃耆各二分

黃連各二分

地骨皮

木香各半兩

桃仁

鼈甲

文星壹兩半

右爲細末用好嫩猪肚一枚淨洗將藥末入猪肚內以線縫合蒸令爛熟於砂盆內研如膏負如梧桐子大食前粥飲下冬拾元午食前再服

秦元散

治血經有熱月脉凝滯五心煩倦出婦人經閉

麥門冬

秦元各呈壹兩

生地黃

當歸各半兩

地骨皮

鬱金

蘇木各呈壹分

右爲細末每服壹錢半水壹盞紅花少許同煎至柒分溫服若經脉調不用紅花忌酒與熱物此方可服壹年

婦人客熱方論第二

九三方

夫婦人有氣血陰陽臟腑虛實實則生熱虛則受邪邪熱加人陰陽冷熱自相乘也今云客熱者是體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上焦胃腸之間虛熱口燥心煩手足壯熱者是也

麥門冬散

治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

麥門冬

北柴胡

赤茯苓各壹兩

羚羊角屑

赤芍藥

桑白皮

黃耆各壹兩

生乾地黃

甘草各半兩

右以咀每服肆錢水壹盞薑參片煎陸分去滓溫服無時候

犀角散

治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑

赤芍藥

地骨皮

紅花

甘草各半兩

北柴胡壹兩

黃耆壹兩半

麥門冬

人參

枳殼

赤茯苓各壹兩

右吹咀每服肆錢水一盞半薑參片煎柒分去滓無時

溫服

黃耆湯 治婦人客熱心胃逆悶肢節煩疼不思飲食

生乾地黃 黃耆各壹兩 犀角屑 甘草

瓜樓子仁 黃芩各壹兩 人參 茯苓各三分

右為細末每服貳錢水壹中盞淡竹葉伍片煎至柒分
溫服無時候

婦人寒熱方證第三

九四方

經云陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒夫婦人勞
傷氣血虛弱令陰陽交氣虛實不調故令寒熱如瘧也

溫風散 治婦人血風氣體虛發歇寒熱

北柴胡 地骨皮壹兩 桑白皮 枳殼

前胡 黃耆各叁分 白茯苓 五加皮

人參 甘草 桂心 白芍藥各半兩

右以咀每服叁錢水壹盞生薑叁片煎至柒分去滓溫
服無時候

生乾地黃湯 治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思飲食

生乾地黃 北柴胡各壹兩 羌活 木香

桂心 防風各半兩 酸棗仁 羚羊角屑

白芍藥 白朮 黃耆 川牛膝

白茯苓 當歸 枳殼各叁分

右以咀每服叁錢水壹盞薑叁片煎至柒分去滓溫服
空心

柴胡湯 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮各壹兩

人參

地骨皮

枳殼製

生乾地黄

苦梗

桑白皮

赤芍藥各參分

鱉甲各參兩

麥門冬參兩寸草半兩

右咬咀每服肆錢水盞半薑冬片煎法分去滓溫服無時候

刺芥散 療時氣風溫寒熱瘴瘧往來潮熱並宜服之

陳皮

麻黃

香附子

甘草各壹兩

荊芥穗

厚朴各壹兩

草果仁參兩

川白芷

桂心各壹兩

右咬咀每服貳錢水盞大薑薑冬片棗兩枚煎至柒分去滓溫服無時候

寡婦寒熱如瘧方論第四

九一方

論曰寡婦之病自古未有言者惟君公傳與褚澄略而論及言寡者孟子正謂無夫曰寡是也如師尼喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可得是以懨懨成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰可乎夫既處閨門慈心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘧疾之則為勞又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黧瘦瘠等證皆寡婦之病診其脉獨肝脉弦出寸口而上魚際究其脉原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

針刺黃元

許學士云有一師尼患惡風體倦乍寒乍熱

面赤心煩或時自汗是時疫氣大行醫見寒熱作傷寒治之大小柴胡湯雜進數日病劇予診視之曰三部無寒邪

脉但厥陰肝脉弦長而上魚際宜服抑陰等藥予製此方治之愈

北柴胡 秦艽 黃芩 各半兩 生地黄 貳兩

赤芍藥 壹兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大烏梅煎湯下參拾元

無時候日參服詩李士公嘗讀史記倉公傳載齊北王以爲寒熱病也倉公曰病得之欲男子而不可得也何以知欲男子而不可得診其脉肝脉弦出寸口是以知之又欲男子而不可得診其脉肝脉弦出寸口是以知如重一證在本卷第十論

婦人惡寒方論第五 九一方

論曰夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脉必浮數發於陰者宜溫裏脉必沉細又有汗後利後惡寒及背惡寒已上疾證方治並載百問不復繁引僕嘗治一婦人但惡寒別無他證六脉平靜遂用敗毒散而安此藥能去表中風邪故也經云惡寒家慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相薄脉道沉伏愈令病人寒不可過但去被徹火兼以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚針藥所以不能治矣

敗毒散 見蜀方

婦人血風煩悶方論第六 九四方

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之搏於血使氣不宣而否滯則生於熱或肢節煩疼口乾少卧皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也
浴婦人血風虛冷月疾不調或即脚手心煩熱或即頭面

浮腫頑麻 川烏頭

川烏頭壹斤用上好清油各四兩一於於銚內炭火炒不

出了於新瓦上或不裂者者仍須如桑林也為度逐旋取

右為細末更入臼中或乳鉢內研令俾後將蒸餅水浸

後却瀝去水漸漸入臼中和杵直待元得即元如梧桐

子大小心溫酒或鹽湯貳拾元忌動風物丈夫風疾亦

治婦人氣血不和心腎煩悶不思飲食四肢少力頭目昏

眩身體疼痛

牡丹皮 白茯苓 赤芍藥 白芷

甘草各壹兩 柴胡壹兩半

右為細末每服貳錢水壹盞生薑三片棗一枝同煎至

柒分溫服食後臨卧

酸棗仁散 治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁喫食少

酸棗仁 赤芍藥 當歸 羚羊角屑

赤茯苓 紅花 生地黄各三

防風 羌活 川牛膝 麥門冬

桂心 川芎 地骨皮 甘草各半兩

右以咀每服肆錢水壹盞半薑叁片薄奇少許煎柒分溫

當歸散 治婦人血風潮熱

當歸二兩 芍藥 延胡索 不灰木

熟地黄各一 大黃三分 熟 桂心半兩 甘草壹分

右為細末每服貳錢水壹盞脂壹小角子煎至陸分

去滓如躁時效冷服細呷清者

婦人血風攻脾不能食方論第七 九四方

夫脾象於土脾為中州意智之藏也其肝心肺腎皆受脾之精氣以榮養焉脾與胃為表裏脾主化穀納食胃為水穀之海故經言四時皆以胃氣為本也婦人血氣不調臟腑勞損風邪冷氣蘊蓄在內攻於脾胃脾胃既虛為邪所乘則不能摧伏五穀故令不能食也

草豆蔻散 治婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不納飲食

人參 壹兩 草豆蔻仁 壹兩 白茯苓 半夏 各二兩

良薑 白朮 縮砂仁 批把葉 去毛 甘草 各半兩

桂心 木香 青皮

右為粗末每服參錢水壹大盞薑參片煎至柒分去滓溫服無時候

神效元 治婦人血風攻脾胃腹脇氣滿不思飲食

白朮 附子 炮 枳殼 製 訶子

桂心 人參 木香 食茱萸 泡

陳皮 各壹兩 苦梗 乾薑 各半兩

右為細末以酒煮神麩末貳兩作糊為元如梧桐子大每服貳拾元空心薑湯吞下

椒紅元 治婦人血風攻脾胃臟腑虛冷全不思食臍腹多

痛體瘦無力

椒紅 沉香 附子 炮 義茂

訶子 當歸 白朮 各壹兩 良薑

白豆蔻仁 丁香 各半兩 麝香 壹分

右為細末酒煮麩負如梧桐子大空心溫酒下三元

進食散 李潛云治脾胃虛寒不思飲食及久病人脾胃虛

全不入食者只兩服能食出蘇沈據愚見此方既有川烏

青皮

陳皮

粉草

良薑

桂心各壹分川烏炮去皮

草豆蔻仁各壹分訶子伍箇

右為細末每服壹錢水壹盞薑貳片煎至柒分溫服

婦人夢與鬼交方論第八

九三方

夫人稟五行秀氣而生承五藏神氣而養若陰陽調和則臟腑強盛風邪鬼魅不能傷之若攝運失節而血氣虛衰則風邪乘其虛鬼邪干其正然婦人與鬼交通者由臟腑虛神不守故鬼氣得為病也其狀不欲見人如有對怪時獨言笑或時悲泣是也脉息遲伏或如鳥喙皆鬼邪為病也又脉來綿綿不知度數而顏色不變此亦是此候也

後神散

治婦人風虛與鬼交通妄有所見聞言語雜亂

茯神壹兩半 茯苓

人參

石菖蒲各壹兩

赤小豆半兩

右咬咀每服冬天錢水壹盞煎至陸分去滓食前溫服

桃仁元

治婦人與鬼魅交通

辰砂

檳榔

當歸

桃仁各壹分

水銀研令星盡

麝香

阿魏麝香

沉香各半兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心桃仁湯吞下拾元

又方

似**辟瘟丹**

虎頭骨貳兩

朱砂

雄黃

雌黃

鬼臼

皂莢

蕪荑仁

鬼箭

梨蘆各壹兩

右件生為末煉蜜為元如彈子大囊盛壹元男左女右繫臂上及用壹元當病人戶前燒之一切邪鬼不敢近

太乙神精丹 蘇合香元皆可用也

婦人傷寒傷風方論第九

凡八方

論曰古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血血室不蓄則二氣諧和血室凝結則水火相刑傷寒氣口緊盛即宜下人迎緊盛即宜汗婦人左關浮緊不可下當發其汗以救血室榮衛得和津液自通浹然汗出而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣者言不可下也。若行湯遂則熱入胃令津燥中焦上焦不榮成血結胃狀須當針期門也五行相對以生相扶以出平居之日水常養於木水木相生則榮養血室血室不蓄則脾無蘊積脾無蘊積則剛燥不生剛燥既生若犯胃氣則晝夜譫語喜忘小腹滿小便利屬抵當湯證也。傷寒胃實證且下之婦人熱雖然婦人傷寒與男子治法不同男子先調氣婦人先調血此大略之詞耳要知脈緊無汗名傷寒脈緩有汗為傷風熱病脈洪大中暑脈細弱其證一也假如中暈用白虎胃實用承氣豈必調血而後行湯邪仲景傷寒論所以不分婦人者良亦在學者皆可隨病於男子藥證中以意選用也。若姪婦傷寒藥性須涼慎不可行桂枝半夏桃仁等藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋為姪婦而去也大抵產前先安胎產後先補益次服傷寒藥若病稍退則止藥不可盡劑此為大法。黃帝問婦

人重身毒之柰何岐伯曰有故無殞亦無損也大積大聚其可犯表其大半過其厄也男子婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間有婦人傷寒方書稱仲景所撰而王叔和為之序以法考之間有可取疑非古方特假聖人之名以信其說於天下今取金匱玉函治婦人傷寒與俗方中可採者列為一卷雖不足以盡婦人傷寒之詳並可以百問中參用也

婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脈凝滯不得往來宜桂枝紅花湯

桂枝 芍藥 甘草二兩 紅花貳兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜四片棗貳個煎至七分去滓溫服良久再服汗出而解

婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食黃芩芍藥湯療之

黃芩 芍藥 白朮 生乾地黄

右各壹兩咬咀每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服寒則加生姜

婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下宜服

當歸湯

柴胡二兩 白朮貳兩 人參 甘草

赤芍藥 當歸各一兩 五味子 木通各半兩

右咬咀每服半兩水壹盞半生姜四片棗貳枚煎至稠分去滓稍熱服

婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩語目赤毒氣

閉塞不得通宜瀉心二黃湯

川大黃

鼠尾黃芩

鷹爪黃連等分

右為粗末每服肆錢水壹盞煎至捌分去滓溫服取微利如目赤睛疼宜加茯苓嫩竹葉瀉肝之餘氣

婦人傷寒差後猶有餘氣不去謂之遺熱宜**乾地黃湯**

乾地黃壹兩 大黃

黃連

黃芩

柴胡

白芍藥

甘草壹兩半

右咬咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓溫服取漉利汗出解

男子病新差婦人與之交合得病名曰陽易其證裏急腰膝及腹內痛身重宜**濕瀉散**

用男子糞褸燒灰為末以水調方寸匕服即愈

婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胸手足拘急搐搦

如中風狀宜**膏黃如湯**

括樓根貳兩 淡青竹茹半升

右以水貳升半煮取壹升貳合去滓分作叁服

婦人病未平復因有所動小腹急痛腰膝疼四肢不任舉動無力發熱者宜**當歸白芍湯**

桂枝

白朮

當歸

甘草

芍藥

人參

黃耆

各壹分

生附子

壹箇破作

剉片各壹分

生薑半兩

右咬咀水叁升煮取壹升半去滓通口服壹湯盞食頃再服溫覆微汗差

婦人熱入血室方論第十

凡五方

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀

此為熱入血室無犯胃氣及上二焦宜小柴胡湯

婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為熱

入血室其血必結故使如瘧狀宜服小柴胡湯

柴胡別錄重 黃芩 人參 生乾地黄

甘草各參 半真黃錢重

右以咀每服伍錢水琰半薑叁片棗貳枚煎至捌分去

滓溫服

局方四物湯不用熟地黄只用生乾地黄加北柴胡等分

煎服亦療此證

婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜服

乾薑柴胡湯

柴胡肆兩 桂枝壹兩半 括樓根貳兩 牡蠣

乾薑 甘草各壹兩

右以咀每服伍錢水琰半煎柒分去滓溫服初服微煩

再服汗出而愈

婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫近宜海蛤散婦人血

結胃法當針期門仲景無藥方此方疑非仲景然其言有

理姑存焉

海蛤 滑石 甘草各貳兩 芒硝壹兩

右為細末每服貳錢雞子清調下小腸通利則胃膈血

散膈中血聚則小腸壅小腸既壅則膈中血不流行宜

此方小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈

婦人傷風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脉遲身涼

和胃脇下滿如結胃狀謔語者此為熱入血室也當刺期

門穴隨其實而取之期門穴在乳直下筋骨近腹處是也
凡婦人病法當刺期門不用行子午法恐纏藏膜引氣上
但下針令病人吸五吸停針良久徐徐出針此是平瀉法
也凡針期門必瀉勿補可肥人二寸瘦人寸半深也



婦人咳嗽方論第十一

九九方

夫婦人咳嗽者由肌體虛外受於寒熱風濕所得也肺為
四臟之華蓋內統諸臟之氣外合於皮毛若為寒熱風濕
所傷邪氣自皮毛而入於肺中外皆傷故令咳也大抵治
咳不可一槩治當以脉息辨之其脉浮而弦者起於風濡
而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澁者起於寒風者
散之濕者燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之未有不妥
者也

咳嗽用溫藥方論第十二

初虞世

經曰微寒為嗽寒甚為腸澼古人立方治嗽未有不本於
溫藥如乾薑桂心細辛之屬以寒氣入裏非辛甘不能發
散以此準之未有不因寒而嗽也又曰熱在上焦因欬為

肺痿又實則為肺癰虛則為肺痿此人其始或血不足或酒色滋味太過或因服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪脉數發熱咳嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦用溫藥如建中之屬今人但見發熱咳嗽率用柴胡鱉甲門冬葶藶等藥旋踵受弊而不知非可為深戒就使不可進以溫藥亦須妙以湯元委曲調治無為鹵莽致傷人命治虛中有執咳嗽膿血口苦咽乾黃耆散

黃耆四兩

甘草貳兩

右為細末湯點壹貳錢服日叁一方甘草一兩黃耆

六兩名黃耆六一湯只以咀水煎服

治婦人咳嗽不止漸成勞氣宜服蛤蚧散

蛤蚧一對

紫苑

款冬花

鱉甲炙

貝母去心

皂莢子仁

杏仁各壹兩炒

杏仁炒去皮尖

右為細末煉蜜真如梧桐子大每服貳拾元淡薑湯吞下

含化元昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞服

此安冠宗夔方

枇杷葉去毛

桑白皮

款冬花

木通

紫苑

杏仁各等分

大黃減半

右為細末煉蜜元如櫻桃大食後夜卧含化一元

貝母湯治諸嗽久不差

出本事方

貝母生薑汁

北五味子

黃芩

乾姜煨者

陳皮略壹

半夏

桑白皮

桂心

北柴胡熟者加壹兩

木香

甘草各一分

右為粗末每服伍錢水壹錢半杏仁柒箇去皮尖碎之
生薑貳片煎至柒分去滓熱服黃師文云戊申冬有姓
蔣者其妻積年嗽製此方授之一投而瘥以此治諸嗽
悉皆愈

定喘湯治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上氣喘急喉中
涎聲背滿氣逆坐卧不安飲食不下及治肺感寒邪咳嗽
聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

半夏麴炒 明阿膠炒 甘草 各錢半 鷓鴣殼製 兩
北五味子 桑白皮 麻黃 去節 人參 各壹分
右咳嗽每服叁大錢姜叁片烏梅半箇煎至七分去滓
漸漸溫服食後臨卧服 方同和劑分兩加減不同有效

滄州李官人宅 **補肺湯** 治狀同前 又名清金湯

鷓鴣殼製 兩 人參 粉草 各半兩 陳皮
茯苓 杏仁製 白朮 明阿膠炒
北五味子 桑白皮 薏苡仁 紫蘇並略
右咳嗽為末每服叁大錢水壹錢半姜叁片棗兩枚烏梅
半箇煎至壹錢臨卧溫服僕每用則無效遂加百合貝
母去心半夏麴款冬花各壹兩服之良驗

金不換散治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿悶咳
嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰及遠
年日近一切喘咳疾諸藥不效者並治之

鷓鴣殼製 兩 杏仁製 甘草 各壹錢 枳殼 四錢
右咳嗽每服叁錢水壹錢半姜叁片烏梅半箇煎至八
分食後臨卧漸漸熱服 許元林先生方乙卯年七月撰

無效漸成勞瘵求余診之六脈濡弱以愚考之此是血
弱又因憂感太過而成斯疾合用當歸等藥治之必愈
遂先用古今錄驗補皮湯空心服藥子降氣
湯後用金銀煎熟地黃元當歸元調理得安

又治一婦人時行感熱咳嗽遂用小柴胡湯去人參薑棗
只加北五味子煎服愈

古今錄驗補皮湯療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中作聲
上氣不得下頭痛方

陳皮

紫苑

麻黃去根

杏仁製

當歸

桂心

甘草

黃芩各等分

右咬咀每服伍錢水錢半煎至壹瓖去滓熱服

勞嗽方論第十三

九二方

經曰人感於寒則受病微則為咳甚則為泄為痛九咳嗽
五臟六腑皆有之惟肺先受邪蓋肺主氣合於皮毛邪之

初傷先客皮毛故咳為肺病五臟則各以治時受邪六腑

則又為五臟所移古人言肺病難愈而善卒死者肺為驕

藏怕寒而惡熱故邪氣易傷而難治以其湯散逕過針灸

不及故也十種欬嗽者肺咳心咳脾咳腎咳肝咳風咳寒

咳支飲咳膽咳厥陰咳華佗所謂五嗽者冷嗽氣嗽燥嗽

飲嗽邪嗽孫真人亦有方治寒毒注嗽者歷代方論著之

甚詳惟今之所謂勞嗽者無所經見意其華佗所謂邪嗽

真人所謂注嗽者是也此病蓋酒色過度勞極傷肺損動

經絡其重者咯唾膿血輕者時發時差又有因虛感邪惡

之氣且傳注得之或先嘔血而後嗽或先咳嗽漸就沉羸

此則非特內損肺經又挾邪惡傳疰之氣所以特甚病之

毒害無過此也真人治注嗽通氣元方用蜈蚣四節又云

夢與鬼交通及飲食者全用蜈蚣外臺方四滿元治五嗽
亦用蜈蚣過世名公能推原其旨音遂用蛤蚧天靈蓋桃
柳枝麝香丹砂雄黃安息香之類以通神明之藥療之高
出古人之意矣又肺中有虫如蚕公入喉痒而咳嗽湯散
逐過鍼灸不及以藥含化虫死即嗽正見張銳方
深師療五嗽一上氣嗽二飲嗽三齶嗽四冷嗽五邪嗽

四滿元

乾薑

桂心

躑躅花

芎藭

紫苑

芫花根皮各

蜈蚣壹枚去頭足炙

細辛

甘草炙

鬼督郵

人參

半夏洗各

右拾貳味為細末煉蜜元如大豆許每服伍元米飲下
日叁未知加至柒捌元服此藥無一不恙忌羊肉鰻生葱

生菜海藻菘菜

古今錄驗**四滿元**療五嗽一氣嗽二齶嗽三齶嗽四邪嗽
五冷嗽悉療之方

蜈蚣貳枚炙

芫花根五

躑躅花壹

乾薑

芎藭

桂心各四分

人參

細辛各貳分

右為末煉蜜元如梧桐子大米飲下壹拾元日叁服加
至拾伍元忌生葱生菜

喘滿方論第十四

九六方

夫喘之為病黃帝問岐伯岐伯對曰行則喘出於腎淫
氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害晶有所驚恐喘出於
肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與當是之時勇者氣
行則已怯者則着而為病也原疾之由雖曰皆本於肺與

氣然感外邪則有太陽證脈浮無汗而喘者宜麻黃湯陽
明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜承氣湯若表邪
未解誤服下利藥不止脈促喘而汗出者宜黃芩湯
若微喘者桂枝厚朴杏子湯汗出而喘若無大熱者宜麻
黃杏子甘草石膏湯若表邪未解心下停水發熱而喘或
嘔者小青龍湯去麻黃加杏仁主之若陰證喘促者四肢
逆冷脈息沉細或寸大尺小或六脈促疾或心下脹滿結
硬或冷汗自出或大便頻數上氣喘促或咽喉不利者此
是本氣極虛內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則
愈宜返陰丹主之配上方並見僕且以大槩而言之諸藏
相乘而喘者以杏子散如感寒伏熱而喘者以華蓋散九
寶湯若暴寒而火覆衣被過當傷熱肺實而喘促者其狀
多有熱證宜洗心散冷水調服若因氣宇不調痰盛喘促
者宜四七湯兼官局積梗湯薑煎服若涎多而喘者宜千
緡湯橘皮半吳湯若不得臥臥即喘者此由水氣逆行上
乘於肺肺得水則浮而開使氣不得通流其脈沉大宜神
秘湯肺之積名曰息貫在右脅下大如杯令人洒淅寒熱
喘咳發癰疽且棗膏元若上氣喘者神授湯若上盛下弱
而喘促者宜蘇子降氣湯吞黑錫丹若尊年之人素來稟
賦太厚不任熱藥者不可輕投丹劑及諸熱藥但以秘傳
降氣湯分心氣飲論之梗槩不出於此矣若素有脚氣而
喘者當作脚氣治之又有骨蒸勞喘自有專門不敢濫及
神祕湯治水氣乘肺而喘兼療支飲而喘

陳橘皮洗去

紫蘇葉

人參

桑白皮

生薑等分

右咬咀每服半兩水煎去滓溫服

杏子散 治諸藏相乘喘急

杏仁去皮尖大雙八枚炒黃細研如膏

麻黃根為細末等分

右和煎橘皮湯調下貳錢無時候

千縉湯

齊州半夏葉枝炮裂四片破之

皂角去皮炙

甘草炙一寸

生薑如指大

右同以水壹碗煮去半頓服沈與宗待制嘗病痰喘不能卧人扶而坐數日客有見之曰我曾如此得良藥壹服差我以千縉酬之謂之千縉湯可試為之與宗得湯壹服而差

棗膏元 療息賁

葶藶研細

陳皮

苦梗

各等分

右後貳味為末入葶藶令停煑肥棗肉研為膏和負如梧子大每服伍柒元飲下 許學士云予嘗患傳飲水積肺經食已必噎漸喘覺肺系急服此良驗

神授湯 治上氣喘急不得卧

橘紅

苦梗

紫蘇

人參

北五味子等分

右咬咀每服肆錢水壹瓊煎至陸分去滓食後服

九寶湯

治感風伏熱一切咳嗽喘急不問高年小兒室女

產前產後皆可服惟虛勞自汗不可服

薄荷葉

紫蘇

大腹皮

洗

麻黃

去根各四錢

桑白皮

桂心

杏仁

去皮尖陳橘皮

甘草各貳兩

右以咀每服半兩水壹錢半薑拾片烏梅一箇煎至六分去滓溫服食後 有兩浙張大夫病喘二十年每至秋冬輒劇不可坐卧百方不差後得臨平僧法本方服之遂差法本凡病三十年服此藥半年乃絕根本永不復發凡服此藥須父乃差

官局桔梗湯

摘皮半夏湯

洗心散

華蓋散

並見局方不復

贊四七湯見本卷

漢嘗療羅安人年近六十遇秋冬之交上氣喘促不能坐卧六脉洪實服諸藥無效問疾之原

少年自川中任所服餌丹砂又恐是丹毒為害遂服洗心散

以華蓋散數服而愈護記之

婦人風痰方論第十五

九八方

夫婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於膏膈所成也人皆有痰少者不能為妨多者成患但膏膈有痰飲漬於五臟則令眼暈亦令頭眩頭痛也

評曰夫痰之為害多因外感五邪

五邪者寒暑燥濕風

內傷七氣

七氣者喜怒憂思驚恐恚

因五邪而得者得風為風痰得寒為寒痰

得冷為冷痰得熱為熱痰得暑為暑痰因七氣所傷者

多因婦人情性執著不能容忍而有此證豈特只因風

冷而成哉所以外感五邪內傷七氣則一身之中血液

淚汗涕唾身中濕者則濁變而成痰乘間而為害也經

云清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然有痰涎

飲沫四種相類宜子細詳辯調治因風而生痰者宜服

三生飲星香飲青州白元子化痰元方見因寒冷而得者宜服降氣湯黑錫丹養正丹方見因熱而得者宜服金沸草散柴胡半夏湯因暑而得者消暑元方見因氣字不調鬱結而成者宜服參蘇飲四七湯一陳湯痰在上者以瓜蒂散吐之在下者以控涎丹利之雖曰可吐可下亦要觀人之勇怯察脈之虛實方可投之切記不宜痛擊暴下所以初虞世有金虎碧霞之戒者此也

三生飲 星香飲

參蘇飲 方見卷第一 論 二

控涎丹

方見卷第一 論 二

旋覆花湯治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶

旋覆花

去蒂 枇杷葉 去毛

川芎 北細辛

藿香

桂心

枳殼

前胡

人參

羌活

半夏 甘草

羚羊角

赤茯苓

右為粗末每服參錢水壹瓊薑炙片煎至柒分去滓溫服

治婦人風痰心膈壅滯天南星元

天南星

白附子

皂莢仁 炒黃 半夏 麩

晉礬

右為細末以酒煮麩糊負如梧桐子大每服拾元生薑薄荷湯吞下

又方

半夏

天南星

肥皂莢

生薑

石以水伍升壹同煮令水盡去皂莢生姜只用半夏南

星煇乾為末以酒煮麩糊 貝如梧桐子大生姜薄荷湯
下七元

柴胡半夏湯 治痰熱煩痛利 胸除煩悶手足煩熱榮衛不
調肢節拘倦身躄疼痛嗜則 力飲食無味兼治五嗽痰
癖

柴胡 兩 半夏 參兩 十人參 去芦 甘草

黃芩 麥門冬 各二兩 白朮 貳兩

右以咀每服伍錢水浸半盞 煎至捌分去
滓服

金沸草散 治傷寒中脘有痰人 壯熱頭痛筋緊急時發
寒熱皆類傷風

荆芥穗 兩 半夏 甘草 北細辛 各壹

赤茯苓 貳兩 前胡 旋覆花 各參

右為細末每服貳錢水壹盞 生薑伍片棗壹枚煎至陸
分熱服不知再服 藥局有麻黃赤芍

瓜蒂散 療病如挂枝證頭不痛 項不強寸脈微浮胸中痞
鞭氣上衝喉咽不得息者此為 膏中痰也當吐之宜服此

瓜蒂 炒黃 赤小豆 各半兩

右為細末取壹錢匕豉壹合 湯柒合先漬之須臾煮作
稀糜去滓取汁和散溫頓服 不吐少少加得快吐乃止
諸亡血虛家不可與之 藥性大忌令人吐

大半夏湯 治痰飲及脾胃不和

半夏 白茯苓 生薑 各壹分

右以咀作壹服每遇膈間有 寒痰以水貳盞煎至壹盞

去滓臨卧温呷如有熱痰加炙甘草壹分如脾胃不和去甘草加陳橘皮壹分同煎此即二陳湯加減得理

四七湯治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七氣所為也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之 婦人清性執着不能寬解多被七氣所傷遂致氣填胃臆或如臨按上塞咽喉甚者滿悶欲絕產婦尤多此證宜服此劑以香附子藥久服取効切不可謂紫蘇耗氣且謂新產命血俱虛不肯多服用之効驗不可具述

紫蘇葉 貳兩 厚朴 叁兩 茯苓 肆兩 半夏 伍兩

右咬咀每服肆錢水壹瓊壹薑柒片棗壹箇煎至陸分去滓熱服無時候若因思慮受過當小便白濁用此藥吞青州白元子極妙

婦人心腎嘈雜方論 卷十六 九二方

夫心腎嘈雜婦人多有此證 你疾之由多是痰也皆血液淚汗變成或云是血嘈今人多用褚餘血炒而食之則愈詳其此理是以血導血歸原 剛恰如以鹽梅下涎之義不若用許學士旋覆花湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多睡口中清水自出脇肋急脹滿痛不欲食此胃氣虛冷所致其脈沉遲弦細是其證也

旋覆花湯方

旋覆花 北細辛 橘紅 桂心
人參 甘草 苦梗 白芍藥

半夏各半兩 赤茯苓 各一分

右咬咀每服肆錢水一盞半薑茶片煎至捌分去滓溫服
局方治惡阻半夏茯苓湯亦妙方見惡阻論中

新編婦人大全良方卷之六

新編婦人大全良方卷之七

婦人嘔吐方論第一

凡六方

夫婦人嘔吐者由脾胃有邪冷穀氣不理所為也胃為水穀之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於胃胃氣逆令嘔吐也 愚詳曰夫嘔吐之疾非特脾胃虛冷而嘔吐也亦有胃熱而嘔者亦有胃中冷胃口熱而吐者亦有痰盛而嘔者亦有血弱而嘔者經云無陰則嘔是也不可以一槩用藥 如胃冷而嘔吐宜用局方人參丁香散理中元及許仁則半夏元人參七味元 如胃熱而嘔吐者宜用小柴胡湯蘆根湯竹茹湯槐花散 如胃中冷喟熱而嘔吐者宜用局方藿香正氣散生薑棗子煎沉冷服即止 如痰盛嘔吐者宜局方半夏茯苓湯二陳湯 如惡阻兼服茯苓元目有專門見十一卷第一論 如血不歸原而嘔吐者宜用十全大補湯加陳皮半夏藿香薑棗煎服 或有脚氣而嘔者自有專門不敢濫及

益智子散治婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐全不下食四肢無力

益智 壹兩 附子 炮 縮砂仁 丁香

厚朴 黃耆 白朮 白茯苓

陳皮 川芎 良薑 藿香葉

當歸 各參分人參 桂心 各半兩

右咬咀每服參錢薑參片棗薑棗煎至柒分去滓無時

溫服

治婦人臟腑虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水穀不消**丁香散**

丁香

白木

縮砂仁

草果仁各參

人參壹兩

當歸

白豆蔻

藿香葉

甘草各半兩

橘皮叁分

神麴

呵子各半兩

右為細末每服貳平錢煎薑棗湯調下

竹茹湯治胃熱嘔吐

乾葛叁兩

半夏湯洗七次姜汁半盞煎水一升煮令耗半可取三分用

甘草叁分

右咬咀每服伍錢水貳錢薑叁片竹茹壹彈大棗壹枚煎至壹碗去滓溫服

許學士云胃熱者手足心熱 政和中一宗人病

傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫

三

六

二

者皆進丁香藿香滑石等藥下咽即吐予曰此正

汗後餘熱留胃腕孫兆竹茹湯正相當爾亟治藥

與之即時愈

良方**魂花散**亦相類方

皂莢

白礬

槐花炒令黃

甘草等分

右為細末白湯調貳錢

許仁則**半夏元**療積冷在胃嘔逆不下食方

半夏壹升真熊州者洗去滑

小麥麴壹升

右搗半夏為散以水搜麴圓如彈子大以水煮令麴熟則是藥成初吞四五元日二服稍加至十四五元旋煮

旋服服此覺病減欲更重合服亦佳忌羊肉鴿救急同
又依前法元雖覺漸損然病根不除欲多合前元又慮
藥毒不可久服欲不服又恐病滋蔓宜合人參七味元服

人參

白木各出兩厚朴各

細辛各出兩

生薑剉兩末橘皮炙兩挂心貳兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大飲下十元漸加至二十
元與半夏元間服亦可忌桃李雀肉生葱生菜吳昇同

婦人霍亂方論第一

凡六方

論曰嘔吐而利者名霍亂也原疾之由皆因腸胃虛冷飲
食過度觸冒風冷使陰陽不和清濁相干致令揮霍變亂
也或先心痛而吐者或先腹痛而利者或吐利俱作者或
頭痛身體壯熱而脈浮洪者或陽氣暴絕而手足逆冷而

脈息微絕者治之當分陰陽察其虛實辨其冷熱觀其脈
息熱者涼之冷者溫之以平為期百問云凡霍亂吐利熱
多而渴者五苓散寒多不飲水者理中元吐利已汗出而
厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯
夏月中暑霍亂大煩渴四肢逆冷冷汗出脚轉筋者香薷
濃煎沉冷服即效凡霍亂之脈得浮洪者湯 女子

加減理中元

主霍亂臨時方亦可治男子

其千金翼

人參

白木

乾薑

甘草各壹兩

右為細末煉蜜為丸每兩作伍元取湯和壹元服之日
拾服吐多利少者取枳實各枚灸去穢四破水參升煮
取壹升和壹元服之吐少利多者加乾薑一累吐
利乾嘔者取半夏半兩泡洗去滑水貳升煮取壹升和

壹元服 若體疼痛不可堪者水參升煮棗參枚取壹升和壹元服 若吐利大極轉筋者以韭汁洗腹腎從臍至足踝勿逆即止 若體冷微汗腹中寒取附子壹枚炮去皮四破以水貳升煎取壹升和壹元服 吐利悉止脉不出體猶冷者可服諸湯補之

千金翼四續湯治霍亂吐利腹痛手足逆冷脉微欲絕

附子壹箇破 乾薑參兩 人參 甘草各壹兩

右以咀水煎服

四逆水猪膽汁湯治吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕者

甘草貳兩 乾薑參兩 附子壹枚 猪膽汁半合

右參味以咀每服伍錢水參錢黃至貳錢去滓內猪膽汁分作兩次温服其脉即來

霍亂 治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥鱠生冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之間便至吐利心腹疼痛霍亂氣逆有先心痛而吐者或先腹痛而利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷脉微欲絕者或煩悶昏塞欲死者雄婦霍亂吐利此藥悉能主之

香薷葉肆兩 白匾豆 厚朴各貳兩

右以咀每服半兩水壹大錢酒壹分慢火濃煎至六分

去滓井中浸令冰冷頓服無時候連併二三服立見神效蘇沈良方中名香茸散百問同有黃連無扁豆

呵子散治老幼霍亂吐利壹服取效又治九種心痛及心脾冷痛不可忍其功如神

呵子 甘草 厚朴 乾薑

草菓仁 陳皮 良薑 茯苓

神麴 麥牙 各等分

右為細末每服貳錢候發刺痛不可忍用水壹瓊煎柒分入鹽服急則益點

胡椒湯治霍亂吐利甚妙

胡椒肆拾 綠豆拾百肆

右為細末木瓜煎湯調下貳錢

三廿六

全良方卷之七

外

婦人翻胃吐食方論第三

凡二方

白芷散治婦人翻胃吐食千金翼云不特治婦人男子亦可服壹斤以上為妙

白礬土以米醋壹升爛白礬土令赤入醋內浸今冷再服再浸以醋乾為度取壹兩研

乾薑壹分炮

右為細末研停每服壹錢飯飲調下甚者貳錢

白芷散治婦人翻胃吐食

右用白芷壹兩切作片於瓦上炒入黃為細末用猪血貳拾文切片以沸湯泡七次將血蘸藥喫七片如刺藥末留後次用

婦人血膈方論第四

凡一方

牡丹煎治婦人血膈

牡丹皮
白芍藥

苦參

貝母去心

玄胡索

右等分為細末煉蜜丸如梧桐子大每服拾伍貳拾元米飲吞下無時候

婦人鼻衄方論第五

凡七方

夫婦人鼻衄者由傷動血氣所致也凡血氣調和則循環表裏經絡澁則不散若勞傷損踵而生熱氣逆流溢入於鼻者則成鼻衄也只有產後見衄者不可治評曰凡鼻衄得此疾亦有因怒氣而得之者曾起其人鼻衄不止諸治不差召予治之先用蘇合香丸四粒次用五苓散濃煎白茅花湯調服即止以用云服丹藥太過遂用黃連黃芩大黃為末水煎服愈調服亦可

治婦人鼻衄血流不止

刺薊貳兩

桑耳

亂髮灰

艾葉各壹兩

生地黄貳兩 蒲黃兩半

右為細末每服貳錢無時粥飲調下

伏龍肝治男子婦人五臟結熱吐血衄血並皆治之

伏龍肝

生地黄各壹斤

竹茹壹升

芍藥

當歸

黃芩

川芎

桂心

甘草各貳兩

右咬咀水壹斗參升煮竹茹減參升內藥煮取參升分為參服千金無桂

百問有茅花湯 以白茅花濃煎飲之立止

一方擣生白茅根取汁壹合飲之止 又方取生葱心塞鼻中即定若因刺著并刀斧所傷血不止並用之立定

又方取釜底墨細研入鼻中 又方取亂髮灰細研以竹管吹入鼻中立止 又方取龍骨末吹入鼻中立止

婦人吐血方論第六

凡十三方

夫婦人吐血者皆由臟腑傷損所致夫血者外行於經絡內榮於臟腑若傷損氣血經絡則虛血行失於常理氣逆者吐血又怒則氣逆甚則嘔血然憂思驚恐內傷氣逆上者皆吐血也

治婦人吐血心煩昏悶 **雞蘇散**

雞蘇葉 青兩

阿膠

刺薊

生地黄 各兩

黃耆

羚羊角屑

茜根

甘草 各半兩

麥門冬

黃芩

當歸

伏龍肝 各參分

右為粗末每服肆錢水壹瓊薑參片竹茹半雞子大煎

至六分去滓溫服

治婦人虛損氣逆吐血不止 **雞蘇散**

凡遇湯頭宜提起

雞蘇葉

黃芩 各青兩

當歸

赤芍藥 各半兩

伏龍肝

阿膠 各式兩

右為粗末每服肆錢水壹瓊煎至六分去滓溫服

治婦人熱毒上攻吐血不止

生藕汁

刺薊汁

生地黄汁 各參兩

生薑汁 半合

白蜜 壹合

右和煎參兩泝無時以壹小瓊調炒麩壹錢服

千金翼治吐血百方不差療十十差神驗不傳方詳此藥

性治熱毒吐血有效

地黄汁 半升

生大黃末 壹斤

右煎地黄汁參兩沸調大黃末 分為叁服

又方 伏龍肝

右研令極細每服貳錢新汲水調下頻服取效

又方 白茅根青搗長

右以水壹大瓊煎取柒分去滓溫服

又方治吐血 桂心末

右水調方寸匕日夜可貳拾服

又方 生地黄切參片 阿膠貳兩炒 蒲黃陸合

右水伍升煮取參升分叁服僕嘗治一人吐血甚其脈

而得之遂用蘇合香元和雞蘇元部氣口濡此因怒極

云凡此無不愈者服生地黄

柔脾湯 治虛勞吐血衄血下白汗出方 出養生必用

甘草 白芍藥 黃耆各壹兩 熟地黄參兩

右為末每服肆錢水酒各壹瓊已上煎柒柒分去滓取

陸分清汁溫服食前行子嘗治一而人年十九歲月經不

形客入肥腠不大不小僕投以四生元即安又嘗治

青餅子因飽低頭負重吐而諸藥無効亦投四生元及

生地黃散經水沸亦不可服初真此治如陽乘於陰血得熱

成米自服溫藥以緩之黃耆

四生元 療吐血凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此

生荷葉 生艾葉 生栢葉 生地黄

右等分攪研圓如雞子大每服壹元水參瓊煎至壹瓊

去滓溫服無時候陳日華云 飲食將竟侍者掛堂齋罷

來此立見卓子上不穩急 問去年嘔血者无恙否其

飽物破肺也明年再到

主僧谷云得四生元服之遂愈自得此方屢救人有效

療熱甚嘔血者以犀角地黄湯方小三黃元以白茅根煎濃湯吞之妙

犀角地黄湯治內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑

芍藥參分 生地黃半斤 牡丹皮去心

犀角屑壹兩如升林川者代之

右以咀每服伍錢水煎服有熱如狂者加黃芩貳兩

青餅子治咯血

青黛 杏仁各壹兩華佗方以性燥不用炒杏仁去皮尖牡蠣不用

右壹處同研成膏熔黃蠟和作叁拾餅子每服壹餅子

用乾柿半箇夾定以濕紙裹煨令香同嚼粥飲下無時

若陰乘於陽心肺經寒而嘔血者宜服**乾薑甘草湯**

甘草 乾薑各半兩

右以咀水煮頓服 芍方理中湯亦妙方見和劑

婦人痲痺諸氣方論第七 凡四方

夫婦人痲痺者本因邪氣積聚而生也痲者在腹內近臍左右各有一條筋脉急痛大者如臂次者如指因氣而成如弦之狀名曰痲氣也痺者為僻側在兩肋之間有時而痛故曰痲也夫痲之與痺皆陰陽不和經絡否隔飲食停滯不得宣流邪冷之氣搏結不散得冷則發作疼痛故曰痲痺者也

麝香元治婦人痲痺冷氣兼注氣心腹痛不可忍

麝香半兩 阿魏壹分 五靈脂

桃仁 三稜各叁分 芫花醋炒 檳榔各壹兩

莪茂

桂心

沒藥

木香

當歸各半兩

右為細末入麝香令停用粳米軟飯為負如梧桐子大每服十元無時淡醋湯下

治婦人瘕癖及血氣等神效方

右以獾猪肝壹具可及拾兩者用巴豆伍拾枚去大皮割在肝內用醎醋參梳慢火熬令肝爛熟入砂鉢內研令極爛入京三稜末和就得所為負如梧桐子大每服

五元食前熱酒下

想熱後去巴不用。夫瘕癖癰腹血

之皆血之所為僕嘗治一婦人血氣刺痛甚欲死而不言而死一日方省醫巫併治數年不愈僕以葱白散烏刺痛要安又嘗治一婦人血氣作楚如一小盤撒走注血氣用此二藥亦有奇效故錄于后

烏雞圓元

方見二十四卷拾遺門

葱白散專治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛大

治婦人產前產後腹痛胎不安或血刺痛者兼能治血藏宿冷百節倦疼肌體怯弱勞傷帶瘕久服盡除但婦人一切疾病最宜服此

川芎

當歸

枳殼

厚朴

桂心

乾薑

芍藥

舶上茴香

青皮

苦練子

木香

熟地黄

麥牙

三稜

莪茂

茯苓

神麴

人參各等分

右為細末每服參平錢水壹瓊連根葱白貳寸拍破鹽半錢煎至柒分溫服內大黃呵子宜相度病狀如大便

不利入大黃同煎却不入益如大便自利入呵子煎生

生云此藥大治心氣痛用之見効甚速嘗以此藥治心
腫方亦効陳宜入病血氣作痛不可忍服諸藥無効必
僕發之兩脚腫沉弱痛肝脈流美繫此血氣漸成痲痛
也只以此藥安愈四明馬朝奉後院亦病此用此

二藥

羅安人每遇經脉行時則臍與小腹下痛不可忍服藥無効
僕以桂枝桃仁湯愈自後再發一投而差

桂枝桃仁湯

方見第一
卷十一論

治經候來時先腹痛男八德局方七氣湯吞下來復丹

婦人疝瘕方論第八

凡四方

夫婦人疝瘕之病者由飲食不節寒溫不調氣血勞傷臟
腑虛弱受於風冷冷入腹內與血相結所生疝者痛也瘕
者假也其結聚浮假而痛推移乃動也婦人之病有異於
丈夫者或因產後血虛受寒或因經水往來取冷過度非
獨因飲食失節多挾於血氣所成也診婦人疝瘕其脉弦
急者生虛弱小者死又尺脉瀋如浮牢為血實氣虛也其
發腹痛逆氣上行此為婦人胞中絕傷有惡血久則結成
瘕也

治婦人疝瘕久不消令人黃瘦疝羸兩脇妨悶心腹疼痛

乾漆散

乾漆炒

木香

芫花醋炒

赤芍藥

桂心

當歸

川芎

琥珀各半

大黃

真兩炒

牛膝三分

枳仁壹兩

麝香壹分

右為細末無時溫酒調下壹錢

治婦人疝瘕及積瘀血在臍時攻腹脇疼痛

川芒硝

礞砂

各壹兩

當歸

雄黃

桂心

各半兩

大黃

炮 二稜 各貳兩

右為細末用米醋壹椀熬大黃末為膏次入餘藥末和元如梧桐子大空心溫酒吞拾元漸漸加至貳拾元以利下惡物為度

治婦人疝瘕及血氣疼痛**巴豆元**

巴豆

去皮心 醋煮

礞砂

大黃

五靈脂

桃仁

各叁分 木香

右為末煉蜜元如綠豆大淡醋湯空心五元熱酒亦可

良方**與神元**

神麴

茴香

各肆兩 木香

椒炒香出汗

丁香

各半兩 檳榔

漆陸兩半生半用 香

右除椒漆伍物皆半生半炒為細末用煎生熟漆和元加彈子大茴香末拾貳兩鋪陰地陰乾候外乾并茴香收器中極乾去茴香腎餘腸膀胱瘕瘕及疝墜五膈血崩產後諸血漏赤白並壹元分四服死胎壹元皆綿灰酒下難產炒葵子肆枚枚搗碎酒煎下壹元諸疾不過叁服瘕氣拾服膈氣瘕瘕伍服血瘕叁元當差子婦病腹中有人塊如杯每發痛不可忍時子婦已貴涼下善醫者然為難矣前應之日此血瘕也殺黑神元叁元杯氣盡消然身不復作

婦人八瘕方論第九

凡一方

夫婦人八瘕者皆由胞胎生產月水往來血脈精氣不調之所生也腎為陰主開閉左為胞門右為子戶主定月水生子之道胞門主於子精精神氣所出入台於中黃門玉

門四邊主持關禁閉子精麟下三寸名曰關元主藏魂魄
婦人之胞三焦之府常所從止然婦人經脈俞絡合調則
月水以時來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絕不
通邪氣便得往入合於其藏若生血未盡而合陰陽即令
婦人血脈攣急小腹重疼支滿胃脅腰背相引四肢疼痛
飲食不調結牢惡血月事不時或前或後因生聚如懷胎
狀邪氣盛甚令人恍惚多夢寒熱四肢不舉陰中生氣腫
肉生風甚者害於小便小腹築痛淋瀝面色黃黑則不復
生子其八瘕者黃瘕青瘕燥瘕血瘕脂瘕狐瘕蛇瘕蟹瘕
是也千金外臺言之詳矣

治婦人血瘕血積經候不通 出本事方

桃仁 各乙兩 大黃 各乙兩 蝨虫 炒黑 川朴消 乙兩

右四味為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升
五合下大黃桃仁蝨虫等不住手攪欲下手負下朴消
更不住手攪良久出之負如梧桐子大前一日不用喫
晚食五更初用溫酒吞下五元日午取下如赤豆汁或
如雞肝蝦蟇衣狀未下再作如鮮血來即止續以調血
氣藥補之此方出千金 便年有通膈腹脹不可
作淋治如八正散之類數種皆治不通痛愈其苦
此血瘕也非腫脹不可若子用此藥更初服六日
痛痛不可忍遂少須下血塊如拳者數枚小如黑
直樹酌者

婦人腹中瘀血方論第十 凡二方

夫婦人腹中瘀血者由月經不澁不通或產後餘穢未盡
因而乘風取涼為風冷所乘血得冷則成瘀血也血瘀在

內則時時體執面黃痰久不消則變成積聚癥瘕也

桃仁散

蝨虫

水蛭

烏賊骨

鯉魚鱗燒灰

芫花醋炒

枳殼

當歸炒

牛膝

赤芍藥

礞砂

桂心各半兩

桃仁三分

右為細末食前溫酒調下一錢

桃仁丸

治婦人腹內有瘀血月水不利或斷或來心腹痛

桃仁

大黃炒各二兩

蝨虫炒去翅足

水蛭各四枚炒焦

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五元熱酒吞下未知

加至八員

婦人癥痞方論第十一

凡三方

夫婦人癥痞者由冷熱不調飲食不節積在腹內或腸胃

之間與臟氣結搏其牢強推之不移者名曰癥言其病形

徵可驗也氣壅塞為痞言其氣痞澁不宣暢也皆得冷則

發動刺痛癥痞之病其形冷結若冷氣入於子藏則使無

子若冷氣入於胞絡搏於血血得冷則澁亦令月水不

通也

四肢瘦弱

川山甲炒

鱉甲醋炙

赤芍藥

大黃炒

乾漆炒令烟

桂心各半兩

川芎

芫花醋炒

當歸各半兩

麝香壹分

右為細末入麝香令得每服一錢無時熱酒調下

蓮花散

治婦人癥痞腹脇妨痛令人體瘦不思飲食

義茂三分

當歸炒

桂心

赤芍藥

攢椰

枳殼

木香

昆布

琥珀

各半兩

桃仁

驚悸

大黃

各壹兩

右為末煉蜜食如梧桐子大食前粥飲下貳拾元

治婦人癥痞結塊不散心腹疼痛

雄雀巢

各壹兩

硃砂

當歸

芫花

各半兩 巴豆壹分

右為末同研令停醋煮麩糊食如小豆大當歸酒下元

婦人食癥方論第十二

凡二方

夫婦人食癥者由臟腑虛弱月候來時食生冷之物脾胃既虛不能消化與藏氣相搏結聚成塊日漸生長盤牢不移故謂之食癥也

治婦人食癥久不消令人瘦弱食少

硃砂

青礞石

穿山甲

三稜

乾漆

硫黃

巴豆

各半兩

右為末用軟飯食如小豆大每服伍元生薑搗皮湯下

治婦人食癥塊久不消攻刺心腹疼痛

青礞石

巴豆

朱砂

粉霜

木香末

各壹兩

右研令停以糯米軟飯食如綠豆大每服貳元空心

溫酒下取下惡物為度

婦人積年血癥塊方論第十三

凡七方

夫婦人積年血癥者由寒濕失節臟腑氣虛風冷在內飲食不消與血氣相結漸生癥塊盤牢不移動者是也皆因血氣勞傷月水往來經絡不流惡血不除結聚所生也

久而不差則心腹兩脇苦痛等於飲食肌膚羸瘦
治婦人積年血癥塊或攻心腹疼痛四肢不和面少血色
飲食全少

乾漆炒令 大黃炒 琥珀 礪砂研

硝石研 莪朮各三分 紅花 延胡索

桂心各半兩 膩粉壹分 巴豆用

右為細末用棗肉和負如無桐子大每服伍元於日未
出時煎蘇木湯吞下量意人輕重加減服之

治婦人積年血癥塊不消狀若鬼胎之候宜服

琥珀研 桂心 牛膝 荒花製

檳榔 挑仁炒各 生地黄 延胡索

當歸各半兩 鱉甲 三稜 乾漆炒

礪砂各壹兩 大黃貳兩 麻虫四十九枚 水蛭四十九枚

右為末醋煮礪砂為膏入麻末和搗三二百杵負如梧
桐子大每服拾元空心温酒下

治婦人積年癥塊不消

礪砂 乾漆 雄黃 水銀以少

雄雀糞各壹分 巴豆拾粒

右研停用棗肉負如綠豆大空心當歸酒下參元臨卧
再服取下惡物為度

理五積氣瘕及驚悸血積癥癖血瘕發散攻刺疼
痛嘔逆噎塞心中迷悶不醒人事及血鼓癥瘕脹滿經脉

不行者 靈苑方

荒花去枝梗取 礪砂研 雄雀糞各壹分 巴豆拾粒

附子用七片

當歸

桂心

木香

沒藥別所

肉豆蔻一枚

班猫三枚

三枚去頭足通研

附子用七片

右一十二味除班猫沒藥餘為細末與班猫沒藥一処

合研令停入前膏子內和搗千百杵元如赤豆大初服

壹元用醋炒羅白子令焦黑以酒浸同煎一二沸放溫

吞下漸加至五負七負即止如急卒血氣攻心脾以酒

醋共一銀錢煎沸吞下婦人血痕癢癬結塊攻心疼痛

悶絕久醫不効者入禹餘糧一兩火煨醋焯七次研細

和藥為負每服五負用蘇木節二兩細剉酒三升煎至

七合去滓分為三服吞藥併進三服當汗出則瘥隨大

小腸逐下其病立差人弱者每服只二負如是丈夫元

臟小腸氣脾積氣癥塊等疾即入丹砂二兩細研和停

以生姜鹽湯吞下二負

五靈脂 治婦人積年癥塊及惡血氣久不除者

五靈脂

乾漆心相尺

川烏各乙兩

麝香

硫黃

礞石半兩

巴豆二十枚

去心

右為末研停醋煮麪糊負如綠豆大每服五負空心溫

酒下

三棱 治婦人血癥血瘕食積痰滯出選奇後集

三棱

莪茂各一兩

青橘皮

去白半下

麥芽炒各乙

右用好醋六升煮乾燬為末醋糊負如梧桐子大每服

三四十真淡醋湯下痰積多薑湯下

治婦人久虛積冷經候不行癥瘕癖塊腹中卒暴疼痛而有黥黥積聚羸瘠百病方

經煖花葉石 研兩半

礪砂 以布隔湯淋

桂心 別為末 木香

乾薑 各一兩 縮砂仁 二兩

紅豆 半兩 班猫 百个

臘川狗 胎十枚 生地黄汁

童子小便 各二 虻青 二百个

以糯米一升同炒米黃去米不用

右玖味為末同三汁熬為膏和上末真如雞頭大朱砂為衣每服一負濕消噉破食前服米飲亦可孕婦莫服

婦人血氣心痛方論第十四

凡五方

夫婦人血氣心痛者由臟腑虛血氣不調風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者成疔者心為諸臟之主而主於神其正經不可傷傷之而痛者各為真心痛朝發夕死別絡為風冷所乘而痛者故痛發不輕不甚而成疔者也

治婦人血氣攻心痛發歇不定

烏藥

義茂

桂心

當歸 炒

桃仁

青皮

木香

右等分為末每服一錢熱酒調下

治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣

當歸 炒

桂心

青皮

附子 炮

阿魏 炒裏畏其

白木

川芎 各一兩

吳茱萸 泡

木香

乾姜 各三分 檳榔

肉豆蔻 畏

延胡索

義茂 各一兩 朱砂 細研

右為末先以醋壹升煎阿魏成膏和藥末搗三百杵
如梧桐子大每服貳拾元食前熱酒下

雞舌香散

治男子婦人九種心痛一切冷氣

良薑

劉銜

桂心

赤芍藥

等分

右為細末每服貳錢水一錢入鹽木瓜三片同煎七分
溫服鹽湯點亦血氣汕瘦痛用熟醋湯調下忌生冷

又一方

治人疝遺尿不可忍者搗入血氣作心脾痛在動方同只無

桂心用醋煎醋湯點亦可乙丑年春初以女年十五經

飲不山崩崩流皆無以香元神保元聖中

元阿子藏上氣湯皆無以香元神保元聖中

懷氏一神元

治婦人血氣不和作痛不止及下血無時月

水不調

真蒲黃

草撥

右等分為細末煉蜜食如梧桐子大每服三十元空心

溫酒吞下如不能飲失飲下兩服即止

復自藥酒

治婦人血風血氣等疾武興戎司機宜侯

愷云見一道人用此方療病不一而足遂以為獻真是妙

五靈脂

桂心

各

古為末空服貳大錢酒半錢水半錢煎至八分疾作熱

服

失笑散

見

阿子散

見

亦妙

靈苑方治婦人卒血氣心痛只用生五靈脂為細末每服

一錢酒一錢煎沸熱服

婦人血氣心腹疼痛方論第十五 廿二方

夫婦人血氣心腹疼痛由臟腑虛弱風邪乘於其間與真氣相擊而痛其痛隨氣上下或上衝於心或下攻於腹故云血氣攻心腹疼痛也

治婦人血氣攻心腹疼痛

- 延胡索 當歸 川芎 桂心 各參分
- 木香 赤芍藥 桃仁 各半兩

熟地黃 當歸

右以咀每服參錢水一椀薑三片煎至七分去滓熱服

治婦人血氣攻心腹煩躁胸亂疼痛不止

- 琥珀 沒藥 當歸 赤芍藥
- 牡丹皮 延胡索 蒲黃 莪茂

桂心 等分

右為末每服壹錢溫酒調下

沒藥散 治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行兒疝塊

痛 出 疝 塊

- 血竭 沒藥 桂心 當歸
- 蒲黃 紅花 木香 延胡索
- 乾漆 赤芍藥 等分

右為細末每服二錢熱酒調下食前服

治血塊衝心叫噉其痛不瘳者如喫不瘳可灌下

右用真 三錢熱酒調服立止

瑞金散 治婦人血氣痛月經不行預先嘔吐疼痛及月信不通

片子薑黃

牡丹皮

我茂

當歸

赤芍藥

川芎

紅花

延胡索

右為末每服貳錢水壹瓖酒參分煎七分溫服日參次

八儂散 治血氣心腹疔痛立驗

當歸

厚朴

芍藥

枳殼

人參

茯苓

肉豆蔻

右為末水貳升煎取捌合空心二分參服

八儂散

治婦人血氣心腹疔痛立驗

靈苑方

棕櫚

當歸

麝香

右同研令俚每服壹錢溫酒調下

不換金散

治婦人血刺痛不可忍者

靈苑方

三稜

莪茂

巴豆

靈苑方

右參味以醞醋壹碗熬醋成膏為度先將糠固濟一罐

子陰乾後將藥并醋膏一處置罐子中外用泥裹以平

一瓦子一片蓋之用炭火五七斤煨常看守纔候煙急出

即取出看通黑則止不得燒過了便入乳鉢內細研為

末有患者炒生薑酒調一錢服

治婦人急血氣

靈苑方

大生烏頭

牡丹皮

桂心

右為細末每服壹錢酒半瓖童子小便半瓖煎至柒分

溫服如婦人血瘦血氣胎血積聚上衝心膈須臾欲絕

者用酒壹瓖生薑壹片煎至柒分去滓通口報

大效琥珀散

治婦人心膈迷悶腹藏拍撮疔痛氣急氣悶

月信不調等疾 靈死方

烏藥 我茂各貳兩 當歸壹兩

右並生為細末温酒調貳錢服服後以食壓之忌生冷
油膩等物如是產後諸疾炒生薑酒調下

治血氣不調臍下痛

桑耳 菴藷子 桂心 土瓜根

川芎各肆分 甘草貳分 牛膝 赤茯苓各伍

大黃 白芍藥各陸 乾地黄捌分

右為末煉蜜元如梧桐子大醋湯吞下貳拾元

痛散 治婦人血氣刺痛

荔枝核燒存性 香附子去毛炒

右為細末鹽湯米飲調下貳錢不拘時候服

沒藥散 治婦人血氣疼痛不可忍者出博濟方

紅花 沒藥 當歸 延胡索炒

右等分為末每服貳錢童子小便酒各半錢同煎至六
分熱服只用秤錘淬過調亦可常服只用温酒

生方 治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼痛不思飲食

出傳

牡丹皮 桂心 當歸 延胡索各壹兩

我茂 牛膝 赤芍藥各壹兩 荆三稜壹兩

右為粗末每服參錢水壹瓊酒半錢煎柒分温服

至聖湯 治婦人血氣產前產後百疾出全前

當歸 芍藥 乾薑 我茂

桂心 地黄 蒲黃各半 黑豆壹兩

右為細末空心熱酒調下貳錢

天德散卷第七論 **靈苑方**方見本卷 **調經散**方見第一卷

治婦人腹脇刺痛以芎藭方七氣湯加延胡索少許同煎服若胃膈不快惡心更開服芎藭為丸為沉湯兼治月水不調或前或後

芎藭散 治婦人脾血積氣及心脾疼男大德備錄

芎藭以節者 吳茱萸炮 香附子炒去毛

右參味並剉細以醪醋伍升煮乾為度焙乾為細末以好神麴打糊為元如梧桐子大空心食前以淡薑湯吞下四五元日三服摘皮湯亦好

治婦人血氣走作疼痛不可忍者及月水不調面色痿黃喫食減少及產後諸疾並皆治之 **延胡索散**

延胡索生 三稜生 當歸酒浸 莪朮醋浸

右為末每服貳錢空心溫酒調如血氣發甚者及月水不調並皆童子小便酒紅花同煎調下

治婦人久積血氣時發刺痛肌瘦乏力月候不調 **當歸散**
元 當歸別兩 續榔 赤芍藥 牡丹皮

延胡索各兩

右除當歸末用米醋熬成膏入衆藥末和負如梧桐子大空心溫酒下貳拾元午食前再服

治婦人積年血氣攻刺心腹疼痛不可忍者及多方醫療未差宜服 **神聖北** **靈苑方**

北亭去砂 沒藥 木香 當歸各壹分
羌花 莪朮各半兩 巴豆去皮膜

右先研北亭沒藥巴豆如粉用好米醋三升同煮為稀膏然後將餘肆下為細膏內搜合成塊用新瓦合盛之臨時加減元數用酒醋各半燒煎數沸通口服不得齧破仍須熱盡酒醋立差或男子元氣亦依前方服食如急喉閉者男左女右以壹元鼻中嗅之立愈具中云臨時加減負數皆不云大小數目詳之古人亦鹵莽也既有北亭羌花巴豆合當負如綠豆大每服只伍元

治產前產後血氣不和及一切疾靈散
當歸微炒 川芎各壹兩 赤芍藥貳兩 羌活壹兩 獨活壹兩
右為末每服貳錢空心溫酒調下如腰腹痛加陳皮去白半兩乾薑炮半兩為末同和停如不喫酒以水壹錢煎至柒分溫服

婦人血氣小腹疼痛方論第十六 凡四方
夫婦人小腹疼痛者此由胞絡之間夙有風冷搏於血氣停結小腹因風虛發動與血相擊故痛也
治婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛靈散

葳靈仙壹兩 當歸 沒藥 木香 桂心各半兩

右為細末無時熱酒調下壹錢服忌茶
治婦人久積血氣疔刺小腹疼痛四肢無力不能飲食宜

當歸散

當歸炒 赤芍藥 劉寄奴 沒藥

枳殼 延胡索等分

右為細末熱酒調下壹錢無時候

追氣元 治婦人血刺小腹疼痛不可忍 靈苑方

芫臺子微炒 挂心各壹兩 良薑半兩

右為細末醋糊元如梧桐子大每服伍員無時淡醋湯下常服補血虛破氣塊甚有效

石灰散 治婦人血氣痛不可忍者陳五婆方出婦人

右取猪貼脊血半瓊於湯上煖用杖子攪停後用石灰於火上燒令黃為末羅過入灰壹錢同血攪停放溫服立愈

婦人兩脇脹痛方論第 一十七 凡六方

夫婦人兩脇脹痛者由臟腑虛弱氣血不調風冷之氣客於腸胃傷於胞絡之間與血氣相搏壅塞不宣邪正交爭衝擊故令兩脇脹痛也

治婦人脾胃虛氣攻兩脇脹痛 單豆蔻散方

單豆蔻 呵子肉略壹 挂心 舌梗

厚朴各叁分 甘草壹分 川芎 當歸

乾薑 檳榔各半兩

右為粗末每服肆錢水壹瓊煎柒分去滓熱服食前

治婦人臟腑虛冷宿冷氣攻兩脇脹痛坐卧不安 審蘭子散

審蘭子 延胡索 桃仁 挂心

琥珀 當歸各壹兩 赤芍藥 木香

沒藥各半兩

右為末每服貳錢溫酒調下無時候

人參紫金元 治婦人榮衛不和心腹刺痛胃脘脹滿不進

飲良 蘇武傳方

紫金元 蒼朮 石菖蒲略壹 香附子貳兩

人參 半兩 木香 參錢

右為末米糊和真如梧桐子大每服參拾負食後置湯

氣針元 治久積風墜疎利滯氣空胃滿止刺痛

木香 青皮 去白 大黃 炮 檳榔 各壹兩

黑牽牛 貳兩 半

右為末煉蜜元如梧桐子大溫水下參拾元

氣痛發神保元愈不一二日用痛再服神保元以香薑桂等藥
而大開不通其疾轉甚亦有要用沉香木香薑桂等藥
而未敢服者痛甚則築心築背築定兩脇伏有兩柴十字
問神定心脇痛其何如天召僕診之六脈沉伏不可準也但
痛此用藥觀其人何如肥者曰夫九痛之脈不可準也但
也總云大滿人實者不可下之痛其手不可向通此大實
腹脹又已未在金陵有家提幹元五六百通此大實
益甚召僕診之六脈沉伏而和不可向通此大實
手如火以此知其實痛也衆問如何治療僕曰大凡心
即生風痛不可便作虛冷治療有兩醫答曰非冷而何熱
又仲景云云腹痛者注枝加芍藥湯痛甚者注枝加黃芩湯
家醫之辨云云前在素來質弱僕曰有可辨之遇痛時使
痺按之若痛止是虛寒也若按之不可近則與異常僕曰此
實痛也西令一辨嚴之手不可近則與異常僕曰此
熱無可疑者當用大柴胡湯治之
服愈

論脇肋疼痛服**木通散**亦可治男子

心下脇肋少腹疼痛皆素有積寒而溫煖湯散亦可主治
甚者以溫藥下之心下與小腹痛諸書並有效方而脇肋

下痛鮮復治法此

木通散 治脇肋苦痛偏効併心下脇肋并小腹牽引痛者

皆主之

木通 去皮節 青皮 去白 川練子 去皮拔各壹兩 巴

兩炒黃夫 羅蔔子 炒 舶上茴香 兩 莪茂

木香

滑石 各半兩

右為細末煎葱白酒調三錢壹服愈其若不通再服

三陰散 治中焦虛弱兩脇刺痛面目手足浮腫大便祕澀兼治脚氣

大腹皮

紫蘇

沉香

乾木瓜

獨活 各半兩

川芎

木香

甘草

陳皮

檳榔 各三分

右以咀每服參錢水壹錢煎至柒分去滓空心熱服日

中脈痛者以京州者為婦人中暑虛痞腹脹痛大便

而愈

婦人心腹脹滿方論第十八

凡三方

夫婦人心腹脹滿者由臟腑久冷氣血虛損而邪氣客也

乘於心脾故也足入陰脾之經也脾虛則脹足少陰腎之

經也其脉起於小指之下斜趨足心入跟中上股內後廉

貫腎絡膀胱從腎上貫肝膈入肺中其支者從肺出絡於

心藏虛邪氣客於三經與正氣相搏積聚在內氣并於脾

脾虛有脹故令心腹煩滿而脹也診其脉遲而滑者脹也

白朮散 治婦人脾胃氣虛心腹脹滿不欲飲食四肢少力

白朮

草菓仁

河子肉 各二分

赤茯苓

檳榔

桂心 各半兩

陳皮

厚朴

人參 各壹兩

甘草 壹分

水一盞

右為粗末每服肆錢薑參片葉膏夜煎至柒分去滓食

前熱服

檳榔散 治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食

檳榔

前胡

川芎

青皮

參分

赤芍藥

桂心

大黃

苦楝

木香

枳殼

甘草

青分

右為嘔吐母服肆錢薑棗二片煎至柒分去滓溫服無時

易之六分心氣飲亦妙方見本卷三脫散亦妙方見本卷

治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食木香散

木香

桂心

白朮

乾薑

陳皮去白

草果仁

訶梨勒

人參

神麴炒黃

甘草

各半兩

右為細末每服壹錢如茶點熱服

新編婦人大全良方卷之七

