

濟生拔粹方

九

雲岐子保命集論類要卷上

辨脉三部九候



凡持脉須明三部九候不知者未足言診脉之道三部者寸关
上部主鬲上至頭之有疾關為中部主鬲下至臍之有疾尺
為下部主臍下至足之有疾故為三部也九候者浮沈二指
之下浮沈二候者二而成天中沈二候者三而成人沉診二
候者二而成地三而三之故為九候此四十五動平脉法也
如三指之下浮沈得六數七極者熱實於表當瀉表宜麻湯
如浮沈得二遲二敗者為表虛也當補其虛宜桂枝湯
如中沈得六數七極者其中焦之熱實宜調胃承氣湯瀉之
中沈得二遲二敗者中焦虛也當補之以建中湯理中湯
如沉沈得六數七極者下焦熱實以大承氣湯瀉之

沉沈得二遲二敗者下焦之虛也以姜附湯補之

麻黃為瀉能瀉表之實不能瀉裏之實桂枝湯為補而能補
表之虛不能補裏之虛姜附為補不能補表之虛而能補裏
之虛承氣為瀉能瀉裏之實不能瀉表之實建中之補能補
中焦之虛而不能補上焦下焦之虛調胃為瀉能瀉中焦之
實而不能瀉上焦下焦之實也

辨傷寒溫病

問曰傷寒溫病何以脉辨答曰溫病冬傷於寒所得也至是變
為溫病傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦溫病
也經曰溫病之脉行在諸經不知何經之動隨其經所在而
取之

如太陽證汗下後過經不愈沈得尺寸俱浮者太陽溫病也

如身熱目赤汗下後過經不愈訖得尺寸俱長以陽明溫病也
如背脇痛汗下後過經不愈訖得尺寸俱弦少陽溫病也
如腹滿噎乾訖得尺寸俱沉細過經不愈太陰溫病也
如口燥舌乾而渴訖得尺寸俱沉過經不愈少陰溫病也
如煩滿囊縮訖得尺寸俱微緩過經不愈厥陰溫病也
是故隨其經而取之隨其證而治之如發斑乃溫毒也

刺傷寒結胃痞氣

傷寒下後結胃痞氣皆足三陰之終手三陰之始胃中結痞過
在足少陰腎手厥陰包絡刺兩經之井原以瀉胃中之氣心
中結痞過在足太陰脾手少陰心刺兩經之井原以瀉心中
之氣

胃中結痞過在足厥陰肝手太陰肺刺兩經之井原以瀉胃
中之氣 或上中下三腕應痞結而瀉之

刺傷寒三陽頭痛

傷寒三陽頭痛何法刺之答曰手之三陽足之三陽皆會於頭
者謂諸陽之會其受邪伏留而不去故曰三陽頭痛視其色
脉知在何經
如脉浮而頭痛過在足太陽刺腕骨京骨
如脉浮而長過在手陽明刺合骨衝陽
如脉浮而弦過在手足少陽刺陽池丘墟風府風池刺頭痛
之法也

刺三陰腹痛

傷寒邪在三陰內不得交通故為腹痛手足之經皆會於腹
如脉弦而腹痛過在足厥陰刺太衝太溪太陵

如脉沉而腹痛過在足少陰腎手厥陰心包刺太谿太陵
如脉沉細而腹痛過在足太陰脾手少陰心刺太白神門三
陰交刺腹痛之法也

桂枝湯二十八證方二十四道

桂枝湯

桂枝加蒼根湯

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝加附子湯

桂麻各半湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝二越婢一湯

桂枝甘草湯

桂枝加桂湯

桂枝加人參湯

桂枝去桂加白朮湯

桂枝加大黃湯

桂枝湯論

傷寒論卷二

二

尺寸俱浮太陽受病當一二日發以其脉上連風府頭項痛腰
脊強太陽經始於目內眥從頭下至足終於至陰為表之表
其太陽者標熱本寒為太陽之表表陽則熱本者膀胱之裏
主水故寒脉浮為在表故太陽經病身熱惡寒頭痛項強腰
痛凡治太陽不可利小便不可妄下利小便者熱傳於裏而
為血證下之則變為結胸此太經病所禁也若傳於本者可
利小便本為膀胱有熱小便赤澀何禁也太陽中風風傷衛
衛氣虛而脉浮身熱自汗惡風宜桂枝湯補之表虛故也桂
枝辛熱生姜辛溫甘草甘平大棗甘溫芍藥酸苦微寒而收
實其衛氣而止汗辛甘發散風邪為陽矣

桂枝湯

桂枝

芍藥

生姜

甘草

大棗

桂枝湯

右劉如麻豆大每服五錢水一盞煎至八分去滓溫服

太陽中風陽浮者寸浮也陰弱者尺弱也表虛自汗鼻鳴者肺通於鼻鼻和則聞香臭矣肺氣受邪而不通肺主衛風傷衛故鼻鳴乾嘔汗出惡寒太陽標病當補其衛汗不得外泄故使榮氣內守宜桂枝湯

太陽脈浮而弱不及平脈頭痛項強發熱汗出惡風者太陽標病故宜桂枝湯

太陽標病脈浮而長項背強者太陽也凡凡發熱不惡寒者陽明標病與太陽相併均宜桂枝加葛根湯

桂枝加葛根湯

桂枝

芍藥

甘草

各陸分

葛根壹兩

生姜

壹兩

大棗

肆枚

右劉如麻豆大每服五錢煎服

保命金卷十一

四

太陽標中風身熱頭痛項強惡風反下後脈浮而弱自汗而喘肺主於氣上逆而喘因下動胃氣加厚朴屬陽明上氣而逆屬肺加杏仁故宜**桂枝加厚朴杏仁湯**

桂枝

芍藥

生姜

各壹兩

甘草

陸分

大棗

肆枚

厚朴

杏仁

各加伍分

右劉如麻豆大每服五錢水一盞煎服

太陽標本病頭痛項強惡風身寒自汗脈浮而微發汗遂漏不止小便難而清四肢急難以屈伸者太陽標與少陰本相併

故宜**桂枝附子湯**

桂枝

生姜

各壹兩

大棗

叁枚

芍藥

甘草

各壹兩

附子

半枚

右劉如麻豆大水煎服

太陽標本病頭痛惡寒下之後膏滿脈促太陽標太陰本相併

桂枝加芍藥湯脈微而遲大陽與少陰相併故加附子

桂枝加芍藥湯

桂枝 生姜各壹兩半芍藥參兩半大棗陸枚

痛甚者加大黃大實痛裏傳表

右咬咀每服五錢水煎服

桂枝加附子湯

桂枝 甘草 生姜各壹兩半大棗陸枚附子去皮臍

右咬咀每服五錢水煎服

大陽標病脈浮而大頭痛項強八九日如瘧狀熱多寒少不嘔者無少陽清便自調者裏和也寒熱榮衛俱病故宜

桂枝麻黃各半湯

甘草各半兩大棗貳枚麻黃半兩桂枝捌錢芍藥 生姜

右咬咀每服五錢水煎服

大陽標病頭痛項強身熱惡寒脈浮而洪過於平脈而自汗不止衛氣不與榮氣諧和刺風池風府整太陽之綱却與桂枝汗又不止形似瘧一日再發非桂枝證也脈洪大者故獨桂枝不愈可與桂枝二麻黃一湯和其榮衛

桂枝湯

桂枝捌錢芍藥伍分麻黃參錢去節 大棗貳枚生姜伍錢杏仁捌枚浸去皮尖

右剉如麻豆大每服五錢水煎服

太陽病頭痛項強熱多寒少脈微而弱陰脈也熱多寒少右陽明太陽與陽明標併宜

桂枝 芍藥 甘草 麻黃各參錢生姜伍錢半

石膏半兩大棗貳枚

右咬咀每服五錢水煎服

桂枝證或下之頭項強痛發熱無汗心下滿疼小便不利熱不

除宜桂枝湯以助其汗芍藥 壹兩半 大棗 陸枚

甘草 生姜 茯苓 白朮 各壹兩

右咬咀每服伍錢水煎服小便利止後服

太陽標病身熱頭痛項強寸浮尺弱寸浮汗自出尺弱熱自發

陰虛則發振陽浮則惡寒翕翕發熱為脫振鼻鳴乾嘔者裏

和表有病桂枝湯主之

太陽病如瘧頭痛項強發熱惡寒熱多寒少一日三二度發脈

浮微緩者欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗更

下更吐也

如汗下後面反有赤色者未解也不能得小汗出非獨桂枝

證也身痒者榮衛不行可用桂枝麻黃各半湯

太陽經病外證未解脈浮弱者浮者為陽弱者為陰法當自汗

故宜桂枝湯

太陽病禁下下之後身熱惡風脈浮者表未解脈浮而微者陰

也法微喘而為傷肺下之傷胃故宜桂枝厚朴杏子湯

太陽病身熱惡寒惡風脈浮者表未解下之逆也解表宜桂湯

太陽病身熱惡寒惡風脈浮而弱自汗出而不止榮衛不和也

宜桂枝湯

太陽病脈浮而弱身熱小便清知不在裏太陽本不病邪在標

宜桂枝湯

太陽病頭痛項強身熱發汗則解半日復煩者脈浮數未解也

可更發汗宜桂枝湯

太陽病身熱頭痛脈浮而緊無汗醫發汗過多其人又手自冒
心心悸欲得按者因發汗多虛故也宜桂枝加甘草湯以
緩之也

桂枝甘草湯

桂枝

甘草 各壹兩

右咬咀每服五錢水煎服

太陽病脈浮而緊身熱頭痛項背強當發其汗醫妄下之清穀
不止身疼痛其脈緊而微當救裏宜四逆湯候身不疼痛清
便自調急當救表宜桂枝湯

太陽病脈浮而弱身執惡風頭痛項強自汗不止榮弱衛強榮
弱者汗自出血不能守而泄於外衛不能護是知榮衛不和
也欲救邪風宜桂枝湯

太陽經病頭痛項強身熱不罷者不可下是禁也下之爲逆醫
以小發其汗邪氣不越則面色正赤陽氣怫鬱而不得越也

傷寒集

蓋當汗而不汗也故其人躁煩者邪氣不能散也行於經中
乍在四肢乍在腹中按之不能得經一兩次汗解邪氣不除
則致病人短氣但坐者虛也故汗出不徹脈浮而濇故知之
更發汗則愈太陽中風脈浮而緩今反浮而濇者因小發汗
脈濇而緊者身必疼痛當大發汗如尺中弱者不可發汗尺
者陰也弱者陰虛也陰主血虛則尺虛不能作汗故知禁也
病常自汗出榮氣和也不解者衛氣不與榮氣和也脈居榮
衛之中榮衛和則脈平榮衛不和則脈病當和榮衛使脈得
平宜桂枝湯

太陽病苦頭痛者必衄乃邪無從出也宜桂枝湯

太陽標病頭痛身熱項背強脈浮而大法當汗解脈浮大而熱
甚醫又重之令其汗出病人反煩燥而不解後必清血便血

或衄血皆心邪所致也是謂實實虛虛禁之一也
其脉数者豎豎又灸之火邪隨經而為煩逆助陽損陰乘虛而
助實流散脉中焦骨傷筋焦骨為骨蒸傷筋為筋緩從腰下
重者傳陰力也名曰火逆禁之二也

凡病欲解必先煩燥汗欲出也醫又燒針令汗榮衛不和加
燒針則寒邪核起而赤不散盛火之氣發腠脉從少腹上衝
心痛皆燒針之過也所禁者三也太陽標病薰針灸三禁而
發變者宜**桂枝加桂湯**

桂枝貳兩芍藥 生薑各壹半甘草壹兩大棗陸枚

右咬咀每服五錢水煎

太陽病外未除數下之頭痛身熱惡風脉浮而弱醫反數下之
此其禁也表證不除脅熱而利邪氣從虛而入其脉尚浮宜

桂枝加人參湯人參甘溫以甘緩之桂辛熱以辛散之甘緩
其中辛散其表故宜**桂枝加人參湯**

桂枝壹兩甘草壹兩白朮 人參 乾薑各壹兩

右咬咀每服五錢水煎

太陽病頭痛身熱惡寒脉浮醫反下之後又發其汗不當下而
下心中痞而惡寒脉浮不可攻痞攻之為逆解表宜桂枝湯
表解後攻其痞宜大黃黃連瀉心湯

太陽傷寒頭痛身熱惡寒惡風身疼煩不能轉側者太陽表中
風寒濕之氣風則身熱頭痛自汗濕則肢節煩疼身重故也
寒則浮而瀦瀦則陰盛而患寒宜桂枝加附子湯

太陽標病身熱惡寒風脉浮而緩大便硬屬陽明小便不利太
陽本也欲下之其脉浮而緩有太陽表證宜戒其辛而加其

甘甘緩其中不發不攻也故桂枝去桂加白朮湯

太陽病身熱惡風項背強而脈浮反下之腹滿痛而利屬大陰宜桂枝加芍藥湯

如胃中滿痛而實不自利脈浮者當以寒治熱以苦能泄宜

桂枝加大黃湯

桂枝冬錢芍藥壹兩甘草 大黃各半兩

右以咀每服五錢水二盞棗一枚生姜四片同煎

太陰標病腹滿咽乾脈浮者有太陽也當從脈浮治宜桂枝湯不自利者勿加芍藥

麻黃湯十證方五道

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

麻黃升麻湯

太陽尺寸脈俱浮脈從標本桂枝主衛而在表故風則傷衛衛者氣也氣從於表太陽行身之後故先用桂枝寒則傷榮榮者血也血為有形之說血近於經經有始終榮衛營周不息豈有止也寒邪傷榮脈浮而緊身熱惡寒頭項痛而無汗故終始者為經以身熱者為表以浮者為標故太陽病先桂枝次麻黃麻黃為瀉表之實

麻黃湯

麻黃貳兩半桂枝壹兩甘草半兩杏仁伍拾個
去皮尖

右剉如麻豆大每服五錢水煎服取似汗

太陽標病身熱頭項背強身疼惡風是寒則傷榮脈浮而緊表實無汗而喘者宜麻黃湯

太陽標病頭痛身熱右陽明標發熱不惡風而反惡熱者宜
長喘而官滿不可下當從脈浮而治以麻黃湯解表少陽
也

太陽病頭痛項背強十餘日不解脈浮而細官中滿脇痛者太
太陽少陽併病與小柴胡湯如脈浮而不細反緊者宜麻黃湯
太陽標病身熱惡寒脈浮而緊無汗身疼痛表實榮氣不得泄
煩燥必衄宜麻黃湯 當汗不汗則衄也

太陽標病脈浮緊而頭痛已發其汗雖漏不止不可行桂枝自
汗而喘邪在上焦而無大熱者未傳入裏也宜麻黃杏仁甘
草石膏湯石膏之氣清治太陽頭痛甘緩其中杏仁治上焦
之喘非麻黃發汗之治也

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃 貳兩 杏仁 貳拾伍个 石膏 四兩 甘草 壹兩

右咬咀每服五錢水煎

太陽標病頭痛惡寒脈浮而緊無汗身疼痛八九日不解者未
經發汗微發其汗小除其煩目瞑劇者邪氣循經上攻頭者
諸陽之會必作衄也陽氣重故耳宜麻黃湯

少陰本病脈沉而遲身熱頭疼背強自太陽所變也當從少陰
治寒淫於內治以辛熱宜

麻黃附子細辛湯

麻黃 各貳兩 附 壹枚炮去皮臍

右咬咀每服五錢水煎

少陰標本病身涼脈沉頭痛無汗宜微發其汗

麻黃附子甘草湯

麻黃 甘草 各二兩 附子 壹枚炮去皮

右以咀每服五錢水煎服相次三兩服微汗出止

厥陰標病傷寒陰結不大便六七日大下之結去脈當浮則愈
反寸脈沉而遲手足厥冷寸脈沉而遲者少陰本脈故主咽
喉不利唾膿血四肢厥者為厥陰利不止為太陰為難治濕
之則咽中痛不可溫也宜麻黃升麻湯

麻黃 升麻 當歸 知母 麥門冬 石膏

黃芩 乾姜 芍藥 桔梗 石膏

茯苓 甘草 白朮

右以咀每服五錢水煎相次一服汗出止

葛根湯四證方二道

葛根湯 葛根加半夏湯 葛根黃芩黃連湯

太陽傷寒中風經与經合尺寸俱長陽明受病當二三日發以
其脉夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得卧陽明經始於鼻
交額中從頭下至足行身之前為表之裏其陽明經標熱本
實標陽則熱本於胃胃有水穀之海故本實其從標則浮而
長從本則沉而實陽明為肌肉之本標病身熱蒸蒸而不惡
寒本實胃中燥鼻乾目疼凡凡而熱陽明禁發汗在本者不
禁下發之則變黃證太陽主榮衛是也榮衛之下肌肉屬
陽明二陽併病葛根湯主之衛者桂枝榮者麻黃榮衛之中
麻黃桂枝各半湯榮衛之下肌肉之分者葛根湯又名解肌
湯

葛根 麻黃 桂枝 甘草 芍藥 生薑 大棗

右咬咀每服五錢水煎服取微汗

太陽經病項背強頭痛太陽從上至足凡凡而無汗肌熱者為

陽明惡風在表也脈浮而過於平脈有葛根湯

太陽經病頭痛項背強兀兀而熱不惡風目疼鼻乾而利者傳

陽明也脈浮大而長傳胃則嘔宜葛根湯

太陽經與陽明合病頭痛項強身熱不惡風脈浮弦不利陽

明本實但嘔者少陽也宜葛根加半夏湯

葛根 津兩 麻黃 參分 甘草 芍藥 桂枝 各半兩

大棗 參枚 半夏 陸錢壹字

右咬咀每服五錢水煎日三

太陽經與陽明標為病頭痛項強身熱鼻乾脈浮大而長宜葛

根湯解肌從陽明之治也若無陽明脈證獨有太陽脈浮自

汗惡風桂枝湯主之反下之裏虛利不止脈浮大而長者葛

根加黃芩黃連湯黃連苦而堅內能止下利黃芩苦寒主表

執裏實是以加之

葛根加黃芩湯

葛根 各兩 黃芩 參分 甘草 半兩 炙 黃連 各兩

右咬咀每服五錢水煎

青龍湯五證方一道

大青龍湯 小青龍湯

傷寒六經以太陽為始故皆為外證為內皆主表腹主裏太陽

行身之後為諸陽之表風寒中人先傷於表故外而之內邪

中衛者桂枝中榮者麻黃在肌者葛根在筋者青龍去葛根

而知石膏便為大青龍無水皆不用因水而用之也

大青龍湯

麻黃

各二兩

桂枝

各二兩

杏仁

五十個

大棗

五十枚

生薑

半兩

甘草

各二兩

石膏

如半個雞子大

右咬咀每服五錢水煎

太陽經中風頭痛項強脉浮而緊發熱中風脉當得緩自汗出

今反浮緊無汗而煩躁可解表宜大青龍湯

太陽經傷寒頭痛項強身不疼但重乍有輕時中風即脉緩宜

大青龍湯

太陽經病身熱頭痛惡風脉浮而滑表不解心下有水氣而嘔

噦者小青龍主之心下有水氣加細辛乾姜辛而散水五味

子酸收而止渴故宜小青龍湯

麻黃

芍藥

細辛

各三分

半夏

洗

乾姜

各三分炮

甘草

炙

桂枝

各二分

五味子

半兩

右咬咀每服五錢水煎

太陽經病頭痛身熱惡風因飲水而欬者邪在於表因飲水而

不消形寒飲冷則傷肺故微喘脉浮而緊宜小青龍湯

太陽經病頭痛項強腰脊強脉浮而緊是傷寒也法當解表反

飲冷水內無邪熱不能勝水故停心下乾嘔而欬或渴或嘔

水停心下或利水氣逆上或小便不利膀胱受濕或喘傷肺

宜小青龍湯

柴胡二十證方五道

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

小建中湯

柴胡桂枝乾姜湯

尺寸脉弦者少陽經受病也當三四日發以其脉循脇絡於目

故脅脇痛而耳聾少陽經始於目銳眦終於耳後下至

足交膈中故背脊中痛絡耳則耳聾清腸則腸痛風熱之目
銳皆尺寸俱弦從膽經傷木脈從其本也足少陽本陰之身
之側從探湯水之子故發熱從本陰木之母故惡寒可汗
明後有太陽木居於中故往來寒熱治以陽有三味不可汗
不可下不可利小便表解者有高下有淺深皆各不同自桂
枝至青龍表解盡也已有太陽柴胡證與少陽標與經相
併所致也三陽自少陽而傳陰陰懼邪而嘔傳陽則寒熱六
爭少陽者為病內不得入外不得出半陰半陽非尋辛甘酸
苦之藥柴胡黃芩味苦寒而從陰半夏生姜味辛熱而從陽
人參甘草大棗味甘和而從中厥陰風木從乎中也主春分
之氣也其次有大柴胡從陰者二分之一從陽者一與承氣
相近為表之裏藥也生姜半夏大棗之辛甘發散為陽裏者

大黃枳實芍藥黃芩柴胡酸苦湯汁為陰多陰而少陽也故
名大柴胡湯陰陽各半故名小柴胡湯

小柴胡湯

柴胡 二兩 黃芩 七升半 人參 七升半
半夏 四分 大棗 三枚 甘草 六分 生姜 五分

右咬咀每服五錢水煎

太陽經病頭痛項強脈浮而緊者表病也今反浮細者外已解
也浮而細者表已和也設胃滿者少陽經病宜小柴胡湯脈

浮宜麻黃湯

太陽經病五六日頭痛項強腰痛脈弦而浮往來寒熱胃滿者
少陽也喜嘔者欲傳於裏也宜小柴胡湯

血弱氣盡腠理開邪氣因入與氣分爭往來寒熱休作有時
宜小柴胡湯主之

太陽經病頭痛腰脊強身熱過經者六經傳變至十余日先汗而表解後下之後柴胡證仍在大便結而煩脈數者宜

大柴胡湯

柴胡 肆兩 黃芩

芍藥 各壹兩半 半夏 壹兩半

枳實 半兩 大黃 半兩

右咬咀每服五錢生姜四片棗一枚同煎以利為度

太陽經病頭痛項強身熱惡寒脈浮而緊已發其汗而小差過經十三日不解脅滿而嘔者少陽經病也日晡發潮熱者

陽明經病也必大便秘宜柴胡加芒硝湯

柴胡 貳兩 黃芩 叁分 人參

甘草 各貳分 半夏 陸分

大棗 叁枚 生姜 芒硝 各半兩

右咬咀每服伍錢水煎去滓入硝再煎三二沸溫服

太陽傷寒頭痛項強五六日中風不解往來寒熱非桂枝證而

少陽經病脅滿苦滿嘿嘿不欲食者傳裏也心煩喜嘔者胃

虛也或脅中煩者邪在上焦也不嘔者胃實也或渴者裏熱

也或腹中痛者裏實也或心下痞硬者少陽結也或心下悸

動者裏熱也或不渴者裏和也或微熱者氣逆也宜小柴

胡湯加減用之

太陽經病六七日脈遲陰也浮弱者陽虛也虛則惡風寒手足

溫者表病也醫二三下之裏虛不能實而脇滿痛少陽也面

目及身黃者濕熱也項強者太陽經病也小便難也衛氣不

行也與小柴胡湯後必下重少陰本受濕也本渴飲水而嘔

者胃虛也柴胡不中與也脈遲而不弦者宜**小建中湯**

桂枝 壹兩 芍藥 叁兩 甘草 壹兩 膠飴 半升 大棗 陸枚

生姜 壹兩

右以咀每服五錢水煎去滓內膠泥再煎
遲再作一劑 加黃耆末一分

太陽經病傷寒陽脈瀯瀯者陰也陰脈弦者陰也尺寸俱是
陰脈也病當腹中痛先与小建中湯止裏表不和者与小柴
胡湯和之

太陽傷寒頭痛項強背脇痛而嘔者足太陽經与少陽經俱
病脈當浮弦日晡潮熱者陽明本也當大柴胡湯下之不得
利反自利者知醫用丸藥下之也傷寒之禁故言非其治也
潮熱者胃實也先宜柴胡解太陽少陽經病表解則柴胡
芒硝攻陽明之本可也

太陽經病十余日表傳於裏脈須浮熱結於內胃中實痛小便
赤澀往來寒熱宜大柴胡湯

太陽經傷寒五六日頭痛項背強脈浮汗出而解復下之裏未
實下後背滿氣痞於上小便清而不利氣結於下反渴陰陽
不和也頭汗出者陽動於上往來寒熱表裏不和宜

柴胡桂枝湯

柴胡 括萎根 各二兩
桂枝 壹兩 牡蠣 半兩 煎
黃芩 五分 乾姜 甘草 各半兩

右以咀每服五錢水煎

太陽經病五六日頭汗出者陽動於上微惡寒者太陽本也手
足逆冷者傳於內也心下滿大便難不欲食脈細者陽氣結
也非少陰也宜小柴胡湯二陰無頭汗故非也

太陽經傷寒汗出不解心下痞嘔以下利者宜大柴胡湯

太陽經病潮熱鼻乾身疼脈弦而長大便溏陽明本虛也宜瀉

不去者少陽經病也故宜小柴胡湯

陽明經中風故身熱鼻乾而嗜卧不得汗陽明也短氣脛滿脇下及心痛少陽也脉弦者少陽也浮者陽明中風也一身及目黃者陽明屬土故色黃結於目也小便難者濕熱在內也有潮熱時時發噦裏實也耳前後腫者濕熱在下也十日已去脉續浮者傳表也當隨證加減而治脉浮而弦者宜小柴胡湯

承氣湯二十七證方三道

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

凡治傷寒須明標本經絡始終陰陽脉變滑瀆浮沉發表攻裏標本逆從邪氣所感而有淺深皮膚腠理肌肉筋骨高下不同瀉痞攻實治皆各異淺者桂枝次者麻黃次附子細辛此

淺深之次也表之裏者小柴胡其次表微裏甚者大柴胡湯獨裏無表者承氣湯也故發表有淺深攻裏有微甚承氣功裏立法有三

大承氣者厚朴苦温去痞枳實苦寒泄滿芒硝味鹹而能軟堅大黃味苦寒能泄實痞滿燥實四證全則可用故曰大承氣湯

小承氣者大黃味苦寒泄實厚朴味苦温去痞痞實兩全可用也故曰小承氣湯

調胃承氣者大黃苦寒泄實芒硝鹹寒而能潤燥甘草甘平和中其中燥實堅二證全者可用故曰調胃承氣湯

承氣湯

胃承氣湯

陽明病身熱多熱內亡津液胃中燥大便不通譫語脈沉疾其
病心下痞而實痛故宜小承氣湯

中實痛心下痞譫語者宜小承氣湯

陽明經病身熱自疼鼻乾不得卧汗多微熱惡寒脈長而大者
表未解也當用葛根湯解表其熱不潮者裏未實也未可與

承氣湯若腹大滿不通痞實脈沉疾者可與小承氣湯微和
胃氣少與使不大油如見痞滿燥實者宜大承氣湯

陽明病身熱鼻乾脈長而大其人汗多者津液外出胃中乾燥
傳於本病大便硬而譫語者裏實也心下痞者氣不散也脈
沉而疾者熱在裏也宜小承氣湯

卷之十九

十九

陽明經病身熱蒸蒸汗出經傳於本也胃中燥實譫語潮熱脈
滑而疾心下痞者宜小承氣湯因與承氣湯一升腹中轉氣

者實欲散也言與一升却不轉者再勿與之氣散故也明日
又不大便又瀉者陰脈也為難治

太陽傳陽明以大柴胡下之煩燥心下硬不除五六日與承氣
湯一升欲泄其實又不大便小便少者得太陽本也雖不能

食後自利也但初頭硬者下躁也後攻之必溏者實散也如
小便利大便秘硬乃可攻之

陽明經病身熱鼻乾脈當尺寸俱長今反脈遲者汗自出不惡
寒無大陽也身重短氣者傳本也腹滿潮熱大便難者胃實

也大承氣湯主之
若腹滿不通者痞實也小承氣湯主之

陽明經復寒鼻乾身熱脈長若吐下不解內亡津液至下合日
如見鬼狀大實也微喘直視痞滿也腹反沉疾者在裏也

大承氣湯

陽明本病讖語潮熱者胃中實熱也不能食者裏燥也宜大承
氣湯

二陽併病太陽證罷無表陽明潮熱汗出大便難讖語者宜
大承氣湯

陽明經病得之煩熱不得卧自汗出者欲解也復發如瘧狀日
晡潮熱脈實者陽明本胃實也宜大承氣湯

陽明經病身熱鼻乾而煩發熱自汗出多者傳本也必胃中燥
急下之宜大承氣湯

汗出不解復滿發熱者故知發汗不解也腹滿痛者裏實也
急下之宜大承氣湯下後腹滿減者不足再下也腹滿不減
宜大承氣湯

陽明少陽合病必下利脈滑而數者有宿食也當下之宜大承
氣湯

陽明經病身熱而煩脈遲不相應也故雖汗出不惡寒非表證
也身重短氣腹滿者傳裏也喘而潮熱者外解可攻裏也手

足漑漑然汗出者裏實也大便秘者有燥也宜大承氣湯

陽明經病身熱而煩自下血讖語者邪熱入於血室當以小柴
胡湯和之但頭汗出者陽明實也刺期門瀉客熱漑然汗出

者表欲解也表邪已解脈反沉數者病在裏也故讖語有燥
屎在胃中此風燥也下之者勿令太早須通經早下則變生

他病語言必亂神不守也表虛裏實下之則愈宜大承氣湯

少陰經病口燥舌乾而渴者胃中實熱而有痛脈沉而疾者宜
大承氣湯

少陰經病口乾燥而渴者宜利清水心下痛胃實也脈沉而疾宜
大承氣湯

少陰經病胃腎絡於肺繫舌本故口乾燥而渴飲水大便難者
胃實也脈沉而疾者宜大承氣湯

陷胃湯十一證方二道 三陽下後傳本實

三陽之標與經併而為表虛本實傳變分部以為別頭痛而背
強身之後鼻乾胃滿身之前脇痛而耳聾身之側此經之病
也各有頭痛者經之始也手足沉困者經之終也發熱惡寒
者經之表也此邪中三陽之為病也三陽之表脈俱浮大當
以汗解淺深有次其裏未實醫反攻之此為逆也故脈浮下

卷之七

廿八

之此為大逆邪氣在標反攻其本本虛則邪氣從虛入而動
於膈而作結胃心下硬滿痛或如柔痙狀或心中懊懣或舌
燥而渴或頭痛汗出劑頸而還或水結於心下此皆結胃之
病也

太陽標與本經所傳者大陷胃湯標與陽明經所傳者大陷
胃丸標與少陽經所傳小陷胃湯故三陽下之為結胃也

大黃苦寒泄實而去熱芒硝鹹寒軟堅而潤燥甘遂苦寒破
結熱而去水此逆之甚也其變證多

大黃芒硝加葶藶苦寒破結熱而走水泄氣杏仁味辛溫而
治上此逆之微也其變少

黃連苦而堅括糞實苦寒而散結半夏辛溫而治上逆之小
也凡此三藥加減不同故傳有異也

大陷胃湯

大黃貳兩芒硝貳分
青兩別以水壹斗

右以水一斗煮大黃至八分去滓下硝一兩下其遂末
温服

大陷胃丸

大黃貳兩芒硝貳分葶藶壹分杏仁壹合

古搗羅一味內芒硝杏仁合研如筋如彈丸大一枚抄甘遂末一字白蜜少許水一盞半煮取一盞服一宿乃下如不下再服

小陷胃湯

半夏陸錢黃連壹分括萎壹分
壹个肆分之壹

右剉如麻豆大以水一盞先煮括萎至一盞半下諸藥取八分去滓温服未知再服微解黃涎便安也

大陽經病項背強如柔痊狀自汗直視脉寸沉關浮尺弱寸沉無表關浮結寸尺弱陰虛下之宜大陷胃丸

大陽經病頭痛項強反下之心中懊懣邪動於膈故陽氣內陷心下結硬手不可近者宜大陷胃湯

傷寒六七日結胸熱實脉沉緊心下痛大陷胃湯

大陽經病頭痛項強而發其汗裏未實反下之後五六日不大便熱結於胃中舌燥而渴潮熱而煩從心下至小腹滿痛不可近者裏實痛也大陷胃湯

大陽經病頭痛項強脇痛與少陽經併反下之而為小結胸病在心下結熱而痛按之痛脉浮滑者皆陽也不可下宜小陷胃湯

大陽經病頭痛身熱脉浮而數浮則為風風則傷衛數則為熱熱則傷氣動則為痛動於陽則背痛動於陰則腹痛數則為虛而為陰虛故頭痛微盜汗出者風傷衛也故表未解醫反

下之動數變遷邪熱乘入結於胃故膈內拒痛也胃中空虛下之早故也短氣煩燥熱結於內也心中懊憹者煩而不安也陽氣內陷心中結痛而硬手不可近宜大陷胃湯
太陽經病下之太早而為結胃頭汗出余劇無汗者陽往上奔也劑頸而還者熱結於上也小便不利者太陽本病也故身必發黃宜大陷胃湯

太陽病傷寒頭痛身熱解不徹醫為六日而下之傳為結胃邪熱拒膈而痛脈沉而緊當心下痛按之石硬者結之甚也宜大陷胃湯

但微汗出者無大熱者此為水結在胃脇間悶痛宜大陷胃湯
太陽經病表未解反下之飲冷水結於胃中非陽也為寒實結胃故無熱證 宜三物小陷胃湯

保命集卷一
瀉心湯九證方五道 又十棗湯一方

凡三陰二陽之標本治各異不同而發於陽者下之為結胃謂大浮數動滑發於陰者下之為痞氣謂沉滑弱弦微脈同三陰下之為痞病皆不同有用寒藥而為熱痞黃連大黃之類也
有用寒熱藥者陰與陽不和而痞大黃黃連加附子之類有用辛熱藥多而寒藥少者陰盛陽虛而痞半夏瀉心湯甘草瀉心湯生姜瀉心湯之類瀉心湯者非瀉心火之熱瀉心下之痞也通而論之其熱陽多陰少蓋病發於陰而得之有大黃黃連瀉心湯獨為陰心下痞而脈疾一證桂枝後用從太陽浮弱所變余者皆陰陽雜用

大黃 黃連 各取兩 甘草 壹兩

如麻豆大沸湯一盞執瀆之一時久變出滓燔動分服

附子瀉心湯

大黃 黃連 黃芩 各壹兩 附子 壹枚炮去皮

右剉如麻豆大沸湯一大盞執瀆之一時久絞去滓內附子汁分溫再服

黃連瀉心湯

半夏 貳錢 黃連 半兩 黃芩 人參

甘草 各壹兩 大棗 陸枚 乾姜 壹兩半

甘草瀉心湯

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煮至八分去滓溫服

半夏 壹兩 大棗 陸枚 黃連 人參 各半兩

生薑瀉心湯

生薑 壹兩 黃芩 兩半 人參 壹兩 乾姜 半兩

右剉如麻豆大每服五錢水煎

太陽經病頭痛惡寒六七日嘔而發熱皆經病也宜柴胡湯服

藥蒸蒸而發熱汗出不解者表解心下有痛者為結胃熱結

於內也如滿而不痛為痞氣發於陰而得宜半夏瀉心湯柴

胡後變心下痞按之軟者脉疾者宜大黃黃連瀉心湯心下

痞而惡寒汗出脉沉者附子瀉心湯發於陰陽而得心下痞

瀉心湯不解者氣不降也與五苓散非太陰不用瀉心湯太

陰主痞滿也

傷寒汗後胃中不和心下痞不發熱而身涼宜生薑瀉心湯

太陽中風反下之心下痞醫反覆下之痞益甚脉浮而微痞者

氣疾也宜甘草瀉心湯

太陽經病頭項惡寒此太陽傷寒一下之後復發其汗不解心
下痞而惡寒脈浮者不可攻痞表未解也當先解表宜桂枝
湯惡寒脈浮已解表和也可攻痞宜大黃黃連瀉心湯
太陽經病頭痛發熱太陽也嘔者少陽也脈浮而弦柴胡證具
也以他藥下之柴胡證仍在未解也復與柴胡湯雖下後不
為逆

太陽經病表解其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞硬滿引
脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者宜**十棗湯**

芫花炒赤熬甘遂

大戟各等分

右各另為末合和入臼中再杵二三方下先以水一升半煮
肥棗十枚擘破煮取八合去滓內藥末強一錢七羸弱人半
錢單飲棗湯送下平日服若下少病不除者更服加半錢利

後米粥日養合下不下令人腹滿脹通浮腫而死

太陽病汗出表解心下痞硬乾噎食臭者胃氣不和也脇下有
水腹中雷鳴寒氣之變也下利者裏寒也宜生姜瀉心湯
太陽中風在表反下其人下利日數十行者脾胃虛也穀不化
腹中雷鳴者裏寒也心下痞而乾嘔煩者胃中虛安氣上逆
故痞硬也宜甘草瀉心湯

抵當六證方二道

夫傷寒變證不同而各有法在標者治之標無汗之過在本者
治之本無下之過故治有標本用有逆從今之醫者邪在於
標而治其本傳之為結背痞氣或為畜血邪在本而治其標
則鼻衄而發黃或為溫毒或為癰疹故諸變不可勝數也太
陽之本膀胱是也亦有出無入上傳道行氣之府氣化則能出

入邪在大陽或小便自利反利其小便熱隨氣行蓄血於內故有桃仁承氣湯抵當丸抵當湯二藥之變大陽標與陽明變桃仁承氣湯太陽標與少陽陽明變抵當丸太陽標本變抵當湯陽明標與太陽本變亦有抵當湯止血證傳變之法也水蛭味鹹苦寒鹹能勝血苦則入心育虫味苦微寒而能破畜血桃仁味苦甘能破血大黃味苦寒能泄實而去熱故有少陽之輕治抵當丸水蛭育虫各倍大黃二倍桃仁亦多於方故有大陽之重治抵當湯桂枝甘草為表藥大黃芒硝為裏藥桃仁散血故從太陽陽明之實治也抵當丸

水蛭

育虫

桃仁

大黃

右為細末只一九以水一大盞煮一九至七分頓服時時當下血愈不下更服

桃仁

大黃

桂枝

甘草

芒硝

右剉如麻豆大以水二盞至八分去滓下硝煎化溫服未利

後時再服

水蛭

育虫

大黃

桃仁

右剉如麻豆大作一服以水二盞煎至八分去滓溫服

太陽經病頭痛身熱不解小便利而赤者熱在膀胱也大便狀

如豚肝者有血也其人如狂者熱結膀胱也宜桃仁承氣湯

太陽經病頭痛身熱未解也反小便利而利脈沉數者邪氣

下入膀胱蓄血於內其人發狂者熱在下焦少腹滿痛下血

則愈宜抵當湯

太陽經病頭身熱當解反利小便熱發於內則身黃脈

沉沉為裏

裏

便自利

其人如狂者

下焦有血

白

黃

脈

沉

也宜抵當湯

傷寒有熱表也少腹滿當小便不利結熱於內也今反利者有血也宜抵當丸

陽明經病身熱而煩喜忘者血氣失度神無所養故喜忘也大便秘黑色者畜血於內也抵當湯下之

陽明病表已解發熱而脈數者可下之假令已下不大便者有瘀血抵當湯凡辨血證其法有二小便自利一也大便秘色二也狂言見鬼小便淋者二也

梔子湯五證方二道

傷寒發表攻裏之後傳變不同下之早而有結實痞氣結胸者邪氣結而實痞氣者邪氣痞而虛虛實之間邪在胸中與正氣相搏懊懣而煩不得眠者宜梔子湯大抵不得眠者從陽

明所得太陽中所有梔子湯者自太陽而傳陽明也謂之曰太陽梔子湯陽明有梔子湯者本經自傳而得之者也

梔子湯

肥梔子 肆枚 香豉 半兩

右以水二盞先煮梔子至一盞內豉同煮至七分去滓溫服太陽經病頭痛身熱惡風發汗解表頭痛止而身熱不去大下之裏有熱虛邪傳於胸中懊懣不得眠心中結痛者梔子湯

而不得眠者梔子湯

梔子

肆枚 乾姜 半兩

右判如麻豆大水一大盞煮至七分去滓溫服陽明經病身乾不得眠胸中結痛而緊在表也咽乾口苦者少陽

也腹滿而喘傳裏也汗出惡熱表未解也若下之利更甚虛邪氣乘虛而入客氣動膈心中懊憹不得眠宜梔子瀉湯

發黃四證方二道

傷寒傳發黃者四有畜積發黃自太陽傳本也有結胸發黃下之早故也有濕熱發黃太陽經傳陽明本也有寒濕發黃少陽與太陰也大抵發黃多從陽明太陰脾胃屬土故也土勝則剋水使小便不利濕熱內變故令發黃陽明者茵陳蒿湯兼太陽者麻黃連翹赤小豆湯兼少陽梔子瀉皮湯

發黃湯

茵陳蒿 壹兩半

大黃 伍分

梔子 拾枚

右剉如麻豆大每服一兩水三盞先煮茵陳減一半內二味煮八分去滓溫服日二小便當如皂角汁則黃出矣

陽明經病身熱鼻乾頭汗出陽往上奔小便赤而不利濕熱發黃宜茵陳蒿湯

陽明病身熱不去七八日身黃如橘色小便赤澀而不利宜茵陳蒿湯

太陽陽明身熱不去痰熱在裏身必發黃小便微利宜麻黃連翹赤小豆湯

少陽陽明身熱不去小便自利而煩者身必發黃宜梔子瀉皮湯

麻黃

連翹

赤小豆

右剉如麻豆大每服一兩水三盞煎至八分去滓溫服

梔子瀉皮湯

大黃

梔子

瀉皮

右判如味且大每服一兩水三盞無服 蘇黃大便自利不
止者加黃連黃蘗各二兩生減大其用之多効

五苓散十五證方七道

陽證發於標者汗而解之發於裏者以而利之病在太陽渴
而飲水者熱結膀胱也膀胱者傳導汗氣之府故有熱則多
渴而煩小便不利宜五苓散是太陽以入本藥也

太陽

豬苓半兩 澤瀉膏兩 白朮參二分 茯苓伍分 官桂半兩

右為細末每服抄二錢白湯調下

白虎湯

石膏肆兩 知母壹兩 甘草貳兩 粳米壹合

右判如麻豆大每服五錢水一盞至八分米熟為度

少陰

豬苓 茯苓 阿膠 澤瀉 滑石各半兩

右判如麻豆大水一盞煮至八分去滓內膠消盡服

太陽證寸緩者浮緩也當汗惡寒因浮者當心下有痞也尺弱
者醫下之過而虛其陰故有此脈如不下病不惡寒汗出而
渴者轉屬陽明也陽明主胃胃中熱則小便數大便硬也不
更衣十日無所苦者不知人也治法欲飲水少少與之法當救
渴宜五苓散

太陽經病發汗後大汗出表解也汗液內少胃中乾燥而不得
眠故欲飲水小便不通水無所入也宜五苓散

發汗已後汗數煩渴者宜五苓散
不解熱傳於裏故有表裏證

也熱欲飲水傳裏也水入則吐不能散也故名水逆宜五
苓散

太陽病發汗後表解其人臍下悸者欲作奔豚當散
之宜

茯苓 壹兩 桂枝 壹兩 甘草 半兩 大棗 肆枚

右剉如麻豆大以甘瀾水一斗先煮茯苓減五升下諸藥
煮取七合溫服

太陽經傷寒若吐邪在上焦若下邪在裏也吐下後不愈非其
治也心下逆滿者下之過也氣上衝胃起則頭眩者吐之過
也脈沉緊者發汗動經浮緊當汗沉緊不當汗故汗則動經
身為振搖宜

茯苓 壹兩 桂枝 壹兩 白朮 壹兩 甘草 各壹兩

右剉如麻豆大每服五錢水二斗至八分服

太陽經病傳裏未實醫反吐下之不解熱結於內而惡風脈浮
者邪在上也

石膏 肆兩 知母 肆兩 炙甘草 壹兩 粳米 半升 人參 伍分

右剉如麻豆大每服五錢水煎取米熟為度

傷寒表解無大熱口燥渴背微寒脈浮者邪在上也白虎加人
參湯

太陽病頭痛背強發熱無汗脈浮當汗表未解者無白虎證如
表解後渴者白虎加人參湯

太陽經病反下之脈浮者不結胃浮者上焦實也故必咽痛
故使然也脈緊者必咽痛陰浮而

強者必兩脇拘急弦者少隕行寸

而數者邪在表故頭痛未止脈沉緊者必欲嘔胃虛寒脈沉滑者脇熱也沉為在裏滑者為陽陽隨陰轉故多脇熱在裏而為利脈浮而滑者浮為陽滑為陽二陽脈併則為下血為熱病也病在陽當以汗解各隨脈證治皆不同在表當汗反以水澀之若灌之使表熱不能出邪熱弥更而反煩燥肉上粟起意欲飲水煩燥反不渴裏未熱也宜文蛤散若不差者宜與五苓散

陽明經病發熱脈浮而渴欲飲水者陽明中熱也小便不利者太陽本病也宜豬苓湯

太陽陽明與少陽為三陽合病故腹滿身重難以轉側者傳裏也口中不仁者罵詈不避親疎也讖語遺尿者膀胱不禁也不可發汗發汗則讖語不可下下則額上汗出也手足逆冷

自汗出者熱厥在裏也宜白虎湯

厥陰傷寒脈滑而厥者渴者裏有熱也宜白虎湯

乾姜四逆湯十五證方七道

乾姜附子湯 四逆湯

芍藥甘草附子湯 附子湯

吳茱萸湯 通脈四逆湯

大陰本病論

尺寸俱沉細者大陰受病也大陰標本俱陰故脈沉者陰細者陰也是從標本故緩也脾藏當緩不緩是不從五行而從標本其經始於足大指隱白從足上行至腹布胃絡噎經之為病腹滿噎乾自太陽中風反下之利不止傳入大陰一本腹滿時痛宜桂枝芍藥如腹滿而實痛者桂枝加大黃此

一證從太陽傳變而來也

少陰本病論

少陰脉尺寸俱沉標本俱陰其經始於足心循腹上行繫於本
貫腎絡肺故口燥舌乾而渴為經病也身寒自汗四肢不
便清腹滿惡寒脉沉而微此少陰本病也當溫之宜附子薑
治少陰乃以熱治寒皆少陰本藥也

乾姜附子湯

乾姜 壹兩炮 附子 壹个炮去皮脐

右咬咀每服伍錢水煎

少陰病脉沉而微本寒也宜乾姜附子湯
發汗病不解反惡寒者虛故也小便清大便依度腹痛者皆宜

芍藥甘草附子湯

芍藥 各叁兩

甘草 壹兩 附子 壹个炮去反脐

右咬咀每服五錢水煎

太陽病傷寒頭疼項強當發其汗反下之清穀不止裏寒也一
身疼痛者表寒也急當救裏者先治其本宜四逆湯從少陰
本也穀氣裏和外身疼痛後治其表宜桂枝湯

四逆湯

甘草 壹兩 乾姜 柒分半 附子 半个炮

右剉如麻豆大水二盞煎至七分去滓溫服

太陽經與表感風濕之氣相搏骨節煩痛者濕氣也濕則關節
不利故疼掣而不能屈伸者風也汗出身寒脉沉微短氣小
便清而不利者寒閉也惡風者表虛也或微腫者陽氣不行

甘草附子湯

甘草 壹兩 附子 壹个炮 白朮 壹兩 桂枝 叁兩

右剉如麻豆大每服五錢水煎溫服汗出即解

防明今病身熱鼻乾汗浮而遲遲則為寒表熱而裏寒清穀下利宜四逆湯

大陰病腹痛脈浮者太陽也故宜枝枝湯自利不渴者裏寒也屬大陰脾本藏寒也脈沉而細當溫之宜四逆輩

少陰病足腫寒躄重痛手足冷而逆骨節疼脈沉者本病也宜

附子一個 茯苓 人參各一兩 白朮二兩 芍藥一兩半

右判如麻豆大每服五錢水煎服日三

少陰本病身寒肢沉溼口中和背惡寒四肢冷小便清者宜附子湯

少陰病足腫寒如油小便清吐逆者裏寒也寒多不下食手足逆冷表寒也煩燥欲死者陽虛也宜吳茱萸湯

吳茱萸三兩半 人參半斤 生姜半斤 大棗三枚

右判如麻豆大每服五錢水煎服

少陰病下利清穀裏寒外熱手足逆冷脈微欲絕惡寒或利止

咳不出宜通脈四逆湯

甘草二兩 附子大者一個 乾姜三兩

右判如麻豆大每服五錢水煎服未差再服

面赤者加連翹葱白五枚

腹中痛者去葱加芍藥二兩

嘔者加生姜二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩

咳不出者去桔梗加人參二兩

少陰病足腫寒肢冷四肢冷其人或咳者肺寒也乾嘔者胃虛也

小便清而不利者寒閉也腹中痛者腎病也或瀉利者寒在下焦也故曰宜四逆湯

少陰病足脛寒食入則吐裏寒也心中溫滿欲吐者胃虛也復不能吐者肝氣也始得之手足寒脈弦而遲者腎肝也胃中實不可下陰氣在上也常吐膈上寒飲欲嘔者不可吐寒在上焦故不可吐也當溫之宜四逆湯

以証變證方一十四首

厥陰病手足厥冷自汗小便清而利脈細欲絕者厥陰也宜

四逆湯

當歸

桂枝

芍藥

純辛名一兩

甘草

通草

陸冬七分半

右剉如麻豆大每服五錢水二盞棗一枚煎至八分去滓溫服

厥陰病四肢滿悶大汗出熱不去者虛陽之氣也內拘急腹中

痛下利氣逆於上惡寒厥逆脈細而微者宜四逆湯

厥陰病四肢拘急大汗出而下利者表裏俱寒者也其脈細而

厥宜四逆湯

厥陰病傷寒厥陰本自寒下醫復吐下之胃中虛寒故食入吐

脈細而微

乾姜

黃芩

黃連

人參

冬七分半

右剉如麻豆大水煎溫服

厥陰病四肢拘急下利清穀裏寒外熱也汗出而厥者表虛也

脈細而絕者陽氣衰也宜通脈四逆湯

厥陰病四肢拘急傷寒脈滑者為陽脈也故言裏有熱白虎湯

主之手足厥逆脈細欲絕者當歸四逆湯主之

陰病四肢拘急而嘔脈弱陰病也小便復利者裏虛也身微熱見厥者不相應也故為難治宜四逆湯

厥陰病四肢厥逆脈細而微內傷寒邪胃中無食而虵厥時靜時煩為之藏寒虵上入膈時煩也得食而吐虵者聞食氣而上出也宜烏梅丸

烏梅各拾伍個細辛

乾姜

附子

蜀椒

黃蘗各壹兩

黃連各壹兩

當歸壹兩

人參貳兩

桂枝去皮壹兩

芍藥兩半

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟拌成泥和藥令相得內臼中與蜜同杵二千下丸如桐子大先食飲服十九日三服稍加至二十九禁生冷滑物等

保命集二

廿一

厥陰病七八日膚冷者表寒也病人躁無暫安者此為藏厥非虵厥也藏厥者藏寒也宜四逆湯

其人常自吐虵者亦虵厥也宜烏梅丸

厥陰病四肢厥冷脈乍緊心下滿而煩者寒實實在胃而煩也宜吐之以

赤帶散

赤帶壹分赤小豆

右搗篩已合治之取一錢豉一合湯七分令先漬之須臾煮作稀糜去滓取汁和散頓服不吐少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

厥陰病四肢拘急心下悸裏有水宜先治水以茯苓甘草湯

茯苓

生薑各貳兩

桂枝

炙甘草各壹兩

右剉如麻豆大每服五錢水煎溫服

厥陰病四肢拘急內傷寒物下利日十余行脈反實者脈病不相應也故死下利於飲水者有熱故也脈當實而白頭弱湯

白頭翁 黃蘗 秦皮 黃連 各半

如刺如麻豆大水二盞每服五錢煎服不差亦服

傷寒陽脈滑陰脈弦寸滑者陰也陰脈弦者肝脈也木能剋土

法當腹中痛當補脾胃先與小建中湯不差與小柴胡湯

大陽傷寒當解表服下藥利不止心下痞者脾胃虛也當與理

中丸和之利益甚者邪在下焦也宜**赤石脂禹餘糧湯**

赤石脂 禹餘糧

右剉碎每服五錢水煎溫服

服藥後利不上者邪在大陽之本故當利小便却與禹餘糧

湯則愈 **理中丸**

人參 各二兩 乾姜 甘草 白朮 各二兩

右為細末煉蜜為丸如鷄黃大以湯數合和丸碎研溫服日

三腹中未熱益至三四丸煎熱粥飲之

太陽中風自汗出醫反發其汗必恍惚心亂以虛而反又一虛

之則心神虛而恍惚小便已陰痰氣虛也宜禹餘糧湯

太陽傷寒頭痛當以藥發其汗而解醫反以火迫劫之而亡陽

必驚狂起卧不安者火邪內變也宜**桂枝去芍藥加蜀漆牡**

蠣龍骨湯

桂枝 生姜 蜀漆 各膏 甘草 壹兩 牡蠣 貳兩半

龍骨 貳兩 大棗 陸枚

右剉細每服五錢水煎溫服

病如桂枝證頭痛項不強身熱自汗當與桂枝湯服藥後未解

寸脈浮者中痞故寸為上部胃中痞者膈上病也氣上衝不

得息者邪結在上也此為胃中有寒宜吐之以芫散
太陽經病欲傳少陽必自利傳裏也宜茯苓湯
若嘔者少陽也宜黃芩加半夏生姜湯



黃芩 條各芍藥 各甘草 各錢大棗 各枚

右剉細每服五錢水煎溫服

太陽經傷寒傳裏胃中有熱胃有邪氣傳陽明本也腹中痛欲

嘔者熱在內也宜黃連湯

甘草 各黃連 各乾姜 各人參 各半大棗 各枚

右剉細每服五錢水煎服

傷寒發表攻裏後又吐下之表解後心下痞硬噫氣不除寒熱

不交則氣噫而不除宜旋覆代赭湯

旋覆花 各半人參 半兩半夏 乙兩代赭 錢半

甘草 半兩半夏 錢大棗 枚

右剉細分三服水煎溫服

諸雜證方十一道

傷寒少陰經絛於肺繫舌本邪在膏結於咽喉中痛而不利或
為失音白通猪膽汁甘桔苦酒之類也少陰之經藥也非少
陰本藏之藥也脉皆浮弱是以膈上至頭之有疾雖在下部
之法亦少陰也

傷寒病在裏當下麻仁丸寧守煎土苻根猪膚湯之類非熱
氣在胃而實脾約中燥而結跌陽脉浮而滿脉浮而無力下
之而弱雖當下之不可便用承氣何也內陰也故也下之則
損胃傷腸故當潤而通之勿令損氣察脉之實勿令快也

傷寒六經發表攻裏標本通經各異下不同輕重赤白
少陰之標木病也當溫之以附子四逆湯輩也太陽麻黃桂
枝之法如桃花湯禹餘糧湯龍骨牡蠣救逆湯輩皆重泄之
藥旋覆代赭乃輕重之藥同太陽大柴胡承氣輩單輕石重
者皆少陰本藥以隊於下也

陽明經病自汗出醫又發其汗小便當不利今反自利津液內
竭也雖大便硬乾燥不可攻之宜蜜煎導而通之若土苴根
豬膽汁皆可為導

蜜煎導

蜜四兩

右一吐內銅器中微火煎之稍凝如飴狀撓之勿令焦捻作
錠子如指長二寸當熱時急作令頭銳內穀道中欲大便去
之

豬膽汁方

大豬膽去脂瀉汁和法醋少許以灌穀道中如一食頃當大便
大陽經病反小便不利者熱結膀胱也大便乍難乍易者胃中
有微熱也宜大承氣湯下後食穀欲嘔者屬陽明胃虛也宜
吳茱萸湯

跌陽脉浮而濇小便數趺陽者胃脉也足趺上衝陽是也脉當
浮緩今反浮濇者雖小便數大便硬非沉數不可下浮濇者
脾約也故宜**麻仁丸**

麻仁半升 芍藥貳兩 厚朴貳寸半 姜製
枳實貳兩半
杏仁貳合半 去皮尖 大厚肆兩七去皮

右為散蜜和丸如桐子大飯飲下丸未知益加之
陰平病二三日至四五日腹中痛自有大陰也小便不利者

太陽下也便膿血者少陰本受也宜

赤石脂肆兩粳米乙合半乾姜二錢半

右以水二盞煮二味半熟去滓以赤石脂細末方寸匕溫服

少陰病下利咽痛者少陰也膏滿心煩者有熱也宜豬膚湯

豬膚四兩

右一味以水二大盞半煮至一盞二分去滓加白蜜二兩半

白粉一合二勺半

少陰病二三日咽喉痛者少陰繫於舌故咽痛也宜甘草湯不

差與桔梗湯

甘草壹兩

右到細每服五錢水二盞煮至六分去滓溫服日二加桔梗

一兩便為桔梗湯

少陰經病咽中生瘡不能言語聲不出者宜苦酒湯

半夏洗大者肆拾个

雞子壹个去黃肉

苦酒著卵殼中

右半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令二沸去滓

少少嚥之

少陰病下利脉微宜白通湯

附子壹个去白

乾姜壹兩

右到細每斤五錢入葱一寸水煎白通服後

利不止厥逆無脉乾嘔者少陰本病也宜白通加豬膽汁湯

附子壹个去白

乾姜壹兩

豬膽汁分

葱白壹莖

白通分

豬膽分

右為末水一大盞煮至五分去滓內豬膽汁和調相得溫服

少陰經病至四五日腹痛者裏有濕也小便不利四肢沉重者

裏寒也疼痛者裏有水也或然者氣逆於上也或小便不利者溫毒在內也或下利者脾氣盛也或嘔者胃氣虛也宜服

真武湯

芍藥 芍藥 附子 附子 生薑 生薑 白朮 白朮

茯苓 芍藥

右剉細每服伍錢水二盞煮至八分去滓溫服日二

效者加五味柒錢半 細辛一錢半

少陰病二三日已上經病日去心中煩不得卧者少陰本受熱

也宜黃連阿膠湯

黃連 黃連 阿膠 阿膠 梔子仁 梔子仁

右為細末每服四錢水二盞煎服

病人手足厥冷者厥陰本病也脉乍緊者為寸脉緊也心下滿

而煩者邪在胃中也宜芩瀉散

厥陰傷寒心下悸者內傷冷水結於心下故悸也宜茯苓甘草湯

症濕暘十六證方十二道 症證

夫傷寒症濕暘者風濕熱也風氣感而重者為之症濕氣感而重者變為發黃暑氣感而重者為之暘太陽表與經傷寒中風相似太陽陽明所致也

太陽經與標病發熱無汗惡寒者表實也頸項強而脉浮結者

反張名剛症宜用黃加獨活湯 方在下難知也

太陽經與標病發熱者標也 汗者表虛也項背強而脉浮弦

者柔症也宜用桂枝加芍藥湯 方在下難知也

陽標病發熱者在表也脉 沉細者附太陰也沉為在裏細

者必腹痛宜桂枝加芍藥防風湯 方在下

太陽經與標病因發汗過多榮氣內虛不以此榮於筋風氣變動

故口噤因汗多而傳陽明也陽明經使口環唇背反張者太

陽病身之後為所生病宜去風養血防風當歸散 在內前冊

傷寒汗下後不解乍靜乍燥目直視口噤往來寒熱脉弦者少

陽風瘥也宜小柴胡加防風湯 方在下

太陽經與標有濕氣榮衛俱病也關節煩疼而小便不利脉沉

細者濕氣在內也屬太陰故小便不利大便反快宜勝濕利

小便五苓散猪苓湯

太陽標病一身盡痛者表也身如薰黃者陽明脾胃相傳之變

也茵陳蒿湯

濕家病者太陰也頭汗必背強欲得覆被向火者本陰也勿下

之下之早則為痞氣乃胃冷則為噦胃滿小便不利舌上白

胎者陰陽反也寒反在上則舌上白胎熱反在下則小便

不利故曰丹田有熱胃中有寒渴欲飲水者丹田有熱也得

而後陰陽和額上無汗上焦和也小便利者下焦治也故

主如下後小便不利額上汗出不止微喘陰陽相離故死也

太陽病風濕相搏榮衛俱病一身盡疼表氣不和當汗而解

之治隨汗出值其佳雨不止濕氣不除後微發其汗風濕皆

去也 杏仁二十五个去尖

葛根兩 甘草半兩 芍藥二兩 麻黃二兩 桂枝二兩 水一斗 煮取六升 去滓 分三服

家一身盡發熱而黃而喘頭暈鼻塞而煩其脈大身熱以食腹中不和無病病在頭中寒濕攻鼻塞而煩內藥第中則病

大陽中熱者暍是也汗出惡寒者在表也身熱而渴者在上焦焦也宜白虎加人參湯頓服之

大陽中暍者身熱而煩汗欲出反飲冷水嚔之汗不能出水行皮中而脈微弱表有水也當發其汗宜升麻湯

升麻 葛根 芍藥 甘草各一兩
右剉細每服一兩水二盞煎服

大陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細訖遲小便已洒淅毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚何也為脈弦細訖

遲此其禁也齒乾者牙乃骨之精今燥者骨熱也針藥不能治當灸大杼穴

論傷寒霍亂并治

夫傷寒霍亂者其本於陽明胃經也胃者水穀之海主稟四時皆以胃氣為本與脾藏為表裏皆主中焦之氣腐熟水穀脾胃相通濕熱相合中焦氣滯或因寒飲或因飲水或傷水毒或感濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏上下相離榮衛不和相離故轉筋卒痛經絡亂行暴熱吐瀉中焦胃氣所主也

有從標而得之者有從本而得之者有從標本而得之者六經之變治各不同察其色脈知犯何道隨經標本各施其治此治霍亂之法也

傷寒吐瀉轉筋身熱脈長陽明本病也宜和中五苓散建中湯

或四君子湯 方在下難知中

脉浮自汗者四君子加桂五錢主之

脉浮無汗者四君子加麻黃五錢主之

傷寒吐瀉轉筋者脇下痛脉弦者木剋土也故痛甚平胃散加

木瓜五錢亦可治宜建中加柴胡木瓜湯 方在下難知中

傷寒吐瀉後大小便不通胃中實痛者四君子加大黃兩主之

傷寒吐瀉轉筋腹中痛脉重脉沉而細者宜四君子加芍藥高

良薑湯 方在前難知中

傷寒吐瀉四肢拘急脉沉而遲此少陰霍亂也宜四君子加姜

附厚朴湯 方在前難知中

厥陰霍亂必四肢厥冷脉微緩宜建中加附子當歸湯 方在前難知中

難知中



雲漢子保命集論類要卷上

