



修仁齋直指方論卷之十四

瀉痢

附 脘臍

瀉痢方論

痢與瀉名目不同而感受之源一也。風邪得之，鼻塞頭暈，身強痛寒，邪得之，面瘡惡寒，肢體拘攣，受暑得之，面煖背寒，自汗發渴，受濕得之一身盡痛，重有浮黃，或傳冷，則淒清腸鳴，或蘊熱，則發熱，煩燥，冷執不調者，乍澁乍濶，飭食傷饱者，注下酸臭，諸有積以肚熱，纏痛推之，諸有氣以狀如蟹潮驗之，究其受病之源，決之對病之劑，人要以散風邪，行滯氣，開胃院爲先，不可遽用。

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

瀉痢

○寒熱之辨，治法之別，當以手足溫爲熟於理，甚當亦當合赤白而並觀之，庶乎其的矣。雖然風寒暑濕感之於外者也，其有大嚼飽飽宿酒漿醯醢以成積滯，旁闥縱情加奔走勞役以耗精血，此非病生於內者乎？必明別內外而權度之，則受病淺深用藥輕重，知有定嚮矣。毋槩曰無積不成刺。○下痢壯熱須用承氣散，加厚朴、枳實、芍藥、甘草、大黃、芒硝。○下痢兼曰有積，有暑，如用藥不效，即是腸胃有風邪，執者亦者與。○寒者白者，不投冷，下涼者，加三晉之方見水錄門

瀉痢證治

○寒熱之辨，治法之別，當以手足溫爲熟於理，甚當亦當合赤白而並觀之，庶乎其的矣。雖然風寒暑濕感之於外者也，其有大嚼飽飽宿酒漿醯醢以成積滯，旁闥縱情加奔走勞役以耗精血，此非病生於內者乎？必明別內外而權度之，則受病淺深用藥輕重，知有定嚮矣。毋槩曰無積不成刺。○下痢壯熱須用承氣散，加厚朴、枳實、芍藥、甘草、大黃、芒硝。○下痢兼曰有積，有暑，如用藥不效，即是腸胃有風邪，執者亦者與。○寒者白者，不投冷，下涼者，加三晉之方見水錄門

不換金玉散治風邪寒邪冷證下痢方見寒類

白芍湯 方見吐瀉門 加白芍 治風寒冷證下痢加乾

黃芩散 治傷濕下痢仍以白芍加利小便

方見腸門 加白芍 治濕冷下痢

白芍散 治濕冷下痢腹血腹痛婦人下血

乾艾葉散附兩炒焦存性 川白芍散兩炮

右爲末醋煮麪糊直桐子大每茶拾圓食前溫米飲下

久病虛寒證渴漏痢通用

木香

厚朴半製

蒼朮

米泔

乾薑

炮

肉豆蔻半兩

半夏曲

陳皮

阿膠

墨栗殼

去筋華 醋淹炒

縮砂

甘草

炒

右剉每參錢薑叢煎食前服

佐之

糞丸

升麻

白芍藥

甘草

炙各半兩

白乾葛

各伍兩

石鹿末每參錢薑叢片同前吞急連口治傷暑下痢纏痛

糞丸

升麻

白芍藥

甘草

炙各半兩

白乾葛

各伍兩

治暑痢

升麻

白芍藥

甘草

炙各半兩

白乾葛

各伍兩

白芍散 治冷熱不調瀉利

黃連苦寒不可用散半兩本香蜜分

右取香連爲末醋糊直桐子大每參拾圓茶飲下前

糞丸

治冷熱不調下痢方見瀉門依前法用之

大黃散 治食積下痢腹痛

方見瀉門依前法用之

大黃散 治諸積下痢用

方見瀉門

大黃散 治諸氣病

方見瀉門

大黃散 治下痢

同治氣利丸如醫勸

草根末

白蜜

牛乳半升

右同前減半空腹服

而治赤白下痢

吳茱萸

鹽水

黃連

大膽半寸穿同  
妙鼎分爲黃連

右各研末醋麪糊圓相子大赤痢專服白痢專服黑蜜  
赤白併服或多或少以意增減每服染拾圓陳米飲下以愈  
爲度

同治氣利丸入腸胃泄下鮮血及腸胃濕毒下如豆汁或  
下瘀血

人參

白伏苓

川芎

當歸

辣桂

白朮

白芍藥

等分

右剉每服參錢朮朮百餘粒同前食前熱服腹痛加冰糖

冷證久痢不止

方見渴門

四肢厥冷以意擇用

石蓮肉

日乾

右爲末每服貳錢陳米飯調下便覺思食仍以日照東方壁  
土炒直爲末作兩服每服薑伍片大棗參箇大烏柏參箇食

止赤白痢

伏苓

白朮

甘草

半錢

草果

連皮壹枚

大艷粟殼

炒熟去殼加木香

半錢

右爲末分作兩服每服薑伍片大棗參箇大烏柏參箇食

前煎服

方見渴門通用

同治氣利丸治臘月久虛止渴止痢

陽起石

入甘蠶桂令酒末酒淬

左顧牡蠣

白者名牡蠣

紅肉

白石脂

鐵紅

鍾乳粉

青白

右研極細如粉和畢糯米糊頭空心米飯下渴者人參湯下亦治陽風下血又寒藥方見溫通用

赤芍酒治脫肛

赤石脂剉小服

禹餘糧

酒醋淬以碎爲度

右等分水和每服肆錢空心煎溫服瀉痢須要衣服周密恐傷風冷尤嫌熱血痢裏急而痛甚雖已疎通瀉滌然其痛不減者非熱亦非積也榮血虧小陽剛勝陰故爾用華當以酒爲佐榮血一調其痛立止

## ○脫肛

### 脫肛方論

四十八難曰病之虛實出者爲虛入者爲實肛門之脫非虛無故然哉蓋惟實則溫溫則內氣充而有所蓄惟虛則寒寒則內氣餒而不能收而况大腸之厚薄膚脂之瘠肥亦視夫內氣之虛實何如耳大凡脫肛須以溫湯澆令和軟然後摩溼而入治法以溫敍行之其有產婦用力過多及小兒叫號聲氣久痢不止風邪襲虛亦有此證○凡腸頭作癢即是腹中有虫○用銀頭煎湯薰洗仍以銀頭煎服其脫肛腸風痔漏者登渴不可用舊紙若包裹湯藥雜物尤不可用纔有一毫染污其間立見痛腫如此急以溫湯滌之患在肛腸登渴後須用一洗

### 脫肛證治

溫頭治肛門脫出不收

蝟皮

青黃有性參錢

磁石

半兩法前數沸  
熊膽石茶炒爲末

辣桂

參錢

右細末每服貳錢食前米飲調下仍以破草鞋底炙上面熨

按令入

醫頭治脫肛

驚頭

慢火灸

右爲末塗傅腸頭用軟紙襯輕輕按入仍以方寸匕食前不

飲調下

磁石治脫肛

磁石半兩煎入煎沸藥空心米飲調下

白芍治脫肛

右爲末每服壹錢空心米飲調下

大茴附治脫肛

右末每服壹錢食前新水煎沸即服小兒通用

白礬枯治脫肛

白礬枯

綠礬枯

荳子殼取肉枳殼去核燒成

白附子

生南星

生半夏

生附子

去皮鹽配

黃瓜蔓霜

黃瓜蔓霜存性

蝦皮壹錢

胡桃仁

朱橘子肉鹽水

蜜酒

右細末醋煮麪糊圓

桐子大每服貳拾圓空心溫酒下或

蜜酒送下

白芷治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

白芷

黃連

木賊

右末每貳錢米飲調下

白芷治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

白芷

黃連

木賊

鐵粉研細

右入白芷末夾和傅之即按入

白芷治脫肛熱痛

生瀉黃以猪膏和傅即接入

桑根上緑桑葉子

桑根上緑桑葉子

右末以

和塗兩後緑桑葉子

桑葉子

卷之十四

橡斗子燒存性猪脂和傅

宋人治脫肛不熱

木賊燒存性爲末，慘以帛捲入

獨尾散治脫肛不收。半兩末并水參椀入磁瓶內慢火煎半續入。

各壹錢東熱熏洗仍以未傳之

五味方治大腸積冷久年脫肛

石灰炒熟以帛包裹肛坐其上冷又別換仍以

未傳

小兒病後風邪入大腸脫肛不收以此散風邪加

前人見寒藥

黃皮桑根取葉一升煎帶溫

右以布盛並小兒肛門牽手按入次用門臼中細磨線繩擗之

直取前後緣際折中橫取兩尖折中在頭

之中心端正螺毛處是也兩手握蒜灸灸則肛腸自收

張氏治蟲蝕肛門咽乾唇瘡齒晦

方見活人書

脫肛

增修仁齋直指方論卷之十四

增修仁齋直指方卷之十五

六。積熱

附

癟冷  
挺滯

轉胞

便多

積熱方論

酒麪前搏、雄附、峻補皆能生熱，謂之積者何哉？朝斯夕斯，其所由來尚矣。夫人偏陰不可以無陽，偏陽不可以無陰，惟在冷煖得中而已。矯枉過正，識者憂焉。然則欲去積熱，將何如曰：「醫學第一藥耳。」雖然，凡熱皆出於心，熱甚則能傷血，又不可無此。自本自根之論也。若夫酒後之麪，飯後之酒，最易積熱，又當防於未然。

積熱證治

諸熱通用

方見寒熱篇

散解熱次之

方見寒

○治積熱，緩隆三焦皆熱，大小便閉

黃連

天瞿

黃芩

大黃

濕熱等分

右剉細，每服三錢，參片慢火燉，食後服

白芷、荆芥穗各一錢，少許同煎，食後服

拾遺熟水下

○治壯熱，燥風熱，壅塞大小便祕澀

大黃

濕熱等分

當歸

芍藥

麻黃

不去頭，荆芥穗各一錢半

白朮

濕熱半

右末，每服貳錢半，生

少許同煎，食後服

四順丸

治而熱，蘊經，難帶

大黃

濕熱等分

赤芍藥

當歸

甘草

濕熱等分

右爲罈末，每貳錢半，慢火煎服

亦治血熱，可擇用

○治心熱，煩躁，目赤，咽疼，小便淋閉

大黃

濕熱等分

瞿麥

木通

滑石

萹蓄

車前子

山楂仁

甘草

濕熱等分

右剉，每服二錢，入燈，煎食後服

大尾，心熱，要得小便流利

而出

甘露飲 治諸瘡發熱

生乾地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

並去心

黃芩

枇杷葉

山茵陳

枳殼製

石斛

甘草

炙等分

右末每服貳錢半食前煎服加葛根紫胡尤佳

大補散 治諸熱利小便

生乾地黃

木通

荆芥

地骨皮

右剉每三錢二片煎服

桑白皮

甘草炙

甘草 貳錢

黑豆

甘草

右生甘草片井水煎汁服

黃連

去鬚根等分

右以井水浸良久磁碗盛之置鐵鉢內隔湯匙取清汁服并燒

生姜酒 治上焦壅熱口乾咽痛煩躁涎潮

馬牙硝

寒水石

硬石膏

甘草

微炙各一兩

牛膽南星

參三分

研細牛黃

腦子

麝香各一兩

右末煉蜜圓每兩作肆拾圓每服壹圓溫酒吞入參湯調下

解毒散 取積下熱

雄黃

副飛

川薑金

各一兩

巴豆

治肆箇去油

右末醋煮麪糊圓麻子大每服伍圓加至七圓熱茶清下裏

實用此喉嚨以熱茶清調灌

竹茹湯 治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足心皆熱者是

半夏

參三分

用鹽水

煎

去半切片

乾葛

參三分

甘草

參三分

右剉散每參錢二錢

一彈子許

水煎

去半切片

甘草

前溫服或加節桂

諸熱消炎散

去鹽

等分

蜜丸

每服一錢

建康酒

皆可用

# 上痛冷

痼疾方論

苟得其養無物不長苟失其養無物不消人之處世飲食爲上湯藥次之惟其口腹不充嗜慾無節所以臟中停寒而爲之沉痼也男子精流女子帶下皆寒體冷氣乏血衰嘔吐惡心久則暴下皆其證耳療治之法雖貴平溫補不貴辛大剛性於滋血養氣中佐以寒之爲愈抑古人所謂精不足者補之以味繼此尤當加意焉若夫執齋剛燥亟欲陽氣賴回吾恐腎水易涸心火發炎識者未保其社

## 痛冷證治

治諸虛百損

人參

壹分

白朮

白伏苓

甘草

錢

熟地黃

白芍藥

蜜炙大  
各半兩

當歸

川芎

錢

右剉散每服參錢半蜜炙煎空心食前服加熟地黃溫之

並主痼冷須加當歸

方見寒熱

五味子

肉蓯蓉

牛膝

酒浸  
蜜炙各半兩

錢

右末練蜜圓桐子大每參伍拾圓食前鹽湯下

治下元冷備腰脚痠羸勞渴消渴

熟附子

各半兩

澤鴻

牡丹皮

白伏苓

各半兩

錢

右爲末練蜜圓桐子大每服參拾圓食前鹽湯下

治脾腎俱虛冷氣刺痛止于膝冷除濕破瘀

黑錫散

透明礦黃

丹砂各半兩

金鉛子

芒硝去皮

沈香

木香

熟附子

蘇蘆

酒浸

肉桂

父口半兩研細水酒

船上茴香炒破故紙酒服

陽起石

研細水酒

肉豆蔻

各一兩

右用新鐵鉗如常法結黑絲繩砂子地上出火毒候冷研極細餘藥並末同研自朝至暮以黑光為要酒麴糊圓桐子大陰乾每二瓦十圓穴心鹽湯下婦人久病陽陽下本方加瘦大陰乾每二瓦十圓穴心鹽湯下婦人久病陽陽下本方加瘦

參

升升降水火助陽接真治咳嗽齧齒冒痰結頭運腰痛腰疼

霍亂吐瀉

好硫黃

黑錫

水銀

朱砂

研細名晝曉

右淨鐵邊以厚紙布丸柄先鑿一孔濾去滓壹兩淨再放邊內用鐵匙炒攪將熟參錢重漸入其中或焰起亦莫管只急手攪炒令熟無性其頭皆燒去但得鉛熟遂傾放地下紙上令硬即碾開以紗篩出鉛粉其餘成珠者再炒碾爲末次將邊鉛慢火爐上又鑿一孔濾去滓壹兩漸入頻攪炒纔見黃煙上急施過冷爐上少頃又過火上再炒得證<sup>火頭</sup>皆成黑色極調和了却放冷爐上候冷又煩在十分微微火上少頃入水銀以鐵匙頻攪炒令十分調青煙上煙上便走了水銀又次入朱砂末頻攪炒令十分調和即傾放地下紙上俟硬別碾爲末糯米糊圓裹豆大每參拾國益湯空心下

諸虛痼冷厥冷神效

好硫黃

研細

水銀

參

右修煉家有見成者贖研細糯米糊圓小麻子大每服伍粒圓加至拾伍圓空心下<sup>火頭</sup>湯下或益湯下亦氣偏墜木腎腫疼炒圓入酒熱候溫下○虛勞喘嗽<sup>火頭</sup>湯下○白癰瘍<sup>火頭</sup>湯下○益湯下○脹滿腹痛腰疼<sup>火頭</sup>湯下○白癰瘍<sup>火頭</sup>湯下○中風瘻厥而青紫

痼冷

○湯研灌○走注風遍身痛嘴白酒下○脚痛水湯下

○氣喘○薑皮湯下○婦人血痛氣痛症用參附子靈脂酒  
醋各半煎湯下○小兒慢驚沉困胃虛神脫人參附子煎湯  
吞下

○服附子治腎氣土攻頸背不能轉側亦治冷脾不仁

熟附子末

正川椒

右每服大錢匕川椒貳拾壹粒用白麪塞滿水盞  
半盞茶片前半去椒入鹽少許通口空心服

○大凡腎氣須以川椒引而歸經則安矣又一證醫虛血寒氣逆  
而脹脅腹走痛中脘痞滿兩眼多眩此寒泣血也○瀉湯加川椒  
桂圓立愈若大便滯更加川椒○瀉湯方見卷之

○方見水飲門

癰冷

# 秘止泄

○轉胞 便多

小便不通方論

卷之五

五十五

○腎主水膀胱爲之府水瀦於膀胱而泄於小腸實相通也然小腸獨懸於心者何哉蓋陰不可以無陽水不可以無火水火既濟上下相交此榮衛所以流行而水竇開闔所以不失其司耳惟夫心腎不濟陰陽不調故內外關格而水道滯傳送失度而水道滑熱則不通冷則不禁其熱盛者小便閉而絕無真熱微者小便難而僅有腎與膀胱俱虛客熱乘之故不能制水水挾熱而行滯焉是以數起而溺有餘瀝腎與膀胱俱冷內氣不充故胞中自滑所出多而色白焉是以遇夜而陰盛愈多若夫下焦蓄血其與虛勞內損則便溺自遺而不知下焦虛寒不能溫制水液則便溺欲出而不禁是皆心不與腎交通故或冷或熱而滑澁隨之矣繼自今心氣旺盛小便壅遏以清利行之如諦和益之如諦和之類是也心氣虛怯小便滑利以溫

皆可以舉隅而反。或者膠柱調瑟。詳於腎而略於心。其可乎？雖然小腸之與膀胱。心腎所主固也。然素問有云。水之本在腎。其末在肺。則知天一之水。自上而下。相爲貫通。亦猶心腎之不可不升降也。昧者。夜間忍縮小便。使水氣上逆乘肺。痰涎喘嗽。激烈亂爭。鳴其來不可擗。於此見肺主氣也。小便澀滑。又當調適其氣焉。母徒曰。可以逐肺經之水。

水便不通證治

菖蒲湯治心腎有熱。小便不通。

生車前草搗取自然汁半盞。入蜜壹匙調服。

瀉心湯治心腎有熱。小便不通。

赤茯苓

木通

車前子

桑白皮炒

荆芥

燈心

赤芍藥

甘草蜜炙

生蒲黃

滑石等分

右末每服貳錢。葱頭壹片。蜜伍葉煎湯調下。

人參附子散治心經邪熱。小便赤澀不通。方見水熱門。加人參附子散治小便不通。每服貳錢用

四物湯各壹握。前湯調下。

參耆湯治心肺虛而客熱乘之。小便澀而數數而瀝。

赤茯苓半錢。生乾地黃。黃耆

桑螵蛸蜜炙

地骨皮。葛根半錢。人參半錢。

北五味子

菟絲子酒浸研

甘草炙。名貢錢半錢。

右細剉每服參錢。新水煎。臨熟入人參。貳拾壹輩溫服。  
人參。治腎虛小便數而瀝如欲滲之狀。或虛勞內損。遺尿或下焦虛寒。小便欲出而不禁。通用。方見消渴門。

真腎通治下焦虛冷。尿多。或虛勞遺尿。或欲出而不禁。

鹿茸酒炙

肉蓯蓉酒浸

當歸各半兩

雞內金半錢。研末。

龍骨

牡蠣灰

赤石脂

禹餘粮。研末。水半

川白薑

益智仁

巴戟

乳香

各一錢。研末。水半

右細末糯米糊圓桐子大每服柒拾圓空心鹽湯下  
秋水瀉治下焦蓄血濺水迷忘小腹急痛內外有熱加生  
方見血類

大小便不通證治

治小便大便不通龍眼肉壹兩不得洗帶土圭鹽壹塊  
武拾壹粒鹽武匙同研爛捏餅烘熱捲臍中以帛扎定  
良久氣透自通不然再換壹劑

轉胞證治

治胞轉小便不能通先用

良薑

葱頭

紫蘇葉各壹錢

右煎湯密室內熏洗小腹外腎肚門留湯再添蘸帛洗以手  
拊摩膝下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣次用

蜀葵子

貳錢半赤伏參

赤芍藥

白芍藥各半兩

右剉每服參錢煎取清汁再緩乘熱調食圓參圓并研

細鹽半錢食前溫服。又法炒鹽半斤囊盛熨小腹

便多證治

多鵝方錢鑿圓治腎虛多渴或小便不禁而渴

葫蘆巴

炒

故紙

炒

川練肉

用鹽酒炒去粗鹽

大熟地黃

益智仁

鹿茸酒炙

山茱萸

代赭石

煮熟研細茶末研細

熟艾

米醋浸

參

龍骨

沉香

滴乳香

各

禹餘糧

煅酒淬碎爲度細研

丁香

右細末水煮糯米糊圓桐子大每服伍拾圓食前  
湯送下

大便祕證方論

凡人五味之秀者養臟腑諸陽之濁者歸大腸大腸所以司出  
而不納也。今傳畜蠶結獨不得其蹊道何哉抑有由矣。孰邪入  
裏則冒有燥糞三焦伏熱則津液中乾此大腸之挾熱然也。虛

人臟冷而血脉枯老人腸寒而氣道滯此大腸之挾冷然也腹脹痛悶曾痞欲嘔此證結聚以宿食留滯得之腸胃受風固燥秘滯此證閉塞以風氣蓄灼得之若夫氣不下降而穀道難噫逆泛滿必有其證矣劑量治法熱者調冷者散宿食者清風秘者潤氣不下降則桂枝湯固在精擇而審處其間縱橫泛應亦自胃中活法充之矣然而大腸與肺爲表裏大腸者諸氣之道路關焉熱則清利冷則溫利積聚者疾其積風壅者踈其風是固然爾孰知流行肺氣又所以爲四者之樞紐乎不然叔和何以曰肺與大腸爲傳送

大便秘滯證治

大黃飲子治身熱煩燥大便不通

川太黃蜜炒無皮者杏仁去皮尖梔子仁

川升麻

枳殼

浸去穰碎炒各半兩

生地黃壹兩人參

黃芩

甘草炙各貳錢半

右剉散每服參錢

蜜炒無皮者伍片貳拾壹粒小烏梅壹枚煎服

白芍蜜炒無皮者治熱證大便結方見續篇門

金液丹治大便挾冷結滯用

麻仁杏仁煎湯下方見經效門

半硫圓治冷秘風秘老人秘結

透明硫黃研十分細

圓白半夏湯盞柴炭焙乾等分

右末空臺蜜炒無皮者粳米圓桐子大每服貳拾圓臺湯下或用

參三錢壹條空臺參片煎熟入

蜜水煎湯貳片溶開食空送下

膠連根葱白參片

右薪水煎去葱入蜜水炒貳錢空匙溶開食前溫服

蜜臘圓大便秘滯通用

杏仁去皮尖

枳殼蜜炒無皮者

麻仁

陳皮各半兩

阿膠

防風各一錢半

右末煉蜜圓桐子大每服伍拾圓老者每服百粒煎湯下壯者用

水泡湯下

臘橘圓治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便秘結

蓬莪术參三錢煎兩良薑半兩巴豆一粒研末於

青皮去白

南木香各半不蛀皂角

參大頭麻存性

百草霜

深井水

桔梗蜜酒

右爲細末用川芎半兩只去殼研如泥漸入藥末研和得所麪糊圓麻子大每服伍圓加至拾圓煎湯下

大黃圓治食積氣滯通利大便兼治心氣小腸氣諸氣攻

刺腰痛

橘紅

青皮去白

檳榔

雞心者各半兩

南木香

貳錢半

川巴豆肉

面錢半研細花布入藥更研

右件並未用生薑自然汁調藥末

爲糊圓麻子大每服拾

圓湯下如氣攻腰痛

杏仁煎湯下

二香圓治積冷氣祕心腹刺痛中滿壅歎

南木香

丁香

青皮

白僵

橘紅

蓬木

桔梗

細砂仁

各半錢

白僵

白僵

橘紅

右細末用

半兩研如泥漸入藥末研和白麪稀糊

圓麻子大候乾每服叁圓加至伍柒圓止

湯下壅歎

朱砂煎湯下

獨活圓治大便積日不通

大好藥

散入

調藥

水

右以棗相倉麻線札縛慢火煮熟嚼細以棗汁送下

大便秘方見總角門用

送下

送下

送下

送下

用

枳殼

防風

羌活

獨活

檳榔

白芷

威靈仙

桑葉

麻仁

杏仁

甘草

各一錢分

右鹿末每貯錢半兩五片蜜壹匙慢火煎服

治氣不下降大便不通

方見氣門加紫蘇葉三錢煎

鶴子湯治氣不下降大腑滯滯

香附

川芎

天台烏藥法枳殼

各半兩

縮砂仁

桑蠶半兩

蘇子

半兩

青木香

參鐵

甘草

炙甘草半兩

右末每服貳錢

陳皮

前湯調下或吞

少許

鶴子湯治氣不下降才使不通

方見氣門加紫蘇葉三錢煎

藥流行肺氣

急感圓治氣秘不大便用

蘇子

前湯下或散送下

送下蘇

食管圓

方見氣門

鳳鳴圓

方見氣門

合肆分國應

陸分研

和別圓大凡腹痛而嘔欲利其大便諸藥皆吐惟

急感圓

用

汁泡湯下最妙

通氣方

方見氣門

煨熟去皮以綿裹納後部即通

又通氣方

方見小便門

臨用入

少許尤速

通氣方

方見氣門

用炭燒置於桶內熏其後部自通

通氣方

方見氣門

治婦人產前產後大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼

參鐵

甘草

右細剉每服參錢食前

溫酒

煎服

# 五疸

附 諸論

## 五疸論

五疸

濕與熱鬱蒸於脾胃而肢體爲之發黃此即疸也疸之名有五  
發熱不渴身腫而汗出如黃檗汁者曰黃疸此胃中蓄熱汗出  
浴水得之已食如飴但欲安卧小便如黃檗汁者曰黃疸此酒  
麴炙燭猪臘熟瘀滯得之食則腹滿怫鬱眩心忪而不自安者  
曰黃疸此失飢大囂遽飽衝脾得之其或飲酒常多進食常少  
溫熱入水火既濟當風以致心中懊惻足胫腫滿是之謂酒疸  
勞倦慾大熱交接帷席未幾遽就浴室以致發熱惡寒小腹滿  
急是之謂酒疸五者雖不同其爲黃則一自本自根未有非熱  
非濕而能致病者也濕也熱也又豈無輕重之別乎濕氣勝則  
如蠶黃而晦熱氣勝則如橘黃而明蓋脾主肌肉土色尚黃濕  
熱內蒸或重或輕不容易於外矣自其濕熱瘀而傷血此又爲  
血疸何以明之疸證之黃小便不利血證之黃則小便自  
利耳况夫腰受濕熱鬱而不行亦多有腹脹之候治法綱領大  
要疏導濕熱於大小便之中人從見茵陳湯以除之

圓葷隨試驗效則目之以尋常不思單陽無陰病勢已極疸而  
不渴猶可用工疸而復渴其或腹瀉全濟者鮮甚則寸口無脉  
鼻出冷氣與夫形如煙熏搖頭直視爲心絕環口黧黑油汗發  
黃爲脾絕此皆倉扁所望而驚者也號謂黑疸之能有瘳乎  
脾與腎俱病爲黑疸四一名文勞身黃額黑疸脉緩大  
順弦急而堅運已食如飴置熱消穀

## 五疸證治

善醫者諸疸通用或小便出血或小便如血用之皆效半盞  
拾片新汲水壹枚前服逐日常遣兩服小便漸白而渴止  
善醫者治黃汗自出發熱更暍小便不利

白芍藥

壹兩半

黃芩

多貞兩

甘草

多貞半壹兩

桂桂

黃耆

多貞兩

黃芩

多貞兩

右剉散每服四錢水煎半盞五片裏三枚煎服覆取微汗未

汗再服

必效散黃疸通用

草薢子

隔年

龍膽草

山梔仁

山茵陳

黃芩等分

右鹿末每服參錢新水煎服

清涼散治證發熱諸熱通用

柴胡

壹兩

赤伏苓

清兩

桑白皮

右剉每參錢薑茶煎服

葛根湯治濕熱瘀而發黃小便秘滯頭汗而渴

方見葛根湯門

五味子

治證通用

方見水門吞

葛根

清兩

治濕熱

發痘或前症

調下亦得

少商

治黃疸大小便秘滯

梔子

壹兩

茵陳

壹兩

枳實

大半錢分

右剉每服參錢薑茶煎片煎服

葛根湯加柴胡同煎卷

壹兩阿膠圓

方見葛根湯門

葛根熟發痘小便祕滯

梔子湯治熱疽

柴胡

壹兩

甘草

壹分

白芍根

壹錢

右件以水煎搗煎藥分時服壹日盡

生髮燒灰存性爲末新汲水調方寸匕日參服

葛根治痘瘡腹滿四肢運轉難行松瀆通通用口二陳湯加葛

不外此皆散治飲酒行事清熱於心經致成黃疸

伏苓

伏神

山藥

遠志

木通

黃耆

炙各

人參

甘草

北梗

各

木香

辰砂

各

麝香

半

人參

甘草

各

右細末每服貳錢加良少許用蜜煎湯調下日二服送下

黃連去鬚淨四兩蜜碎以酒酒醃壹宿日乾爲末粟米糊爲

圓桐子大每服三四十圓以陳湯加蜜煎入薑裏煎

伏苓

當歸

黃芩

茵陳

各半兩

白朮

枳殼

甘草

杏仁

皮

乾葛

各

半夏

蜜參分

右剉散每服參錢水盞半薑染片食前煎服凡酒疸熱痘大便秘者可

白朮治酒疸肚脹

草撥

荆芥穗

不姓川

練子

臘皮

生薑母

軟烏梅

甘草

右件等分於石臼中搗細用磁器盛以自己滿腹小便去其首尾取中間小便浸藥兩重紗蓋露星壹宿拂明飲其清汁續用

水從小便出而肚不脹妙

白朮治酒疸熱痘王瓜擣取汁服

兔絲子

各

辰砂

各

麝香

半

人參

甘草

各

山藥

各

芍藥

各

大黃

各

白朮

各

右爲末山藥圓桐子大每五十圓用烏鵲湯多加伏苓煎湯下

人參

當歸

白伏苓

當歸

白朮

當歸

甘草

當歸

加黃耆

白芍藥

白扁豆

當歸

右剉細每服參錢薑五斤棗研細并水調下

當歸

當歸

解

方

生車前草最治黃疸解諸熱淋研細并水調下

方

車前子炒末二兩飲調立止

圓潤

## 諸淋

諸淋方論

諸淋所發皆腎虛而膀胱生熱也水火不交心腎氣鬱遂使陰陽乖舛清濁相干蓄在下焦故膀胱裏急嘔血沙石從小便道出焉於是有欲出不出淋瀝不斷之狀甚者窒塞其間則令人悶絕矣大凡小腸有氣則小便脹小腸有血則小便澀小腸有熱則小便痛癟者爲血淋不痛者爲尿血敗精結者爲沙精結散者爲膏金石結者爲石揣本揆原各從其類也執劑之法並用去行滯氣疏利小便清解邪熱其於調平心火又二者之剛領焉心清則小便自利心平則血不妄行最不可姑息用補氣得補而愈脹血得補而愈澀熱得補而愈盛水澀不行加之穀道閉遏未見其有能生者也雖然腎氣虛弱囊中受寒亦有挾冷而小便淋澀者其狀尤寒戰而後溲便蓋冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒戰而成淋正氣勝則寒戰解而得便溺也况又有胞系轉戾之不通者乎是不可以無辯胞轉證候臍下急痛小便不通几強忍小便或尿急疾走或飽食忍尿飽食走馬忍尿入房使水氣上逆氣迫於肺故屈戾而不得舒張也胞落即殂

消石白者爲細末每服貳錢。血淋山梔仁前湯調下。熱

淋小便赤而淋澀暗下急痛新水調下或量令前湯下。氣

淋小腹脹滿尿後常有餘瀦。通煎湯下。石淋莖內痛割

尿不能出尿中布沙石令人絕此證將硝用抄紙隔炒

紙焦爲度再研細。參蛤粉。打開煎湯調下。

治諸淋急痛

黃色海金沙。滑石半兩

右爲細末每服貳錢半多用。木通麥門冬草新水煎入

蜜調下

五味子治諸淋

赤伏苓

生甘草各三分

當歸

山梔仁

黃芩各三分

右爲細末每服貳錢半水煮鹽煎至捌分空腹服或以五苓散和之用竹園屎門冬草鹽頭燈心煎湯調下

重面治諸淋小便痛不可忍

重前子

淡竹葉

荆芥穗

赤伏苓

燈心葛根

右件分作兩劑多用新汲水煎急服荆芥通竅

血淋治諸血下。各壹握新汲水煎湯調下若血淋更不好加金匱。佐之切不得用。草薢蓮蓬止澁之劑

治血淋熱痛

黃芩細剉新水煎通口服

治熱淋。方見積善門

治尿血

燒硝爲細末每服貳錢燈心菖蒲少許煎湯調下

血淋尿血通用

生乾地黃

木通

黃芩

生甘草

車前子 不炒

山梔仁

川芎

赤芍藥 級上

右件爲末每服參錢入竹葉拾葉薑全片煎服

車前子 治小腸有熱血淋急痛

生車前草洗淨切內搗細每服准壹盞許井水調濾清汁食前服若沙石淋則以煅瓦砾爲末和之新水調下

閼葵湯 血淋尿血通用

瀉滑石

赤芍藥

瞿麥穗

車前子 不炒

赤茯苓

石菖蒲去毛

桑白皮妙

阿膠炒

黃芩

生乾地黃洗焙

甘草

右爲細末每服貳錢入生姜燒灰壹錢沸湯調下如無羌根止用烹花

金匱治血淋沙淋小便澀痛

車前草於草陰地爲末每服貳錢生甘草煎湯調下亦治

小腸氣並癰癧腫用木通燈心赤茯苓麥門冬煎湯調下

車前草治尿血方具水飼門內加良少許用燈心壹握新水

前湯調下

火劑 治酒麯過度房勞後小便下血

半赤茯苓

赤芍藥

川芎

半夏曲酌半

前胡

柴胡

青皮

枳殼

北梗

桑白皮

白

羌根

燈心

右剉細每服參錢量五片蜜貳匙新水煎服

治小便出血方具水飼門 加白羌根前

治血淋諸淋小便痛不可忍方具水飼門

治心腎氣鬱膀胱有熱小便淋痛及諸熱壅滯

生乾地黃

木通

山梔仁

赤茯苓

大黃

赤芍藥

滑石

名正

大黃

赤芍藥

瞿麥

甘草

赤芍藥

右爲末煉蜜圓桐子大每服貳拾圓食後煎酒送下孰水亦得

臘石圓治濁氣干清精散而成膏淋黃赤白點如肥膏油蜜之狀

白伏苓菖蒲

桑螵蛸

鹿角膠鵝卵炒黃

秋石口半

右末研和糕糊圓桐子大每服伍拾圓入參前湯下

蠶沙圓治沙石淋痛害

蠶滑石

蠶石膏各半兩

石韋去毛

瞿麥穗

木通

蜀葵子各一錢

右細末每服貳錢半用葱頭貳片燈心壹握新水壹大盞蜜貳匙煎湯調下

鵬砂鵝卵治沙石淋急痛

鵬砂

琥珀

赤伏苓

蜀葵子

陳橘皮等分

右末每服貳錢半用葱頭貳片去心麥頭冬貳拾壹粒蜜炙

匙新水煎取清汁調一小或菉豆水浸和皮研清汁調下

太香湯治冷氣癆滯小便淋澀作痛鼻冷清

木香

木通

蠶榔

舶上茴香

當歸

橘紅

赤芍藥

青皮去白

澤瀉

右剉散每服參錢薑五片煎服

沙苑子

黑豆菖蒲

粉草菖蒲

右以新水煎乘熱入滑石末壹錢調和空腹服

# 消渴

附

脹滿 虛腫

消渴方論

水包天地前輩嘗有是說矣然則中天地而爲人水亦可以包潤五臟乎曰天一生水腎實主之膀胱爲津液之府所以宣行腎水上潤於肺故識者以肺爲津液之臟自上而下三焦臟腑皆固乎天一真水之中素問以水之本在腎末在肺者此也真水不竭安有所謂渴哉人惟淫慾恣情酒麯無節酷嗜炙燭糟藏酸酢醯甘肥腥羶之屬復以丹砂五石濟其私於是炎火上薰腑臟生熱燥氣熾盛津液乾焦渴引水漿而不能自禁矣渴之爲病有三曰消渴曰消中曰消腎分上中下三焦而應焉熱氣上騰心虛受之心火散漫不能收斂胃中煩燥舌赤唇紅此渴引飲常多小便數而少病屬上焦謂之消渴熱蓄於中脾虛受之伏陽蒸胃消穀善飢飲食倍常不生肌肉此渴亦不甚煩但欲飲冷小便數而甜病屬中焦謂之消中熱伏於下腎虛受之腿膝枯細骨節酸疼精走髓虛引水自救此渴水飲不多隨即溺下小便多而濁病屬下焦謂之消腎自消腎而折之又有五石過度之人真氣既盡石氣獨留而腎爲之石陽道興強不交精油謂之強中消渴輕也消中甚焉消腎又甚焉若強中則其斃可立待也雖然真水不充日從事於盃勺之水其間小便或油膩或赤黃或泔白或渴而且利或渴而不利或不渴而利但所食之物皆從小便出焉甚而水氣浸漬溢於肌膚則脹爲腫滿猛火自炎留於分肉則發爲癰疽此又病之深而證之變者也總前數者其何以爲執劑乎吁此虛陽炎上之執北叔和有言虛熱不可大攻熱去則寒起請援此以爲治法○又曰消渴證候人皆知其心火上炎腎水下泄小便愈多津液愈涸飲食滋味皆從小便消焉是水火不交濟然亦孰知脾

制腎水而心腎二者皆取氣於胃乎治法總要當服

可以養脾自生津液兼用好粳米煮粥以豬肉碎細入

鹽醋油酒葱椒茴香調和少頃粥熟而後入以此養腎則水有

所司又用

蒸飯白中杵粘圓如桐子每服百粒食後米飲下可以清心止渴

消渴證治

三膏湯通用亦治白濁

兔終子

酒浸參酒淘砂盆研細  
僵筋培乾

北五味子

茱白伏苓伍兩石蓮肉參兩

右末

陸兩末爲糊搜和搗三百杵圓桐子大每五十圓

食前米湯下神妙

治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

人參

遠志

姜淹取當歸

川芎

熟地黃

白伏苓

黃耆蜜炙

北五味子

甘草

微炙各半兩

天花粉壹兩

右剉細每參錢棗煎食前服

治諸渴疾

人參

半兩

白伏苓

一兩

右將

洗功研細以新水壹碗調開同蜜煎至半次入參

末拌和磁器蜜收匙挑服

治諸渴疾

黃耆

伏神

爪蔓根

麥門冬

去心各半兩

北五味子

甘草

炙各半兩

生乾地黃

一兩半

右剉細每肆錢新水煎服

治諸渴疾

川黃連

伍兩

淨白乾葛

知母

伏神

麥門冬

去心大熟地黃

洗燒各貳兩

爪蔓根

粟米各三兩 人參一兩

右木臼中同搗爲散入淨猪肚內縫密置甌內蒸極爛乘熱再杵細若硬加少蜜圓桐子大蒸汁下伍拾丸或粥飲下

又方一味黃連末入猪肚內縫密滿甌米上蒸熟日過杵丸如前法

黃連治諸渴

川黃連淨五兩 白天花粉 麥門冬去心各二分半

右末以生地黃汁并牛乳夾和搗圓桐子大每參拾丸粳米飲下

黃連治煩渴口乾

麥門冬去心 人參

伏苓

黃耆

半生半蜜炙

白乾葛

各一兩半

甘草

各一兩半

瓜萎根

乾葛

各一兩半

右末煉蜜丸彈子大每壹丸溫湯嚼下

黃連治渴通用

枇杷葉

新布拭去毛尖

白乾葛

生姜

切片炒一兩

大烏梅

七個

太草果

二個

淡竹葉

甘草

生半兩

右剉每肆錢新水煎服

黃連治渴通用

辰砂

白伏苓

牡礪粉

知母

金銀箔各二十片

苦參

天花粉

鐵粉

各半兩

蘆薈一分

右末取生蜜想生汁和生蜜圓桐子大每參朮丸麥門冬湯  
治渴疾熟時盡是食之爲妙  
又方生蜜細呷。又方生蜜搗取汁時飲少許

黃連補虛治渴止渴

雪白伏苓各四兩

右爲末鎊曬和圓彈子大每壹丸不飢飽細嚼下

**重陽湯** 治渴神效煮蜜搗絲湯任急飲之頓效如非時以終或綿煎湯服

**辰砂酒** 治渴證小便澁數而瀝兼有油濁方見指門用灯草伏苓煎湯下

**天龍粉** 治消渴飲水多身躰皆瘦

天花粉 黃連去須名一兩 伏苓

當歸各半兩

右末煉蜜圓桐子大每參拾丸半飢飽熟水下或伍拾

**瓜萎根** 治消渴骨蒸

黃連淨剉用 甘草引 浸一宿曬乾凡十次

右末方 丸桐子大每參肆拾丸半飢飽熟水下或伍拾九米飲下

**天龍固** 治消渴引飲無度

人參 瓜萎根等分

右末煉蜜丸桐子大每參拾丸麥門冬煎湯下

**天花粉** 治消渴

天花粉 生乾地黃洗各一兩

乾葛

麥門冬去心 北五味子各半兩

甘草一分

右籠末每服參錢粳米伯粒同煎服

**天龍固** 治消中消穀善飢

人參 白朮 白伏苓 甘草

霍香葉一兩 白乾葛二兩 木香半兩

加北五味子

柴胡 枳殼製各半兩

右籠末每參錢新水煎服

**伏神** 生乾地黃 黃連

麥門冬

去心

枳殼製

牡蠣粉

各一兩

石蓮肉

黃耆炙

知母各半兩

瓜萎根三分

右末煉蜜同搗三百杵丸桐子大每伍拾丸清粥飲下

小兒絲子圓治消腎以水煎服前湯下方見本門

狗杞子圓治消腎久渴困乏小便滑數

柏杞

兔絲子

酒浸

白伏苓

黃耆

杜礪粉

牛膝

熟地黃

洗

麥門冬

去心一兩

雞內金

微炙一兩半

桑螵蛸

瓜萎根

各二分

山茱萸

牡丹皮

各半兩

右末煉蜜和搗三百杵丸桐子大每伍拾丸食前粥飲下

治消腎補虛止渴

方見廁冷門

本方去附子以生五味

代之內

鴻臚塊再蒸

再蒸

治消腎不渴肌肉瘦削小便澀數而瀝如欲滲之狀

兎絲子

酒浸研培

山茱萸

酒浸當歸

益智仁

各半兩

川練肉

牛膝

葫蘆巴

炒

厚杜仲姜製炒

巴戟

去心

蕤

酒浸培各三分半

乳香

一分

右末糯米糊丸桐子大每伍拾丸棗湯或益湯食前服

奴補丸

治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠

二兩沉香半兩

澤鴻

截塊并覆盆子

白伏苓

人參

熟地黃

洗再炒

蕤

酒浸培

兎絲子

酒浸蒸研

北五味子

石斛

炒

當歸

酒浸培各一兩

麝

一錢

右末煉蜜圓桐子大

未研

衣每伍拾圓空心棗湯下

治消渴有虫出夷堅志

錄

取新白皮壹握切焙入

少許水貳碗煎至壹碗空心飲之雖困頓不妨自後下虫三四條狀如蛔虫其色真紅而渴頓止乃知消渴壹證有虫耗其津液

# ○。脹滿

脹滿方論

陰陽愆伏榮衛凝滯三焦不能宣行脾胃不能傳布此脹滿之

脹滿

所由生也曰穀脹曰水脹曰氣脹曰血脹或冷或熱又不可以無別失飢傷飽痞悶停酸旦則陰消陽長穀氣易行故能飲食暮則陰長陽消穀氣難化故不能食是爲穀脹脾土受濕不能制水二瀆於腸胃而溢於趺膚癰二有声怔忪喘息是爲水脹七情鬱結氣道擁隔上不得降下不得升身腫大而四肢瘦削是爲氣脹煩燥漱水迷忘驚狂痛悶嘔惡虛汗厥逆小便多大便黑婦人尤多見之是爲血脹陽挾爲邪則身躰有熱脹滿而咽乾陰寒爲邪則吐不下食脹滿而自利隨證劑量是固然亦抑猶有虛实之辨焉實者腹中常脹外堅內痛按之不陷法當爲之疏利虛者時脹時減虛氣留滯安之則濡法當以溫藥和之此又出於隨證劑量之外其若久病羸乏卒然脹滿喘息不得與夫腑心突起或下利頻三百藥遍嘗未見一愈者耳

脹滿證治

附治七氣爲鬲飲食不消穀脹氣脹通用

直方十七

六

人參

伏苓

厚朴製

橘紅

蓬木

枳殼製

半夏麴

甘草炙

生白姜

辣椒

檳榔

木香等分

右杵末每參錢姜貳片棗貳枚煎服

大黃

治穀脹氣脹

京三棱

蓬木

青皮

陳皮

半夏麴

霍香

北梗

益智仁

枳殼製

香附炒各半兩

甘草炙三分

右剉散每參錢姜五片棗貳枚煎服

大黃

治七氣留滯飲食不下氣滿膨脹方見諸氣門

大黃

治痘滿脹痛穀脹氣脹通用

草澤茄

白豆蔻仁

縮砂仁

青皮

蘿蔔子

木香

各三分半

肉豆蔻

茴香炒三分

辣桂

丁香

一分半

陳皮

三分

右末飛麪煮稀糊圓桐子大每卷拾圓煎湯下

諸氣散治氣滯脹滿宿食不消方見諸氣門

大半夏湯

方見痰涎門

小半夏水全功湯

方見水飲門

二藥加減

紅北梗

煮熟並主水氣脹滿

和劑流氣散調榮衛利二焦行痞滯消腫方見諸氣門

加減見水腫門

調降湯治氣脹方見喘門

沉香降氣湯

治陰陽交滯心腹脹滿留飲停酸積冷諸證方見諸氣門

人參同歸湯治血脹

當歸

半夏各一錢分

川芎壹兩

蓬朮

木香

縮砂仁

烏藥

甘草炙各半兩

人參

辣桂

五靈脂炒各壹分

右剉散每服參錢薑伍片棗貳枚紫蘇四葉煎食前服

溫胃湯治冷則氣聚脹滿不下食

熟附子

當歸

厚朴製

人參

橘紅

半夏麵

生白薑

甘草

炙各壹兩

右剉散每服參錢棗貳枚食前煎服

通氣散治冷證腫脹泄瀉方見諸氣門

厚朴

枳殼製

北梗各半兩

甘草

炙各壹兩

右剉每參錢薑伍片棗貳枚烏梅壹枚煎服

丁香

木香各壹兩

乾薑壹兩

深村百草霜貳兩

大杏仁

壹個去皮尖

肉豆蔻半錢

肥巴豆

半錢去油

黃蠟

肆兩用老酒黃

麻油

壹兩半錢各添半兩

細末

三分

研極得所煉油蠟和成

劑油單裹漸圓至大每五七圓加至拾伍圓熟水下來

然可治痢不可

方見諸氣門

通利脹滿雖然

可治痢不可

方見諸氣門

治瀉蓋病家服之有積則行無積則止若以此亦可治瀉誤人已上數劑前氣類多困乏方却在此

## ○虛腫

### 虛腫方論

虛腫

賈洛陽以病腫不治必爲痼疾雖有扁鵲亦莫能爲則知腫之危惡非他病比也夫人所以得全其性命者水與穀而已水則腎主之土穀則脾主之惟腎虛不能行水惟脾虛不能制水胃與脾合氣貫爲水穀之海又因虛而不能傳化焉故腎水泛溢反得以浸漬脾土於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫矣其狀自胞上下微起肢體重着咳嗽怔忪股間清冷小便澁黃皮薄而光手按成窪掌手即痛是也治法大要身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可下其閑通利小便順氣和脾俱不可緩耳然而證雖可下又當權其重輕不可過用

可過用

猛烈之劑一發不收吾恐峻決者易固

閉者難水氣復來而無以治之也雖然水之爲腫特一耳曰風曰氣曰血合而有四焉風腫者皮癱麻木不仁走注疼痛氣腫者皮厚四肢瘦削腹脹脹其或煩躁漱水迷忘驚狂嘔逆順悶皮間有紅縷赤痕者此血腫也婦人經脉壅閉敗血停腐尤多見之然婦人懷胎亦有氣遏水道而虛腫者此但順氣安脾飲食無阻既產而腫自消若產後發虛則虛退而告殂矣大凡虛腫先起於腹而後散於四肢者可活先起於四肢而後歸於腹者不治至若蟲脹而肚上有筋腹滿而大便滑泄久瘧而轉作虛浮與夫脣黑傷肝缺益平傷心脾突傷脾足平傷腎背平傷肺皆爲不治之證當明辯之。男從脚下腫而上女從身上腫而下或肉硬或手掌平並不治

虛腫證治

青龍湯

澄表有水

聚湯

量用治裏有水詳

方見水飲門

多用  
少用  
氣藥交和食前溫湯下治水腫

效方見水飲門

溫圓治十種水病積聚脹滿癰癥癰漏久瘡諸風

吳茱萸

鹽膽朱砂末

柴胡

北梗

石菖蒲

乾薑

肉桂

黃連

伏苓

人參

川椒

厚朴

皂角

去皮子炒

紫苑茸

巴豆

去皮膜出

川烏頭

去皮膜

巴豆油各半兩

川烏頭

去皮膜

右細末和巴煉蜜圓桐子大每服參圓食後薑湯下加至五

七圓止治水腫

用

加炒

入些薑汁略煎

送下

方見水飲門

沉香

丁香

木香

青木香

霍香

川芎

赤伏苓

檀榔

枳殼

甘草

乳香

麝香

壹年麝

研末

右龜末每貳錢半薑參片紫蘇葉姜末入煎服凡虛腫先用諸香以透其關絡然後審證察之

蘿蔔子

赤伏苓

牛膝

草薢

研末

甘草

各等分

半夏

川芎

檀榔

棘桂

青皮

陳皮

青木香

白色商陸

各等分

半夏

川芎

檀榔

白芷

方見水飲門

加

煎吞

研末

送下

無熟者

研末

白芷

方見水飲門

加

煎吞

研末

送下

無熟者

研末

右剉每服參錢薑肆片不飢不飽煎服

方見水飲門

加

煎吞

研末

送下

無熟者

研末

健脾散

方見水飲門

治水腫

研末

水腫

研末

送下

無熟者

研末

牽牛

燒取末

蕷蘆

燒取末

木猪苓

燒取末

川椒目

研末

澤瀉

木香

各等分

川椒目

研末

川椒目

研末

川椒目

研末

腫

右末先以葱白二莖粟水煮熟而半盞入老酒半盞調藥末三錢空心服

荷圓治水腫氣腫

葫蘆巴炒去目

故紙炒出汗

縮砂仁

草澄加

正川椒炒出汗

烏梅肉着薦名貢錢半

烏梅肉着薦名貢錢半

木香

牽牛炒半兩

巴豆肉各去油青甘露蜜半

右末稀麪糊圓盒豆大每伍圓食後薑湯下

治晉滿腹腫大渴不止時或乾呕

人參

川厚朴製

草果仁

良薑

芍子炒

川白薑生

藿香

肉豆蔻炒

真橘紅

甘草炒各一錢分

蒼朮炒

縮砂仁

伏苓各一錢分

川芎炒

赤茯苓

陳皮

桑白皮炒

青皮

陳皮

枳殼

赤茯苓

當歸

川芎

石韋炒去毛

羌活各壹分

半夏炒

牽牛炒取末

牽牛

甘草炙各半

右剉每參錢薑肆片煎服

防風去節

牽牛炒取末

甘草

炙各半

白芷

半夏炒

芍藥

陳桂

羌活

獨活

當歸

川芎

右剉每參錢薑肆片紫蘇三葉煎服

防風去節

治氣作鹽脹但腹痛而四肢頭面不腫

紫蘇葉縮砂

紫蘇葉縮砂

紫蘇葉縮砂

枳殼

青皮

陳皮

二錢

蓬木

檀榔

辣桂

白豆蔻仁

車澄茄

木香

半夏

蘿蔔子生

甘草

分半

右剉每服錢薑棗煎服

枳殼

白术

紫蘇葉

辣桂

陳皮

檀榔

北梗

木香

五靈脂

半夏

伏苓

甘草

右剉每服錢薑棗片煎服

華陰細辛

義木

辣桂

延胡索

當歸

川芎

白芷

檳榔

大腹皮

桑白皮

瞿麥穗

赤茯苓

陳皮

蕷蘆

大黃

甘草

壹分半

右剉每服錢薑棗煎食前服

歸活血分如前

川續斷

赤芍藥

辣桂

五靈脂炒

羌活

赤茯苓

牽牛

炒取末

半夏

甘草

各壹分半

右剉散每服錢薑棗片食前煎服

右治遍身腫外腎腫

壹箇半足全者研細入

末等分老酒調下

右剉散以童尿洗淨以童尿浸壹日夜取出別換童尿又浸壹日後再取出文搜童尿浸壹日夜次以生布錢袋牽擦去皮於臼中搗細用米醋煮飛白麪糊圓子大每服半拾圓煎和劑流氣熱透下方見張漢門

又方

生綠豆

信合橘皮貞錢

良藥

細剉

右燒之貞錢當燒錢細剉煎湯候冷調綠豆末得所然後

略煖連參日空心服

青皮

木香

黃連

橘紅各壹分

胡椒

壹錢半

右爲末入巴肉不用去油壹錢麪糊圓胡椒大每參肆圓  
薑湯下大便利腫自消未利再服停積病滯通用

又方二山一味大流氣壹貼加巴肉壹錢用蜜煎通酒參條  
載砂罐內壹握用薑柒片大棗貳枚新水壹大碗同煎取清汁  
調和合進圓參圓吞溫酒伍圓效溫三圓方見腎門  
治外腎腫大生物水泡透明方二十七味透氣散加白芷一兩  
細研吞服百粒效

腫

增修仁齋直指方論卷之十七

身曲直



腰痛

腎氣

木腎

身疼方論

凡人百骸四體肌肉皮膚關節脉絡總而謂之身風淫濕滯血刺痰攻皆能作痛至於骨之酸疼或寒或熱入裏徹骨則倍蓰千萬大不侔焉蓋骨為髓之藏體者飲食五味之實秀也髓虛則骨盡熟所必至矣痛在於身風之證以走注知之濕之證以重着驗之血有筋脈讚刺之證痰有眩暉咳唾之證驅風除濕行血豁痰對證一投猶冀可以旦暮起病入於骨此勞極損傷之不可救藥者也真能生乎然則身痛之與骨痛毫釐千里之差於此不可以無辨雖然胃家之癆多為項腫臂痛蓋熱在上焦不能清利故釀日久生痰涎聚飲氣流入於項臂之間不腫則痛耳然而曰痰曰涎曰飲又有理一分殊之別伏於包絡隨氣上浮客肺壅嗽而發動者痰也聚於脾元隨氣上溢口角流出而不禁者涎也惟飲生於胃府為嘔為吐此則胃家之病學者不可不知

身疼證治

人參頭風散 方見溫藥 加川芎當歸治血刺身痛  
大黃散 方見寒藥 加桂枝陳皮治痰證身痛並見風藥  
加味大黃散 方見寒藥 加川芎當歸治風濕身痛並見風藥  
加味大黃散 方見寒藥 加川芎當歸治風濕身痛並主傷濕身痛

猪苓散 方見寒藥 加川芎當歸治血刺身痛  
大黃散 方見寒藥 加桂枝陳皮治痰證身痛  
猪苓散 方圓治臂痛不能舉手或左右轉移或兩臂如人抽拽圓白半夏 溫散參芩切碎 伏苓 売散

風化朴消 薑散 半分 枳殼半兩  
右末薑汁煮稀糊圓榧子大每空一拾圓食後薑湯下

山治痰注臂痛

片子菖蒲

陸錢

天仙藤

羌活

白术

白芷梢焰半夏製半兩

右剉每服參錢菖五片煎服間下

方見腰疼類

諸風痰涎通用

圓白半夏

生煎內服水

南星

各三兩

白附子

生煎內

川烏頭

生去皮膽半兩

右細末入生絹袋并水搗以手揉出滓再研入袋搗盡磁盆中曬露至曉弃舊水換新水攢曬次早又換新水攢曬春夏日夏參一日秋柒日冬拾日本水曝乾研開糯米粉煎粥清圓菉豆大每參拾圓菉湯下治酒家癰壅項腫

研末

白芷

前湯調下吐痰立愈自後

陳湯加

服方見癰類

身疼

全蝎

紫箇新瓦上

麝香

書字

右老酒參姜空心調作壹服如覺已透則止未透次日再作壹劑然病未盡除自後專以

洗淨切碎酒煎日貳服

神效

酒飲圓

治酒齶停飲臂痛

見水飴門

沉香

人參

牛膝

伏參

當歸

木香

黃耆

蜜炙

巴戟

去心

熟附子

辣桂

去桂

鱉甲

各一兩

荆芥

各半兩

羌活

熟地黃

各半兩

全蝎

重錢半

大肉豆蔻

蜜炙

右末每貳錢葱白兩水煎參片另臺貳枚食前煎服溫酒調下尤妙

加製蜜酒治勞倦身痛方見瘤門

治風淫而刺身體疼痛四肢拘攣

延胡索

辣桂

當歸

右末每貳錢酒調下活血除風理氣

頭鵝頭補益真元治臂痛腰痛

杜仲

黑熟肉破故紙

同

鹿茸

貳肉

沒藥

宣兩別研

右細末用酒浸去皮杵爲膏入藥少許酒煮糊圓桐子大每百粒空心盃湯下

## 腰

### 腰痛方論

自疼

腰者腎之外候一身所恃以轉移闔關者也蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊腎氣一虛凡衝風受濕傷冷畜熱而溼氣滯水積墮傷與夫失志作勞種種腰痠疊見而層出矣衝風者汗出乘風邪風毒之胚胎也受濕者踐雨日濕重者腫滯之前驅也腰間如水為傷冷發渴便閉為蓄熱血滯則轉側如錐之所刺氣滯則鬱鬱悶悶而不伸積水沉重則小腸不得宣通隊齊損傷則瘀血為之繫結沮剉失志者腎之蠹疲精勞力者腎之戕舉是數證腎家之感受如此腰安得而不為痛乎內經曰腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣審斯是則痛在少陰以究其受病之原而處之為得雖然少筋聚於陰器肝者腎之同系也五臟皆取氣於穀脾者腎之倉廪也鬱怒傷肝則諸筋縱弛憂思傷脾則胃氣不行二者又能為腰痛之寇故併及之

### 腰痛證治

頭鵝頭治腎虛腰痛益精助陽烏龜壯脚

破故紙

肉桂仲

去舊制新兩用蜜酒貳兩半擦擦炒乾

右細末用

蜜酒

大半

參拾箇

濃入少數蜜圓桐子大每服五

上圓頭氣散食前下方見張氏門

少腎圓治腎虛腰痛煎服食前下方見水飲門

獨活風寒濕氣治風邪冷濕傷腎腰脚背痛及新產腹痛腰脚攣  
疼最除風活血脚氣通用

獨活風寒濕氣寄生如無以獨活代之杜仲蜜製炒

細辛

牛膝酒浸焙

秦艽去苦味

伏苓

白芍藥

辣桂

川芎

防風

人參

當歸

熟地黃角

甘草炙

右細剉每服半錢空心煎服下利者去

川芎

加桂去皮尖炒

小茴治風久腰痛方見諸風門加桂去皮尖炒

附子生

蒼朮炒

杜仲蜜製炒

生乾薑

白朮

伏苓

牛膝酒浸焙

厚朴蜜製

甘草炙各

右剉每服三錢薑片棗一枚食前

小茴治陽冷腰痛方見寒氣加桂去皮尖炒

食前服

小茴治內蓄風熱入腎腰痛大小便不通方見積熱門加桂

去皮尖炒

小茴治血澀腰痛方見血氣類用桂斷牛膝桃仁炒煎湯

磨下

小茴治腰間積水痛重方見濕門續用安腎圓并少許桑

子

小茴治打墜腰痛方見水飲門續用安腎圓并少許桑子

入小茴前湯調下

虎脣骨

酒炙

敗龜

酒炙

驥驥竭

蜜炙

赤芍藥

蜜炙

當歸

酒炙

沒藥

酒炙

白附子

蜜炙

自然銅

蜜炙

辣椒

蜜炙

防風

酒炙

白芷

蜜炙

牛膝

蜜炙

牛膝

蜜炙

牛膝

蜜炙

天麻

檳榔

五加皮

羌活各壹兩

右末每服壹錢溫酒調下加金鴉妙脚氣通用

破故紙炒香茴香炒 辣桂芥子粉

右末每服貳錢熟酒調食前進飲酒主腰痛止行血

右末每服貳錢熟酒調食前進飲酒主腰痛方見氣類多加白芍少加萸肉少加萸肉少加萸肉少

右末每服貳錢熟酒調食前進飲酒主腰痛

力腰痛

一方見桐冷門

半夏

炒

分

辣桂

宣木瓜

當歸

川芎

牛膝

好紹辛

各貳

石菖蒲

甘草

各貳

分

右剉細每茶錢薑伍片棗貳枚煎服

右末每服貳錢半薑裏煎治憂思傷脾發爲腰痛

腰痛

方見諸氣門

右末每茶錢薑伍片棗貳枚煎服

腰痛

方見諸氣門

橘核

茴香

葫蘆巴

奄藺子

破故紙各炒附子肉等分

右末酒煮糯米糊圓桐子大每服參肆拾圓食前鹽湯下治腰痛不能轉側一方見神經壹大塊燒通紅淬老酒去神麪通口吞

八角茴香炒末食前溫酒調下

○臘月二氣

腎氣方論

腎主納氣人之氣海藏焉腎虛而爲風寒所乘爲者濕所襲而

喜怒憂恐所傷而水結不散又與氣搏是以群邪聚於其中曰疝曰奔豚曰小腸氣曰膀胱氣皆是物也其候不特外腎小腹作痛或攻刺於腰脇或游走於背膂或冷氣搶心心下痛滿或手足厥冷痛遊脣傍或脇之左右如盃或臍之上下如臂或腹中累累如桃李或胃脘間擾大如盤有壯熱惡寒者有酒漸寒孰者有不得大小便者有裏急而下泄者有自汗出者有不欲食者其於陰間則外有小大伸縮而上下不當囊有腫脹急痛而發歇無定按冷觸怒則塊物逼上囊根或攻腹脇時和心平則塊物自消脅系歸入囊中凡此皆謂之腎氣治法綱領風則散之寒則溫之暑則解其熱濕則滲其水七情所發調其心氣水與氣搏行其小便其間以主治腎氣之劑參之固定則也然總治之法大要以流行踈利爲先母曰腎虛得病不敢踈泄蓋腎爲邪氣所干若非逐去病何由愈儻或姑息畏虛妄以剛劑兜住使大小腑秘而不通邪氣入腹衝心危殆必矣雖然腎氣發作固以腎虛得之然虛中有冷虛中有熱又有冷熱不調尤當詳審冷者腸邊及外腎清冷小便清而多遇寒即發是也熱者內挾暑氣或積酒毒或服邊藥於前外腎與小腹俱熱肛門間糞後亦熱小便數而澀遇熱則甚是也冷熱不調者小腹外腎乍冷乍熱大便小便或秘或利用藥溫涼當隨證而權度之但所謂流行踈導常常運轉於其中矣其若大小便流利之後或更有牽刺引疼或微氣遊注於肌膚之間此則腎虛血虛氣不還元當加潤養人參當歸四物湯

韓文

可無惟是逆氣長噓中脘停酸燥悶擾甚而至於嘔吐最爲惡候何則天一生水腎實主之宗筋聚於陰器惟藉陽明以養之今脾土不濟腎水上乘必爲酸汁必爲涎飲在苒渝時遂成暴吐醫家熟劑之始皆知腎經惡燥如增補之言食之類誠不敢發用耳及其嘔吐大作嘔木蜜用之而不顧若猶未也則

勢至此脾土未強腎水已爲之涸腎水既涸脾土又爲之焦往  
往陰陽不升降榮衛不流行大小二便閼滯虛閉而腎汁胃汁  
皆自其口出也如此者大抵不救臨病須當識證預與病家言之

腎氣證治

右圓治風寒疝痛及諸血滯作痛

牡丹皮

四兩

桃仁

浸去皮炒別研

官桂

各半兩

川烏頭

壹隻去皮尖

熟

右末煉蜜圓桐子大

每服伍拾圓

溫酒下血痛醋湯下

卷之四

方見痛冷門

治奔豚氣痛嘔吐身冷

頭痛下

右圓治腎虛無陽小腸氣痛頭額小腹外腎時冷兼治濕證

附子

生

沉香

壹錢

辣桂

草

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

右剉爲壹服薑小片空心煎服

右圓治無陽臍冷疝氣兼治濕證

吳茱萸

半兩

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

右圓治腎冷寒疝

良薑

半兩

巴豆肉

炒去巴豆

桂心

半兩

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

右圓治腎冷寒疝

柏子仁

半兩

胡椒

壹錢

縮砂仁

半兩

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

車燈丸

白豆蔻仁

甘草 各一錢分

右鹿末每參錢薑棗煎食前服

橘皮散治腎氣虛中有熱小腹外腎肛門俱熱大小便不通

梔子仁

枳殼 各半兩

北梗

北前胡

青木香

赤伏苓

車前子

甘草 各一錢分

右剉每參錢新水煎服壯熱加大黃 大便秘加大黃

杏仁湯治腎氣虛中有熱大小便不通

黑豆

參合 甘草 蒼錢剉 薑茶片

右作壹劑新水煎取清汁服

桔梗散治腎氣熱證小便祕黃色

海浮石

右細末每貳錢煎食前取清汁服

金匱散治膀胱氣痛

巴豆

參半粒去殼研斷

川練子

川柏薄切片

右件用麸貳合同炒令黃亦去麸與巴豆只將川練爲末每

貳錢溫酒調空心服

橘皮散治腎氣冷熱不調

柴胡

葛根

人參

桂枝

白芍藥

生薑 各半兩

半夏

黃芩

甘草

各參錢

右剉散每服肆錢姜煮取水大盞煎分溫服

橘皮散治奔豚疝氣攻刺走痛

辣桂膏

兩半

蜜牛膝鹽煎酒服

青木香散治膀胱疝氣每伍錢圓以蜜煎入蜜煎酒服

下亦見水飲門又方竇氏言貳柏粒茶末筒去頭足翅

爲末同於文武火上慢慢炒令圓子微香以磁碟蓋鋪上頓在冷處少項去皮取圓子每服伍拾圓子

調下

金匱治膀胱小腸氣外腎腫痛

大川紳子

參根去皮根頭切碎片一錢參根

右以酒煎服等分

各半盞連根心一寸煎取汁食前調下

治小腸氣痛不可忍一箇去頭足翅入大棗中線繫濕紙包置慢火中煨令香熟去紙空腹食棗以

前湯送下

治膀胱小腸氣痛金匱緊實而全者不拘多少焙乾爲末每迎病發時用一錢入半字分作貳服溫酒調下人行捨里又進後服神效

治小腸氣痛及諸血痛

川五靈脂

蒲黃

加延胡索各等分

右末每服貳錢酒半盞煎分食前服血痛臨熟入米醋少許

治小腸氣吊腹中成陣刺痛兼治風證

益智仁

白芷

白乾薑

茴香

甘草

天台烏藥

法香附子

青皮

壹兩半

續椒

麻黃

去節

川芎

枳殼

各半兩

右末每服貳錢少許水煎食前服

全蜀王氏治小腸氣痛最良

延胡索

用鹽炒研

全蜀王氏生用各分

右細末每服壹錢食前溫酒調下亦治心痛不飢飴醋湯調下

金匱治小腸氣攻刺

茵薑

炒青曲

右末每服貳錢酒沃蓋定取酒調下

附錄治腎氣兩病七氣通用

當歸

川芎

枳殼

官桂

青皮

川白薑生

茴香炒

川練肉

陳皮

紫蘇

三棱酒

蓬木附浸壹宿宿

芍藥

伏苓

木香各一兩

人參

沉香

甘草炙

各半兩

右鹿末每服參錢葱白貳寸鹽少許煎服大便秘加

寸金圓治奔豚諸疝作痛

當歸

延胡索

舶上茴香炒

葫蘆巴

各一兩

桃仁

桑螵蛸酒

川五靈脂

別研白芍藥

川練肉

茱萸粉

木香

全蝎

各半兩

右末米醋打麪糊圓桐子大每服伍拾圓少鹽入酒送下有

熱小便秘重前後二分以之前湯下

法寒疝作痛方見通氣門

每服貳錢入

白薑

各半兩

少鹽煎服是藥末用茴香鹽酒調下

治腎虛爲邪所襲留伏作痛陰癰偏大或生

瘡出苦水

吳茱萸

酒半盞

晨早

馬蘭花醋浸培

川練子

桑螵蛸

官桂

用盐炮

延胡索

黑豆炒

橘紅

取舶上茴香

桃仁

去皮

白蒺藜

炒木香各半兩

右細末酒麴稀糊圓桐子大每肆拾圓食前溫酒鹽湯送下  
頭膚巴圓治腎經虛冷膀胱氣痛或陰腫偏墜或小腹有物如  
卵上下走痛

葫蘆巴

川練子

桑螵蛸

各半兩

川烏炮去皮臍

各半兩

大巴戟

去心各半兩

牽牛炒取末貳兩

各半兩

吳茱萸

半盞

桑螵蛸

各半兩

牽牛炒參兩

各半兩

右爲末酒麴稀糊圓桐子大每貳拾圓空心溫酒送下

治小腸膀胱氣痛

延胡索

豆兩

川練

熟地黃

舶上茴香

熟各半兩

牽牛

炒去未

當歸

天台山烏藥

各壹分

良薑

全蝎

朱葛炮

青皮

去白

右末生薑自然汁浸糕爲糊圓桐子大每服參拾圓燒綿灰存性調酒送下

黑牽牛

炒熟

白牽牛

炒熟

右爲末每服挑參錢匕一錢壹副薄切開縫入伍拾粒  
壹柏粒以水偏摻入腎中線繫濕紙數重裹煨香  
熟出火氣燈後空腹嚼喫好酒送下少項就枕天明取下惡  
物即愈

伏苓

蒸熟

治腰下悸動欲作奔豚

伏參

蒸熟

甘草

半兩

桂枝

壹兩

右剉細每服肆錢棗壹箇用甘泉水壹盞煎服

治疝氣外腎脛張極大或生瘡山黃水其痛遠脅寒熱

京三棱

達義木

木猪苓

白附子

蘿蔔子

赤芍藥

黑牽牛

川練肉

山因陳

青木香

陳橘皮

五靈脂

澤鴻

鹽酒半升生用

海藻

酒浸壹宿去巴旦不用

海浮石

米泔浸大端如海螺壳去頭足脚同炒黃又此未次黑爲度

川山甲

熟大灰煨各壹兩

青皮

去白頭去皮兩瓣生用壹兩萬磚灰炒熟不用

香附

半兩鹽兩壹兩生用壹兩以巴旦無去巴旦不用

右件截碎夾和微炒爲末酒麴并糊圓桐子大每服參拾圓溫酒送下此藥能泄肝膽之用

治膀胱小腹氣不消諸丸通用

方見本門

金匱要略治腎氣攻刺及腳氣酸疼通用皆得效

葫蘆巴慢火炒牛膝酒浸炒舶上茴香酒浸炒

肉蓯蓉酒浸炒川續斷生用厚杜仲去皮鹽炒

天麻各頭兩當歸酒浸炒白芍藥別研各一錢

右爲末以去枝梗頭大木心枝切去蓋去糠入文塞滿  
蓋定竹針挿麻線繫蒸酒研細和藥爲圓桐子大每服染拾  
圓溫酒盞湯任下

鷄頭目人七氣湯加炒桑子煎服

生薑母多開小孔納以山礬濕紙裹透老酒嚼下

## ○木腎

木腎方論

心火下降則腎水不患其不溫真陽下行則腎氣不患其不和  
溫溫其和安有所謂木強者哉惟夫嗜慾內戕腎家虛羸故陰  
陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯其間脹大作疼頑痺  
結硬勢所必至矣執劑之法不可純用燥熱當溫散溫利以逐  
其邪邪氣內消榮衛流轉益如寒谷回春蓋有不疾而速不行  
而至者矣外此又有一種升高墜下外腎跌傷驚氣與敗血交  
攻亦有木強脹痛之證治法大要則同於中更爲之消瘀

木腎證治

川練子治外腎脹大麻木痛硬及卒豚疝氣偏墜諸證

川練子不蔓者取根治以鹽先切茱萸取肉以鹽潤之貢錢半  
同炒併留皮切茱萸以鹽潤之貢錢半同炒併留皮  
牛膝切茱萸以鹽潤之貢錢半同炒併留皮切茱萸以鹽潤之  
肆面去頭同炒去頭用巴豆不用巴豆茱萸以鹽潤之  
炒去頭子南香油青木香各半辣桂

南木香各半蜜丸

右並爲末酒調椿葉糊圓子大每服參拾圓食前盞酒下  
積日計功打墜瘀血證不方加巴豆蜜丸高畧炒入藥以

研為末調酒下

治膀胱小腸氣痛外腎脹大通治木腎方見腎

治腎冷疝氣脹痛

吳茱萸

陳海言西言半用芝石同宣宿半用米醋浸鹽酒各口服

大茴附

甘草半兩

青木香

各口半兩

玄參末米糊圓桐子大每服柒拾圓食前益湯下或乳香葱

白煎湯下

# 目腎臟風癢

附

頭風

## 腎癢方論

實則爲痛虛則爲癢癢之出於腎蓋也明矣腎屬足少陰之經  
裏間濕癢謂之腎臟風也所共知也孰知宗筋聚於陰器足厥  
陰之肝系焉惟腎主虛惟肝主風人之精血不充內爲嗜慾所  
耗外爲風冷所乘風毒濕氣皆從虛入裏間其有不濕癢者乎  
脚下其有不瘡瘍者乎療治之法先當疏散風邪流行濕毒夫  
然後以活血與驅風數輩潤養而平治之若欲  
遽用燥烈之劑五品心擴生內邪病無由愈間有患者  
爲酒麵炙搏所傷腎虛而挾熱如煩躁黃疸發爲圓子又不可  
無其或不施藥餌一切從事於熱湯雖沃之暫止然真氣愈泄  
肝腎愈虛或者未知收濟

## 腎癢證治

### 宣鳳散疎肝腎風

大雞心一粒

葛根

橘皮半兩

獐牛膝取末一兩

白芷兩

甘草半兩

右末每服貳錢蜜湯調下

### 不寐散去肝腎濕氣

方見前集

### 腎臟風水

方見水鏡門

### 用安靜圓少用青之膏圓

來和鹽湯下屢效

方見水鏡

### 頭風

方見水鏡門

當歸

川芎

白芷

華陰細辛

白芍

桃仁

白芍藥

半夏製

塊潤

杜仲

白芍藥

桂枝

橘紅

檳榔

天麻

黃芩

款冬花

右細剉每服參錢水盞半薑錢伍片棗貳枚煎七分濾清暖  
熱入鼻竇末少許含前服鼻竇以收心氣使心腎相交或有

熱證去薑加蜜煎

蕤蕤散治癩風上攻耳鳴目眩下注陰濕瘡瘍

蒺藜炒剉草烏頭水浸些日後日用白芷

白附生

蒼朮炒

荆芥穗各半錢

右懸末米糊圓桐子大每錢拾圓上則茶清下則益酒服

甘草同治肝腎風養方見腸風門

治外腎濕瘡方見虛勞類

大腹皮

壹升

腎臟風瘡

右夾苦參頭煎湯溫洗拭以津唾塗次用細鹽燒存性入  
些白芍未傳逐日前煎湯盞室洗換藥或用細鹽燒存性仍服  
并蜜煎用米飲調下

莖頭三五孔小漏瘡出血微膿妙方

油髮燒存性灰傅乾則津唾調仍以米湯調髮灰食前服  
並蜜煎用米飲調下

龍骨

石膏生

五倍子各壹白及

乳香

黃華丹各半麝少許

右細末先以

大腹皮紫蘇葉

煎湯溫洗後傅

爐甘石

青分

真蚌粉

黃連

五倍子各半分

右細末摻先以

大腹皮前湯溫洗

又爐甘石方見諸瘡門

油髮灰

青黛草等分

右爲末入些鹽或摻或津唾調傅

又青紙方見筋膜瘡門

大學治腎臟風發發齊方

雞心檳榔

黃連、黃芩、生地、當歸、全蠶、參、白芍

明疏黃

黃連、黃芩、生地、當歸、全蠶、參、白芍

右同末入半錢少許於磁器收每用少許調抹兩掌心以臘臭男以兩掌擦外腎女以兩掌擦兩乳各睡至醒次日又如此用藥屢效

多用酒加去目水蘸濕半日來研膏擦手如上法亦驗

## 頭風

### 頭風方論

腎臟風癢

是太陽者頭之經也六經傷寒惟太陽受病最多蓋頭居其上當風寒之衝一有間隙則若項若腦若耳若臘風邪乘虛皆得而入之矣况復擣沐取涼飽食仰卧之不謹乎頭風為病不必

須有偏正頭疼之證但自頸項以上耳目臘眉後之間或有一處不善之體焉皆其漸也有頭疼有頭運有頭皮頑厚不自覺知有口舌不仁莫知滋味或耳聾或頭汗或目痛或眉棱上下掣痛或臘中聞香極香聞臭極臭或只呵欠而作冒眩之狀凡此皆頭風證也治法大要有執證者消風散用防風消芥煎湯下無熟證者宜頭項用薄茶清下又有素患頭風之人或因傷風寒暑濕休證調理已獲輕安未幾頭風發作則不必拘泥前藥當以頭風和平之劑療之其或病驅老弱先患頭風復感寒邪自汗不止此等用藥無能之又不可也若夫太陽項強一證無汗惡風則爲表實合用葛根湯汗出惡風則爲表虛合用葛根湯此是又感受風邪在頭風界限之力者也入水捕魚入林捕兔要必知其所在斯可矣

消風散治頭目昏痛鼻塞冒運

人參

羌活

川芎

白伏苓

白僵蚕

霍香葉

荆芥穗

防風

甘草

厚朴

陳皮

各半兩

右末每服貳錢

煎湯調下

追風散

治偏正頭風寒癟面上遊風狀若虫行

川芎

荆芥

甘草

南星

防風

羌活

天麻

全蝎

白附子

雄黃

甘草

南星

地龍

白芷

天麻

全蝎

乳香

羌活

全蝎

右爲末

白芷

全蝎

南星

頭風

右為末煉蜜圓彈子大每壹圓食後噙水湯嚼下妙

陳湯

見暑門加細辛

治偏正頭疼痛連腦項吐逆眩心耳聾目暗

如聖湯

治偏正頭疼痛連腦項吐逆眩心耳聾目暗

川烏

皮肉

南星

川芎

半夏

重陽去滑生

川芎

甘草

各兩

天麻

防風

半夏

各一錢去滑生

川芎

右末蒸餅糊圓雞頭大捻作餅日乾每服五餅同

分煎水服

葛根

附子

生

烏頭

生

南星

乾薑

右散每服參錢薑五片少許熟煎空心服

葛根

生

細辛

各一錢

甘草

參分

葛根

一錢

細辛

右剉散每服肆錢薑五片大棗壹枚煎服

葛根

生

細辛

去苗十

細石膏

一錢

葛根

一錢

細辛

右剉散每服肆錢薑五片大棗壹枚煎服

川芎

生

天麻

各半兩

細辛

去苗十

細石膏

一錢

葛根

一錢

細辛

荆芥穗

生

白芷梢

去苗

甘草

各一錢

全蝎

炙

僵蚕

一錢

右末白湯或茶清調食後臨卧服

加桂枝

葛根

一錢

白圓子

加

朱砂薑汁湯下皆要禁

頭風

# 二。眼目

眼目方論

眼者五臟六腑之精華如日月麗天著明而不可掩者也其首星亦皆屬心其滿眼白睛屬肺其烏睛圓大屬肝其上下肉胞屬脾而中間黑瞳一點如漆者腎實主之是雖五臟各有證應然論其所主則瞳子之關係重焉何以言之目者肝之外候也肝取木腎取水水能生木子肝母腎有子母而能相離者哉故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣之則昏蒙暈眩烏輪赤暉刺痛浮漿此肝熱也膽生清渙祐黃達睛此肝虛也瞳人開大淡白偏斜此腎虛也瞳人焦小或帶微黃此腎熱也一虛一實以此驗之然人知肝腎之氣相依而行熟知心者神之舍又所以爲肝腎之副焉所謂一而二二而三者也何則心主血肝藏血血能生熟凡熟衝發於眼皆當清心涼肝又不可固孰水生木之說特眼者轉膜裹水照徹四方溯源反本非天一之水又果孰爲之主宰乎析而論之則拘急牽颶瞳青胞白癡而清淚不亦不疼是之謂眼烏輪突起胞硬腫紅眵淚濕漿裏熟刺痛是之謂眼眼渾而淚胞腫而軟上壅膝臟酸澁微赤是之謂眼其或風與熱并則癢而浮赤風與氣搏則癢澁昏沉血熱交聚故生浮膚粟肉紅纏偷針之類氣血不至故有眇視胞垂雀眼障障之形淡紫而隱紅者爲眼鮮紅而赤者爲眼熟兩皆呈露生弩肉者此心熱血旺白睛紅膜如紙傘者此氣帶血凝熱證瞳人內湧白睛帶黑色浮而赤也冷證瞳人青綠白睛枯槁氣沉而濁也眼熱經久復爲風冷所乘則赤爛眼中不赤但爲葵飲所注則作赤肝氣不順而挾熱所以善明熟氣蓄聚而傷飽所以胞合此外證之大槩然厥五臟不可謂一脾與肺獨無證何耶曰白睛者亦或有筋者其熱在肺上胞

眼目

下胞或目唇間如赤點者其熱在脾脾主味也五味之季養諸中則精華發昇於其外肺主氣也水火升降榮衛流轉非氣孰能使之前所謂五臟各有證應者於此又可推矣雖然眼之病患多生於熱其間用藥大抵以清心涼肝調血順氣為先有少陰家與燥設遇虛證亦不過以甘草當歸黃芩等輕用溫藥可也况夫肺能發燥肝亦好潤古方率用桔梗桑白皮之類多爲佐果非潤益之意乎至於退翳一節尤隸利害凡翳起於肺家受熱輕則朦朧重則生翳眞珠翳狀如碎米者易散梅花翳狀如梅花葉者難消雖翳自熱生然治法先退翳而後退熱者謂熱極生翳若先去亦熱則血爲之水而翳不能去其有赤眼與之涼藥過多又且滌之以水不反掌而水凝眼特一團水耳水性清澄尤不可規規於點洗喜怒失節嗜慾無度窮役眼力泣涕過傷凌寒衝風當暑冒日不避煙火飲啖熱多此皆患生於腑職者也專事點洗可平哉有能靜坐澄神愛護目力放懷息慮心逸日休調和飲食以養之斯酌藥餌以平之明察秋端斷可知矣諺曰眼不點不害耳不幹不聾請以爲戒鳳眼瘡則熟蜜潤劑可

眼目證治

人參蜜漬治風眼熱眼澁羞眞瞞

羌活

川芎

北梗

右末每服壹錢半

方見前項  
方在後夾和亦得

方見前項  
如風熱性效同

方見前項  
方見頭面門治眼風養目藥頭煎湯下

治眼壅熱赤腫方

山萸

車前子

右煎湯下本門

通用食後臨卧服

治諸風攻眼消腫

防風

沙苑蒺藜

甘草

川芎

羌活

甘菊

荆芥

白芍

草決明

蟬蛻去足

蛇皮

川芎

羌活

甘菊

荆芥

右末每壹錢半用

去心煎湯下食後臨卧服

蒼朮

荆芥穗

甘草

川芎

羌活

白芍

荆芥

右末每壹錢半用

入鹽少許沸湯點下或用頭風通夾和尤佳

蒼朮

荆芥穗

甘草

川芎

羌活

白芍

荆芥

右末每貳錢食後茶清下

杏仁

甘草

川芎

羌活

甘草

川芎

右末每貳錢食後茶清下

白芍

甘草

川芎

羌活

甘草

川芎

眼目

右末每服錢指壓定食後研湯調下

海桐子治風眼昏淡翳膜

川芎去西

蒼术

童便去皮去皮水煎服木誠

大節童屎湯

蟬殼去蟬

蛇皮

鴟鴞去皮去皮水煎服苦活

防風

羌活子

楮實

地骨皮

荆芥穗

旋覆花

白葵梨

去皮去皮水入蜜煮全蝎僵蠅

細辛

杏仁去皮

甘草

各半兩水入蜜煮全蝎僵蠅

石决明用東涼水研

當歸

右細末每服壹錢半食後臨卧服或

以前湯下

右決明用東涼水研

當歸

防風

羌活

各三兩

蟬殼

甘草

各二兩

伏苓兩

蕤蕤

沙去刺

芍藥

蒼术

童便去皮去皮水煎服各半兩

右細末每錢食後米酒茶清送下

蟬殼洗鹽

甘菊

川芎

防風

羌活

山梔仁

白葵梨

去皮去草決明

荊芥穗

蔓荆子

沙去刺

芍藥

蒼术

童便去皮去皮水煎服各半兩

木賊去蕪

蒼朮

水去皮水煎服各半兩

木賊去蕪

甘菊

水去皮水煎服各半兩

右末每服

錢食後米酒茶清送下

荆芥穗

柏子仁

水去皮水煎服各半兩

甘菊

川芎

水去皮水煎服各半兩

黃芩

玄參

水去皮水煎服各半兩

白芷炒去

細辛

水去皮水煎服各半兩

黃芩

木賊

水去皮水煎服各半兩

右末每服

錢食後臨卧服各半兩

白及炒去

細辛

水去皮水煎服各半兩

川升麻

芍藥

白薇

枳殼 麵粉

大黃

甘草

等分

右籠末每參錢新水煎熱服以通利為度

八珍丸治熟眼腫痛

車前子

龍膽草

穀精草

仙靈脾

威靈仙

藁本

荆芥穗

秦皮

甘草

各一錢半

右細剉每服貳錢食後煎服

黃連湯治諸熟眼赤腫羞明冒暑飲酒患眼痛用

黃連

去鬚蕊碎色紅者隨意新水浸半日

右以磁碗盛重湯燒食後服滓再燒

梔子仁

荆芥

大黃

甘草等分

右剉每服貳錢水煎食後服

黃連丸治肝盛風熱攻眼赤腫多淚浮霧蔽明

當歸

川芎

防風

羌活

山梔子

薄荷葉

大黃

甘草等分

右末每服貳錢食後剉少泡湯調下

翁眼丸

木賊

草薢

當歸鬚

木賊

草薢

右末茶水調舌浸出涎

桔梗丸治肝熱風毒攻眼赤痛

大黃

桂枝

山梔子

杏仁

葛根

右末煉蜜圓梔子大每服參肆粒圓臨卧溫湯下

龍膽草

梔子仁

各二錢

防風

玄參

荆芥

山茵陳

甘菊去萼

桔實

甘草

各一錢

新刊仁齋直指方論

三

右末每服壹錢半食後茶清調下

細辛流浸酒加川芎治角眼浮軟上壅蒙瞼加幹姜治風眼牽  
瞼昏濁澁疎方見眼病篇調稍潤良佳方見頭目門

獨活湯治肝熱生翳亦治角眼日光點者

楮實子研細

右以蜜湯調下食後服亦治小兒翳眼

人參各半兩清心益肝明日退翳

蔓荆子研細

伏神去木各半兩

蘆薈研細

琥珀

茺蔚子研細

蟬殼洗去皮去心各半兩

車前子各半兩

全蝎伍枚

白蒺藜炒去遠志冰片各半兩

生地黃洗去心曬乾研細

熟地黃洗去心曬乾研細

細辛

右細末煉蜜圓桐子大每伍拾圓空心粥飲下臨卧

湯下方見翳

桑葉湯治熱眼赤痛

車前子各半兩

麥門冬去心生地黃洗去心曬乾研細

當歸

右剉每服參錢新水入蜜同煎食後服加川芎尤好

防風各半兩

川芎

人參各半兩

乾白蒺藜炒去刺去皮研細

全蝎伍枚

生地黃各半兩

羌活

川芎

右剉爲末煉蜜圓桐子大每伍拾圓食後薄茶下加

半两尤佳

蟬殼研細

苦蘗炒去刺去皮研細

防風

木贼去繭莖及根皮研細

川芎

秦皮

勝霜

甘菊

甘草各半兩

右末每服壹錢薄茶下

眼目

蛇眼

洗倍

蝉退

洗倍

黃連

去頭

綠豆

壹兩

甘草

生

煎幾

右剉細每服兩錢食後臨卧新水煎服  
治肝腎風虛瞳人帶青澀澤臟腑洗垢開光能驅風明目

真杏仁

水浸五枚去皮尖

右五更初就床端坐勿言勿唾息慮澄神嚼杏仁一粒勿嚥逐一枚嚼至五粒俟津液滿口分爲參嚥直入肝腎惟在久而成功

右退紙治眼腫痛澀昏淡羞明

鴟羊膽

板鈍上火熱

右以板鈍研和入板鈍末少許頻研成膏食後臨卧匙抄少許含嚥亦可點目

夏枯草治眼痛痒翳膜

夏枯草

炒熟

細辛

連翹

川芎

當歸鬚赤芍藥蟬殼各五錢半

甘草生

右末每貳錢茶清米泔下無效以金明池代用

神曲治一切眼疾香粉通用

木賊

去頭葉浸鹽水

甘草

蜜炙

川芎

穀精草

炒熟去蟬殼

甘草生

蜜炙

荆芥

右末每貳錢茶煎湯調下

茺蔚治內外障

茺蔚

不切兩日擣碎取根去皮去核去蕊不用

木賊

去頭葉浸鹽水宿宿

甘草

蜜炙

川芎

荆芥

旋覆花

等分

桑葉

桑葉

水浸鹽水宿宿

甘草

蜜炙

川芎

荆芥

旋覆花

等分

桑葉

水浸鹽水宿宿

眼目

蠅殼去土

白蛇皮

燒熟

白蒺藜子

穀精草

防風

羌活

川芎

杏仁

去皮

甘草

生嚼各一錢分

右末每壹錢食後蜜湯調下

目治內外障失明或欲結青光內障或赤脉疼痛參藥之

血竭

熊膽

研細

人參

蛇退

皂角水洗研細各半錢

木賊

去頭葉

蒼朮

童尿浸研細

威靈仙

鷹爪

黃連去鬚各半錢

地骨皮

洗研細

蔓荆子

茺蔚子

車前子

川芎

當歸

羌活

蟬退

洗研細

石決明

各一錢

生

蚕退紙

黃柏搗爛

右細末用麝香壹具去筋膜慢火煮半生熟帶血性和藥同搗以粟米粉用肝汁煮糊圓桐子大每染割拾圓溫米泔下或石菖蒲煎湯下食後常服

目解消血明目

全針圓

燒爲末

杏仁去皮

白羊子肝壹具

去筋膜

右件曰內搗細衆手圓桐子大海米拾粒食後臨卧溫米泔下日三服

目治內外障翳目睛疼痛

石决明

半生

明礬

各半兩

川芎

木賊

去頭葉各一錢

杏仁

浸去皮半兩

甘草

各一錢

右細末每貳錢心通同少許煎服食後臨卧

目治眼生翳障神效

白蒺藜

炒熟

蒼朮

童尿浸研細各一錢

蟬殼

燒研細

蛇退去頭尾取肉切丁

各半錢

皮不燃用

蜜炙研細

菜花蛇皮

川芎

各一錢

杏仁

去皮

防風

羌活

白芷

各半錢

華陰細辛

各半錢

獨活

各一錢

白附子

半錢

明礬

石膏

荆芥穗

各一錢

真蚌粉

各半錢

右細末每服壹錢半沸湯點本清調以舌浸於藥中良久毒涎自出又別換藥食後臨卧服仍用

白澤石膏

烏賊骨

真蚌粉等分 小珠少許

右細末每壹錢半

米泔食後臨卧常服

治眼中翳膜瘡目翳眼痛用

貞蛤粉

細穀精草日曉細末

右來和每服兩錢生豬肝參指大竹刀切開藏藥捲束麻繩

扎米油壹椀煮肝熟食後臨卧細嚼以汁下

五味散治內障眼

蟬退

蛇退

蚕紙

鳥雞外殼

男子髮等分

還睛圓治眼白昏翳

蟬殼

生僵

蒼耳

熟地黃

川芎

白葵梨

各一兩

羌芍子

羌活

防風

荆芥

蔓荆子

杏仁

皮

東綠子

炒枳殼

各一兩

石决明

生僵

朱砂皮

去頭重取肉三兩

羌活

甘菊

右細末凍蜜圓彈子大每壹圓食後細嚼薄茶下

明眼圓治眼白翳膜

各一兩

蛇皮

半兩

羌活

甘菊

生地黃

各一兩

熟地黃

名青半兩

淨石斛

炒

枳殼

各一兩

羌活

防風

牛膝

名熟西甘菊

去葉青一片

右末煉蜜圓桐子大每伍拾粒空心食前鹽湯下或

水煎服

大半升

雙方圓治肝腎俱虛眼目昏翳

各二兩

虫終子

半兩

熟地黃

朱砂

東前子

各三兩

右末煉蜜圓桐子大每伍拾粒食前鹽湯下或

水煎服

大半升

熟地黃

朱砂

東前子

各三兩

大半升

水煎服

大半升

右肆藥丸和每服百粒食前鹽湯下或入蜜酒下治腎虛  
瞳人開大淡白昏瞞凡人五更初腎氣開纏一言語喉啞腎  
氣即合當時靜默進前藥百粒功效勝常

調目圓治肝腎氣虛目暗黑花

從容謂長流枸杞子參兩白芍去陳川巴戟去亂頭浸  
右細末煉蜜圓洞子大每伍七粒粉食前鹽湯下余太宰方  
加熟水煎貢兩淨或用蜜圓對交服

升降水火明眼目益心智

破石燒研末朱砂研末蜜圓對交服

神曲炒熟研末加沉香半兩

心鹽湯

下磁石法水入腎茶妙法火入八瓣以沉香是則升

降水火

陽明治肝虛風熱攻眼赤腫羞明潮紅膜

當歸

赤芍藥

黃連去鬚等分

右末每用貢錢極沸湯泡乘熱先薰後洗冷則再燙用目兩  
三次又方沸湯入白鹽少許閉目沃洗盐亦散血

柔軟治眼睛腫脹突出新汲水沃眼中頻數換水眼睛自入  
仍以

鷺爪黃連

李漁

乾艾葉

少許

真杏仁

壹个去皮

右同搗碎新汲水浸壹日後瀝清汁仰卧以帛蘸滴入眼中  
鼻內見苦味即藥透也或新水浸破器盛重湯洗濃汁  
以紗布燒存性入藥用

鷺爪黃連治風毒攻眼赤腫

黃連

李漁

蔓荆子

研末

五倍子

研末

右剉細分參芩新水煎清汁以手沃洗效

引酒治浮翳乘翳霧膜遮睛

雪白鹽淨器中生研少許

右以大燈草蘸搘輕手指定浮翳就點凡參次不疼痛勿驚  
只囊效

薑茶治眼風養冷淡爛眼有虫

生薑母煮湯以銀筋挿入即拔出點眼頭尾效

南鵬砂色黃

腦子少許研細

右以燈草蘸點其上

後參麥謂之煎湯調水食服

燭尾治爛眼風治目燒紅碎童尿凡參次出火毒壹日夜研細末入未用童尿浸取清汁點眼胞仍取

軟葉入男兒乳汁研爲圓置眼眥頭引虫自出

目治風眼流淚不止

綠爐甘石

烏賊骨

半分

右細末入腦少許點目并口漱自收藥擦脣和之

前參

朱砂貢金

南鵬砂

半分

葵仁二錢

蜜酒

半分

真珠

蠟石膏

各半錢

膽壹字

麝少許

右細末用冬蟲研和於碗內蒸得粘入角罐收用時前後皮  
汁調銅筋點於眼眥頭淡出爲效

獨眼治患眼赤腫閉合

土朱貢分

蠟石膏

壹分

右末新水入蜜調傅眼頭尾及太陽處仍以角罐收用時前後皮  
液滴入眼治夜不能視

遇夜不能視

竹刀拔開納

於中麻線扎第二米泔煮七分熟又另

蘸細嚼以汁送下無通透以

明砂代用

治内外障經入猪肝煮帶王和汁細嚼效

治風熱之脾間積熱兼宿食不消則用針灸以利細火而過水前調大黃末少許利之

方治小兒豆瘡入眼生翳者取其尾而垂之從項下割破些少取生血點翳即除尤佳若翳已癢即以鴉膽子以燈心蘸點仍用沙鹽洗眼等爲末每壹錢第二采酒調服

通視散

細辛

川芎

腦荷

蔓荊子等分

右爲末每半錢搗入鼻又頭風門加眉弓皆可通關  
小兒疳眼不開諸方太麻在後

新編仁齋直指方論卷之二十一

耳

耳論

耳屬足少陰之經腎家之寄藏於耳也腎通乎耳所主者精精氣調和腎氣充足則耳聞而聰若勞傷氣血風邪龍虛使精脫腎憊則耳轉而聾又有氣厥而聾者有挾風而聾者有勞損而聾者耳十二經脉上絡於耳其陰陽諸經通有交并則臟氣逆而爲厥厥氣搏入於耳是爲風聾必有時平眩暈之證耳者宗脈之所附脉虛而風邪乘之風入於耳之脉使經氣痞而不宣是爲風聾必有時平頭痛之證勞役傷於血氣淫慾耗其精元瘦悴力疲昏昏曠曠是爲風聾有能將適得所血氣和平則其聲暫輕其或日就勞傷風邪停滯則爲久聾之證矣外此又有耳觸風邪與氣相擊其聲嘈嘈眼或見光謂之風聾熱氣乘虛隨脉入耳聚熱不散膜汁出焉謂之膿耳入耳間有津液輕則不能爲害如風熱搏之津液結轉成核塞耳亦令暴聾謂之膿前是敷若肾脏可推風則浮而盛熱則洪而實虛則濁而濡風爲之踈散熱爲之清利虛爲之調養邪氣屏退然後以通耳謂氣安腎之劑主之於此得耳中三昧

耳病證治

食後服加石菖蒲每服參錢以生薑葱白同煎  
方見風寒門方見寒門方見風寒門或陰陽方見脚氣門不摸  
方見風寒門重者吞正丹方見癩冷門尤治耳聾皆當調氣  
方見風虛耳聾

辣椒

川芎

當歸

細辛

淨石菖蒲

木通

白芷

木香

麻黃

甘草

大南星

白芷梢各等分

右件剉碎每服參錢水煮至半葱白貳片紫蘇伍葉薑伍片食後前晚少食臨卧加此藥服亦可用方見周易

右宣風散通利腎臟風氣

雞心棗榔皮橘皮

枳殼製各半牛摩半生

右爲末每服貳錢蜜湯調下食前服

地黃圓治勞損耳聾

大熟地黃當歸

川芎

辣桂

兔絲子

酒浸七日炒半生研末

大川椒

去骨

故紙

白葵梨

炒半生研末

杜仲

鹽製炒去絲

白芷

石菖蒲

各壹錢分

磁石

火燒醋淬研末

白芷

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服伍拾圓以葱白溫酒空心吞下晚飯前又服

益智散治聾蓋耳聾聲

磁石火燒醋淬研末巴戟

大川椒

開口者

沉香

石菖蒲各半兩

荳木

陳皮

右爲細末每服貳錢用猪腎壹隻細切和以葱白少許并藥濕紙捲裹煨令香熟空心嚼以酒送下

右治風入耳虛鳴

白芷

石菖蒲

荳木

陳皮

細辛

厚朴

半夏

製

辣桂

木通

紫蘇莖葉

甘草

錢分

川芎

貳分

右剉散每服錢薑伍片葱白貳片水煎食後臨卧服

耳聾方

草烏頭

各半兩

石菖蒲

右等分爲末用綿裹塞耳壹日多度

耳聾暴聾方

川椒

石菖蒲

舊松脂

巴豆肉

半兩

右爲細末鎔蠟圓如棗核大塞入耳

開通治內熱耳出濃汁

川升麻

木通

赤芍藥

桑白皮炒

麥門冬去心生地黃

前胡

赤伏苓

蔓荊子

甘草炙等分

右件剉散每服參錢薑裏煎食後臨卧服

消石

爛石膏

天花粉

防風

各半分

腦少許

右件爲末擦耳立止

真龍骨

白礬

赤小豆

黃華丹

烏賊骨各一錢分

臘脂半分

右爲細末擦耳

金方

爛石膏

於新瓦上慢火燒

明礬

煅

真蚌粉

真龍骨

各等分

麝少許

右爲細末用綿繩竹篋拭耳換綿蘸藥入耳

金華方

生豬脂

生地龍

金丁墨

等分

右件細研以葱汁和捏如棗核薄綿包入耳令潤即挑出

明硫黃

雄黃

各研細

遠志

去心

皂角肉

等分

右爲細末葱白搗粘入麝少許綿包入耳

革麻子肉

巴豆去膜油

杏仁去皮

滴乳香

松脂各別研

青鹽半分

右件細研鎔蠟圓如棗核大入耳

以生鼠取膽汁盡入耳又以生鼠取腦髓綿包入耳生鰯魚  
腦通用

菖蒲清壹寸

巴豆清箇去

麝少許

右爲末合研作丸圓綿包入耳日壹圓

草薢子兩箇去油用

遠志去心

乳香

磁石燒如前各貳分

皂角

半錢

生地龍一條中者

全蝎

貳箇焙

右爲細末入蠟搗圓柱入耳

白鹽炒熟董帛包熨

杏仁炒焦研細綿包塞

桃葉挾細塞其耳自出○或以鹽署研汁滴入耳又以川椒

爲末法醋浸壹宿滴耳

猪脂壹指許灸令香置耳孔邊其蟻自出

用牛糞取汁灌放耳中少時自出或以錢皮搗汁灌入耳即  
自出

用大蒜壹瓣從壹頭開孔以巴豆肉壹粒慢火煨極熟入蒜  
孔中以新錦包塞耳逐日換

用猛燭石半錢搗碎生研細入薑耳孔別用針砂末入不聲  
耳孔自然通透然後傾出

全蛇

土狗

中地龍

雄黃

明礬

半生半熟各半錢

麝麝

言字

右研細葱白引藥入耳閉氣面壁坐壹時參日壹次

膽

明白

黃驥丹

龍骨

膽脂

等分

右件研爲細末用綿杖蘸乾換綿杖蘸藥入耳入各少許摻入耳

又

蝎梢

半錢

臘脂

半錢

乳香

麝香

各少許

右研爲細末以幹子挑入耳

調腎者宗脉所聚耳爲之敷血氣不足宗脉乃虛風邪乘虛隨脉入耳氣與之搏故爲耳鳴先用

金匱要略

同前卷

方

此見水竈門散邪躁風

氣續

和養

川芎

當歸

華陰細辛

半錢

辣桂

右剗細每服多錢入紫蘇薑棗煎服如虛冷甚者酌加

田

鼻

鼻論

肺爲氣之主通竅於鼻鼻者清氣出入之道路也陰陽升降氣和平則一呼一吸榮衛行焉其或七情內蠹六氣外傷則清濁不分泥丸汨亂諸證迭起矣夫血之與氣相隨而行若臟腑生熱乘於血氣故熱氣迫血妄行自鼻孔出謂之鼻衄熱則津液中乾冷則體液流注若周冷隨氣乘於鼻則津液交滯不

能自收謂之流涕肺寒所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不聞於是壅作鼻塞冷熱作聚血脉陰凝歲月淹延轉加雍結於是變生息肉或風邪入鼻搏於正氣邪正相擊鼻道不通則爲鼻痛或氣血壅滯上焦生熱邪熱之氣留伏不散則爲鼻瘡疊是數證七情六氣皆當究其感受之原用藥有序痊愈可期執方無權迄未有所濟也外此更有濕疊一證鼻漏汁臭下部生瘡詳於後篇辨論見之

鼻病證治

升麻湯治上熱衄血

生地黃

洗淨阿膠炒研  
水煎兩

川芎

北梗

蒲黃

甘草

生各半兩

右剉碎每服參錢水煎熟入生薑汁或匙溫服

升麻湯治鼻衄

生地黃

生麥門冬

生薑

白藥

右搗細以井水貳大燒煎七八分分兩服

升麻湯治實熱衄血

大黃

裹蒸

川芎

黃連

黃芩等分

右爲末每服貳錢井水調服食後

升麻湯治肺熱胃中鬱熱衄血兼治血淋

吐血口臭

雞蘇

即臘荷半斤

真蒲黃

壹錢阿膠炒研

麥門冬

去心阿膠

甘草

半斤人參

柴胡

名宣酒半斤

生地黃末

參兩

右搗研取細用冬蜜壹斤熬蜜貳沸即入生地黃末頻攬得所次將餘藥和圓如桐子大每服參拾圓食後服

鼻

川芎金末井水調下亦治吐血。又茅花煎湯口服。又方

方

方見血類

曾服燒煉藥致鼻血者

以酒前湯解之

仍燒存性爲末入鼻。

又方

方頭陀半生半炒末入鼻。

又方

方頭陀燒去穢爲

末入鼻少許入鼻或加

川椒散。

又方

方頭陀散或頭陀酒滴入

鼻。又方

方頭陀濃香取參辦研細脚底鼻中有蒜氣即去之

川椒散治流涕

大紅開口川椒

散炒蓋出酒研末

苦丁茶頭內

川白薑

生者

辣桂

川芎

細辛

津白朮

半分

右件爲末每服貳錢溫酒調下。川白薑治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物空塞脣氣不宜遂流體薄。

白芍切碎片用沸湯盞內焙乾每服貳錢用棗米箇甘草少許同煎食後服參肆服後其硬物自出脣氣流轉體薄自收仍以白芍作餅用紗襯灸熱貼脣前

慰斗火慰透或加白芍散末入鼻。

白芍散治鼻壅爲號

芎菊

賓榔

青黃

去筋

肉桂

防己

木通

細辛

七

白芷

石菖蒲

分蜜水木香

川椒

甘草

半分

右剉每參錢生薑茶煎服

通頭散去鼻塞

瓜蒂

藜蘆

去筋

半分

皂角肉半分

麝少許

右爲末吹些入鼻亦治息肉

雄黃半錢

瓜蒂蜜水

綠礬

去筋

麝少許

右爲細末搐些入鼻亦治息肉

瓜蒂 明礬

華陰細辛又言於黃半錢

右爲末以雄犬膽汁和圓線包塞鼻

瓜蒂 華陰細辛等分

右末綿包少許塞鼻

甘遂

明礬

朱砂

雄黃

雌黃

梨蘆

瓜蒂

雄黃

右爲末青蜜調傅前鼻鷄頭藥通用

人參酒

白蜜酒

方見醫門

人參酒

白蜜酒

方見醫門

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

杏仁水浸去皮細辛

白芷

全蝎

研細

右爲末麻油調傅

人參酒

白蜜酒

方見醫門

人參酒

白蜜酒

方見醫門

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

用杏仁研乳汁傅之。或以烏牛角研傅。

或以麝香研傅。或以麝香研傅。

研傅

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

白蜜酒

人參酒

巴豆肉去皮去心

人參酒

研砂

半錢

人參酒

研砂

壹錢半

人參酒

右件同入罐子中以慢火熬參酒取下續入研細人參酒  
錢半錢人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒  
點纔見微紅便洗去人參酒共研細人參酒共研細人參酒  
落矣

白龍團末逐日洗面如潔巨法更捲小時方以湯洗去食後  
常服人參丹壹錢人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒

人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒

人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒

人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒

人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒

人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒

人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒共研細人參酒

白鹽常擦妙

髮灰入鼻磨好墨入點法醋并水調下

。唇口舌

唇舌論

心之所司者舌脾之所司者唇口是雖各有司存然心之氣未嘗不通於脾胃之氣未嘗不通於心也夫舌者心之官掌五味之秀以榮養一身資脾胃之藏以分布水穀故心之本脉系於舌根脾之絡脉系於舌傍或風寒暑濕之所中傷則舌縮捲而不能言或憂愁思慮之所鬱閉則舌腫痛而不得息心熱則破裂生瘡脾閉則白胎更雪舌之爲病合心脾而主治之故曰心之氣未嘗不通於脾胃此也口者一身吐納之都門百物榮養之要道節宜少舛病必生焉故熱則苦寒則鹹宿食則酸煩燥則澁虛則淡溼則甘臟氣偏勝則其味必偏應於口鹹酸甘苦澁舌味之而誰歟若夫上池津液出於舌端心實主之地津液布非胃而何故曰脾之氣未嘗不通於心者此也或問口臭一證可得聞乎曰臟腑異氣燥齶不同是氣蘊積會膈之間挾熱而衝發於口人將掩鼻而過之信夫醫不難於處方惟難於識證受病源流稽不及究詳以古方審試一中不幾費人乎此端之不可不早

唇舌證治

唇舌證治

心脾有熱口舌破裂生瘡

川升麻

玄參

川芎

生地黃洗膿

淨黃芩

甘草

大黃

黃連

右件剉碎每服參錢薑茶煎食後服

龍膽草治口舌生瘡

寒水石

燒紅  
子升  
朱砂  
砂膽

鵝半錫

右爲細末日參伍次摻

五福化毒散

治唇舌腫破生瘡

鴉頭湯

玄參

洗藥  
北梗各參兩

伏苓

鼠屎半兩

人參半兩

馬牙硝

青黛各一錢

甘草

桑蠶半兩  
燒麝蔚壹字

金銀箔

各取半錢

右爲細末煉蜜圓如皂子大以腦荷泡湯候冷調下如口臭以生地黃汁調下

治口舌瘡腫

生地黃

藍青葉各等分

右入蜜杵細每服半兩井水煎食後服

治口舌瘡

浮萍草

黃柏並末

杏仁

青黛等分

唇舌

右煉蜜研圓皂子大以綿裹含有涎吐之

治心熱口瘡

方見喉門

可擇用

治心熱口瘡

方見喉門

可擇用

槐花晒爲末傅舌上或

方見瘡門

生傅

治心熱口瘡

方見喉門

可擇用

治口臭口乾口舌瘡

方見瘡門

可擇用

寒水石

燒紅  
另研  
鵬砂  
賣附

可擇用

馬牙硝

另研  
甘草  
桑蠶金黃兩

可擇用

右爲細末甘草膏搜圓麻子大含漱

治胃中熱口臭煩渴

方見鼻門

可擇用

真蒲黃散

傳

鵬砂末薑設蘸擦

蛇皮燒存性全玉竭

右爲末少許擦傅

大山豆根剉細含嚥或末擦傅

正黃連

厚黃柏

雞心擣榔

右等分爲細末傅之即可

黃柏燒存性

青黛燒存性

銅綠燒存性

右件爲末傅之

黃連

升麻

五貳件爲末以薄綿包含嚥盧醫會末傳

白蘆檳榔抑燒存性和少輕粉研傅

唇舌焦燥口破生瘡者蓋心脾受熱所致也以水浸重湯而飲之或用淡鹽水以粳米飲吞下此爲要藥至於大渴而不可擇含少與方見消渴門執劑之法無以踰此然此特隨幾應變而已就根本論之則水火相濟方見消渴門

唇舌

咽喉

咽喉論

咽者胃之系喉者肺氣之所通咽以藏物喉以候氣理一而分殊也自其風邪客於喉間氣鬱而熱則壅遏而爲咽喉自此熱氣生於肺胃風毒蘊隆則腫結而爲喉痹又咽者陰陽不和肺雍盛風熱素氣不能宣通故令尸虫發動上熱於喉或癰

壅如瘻之候也。穀賊者，堅平強滑藏於米而誤食之滯於咽喉，不能博化，故煩熱併聚與血氣搏遂令腫刺如喉嗌之生瘻，而也胃脣實熱，腫炎上焦發為白頭赤根固有咽喉之證，腑停寒寒則氣縮如物室礙於其間亦有喉閉之證。至若懸雍上脣雖不關於咽喉，所以暴腫者抑亦熱氣使然也。咽喉懸雍關要所係，病不急發皆能殺人，然則療之將何如曰：熱則通之，寒則溫之，不熱不寒依經調之，寒熱和平病不生矣。

咽喉證治

鷄子酒治酒麴熟盛咽喉腫結閉塞

鴨黃膽礬半錢

全蝎貳箇

右爲末以雞羽蘸藥入喉中，湏更破開聲出，次用研細并水調下，候吐出毒涎即愈，未吐再服。

凹豆根治積熱咽喉閉塞腫痛

山豆根二錢大黃一錢

川升麻

朴消生各半

右爲末，凍蜜圓如皂子大，每壹粒以薄綿包少，喃便含嚥液。

寒水石研末治喉毒上攻咽喉腫痛

寒水石

石膏

各取兩研青黛茶末

右爲細末，拌和青黛水浸蒸，研糊圓龍眼大，每壹圓食後以井花水化下。

益硝肆兩治咽喉熱腫口舌生瘡

益硝

青黛茶末

真蒲黃半兩

右以生荷汁半斤和麥片入磁銚慢火熬乾研細，每半錢筒吹入口內。

鷄子酒治咽喉熱痛腫塞

寒水石半兩鴨砂

牙硝

朱砂各研膏

冰榔半錢

右爲細末，每壹字，擦入口，津。

冰榔治咽喉熱閉，濃糊舌苔，物難

貨衆

縮砂仁

荆芥梗

白伏苓

玄參

黃連

山豆根

滑石研

甘草生各半  
研末

寒水石

鵬砂

壹錢研細

右爲細末每壹錢乾摻舌上漸以新水嚥下

爭清鹽酒大

治咽喉脣舌熱腫生瘡

人鼻瘡熱門

鵬砂治咽喉腫痛

北梗

去芦

甘草

加荆芥穗

右件等分爲末每服貳錢用井水煎臨卧服

鵬砂治喉風

白僵蚕

明白礬

生

右件爲末以白僵蚕和圓如皂子大每壹圓薄綿包入喉少

項涎水出而愈

鵬砂治喉閉

遠志

去心

右爲細末以管子攢開口吹藥入喉策令頭低涎出而愈

鵬砂治喉中熱塞腫痛散血消淡

白藥

朴消

右爲末以小管吹入喉

木鳖子仁

川大黃

牙硝

射干

山豆根

川升麻

白藥

右件等分爲末煉蜜圓如皂子大以薄綿包含噙液

鵬砂

牙硝

右件等分細研每服半錢以薄綿包裹噙液

清蜜浸酒一宿取汁含噙

咽喉

鵬砂治喉閉

加冰

酒冷證氣縮喉閉

方

治喉閉

酒冷證氣縮喉閉

方

治冷證無陽咽喉閉

辣桂

甘草

半夏

右件等分剉碎每服參錢水壹大盞煎半候冷少呷

膽礬細研以管子挑少許咬入喉中即破續以前湯調炒白蜜以去其風如無膽礬只用白蜜代之亦得

明白礬末壹大錢匕用瀝油壹粒入蜜中以火炙乾取

爲末極細每壹字以小管挑吹入喉涎出自愈

蛇皮

暑汎遇日乾剪作細屑

白梅肉

右件研和爲圓含化屢效

治癰喉風急喉閉方見舊熟門每服柒圓研細以熟水研白梅肉調下或熟茶清下熱則通之用此

消參

鵬砂

壹分

直僵蚕

蟻子分蕊少許

右爲末每半錢以竹管咬入喉

川升麻

紫蘇

右剉井水平煎服

桑退紙燒存性爲末煉蜜圓丸子大含嚥

綠礬研細米醋調點一邊高側卧含嚥

皂角肉半錢剉細以米醋壹大匙煎至半分濾清飲

白礬

直僵蚕

南星

梨芦

全蝎

生

各壹錢

各壹錢

右爲末以小管挑壹字吹入鼻中吐痰喉通

治喉脾欲絕

雄黃

明礬

各壹錢

竭梢茶

右爲細末每服壹字吹入鼻吐痰效

方

玄參

升麻

射干

大黃各壹分

甘草

射干

大黃各壹分

咽喉

明礬燒灰存性和蜜研細勑頭點傳患處

方

脂麻炒爲末以湯點服

方

白明礬

牙硝各壹錢

臘脂

半錢

右研細攪烏梅肉圓旋含之

方

治喉熱閉喉以雞黃汁和皂角漿

吐之

方

右件同研以雞羽送入

方

以常令喉斗

方

齒

齒痛

齒者骨之所終、髓之所養、腎實土之經、云腎衰則齒豁精固則齒堅誠哉是言也或曰手陽明之支脉入齒手陽明者大腸經也於齒夫何預不思大腸傳送氣道行焉壅則齒浮虛則宣露挾風則上攻頭面則變成齦脫不相爲而實相閑也夫齒之爲病者五一曰風一曰寒一曰濕一曰熱一五曰生

風氣襲虛客於齒間乘於血氣故令斷腫熱氣加之腰汁遺臭此風熱之爲齒痛一也血氣不足胃鬱乃虛風冷湊入停於齒根不腫不蛀日漸動搖此風冷之爲齒痛二也熱則生痰毒氣上攻灌注經絡最能發痛外證雍盛咳唾交衝此毒痰之爲齒痛三也頭面有風挾熱攻齧熱搏於血故令血出瘀滯不消掣痛鑽刺此惡血之爲齒痛四也凡人飲食甘肥不能潔齒腐臭之氣滲漬日久齒根有孔虫在其間蝕一齒盡又度其餘至如痈瘡皆其種類必虫殺而後痛止此非五曰虫蝕之證乎前是數者痛有自來治各隨證條列于後雖然百物養生莫先口

齒不嗽不洗壞臺之媒是不惟累生宿腐而暑毒酒毒常伏於口齒之間莫若時時洗漱之爲愈也臨睡洗畢至于晨興灌一口吐出掌中就掌搗眼自覺光明終身行之真可爲駁耳受用

## 齒病證治

荆芥

治風熱齒痛

升麻

細辛

右件等分爲末每服貳錢以沸湯點漱口令嚥併用擦牙

此是頭風門治齒熱痛斷腫有汗先傳消風散又以

傳其上。又法

川芎煎湯漱熱解毒

當歸

川芎

細辛

白芷

葛根

藁本

蜂房

右剉每貳錢井水煎服仍含漱

香附 治冷證齒痛

香附

紅川椒炒

故紙

莎各頭蟲草撥壹錢

右爲末和炒圓貳錢擦傅

川椒 治風冷齒痛

白芷

細辛

良薑

葛撥

右件等分爲末擦牙擣鼻

川椒

香附

蜂房

右件等分爲末擦牙擣鼻

長肥皂角

大鉗

白鹽

半兩

右二件同燒赤研細常擦

方見瘡藥加

細辛

用薑裹烏梅煎治毒瘍齒痛仍

以

等分井水煎候溫以舌浸其中涎自流

出

加

細辛

用

鹽

半兩

治牙宣出血或痛

桃花

荆芥穗

白芷

右等分末擦牙仍煎點服

川椒 治齒出血

鐵金

白芷

細辛

右件等分爲末擦牙仍以川椒竹皮濃煎入鹽少許含嚥或

炒鹽傅

川椒 治惡血齒痛

白芷

細辛

川五靈脂以米醋煎汁含嚥

川椒 治虫蝕齒痛

清牙皂角

大鉗

川椒

壹錢半

生明礬

右爲末蒸飯搜圓如掌手大熱於乳中有殘吐之

川椒 治齒虫痛

川椒

白芷

蜂房

右件剉碎等分每服貳錢以井水葱白煎熱含冷吐

出齒牙痛方

川巴豆肉三分

明乳香壹錢

右同研溶蟾圓麻子大每服壹圓塞孔

紅川椒末三分

大巴豆肉三分

右杵研細蒸飯圓如麻子大以薄紗包裹孔

明礬或鐵或鐵滴乳香壹錢

右爲細末飯圓塞孔

蜘蛛殼壹箇搗軟以薄綿包塞喉吐之。又方  
入蜜酒數擦塞。又方燒存性擦少時塗湯漱口。

又方連根入研傅痛處

齒

咬方

首僵蚕

蜂房

另貯件各等分

樟腦半錢

右爲末用酒按濃鹽漬少頃和作小圓塞孔

齒痛通用

草撥

生地黃

當歸鬚

荆芥穗

等分

薑黃

桑白皮

當歸

赤芍藥

生熟等分

右爲麩末每服參芪井水煎頓漱齒

齒痛通用

當歸

荆芥穗

川升麻

川鬱金

等分

右爲末每服半錢揩痛處良父鹽湯灌漱

齒痛通用

紅川椒或鐵

樟腦

赤小豆

縮砂仁各兩

明礬

治口瘻

爲末少許塞傳無不妨齒痛惟此

麻痺

蜂房

全蝎

爲末傅亦治風疼

通利目絲爪乾燒存性爲末擦傳

方

蜂房

明礬

黃草丹等分

右爲末飯爲小圓塞齒

治指癰斷爛口臭

白礬

青黛

胡黃連

蘆薈各壹分

右爲末每眼半錢傳患處

蝦蟆

分半頭半尾

蜜丸壹字

以濕紙裹又用荷葉外包煨令焦存性爲末入少許研傅。又燒入鑊亦治牙疳。不可爲齒藥

齒

朱砂

雄黃

磁石

石膽

碧石

星石

右件等分入磁合塗泥塗燒兩日夜覆地出火毒兩日細末雞羽蘸傳瘡瘍肉朽骨損牙俱出而愈此周官五毒攻瘍正方諸惡肉朽骨瘍毒通用

蚕絲桑芽附直僵蚕炒熟分爲末擦傳良久鹽湯漱口

鵝糞馬糞附細末良久鹽湯洗口

明白礬

乳香半錢

少麝

右件同研細輕手擦良久鹽湯灌漱

酒以井水洗口頻換之言且漱或同鹽泡湯微冷含

或酒傳齒痛通用

新編仁齋直指方論卷之二十一

丁巳



