

經史證類備急本草

八



經史證類備急本草卷第六

草部上品之上總八十七種

三十人種神農本經白字

二種名醫別錄墨字

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

黃精

菖蒲

菊花

苦薏白  
菊續注

人參

天門冬

甘草

乾地黃

茺蔚子

菟絲子

牛膝

茺蔚子莖附

女萎

萎蕤  
等附

防葵

胡荽

麥門冬

葉根  
等附

獨活

外麻

車前子

葉根  
等附

木香

薯蕷

麥門冬

音  
以音入

澤瀉

遠志

龍膽

葉根  
等附

細辛

石斛

巴戟天

葉根  
等附

白英

白蒿

赤箭

音  
以音入

蓄瀉

荳蔻

耆

耆  
等附

赤芝

黑芝

青芝

音  
以音入

白芝

黃芝

紫芝

音  
以音入

卷相

一種唐本餘

辟虺雷

四十六種陳藏器餘

藥王

兜木香

草犀根

薇

無風獨搖草

零餘子

百草花

紅蓮花白蓮花旱藕

羊不喫草

萍蓬草根

石藥

仙人草

會州白藥

救窮草

草鼓

陳思炭

千里及

孝文韭

倚待草

雞俟菜

桃朱術

鐵葛

伏雞子根

陳家白藥

龍珠

搊胡根

甜藤

孟娘菜

吉祥草

地衣草

郎耶草

地楊梅

茅膏菜

蕷菜

益姑草

蜀胡爛

雞脚草

難少蘭

蓼蕎

石齊寧

藍藤根

七仙草

甘家白藥


天竺乾薑

池德勒

滁州黃精



丹州黃精



證類本草六

三


兗州黃精



解州黃精

證類本草下

四





唐本草

抱朴子

證類本草六

五



永康軍黃精



解州黃精

申

證類本草大

大



洪州黃精



相如黃精

證類本草六

七

三



黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不飢一名重樓一名菟竹一名雞格一名敎窮

## 一名鹿竹生山谷二月採根陰乾

陶隱居云今處處有二月始生一枝多葉葉狀似竹而短

根似萎蕤萎蕤根如荻根及菖蒲蕊鰐節而平直黃精根如鬼臼黃連大節而不平雖燥並柔軟有脂潤俗方無月此而爲仙經所貴根葉華實皆可餌服酒散隨宜具在斷穀方中黃精葉乃與鉤吻相似惟莖不紫花不黃爲三品而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦爲奇事

今故

別本注云今人服用以九蒸九暴爲勝而云陰乾者恐爲

爛壞

云一名垂珠服其花勝其實其實勝其根但花

難得得其生花十斛乾之纔可得五六斗耳而服之日可三合非大有役力者不能辨也服黃精僅十年乃可大得其益耳且以斷穀不及朮解令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年可以與老小休糧人食之謂爲米脯也

廣雅云黃精龍銜也

云黃精君

藏器云黃精陶云將鉤吻相似但一善一惡耳按鉤吻即野葛之

別名若將野葛比黃精則二物殊不相似不知陶公憑何所說其葉偏生不

對者爲偏精功用不

正精

云黃精寒

云補五勞七傷助

筋骨止飢耐寒暑益

脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顏入藥生用

不立下

八

王仲

圖經曰

黃精舊不

番戶出州郡但云生山谷今南北皆有之以嵩山茅

山者爲佳

二月生苗高一二尺以來葉如竹葉而短兩兩相對

有無子者根如嫩

生薑黃色

二月採根蒸過暴乾用今通八月採山中人九

蒸九暴作果賣甚甜美而黃黑色江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉

頭極尖而根細蘇恭注云鉤吻蔓生殊非比類此恐南北所產之異耳初生苗

時人多採爲菜茹謂之筆菜味極美採時尤宜辨之隋羊公服黃精法云黃

精是芝草之精也一名萎蕤一名仙人餘糧一名苟格一名菟竹一名垂珠共

一名馬箭一名白及二月三月採根入地八九寸爲上細切

一石以水二石至

斗煮去苦味瀉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑豆黃末相和令

得所捏作餅子如錢許大初服一枚日益之百日知亦燒乾篩末水服功與

得全又博物志云天姥謂黃帝曰太陽之草名黃精餌之可以長生世

傳華佗潔葉青黏散云青黏是黃精之正葉者書傳不載未審的否也

上等抱朴子云服黃精花勝其實花生十斛乾之可得五六斗服之十年乃可

得全又初服只可一寸半漸漸增之十日不食能長服之止三尺五升服

三百日後盡見鬼神

外天根葉花實

皆可食之但相對者是不對者名偏精

雷公云

凡使勿用鉤吻真似黃精只是葉有毛鉤子二箇是別認處若誤乾用

切曝

食療

餌黃精能老不飢其法可取甕子去底金上安置令得所盛

壞其生者若初服只可一寸半漸漸增之十日不食能長服之止三尺五升服

三百日後盡見鬼神

外天根葉花實

皆可食之但相對者是不對者名偏精

神仙服黃精成地仙

根莖不限多少細剉

陰乾搗末每日淨水調服任意

# 稽神錄

臨川有士人王所使婢媚乃

多一年之周變老爲少

入山中久之見野草枝葉可

即拔取根食之甚美自是常食父而遂不飢輕健夜息大樹下聞草中動以

爲虎懼而上樹避之及曉下平地其身歛然凌空而云或自一峯之頂若飛

鳥焉數歲其家人採薪見之告其主使捕之不得一日遇絕壁下以網三面

圍之俄而騰上山頂其主異之或曰此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒

饌五味香美置往來之路觀其食否果來食食訖遂

不能遠去擒之具述其故指所食之草即黃精也

經

苦精寬中益氣五藏調良肌肉充盛骨體堅強其力倍多年不老顏色

鮮明髮白更黑齒落更生先下戶蟲上戶好五味

六十日下下戶好五色三十日下爛

博物志

昔黃帝問天老曰天地所生

出花實根二等花爲飛英根爲氣精

博物志

昔黃帝問天老曰天地所生

食之入口立死人信鈎吻之殺人不信黃精之養壽不亦甚乎

博物志

昔黃帝問天老曰天地所生

草經

黃芝即

也


道藏神仙芝草

戎州苦蒲


證類本草六

九

王朔



衡州菖蒲




衡州菖蒲

十六

證類本草六

十

承



菖蒲味辛溫

云菖蒲平

無毒，風寒濕痺，效逆

上氣開心孔

菖蒲

云菖蒲平

生九竅，明耳目，出音聲，主耳聾聵

中

瘡溫腸胃止小便利，四肢濕痺不得屈伸，小兒溫瘡身

積熱不解，可作浴湯以服之。

昌陽

生上洛池澤及蜀郡嚴

益心智高志不老。

昌陽

生上洛池澤及蜀郡嚴

道一十九節者良露根不可用。五月十二月採根陰乾。

昌陽

生上洛池澤及蜀郡嚴

秦皮秦艽爲之使惡地膽麻黃同隱居云上洛郡屬梁州嚴道縣在蜀郡今乃處處有生石磧上概暗節爲好在下濕地大根者名昌陽止主風濕不堪服食此藥甚去蟲并蚤虱而今都不言之真菖蒲葉有脊一如劍刃四月五月亦小釐華也東間溪側又有名溪蓀者根形氣色極似石上菖蒲而葉正如蓀無脊俗人多呼此爲石上菖蒲者謬矣此止主效逆亦斷蚤虱爾不入服御用詩詠多云蘭蓀正謂此也目昌陽

云山中菖蒲一十二十節藥性論云菖蒲君朱苦辛無毒治風濕瘡耳鳴頭風疾下鬼氣殺諸蟲治惡瘡亦葢石澗所生堅小一寸九節者上此菖蒲亦名昌陽

云除風下氣丈夫藏女人血海冷敷多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂擗筋治客風瘡疥癩亦便殺腹藏蟲及蚤虱耳痛祚末

炒承熱裹署甚驗

色糖羊肉

石菖蒲出宣州二日八月採取

八月採取

圖經曰

菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州戎州者佳

二月採根陰乾今以五月五日收之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一十九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟暴乾方堅實折之中心色微赤解之生香少涼人多植于乾燥沙石上中臘月移之尤易活古方亦有單服者採根剪小以魚鱗者治擣一寸許以水及米泔浸各一夜又刮去皮切暴乾擣繩繩米泔和勻更熟蜜拌丸梧子大繩葛袋盛置當風處令乾每日酒飲生三十日臨卧更服一十九丸久得效如本經所說又蜀人用治心腹冷熱擣繩繩耳一寸搘碎同吳茱萸煎湯飲之良黔蜀蠻人亦常將隨行卒處心痛醫二寸熱湯或酒送亦效其生蠻谷中者尤佳人家移種者亦甚日旦乾後取香堅實不交蠻人持來者此即醫方所用石菖蒲也又有水菖蒲生深澗水澤中甚多葉亦相似但中心無脊採之乾後輕虛多滓殊不及石菖蒲不隸入藥用但可擣末油調塗疥瘡今藥肆所貨多以兩種相雜尤難辨也

雷公云

凡使勿用泥菖夏菖其二件相似如竹根難形黑氣穢味腥不堪

用凡使採石上生者根條嫩黃緊硬節稠長一寸有

即

醫方所用石菖蒲也又有水菖蒲生深澗水澤中甚多葉亦相似但中心

無脊採之乾後輕虛多滓殊不及石菖蒲不隸入藥用但可

擣末油調塗疥瘡今藥肆所貨多以兩種相雜尤難辨也

灌喉

中

又方

父服耳明益智甲子日取菖蒲一十九節者陰乾百日為末服方寸匕日三服耳目聰明不忘

也採得後用銅刀刮上黃黑硬節皮一重子用熟桑枝條相連蒸出暴乾去桑條剉用

灌喉

中

玉

王六

土

血不止菖蒲一升半剉酒二盞並煎取一盞去滓分三服食前溫服

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

好事者服而驗之不可

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

犯鐵若犯之令人吐逆立差口厭之病卒死脉猶動

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

舌下俞忽不寤勿以火照之殺人但痛齧其踵及足拇指甲際多垂其面

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

即活又菖蒲末吹鼻中又桂末內舌下

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

鼻中又桂末內舌下

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

安或腰痛胎轉捨心下血不止菖蒲根汁三外服之

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

背生菖蒲搗貼若瘡乾搗末以水調塗之孫用和方同

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

產後下血不止菖蒲三兩酒以酒二升煮分作兩服止

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

子母秘錄治胎動勞熱不安去血手足煩

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

夏禹神仙經治癰者三斤以絹囊盛

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

漢武帝內傳聞中嶽有石上菖蒲一寸九節食之長生故來採之忽然

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

不抱朴子南中多鹿每一雄遊牝百數至春羸瘦蓋遊牝多也及夏則唯

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

見食菖蒲一味却肥當角解之時其苦甚痛獵人逢之其鹿不敢

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

逸走伏而不動從上先以繩繫其莖截取之以其血未散然後斃鹿又韓襄

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

菖蒲必此類也其池澤所生肥大節疎麤慢甚不可入藥唯可作果盤益氣

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

一寸九節別說謹按今陽處山中生水石間者其葉逆水而生根鬚略

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

紫花尤善無少泥土相葉極累細一寸不啻九節入藥極佳今二

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

浙人家以瓦石器種之旦暮易水則瓦水濁及有泥滓則萎近方多稱用石

## 又方

治好忘父服聰明益智七日

菖蒲味不烈而和淡爾


## 又方

治好忘父服聰明益智七日

## 證類本草六

二三

鄧州菊花




衡州菊花

證草本草六

三



# 菊花



四百二十五

證類本草六

古

里

菊花味甘無毒主風頭瘡及腫痛風濕久冷流溢出皮膚死肌惡瘻風癰瘍瘻療腰痛去來陶陶除骨中煩熱安腸胃利五脉調四肢

一名日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傅延年一名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆

陰乾

术枸杞根桑根白芨爲之使菌陰云菊有兩種一種葉累氣香而味甘葉可作羹食者爲真一種青莖而大叶萬葉氣味苦不堪食者名苦慧非真其華正相似唯以甘苦別之爾南陽縣最多今近道處處有

取種之便得又有白菊莖葉都相似唯花白五月取亦主風眩能令頭不白

山經以菊爲妙用但難多得宜常服之爾菌陰云甘菊花使能治熱頭風旋地腦骨疼身上諸風

今之秋華菊菌陰云苦慧味苦破血婦人腹內宿血食之又調中止洩花如菊莖似馬蘭生澤畔似菊葉甘而慧苦語曰苦如慧是也菌陰白菊朱苦染髮

令消散頭風白髮令黑和巨勝茯苓蜜丸主風眩變白不老益顏色又靈寶方茯苓合爲丸以成鍊松脂和每服如雞子一丸令人少顏色不老主頭眩生平澤花茶白

五月花抱朴子劉生丹法用白菊花汁和之服之云甘者入藥苦者不任  
華治云菊花治四肢遊風利血脉心煩骨膈壅悶并癰毒頭痛作枕明目  
葉亦明日生熟並可食菊有兩種花大氣香莖紫者爲甘菊花小氣烈莖青  
小者名野菊味苦矣雖如此園蔬內種肥沃後同一體花上水益色壯陽治  
一切風並

無所忌

圖經曰菊花生雍州川澤及田野今處處有之以南陽菊潭者爲佳初春  
厚至柔嫩可食者其花微八味甚甘此爲真有青莖而大葉細作萬丈氣味  
苦者其華亦大名苦苣非真也南陽菊亦有兩種曰菊葉大似艾葉莖青根細  
花白葵黃其黃菊葉似桐蒿花葵都黃然今服餌家多用白者南京又有一  
種開小花花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳正月採根三月採葉  
五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾用唐天寶單方圖載白菊云味辛  
平無毒元生南陽山谷及田野中頴川人呼爲田峰菊汝南名茶苦蒿上黨  
及建安郡順政郡並名羊鬱草河內名地薇蒿諸郡皆有其功主文夫婦人  
久患頭風眩悶頭髮乾落骨中瘀結每風發即頭旋眼昏暗不覺欲倒者是  
其候也先灸兩風池各二七壯并服此白菊酒及丸永差其疾春末夏初收  
軟苗陰乾擣末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再漸加三方寸匕若不  
飲酒者但和羹粥汁服之亦得秋八月含花收暴乾切取三大斤以生絹囊  
盛貯浸三大升酒中經七日服之日三常令酒氣相續爲佳今諸州亦有作  
菊花酒者其法得於此乎

八百六十五


證類本草六

十五

王寅

食療云甘菊平具葉正月採可作羹五月五日採花九月九日採並主頭風目赤淚出去風熱利五藏野生苦菊不堪月聖惠  
方治頭風頭旋用九月九日菊花暴乾取米一升蒸熟用五兩菊花未搜拌如常醞法多用細麪糊爲懷酒熟即壓之去滓每服一小盞酒治酒醉不醒九月九日真菊花末飲服方寸匕用其食醫心鏡甘菊主頭風目眩目澁出風火外  
臺秘要治酒醉不醒九月九日真菊花末飲服方寸匕用其食醫心鏡瘡膏肉痛切作羹羹熟即服之王函方犯丁腫垂死菊花一握搗絞根白增年方廿第三月上寅日採名曰王函方廿四日採名曰金精十二月上寅日採名曰容成九月上  
乾百日取等分以成日合搗千杵爲末酒調下一錢匕以蜜九匙相子大酒服七九一日三服百日身輕潤澤服之一年髮白變黑服之二年齒落再生服之三年八十歲老人變爲童兒神効

潞州參



威勝軍人參


證類本草六

十六

丁六



充州人參




滁州人參

十五

證類本草大

主

王凡



味甘微寒無毒主補五臟安精神定魂魄止

腋通肺霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘

人微一名土精一名血參如人形者有神生上黨山谷

及遼東二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見

名神草一名男參一名女參

風茯苓爲之使惡溲疏反茹蘆云上黨郡在冀州西南今魏國所

獻即是形長而黃狀如防風多潤實而甘治用不入服乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗則是遼東形大而虛軟不及百濟百濟今自屬高麗高麗所屬兼有兩種止風擇取之爾實用並不及上黨者其參藥切要亦與甘草同功易蛀錯蠅暗唯內器中密封頭可經年不壞人參生一莖直上四五葉相對生花紫色高麗人作人參讀曰三極五葉背陽向陰欲來求我假黯樹相尋假樹葉似桐甚大蔭廣則多生陰地操作甚有法今近山亦有但作之不好

麗讀也今潞州平州平州易州檀州箕州幽州鴈州並出蓋以其山東豆相接故皆有之也

### 證類本草六

大

王氏

參亦用焉陶云俗用不入服非也王氏錫鑑云人參惡齒齦生上黨郡人形者上少山海東新羅國又出朝海主五藏氣不足五勞七傷虛損痰弱壯逆不下食止霍亂須悶三歲同五藏六腑保中守神馬蘭爲之使消胃中瘀主肺萎吐膿及癥疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛而多夢紛紜加而用之

雲人參和細辛密封經年不壞

日

云殺金石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌

圖經曰

人參生上黨山谷及遼東今河東諸州及泰山皆有之又有河北

防風而閩實春生苗多於深山中皆陰近假賈漆下濕潤處初生小者三四寸許一極五葉四五六年後生兩極五葉末者至十年後生三葉年深者生四極各五葉中心生一莖俗名百尺杆三月四月有花細小如粟藥如紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形者神二月四月八月上旬採根竹刮去土暴乾無令見風泰山出者葉幹青根白殊別江淮出一種土人參葉如匙而小與桔梗相似苗長一二尺葉相對生生五七走三五里許其不含人參者大端含者氣息自如者其人參乃真也李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即空困弱無力垂死者以上黨人參二大兩拍破水一大升煮取四合熱頓服日再兼以人參汁煮粥與服李直方司勸余郎中於漢南患反胃兩月餘諸方不差遂與此方當時便定差後十餘日發入京絳每與名醫持論此藥難可爲停也又難他藥而其効最著者張仲景治胃痺心中痞堅胸氣結胃苔滿舌道氣掩心治中湯主之人

參术乾薑甘草各三兩四味以水八升煮取三升外每服一升日三如臍上築  
者爲腎氣動去木加桂四兩吐多者去木加生薑三兩下多者復其木悸者  
加茯苓二兩渴者加术至四兩半腹痛者加人參至四兩半寒者加乾薑至  
四兩半滿者去木加附子一枚服藥後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發  
揭衣被此方晉宋以後至唐名醫治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或  
加減皆奇効胡洽治霍亂謂之溫中湯陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難  
求而治中丸四順厚朴諸湯不可暫闕常須預合每至秋月常齋白齋唐石  
泉公王方慶云治中丸以下四方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預排  
比也其三方者治中湯四順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草  
各二兩切以水六升煎取二升半分四服若不止加龍骨二兩若痛加當  
歸二兩厚朴

歸二兩厚朴

湯見厚朴條

## 海藥

出新羅國所貢又有手腳狀如蛇長尺餘以竹不灰定紅線  
繩飾之味甘微溫生腹腰消食補養藏腑益氣安神止嘔逆平

脉下痰止煩燥變駿水又有沙州參細小不堪採根用時去其蘆頭不去者世人謹之

雷公云

凡使要肥大塊如雞

腿并似人形者採得

陰乾去四邊蘆頭并黑者剉入

藥中夏中小使發心疾之寒也

外臺秘要

治蜂蝎蟻人方

人參爵以封之

千金方

開心肥健人參一分豬肺十分酒拌和服一百日

百日滿體贛溢日誦千言肌膚潤澤去熱風痰

肘後方

治卒上氣喘急鳴息便欲

絕人參末服方寸匕日五六服

經年後方半夏一兩生薑汁熬一宿曝乾爲末麪糊九

六丸五

十九

十一

## 金方

治吐血以人參一味

清炒新汲水調下一錢服之

靈苑方

治咳嗽上氣喘急嗽血生人參好者搗爲末每服

如菉豆大每服十九食後生薑湯吞下

清炒新汲水調下一錢服之

三錢匕生薑子清調之五更初服仰睡去枕仰卧只一服

愈年深者再服是腎鹹鯈鹽等物渴醉飽將息佳

建州天門冬




漢州天門冬

十六

證類本草六

三




温州天門冬




西京天門冬

證本草六


廿



兗州天門冬



薛州天門冬



本草六

三

天門冬味甘性寒無毒主諸暴風濕偏癱強骨

殺三蟲去伏戶保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小

便冷而能補服輕身益氣延年不飢一名顛勒生奉

高山谷二月三月七月八月採根暴乾

垣衣地黃爲之使畏曾青同高云奉高

太山下縣名也今處處有以高地大根味甘者爲好張華博物志云天門冬連將有逆刺若葉滑者名絲休一名顛棘可以浣練素白如絳音越金城人名爲浣草孽其根溫湯中投之以浣衣勝灰此非門冬相似爾按此說令人所採皆是有刺者本名顛勒亦粗相似以浣劣衣則淨桐君藥錄又云葉有刺蔓生五月花白十月實黑根連數十枚如此殊相亂而不復更有門冬恐門冬亦何必不即是浣草耶又有百部根亦相類但苗異爾門冬蒸剥去皮食之甚甘美止飢雖暴乾猶脂潤難擣必須薄切暴於日中或火烘之也俗人呼苗爲棘刺煮作飲不宜入而終非真棘刺爾服天門冬禁食腥魚唐本草云此有二種苗有刺而澀者無刺而滑者俱是門冬俗云顛棘浣草者形兒器本草云天門冬陶云百部根亦相類苗異爾按天門冬根有十餘莖百部多者五六十莖根長尖內虛味苦天門冬根圓短實潤味甘不同苗蔓亦別如陶所說乃是同類今人或以門冬當百部者說不明也

目錄錫鑑本草開

云蘿藦一名蕷蕷冬注云門冬一名蕷蕷增抱朴子云或名地門冬或名蕷

證類本草六

王二

二二

門冬或名巔棘或名淫羊食或名蠶蠶其生直莖根短味甜氣香者上其生水側下地者葉細似蘆而滑黃根長而味多甘氣臭者下亦可服食然喜令人下氣爲益又遲也服之至日晝夜壯素倍勝於人及黃精也入山便可蒸若煮啖之取足以斷熟若有力者并搗其汁生液以服散充益

經論云天門冬君王肺氣妙治喘息促急寒熱通督氣療肺痿生癰吐膿治濕疥止消渴去熱中風宣火服食之令人肥壯滑澤除身面一切惡氣不累之疾令人白淨齶人使洗衣如五和地華爲使服之耐老頭不白能冷補患人體虛而熱加而用之揚眉子云服天門冬誤食鱠魚中毒浮萍解之七傷治肺氣并嗽消痰風痺熱毒遊風瘧吐血去心煩

圖經曰

葉如茴香極尖細而鍊滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如終衫

而細散皆名天門冬生奉高山之山頭處有一春生藤蔓大如銖股高至丈餘無花暗結子其根白或黃色大如手指長二三十大者爲勝鱠與百部根相類然圓實而長一二十二枝同擡二月三月七月八月採根四破之去心先蒸半炊間暴乾停留久仍濕潤入藥時重炕焙令燥落中出者無大幹麤殊不相類嶺南者無花葉無它異詳按天門冬別名爾雅謂之蘿藦一名蘿藦同冬山海經云條谷之山其草多勝鱠與百部根松在北獄名無不愈在南獄名百部在京陘山阜名顛棘雖處處皆有其名各異其實一也在北獄地陰者尤佳飲服之細切陰乾擣下篩酒調三錢一日五六進之二百日知可以強筋骨顏色興鍊成松脂同蜜丸益善服者不可食鹽

魚北方以蘋棘爲別名而張茂先以爲異類博物者云天門冬莖間有刺而葉滑者曰絲休一名蘋棘根以浣練素令白越人名爲浣草似天門冬而非刺而葉滑便不中服然今所有往往是此類用者須詳之

## 雷公云

採得了去上皮一重便劈破去心用柳木甑燒柳木柴蒸一伏時洒酒令遍更添火蒸出曝去地二尺口來作小架上鋪天門藥將

蒸了天門冬擗令乾用

## 食療

補虛勞治肺勞止渴去熱風可去皮心入蜜煮之食後服之若曝乾入蜜丸尤佳亦用洗面甚佳

## 臺秘要

治風癱引勝牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門冬去心皮曝乾搗碎酒服方寸匕若人久服亦能長生

## 經驗後

## 方

服天門冬法不計多少去心皮爲末每服方寸匕日三四服不絕甚益人以酒飲之又治癰瘍積聚毒三刀輕身益氣延年却老百病不侵孫

## 真人枕中記

天門冬服末服十匙日三無問山中人間恒勿廢久服益若釀酒服之去癰瘍積聚風痰癲狂三蟲伏尸除瘟痺輕身益氣令人不飢

## 修真秘旨

神仙服天門冬三十斤細切陰乾搗末每日服三錢酒調下日五六服二百日後怡泰

拘急者緩羸劣者強三百日身輕三年走及奔馬

## 道書人帝聖化經

欲不畏寒取天門冬茯苓等分爲末服方寸匕日再服大寒時單衣汗出

## 抱朴子

云杜陵抱朴子天門冬倚八十妾一百四十八日行三百里赤頂子

冬齒落更生細髮復出


## 神仙傳

甘始者太原人服天門冬在人間三百餘年

## 府州甘草



汾州甘草




一六

汾州甘草

證類本草六

卷五



國老宋無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨長

肌肉倍力金匱通切

時勇

解毒溫中下氣煩滿短氣傷藏

欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒爲丸士之精安和

木乾添苦參爲之

七十二種石一千二百種草

父眼雲

一名蜜甘

一名羨草一名密草一名落草生河西川谷積沙山及

上郡二月八日採根暴乾十日成

木乾添苦參爲之使惡遠志反大戟

荒花甘遂海藻四物箇隱居云河西上郡不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷中來赤皮斷理者之堅實者是抱罕草最佳抱罕羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間亦有不如文有紫甘草細而實乏時可用此草最爲衆藥之主經方少不用者猶如香中有沉香以國老即帝師之稱雖非君爲君所宗是以能安和草石而解諸毒也

云薦大苦注今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節有枝相當疏引詩唐風云采苓采苓首陽之蘼是也

云甘草君忌豬肉

諸藥衆中爲君治七十二種乳石毒解一千二百根草木毒調和使諸藥有功故號國老之名矣主腹中冷痛治癰癪除腹脹滿積益五藏制諸藥毒養

腎氣內傷令人陰痿主婦人血歷腰痛虛而多熱加而用之

目華云

云安塊

定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九

竅利百脉益精養氣壯筋骨解冷熱入藥灸用

圖經曰

甘草生河西川谷積沙山及上郡今陝西及河東州郡皆有之春生

豆根長者三四尺麤細不定皮赤上有橫梁梁下皆細根也二月八月除日

採根暴乾十日成去蘆頭及赤皮今云陰乾用今甘草有數種以堅實斷理

者爲佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云薦大苦

云薦一名大苦郭璞云甘草也

蔓延生葉似荷青黃莖赤有節有枝相當疏引詩唐風云采苓采苓首陽之蘼是也

云薦與苓通用首陽山在

河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒以訛苗葉與今全別豈種類有

不同者乎張仲景傷寒論有一物甘草湯甘草附子甘草乾薦甘草漏心等

湯諸方用之最多又能解百毒爲衆藥之要孫思邈論云有山烏頭芭豆

毒甘草入腹即定方稱大豆解百藥毒嘗試之不効乃加甘草爲甘豆湯其

驗更速又備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解毒藥並是嘗用物畏人得

其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥辨又伍波與之親狎不得其實凡

欲食先取甘草一寸炙熟嚼咽汁若中毒隨即吐出乃用都琳藤黃藤二物

酒煎令溫常服毒隨大小溲出都琳藤者出嶺南高三尺餘甚細長所謂三

百兩銀藥也又常帶甘草十數寸隨身以備緩急若經含甘草而食物不吐

者非毒也崔元亮海上方治發背秘法李北海云此方神授極竒秘以甘草

三大兩生擣別篩末大麥麪九兩於大盤中相和攬令勻取上好酥少許別

捻入藥令勻百沸水浸如餅齊方圓大於瘡一分熱傅腫上以油片及故紙

糊令通風令則換之已成濃水自出未

云良便內消當患腫者藥時常須裹

黃耆粥甚妙又一法甘草一大兩微炙搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子晝露四經宿平明以物攬令沫出吹沫服之但是瘡腫發背皆可服甚效

## 雷公云

凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤皆長三寸剉劈破作六七片使甕器中盛用酒浸蒸從巳至午出暴乾細剉使一斤用酥七

兩塗上灸酥盡爲度又

救急瘦疾甘草三兩灸每旦

先炮令內外赤黃用艮

外臺秘要

以小便煮三四沸頓服之良

百一方

兩塗上灸酥盡爲度又


救急瘦疾甘草三兩灸每旦

先炮令內外赤黃用艮

外臺秘要

以小便煮三四沸頓服之良

異州地黃



十六

浙少地黃

證類本草大

卷

申



髓長筋

苦寒無毒

主男子五勞七傷女

子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五藏內傷不足通血脉益氣力利耳目

者尤良

生地黃大寒主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜腕折淤留血衄鼻吐血皆擣飲之

張襄真不

生咸陽川澤黃土地者佳

二月八月採根陰乾

得麥門冬清酒良惡

貝母畏蕪荑蜀本草云咸陽即長安也生渭城者乃有實子實如小麥淮南七精散用之中間以彭城乾地黃最安歷陽今用江寧板橋者爲勝作乾者有法搗汁和蒸殊用工意而此直云陰乾色味乃不相似更恐以蒸作爲失乎大貴時乃取牛膝萎蕤作之人不能別仙經亦服食要用其華又善生

九三十一

蓋類本草大

二十九

王永

根亦主耳聾聾重聽乾者黏濕作丸散用須烈日暴既燥別斤兩大減一斤纔得十兩散爾用之宜加量也

今按陳藏器本草云乾地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二物別蒸乾即溫補生乾則平宣當依此以用之

李時珍本草云乾地黃江東呼共音枯

能補虛損溫中下氣通血脉久服變白延年治產後腹痛土吐血不止

又云乾生二種皆黑鬚髮良藥

華岳云乾地黃助心膽氣安魂定魄治驚悸勞心肺損吐血鼻衄婦人崩

中血運助筋骨長志口乾者平火乾者溫功用同前

生者水浸驗浮者

名天黃半浮半沉者名人黃沉者各地黃互者方俱少次者草房前庭鐵器

寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹子甚細而沙褐色根如人手指通黃色麤細長短不常二月八月採根蒸三二日今燭暴乾

謂之熟地黃陰乾者是生地黃種之甚易根入土即生

一說古種種地黃宜

黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦席圓編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中爲壇壇上又以葦席實土爲一級比下壇徑減一尺如

此數級如浮屠也乃以地黃根莖多者寸斷之葦壇上層層令著逐日以水灌之令茂盛至春秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斲傷故也

得根暴乾之熟乾最上出同州光潤而甘美南方不復識但以生地黃草煙熏使乾黑洗之烘盡仍白也今乾之法取肥地黃三二十斤淨洗更以揀去

細根及相節瘦短者亦得二三十斤搗絳取汁投銀銅器中下肥地黃浸灌

髓長助湯除寒氣主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五藏內傷不足通血脉益氣力利耳目

### 首壳良

生地黃大寒主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜腕折瘀血留血効臙止血皆擣飲之

生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰乾得麥門冬清酒良惡

貝母畏蕪荑云咸陽即長安也生渭城者乃有實子實如小麥淮南七精散用之中間以彭城乾地黃最好歷陽今用江寧板橋者爲勝作乾者有法搗汁和蒸殊用工意而此直云乾色味乃不相似更恐以蒸作爲失乎大貴時乃取牛膝萎蕤作之人不能別仙經亦服食要用其華又善生

九月三十

證類本草六

三十九

三十六

根亦主耳聾聾重聽乾者黏濕作丸散用須烈日暴曬別斤兩大減一斤纔得十兩散爾用之宜加量也今按陳藏器本草云乾地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二物別蒸乾即溫補生乾則平宣當依此以用之

九月三十

證類本草六

三十九

三十六

能補虛損溫中下氣通血脉久服變白延年治產後腹痛土吐血不止云乾生二種皆黑鬚髮良藥曰云乾地黃君生地黃忌三白味甘平無毒解諸熱破血通利月水閉絕不利水道擣薄心腹能消瘀血病人虛而多熱加而用之云乾生二種皆黑鬚髮良藥曰云乾地黃助心膽氣安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩名天黃半浮半沉者名人黃沉者各地黃生者六月九月次年者芽旁前是鐵器中血運助筋骨長志可乾者平火乾者溫功用同前生者水浸驗浮者

九月三十

證類本草六

三十九

三十六

圖經曰地黃生咸陽川澤黃土地者佳今處處有之以同州者爲上二月生葉布地便出似車前葉上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹子甚細而沙褐色根如人手指通黃色麤細長短不常二月八月採根蒸三二日今燶暴乾謂之熟地黃陰乾者是生地黃種之甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤產地則根大而多汁其法以葦席圓編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中爲壇壇上又以葦席實土爲一級比下壇徑減一尺如灌之令茂盛至春秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斲傷故也此數級如浮屠也乃以地黃根莖多者寸斷之蔴壇上層層令著逐日以水澆使乾黑洗之熟乾最上出同州光潤而甘美南方不復識但以生地黃草煙熏使乾黑洗之烘盡仍白也今乾之法取肥地黃三二十斤淨洗更以揀去細根及相飾瘦短者亦得二三十斤搗絞取汁投銀銅器中下肥地黃浸灌



本草綱目


商少木

證類本草六

三二




本草圖




石生木

證類本草六

三三



越州木




古

舒州木

證類本草下

四三



欽定本草



四百三

證類本草 大

三十四

毛

木味苦

甘溫無毒

主風寒濕痺元脾虛

切

巨井

疽癰汗除

熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚出消瘀水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嘔食而

名山薑

一名山薑一名山連生

泰山山谷漢中南鄭

二月三月八月九月採根暴乾

防風地榆爲之使

云鄭

白山茅山者爲勝十一月十二月正月二月採好多脂膏而甘仙經云亦能除惡氣弭災令丸散煎餽並有生熟苗又可作飲甚香美去水木乃有兩種多膏可作煎用昔劉涓子接取其精而丸之名守中金丸可以長生東境木大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然用時宜刮去之

本草云木一名山芥一名天蘇

云白木君李桃李雀肉菘采青

薊而生山中疏云生平地者即名薑生山中者名木

云木一名山精

故神農藥經曰必欲長生常服山精

魚味甘辛無毒能主大風瘡癥多年氣痢心腹脹痛消宿食開胃去痰涎除寒熱止下澁主面光悅駐顏去黑治水腫脹滿止嘔逆腹內冷痛吐瀉不

及開氣虛令病云木治一切風疾五勞七傷令氣腹脹補腰膝消瘀治水氣利小便止反胃嘔逆以筋骨弱軟痃癖氣塊婦人冷癥痕溫疾二藥如常用又名吃力伽蒼者去皮

瘧氣除煩長切後米泔浸一宿入

**圖經曰**木生鄭山山谷漢中南鄭今處處有之以嵩山茅山者爲佳春長三二尺以來夏開花紫碧色亦似刺薊花或有黃白花者入伏後結子至秋而苗枯根似薑而傍有細根皮黑心黃白色中有蕷湯紫色二月三月八月九月採暴乾乾濕並通用今八月採之服食家多單餌之或合白茯苓或合石菖蒲並搗末旦日水調服晚再進久彌佳刷取木不去土水浸再三煎如飴糖酒調飲之更善今崇山所製木前是山法也陶隱居云昔者劉涓子採取其精而丸之名守中金丸今傳其法乃是膏前熟非貞耳謹按技术有二種爾雅云木山薊楊枹韜薊釋曰此辨薊生山中及平地者名也生平地者名薊生山中者名木陶注本草云白木葉大而有毛甜而少膏赤木細苦而多膏是也其生平地而肥大於衆者名楊枹薊今呼之馬薊然則楊枹即白木也今白木生杭越舒宣州高山崗上葉葉相對上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作桺生二月三月八月九月採根暴乾以大塊紫花者爲勝又名乞力伽凡古方云木者乃白木也非謂今之木矣

**唐本云**利小便及用苦酒漬之用拭面點黓極効兩搗羅爲散每服一錢不計時候以好羊子肝一箇用竹刀子批破摻藥在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟爲度患人先熏眼藥氣絕即喫之簡要濟衆亦治小兒雀目

### 證類本草六

三五

王叔

**臺秘要**療忽頭眩暉經久不差四體漸羸食無味好食黃土木三斤麴三斤擣篩酒和併丸如梧桐子大服二十丸忌桃李雀方治中風口噤不知人木四時候以好羊子肝一箇用竹刀子批破摻藥在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟爲度患人先熏眼藥氣絕即喫之簡要濟衆亦治小兒雀目

**千金方**治中風口噤不知人木四時候以好羊子肝一箇用竹刀子批破摻藥在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟爲度患人先熏眼藥氣絕即喫之簡要濟衆亦治小兒雀目

始日三服

兩酒三外煮取一升頓服

**又方**治療頭暉白木末

水調服方寸匕

**經驗方**治療頭暉白木末

細末鹽漿水洗薑乾貼二口一換可

**方**計多少用米泔水浸三兩日逐日換水候滿日取出刮去黑皮切作片子暴乾用慢火炒令黃色細搗末每一斤末用蒸過茯苓半斤煉蜜爲丸如梧桐子大空心卧時溫熟水下十五丸別用木末六兩甘草末一兩拌和勾作湯點之下木丸妙

**又方**治內外障眼蒼木四兩米泔浸十日逐日換水後不用木賊二兩以童子小便浸一宿水淘焙乾同搗爲梅師方治心下末每日不計時候但飲食蔬菜內調下一錢匕服甚驗

**梅師方**治心下木三兩澤瀉五兩坐以水三升煎取一升半分服

### 集驗方

細末鹽漿水洗薑乾貼二口一換可

以負重涉嶮凶年與老小休

服

**荀子注**列仙傳劉涓子齊人隱於宕山餌木能致風雨

細末鹽漿水洗薑乾貼二口一換可

一人教之食木遂不飢數十年乃還鄉里顏色更少氣足不差白木爲

力轉勝故木一名山精神滋養必欲長生當服山精

之清氣服之令人長生絕穀致神仙

梁庚肩吾

諭玉液足使坐致延生伏深銘忘

產寶產後中風寒遍身冷直口噤不識人方白木四兩以酒三外煎取一升頓服

細末鹽漿水洗薑乾貼二口一換可

糧人不能別之謂之米脯

逃壺山中飢困欲死有

之清氣服之令人長生

絕穀致神仙

長生

之清氣服之令人長生絕穀致神仙

梁庚肩吾

諭玉液足使坐致延生伏深銘忘

單州菟絲子



三九五

證類本草六

三十六

示

菟絲子味辛甘無毒，續絕傷補不足，益氣力肥健。汁去面點，養肌強陰，堅筋骨。主莖中寒，精自出，溺有餘瀝，口苦燥渴，寒血爲積。又腰間輕身延年。一名菟纏，一名唐蒙，一名玉女，一名赤網，一名菟蠶。菟蠶音亂。生朝鮮川澤田野蔓延草木之上，色黃而細，爲赤網色淺而大，爲菟蠶。九月採實，暴乾。得酒良署，預松脂爲之使惡。菟萬菟萬居云宜丸不宜煮。云或謂菟絲無根也，其根不屬地，伏苓是也。抱朴子云：或謂菟絲無根也，其根不屬地，伏苓是也。篇云：菟絲初生之根，其形似兔掘取害其血以和丹服之，立變化。

論云：六菟絲之草下有伏兔之根，無此兔則然不得生於上，然實不屬也。又內篇太菟絲初生之根，其形似兔掘取害其血以和丹服之，立變化。

菟絲子君能治男子女人虛冷，添精益髓，去腰疼膝冷，久服延年，駐悅顏色。又主消渴熱中。華子云：補五勞七傷，治鬼交泄，精尿血潤心肺，苗莖似黃麻線，無根株多附田中草，被纏死或生一叢，如席闊開花，結子不分明，如碎黍米粒。八月採米粒，八月前採。

圖經曰

茺蔚子生朝鮮川澤田野今近京亦有之以菟句者爲勝夏生苗如然蕪蔓延草木之上或云無根假氣而生六七月結實極細如

蠶子土黃色九月收採暴乾得酒良其實有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟蘿其功用並同謹按爾雅云唐蒙女蘿女蘿茺蔚釋曰唐也蒙也女蘿也茺蔚也一物四名而本經并以唐蒙爲一名又詩云蕪與女蘿毛傳云女蘿茺蔚也陸機云今合藥茺蔚也而本經茺蔚無女蘿之名別有松蘿條一名女蘿自是木類寄生松上者亦如茺蔚寄生草上豈二物同名本經脫漏平文書傳妄云茺蔚無根其根不屬地今觀其苗初生纏若絲遍地不能自起得他草梗則纏繞隨而上生其根漸縱於地而寄空中信書傳之說不謬矣然云上有茺蔚下有茯苓茯苓抽則茺蔚死又云茺蔚初生之根其形似兔掘取剖其血以和丹服之今人未見其如此者豈自一類乎仙方久單服者取實酒浸暴乾再浸又暴令酒盡篩末酒服而彌佳兼明日其苗生研汁塗面

斑神效

雷公云

勿用天碧草子其樣真相似只是天碧草子味酸澁并粘不入藥用其茺蔚子稟中和凝正陽氣受雜偏補人衛氣助人筋脉一茎

從樹感枝成又從中春上陽結實其氣大小受上鑑二兩全採得去麤薄殼了用苦酒浸二日底出用黃精自然汁浸一宿至明微微火煎至乾入臼中

熱燒鐵杵一勁三千餘杵成粉用苦酒

肘後方

治卒腫滿身面皆洪大

一三宿每服

又方

治毒發痛步蟲齧茺蔚子熬令黃黑未和難于黃塗之亦治穀道中赤痛

又方

治面上粉刺擣茺蔚

八十

蓋類本草六

三十七

田光

子绞取汁

經驗後方

治丈夫腰膝積冷痛或頸麻無力茺蔚子洗秤一

塗之差

兩牛膝一兩同浸於銀器內用酒過一十五日暴

乾爲末將元浸酒再入少醇酒作糊搜

和丸如梧桐子大空心酒下二十九

一兩蜜炙搗用薯蕷末酒煮爲糊丸

如梧桐子大空心酒下五十九

子母秘錄

固陽丹茺蔚子二兩酒浸十日水淘焙乾爲末更入杜仲

書

治橫生兔頭子和天麻調下錢匕次亦得

修真方

符仙方茺蔚子一斗酒一斗浸良父庶出暴乾又浸以酒盡爲

產

度每服二錢溫酒下正二


錢一五錢水飯狀一至三七日加至

三錢七服之令人安

三錢水飯狀一至三七日加至

三錢七服之令人安

歸州牛膝



滁州牛膝

證類本草六

三八

田光



懷州牛膝




單州牛膝

證類本草六

三九

+



牛膝

君爲

酸平無毒

主寒濕腰痺四肢拘攣膝癆不

可勝氣陽助人潤墮胎療傷中少氣男子陰消

老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止癰白以服輕身而美

名百倍生河內川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾

惡螢火陸英龜甲畏白前開慧昌云今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節似牛膝故以爲名也乃云有雌雄者莖紫色而節大爲勝爾周易云諸藥八月已前採者皆曰乾火乾乃佳不爾錦爛黑黯其十月已後至正月乃可陰乾周易云牛膝臣忌牛肉能治陰痿補腎填精逐惡血流結助十二經脈病人虛羸加而用之同云牛膝治腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并立暈落死胎壯陽懷州者長白近道蘇州者色紫

圖經曰

牛膝生河內川谷及臨朐今江淮閩粵閩中亦有之然不及懷州

者爲眞春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如匙兩兩相對於莖上生花作穗狀結實甚細此有二種莖紫節大者爲雄青細者爲雌二月七月十月採根陰乾根極長大而柔潤者

佳莖葉亦可單用葛共治老瘡久不斷者取葉莖一把切以酒三升漬服令微有酒氣不即斷更作不過三劑止唐崔元亮海上方治瘡用水煮牛膝根未發前服今福州人單用土牛膝根淨洗切焙乾搗下旋酒煎溫服云治婦人血塊極效

雷公云

汁浸一夜瀝出細剉焙乾用之

聖惠方

治眼卒生珠管牛膝并葉搗絞

取汁日三

四度點之又方含於豉汁中相和煮作粥和鹽醬空腹食之

千金方

治婦人小戶嫁痛牛膝五

要

治勞瘡積久不斷者長生牛膝一握切以水六升煮取二升分二服未發前服

外臺秘

治卒暴癥腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝

上生瘡爛取牛膝酒漬含漱之無酒者空含亦佳

半去滓分作三服

又方

治風瘡癰癧牛膝末酒服方寸匕日三并主骨疽癰病及瘡癰

肘後方

及苦

出服五合至一升量力服之

又方

治齒痛燒牛膝末著齒間含之

又方

治小便不利莖中痛欲死兼治婦人血結腹堅

一升漬經一宿每服升量力服之

飲一兩盃日三服

經驗後方

治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉爲末生地黃汁五十九丸服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生

梅角方

治竹木刺在肉中不出取

又方

治胞衣不出取

又方

治胞衣不

出牛膝八兩以水九升煎取三分服

### 又方

治車得瘡瘍人不識

根灰致牙齒間者以牛膝根燒傳之

牙


齒疼燒牛膝根灰致牙齒間

### 又方

治金瘡痛用生牛膝根燒傳瘡上立差

孫真人食忌

## 茺蔚子



證類本草下

里

說

茺蔚子味甘微溫微寒無毒主明目益精除水氣療血逆大熱頭痛心煩以服身

茺蔚子

上音隱  
下音詠

味甘微溫無毒主明目益精除水氣療

血逆大熱頭痛心煩以服身

茺蔚子一名貞蓀生海濱池澤五月採

有根如荳方莖子

形細長三稜方用亦稀唐本注云蕷莖葉似蕷子而葉薄子腫腹中主產後血脈諸雜毒腫丹油等腫取汁如豆滴耳中主導耳下子死腹中主產後血脈諸雜毒腫丹油等腫取汁如豆滴耳中主導耳中虺蛇毒傳之良本注云此草而野間人呼爲蕷莖莖本功外苗子入面藥令人光澤亦擣苗搗取敷疼痛者又擣苗絞汁服七沸腫下水兼惡毒腫別本注云其子狀如小桔子而稍纏大微有陳氣止前及擣浸取汁服之下死胎也

釋草注云蕷莖本苦微也葉似荳方莖白華生節間又名蕷母疏引蘇軾詩曰蕷臭穢臭穢則人不持也

云治產後血脈苗葉同功乃蕷母也生花如蘿蔓子葉密五月採

圖經曰

茺蔚子生海濱池澤今處處有之謹按毛詩云中國有蕷兩雅云荏蔴推郭璞云今茺蔚也葉似荳方莖白華莖生節節生花實

機云韓詩及三蒼皆云蕷益母也故曾子見之感因劉歌亦謂蕷臭穢臭穢即茺蔚之今園圃及田野見者極多形色皆如郭說而苗葉上節節生花實似雞冠子黑色莖作四方稜五寸採又云九月採實醫方中稀見用實者唐天祐鍤益母草澤而法五月五日採根苗具水勿令背土王乾搗羅以水和

之今無熟靈之如雞子大再暴仍作一鑪四傍開竅上下置火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小火養之勿令絕經一復時出之甕器中研三沸再研三日收之使如湯豆法廣濟方療小兒疳瘍因垂死者取益母草煮水和絞取汁頓服良又主難產搗取汁七大合煎半頓服立下無斂者以乾者一大握水七合煎服又名蠶貞益又名苦低草亦主馬齒絆切此草和

醋炒傳

之良

## 聖惠方

治婦人勒乳痛成癰益母爲末水調塗乳上一宿自差生搗爛用之亦得

## 又方

治產後血不下益母搗絞汁每服一小盞

## 溫攬勾服外臺秘要

治折傷內損有瘀血每天陰則痛兼治產婦諸疾神方三月採益母草一名負擔一名夏枯草洗擇

令淨於箔上搗暴令水乾別用拔斷可長五寸已來勿用刀即置鍋中以水二頃以來令草上水深二三寸煎煮益母爛水三分減二濾出草取五六斗汁瀉入盆中澄之半日已來以綿濾取清汁益中滓澱盡弃之其清汁於小釜中慢火煎取一斗以來如稀餳每取梨許大緩酒和服之日再服以和羹粥並可如速行不能稀煎去即更煉可九杵每服之七日內則疼痛漸瘳七日平復或有產婦惡露不盡及血暈一二服差其藥治風益心力無忘

## 肘後方

婦人一切血病產

婦一切傷損

益母草不限多少

竹刀切洗淨銀器內

煉成膏

甕器內

甘之並以酒服之

孫真人

治馬咬方益母草細切和醋炒封之

食醫心鏡

治小兒疳瘍

每次以益母草

## 集驗方

治婦人帶下赤白色

益母草花開偏治面上風刺亦制硫黃

時採搗爲末

每服二錢食前溫湯

調子母秘錄

治產後血暈心氣絕益母草研絞汁服一盞妙

又方

治小兒疳瘍益母草絞汁稍稍服

## 衆

新生小兒浴法益母草五兩剉水一斗

門方

治癰子已破用

益母搗傳瘡炒

丹房鏡

治癰子帶下赤白色

益母草花開

時採搗爲末

每服二錢食前溫湯

入酒一合

溫攬勾服

六八古

滁州志

馬正

相雲



十五

舒州萎蕤

證類本草六

四三

醫



萎蕤

無毒草

不能動跌筋結

心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛皆

燥沃出

麻

不老

一名熒

一名地節一名玉竹一名馬薰生太山山谷及丘陵立

春後採陰乾

畏鹹

云按本經有女萎無萎蕤別錄無女萎

有其根似黃精而小異服食家亦用之今市人別用一種物根形狀如續斷

莖味至苦乃言是女青根出荊州今療下痢方多用女萎而此都無止洩之

詭疑必非也萎蕤又能理諸石人服石不調和者煮汁飲之

云女萎

功用及苗蔓與萎蕤全別列在中品今本經未書是女萎能效果二字乃萎蕤

之功以朱書爲白字

云按本經有女萎無萎蕤別錄無女萎

一名委蕤葉似竹大者如箭竿有節葉狹長而表白裏青根大如指長一二

尺可啖云委蕤君主時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加

而用之良

云女萎萎蕤二物同傳陶云同是一物但名異且下痢方

多用女萎而此都無止洩之詭疑必非也按女萎蘇又於中品之中出之云

主霍亂洩痢腸鳴正與陶注上品女萎相會如此即二萎功用同矣更非二

物蘇乃剩出一條蘇又云女萎與萎蕤不同其委蕤一名玉竹爲其竹一名

地節爲其有節魏志樊阿傳青黏

一名黃芝一名地節此即萎蕤極以偏

五勞七傷虛損腰脚疼

痛天行熱狂服食無忌

圖經

萎蕤生泰山山谷丘陵今滁州舒州及漢中皆有之葉狹而長袁

長一二尺或云可噉三月開青花結圓實立春後採根陰乾用之本經與女

萎同條云是一物二名又云自是二物苗蔓與功用全別爾雅謂葵委蕤

爲切下郭璞注云葵草也亦無女萎之別名疑別是一物且本經中品又別有

女萎脩蘇恭云即此女萎今本經朱書是女萎能効黑字是萎蕤之功觀古

方書所用則似差別胡洽治時氣洞下遺下有女萎丸治傷寒冷下結陽

中用女萎治虛勞小黃耆酒云下痢者加女萎詳此數方所用乃以中正故

能動搖及去虧好色故也又治傷寒七八日不解續命龜甲湯治脚弱龜甲湯並用萎蕤及延年方主風熱項急痛四肢拘攀茵芋酒中用

發即頭熱萎蕤丸乃似此黑字女萎緣其主風熱濕毒腰痛故也二者主治

既別則非一物明矣然陳藏器以爲更非二物是不然矣此女萎性平味甘

中品女萎味辛性溫性味既殊安得爲一物又云萎蕤一名地節極似偏精

疑即青黏華他所服漆藥青黏散是此也然出無復能辨者非敢以爲信然耳

十七

證類卷六

四一四

三百

雷公云

凡使勿用鈎吻并黃精其一物相似萎蕤只是不同有誤疾人萎蕤節上有毛莖班葉尖刺月小黃點採得先用竹刀刮去算皮子

洗淨却以蜜水浸

一宿蒸了焙乾用

外臺秘要



主發熱口乾小便澀萎蕤五兩煮外飲之

楊氏產乳

療久

肛不止取艾萎

切一外燒薰之



襄州防葵

辛大

證類本草六

四一五

防

甘苦寒無毒

生酒浸服治腰脅熱結溺不下

熟

溫

止驚狂

大療五藏虛氣小腹支滿臚脹

口乾除腎邪強志安眠堅骨髓益氣輕身中火者不可

服令人恍惚見鬼

一名梨蓋

一名房葵一名爵離一名

農巢一名利茹一名方蓋生臨淄川谷及嵩高太山少

室三月三日採根暴乾

固隱居

云北信陽今用建平問者云本與狼毒同根猶如三建今其形亦相似但置

水中不沉爾而狼毒陳久亦不能沉矣

唐本注

云此藥上品無毒久服主邪氣驚狂之要其根葉似葵花子根香味以防風故名防葵採依時者亦能沉

水今乃用枯朽狼毒當之極爲謬矣此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西

方有之其興州採得乃勝南者爲隣蜀土也

臣禹錫等謹按藥性論

云防葵

君有小毒能治疝氣疫癬氣塊膀胱宿水血氣瘤

大如椀悉能消散治鬼瘞主百邪鬼魅精怪通氣

圖經曰

防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山蘇恭云襄陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者爲隣蜀土也今惟

諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一莖其端開花

花葉天蓼而色白根似防風香味亦如之依時採者不沉水陶隱居云與狼毒

六卷

證類本草六

四十六

王其

同根但置水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極爲

謬矣三月三日採六月開花即結實採根爲藥

陳藏器云

按此二物一是上品而陶云防葵與狼毒根同但置水中不沉然此二物善惡不同形質又別陶旣爲此說後人因而

用之防葵將以破堅積爲下品之物與狼

毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

雷公云

凡使勿誤用狼毒緣貳

用之防葵將以破堅積爲下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

又不同切須審之恐誤疾人其防葵在蔡州沙土中生採得二十日便炒用之唯輕爲妙欲使先須揀去艸未後用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二外拌了土器中炒令黃精汁盡

肘後方

治癲狂疾防葵末溫酒服一刀圭至二三服身潤又小不仁爲候



