

新編婦人大全良方

七

妊娠疾病門

胎類心明須知妊
娠疾之故以次之

凡妊娠諸病但忌毒藥餘則對證依法治之

妊娠隨月數服藥及村忌法第一 凡貳拾方

千金妊娠言月名始胎飲食精熱酸美受御且食大麥母
食腥辛白濁絕正

又妊娠壹月足厥陰脉養不可針灸其經足厥陰內屬於
肝肝主筋及血壹月之內血行不為力事寢心安靜
母令恐畏

又妊娠壹月陰陽新合為胎害不多為痛熱多卒驚舉重腰
痛腹滿胞急卒有垢所下當以理安之且服烏雄雞湯方

烏雄雞壹隻 治如食法 吳茱萸壹升 茯苓

生薑 甘草各壹兩 人參

白朮各叁兩 麥門冬伍拾

右拾味細切以水壹斗貳升煮雞取汁陸升去雞下藥
內取三升并膠烱盡取叁升去滓温服壹升日叁服

又若曾傷壹月胎者當預此補胎方

北細辛壹兩 防風貳兩 烏梅壹升 吳茱萸伍合

乾地黄 白朮各壹兩 大麥伍合 生薑四兩

右咬咀以水柒升煮取貳升半去滓分温叁服若寒多
者倍細辛柒葉熱多温者去細辛柒葉加枯樓根貳兩

若有所思去大麥加栝子仁叁合壹方有人參壹兩忌
生菜蕪美桃李雀肉等物

妊娠貳月名始膏母食辛臊居必靜處男子勿勞百動痛是謂胎始結

又妊娠貳月足少陽脈養少可鍼灸其經足少陽內屬於膽膽主精貳月之時兒精成於胞裏當謹護驚動

又妊娠貳月始陰陽踞經去日寒多壞不成有熱即萎卒中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰痛卒有所下寒不熱艾湯主之方

丹參 貳兩

當歸

人參

麻黃 貳兩

艾葉

阿膠 貳兩

甘草 貳兩

大棗 貳兩

牛薑 陸兩

右九味切以酒參升水壹斛內藥煮減半去浮內藥取取參升分溫參服忌海藻菘菜

又若骨湯二月胎者當預服此湯方

黃連

人參 貳兩

吳茱萸 伍分 生薑 貳兩

山薑 貳兩

右伍味切以醋漿洗升煮取參升肆服日叁夜壹每冷日壹作若煩見不安加烏梅壹升加烏梅者不用漿

用水日忌猪肉冷水蕪菜一方當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而外感者也

又妊娠三月手心主脈養不可鍼灸其經手心主內屬於心無悲哀無思慮驚動

又妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃

卒驚恐憂愁頭志喜顛小動於經脈腰痛繞臍苦痛腰背
痛卒有所下雞湯方

雄雞精食法甘草炙

茯苓 人參

阿膠各貳兩黃芩

白朮各壹兩芍藥肆兩

麥門冬去心大棗剉生薑壹兩

右咬咀以水壹斗伍升煮雞臠半內藥煮取一半入清
酒叁升并膠再煎取叁升分叁服壹日盡之溫卧忌

海藻松葉酢物桃李雀肉等方有當歸

又若曾傷三月胎者當預服神湯方

茯神 丹參 龍骨各壹兩阿膠

當歸 甘草炙 人參各壹兩赤小豆壹斗

大棗十二枚

古咬咀酢將壹斗煮取叁升分四服七日後服一劑腰

痛者加桑寄生臠深師方有菴白麻子精忌同前

姪娘四月始受水精以成血脉其食稻獲其羹魚鴈是謂

成血氣以通耳目而行經絡

又姪娘四月手少陽脉養不可鍼灸其經手少陽內輸三

焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

又姪娘四月為離經有寒心下温温欲嘔胃腸滿不欲食

有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒

熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胃煩不得安

卒有所下雞湯方

菊花如雞子麥門冬去心麻黃去節

阿膠各

生薑伍兩甘草炙 當歸 半真洗各

人參 壹兩半 大棗 壹兩

右細剉以水捌升煮減膏半內清酒參升并阿膠煎取

參升分參服溫卧當汗以粉粉之護風寒四五日忌羊

肉海藻松菜餅等

又若曾傷四月胎者當預服調中湯方

芍藥 肆兩

甘草 各壹兩

芍藥

續斷 各壹兩

此方

白朮 各壹兩

烏梅 壹升

生李根 壹兩

當歸 壹兩半

生薑 肆兩

厚朴 各壹兩

枳實 各壹兩

右細切以水壹斗煮取參升分四服日冬夜壹劑日再

服壹劑一方有半夏貳兩忌海藻松菜桃李雀肉

妊娠五月始受火精以成其氣晏起沐浴浣衣居處必厚

其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和菜重

調以五味是謂養氣以定五藏

又妊娠五月足太陰脉養不可鍼灸其經足太陰內輸於

脾五月之時兒四肢成無大飢無甚飽無食乾燥無自灸

熱無大勞倦

又妊娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹

滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛

悶頭欲仆卒有所下 阿膠湯方

阿膠 肆兩

人參 壹兩

麥門冬 壹兩 生薑 陸兩

吳茱萸 各壹兩

旋覆花

當歸

芍藥

甘草 各壹兩

黃芩 各壹兩

右細切以水玖勝煮取壹半內清酒參升并膠微火煎
取參升半分為四服日冬夜壹先食再服便愈不差更

服忌海藻松菜

又若曾傷五月胎者當預服**安中湯**方

甘草炙

芍藥各二兩當歸

人參

乾地黄

芍藥各二兩五味子五合生薑陸兩

麥門冬去心

大蘇仁五合大棗三十五枚黃芩二兩

右細切水柒升清酒五升煮取參升半分四服日參夜

壹柒日再服壹劑忌如前

小品療姙娠五月舉動驚愕胎動不安下在小腹痛引腰

胎小便疼下血當歸湯方

當歸

阿膠

芍藥

人參各二兩

棗乾黃芩

艾壹虎口

右細切以酒水各參升合煮至參升去滓內膠令烊分

參服腹中當安小便緩也古今錄驗救急同一方有甘

草無參棗

姙娠六月始受人毒精以成筋身欲微勞無得靜處出遊於

野數觀走犬馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂變腠理紐筋以

養其力以堅背脊

又姙娠六月足陽明脈養不可鍼灸其經足陽明內屬於

胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無大飽

又姙娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫

滿忽有所下腹痛如欲產手足煩疼**麥門冬湯**方

麥門冬去心

甘草炙

人參二兩

乾地黄二兩

黃芩二兩

阿膠二兩

生薑陸兩

大棗十五枚

右八味切以水柒升煮減半內清酒貳升并膠煎取參

六分參服每如人行三四里中間進糜粥忌海藻松菜

天若傷六月胎者當預服**柴胡湯**方

柴胡 肆兩

芍藥 方兩

白木

甘草 炙各

乾地黃 伍兩

麥門冬 叁兩

茯苓 壹兩

芍藥 貳兩

乾地黃 伍兩

生薑 陸兩

大棗 枚肆

右十味切以水壹斗煮取叁升分四服日叁夜壹中間進

糜粥勿食生冷及堅強之物七日更服一劑忌海藻松

菜蕪美桃李雀肉等

方有黃

集驗療妊娠六七月胎不安常處**旋覆花湯**

亦名匝病

旋覆花 壹兩

厚朴

白木

枳殼

黃芩

茯苓 各叁兩

半夏 方兩

芍藥

生薑 各貳兩

右細切以水壹斗煮取貳升半先食分五服日叁夜貳

忌羊肉鵠醋桃李雀肉千金同

妊娠七月始受木精以成骨勞身搖肢無使定止動作出

伸以運血氣自此後居處必燥飲食避寒常食粳稻以密

腠理是謂養骨而堅齒

又妊娠七月手太陰脉養不可針多其經手太陰內屬於

肺肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄

衣無洗浴無寒飲

又妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若

撓寒煩熱腹滿短氣常苦頸項腰背強**葱白湯**方

葱白 長叁肆寸

半夏 洗切

麥門冬 去心

主薑 捌兩

甘草 炙

當歸

黃耆 各炙兩

阿膠 肆兩

人參 壹兩半 黃芩 壹兩

旋覆花 壹把

右十一味切以水八升煮減半內清酒參升并膠煎取肆升溫服壹升日叁夜壹溫卧當汗出若不出者加麻黃貳兩煮服如前法若秋後勿強責汗忌羊肉鰾海藻菘菜等

杏仁湯 若曾傷七月胎者當預服

杏仁

去雙仁 實少大碎 甘草 炙

鐘乳 研

乾薑 各貳兩

麥門冬

去心

吳茱萸 更酪言 五味子

粳米 各伍合

紫苑 壹兩

石九味切以水捌升煮取參升半分四服日三夜一中間進食七日服一劑忌海藻菘菜

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理光澤顏色

又妊娠八月手陽明脉養不可缺多其經手陽明內屬於大腸大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無鹹失食無忍大起

芍藥湯 又妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷痛而目視茫茫

芍藥 肆分

人參

當歸

甘草 炙 各

白朮 壹兩

厚朴 二兩

薤白 切 壹升 生薑 切 肆兩

右八味切以水伍升酒肆升合煮取參升分叁服日再夜壹忌海藻菘菜桃李雀肉等

胎前產後若曾傷八月胎者當預服

甘草炙

柴胡

白朮各參兩 厚朴

芍藥各貳兩 葵子貳升

生薑陸兩

大棗貳拾枚

右八味切以水豉升煮取參升分參服日參一日服一

劑忌海藻菘菜桃李雀肉等食前

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自時而待之是謂養毛髮多才力

又妊娠九月足少陰脈養不可鍼灸其經足少陰內屬於

腎腎主續縷九月之時兒脈續縷皆成無處溫冷無着多衣

胎前產後又妊娠九月若卒下痢腹痛懸急胎上衝腰背痛

不可轉側短氣

半夏洗

麥門冬去心 乾薑各五合

當歸

吳茱萸

阿膠炙

大棗拾貳枚

右柒味切以水豉升煮取參升去滓內白蜜八合微火

上溫分肆服痢即止忌生血物錫

猪腎湯若曾傷九月胎者當預服

猪腎壹具

茯苓

桑寄生

乾薑

乾地黄

芎藭各參兩 白朮肆兩

麥門冬壹升

附子仲諸壹 大豆叁合

右十味切以水壹斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取參升

半分四服日參夜壹於日更一劑忌猪肉冷水蕪荑桃

李雀肉酢物等

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關

節人神皆備但俟時而生集驗延年同

妊娠惡阻方論第二

凡十二方

夫妊娠阻病者按各殺產寶方謂之子病巢氏病源謂之惡阻若婦人稟受怯弱或有風氣或有痰飲既妊娠便有是病其狀顏色如故脉息和順但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食酸鹹甚者或作其熱心中憤悶嘔吐痰水胃脘煩滿恍惚不能支持不拘初娠但疾苦有輕重耳輕者不服藥亦不妨重者須以藥療之千金方有半夏茯苓湯茯苓圓貳方專治阻病然此一藥比來少有服者以半夏有動胎之性蓋胎初結慮其易散此不可不謹也張仲景傷寒論云婦人傷風續得寒熱發作有時此為熱入血室有用黃龍湯者小柴胡湯去半夏也此蓋為妊娠而設焉王子亨則有白朮散局方則有人參丁香散用之良驗然三方皆大同而小異揚振則有人參橘皮湯齊士明則有醒脾飲子試之亦效皆不用半夏動胎等藥服者知之

白朮散治惡阻吐清水甚害十餘日漿漿不入者

白朮 壹兩

人參 半兩

丁香 壹錢半 甘草 壹錢

右為細末每服貳錢水壹瓖薑伍片煎至七分溫服

人參橘皮湯治阻病嘔吐痰水

人參 去蘆

陳橘紅

白朮

麥門冬 去心

甘草 參錢

厚朴 製

白朮 去破各

右為粗末每服肆錢水壹瓖半湯竹茹壹塊如彈子大生薑叁片煎至柒分去滓澄清溫服空心食前集驗无

茯苓 麥門冬 甘草

人參丁香散 治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及心腹刺痛

人參 半兩 丁香

藿香 各半兩

右為散每服參錢水壹錢煎至七分去滓溫服無時

又方

人參

丁香

柿蒂 各壹兩 甘草

良薑 各半兩

右為細末每服貳錢熱湯點下無時

國治山 治妊娠阻病嘔逆不食甘苦者中滿口中無味或

作寒熱 此出七代傳方

草豆蔻 以溫酒洗去火中燥

厚朴 各

乾薑 各二分

甘草 乙分

右為細末每服貳大錢水壹大瓊棗貳箇生薑參片煎

一至捌分去滓呷服病輕者只一貳服便能食舊有橘紅

貳兩治寒熱瘧痢不食後人去橘皮以乾生薑代乾薑

治老人氣虛大便秘少津液引飲有奇効產科醫官齊

士明依舊用乾薑去橘皮亦名醒脾飲子治阻病極為

神驗宣和初在京師校勘

保生湯 治婦人經候不行身無病而似病脉滑大而陸部

俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食臭或但嗜一物

或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作寒病治之宜服此

藥如覺惡心嘔吐加丁香生薑煎服

溫隱居方

人參 乙分

甘草 乙分

白朮

香附子

烏藥

橘紅 各半兩

右以咀每服參大錢水一錢生薑伍片煎至五分去滓

温服無時或作末子調服

古今錄驗療惡食

人參肆兩

厚朴

生薑

枳殼

甘草各貳兩

右切以水陸升煮取叁升分叁服

治妊娠阻病心中憤悶見食嘔吐惡聞食氣肢節煩疼身體沉重多思嗜卧面黃肌瘦

人參

陳皮各捌分

麥門冬

甘草

生薑各貳分

白茯苓

大棗壹拾箇

右以水伍升煎取貳升温分叁服忌食茶醋等。

凡妊娠惡食者以所思食任意食之必愈。壹方無棗

子有半夏竹茹如陳皮分兩

一香散療妊娠胎氣不安氣不升降飲食不美嘔吐酸水

起坐覺重宜服之

香附子壹兩

藿香葉

甘草各貳錢

右為細末每服貳錢入鹽少許百沸湯點下

近效方療妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹

麥門冬各叁兩

橘皮壹兩

芦根壹握

右細切以水壹大升煮取半升去滓分兩服食前壹服

壹方無麥門冬用小麥叁合。幹熱四肢煩熱者加地

骨皮醫人夏侯伍方

李茂翁先生云若左脉弱而嘔服諸藥不止者當服理血

歸原藥則愈經云無陰則嘔是也

治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無效者
此藥理血歸原則愈

人參

甘草

川芎

當歸

京芍藥

丁香各半兩 白茯苓

白朮

陳皮各精

苦梗炒

枳殼各壹分

半夏

炮洗茶洗

右以咀每服參錢重生薑伍片水壹枚煎

安胎散 治懷胎三月四月至九月月日惡阻病者心中憤
悶頭重目眩四肢沉重懈怠不欲執作惡聞食氣欲嘔或
酸多睡小起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腰腹疼痛
或時下血及妊娠一切疾病並皆治之

甘草

茯苓

當歸

熟地黃

川芎

白朮

黃耆

白芍藥

半夏

炮洗

阿膠

切粉炒

地榆

各等分

右以咀每服參錢水壹半生薑肆片煎至捌分去滓温
服無時候。一方無半夏地榆有人參桑寄生及一方無
白朮黃耆半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白茯苓

妊娠痰逆不思食方論第三

凡八方

夫水飲停積結聚為痰人皆有之少者不能為害多則成
病妨害飲食乃至嘔逆妊娠之病若嘔逆甚者傷胎也原
疾之由皆胃氣不調或風冷乘之冷搏於胃故成斯病也
亦惡阻之壹端

半夏

炮洗

治妊娠惡阻

心中憤悶

虛煩吐逆

頭目昏眩

四肢怠惰

百節煩

痰逆嘔吐

嫌聞食氣

好嗜鹹酸惡寒

汗出羸極黃瘦多卧多起不進飲食妊娠如有痰逆生阻病

千金以半夏茯苓湯以對之此思邈處方之妙也若孕婦
羸弱胎孕不牢則動必成各全在醫者相人強弱以投之
又何慮焉

半夏當用切大生薑公兩茯苓各熟地黃各兩

橘紅北細辛人參芍藥

紫蘇川芎各各苦楝甘草各各半兩

右咬咀每服肆大錢貳錢薑茶片煎至柒分去滓空心
溫服兼服茯苓圓

局方與崔氏無紫蘇細辛有旋覆花壹兩有寒熱煩渴
口瘡去橘皮細辛加前胡知母各叁兩腹冷下痢者去
地黃加炒桂心貳兩胃出虛熱大便秘小便赤澀加大
黃參兩去地黃加黃芩壹兩然半夏雖能動胎若炒過

則無妨

張氏方治夏茯苓湯

半夏洗切陳皮各兩白茯苓貳兩縮砂仁壹兩

甘草肆兩

右咬咀每服肆錢水貳瓊薑拾片棗壹箇烏梅半箇煎
至柒分食前溫服

茯苓圓治妊娠阻病心中煩悶頭目暈重憎聞食氣吐逆

吐痰煩悶顛倒四肢重弱不自勝持服之即効要先服半
夏茯苓湯兩劑後服此藥

赤茯苓人參桂心乾薑

半夏洗切橘紅各壹兩白朮葛根

甘草枳殼各各貳兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大米飲吞下伍拾圓日
參服。一方有麥門冬忌海藻菘菜羊肉錫糖桃李雀
肉酢等。肘後只五味云。妊娠忌桂土金同。

赤茯苓

前胡

白朮

紫蘇葉各壹

半夏

麥門冬

人參

大腹皮各半

右為粗末每服肆錢水壹瓊薑伍片煎至柒分去滓温
服壹方無大腹皮人參有大腹子攪擲

療妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生薑根各分橘紅肆分

生薑肆分

檳榔貳分

右切以水貳瓊薑取柒合空心熱服

療妊娠心膈氣滯嘔吐不下飲食心神虛煩四肢少力

枇杷葉

半夏

麥門冬

人參

甘草半兩

川子肉

藿香各壹兩

赤茯苓

枳殼

陳皮各叁分

右以咀每服叁錢水壹瓊薑叁片煎至柒分去

滓温服壹方無大腹可子

集驗療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹

橘皮各叁兩

生薑

茯苓各肆兩

半夏伍兩

右細切以水陸升煮取貳升半去滓分參服不差煩服

忌羊肉錫酢等物

古今錄驗療妊娠不欲食或吐春月所宜服

甘草

柴胡各貳兩麻黃壹兩

食茱萸半兩

右細切以水陸升煮取參升通寒温服壹升日叁療食
噫醋除熱下氣所宜多與上同但秋夏去茱萸加枸杞
壹升六月加小麥壹升石膏參兩秋去石膏加甘草壹
兩九月去麻黃加乾薑壹兩十月加川芎參分忌海藻
菘菜

胎動不安方論第四

凡載拾方

凡婦人妊娠胎動不以日月多少而常墮胎者有雖有胎
而月信雖不多常來而胎不損者產寶方云婦人妊娠常
胎動不安者由衝任經虛胞門子戶受胎不實故也并有
飲酒房室過度有所損動不安者巢氏云婦人衝任貳經
受風寒而有胎故不以日月多寡因誤有擊觸而胎動者
有喜怒不常氣字不舒傷於心肝觸動血脉衝任經虛乃
致胞門不固或因登高上廁風攻陰戶入於子宮如此皆
令胎動不安也曾有以妊娠月信不絕而胎不損問產科
能宗古者答曰婦人血盛氣衰其人必肥既娠之後月信
常來而胎不動若據晚進觀之便以為漏胎若作漏胎治
之則胎必墮若不作漏胎治則其胎未必墮今推宗古之
言誠有旨也巢氏云婦人經閉不利別無所苦者是謂有
子以其經血蓄之以養胎擁之為乳汁也有子之後蓄以
養胎矣豈可復能散動邪所以然者有娠而月信每至是
亦未必因血盛也若謂婦人榮經有風則經血喜動以其
風勝則可也既榮經為風所勝則所來者非養胎之血以
此辨之若作漏胎治之必服保養補胎之藥且胎不損強

以藥滋之乃所謂實實虛虛也其胎終墮宜矣若醫者知
榮經有風之理專以壹藥治風經信可止或不服藥胎亦
無恙然而有胎本不固而因房室不節先漏而後墮者須
作漏胎治之此又不可不審也亦有婦人年方壯歲聽醫
官言其藥可服致補煖而子使胞門子戶為藥所操搏陳
病源并產寶方並謂之胞使新血不滋舊血不下設或有
子不以遲晚則必墮中年之後氣宇漸衰必有崩中帶下
之疾或月信愆期漸覺黃瘦腰背不伸五煩熱五勞七
傷之疾從此而生不獨胞門子戶風寒而生也故千金翼
方有朴消盪胞湯正為此疾今之醫者未見有用亦未見
有知之者又論妊娠胎動其由有貳壹因母病而胎動但
療母疾其胎自安若胎不堅固自動其母疾唯當安胎其
母自愈壹因勞役氣力或觸冒冷熱或飲食不適或居處
失宜輕者轉動不安重者便致傷墮當以母形色察之母
面赤舌青者兒死母活唇口青兩邊沫出者子母俱死面
青舌赤口中沫出者母死子活也

集驗方療妊娠貳壹月上至捌玖月胎動不安腹痛已有
所見方

艾葉

阿膠

意歸

川芎各壹兩

甘草壹兩

右細切以水捌升煮取叁升去滓內膠令烊分叁服日
叁千金文仲備急同

刪繁療婦人懷妊胎動不安葱豉安胎方

香豉壹升熬葱白壹升

阿膠貳兩炙

先以水參升黃蔥豉取壹升去滓入膠再煎令烊服壹
日壹夜可服參肆劑經心錄同

鈎藤湯治妊娠捌玖月胎動不安心腹疔痛面目青冷汗
出氣欲絕此由勞動用力傷胎宮宜急治之

鈎藤 當歸 茯神 人參各壹兩

苦梗 壹兩半 桑寄生 半兩

右為粗末每服五大錢水貳盞煎至壹瓊去滓溫服無
時候忌猪肉菘菜若煩熱加石膏貳兩半臨產月加桂
心壹兩

始妊娠胎動不安護胎法

鯉魚鱗片 粳米 壹升 葱壹盞 豉 壹

右作臠食之每月壹度

治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶 產寶同

當歸 桑寄生 各壹兩 川芎 叁分 豉 捌合

阿膠 貳分 葱拾肆莖

右以水貳升煮取捌合下膠空腹溫分貳服壹方無豉
用銀器煎集驗無寄生豉有續斷 叁分 銀多少先煎後
入藥

黃耆湯治胎動不安腹痛下黃汁

糯米 壹合 黃耆 川芎 各壹兩

右細剉水壹大瓊煎至壹瓊參分溫服

產寶方治胎動

熟艾 阿膠 各貳兩 葱白 壹升

右以水肆升煮取壹升半分為叁服

安胎鐵胃散

白藥子 壹兩 白芷 半兩

右為細末每服貳錢煎紫蘇湯調下或胎熱心煩悶入
炒糖少許煎

銀芎酒 治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍方

芎根 貳兩 剉銀 伍兩 清酒 壹壺

右以水壹大瓊煎至壹大瓊去滓分溫貳服

治胎動方 養生必用方救急療胎動去血腫腹痛

阿膠 川芎 當歸 青竹茹 各貳

右以水拾瓊內銀壹斤煮至伍瓊去銀入上件藥參味

煮至貳瓊半去滓入膠再煎膠烊分溫參服空心自早

至暮盡未効再作

治妊娠冷熱腹內不調致胎不安產後方

艾葉 貳兩 當歸 乾薑 各參兩 川芎 肆兩

右以水肆升煮取貳升分溫肆服不過兩劑

寄生湯 治胎氣常不安治伍箇月已後胎不安

桑寄生 洗剉 秦艽 阿膠 各半兩 糯米 半兩 作粉

右以新汲水參升先下寄生秦艽貳味煮至貳升去滓

次入阿膠糯米再煮約有壹升止分作參服空心食前

日午服之忌酒醋參伍日妊娠胎氣至伍月已後常不

安者服之必効頃見娠婦好飲酒食鹹酸伍卒胎必動

可不知之

治胎動不安

好銀 煮取水 右着葱白作羹食之佳

又方

川芎貳兩

葱白壹升

右以水柒升煮取貳升半分溫參服

順氣飲 產前服之安胎

紫蘇葉

木香均

人參

草豆蔻

茯苓各壹兩 甘草半兩

大腹子

積兩如麻 弱者不用

右以咀每服叁錢水壹瓊芋根叁寸糯米少許煎至柒

分去滓溫服

療姙娠後不轉動方

阿膠炙壹兩 桑寄生半兩

右為末以酒壹升煮伍沸下生雞卵壹枚投酒中分溫

貳服空心食前壹服小品方無寄生有艾葉只用水煎

文仲 **安胎湯** 療血流下方

桑寄生

白朮各伍分

茯苓肆分

甘草拾分

右切以水伍升煮取貳升半分參服若人壯者可加芍

藥捌分足水貳升若胎不安腹痛端然有所見加乾薑

肆分即安忌海藻松菜酢物桃李雀肉等崔氏小品經

心同

治胎動不安 **秦元湯** 出王氏指迷方

秦元

阿膠炒

艾葉

右等分為粗末每服伍錢水貳瓊糯米百粒煎至壹瓊

去滓溫服

小品療姙娠重下痛引腰背安胎止痛湯方

當歸

阿膠炙

乾地黄

黃連

芍藥各膏兩雞子音收 秫米音升

右柒味以水柒升攪雞子令相得煮秫米令如蟹目沸去滓內諸藥莫取參升分肆服忌蕪荑經心錄同

又膠以湯療損動母去血腹痛方

膠音片炙 艾葉音莒

右貳味以水伍升煮取貳升半分參服經心錄同

妊娠漏胎下血方論第五

夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此由衝任脉虛不能約制手太陽少陰之經血故也衝任之脉為經絡之海起於胞內手太陽小腸脉也手少陰心脉也是貳經為表裏上為乳汁下為月水有娠之人經水所以斷者壅之養胎穡之以為乳汁也衝任氣虛則胞內泄不能制其經血故月水時下亦名胞漏血盡則人斃矣又有因勞役喜怒哀樂不節飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母有宿疾子藏為風冷所乘氣血失度使胎不安故令下血也

妊娠卒然下血方論第六 凡十二方

夫妊娠卒然有損動或冷熱不調和致傷於胎故卒痛而下血若不止之則墮胎也

療妊娠參肆箇月腹痛時時下血

續斷剖分 艾葉 當歸 乾地黃陸兩

竹茹 阿膠 雞蘇各肆錢

右以水壹升煎取陸合去滓空心再服隔日更服

療妊娠陸柒箇月忽胎動下血腹痛不可忍

川芎捌分 桑寄生肆分 當歸拾貳分

右以水壹升煎取捌合下清酒半升再煎取捌合分叁服如人行伍陸里再服

廣濟主安胎胎病漏血腹痛

當歸

川芎

阿膠

人參

大棗

右切以水叁升酒肆升煮取貳升半分叁服伍日壹劑頻服叁肆劑無所忌

又療妊娠胎動腰痛及下血安胎

當歸

川芎

苧根

艾葉

葱白

右細切以水壹斗煮取伍升空心熱服正方用銀煮水煎藥又見腰痛門

療妊娠忽下血胎上衝心手足逆冷用生艾汁貳錢入阿

膠生蜜各貳錢煎至壹錢半稍熱服如無生艾濃煎熟艾汁

治妊娠忽然下血腰痛不可忍男六德續錄

鹿角

當歸

只作壹服以水叁錢煎至壹半空心食前頓服不過貳服即安

又方

阿膠壹兩炒艾葉灰半兩

右為細末空心糯米飲調下貳錢

漏胎下血不止胞乾即死宜急治之

生地黃汁

酒

右同煎叁伍沸分溫叁服以止為度

崔氏療妊娠下血不止血盡子死

生乾地黃為末酒服方寸七日參夜壹即愈不過二服

又療妊娠漏胞方青方云及

生乾地黃伍兩

乾薑貳兩半

右為末酒服方寸七日再集驗文仲經心同

療妊娠無故卒然下血不絕方

阿膠叁兩

用清酒壹升半煎取壹升頓服

又方治妊娠卒然下血兼治胎衣不下方

右以鐵錘燒令通赤內酒中如此者叁次候溫飲壹瓊

妊娠驚胎及僵仆方論第七

凡七方

夫妊娠驚胎者是懷妊月將滿其胎神識已具或將產之時從高墜下傷損胞絡致血下胎動遂上搶心曾氣絕不

其母面赤舌青口無沫出者兒死母活唇口俱青沫出

者子母俱死面青舌青沫出母死子活若下血不止胞燥

胎令子死矣

崔氏神妙佛手散

壹名考

治婦人妊娠伍柒月因事

築磕着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下本出

文仲徐王効神驗胎動方云治血上衝心腹滿悶者如湯

沃雪救急經心同出外臺又治產前產後躰熱敗血腹痛

當歸陸兩

川芎肆兩

蘇氏方等分

右為粗末每服叁錢水壹大瓊煎令泣泣欲乾投酒壹

大瓊止煎壹沸去滓溫服口噤灌之如人行五里再服

不過叁貳服便生壹方云此藥治傷胎去血多崩中去

血多金瘡去血多拔牙去血多昏暈欲倒者以水煎服
或先以漏血腹內疼痛加芍藥官桂減半隨手效詳見通
治妊娠因墜倒損胎不轉動腹內疼痛腰重及子死腹中
不出須臾三服立下

川芎壹兩為細末以熱酒調服方寸七日參肆服

治妊娠因失所動困絕千金方亦治子煩

右取竹瀝飲壹升立愈

治妊娠從高墜下腹痛下血煩悶

生地黃 益母草略青 當歸 黃耆各半兩

右以水煎每服肆錢水壹盞薑肆片煎至陸分去滓無時候

集驗療妊娠貳參月上至柒捌月頓仆失踞胎動不安傷

損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上捨心短氣下血不止方

乾地黃 當歸 艾葉各貳兩 阿膠

川芎各參兩

右以水柒升煮取貳升半分作參服腹痛甚加杜仲五

加皮各參兩 壹方無地黃有甘草壹方無地黃却用

生薑自然汁壹匙地黃汁半合馬通半合煎成藥去滓

入此再煎參沸溫服壹方有人參白茯苓水煎

竹茹酒治妊娠誤有失墜損染胎損疼痛

青竹茹貳合好酒壹升煮參伍沸分作參服即安

療妊娠或因僵仆胎動不安臍腹疔痛秦心湯

出產科 方見前

療妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍兼治崩血甚效

兼治子冒又名子癩

縮砂不以和皮炒令黑色壹方用仁熨斗內著炒為細末熱酒調下貳錢不飲酒者以米飲調下皆可覺腹中熱則胎已安矣此方極效溫隱居云神效不可盡述僕用有效

妊娠胎上逼心方論第八

凡七方

夫妊娠將養得所則血氣調和故兒在胎則安當產亦易若節適失宜則血氣乖理兒在胎則亟動至產育亦難而子上逼於心者由產難用氣力胎動氣逆胎上衝逼於心胎上逼於心則悶絕胎下乃甦甚者至死也
蘇飲治妊娠氣胎不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下
名七寶散無弓

當歸 參分

甘草 壹分

大腹皮

人參

川芎

陳橘皮

白芍藥

紫蘇 壹兩

右咬咀每服半兩水壹瓊半薑肆片葱白柒寸煎至柒分去滓空心溫服曾有青婦人累日產不下服此藥壹點則氣結而不行然非順氣則不順也素問云恐則氣下蓋恐則氣結却則不行然非順氣則不順也素問云恐則氣下

此數思有驗不拾服胎便近及婦人陸還則下焦胎氣乃
草麻子去皮研加麝香調貼臍中以下之命在重
召僕診視兩尺脈加麝香調貼臍中以下之命在重
此何證治之曰死胎也何以知之若胎死則有
門下作何證治之曰死胎也何以知之若胎死則有
慶夫面赤舌青者死胎也何以知之若胎死則有
活唇口俱青者死胎也何以知之若胎死則有
不青其子未死其母死胎也何以知之若胎死則有
子懸服自紫蘇飲子治死胎也何以知之若胎死則有
藥拾服而胎近下矣

當歸湯治妊娠胎動湯心悶絕煩燥口乾橫生倒產上衝

下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保女散壹方無草
有川芎厚朴產寶方有川芎

當歸 人參各兩 阿膠 壹兩炒 甘草 貳兩

連根葱白 壹握

右細剉水貳升煎肆味至升半去滓下葱再煎參合溫
服壹劑分為貳次服

治胎上逼心熱痛下血

麴半斤搗碎和熟水絞取汁參中璣無時分溫伍服○
壹方治胎動腹痛連腰用麥麴新汲水調下壹方用神
麴大同小異

治胎上逼心煩悶方又治妊娠陸柒月已後胎動困篤

葱白貳柒並濃煮汁飲之即安若胎已死服之即出未

死即安未効再服

治胎不順胎上逼心方○以烏犬血少少飲之當下

治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白木 伍兩 黃芩 貳兩 芍藥 肆兩

右水陸升煮取貳升半分為叁服綠胎有水致痛兼易產
文仲葛氏療妊娠卒胎上迫心痛方○取弩弦急帶之立愈

九 九 凡壹方 九 九 凡壹方 九 九 凡壹方

療妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛

粳米 伍升 黃耆 陸兩

右以水柒升煎取貳升分為肆服

妊娠誤服毒藥傷動胎氣方第十 凡叁方

奪命丹專治婦人小產下血至多子死腹中其人增寒手
指厚爪甲青白面色黃黑或胎上捨心則悶絕欲死令
汗自出喘滿不食或食毒物或誤服草藥傷動胎氣下血
不止胎尚未損服之可安已死服之可下此方的係異人
傳授至妙

牡丹皮 白茯苓 桂心 桃仁製
赤芍藥

右等分爲細末以蜜圓如彈子大每服壹員細嚼淡醋
湯送下速進兩圓至胎腐爛腹中危甚者立可取出
治婦人服草藥墮孕腹痛方男六德補遺

白扁豆生去皮爲細末米飲調服方寸匕若修製不及
濃煎服亦可亦解男子女人誤中砒毒亦治婦人赤白
帶下要炒黃爲末米飲調下

回春散治妊娠不問月數深淺或因煩仆或因毒藥胎動
不安腰痛腹滿或有所下或胎上捨心短氣力方

熟地黃貳兩 白芍藥 艾葉 當歸
甘草 阿膠 黃耆壹兩 香附兩 壹方有川芎

右咬咀每服半兩水壹大瓊薑參片棗壹箇煎至柒分
去滓溫服無時

妊娠心痛方論第十 凡七方

夫妊娠心痛者多是風邪痰飲乘於心之經絡邪氣搏於
正氣交結而痛也若傷心正經而痛者爲真心痛心爲帝
主之官統領諸藏不可受邪邪若傷之朝發夕死夕發朝
死若傷心支別絡而痛者則乍安乍甚休作有時也妊娠

之人或有病而痛不已者氣乘胞絡傷損子藏也則令胎動凡胎轉移則多不安不安而動於血者則血下也治妊娠卒心痛氣欲絕方出產要

川芎

常歸

茯苓

厚朴各分

右水陸升煎取貳升分為貳服忌如前

雷公炮炙論云心痛欲死急覓延胡

白木湯治妊娠卒心痛欲死不可忍者出古今錄要

白木參兩

赤芍藥貳兩黃芩壹兩半

右切以水陸升煮取貳升半分參服半日令盡微下水令易生忌桃李雀肉

千金療妊娠心痛

青竹茹壹升

羊脂捌兩

白蜜參兩

右參味合煎每服棗核大參枝食前頓服日參服

又方

青竹茹壹升酒貳升煮取壹升半去滓分溫頓服

又方

破雞子壹枚調酒服之

又方

大麻子參升研水捌升煮取伍升分為伍服

又方

橘皮參兩

豆豉貳兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大溫水下貳柒圓無時服四方出外臺秘要

夫妊娠心腹痛者或由宿有冷疹或新觸風寒皆由藏虛而致發動也邪正相擊而并於藏隨氣上下衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛也妊娠而痛者邪正氣交攻於內若不時差者其痛衝擊胞絡必致動胎甚則傷墮也又云妊娠心腹疼痛多是風寒濕冷痰飲與藏氣相擊故令腹痛攻傷不已則致胎動也

當歸芍藥散

治妊娠腹中絞痛心下急痛及產後血暈

內虛氣之崩中久痢常服通暢血脉不生癰瘡消痰養胃明目益津

白芍藥半斤當歸

茯苓

白朮各貳兩

澤瀉

川芎各肆兩方

右為細末每服貳錢食前溫酒調服 元和紀用經云

本六氣經緯元能祛風補勞養真陽退邪熱緩中安和神志潤澤容色散邪寒瘟瘴時氣安期先生賜季少君久餌之藥後仲景增減為婦人懷妊腹痛方本方用芍藥肆兩澤瀉茯苓川芎各壹兩當歸白朮各貳兩亦可

治妊娠心腹痛不可忍方

鹽壹斤燒令赤右以兩指取壹撮酒調服

療妊娠先患冷氣忽中心腹痛如刀刺

川芎

人參

茯苓

吳茱萸

苦梗

當歸各叁兩厚朴製

芍藥各貳兩

右咬咀以水玖升煎取叁升分叁服氣下即安

療妊娠患腹痛并胎動不安

葱白 切壹升 人參

厚朴

阿膠

川芎 各壹兩 當歸 各兩

右咬咀以水柒升煎取叁升分作叁服。一方有甘草

無厚朴川芎

香大鬱治妊娠伍箇月已後常胃腹間氣刺滿痛或腸鳴以至嘔逆減食此由喜怒憂慮過度飲食失節之所致。蔡元度龍人有子夫人怒欲逐之遂病醫官王師復處此方參服而愈後用果驗

廣中莪茂 壹兩

丁香 半兩

粉草 壹分

右為細末空心鹽湯點服壹大錢覺胃中如物按下之狀

白芍藥治妊娠心腹常痛喫食減少四肢不和全不入食

草菓仁 壹兩

陳橘皮

乾地黃

白木 各壹兩 川芎 叁分

當歸 壹分

桂心

乾薑 木香 各半兩

右為細末每服肆錢水壹瓊壹枝煎至陸分熱服

阿膠散治妊娠胎動腹中疔痛不忠飲食

白茯苓

白木

川芎

阿膠 各叁分

當歸 炒

陳皮 各壹兩 甘草 壹分

右咬咀每服叁錢水壹瓊壹叁斤薑壹箇煎至柒分去

滓温服

治妊娠肆伍月忽心腹絞痛

大紅棗 拾肆枚

燒存性為末以葦子小便調下

治妊娠胎動欲落腹痛不可忍

上等銀壹斤 茅根 壹斤

右以水玖升煮銀取貳升入清酒壹升同煎茅根取貳升分爲叁服立安

古今錄驗療妊娠腹內冷痛忽胎動

薤白壹升 當歸切肆兩

右以水伍升煮取貳升作叁服亦將小便服將去壹枚頃出

千金療妊娠腹中痛方

生地黄叁斤搗取汁酒壹升合煎減半頓服愈

妊娠中惡方論第十三 凡叁方

夫妊娠人忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡言邪惡之氣中胎傷於人也所以然者血氣自養而爲精神之主若氣血不和則精神衰弱故邪毒之氣得以中之妊娠之病亦致損胎也

當歸散 治妊娠中惡心腹疼痛

當歸 丁香 川芎各叁兩 青橘皮貳兩

吳茱萸半兩 解兩 去樓湯 炒黑

右爲細末無時溫酒調壹錢

又方

生乾地黄壹兩 枳殼 木香各叁分

右爲細末每服壹錢酒調下

又方

苦梗壹兩 薑半兩 煎服

妊娠腰腹及背痛方論第十四 凡十方

論曰腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷乘之則腰痛

冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其痛不止多
動胎氣婦人腎以擊胞姙娠而腰痛甚者則胎墮也
療姙娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

當歸 各二兩 阿膠 甘草 各二兩 葱白 壹升

右細剉以水柒升煮取叁升去滓分溫伍服

紫酒治姙娠腰痛如折

大黑豆貳合炒令香熟以酒壹大瓊煮取柒分去豆空
心頓服

通氣散治姙娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不以多少瓦上炒令香熟為末嚼核桃肉半箇
空心溫酒調下貳錢

療姙娠腰背痛反覆不得

鹿角 長一尺許以酒令赤酒中碎再煎鹿角為末服亦可

療姙娠腰痛不可忍或連膝痛先服此散

杜仲 肆兩 五加皮 阿膠 炙 防風

金毛狗脊 川芎 北細辛 白芍藥

革薺 各叁兩 杏仁 搗拾枚去

右以咀以水玖升煮取貳升去滓下膠作叁服

療姙娠叁貳月腰痛不可忍者次服此圓

續斷 杜仲 各拾分 芎藭 獨活 各叁兩

狗脊 五加皮 革薺 芍藥

薯蕷 阿子肉 各捌兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下肆拾圓日叁服
療觸動胎以致腰痛甚痛

杜仲 五加皮 當歸 芍藥 人參

川芎 草薢 各壹兩

右細剉以水柒升煮取貳升半分溫參服

療妊娠參貳月及柒捌月胎動不安或腰肚痛及血下

川芎 當歸 各肆兩 艾葉 阿膠 各貳兩

甘草 壹兩

右細剉以水伍升煮取貳升去滓分溫參服

大地黃圓 治產前後腰腹疼壹切血疼信效方治血氣虛

四肢不舉骨髓熱疼

熟地黃 貳兩 烏梅肉 當歸 各壹兩

右為細末煉蜜圓如彈子大每服壹圓白湯嚼下空心

廣濟療妊娠胎動腰痛及下血安胎方見前論中

小品芋根湯 療損動胎腰腹痛去血胎動向下方

生乾地黃 芋根 各貳兩 當歸 芍藥

阿膠 甘草 各壹兩

右細切以水陸升煮取貳升去滓內膠煎烺分溫參服

忌海藻蕪菜

救急療胎動去血腰腹痛方見前第四論中

妊娠小腹痛方論第十五 凡壹方

論曰妊娠小腹痛者由胞絡宿有風冷而妊娠血不通冷

血相搏故痛甚亦令胎動也

療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸 川芎 各捌分 阿膠 炙 人參 各兩分

艾葉 肆分 大棗 貳拾箇 茯苓 拾分

大全良方卷之

卅三

新編婦人大全良方卷之十三

妊娠數墮胎方論第一

凡五方

夫陽施陰化故得有胎榮衛調和則經養周足故胎得安則能成長若血氣虛損者子臟為風寒所苦則血氣不足故不能養胎所以數墮胎也其妊娠腰疼者喜墮胎也千金療妊娠一箇月數墮胎法灸膝下壹寸柒壯又方

赤小豆為末酒調方寸七日貳服亦治妊娠數月月水尚來

刪繁方療妊娠懷胎數落而不結實或冷或熱百病之源

甘草 黃耆 人參 川芎 白朮 地黃 吳茱萸各等分 壹方

右為末空心溫酒調貳錢忌菘菜桃李雀肉醋物鱸魚鱈魚氣斤 粳米壹升

廣濟療婦人懷妊數傷胎方

右貳味如法作臛少着鹽勿着葱豉醋食之甚良壹月中須冬遍作效安穩無忌集驗文仲備急崔氏延年方同

經心錄察石英王風冷在子宮有子常落或始為婦便

患心痛乃成心疾月水都未曾來服之肥悅令人有子方

紫石英 天門冬去心 五味子各壹兩 烏頭炮 菴朮 烏賊魚骨 雲母燒研 禹餘糧

當歸 川椒如常 桑寄生 石楠葉略壹

澤瀉 杜仲 遠志去心 茯苓

桂心 甘草 石斛 人參

辛夷

柏子仁各一分

右為末煉蜜為圓如梧桐子大溫酒下貳拾圓至參肆

拾圓千金方同

瘵妊娠數墮胎皆因氣血虛損子臟風冷致胎不堅固頻有所傷宜服**卷栢圓**

卷栢

鍾乳粉

鹿角膠少

紫石英飛

陽起石飛

桑螵蛸炒

禹餘糧研

熟地黃略

桂心

川牛膝

桑寄生

北五味

蛇牙子

牡丹皮

杜仲

川芎

當歸酒洗

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服參肆拾圓空心溫酒

吞下

妊娠胎不長養方論第二

尾五方

夫妊娠之人有宿病挾疾而後有娠或有娠時節道乖理致生疾病並令臟腑衰損氣力虛羸今胎不長故須服藥去其疾病充其氣血以扶養胎也

集驗治婦人懷胎不長方

鯉魚長壹尺者去腸肚鱗以水漬沒內鹽及棗葉令熟取汁稍稍飲之當胎所腹上當汗出如牛鼻狀雖有所見胎雖不安者十餘日輒壹作此令胎長大甚平安

古今錄驗療妊娠養胎**良木散**

白木

川芎各肆分

川椒炒出汗 牡蠣煨 貳分

右肆味為細末酒調壹錢七日參夜壹但苦痛加芍藥心下毒痛倍加川芎吐唾不能飲食加細辛壹兩半

大者貳拾枚服之復更以漿水服之若嘔亦以醋漿水服之復不解者小麥汁服之已後其人若渴者大麥粥服之病雖愈盡服之勿置裴伏仲景方只霍肉桃李

療妊娠胎不長宜服安胎和氣思食利四肢**黃耆散**

黃耆 白朮 陳皮 麥門冬

白茯苓 前胡 人參 各三分 川芎

甘草 各半兩

右取咀每服參錢水壹瓊薑叁片棗壹枚煎至柒分去滓溫服

療妊娠胎不長宜服養胎**人參圓**

人參 白茯苓 當歸 柴胡

刺蘊 百子朴 桑寄生 枳殼 各壹分

甘草 半兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服貳拾圓食前溫水吞下

白朮圓調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風冷胎瘦不長

或失於將理傷動胎氣多致墮胎常服益血保護胎臟

白朮 川芎 阿膠 地黃 各壹分

當歸 去尾 牡蠣 川椒 各壹兩 常製

右為末煉蜜為圓如梧子大空心米飲吞叁肆拾圓酒醋湯亦可

妊娠胎動安不得却須下方論第三 凡七方

妊娠得病欲去子方附

夫妊娠羸瘦或挾疾病臟腑虛損氣血枯竭既不能養胎

致胎動而不堅固終不能安者則可下之免害妊婦也
療胎動安不得尚在腹母欲死須以牛膝湯下之

牛膝去油兩水銀壹兩朱砂貳兩

右以水五大瓊煮牛膝可得壹半去滓即以蜜和朱砂

及水銀研如膏每服以牛膝汁壹小瓊調下半匙頓服

治妊娘母因疾病胎不能安可下之當歸

挂心壹兩瓜樓壹兩牛膝壹兩瞿麥各壹兩

當歸壹兩

右改咀每服肆錢水壹瓊煎至柒分空心去滓服

又方

瞿麥壹兩挂心貳兩牛膝貳兩蟹爪壹兩

右為細末空心温酒調壹錢服

又方

牛膝壹兩右細擣以無灰酒壹大瓊煎取七分温貳服

又方

取七月七日法麩肆兩水貳大瓊煎取壹瓊參八分綿瀝

去滓分温叁服立下

小品療妊娘得病須去胎方

麥蘗壹升為末和煮貳升服之即下神効

文仲療妊娘得病欲去胎方

取雞子壹枚以參指撮置雞子中服之立出與阮河

南療產難同千金經心錄同

妊娘墮胎後血下不止方論第四 危九方

夫墮胎後復搶於經脉經脉既虛故下血不止也下血多

者便致煩悶乃至死矣

治妊娘損動下血不止腹痛宜服此方

阿膠壹兩 艾葉半兩

右以水壹大瓊煎至陸分去滓溫服空心

治妊娘損動下血不止

甘草壹兩 阿膠壹兩 雞子壹枚

右細判以水貳大瓊煎甘草壹瓊參分去滓下雞子及

阿膠候膠消攪令停無時分溫參服

廣濟療因損娘下惡血不止龍骨散

龍骨 當歸 地黃各一分 艾葉四分

地榆 阿膠 芍藥 乾薑各六分

蒲黃四分 牛角膠一分

右為細末食前粥飲調下貳錢

治妊娘墮胎下血不盡苦煩滿欲極時發寒熱狂悶方

鹿角屑壹兩 煎

右以水壹大瓊煎取汁陸分分為參服調鹿角

屑壹錢服日參服須臾血下古今錄驗同

千金療落胎下血不止方

右以生地黃汁壹小瓊調代赭末壹錢日參服

治妊娘下血疼痛不止方亦治小便不禁

右以家雞翎燒灰細研以溫酒調下貳錢如人行五里

再服以効為度

千金療妊娘胎墮下血不止方

丹參壹味拾貳兩

右細切以酒伍升煮取叁升分叁服
救急療損娠方

右取朱砂末壹錢七生雞子叁顆取白和朱砂頓服胎
若死即出如未死即安

妊娠日月未足欲產方第五 凡四方

集驗治產難及子煩

和母壹味為細末煉蜜圓如雞頭大溫酒嚼下日叁服
千金程氏小品同 一方圓如梧桐子大鴨飲下二十圓

槐子圓治妊娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子 蒲黃等分

右為末蜜圓如梧子大溫酒下貳拾圓以痛止為度

又方 取蒲黃如棗核大篩過以井花水調服

又方

梁上塵 蠶突煤

右貳味為細末空心酒服方寸匕

斷產方論第六 凡七方

論曰欲斷產者不易之事雖曰天地大德曰生然亦有臨
產艱難或生育不已或不正之屬為尼為娼不欲受孕而
欲斷之者故錄驗方以備所用然其方頗衆然多有用水
銀毒虫水蛭之類孕不復懷難免受病此方平和而有異
驗列具于后

小品方療婦人斷產驗方 千金翼外臺秘要同

故本紙方圓壹尺燒為末酒飲調服終身不復懷孕也
療妊娠欲去之并斷產方

栝樓

桂心各二兩 豉壹升

右參味切以水肆升煮取壹升半分服之

又方 附子貳枚為末以淳苦酒和塗右足去之大良

千金斷產方

油煎水銀壹日方息空心服如棗大壹圓亦斷不損人

廣濟落胎方

栝樓根肆兩 肉桂伍兩 牛膝叁兩 瞿麥壹兩

右切以水柒升煎貳升參合去滓温分叁服服後如人

行五里又進壹服無忌

小品療羸人欲去胎方

粉草

乾薑

人參

川芎

生薑

肉桂

蟹爪

黃芩

右捌味等分細切以水柒升煮取貳升分叁服忌食海藻

葶麥生葱

千金欲去胎

大麴伍升清酒壹斗黃二沸去滓分伍服隔宿勿食且

每服其子如粟令母肥盛無疾苦千金

妊娠咳嗽方論第七

凡八方

夫肺感於寒寒傷於肺則成咳嗽也所以然者肺主氣而

外合皮毛毛竅不密則寒邪乘虛而入故肺受之也五臟

六腑俱受氣於肺以其時感於寒而為嗽也秋則肺受之

冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其諸嗽不已則傳

於腑妊娠病久不已者則傷胎也 療妊娠心兩疼毒雍滯肺氣不順咳嗽頭疼艾花散

款冬花

麻黃

貝母煨

前胡

桑白皮

紫苑各半兩旋覆花

白朮

甘草各壹分石膏壹兩

右咳咀每服肆錢水壹瓊薑參片煎至七分去滓溫服食後

治妊娠肺癰咳嗽喘急不食**桔梗散**

天門冬青燉

桑白皮

苦梗

紫蘇各半兩

赤茯苓壹兩

麻黃去節

貝母

人參

甘草各半兩

右咳咀每服肆錢水壹瓊薑參片煎至七分去滓不拘時候服

治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急**馬兜鈴散**

馬兜鈴

苦梗

人參

甘草

貝母各半兩

陳皮去白

大腹皮

紫蘇

桑白皮各壹兩

五味子牝

右咳咀每服肆錢水壹瓊薑參片煎至七分去滓無時溫服

麻黃散治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃

陳皮

前胡各壹兩

半夏

人參

白朮

枳殼

貝母

甘草各半兩

右咳咀每服肆錢葱白五寸薑半分棗二箇水壹盞煎至六分去滓溫服

百病散治妊娠咳嗽心胃不利煩悶不食

川百合

紫苑

麥門冬

苦梗

桑白皮各兩甘草半兩

右咬咀每服肆錢水壹瓊竹茹壹分煎至陸分去滓入蜜半匙更煎二兩沸不拘時溫服

紫苑湯治妊娠咳嗽不止胎不安此方出產科

甘草

杏仁

紫苑壹兩

桑白皮壹分

苦梗參心

天門冬壹兩

右咬咀每服叁錢水壹瓊竹茹壹兩煎至柒分去滓入蜜半匙再煎貳沸溫服

紫苑傷寒咳喘方

以車紅燒赤投酒中候冷飲之良

療妊娠傷寒凝多咳嗽

知母

杏仁

天門冬

桑白皮等分

右咬咀每服叁錢水壹瓊煎至柒分去滓服

妊娠喘急不止宜服高方華蓋散穩重而有効

凡二方

論曰夫妊娠吐血者皆由臟腑所傷為憂思驚怒皆傷臟腑氣逆吐血吐血而心悶昏滿未欲止心悶甚者死妊娠

病此多墮胎也。高方必勝散有効

治吐血不止

馬勃用生布擦為末濃米飲調下馬勃生云牛溲馬勃

諸病用之良也

治鼻衄以白茅花濃煎汁服可第七卷吐血方中選

妊娠子煩方論第九

凡十方

論曰妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六月受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多有煩悶名曰子煩也產寶云夫妊娠而子煩者是肺臟虛而熱乘於心則令心煩也傳感積飲在心胃之間或衝於心亦令煩也若熱而煩者但熱而已若有痰飲而煩者嘔吐涎沫惡聞食氣煩躁不安也大抵妊娠之人既停痰積飲又虛熱相搏氣鬱不舒或煩躁或嘔吐涎沫劇則胎動不安均謂之子煩也

前藥湯治子煩

防風

黃芩

麥門冬

白茯苓

右取咀每服肆錢水壹瓊竹葉數片煎至七八分去滓溫服忌酸物 外臺祕要有竹瀝參合無竹葉名竹瀝湯

又方 時時飲竹瀝隨多少

療妊婦煩燥或胎不安竹瀝湯

淡青竹刮如壹兩

右以水壹大升煮取肆合徐徐服盡為度

胎前冬散治妊婦心煩憤悶虛躁吐逆惡聞食氣頭眩四肢沉重百節疼痛多臥少起

麥門冬

子芩

赤茯苓

兩

柴胡

赤芍藥

陳皮

人參

苦梗

桑寄生

甘草

旋覆花

兩

生地黃

貳兩

右為粗末每服肆錢水壹瓊薑半人分煎至陸分去滓無時溫服

又方

麥門冬

芋根各兩黃芩

茯神各壹兩

甘草各壹分犀角骨半兩

右咬咀每服肆錢水壹錢生地黃壹分淡竹葉貳錢片煎至陸分去滓溫服

柴胡散

治妊娠心煩頭目昏重心腎煩悶不思飲食或嘔吐

柴胡壹兩

赤茯苓

麥門冬

批把葉去毛

人參

橘紅

甘草各兩

右咬咀每服肆錢水壹錢薑參片煎至柒分去滓溫服

人參散

治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩躁壅熱口舌

乾渴

人參

麥門冬

赤茯苓

地骨皮

家乾葛

黃芩

犀角骨洛經

甘草半兩

右咬咀每服參錢水壹錢煎至陸分去滓溫服

治妊娠子煩口乾不得卧

黃連去鬚

右為細末每服壹錢粥飲調下酒浸黃連圓亦妙

治妊娠心煩熱不止

葱白壹握

豉貳合

右以水或大瓊煎取壹瓊半去滓溫分參服

曹母圓

治妊娠因服藥致胎氣不安有似虛煩不得卧者

巢氏謂之子煩也

知母言兩洗焙

右為細末以棗肉為圓如彈子大每服壹圓細嚼煎入

參湯送下。○次見醫者不識此證作虛煩治之損動胎氣宜矣有識者亦見有藥也產科鄭宗文得於陳藏器本草拾遺中也用之良驗方出產科

妊娠煩躁口乾方論第十 凡四方

夫足太陰脾之經也其氣通於口手少陰心之經也其氣通於舌若妊娠之人臟腑氣虛榮衛不理陰陽隔絕熱氣乘於心脾津液枯少故令心煩而口乾也 愚考此證與子煩大同小異其方亦可就子煩中通用一母圓亦妙

知母散治妊娠煩躁心神煩躁口乾渴逆

- 川芥麻 黃芩 人參 麥門冬
- 施子仁 柴胡 茯苓 瓜蒌根
- 犀角屑 各一分 知母 甘草 各半兩

右咬咀每服肆錢水壹錢煎至陸分去滓溫服

知母散治妊娠煩躁悶亂口乾及胎臟熱

- 知母 麥門冬 甘草 各半兩 黃耆
- 子芩 赤茯苓 各一分

右咬咀每服肆錢水壹錢煎至柒分去滓入竹瀝壹合

更煎貳沸溫服

葛根散治婦人妊娠數月曾由煩躁唇口乾渴四肢壯熱

- 葛根 不翻 黃芩 人參 姜薤
- 黃耆 麥門冬 甘草 等分

右每服肆錢水壹錢竹茹壹塊如錢大煎至七分去滓

溫服無時

參黃耆散治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參

黃耆

家葛根

秦艽

麥門冬

各壹兩

知母

參二分

甘草

半兩

赤茯苓

壹兩

右以咀每服肆錢水壹瓊薑參片淡竹葉貳柒片煎至陸分去滓溫服

新編婦人大全良方卷之三

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

