

太平惠民和劑局方

五

太平惠民和剂局方卷十

治小兒諸疾

外有治療諸方互見各類

四肢虛弱治小兒諸風癇癪，潮發癰癧，口眼相引，項背強直，牙關緊急，目睛上視，及諸病久虛變生虛風，多睡昏困，荏苒不解，速宜服之。仙氏曰此古治癇癪妙方也。不得病其用草兒難當歸酒浸切，烏犀，鈎。

白朮

油浸丁宿微炒

人參

去皮姜

乾姜

炮

枳殼

去築，炒

丁香

不見火宿

厚朴

去皮姜

桑本

去土

木香

不見火

茯苓

去皮

敗龜

酒醋塗炙黃

荳荊子

去白

桑螵蛸

微炒

何首烏

泔浸乙宿

燒過切碎

白芷

去根節

麝香

別研

羌活

去根戶

羚羊角

鈎

半夏

湯洗茱萸水姜汁三宿培乾炒黃

川烏頭

燒令通紅，醋少許入坑以鹽蓋，新土圍食慎

防風

去芦

白附子

去皮骨微炮

川烏頭

燒令熟，通紅，醋少許入坑以鹽蓋，新土圍食慎

檀榔

去皮去土

阿膠

去穰微炒

槐膠

燒令熟，通紅，醋少許入坑以鹽蓋，新土圍食慎

沉香

不見火

乾蝎

微炙

獨活

去苗

天南星

湯洗生姜自然汁

細辛

去苗細研

陳皮

去穰微炒

白花蛇

酒浸乙宿炙令熟

川烏頭

燒令熟，通紅，醋少許入坑以鹽蓋，新土圍食慎

藿香

葉去土

阿膠

去穰微炒

單辭

微炙

肉桂

去龜皮

蟬殼

去土微炒

川芎

各半兩

烏鵲

各半兩，足去膩粉

附子

皮將別研

狐肝

至具臘月，采取同烏鵲乙个，入新龕內，以瓦盆蓋頭

硫黃

研細用鑿盞盛，慢火養成汁，入水銀急炒如青泥成砂，再研半兩。

金精

貳拾片爲衣

右如法修事搗研令細，煉白蜜合和入酥，再搗參伍，杵下圓如梧桐子大，每壹歲兒壹圓，溫薄荷自然汁化下，不計時候。

昇元丸

治小兒急慢驚風，天吊撮口，脚發搐搦，如癇壯熱，唇塞不省。

青黛研

蟾酥乾者酒浸乙宿

乾蝎金者蜜炒

麝香研

白附子半分

天南星木之分

右件細研令勻以粟米粥和圓如菉豆大別以青黛爲衣每服乙圓荆芥薄荷湯化下後困睡無疑但有患者先化半圓滴入鼻中嚏噴者必差一本不用天南星

八珍湯治小兒驚風壯熱精神昏憤嘔吐痰涎驚悸恍惚或發瘺癰目睛上視

甘草炒

天麻去戶

朱砂研飛

天南星

牛膽製各伍分

牛黃研

膩粉研

雄黃飛各乙

天漿子

微炒各伍分

銀箔朱衣

右爲細末入研藥勻煉蜜爲圓如豌豆大以銀箔爲衣每服壹歲児服壹圓薄荷湯化下痰證未退可再服之更量児大小加減亦食後服

太乙散治小兒驚風壯熱涎盛發瘻手足搐搦目睛上視

及風壅齧心膈滿口吐痰涎大便祕滯

黑鉛研

凍恰漏劑參兩與水銀結沙子分爲小塊

水銀結沙子

鐵粉各三兩

甘草

洞金盞花一兩

天南星炮爲末

朱砂飛研

膩粉研

二兩

右同研勻以麪糊爲圓如麻子大每壹歲児服壹圓用薄荷蜜湯下微利爲度未利再服乳食後

搐搦目睛上視項背強硬牙關緊急

使君子炒爲末

青黛細研

麝香細研

膩粉研

各壹分

胡黃連爲末

乙分

寒食麪染外

半

天漿子爲末

七个炒

右合研勻以白麪糊爲圓如小豆大每服乙圓煎金銀薄荷湯化下伍歲已上可服貳圓更量大小虛實加減不計時症治大人小兒風壅痰實咽喉不利口乾煩渴睡卧不安及中暑頭痛躁渴不解

麝香

研末两半

朱砂

研末乙两

牙硝

枯研乙两

甘草

炒熟末卷三合伍两

右合研勻煉蜜搜和每壹兩貳錢作拾圓大人溫生姜水化下壹丸如治中暑入生龍腦少許同研細新水化下小兒壹圓分肆服更量大小加減又治小兒腑臟積熱心神不寧夜卧狂叫口舌生瘡用薄荷自然汁化下並食後服

靈丹治一切驚風天吊目睛上視手足搐搦狀候多端用藥壹圓用溫水化滴鼻中令噴嚏叁伍次更用薄荷湯下貳圓即愈如父患五疳腹脹頭大四肢瘦小好喫泥土可思亦食愛咬指甲時擣眉毛頭髮稀疎肚上青筋及父患鴟病並用米飲下貳圓如父患疳蛔咬心發歇疼痛並以苦練子煎湯下貳圓如鼻下赤爛口齒疳蟲并口瘡等用児孩子亦汁研貳圓塗在處疳眼雀目用白羊子肝壹枚以竹刀子批開入藥貳圓在內以麻綾纏定用淘米泔煮熟空心食之仍令乳母常忌毒魚大蒜雞鴨猪肉等

熊膽

用溫水化入藥

蘆薈

研

膩粉

同水銀研

朱砂

研飛各乙两

麝香

研各半分

蟾酥

乾者酒浸乙宿龍腦研

鉉霜

研各壹字

雄黃

研飛各半分

青黛

研

胡黃連

各半分

白附子

炮貳錢

水銀

乙錢与膩粉同研
不見光星

右爲末入研藥勻用熬過獵猪膽汁浸蒸餅爲圓如黃米大湯使如前此藥退驚治風化蟲殺疳除百病進乳食若隔三兩日進壹服永無百病不染橫夭之疾凡有患與服必功効定心丸治小兒伏熱生涎心膈煩躁壯熱霍亂乳食不下嘔噦惡心或發吐逆

山大戟

漿水煮功培乾爲末

乳香

別研乙恰伍两

丁香

為末各伍两

粉霜

研

膩粉

研各半分

黑鉉

紫水銀同研各伍两

水銀

右件合研勻每鎔入蜜貳錢半和爲圓如黃米大

每壹歲兒服壹圓如煩躁研生脂麻馬齒水下如吐逆煎了
香馬齒湯下更量虛實加減食後臨卧服之此藥除熱化涎
下膈止吐逆若胃虛傷冷嘔吐不止者不可服凡小兒吐逆
宜速療之久不止遂爲慢驚常宜收此藥備急

田酒化 治小兒蘊積毒熱驚惕狂躁頰赤咽乾口舌生瘡
夜卧不寧譖語煩渴頭面身躰多生瘡癤

桔梗

微炒

玄參

各一兩

洗磨

青黛

研

牙硝

枯

各一錢

人參

各一兩

茯苓

去皮各伍兩

甘草

炒壹兩半

銀箔

八片為衣

麝香

研半錢

金箔

調片爲衣

右爲細末入研藥勻煉蜜爲圓每兩作拾貳圓每壹歲兒壹
圓分肆服用薄荷水化下及瘡疹後餘毒上攻口齒涎血臭
氣以生地黃自然汁化壹圓用雞翎掃在口內熱痺肌肉黃
瘦雀目夜不見物陳粟米泔水化下食後臨卧服

靈砂歸心丸 治小兒蘊積邪熱潮熱不除頰赤口乾心膈煩躁

巴豆

去心膜皮炒熟研如油大半個乙拾伍粒

牛黃

研

龍腦

研

麝香

研

膾粉

各三兩研

辰砂

研飛九兩

金箔

研拾片

右合研勻煉黃蠟陸兩入白沙蜜參分同煉令勻爲圓如豆大每服貳圓金銀薄荷湯下更量歲數加減如驚癇搐搦用龍腦膾粉蜜湯下服藥先以冷水浸少時服之見効尤速牙關緊急背脊強直精神昏塞連日不省

龍腦

研

牛黃

研

乳香

研一分

天南星

牛膽製者半兩

麝香

研乙分半

乾蝎

湯浸潤十個

去土微炒爲末

右件研杵令勻煉蜜和圓如大雞頭大每服壹圓荆芥薄荷

湯化下量兒大小以意加減服不計時候

玉齋保童圓

治小兒五疳蓋其骨肉輕軟腸胃微細若乳哺有

節則臟腑相調或乳母寒溫失理飲食無常醉飽喜怒及小兒
百辟以後五歲以前乳食漸多不擇生冷好食肥膩甘酸之物
即成五疳一曰肝疳其候搖頭擡目白膜遮睛流汗遍身合面
而目目中澀痒肉色青黃髮立頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢
頻多久而不痊轉甚羸瘦二曰心疳其候渾身壯熱吐痢無常
頰赤面黃脣脯煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢久不痊多下膿血
有時盜汗或乃虛驚三曰脾疳其候腹多筋脈喘促氣壅乳食
不多心腹脹痛多啼歎逆面色萎黃骨立毛焦形枯力劣曾膈
壅悶水穀不消口鼻常乾好喫泥土情意不悅愛暗憎明腸胃
不和痢多酸臭四曰肺疳其候欬嗽氣逆皮毛乾焦饒涕多啼
咽喉不利揉鼻咬甲壯熱憎寒口鼻生瘡唇邊赤痒腹內氣脹
乳食漸稀大腸不調頻頻洩痢糞中米出皮上粟生五曰腎疳
其候肌肉消瘦齒斷生瘡寒熱乍時口鼻乾燥腦熱如火脚冷
如冰吐逆既增乳食減少瀉痢頻併下部開張肛門不收疳瘡
痒痛已上疾狀並皆治療

黃連

去鬚

白鱠頭

名火令焦黃無即炒

草龍膽

去芦

雄黃

研飛

青橘皮

去穰

五倍子

蟾頭

乙枝冬火令黃色

苦練根

天漿子

微炒

麝香

青黛

研

能膽

研

蘆會

各乙分

右爲細末都研令勻用糯米飯和圓如麻子大每服乙錢兒

壹圓不計時候溫米飲下日進參服尤妙

有喝牛微

火令乙分

熊膽

研

胡黃連

木各使君子

為末天漿子

各半分

青黛

研石錢

寒食麪

三分

麝香

乙分

細墨

半分

右件壹處同研勻用白麪糊和圓如黍米大每服伍圓至七

圓米飲下不計時候

○ 搞擗目睛直視 治小兒驚風壯熱痰涎壅滯精神昏憒睡多驚啼或發

搐神 去木

天麻 去苗

膩粉 研

天竺黃 研

胡黃連 各五兩

朱砂 研飛

麝香 研

白附子 各三兩

天南星 各二兩

青黛 研

使君子 乙角

天漿子 微炒四十個

右爲細末以麪糊爲圓如梧桐子大每壹歲兒服乙圓薄荷湯化下更量虛實加減乳食後服

昏憒痰涎不利及風溫邪抗並宜服之 治一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足抽掣精神

白僵蚕 去絲

乾蝎 炒

天麻 去苗

防風 去苗

人參 各二兩

朱砂 研飛

雄黃 研

麝香 研

甘草 各一兩

牛黃 乙分

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服壹圓至貳圓薄荷湯化下不拘時候

治小兒疾病多有諸蟲或因腑藏虛弱而動或因食甘胞而動其動則腹中疼痛發作腫聚往來上下痛無休止亦攻癰叫哭合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面色青黃飲食雖進不生肌膚或寒或熱沉沉嘿嘿不知病之去處其蟲不療則子母相生無有休止長壹尺則害人

胡粉 炒

鶴鱈 去土

檳榔

苦練根 去皮

各五十兩

白礬 枯

各兩半

右爲末以麪糊爲圓如麻子大乙歲兒服伍圓溫漿水入生麻油壹兩點打勻下之溫米飲下亦得不拘時候其虫細小者皆化爲水大者自下

治乳食不消心腹脹滿壯熱喘篋嘔吐痰逆腸鳴泄鴉米穀不化或下利赤白腹痛後重及食癥乳癖痃氣痞結並治之

代赭石 燒黑

當歸 去芦

朱砂 研飛

枳殼 炒微黃

桂枝 去梗

木香

各半兩

麝香

乙分

巴豆霜

半分

右件藥搗羅爲末入研藥勻麪糊爲圓如麻子大每壹歲兌服壹圓溫米飲下更量虛實加減服之食後服

金箔丸治小兒風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴唇焦頰赤夜卧不安譖語狂妄

紫荷車

用黑豆煮軟切作片焙乾式十五兩

山藥

七倍五

牙硝

十五兩

枯

甘草

去皮生

片

龍腦

研拾兩

麝香

研伍兩

金箔

乙千式

衣

朱砂

研

飛

伯

兩

右爲細末煉蜜爲圓每壹兩半作伍十圓以金箔爲衣每服壹圓薄荷湯化下含化亦得食後臨卧常服安鎮心神散敗邪熱涼咽膈止驚啼

金箔丸治小兒驚風猝熱喘急涎噉心忪顛亦大小便不利夜目不穩

渭石

膩粉

研各十

青黛

研

二兩半

天南星

炮各乙十

兩半

巴豆

柒百個
去皮取心相

右爲細末以麪糊爲圓如麻子大每服壹歲壹圓薄荷溫水下如急驚風頭熱足冷口禁面青筋脈抽掣上膈頑涎疾狀甚者加壹兩圓煎桃符湯下疎利下蘊毒熟涎立便安愈小兒瘡疹後餘毒不解宜與服食後

金箔丸治小兒冷熱不調泄瀉煩渴米穀不化腹痛腸鳴或下痢膿血裏急後重夜起頻併不思乳食肌肉消瘦漸成疳

白石脂

煅

龍骨

多方

乾姜

炮

黃連

去蕷微炒

白礬

煅各半兩

右件藥搗羅爲末醋煮麪糊和圓如麻子大每壹歲兌服十圓米飲下乳食前服如煩渴煎人參湯下更量兌大小以意加減日叁肆服

金箔丸治乳哺失節宿滯不化胃腹痞滿嘔吐惡心便利不調

乳食減少又治傷寒溫壯內挾冷實大便酸臭乳食不消或已

得汗身熱不除及變寒發熱多日不解因食成癆先寒後熱

代赭石

研末
鹽淬研

赤石脂

青末
鹽水

杏仁

去皮尖炒熟研
五十粒

巴豆

去皮心出油炒研
三十粒

右合研匀湯浸餅圓如黃米大兒生三十日外可服壹圓
壹歲至參歲並服貳圓至參圓乳汁送下米飲亦得微利爲
度亦不虛人未利再服更量虛實加減乳食後服

關膏治小兒腑臟怯弱內受風冷腹痛脹滿腸鳴泄利或青
或白乳食不化又治藏冷夜啼胎寒腹痛

白芍藥

細研各一錢

人參

當歸各半兩
去苗微炒

木香

右件搗羅爲末都研令勻湯浸炊餅和圓如黍米大每服十
伍圓溫米飲下新生兒腹痛夜啼可服伍圓並乳食前服

淡食治小兒腸虛受熱下痢鮮血或便赤汁腹痛後重晝
夜不止遍數頻多

沒石子

朱方地榆各半兩

黃芩

剉蜜丸貳兩

黃連

剉炒研半

酸石榴皮

壹兩

右件搗羅爲細末以醋煮麪糊和圓如麻子大每服拾圓至
貳拾圓溫米飲下食前服

水銀治小兒驚風壯熱涎盛喘壅或發搐搦目睛上視
及因乳哺不節胃滿嘔逆精神迷悶發癇瘓癥並宜服之

黃明膠

炒令黃燥
乙分參字

膩粉

乾蝎全者

百草霜

研

牛黃

研

鉑霜

研

青黛

研各壹分

巴豆

去皮膜
脂者黃

黑金

同水銀
結砂子

水銀

各乙兩

香墨

燒淬
叁錢

右爲細末入研藥勻以陳粟米飯爲圓如菉豆大搘糊每壹
歲児服壹圓貳歲服貳圓參歲服叁圓肆歲已上服肆圓用
乾柿湯下薄荷湯亦得更量虛實加減服利下青粘滑涎爲
度乳食後服此藥不得化破

金匱治驚化涎涼膈鎮心祛邪抗止痰嗽

蛤粉

研細
或研
两

牙硝

枯研

朱砂

研細
各半两

人參

貳拾五兩
研細

雄黃

研飛
十五兩

龍腦

研

甘草

鹽
五拾兩

金箔銀箔

各半两
為衣

右爲細末煉蜜搜和每膏兩搘綫作貳十圓以金箔銀箔爲衣壹歲兒每服如豆大薄荷溫水化下量歲數臨時加減服之食後

金瘡散治小兒心經邪熱煩赤多渴睡卧不寧譖語狂妄痰涎不利精神恍惚及大人痰熱蘊積心膈煩躁咽喉腫痛口舌生瘡

牙硝

枯研

鐵粉

研
各半两

甘草

炙
半两

龍腦

研
半两

辰砂

研
冬兩

蛤粉

研
八兩

人參

乙两

金箔

卷十片
為衣

右爲細末煉蜜搜和每膏兩半作貳拾丸捏扁用金箔爲衣每服半丸子大人壹圓分作兩服並用薄荷湯化下食後

臨卧服

潤肺散治小兒寒壅相交肺氣不利欬嗽喘急譴聲不出寒壅鼻塞清涕咽喉乾痛

貝母

去心
炒黃

杏仁

湯去皮尖及双仁者
焙乾麪炒各半两半

麻黃

去根節
炒令

人參

各半两
炒黃

阿膠

炒令
黃燥

桔梗

各半两
研細

陳皮

乙分

甘草

炙
乙两

右同杵羅爲龕末每服壹錢水捌分煎六分去滓溫服食後

四分溫服如要和氣即入生姜煎服不計時

芷薑根

人參

細辛

去葉

茯苓

去皮

白朮

甘草

桔梗

各乙两半

右件同杵羅爲末每服壹錢水乙小盞入薄荷三葉同煎至四分溫服如要和氣即入生姜煎服不計時

人參

芷薑根

治小兒寒邪溫病時疫瘡疹頭痛體疼壯熱多睡

及治潮熱煩渴痰實欬嗽

柴胡

去苗

人參

去芦

芩芻

獨活

去岸

柴胡去苗 枳殼去桂炒

右各等分搗爲末每服貳錢水壹盞入青蒿少許煎至六分去滓溫服食後兒小即分爲二服

歸心散治小兒血脉壅實肺藏生熱煩赤多渴五心煩躁睡卧不寧四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令兒血氣不理腸胃不調或溫吐連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癇又治風熱結核頭面瘡癧目赤咽痛瘡瘍餘毒一切壅滯並宜服之

當歸

酒浸去芦

甘草炙

大黃蒸焙

赤芍藥

右等分爲末每服壹錢水壹中盞煎至柒分去滓溫服量兒大小虛實加減微溏利爲度食後臨卧服

安宮散治大人小兒腑藏積熱煩躁多渴舌頰生瘡咽喉腫痛面熱口乾目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡腫痛又治伏暑躁熱瘡瘍餘毒及大便下血小便赤澀

川芎金

用皂角水煮切作片

乾

研

甘草

研

十

兩

大

梔子仁

微炒

連翹

各貳十兩研

雄黃

飛研

甘草

研

十

兩

大

梔子仁

微炒

右爲細末每服乙大錢食後臨卧用新水調服小兒半錢臨時更量兒大小以意加減

安宮散鎮心神化痰涎利咽膈止煩渴

鵬砂

研乙分

朱砂

研飛五十兩

麝香

研

梅

花

腦

研

各半兩

寒

水

石

燒通紅研四兩

右研勻用甘草膏和每兩作壹百圓每服一圓含化小兒夜退黃殺疳虫進乳食

多驚啼薄荷水化下

驚風散治痘氣羸瘦面色萎黃腹脹滿頭髮作穗採鼻咬甲好喫泥土利色無定寒抗往來目澀口臭齒斷爛黑常服長肌退黃殺疳虫進乳食

大皂角

乾蝦蟇

用各等分同燒存性爲末

青黛

研乙分

蘆薈

研

朱砂

研飛

麝香

研

右合研勻用湯浸蒸餅和爲團如麻子大每三歲兒服二十

圓溫米飲下乳食前服

治小兒諸風驚癇潮發搐搦口眼相引項背強直精神皆困痰涎不利及一切虛症並皆治之

天南星

炮

烏蛇

酒炙取肉各三分

天麻

去根節浸一宿附李子酒附一兩

白附子

炮三分半

白僵蠶

去殼微炒四分

麻黃

去根節各半兩乾燭分半

白附子

炮三分半

白僵蠶

去殼微炒四分

已上爲細末以水一升調浸三日以寒食麪一斗拌勻

踏作麴須六月六日以楮葉罨七日取出逐片用紙袋

盛掛當風十四日可用每麴末一兩入下項藥

琥珀

研乙分

辰砂

研飛六分

雄黃

研飛三分

甘草

炙爲末半分

右合研勻煉蜜和圓如雞頭大每服一丸溫水化下不計時
治驚風諸癇壯熱昏憤神志恍惚痰涎壅塞或發搐搦
目睛直視並皆治之

蛇黃

火煅紅米醋淬九次研飛二錢

青礞石

研乙分半

朱砂

研飛三分

鐵粉

研二分半

右研勻以水浸餅丸如桐子大每服一丸煎薄荷水磨剪
刀股化下日二參服此藥治驚化涎不用銀粉小兒藏腑口
齒腸胃柔弱凡用銀粉藥切須慎之則無他苦

驚風搐搦

蛇黃

火煅紅米醋淬伍遍再將醋煮乾爲度

天南星

研爲粉用薄荷汁搜和爲餅炙熟

茯苓

去皮別研分兩

鐵粉

重羅研乙分兩

使君子

仁

已上伍味搗羅爲末各秤半斤

腦子

別研半兩

麝香

別研乙兩

銀箔

研各分

金箔

研各分

右前項伍味藥末入後項研藥拌勻糯米糊爲丸如皂莢子
大朱砂爲衣用薄荷湯磨下伍歲兒一丸分二服三歲已下
兒一丸分三四服更量歲數加減常服安神鎮心定驚控痰
食漸致羸瘦並宜服之

厚朴

去皮姜半两

陳皮

去白

川芎

各二分

使君子仁

浸去黑皮一两

右爲細末煉蜜圓如皂子大二歲已上壹粒已下半粒陳米
飲化下大治小兒腹痛

加感四

去皮姜半两

治小兒吐瀉不止可進乳食常服調胃進食

白蘿豆

蒸熟去皮研末

藿香

甘草

炙去皮各一两

黃芪

去苗各二两

黃芪

去苗各一两

人參

茯苓

去皮

白朮

各四两

右爲細末每服一錢入鹽點服或用水七分盞煎伍分溫服
消溼止渴

治小兒疳病者多因闊乳食也

太早所致或因父患臟腑

肥氣

虛蟲動日漸羸瘦腹大髮豎不必行步面黃口臭發熱

無精神此藥殺蟲進食

神麴

炒

黃連

去頭各十兩

肉豆蔻

炒裹

史君子

去皮

麥蘖

炒各五两

楨榔

不見火細剉

懸

木香

一两

水下空心服

黃連神麴史君子各一两

楨榔

如蘿蔔子大熟水吞下

肉豆蔻

各半两

黃連

各一分

葛根

大熟水吞下

治小兒胎驚內吊腹肚堅硬目睛上視手足抽掣

角弓反張但是涎痰壅盛一切急慢驚風悉皆治之

全蝎

十四个

白附子

研各二十个

天南星

炮

白僵蚕

直青者炒

朱砂

研各一两

麝香

研各一分

防風

去芦各一两

天麻

各一钱

金箔

十片

蟬蛻

去沫乙分

右爲細末入研藥和勻以粳米燶飯取中心軟者搜爲丸每
兩作四十九初生兒半丸乳汁化下周歲兒一丸金銀薄荷
湯化下十歲已上有急候者二丸薄荷湯化下常服鎮心安
神化瘀除一切驚風證候

治小兒脾胃不和宿滯不化腹脹腸鳴嘔噦惡心便利

不調乳食減少或疳瀉積瀉大便酸臭亦治丈夫婦人胃膈不
快酒積食積嘔噦惡心吐瀉脾疼

京三棱

烟

丁皮

不見火各三两

丁香

不見火各一两

青皮

去白各二两

乾薑

炮

巴豆

去皮膜開各二分半

右件爲細末入巴豆拌勻麪醋糊爲丸如粟米大每服五十丸至六十丸二歲兒可服至一歲數加減與之此藥不用大黃硝砂汞粉之類並是性溫之藥常服消積滯進乳食退黃長肌急風治小兒傷風鼻塞清涕酒調塗額門上不可服方見諸風類同助胃清治小兒胃氣虛弱乳食不進腹脹滿腸鳴泄瀉喰乳便青或時夜啼胎寒腹痛

白豆蔻仁

肉豆蔻

丁香

人參

木香

各一兩

白茯苓

去皮

官桂

去龐皮

白术

藿香

藥

縮砂仁

甘草

炙各二兩

橘紅

去白

山藥

各四兩

右爲細末煉蜜和成膏每服如雞頭實大一丸量兒大小加減米飲化下不拘時候

治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食久則漸羸弱大抵脾胃虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進美飲食全竭觀音散

人參

乙丙

茯苓

乙分半

神曲

炒一分

石蓮肉

炒去心乙分

綿耆

白芷

木香

炮

白扁豆

去皮炙焦黃去火毒半兩

甘草

炙各一分

右爲細末每服一錢水一小盞棗一枚藿香三葉煎四分去滓溫服量兒大小加減

治傷風瘟疫身熱昏睡氣壅喘滿痰實壅嗽及驚風潮搐蟲毒中暑並可服之壯實小兒宜與服之

天竺黃

乙丙雄黃

水飛二分

辰砂

別研

麝香

別研各半兩

天南星

臘月臘黃牛膽中陰乾百日者如无只

右爲細末煮甘草水和丸如皂子大每服一丸溫水化下百昧內者作三服或用臘雪水者甘草和葉尤佳

鵝膽膏 治小兒胎寒胃冷腹肚疼痛夜間啼哭嘔吐乳食大便瀉青狀若驚搐時有冷汗

姜黃二分

沒藥別研

木香

乳香

別研各四分

右為細末煉蜜和成膏每服三錢兒一丸如雞頭尖大煎釣藤湯化下更量大小加減不拘時候

蛔蛻圓 治小兒五疳八痢乳食不節寒溫調適垂違髮豎毛焦皮膚枯悴脚細肚大顱解剖陷漸覺羸弱時發寒熱盜汗咳嗽腦後核起腹內塊生小便汙濁膿痢澀青擣眉咬指喫土甘酸吐食不化煩渴併頻心神昏聳鼻赤脣燥小蟲既出蛔虫咬心宿眼雀目名曰丁奚此藥救療效驗如神

白蘿蔴

去皮黃連去蕊

蛔蛻

酒浸去骨焙

胡黃連

各一兩半

青黛

半兩

右件碾為細末猪膽汁麪糊丸如粟米大每服三十九用飯飲吞下食後臨卧日進三服

高良姜散

治小兒冷傷脾胃不和腹脹氣悶不欲飲食

高良薑

草豆蔻

去皮陳皮去白

當歸

微炒

肉桂

去皮各一分

人參

去芦半兩

右件搗羅為散三歲兒每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服不計時候量兒大小加減服之

人參酒

治小兒乳哺飲冷過度傷冷脾胃脹滿多吐痰涎

人參

丁香

去白半兩

白术

各一分半夏

湯洗七分

右件搗羅為末煉蜜和圓如麻子大每三歲小兒服一十九溫湯下不拘時日二服量兒大小加減

鹽門散

治脾胃氣不和腹脹虛脹不欲乳食困倦無力壯熱增寒並皆療之

訶梨勒皮

炮人參各三分

甘草

炙乙分

白术

木香

紫蘇

去皮去梗

藿香

去梗

陳皮

去白

苗芪

桔梗各半兩

右件搗羅爲散參歲兒每服乙分水壹錢入生姜分子大片淮棗乙枚同煎至伍分去滓溫服不計時候量兒大小加減

枇杷葉去毛微炙治小兒脾胃不和增寒壯熱腹痛嘔吐不納乳食

甘草炙各乙分乾木瓜

人參

黃芪各半兩

右爲龜散三歲小兒每服乙分水乙小盞生姜分子三片棗一枚同煎至七分去滓溫服不計時候量兒大小加減

當歸治小兒冷熱不調大便青黃心腹多痛或腹中氣滿或時嘔逆不飲乳食

白芍藥

當歸微炒

人參

芎藭各二分

白朮

甘草炙各半兩

右件搗羅爲末水煮麪糊圓如麻子大三歲小兒每服拾圓粥飲下日三服更量兒大小加減

厚朴治小兒外感風冷壯熱增寒頭痛肺裏寒氣逆嘔吐惡心或手足厥冷及脾胃不和並皆治之

蒼朮

米泔浸去黑皮焙

厚朴

去姜汁陳皮各乙分

乾薑

三分

甘草炙半兩

右件爲細末參歲小兒每服一分水乙小盞入生姜分子片棗子乙枚同煎至伍分瀝去滓熱服

紫蘇治小兒傷寒壯熱頭痛肺疼口乾煩渴

石膏

黃芩

甘草

赤芍藥

葛根

各乙分

麻黃

去根莖

柴胡

各半兩

右搗羅爲散參歲小兒每服乙分水乙小盞入生姜少許葱白參寸或或拾粒同煎至伍分瀝去滓溫服不計時候汗出爲効量兒大小加減

葛根治小兒傷寒四肢煩熱頭疼肺痛心躁口乾發渴

葛根

麻黃去根莖即入參各半兩

肉桂

去麌皮

甘草

各乙分

右件搗爲簾散三歲兒每服一小盞入生薑少許入棗子壹枚同煎至伍分瀝去滓溫服量兒大小加減不計時候人參治小兒傷寒作熱常服調順陰陽和養脾胃定吐逆止煩渴

品味與前人參散同

右爲散三歲兒每服乙分水一小盞煎伍分溫服量兒大小加減

右搗羅爲末以粟米粥和圓黍米大三歲兒服十國粥飲下赤白痢腸內疔痛日夜頻併不欲飲食量大小加減服之

黃連

炒去麌皮微炒

肉豆蔻

炒去麌皮微炒

丁香

一分

木香

訶梨勒

炮去麌皮各半兩

右搗羅爲末以粟米粥和圓黍米大三歲兒服十國粥飲下

宋香治小兒冷痢腹痛四肢不和飲食減少漸至羸瘦

訶梨勒

炮去麌皮微炒

龍骨

厚朴

去麌皮微炒

當歸

微炒各半兩

木香

乾薑炮

白术

各乙分

右搗羅爲散三歲小兒每服乙分以水一小盞入棗子一枚同煎至伍分去滓溫服食前量兒大小加減

鵝鴨治小兒久患亦白痢日夜頻併腹痛羸弱不欲飲食

黃連

去麌皮微炒

黃芩

白龍骨

訶梨勒

炮去麌皮微炒

木香

各壹分

當歸

微炒

乾姜炮

白朮

各半兩

胡粉

三分微炒

白茯苓

乾木瓜

各乙分

右件搗羅爲末煉蜜和圓如菉豆大三歲兒每服拾圓溫米飲下日參服量兒大小臨時加減

烏梅肉治小兒下痢後津液減少藏腑虛燥煩渴引飲及治諸病煩渴引飲無度

烏梅肉

微炒半兩

白茯苓

乾木瓜

各乙分

右搗羅爲末散三歲兒每服乙分水乙小盞入生姜末乙片煎至伍分去滓溫服不計時候服量兒大小加減

白及散 治小兒腎氣不成腦髓不足小兒年大骨癰合而不合頭縫開者是也宜以藥塗之

白及

柏仁

防風

去苗

細辛

去葉各乙兩

右爲細末每壹分以乳汁調塗在兒顱骨上每日壹次用之附子生去皮龍骨各乙丙

附子散 治小兒大腸虛冷肛門脫出多因下痢得之宜以藥傳

伏龍肝

赤石脂

各等分

右撫羅爲細散每用壹錢傳在脫肛上按令入頻用之

赤石脂散 治小兒因痢後腹氣下推出肛門不入

解脫風散 治小兒斷臍後爲水濕所傷或胞濕氣傷於臍中或亂髮彈洗燒金下黑煤 黃蘖末各等分

右件藥同研令細每用少少傳之

紫苑散 治小兒欬逆上氣心胃痰壅不欲乳食

去苗

彈洗

半夏湯泡

甘草

各五兩

肉桂

去蘆皮

細辛

去苗

各二兩

右件爲細末參歲兒每服乙分水乙盞入生姜乙片煎至伍分去滓溫服不計時候量兒大小加減服

采藥散 治小兒初生鵝口其舌上有白屑如米屑者鼻外亦有并不能乳

朱砂

細研

白礬

桔各等分

右件藥研極細每用少許傅兒舌上每日參次用之先便亂髮揩舌上垢令淨即差

紫蘇子

微炒

蘿蔔子

微炒

诃梨勒皮

杏仁

去皮尖麸炒黃

人參

去苗

木香

各半兩

青皮

去白

甘草

炙微赤各乙丙

右件撫羅爲細散每服壹分以水乙盞入生薑錢少許同煎

至伍分去滓溫服不計時候量兒大小加減

犀角人參散 治小兒虛熱及吐瀉煩渴不止及疎轉後並宜服

生犀錫三兩

人參拾伍兩

茯苓或拾伍兩

甘草鹽五兩

甘草伍兩

桔梗

乾葛各半兩

右爲細末每服壹大錢水壹中盞入燈心伍莖同煎陸分放溫服不計時候煩渴者入新竹葉同煎

益智散 治小兒脾胃虛弱腹痛泄痢不思乳食嘔吐不止困乏神懶心脇脹顏色青黃懨懨不醒

丁香肆分

陳皮去白兩

甘草鹽

訶子炮去核

青皮去白

各乙兩

右爲細末每服壹大錢水柒分盞煎至伍陸分食前進量大小加減與服此藥極有神効不可盡述

金匱要略 治小兒脾胃久虛嘔吐瀉頻併不止津液枯竭煩渴多躁但欲飲水乳食不進羸困少力因而失治變成風癟不問陰陽虛實並宜服之

人參

白朮不見火

木香不見火

白茯苓去黑皮

藿香去土梗

甘草炙各乙兩

乾葛半兩

右爲藿末每服壹錢水壹小盞煎至半盞去滓通口服不拘時更量兒大小加減渴甚者併煎任意飲之

全蝎觀音散 治證與前觀音散同

石蓮肉炒去心

白扁豆炒去皮

人參各半兩

神麴炒

各兩

全蝎

白芷

羌活

天麻去苗

防風去苗

各半

茯苓去皮乙兩半

半

右爲細末嬰兒壹字貳叁歲半錢肆伍歲壹錢用水壹錢或半錢棗子半箇或壹箇同煎至柒分去滓服不拘時候

龜心散 治小兒一切驚風搐搦壯熱涎多魚口鴟聲眼睛

直視

天南星

煨

雄黃

研

乾竭

各半兩

白僵蚕

去絲
膚炒
各壹分

膩粉

貳錢

滑石

貳兩

麝香

研
各式
錢半

右爲細末煉蜜爲圓如皂莢子大金銀箔爲衣每服壹圓食後臨卧薄荷湯下常服鎮心神涼咽喉

東連阿膠圓治小兒乳食無度冷熱不調下痢赤白或如急腦白多赤少後重腹痛煩渴引飲小便不利便圓頻數食減少力

肉豆蔻

茯苓

阿皮

訶子

炮去核
各二兩
黃連

去頭微炒
三兩

右爲細末用阿膠壹兩醋煎溶搜爲圓如粟米大每服壹歲兒拾粒至拾伍貳拾粒用溫飲下隨乳亦得更量歲數加減服不計時候

蛇頭圓治小兒急慢驚風手足抽掣眼睛直視角弓反張證候危急者

蛇含石

十個
煅三度醋淬却用甘草

鐵膩粉

五靈脂

酒浸
各式兩
龍腦

神砂

研

白附子

炮

鬱金

炮
酒浸
各式兩
龍腦

麝香

乙丙

花蛇頭

十箇酒浸
用齒井肉

右爲細末麪糊爲圓如雞頭大每服壹圓薄荷自然汁磨以升花水化開量兒大小加減與服

唇爛肚大青筋此藥大能進食悅顏色長肌膚

麥蘖

使君子

去皮

黃連

去頭

微炒

橘紅

培

草龍膽

蕪荑

右等分爲細末粟米糊爲圓如粟米大每服貳叁拾圓空心米飲吞下不拘時候量兒歲數加減

夢周散治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣龕喘急而赤目汗或狂言驚叫或不語無汗及癰瘍遍身赤痒往來潮熱行麻豆癧子餘毒未盡渾身浮腫痰涎欬嗽或變急慢驚風手

足搐搦眼目上視及傷風涎喘頭疼並皆治之

知母

地骨皮

禁淨赤芍藥

甘草

石膏

葶藶子

白茯苓

去皮杏仁

去皮尖炒用

人參

滑石

各半兩

麻黃

去根節一兩半

右爲細末每服壹錢麥子煎湯調下如初生牙兒感胃風冷鼻塞身熱噴嚏多啼每壹字許並用麥子煎湯下辰少以補治小兒急慢驚風潮涎搐搦手足抽掣心膈煩躁及瘡聲啼唾不寧帖腹中疔痛

酸棗仁

淨去殼

代赭石

燒研

乳香

另別研

茯神

去皮取霜

朱砂

研飛半兩

麝香

研壹錢

右爲細末凍蜜圓如雞頭大每服壹圓用金銀薄荷湯研下更量歲數加減與服常服鎮心安神定志此藥比他驚藥大不同溫平不冷

治小兒一切瘡疾皆因寒溫不調乳哺失節或啖生冷菓子粘食等物脾胃微弱不能消化致五藏不利三焦壅滯結塊腹內堅硬如石或發作寒熱有如瘧證不能飲食漸致羸瘦急宜服之

班猫

炒候米焦黃色爲度去米不用

五十箇去頭足翼用糯米半升同

巴豆

去皮取霜貳十粒

右先將班猫碾爲細末却入巴豆霜同研令勻用米糊爲圓如小菉豆大小兒叁歲已前每服叁圓五更初茶清下更量歲數虛實加減與服此藥神妙

治小兒冷熱不調或乳哺失節泄瀉不止或下利鮮血或赤多白少腹痛後重腸胃虛滑便數頻併食困倦一切鴟痢並宜服之

當歸

去芦

訶子

壹兩

乾薑

炮

黃連

去皮取霜各參分

右爲細末用阿膠壹兩參分水煎成汁和爲圓如粟米大每壹歲兒服拾粒至貳十叁十粒溫飯飲下隨乳亦得更量歲數加減與服

治小兒百病如慢驚搐搦用麝香飯飲調下急驚定後
用陳米飲調下驚吐不止丁香湯調下天柱倒脚軟濃米飲調
下渾身壯熱面赤驚叫金銀薄荷湯調下赤白痢不思乳食姜
錢三片棗子三枚煎湯調下喫食不知飢飽不長肌肉炒麥芽
一撮同生薑煎湯調下暴瀉紫蘇木瓜湯調下神形脫言語不
正及大人吐瀉霍香湯調下諸病後無精神少氣力不思食煎
生姜棗湯調下稟受氣怯小兒可每日一服最妙

升麻

知母

甘草

白扁豆

炒

山藥

人參

茯苓去皮

白朮各等分

右爲細末每服壹錢湯使如前常服沸湯點不計時

治小兒五疳八痢腹脹面黃肌膚瘦瘁時作寒熱不思
乳食愛喫泥土揉鼻咬甲頭髮作穗不長肌肉多生瘡癬大便
無時小便如泔嘔吐乳食痢色無定或喫交疥漸黃漸瘦變成
疳疾並宜服之

蝦蟆

史君子炒

阜角燒各

青黛研

二兩半

龍膽草去苗

四兩

雄黃研飛

二兩

右爲細末入研藥令勻水糊爲圓如粟米大每一歲兒七粒
二歲十粒三歲二十粒隨乳下飯飲亦得不計時候

治小兒臟腑怯弱內受積冷腸肋脹痛嘔吐痰逆腸鳴
泄瀉日夜頻併四肢困倦面無顏色肌肉消瘦不進飲食及疳
氣羸瘦肚大青筋口乾煩渴小便白濁食不生肌或發虛腫寒
熱往來或因食甘肥蟲動作痛叫哭合眼並能治之

乾薑炒

丁香各乙兩

青皮去白

京三稜各等分

半斤

右爲細末水糊爲圓如粟米大每二歲兒可照五圓淡姜湯
吞下不拘時候更量歲數虛實加減與之

龍膽草

去根黃連微炒

青皮

去白

安君子

天皮炒

右等分爲細末猪膽汁和爲圓如蘿蔔子大每服二十粒以意加減臨卧熟水下

諸湯

風痰治一切冷氣心腹脹滿胃膈痞滯噦逆嘔吐泄瀉虛滑水穀不消困倦少力不思飲食

丁香枝枝

炒

甘草

炒

白麵

炒

肉豆蔻仁

炒裹煨

右炒鹽拾參片同爲末每服壹錢沸湯點服食前

小青草治胃膈痞塞心腹刺痛腸肋脹滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣疾並皆治之

木香

炒

青皮

各叁斤

薑黃

炒

麥蘖

各伍斤

右爲末每服壹錢沸湯點服不計時候

風痰治一切冷氣心腹刺痛胃膈痞悶脇肋脹滿嘔逆惡心胃膈噫塞飲食減少

青皮

不去白

陳皮

不去白

茴香

陳炒各

繡砂仁

叁斤拾肆

右炒鹽拾肆斤同爲末每服壹錢沸湯點服食前

風痰治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫氣吞酸嘔逆惡

桂心

各乙片

良薑

炒

薑黃

炒

草澄茄

炒

丁香皮

玖兩

右爲末每服壹錢沸湯點食前服

風痰治一切冷氣痰逆惡心胃膈噫塞脇腹撮痛口苦無味飲食不美

阿魏

麪裹煨

茴香

揀淨炒

檀香

一斤半

胡椒

玖兩

乾薑炮

乙斤半

杏仁

去皮少入麴炒

別搗

參二斤半

白粳米

乙半六升

右爲末每服壹錢沸湯點服食前

仙人湯辟瘟疫除寒濕溫脾胃進飲食

蒼朮去皮炒十八斤

棗去核二斗而升

乾薑炮一升

甘草炒十斤半

鹽炒二十五斤

杏仁去皮小火炒六斤

甘草炒十四斤

鹽炒二十五斤

杏仁去皮小火炒六斤

右爲細末入杏仁和勻每服壹錢沸湯點服食前常服延年

明日駐顏輕身不老

杏仁湯調肺氣利脅膈治效數止痰逆

粟米炒六升

甘草炒十斤半

鹽炒十斤半

杏仁去皮尖皴炒十斤

右爲末每壹錢沸湯點服不拘時常服悅澤顏色光潤皮膚
生薑湯治酒食所傷心胃煩滿口吐酸水嘔逆不定飲食無味
胃膈不快

乾生薑二斤

白麪炒三斤

甘草炒十三斤

杏仁去皮尖皴炒十斤

古炒鹽貳拾貳斤同爲末每服半錢如茶點喫常服壹字消
食化瘀寬利胃膈不拘時候

益智湯治一切冷氣嘔逆惡心脣腹脇肋脹滿刺痛胃膈悶
飲食減少

益智仁半升

京三棱炮一斤半

乾薑炮兩

青皮一兩

蓬莪木

陳皮各十克

甘草炒十五兩

鹽炒六斤半

右爲細末每服壹錢沸湯點服不拘時候常服順氣寬中消
宿冷調脾胃

回春湯療元藏氣虛冷臍腹脹滿疔刺疼痛不思飲食一切冷
氣並皆治之

茴香六升

川練子洗炒

陳皮十二斤

甘草炒一斤半

鹽一斤半

右爲末每服壹錢如茶點服常服溫中益氣利脅膈進飲食

回春湯治療與前面香湯同

白芷不見火

肉桂不見火

桔梗炮三十兩

茴香甘草各六兩

右爲末每服壹錢鹽少許沸湯點食前常服寬中益氣溫胃

回春湯治精神不爽頭目昏眩心忪煩躁志意不定

川芎

不見火

白芷

不見火

各二兩

桔梗

焙

三十兩

檀香

不見火

三兩

甘草

炒大兩

右爲細末每服壹錢入鹽少許沸湯點服常服調中順氣安神定志清爽頭目

飲食無味脾胃不和酒食多傷嘔吐不止

縮砂仁

不見火

甘草

炒

各十二兩

桔梗

焙

六十兩

丁皮

不見火

六兩

古爲細末每服壹錢入鹽少許沸湯點服食前常服消滯氣寬胸膈建脾胃進飲食止嘔吐

脾胃去寒順氣

紅豆

肉桂

不見火各一兩

胡椒

六兩

乾薑

焙

三兩

桔梗

焙三十兩

甘草

炒一兩

右爲細末每服壹大錢入鹽少許沸湯點服不拘時

遇脾陽治脾胃不快宿醒留滯嘔吐酸水心服脹痛可思飲食偏冷洩瀉並宜服之

麻油

四兩

良薑

十五兩

茴香

炒半兩

甘草

十壹兩

七分

右炒鹽壹斤同藥炒爲細末每服壹錢白湯點下常服快氣大解中酒羨進飲食

小柴胡湯治脾胃不和中寒上衝胃脇逆滿心腹疼痛飲酒過度痰逆惡心或時嘔吐心下虛脹隔塞不通飲食减少短氣羸困溫中逐水去濕又治腸胃冷濕泄注下水穀不分腹中雷鳴霍亂吐利手足厥冷胃痺心痛逆氣結氣並皆治之

蒼术

米泔浸五兩

生薑

五片

甘草

十四兩

鹽

炒十五兩

右剉碎同碾淹壹宿燒乾碾爲細末每壹錢沸湯點空心服

白梅

二十枚

檀香

一兩

甘草

十三片

鹽

炒十五片

右爲末每壹錢襟生薑新水下酒後乾噦惡心活澁茹茶末

白芷湯治脾胃不和胃膈悶滿飲食不化嘔逆惡心或霍亂嘔吐心腹刺痛腸鳴泄痢水穀繫不分

草豆蔻仁二兩甘草一兩

生薑五兩

塗山炒各五兩

右件拌和勻入瓷器內淹一宿焙乾為末沸湯點服
蜀國湯治胃氣不和心腹疼痛飲酒過度嘔噦惡心脾疼翻胃內感風冷腸鳴泄婦人血氣刺痛並皆治之

香附子六兩

桔梗一片半

甘草一片

乾薑半斤

肉桂四兩

茴香半斤

良薑

陳皮各十二兩

大治脾胃虛冷酒食所傷胃膈不快嘔逆惡心吞酸吐水只淡舌澀可思飲食並宜服之

甘草十八兩乾薑一斤半

粟米三十兩

桔梗三斤

右炒鹽一伯式十分重同為細末每服一升入盐少許沸湯點下常

服快氣不拘時候

諸香

諸香

沉香剉二五兩

箋香

檀香剉茶清浸炒黃

甲香

炭火焚兩日以蜜酒煮熟

沙木炭各二兩

丁香

藿香葉

葉

麝香研

牙硝研

研

腦子

三兩

梅花腦研

二兩

右除研藥外為細末用蜜十兩煉同研藥常法燒

右為末入研藥用蜜拔和令勺如常法燒

降真香

紫檀香剉三十兩建茶末一兩湯調濕

白茅香細剉二十兩青州棗二十箇擘破水一大升煮

拌勻慢火炒勿焦未氣盡為度

麝香研

各九兩牙硝研

十二兩

檀香剉茶清炒

蜜研

倍用煉和香

右為末入研藥用蜜拔和令勺如常法燒

甲香剉

前

沉香剉

前

箋香剉

各六兩

腦子研

研

諸香

紫潤降真香

四十两 刮

黄熟香

三两 刮 烟消 消炎化瘀

粉草

五两 刮

瓶香

二十两

麝香末

十五两

甘松

拣净半斤

丁皮

藿香

各十两

龍腦

一两

篆香

三十两 刮

右爲末入研紫燥蜜搜和如常法燒

玄参

拣净各五两

香白芷

藿香

各二两 刮

香附子

拣净半斤

甘松

拣净各十两

麝香末

半斤

清溪堂

降真香

紫藤者各一两

芩苓香

茅香

各一两 刮

丁香皮

右爲末煉蜜搜和用布袋常

太平惠民和劑局方卷之十

勑授太醫助教前差充四川總領所檢察惠民局 許洪

論處方法

夫處方療疾當先診知病源察其盈虛而行補瀉辨土地寒暑鬱勞女盛衰深明草石甘辛細委君臣冷熱或正經自病或外邪所傷或在陰在陽或在表在裏當須審其形候各異虛實不同尋彼邪由知疾所起表實則瀉表裏實則瀉裏在陽則治陽在陰則治陰以五藏所納之藥於四時所用之宜加減得中利汗無誤則病無不差矣若不洞明損益率自肯襟畏忌不分反惡同用或病在表而却瀉裏病在裏而却宣表在陰則瀉陽在陽則瀉陰不能曉了自昧端由病既不瘳遂傷患者深可戒也故爲醫者必須澄心用意窮幽造微審候狀之淺深明藥性之緊緩製方有據與病相扶要妙之端其在于此凡療諸病當先以湯蕩除五藏六腑開通諸脉理順陰陽令中破邪潤澤枯朽憐人皮膚益人氣力水能淨萬物故用湯也若四肢病久風冷發動次當用散散能逐邪風氣濕藥則多使審而用之則百不失一矣

痺表裏移走居無常處散當平之次當用丸丸藥者能逐風冷破積聚消諸堅癥進美飲食調和榮衛能參合而行之者可謂上工故曰醫者意也大抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多使審而用之則百不失一矣

夫療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠭毒以蟲藥離腫瘡瘤以瘡瘤藥風濕以風濕藥各隨其宜雷公云藥有三品病有三階藥有甘苦輕重不同病有新久寒溫亦異夫重執膩醋鹹藥石并飲食等於風病爲治餘病非對輕執辛苦淡藥飲食等於冷病爲治餘病非對其大綱略顯其源流其餘觀其病狀可知臨事制宜當識斯要矣

論合和法

凡合和湯藥務在精專甄別新陳辨明州土修製合度分兩無差用得其宜病無不愈若真假未類冷熱相爭草石昧其甘辛炮炙失本體生半副金匱方剗半味雖有藥病之名求無必愈之功良以

醫者以知處意再四審心不得委以他人令其修合非但少不等乘以失本方意據和之後研配難明衆口嘗之衆鼻觀之精氣一均都盡而於療病固難得效此蓋是令和之盈虛不得各醫方之淺拙宜加審察又古方藥味多以銖兩及用水皆言升數年代綿歷漫遠傳寫轉見市訛或分兩少而水數多或水數多而分兩少輕重不等器量不殊若不別其精麤何以明其取捨今則加減合度分兩得中削舊方之參差合今時之行用其方中凡言分者即貳錢半爲一分也凡言兩者即四分爲壹兩也凡言斤者即拾陸兩爲壹斤也凡言等分者非分兩之分即諸藥斤兩多少皆同爲等分也凡煮湯云用水大盞者約一升也一中盞者約五合也一小鍾者約三合也務從簡易庶免參差俾修合前調臨病濟急不更冗繁易爲曉了也凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮甲頭足尾骨之屬有須燒炮炙生熟有定一如其法順方者福逆方者殃或須肉去皮或須皮去肉或須根莖或須花實依方揀練事機理削極令淨潔然後秤定分兩勿得參差藥有相生相殺氣力有強有弱君臣相使若不廣通諸經則不知有好有惡或醫自以意加減不依方分兩使諸藥石強弱相欺入人腹中不能治病更相攻擊草石相反使人迷亂力甚刀劍若調和得意雖未能去病猶得安和五藏於病無所增劇也

凡煮湯當以井花水極令淨潔其水數多少不得參差常令文火小沸令藥味出煮之調和必須用意然則利湯欲生少水而多取補湯欲熟多水而少取用新布絞之服湯寧小熱即易消下若冷即令人嘔逆云分再服三服者要令勢力相及并視人之強弱病之輕重爲進退增減之不必悉依方說也

凡擣羅丸藥用重密絹令細於蜜中和則易熟若羅草藥爲散以輕細絹於酒中調服則不泥其石藥亦用細絹羅然後研理數百過視色理和同爲佳也

凡湯酒中用諸石藥皆細擣羅之如粟米亦可以葛篩令調並新綿內湯酒中同煎凡合丸散藥先細切曝燥乃擣之有各擣者有

獨擣令偏研更出細壁時東若逢陰雨亦以微火烘之既燃小傳

冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當半增分兩須得舟乃秤之爲正其湯酒中不須

如此少

凡漬藥酒皆須細剉用生絹盛之乃入酒密封陰寒暑日數示其濃烈便可漬不必待服至酒盡也澤可曝燥微搗更漬飲之亦可爲散服

凡合膏藥初以酒或醋漬令滲透不用多汗密覆勿洩從今日至明日亦有止宿者微火煎之令三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使市面沸乃下之使沸靜良久乃止蓋欲小小生其中有難白者以兩頭微焦黃爲度有白芷附子者亦令小黃色也猪肪皆勿令經水膈月者弥佳絞膏以新布絞之若是可服之膏膏查亦可酒黃飲之可摩之膏膏查則宜以傳病上此蓋欲兼盡其藥力故也膏中用雄黃朱砂麝香乳香鉑丹之輩皆別研如粉候膏畢乃可搜中以物疾攬至於極強勿使沉聚在下不調有水銀胡小湯藥則不在此例

粉者於膏中研令極細

凡修鍊神仙延年丸散皆須先淨其室燒香掃洒勿令浪語當使童子搘之務令細熟杵數可至千萬過以多爲佳勿令婦女小兒喪孝產婦及痼疾六根不具之人及六畜見之皆不效也其逐急諸小湯藥則不在此例

論服相法

夫藥有君臣佐使人有強弱虛實服餌之法輕重不同少長殊途強羸各異或宜補宜瀉或可湯可丸加減不失其宜藥病相投必愈若病在骨髓已上者先食而後服藥病在心腹已下者先服藥而後食病在四肢血脉者且空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜凡藥勢與食氣不欲相逢食氣消即進藥藥氣散而進食如此消息即得五藏安和非但藥性之多方其節適早晚復須調理今所云先食後食蓋此義也

凡服湯欲得稍熱服之則易消下若冷則嘔吐不下若大熱則傷人內後勝在用意湯必須溫清若濁則令人悶不解中間相去如

步行十里久即前服若後湯未消後湯未衝必當吐逆仍
間病者腹中藥消散否乃更進服

凡服丸藥者時如梧桐子大以二十九為始從一服漸加至四十
丸為限過多亦損人云一日再服者欲得引日多時不顯藥力漸
積寒甚五臟亦為佳不須頓服為善徒飭名藥獲益甚少也
凡服浸酒醉欲得使酒氣相接無得斷絕斷絕則不得藥力多少皆
隨性飲之以知為度不可令人醉至吐大損人也

凡服毒藥治病先起如黍粟病去而止不去倍之不去十之取去為
度今藥中單行一兩種有毒之藥只如巴豆甘遂之輩不可令至
盡劑爾如經所說一味一毒服一丸如細麻二味一毒服二丸如
大麻三味一毒服三丸如胡豆四味一毒服四丸如小豆五味一
毒服五丸如大豆六味一毒服六丸如梧桐子以數為丸而毒中
又有輕重只如狼毒鉤吻豈同附子芫花之輩耶凡此之類皆須
量用也

凡餌湯藥後其粥食肉菜皆須大熟大熟則易消與藥相宜若生則
難消復損藥力仍須少食藥於藥為佳亦少進鹽醋乃善亦不得
苦心用力及於喜怒是以療病用藥力為首若在食治將息得力
太半於藥所以病者務在將息攝養之至可以長生豈止愈病而
已哉

論用藥法

夫濟時之道莫大於醫去疾之功無先於藥人居五行內氣病生暑
濕風寒藥分三品七情性有溫平冷熱凡於行用不得差殊庶欲
立方便須憑據療之合理病無不痊若自昧新陳莫分真偽用之
偏僻使之稀疎著以別名求於奇異未諳体性妄說功能率自骨
襟深寫造次是以醫不二世不服其藥斯言信有之矣豈不深思
者哉又不得用土地所無貴價難市珠珍諸寶希罕所聞縱富貴
而無處搜求設貧下而寡財不及或於遠邦求藥或則確執古方
不能變通稽於致誠病既深矣藥何療焉繇是醫者必須捨短從
長去繁就簡卷舒自有盈縮隨機斟酌其宜增減允當察病輕重
用藥精妙則可謂上工矣

凡藥有君臣佐使以相宣攝令和宜用一君二臣三佐五使又可

君三臣九佐使也又有陰陽配合

掌禹錫等按蜀本注云凡天地萬物皆有陰陽大小各有色類

畢究其理止有法象故毛羽之類皆生於陽而屬於陰鱗介之類皆生於陰而屬於陽所以空青決水故色青而主肝州砂法火故色赤而主心雲母法金故色白而主肺膽黃法土故色黃而上門磁石法水故色黑而主腎筋骨以此推之例可知也

兄弟皮爲母厚朴爲子之類是也根莖花實草木骨肉又有單行

者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者

凡此七情合和之時留意于之當用相須相使者良勿用相惡相

反者若有毒者宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也

掌禹錫等注云凡三百六十五種有單行者七十一種有者十二種相使

者九十種相畏者七十八種相惡者六十種相反者十八種相殺者三十六種足也

七情合和既之又又有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣又

有有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出真偽新陳並

有法也

凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根物多以二
月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝
葉乾枯津潤歸流於下全即事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖

葉乃各隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本文也

凡本草說陰乾者謂就六甲陰中乾之又依遁甲法甲子旬陰中在
癸酉以藥著酉地也實謂不必然正是不露日暴於陰影處乾之
爾所以亦有云暴乾故也

今按本草採藥陰乾者皆多惡至加便
昔經霜陰乾者悉無令壞今壞全少乾易得
者悉宜日乾十月已後採者陰乾乃好若幸可而用益當為善

論二品藥畏惡

孫叔

尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起磁石引針琥珀拾芥漆
得蟹而散麻得漆而湧桂得葱而軟樹得桂而枯戎蠺累卵懶膽
分益其氣奕有相關感多如此類其理不可得而思之至於諸藥
尤能遞為利害先聖既明有所說何可不詳而避之時人為方皆
多漏略若舊方已有此病亦應改除假如兩種相當就其輕重擇
而除之傷寒亦散吾常不用藜蘆斷下黃連丸亦去其乾姜而施
之無不效何忽強以相憎苟令共事乎相反為害深於相惡相惡
者謂彼雖惡我我無忿心猶如牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良
此有以制伏之也相通者則彼我交離必不宜合今畫家用雌黃

胡粉自難於粉得黃而黑黃得粉亦變此蓋相反之證也
藥理所昧所以不効人多輕之今按方處治必恐卒難尋究本草
更復抄出其事在山覽略看之易可知驗而本經有首末采門
冬者無以辨山吳天麥之異咸宜各題其條人有亂誤以鹽而海
蛤之與鮀甲愚疑正同又有諸之便署預審預復使紫芝計無應
如此不知何者是非亦且併記當更廣驗正之又神農本經相使
正各一種兼以藥對參互乃有兩三於事亦無嫌其有云相得共
療其病皆既非妨避之禁不復疏出

上藥一百二十種爲君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕
身益氣不老延年者其上品藥性亦皆能遣疾但其勢大和厚不
爲倉卒之効然而歲月常服必獲大益病既愈矣命亦兼申天道
仁育故云應天一百二十種者當謂寅卯辰巳之月法萬物生榮
時也

中藥一百一十種爲臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜避過病
補虛羸者其中品藥性療病之辭漸深輕身之說稍薄於服之者
祛患當速而延齡爲緩人懷性情故云應人一百二十種者當謂
午未申酉之月法萬物成熟時也

下藥一百二十五種爲佐使主治病以應地多毒不可久服斂除寒
熱邪氣破積聚愈疾者其下品藥性專主攻擊毒烈之氣傾損中
和不可常服疾愈即止地體收殺故云應地一百二十五種者當
謂戌亥子丑之月法萬物枯壯時也兼以閏之盈數加之神農本
經三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成一
歲也今所舉其綱目以明藥之品數其本草中唐之所附名醫嘗
用加添之藥不在此例也

論服藥食忌

有木勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物

有藜蘆勿食狸肉

有黃連桔梗勿食猪肉

有地黃勿食蕪荑

有天門冬勿食鯉魚

有細辛勿食生菜

有甘草勿食菘菜及海藻

有巴豆勿食蘆筍羹及野猪肉

有半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉

有牡角勿食生菜

有夜苓勿食醋物

有商陸勿食大肉

有鰲甲勿食見葉

服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸肴物果實等又不可多食肥豬大肉油膩肥羹魚鱠腥臊物

服藥通忌見死尸及產婦淹穢物

論炮炙二品藥石類例

正名

丹砂雄黃雌黃

凡使先打碎研細水飛過灰椀內鋪紙

石鐘乳

凡使生研細水研細不炒過方入藥用如別有煅煉各依本方

赤石脂

凡使通赤鐵子內或刀研細水飛過方入藥用如別有煅煉各依本

陽起石

凡使先以炭火燒通赤好酒煮半日亦得並研細水飛過方入藥用如別研令極細不飛亦得

硫黃

凡使先細研水飛過方入藥用如別有煅煉各依本

磁石

凡使先以炭火燒通赤研細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

食鹽

凡使先酒炒過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

白礬

凡使先酒炒過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

黑鉛

凡使先酒炒過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

禹餘銀紫石英石膏寒水石代赭石

凡使先酒炒過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

百草霜

凡使先酒炒過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

伏龍肝

凡使先酒炒過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

黃丹

凡使先酒炒過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

滑石

凡使先火燒赤研細水飛過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

白聖

凡使先火燒赤研細水飛過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

太陰玄精石

凡使用搗碎細研水飛過懶乾方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

白芷

凡使先火燒赤研細水飛過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

禹餘銀

凡使先火燒赤研細水飛過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

白芷

凡使先火燒赤研細水飛過方入藥用如別研令極細水飛過方入藥用如別研令極細只炒過

方得但稍保之

半終子

此似升以水洗溫大半上了

杵爲龜大培乾後入藥同搗之不逐者更以酒清

經三五日乃中更搗然後搗之須臾熟即易得

川牛膝

凡使先洗去芳頭剉碎以酒浸一日夜焙乾

凡使先大戶頭洗亦得

柴胡前胡等

剉焙乾方入藥用白木獨活羌活等

凡使仍州焙方入藥用

車前子

須微炒藥方入藥用木香未薄如絲火燒乾使勿

用如只夢乾亦得

川牛膝

凡使先大戶頭洗亦得

用如只夢乾亦得

柴胡前胡等

剉焙乾方入藥用白木獨活羌活等

凡使仍州焙方入藥用

車前子

須微炒藥方入藥用木香未薄如絲火燒乾使勿

用如只夢乾亦得

川牛膝

凡使先大戶頭洗亦得

用如只夢乾亦得

柴胡前胡等

剉焙乾方入藥用白木獨活羌活等

凡使仍州焙方入藥用

車前子

須微炒藥方入藥用木香未薄如絲火燒乾使勿

用如只夢乾亦得

川牛膝

凡使先大戶頭洗亦得

用如只夢乾亦得

柴胡前胡等

剉焙乾方入藥用白木獨活羌活等

凡使仍州焙方入藥用

車前子

須微炒藥方入藥用木香未薄如絲火燒乾使勿

用如只夢乾亦得

川牛膝

凡使先大戶頭洗亦得

用如只夢乾亦得

柴胡前胡等

剉焙乾方入藥用白木獨活羌活等

凡使仍州焙方入藥用

車前子

須微炒藥方入藥用木香未薄如絲火燒乾使勿

用如只夢乾亦得

川牛膝

凡使先大戶頭洗亦得

用如只夢乾亦得

柴胡前胡等

剉焙乾方入藥用白木獨活羌活等

凡使仍州焙方入藥用

車前子

須微炒藥方入藥用木香未薄如絲火燒乾使勿

用如只夢乾亦得

川牛膝

凡使先大戶頭洗亦得

用如只夢乾亦得

柴胡前胡等

剉焙乾方入藥用白木獨活羌活等

凡使仍州焙方入藥用

車前子

須微炒藥方入藥用木香未薄如絲火燒乾使勿

用如只夢乾亦得

川牛膝

凡使先大戶頭洗亦得

用如只夢乾亦得

柴胡前胡等

剉焙乾方入藥用白木獨活羌活等

凡使仍州焙方入藥用

車前子

白芷

凡使取根肥者，長大者，切片，用酒浸一宿，去核，入藥用。

中冷，去核取肉，酒浸一宿，代水，入藥用。

內核爲粗末，入藥用。

去核方入藥用。

等（凡使並酒別研令極細，方可入藥用）

白芍（凡使要粘古者，先以酒浸一宿，焙乾，細搗，如粉，用亦得。他有麝香牛黃，細研之，只以酒

各依本方，先用川研令細，然後入藥用之。）

麝香牛黃（凡使先用研，先以酒浸一日慢火炙令通赤候，細研之，可入藥用。）

麝子（凡使先研，先以酒浸一日慢火炙令通赤候，細研之，可入藥用。）

牛黃（凡使先研，先以酒浸一日慢火炙令通赤候，細研之，可入藥用。）

牛黃（凡使先研，先以酒浸一日慢火炙令通赤候，細研之，可入藥用。）

阿膠及諸膠（凡使先研，先以酒浸一日慢火炙令通赤候，細研之，可入藥用。）

阿膠（凡使先研，先以酒浸一日慢火炙令通赤候，細研之，可入藥用。）

太平惠民和劑局方指南總論卷中

論 中 風 證 候

害品類人或中邪固鮮有不致斃者故入藏則難知其經絡空虛而中傷者爲半身不遂手腳癱瘓涎潮昏塞口眼喘斜肌膚不仁痺暉繚僻隨其藏氣所爲不同或左或右邪氣反緩正氣反急正氣引邪喘僻不遂蓋風性緊暴善行數變其中人也卒其眩人也暈激人涎浮昏人神亂故推爲百病長聖人先此以示教人醫編集所以首論中風也

論 中 風 二 中風者皆因陰陽不調藏府氣偏榮衛失度血氣錯亂爲怒過傷飲食無度嗜慾忘情致於經道或虛或塞舌瘻不能言者可先與通關散搐鼻次服

至寶丹此藥性涼稍壯人可與氣虛及年高人不可與服只與後藥卒中風筋急頭眩者可與七宝丹中風半身不遂口眼陽斜筋挛骨痛者可與小續命湯追風應痛丸中風邪氣入藏狂言恍惚与排風湯中風手足癰瘍多与青州白丸子中風項皆拘強牙閼緊急者可與三五七散中風手足戰掉腰脚緩弱可与活絡丹土室丹年高脚弱者可與黃芪丸

論 中 風 三 中風多生於驕貴之人因事激挫忿怒而不得宣泄逆氣上行忽然仆倒昏迷不省人事牙關緊急手足拘牽其狀與中風無異但口內無涎声此證只是中氣不可妄投取延發汗等藥反生他病但可與七氣湯分解其氣散其壅結其氣自止七氣湯連進效速更可與蘇合香丸

論 中 風 4 腹不欲皆因風邪中於經絡氣血行遲機闊縱緩故手足不遂口眼喎斜可與七宝丹偏風語言蹇澁可與小續命湯偏風走疰疼身体麻木可與活絡丹偏風恍惚不定可與排風湯偏風痰涎盛者可與青州白丸子拘急脚弱口噤者可與龍虎丹癰瘍手足不遂可與透水丹偏風筋脉挛急可與驅風丸乳香趁痛散乳香丸七宝丹

論 中 風 5 肢節疼痛皆因風氣入於筋絡及骨節疼痛或攻注脚手痛或拘挛伸屈不得者可與

乳香趁痛散追風應痛丸活絡丹乳香丸沒藥丸太岳活血丹皆可服宜先與五香散淋渫次用活血丹塗之

論 中 風 6 皆因腠理虛風與寒溫氣傷之每遇夜間或三四更以來腰背倦痛轉側不得或身體倦痛者爲有寒溫也與小續命湯大便秘小便多身疼痛者可與木附湯若骨節煩疼者可與乳香趁痛丸或身体麻木足脛弱者可與追風應痛丸

皆因風邪熱滯腸胃津液乾燥秘滯可與
麻仁丸三和散不忌即與皂莢丸如通即止之不可久服如氣
虛及老人不可與皂莢丸只與麻仁丸三和散四物湯加去白

青皮等分同煎秘其者可與神功丸亦可虛老人服

諸風初發皆因小腸積熱膀胱壅滯不利

導赤散雞蘇丸三黃丸三和散秘甚者與神功丸五苓散

皆因血凝毒氣入於兩陰之間其狀或赤腫或冷
痛或麻木不仁或脚軟而緩或增寒壯熱作渴筋脉拘急可與
俞山人降氣湯排風湯丁鱣命湯小降氣湯痛者與石南丸追
風應痛丸乳香趙痛散脚軟不能行者与黃芪丸木瓜丸小便
秘澁與導赤丸五淋散三和散大便秘者与麻仁丸秘甚者与
神功丸衝心悶者与三和散擔腰痛者可與大烏沉湯不以輕
重皆用五香散沐浴若脚腫生瘡者透水丹

頭目昏眩多痰者可與石砂化痰丸痰盛昏眩可與半夏丸天

南星丸心肺有熱与龍膽草犀丸痰盛項強急与金沸草散痰
多膈熱者可與川芎丸心胃不利口苦舌乾可與透水丹羌活
丸防風丸痰甚心忪悸者可與半黃清心丸痰盛渴嘔者可與

天南星丸

皆因血氣不順面赤蟲行瞤動血氣凝滯者可與

可與排風湯胡麻散消風散四生丸甚者多服白芷煎丸荷首

烏散

皆因風虛氣上攻頭目可與

太陽丹白虎丸茶調散川芎丸太陽穴痛与急頭散塗痛處眼

昏頭痛者可與消風散追風散痰熱頭痛者可與防風丸年高

虛弱人風寒入腦頭痛發眩者与木附湯羌活丸三五七散偏

正頭風兩太陽穴及眉棱骨痛牽引兩眼昏暗者可與遇仙散

皆因血氣凝滯可與

驅風丸龍虎丹排風湯胡麻散何首烏散羌活丸川芎丸白龍

丸芎星丸或如虫行可與追風散

皆因血虛受風邪心氣不足入於心經者与

完志丸降心丹平補鎮心丹辰砂妙香散熱者半黃清心丸

通關散消風散大三五七散或追風散痰涎盛与白丸子

諸風初發皆因風虛氣血衰弱行止無力可與

黃芪丸木瓜丸俞山人降氣湯不赤不腫而痛者可與洗風散

淋沃洗之

皆因肝脾陽破風入發腫者可與

王貞散生姜自然叶調藥處內損者上太岳活血丹血不
上首二花茶石散

金因積熱痰涎上攻咽喉口開不得水將不下与
碧雪川管子吹入喉中甚者与雄黃解毒丸王冐無憂散

論傷寒證候

活人書云傷寒正名有一十六條。傷寒傷風傷寒見
風傷風見寒風溫中溫風溫溫溫毒中鴆熱病涼病溫
瘡晚發疫癟外證一十六條外有六證相似中暑傷寒食積虛
勞瘡瘍脚氣與傷寒相似而实非傷寒此證人不曉皆言即傷
寒也若不子細分辨證候虛实用藥則誤人性命在反掌之間
不可不知也

凡傷寒初得病便不進飲食發熱一向不止頭
痛或津身痛或自汗惡風增寒壯熱者乃是傷風傷寒證也便
須問病得幾日有汗無汗惡風不惡風或渴或不渴或嘔逆或
不渴述小便通或不通得幾日須用子細審問方可用藥傷寒
一證與雜病不同若不對證妄投藥餌罪犯非輕誤人多矣

論傷寒凡傷風者皆因脫衣感冒被風吹襲着則洒然
骨寒毛起惡風自汗者乃是傷風證也凡風吹則身自寒惡風
無汗者是傷寒證也

傷寒初得病

二日頭痛身肢痛惡寒或微喘者

肺虛乃老人可與

五積散聖散子此二藥病多日及不惡風者不可服并夏秋之
間亦不可輕服緣中暑似傷寒若中暑人誤服此二藥如犯新
救火其害非輕切宜審實仔細用藥少壯者夏秋宜用
散來蘇散人參輕骨散葱白散和解散神木散之類可服
初得病一二日頭痛發熱身體痛惡寒無汗者可与
(解散金沸草散人參輕骨散)初得病一二日步二日自汗頭
痛心胸或嘔者可与升麻葛根湯敗毒散香蘇散葱白散人參
輕骨散和解散神木散之類皆可用若發汗後熱已退了可与
和煎藥葛根木散正氣散

驗病人四五日至六七日不惡風寒及發熱煩渴嘔逆
手掌中及腋下微有汗出大便不通小便赤得三四日腹中滿
微喘狂言譖語者切不可妄投熱藥只可與

小柴胡湯一貼先進一服如人行十餘里未通候半日久可又
進一服以大便通出燥黃則愈此裏證也煩渴者与五苓散或
平足冷吐瀉不可与小柴胡湯只服參苓白朮散四君子湯之
屬如調理通後恐虛老人須用平補藥可与葛根木散四君子湯
參苓白朮散

論傷寒傷寒傷風往來寒熱脅脇痛乾嘔及大便秘者
可用小柴胡湯一貼病重者再服半貼方效或言渴者或小便

滌兼服五苓散。傷風四五日身發熱而寒氣強而手足溫及大便不通者多用小柴胡湯散養生。散甲散之類。婦人傷寒三五日至七八日月經當行或然水絕失作寒熱然後證語亦丸丸神狀日可夜甚甚為熱入血室也。用物如等分加柴胡煎服如不退用小柴胡湯兼入生地黃桂枝芍藥甘草桂附湯。小柴胡散和解並單乃和解證也。

論曰：傷寒陽證而亦作熱發渴。五七日不止或服熱藥過多熱甚發狂煩躁或瀉亦止。體血者可服。

三清丸可服。先心散或大便秘結与小柴胡湯之類。

論曰：傷寒三日五七日身體疼痛不可轉側自汗四肢微冷濱而不渴或吐逆油瀉腹痛或脊背腰痛者可與理中丸。中湯內肢冷甚腹痛氣急者与姜附湯多加甘草煎及附子。理中丸併服。重者用法鍊黑錫丹金液丹二氣丹之類。隨輕重而用之瀉止四肢暖有寒熱却用五積散聖散子干蓮散之類。微汗則解不然則毒氣存復便難治也。

論曰：有陰微有陽微最宜仔細審問。傷寒陽證熱竅深則反喘若口認四肢微冷便投熱藥此害人性命在須刻間。發藥者極用子細審問如是自疑寧不發藥效他更請醫者看視不可亂發藥也。

論曰：若初得病四肢厥冷身上起粟大便不調或渴或嘔。

區比寒厥也可與理中丸理中湯之類。

論曰：若初得病身便熱頭痛大便不通至六七日渴甚狂言揭衣被不定覺腳手厥冷此乃熱極而發厥冷必竟少時

又却溫熱切不可便投熱藥且與小柴胡湯之類。

昔有國醫孫用和一法採之須子細察審外證方可用藥凡傷寒四肢厥冷當察問病之因若證不明未辨陰陽者且與四味

(理中丸加甘草再和勻作四順理中丸服採之若是陰厥則服

藥了形靜不熱定暉當漸加前件理中湯等若是服四順理中丸了如煩躁不定暉渴狂言自揭衣被者此是陽厥不可投

熱藥。前用前件小柴胡湯之類。

論曰：傷寒五七日至十日已上早晨稍惺至申酉前後發熱不惡寒微有汗大便不通三二日或譯語而渴者与

小柴胡湯三五服重者五七服以大便微利熱須退有渴者可與五苓散猶有煩躁及熱未退者宜加七宝洗心散或與秦艽

盤甲散調理也。

論曰：頭痛傷寒雖退而頭痛不止者諸陽所聚熱毒氣上攻頭

痛不上者可與龍腦芎犀丸(太陽丹百龍丸)芎丸之類。

論曰：傷寒至五七日渴甚或發熱不惡寒大便如常小便

赤是胃中虛燥可与

小柴胡湯發熱渴者与柴胡湯仍加瓜萎煎

傷寒嘔逆有二證胃中有寒而幅滿者可與參芩白朮散方芩散而君子湯胃中亦有熱或發渴或小便赤澁與小柴胡湯或五苓散其小柴胡湯極止熱渴或少氣吐逆者用竹葉湯立効

傷寒吐逆者胃寒吐而身涼或服冷藥太多而不渴大便如常或自利或吐蛔虫者此胃中寒也可与人參丁香散參芩白朮散四君子湯理中丸人參丸嘉禾散

傷寒喘急者皆因風寒邪乘於肺經肺上盛發喘麻黃湯華蓋散欬冬花散人參潤肺丸養肺丸或潤金散緩肺散皆可服也

傷寒咳嗽者由寒邪乘虛入於肺經或飲水過多停飲咳嗽微喘發熱而渴或不渴或寒熱脇下痛者可与小青龍湯三服如脇下痛甚者必有停飲於小青龍湯內加入醋炒芫花少許同煎不可多用多則瀉人如發寒熱咳嗽未盡更進小柴胡湯每服加五味子二十粒同煎或与紫苑散

傷寒五七日發鼻衄或吐血者熱盛氣壅則衄血或吐血切不可妄投熱藥可与

雞蘇丸薄荷煎茅根湯或茅花汁冷送下甚者可与三黃丸如湯兼服五苓散清心散加真蒲黃煎服

傷寒咽喉痛皆因內熱氣秘陽毒上熏則咽喉痛盛者可與

如聖湯甚者可与四順飲犀角飲洗心散皆可服之

傷寒腹痛寒有熱腹痛者三四日大便不通躊躇腹痛或發熱不惡寒或渴者此乃胃中有燥薑故發痛也切不可用熱藥且如正氣散理中湯及諸推積性熱藥皆不可用誤人性命只可与小柴胡湯加芍藥少許同煎一二服如未效可至三四服取大便通爲度。傷寒腹痛有寒證因服冷藥過多大便自利腹中痛手足冷者可与理中丸甚者与附子理中丸理中湯未効用姜附湯多加甘草煎用諸熱藥即止。氣虛及老人傷寒后腹痛大便如常无熱只是腹痛者与黃芪建中湯多服取効小便秘者与五苓散通利亦可与之

麻仁丸未通者与神功丸三黃丸有熱者与四順清涼飲後以參苓白朮散嘉禾散補之。小便秘結者与五苓散通利亦可与之

牡蛎散止汗散兼嘉禾散黃芪建中湯加入參煎服又人參當

歸散加小麥同煎

傷寒後腹痛大便自利手足冷者可服

理中丸之類見腹痛條內

傷寒眼睛及遍身發黃疸小便不利或頭上汗出

者可与

方外散以山萸陳山楂子各少許剉碎二錢煎湯調多服。功用：解暑除熱，止渴。傷寒後腹滿者不思飲食或食後不消化腹脹。

氣散沉香降氣湯前丸面食丸參苓白朮散甚者與青木香丸兼嘉禾散。君子湯木香散木香流氣飲看虛實用之。

黃車阿膠丸駐車丸血多者與地榆散。胃風寒兼服。

使反快膈上汗出此中濕氣也可多服五苓散利小便次用承附湯加服之。

發拔頭可用微溫藥調理只可與。

參芩白朮散虛弱老人用嘉禾散之類調理。

論：夏月傷暑亦云伏暑謂其人從熱中來便從涼處坐卧不知故外涼冷之氣閉暑熱氣伏在腠理中不能發泄故曰伏暑其證自汗惡寒或背惡寒而渴或面垢如未洗面人或板齒燥當門二齒乾是伏暑也嘔逆而渴者及卧不及席也是陽暑也可与。

五苓散桂枝丸大順散香薷散。發熱甚者可与香薷散竹葉湯桂枝散小柴胡湯冷服立効。

論：中暑嘔吐發熱悶亂或霍亂吐瀉可与。

消暑丸五苓散桂枝丸香薷散之類。

利：是頭不痛身體不疼者可与。

金沸草散消散丸辰砂化痰丸倍木丸之類皆可与。

病有頭痛發熱惡寒或腹滿吐逆身體不痛只是四肢倦怠其證非傷寒也此是傷食在腸胃之間可与。

感應丸獨聖丸蓬前丸嘉禾散。食丸諸傷食藥皆可服氣虛老人可服五積散吞下青木香丸順氣散之類。

論：瘴病。

一、瘴病雖是時行之疾然老少虛實受病有淺深大率不同有發熱不寒渾身似火頭痛煩渴言語者有發寒不熱黑昏倦四肢冰冷脅腹疼痛有外寒內熱外熱內寒有寒熱初半有嘔不能言者有吐有瀉有吐瀉俱作當隨證用藥丸口言瘴病一槩治之万一不能取効也。

若發時熱多寒少或內熱外寒但熱不寒渾身如火頭痛煩渴心肾躁動譯語亂言大小便秘滯發作无時者可与小柴胡湯敗毒散升麻葛根湯來蘇散葱白散神木散。煩渴者与五苓

散作寒湯。醫諾心悶者。五苓散入辰砂細研和匀冷取水調服。兼与大全宝丹及小兒金丹丸。兩三方一服。頭痛者與天陽丸。大寒丸。茶周散之類。

○或熱少寒多或內熱外熱或氣熱相半。以骨節燙及脣腹作痛者可与不換金正氣散。人參白朮散。桂枝散。桂子散。桔梗散。杏

蘇散。建中散。章果飲。橘子散。麻黃散。葛根散之類。

○或不熱只是寒或吐或泻或止渴或利小便。或寒熱並而嘿

嘿昏倦者可与木附湯。四柱散。朱砂散。蘇竹丸。苦丸。千華散。君服前藥吐瀉不止四肢微冷。汗出如雨。嘿

寒。白朮散。吞東復丹。三十九至五十丸。甚者姜附散。加五苓散。同煎服。渴者与參苓白朮散。此一證二廣及澤州界上多有之餘火。尤此證發來須用子細詢問的實不可輕用誤人性

命切記。不可輕發以藥。

○若發作有時或連日或隔日或三五日一發。則熱多寒少。或但熱不寒者於未發前先与小柴胡湯。敗毒散之類。至發日却

服露天飲或聖散子勝金丸。嘔逆有痰涎者常山飲。消暑丸之類。有効如神。

○若熱少寒多或只寒不熱或寒熱相半者於未發前可多与不換金正氣散。建中湯。正氣散。平胃散。和脾散。加木散之類。至發日五更初即常山飲。章果飲。發火者燒效餅。靈瘡丹。於耆

及怯弱者不可服。自宜斟酌。

○孕婦患瘧疾誰爲用藥。但只可与章果飲。兼用平胃散。入培血少許用溫酒調服。

○瘧瘧瘧後。軟粥或爛食。更常調和脾胃。可与黃芪建中湯。四君子湯。嘉禾散。參苓白朮散。曹脾散。蘋脾散。蓬脾湯。平胃散。和氣散。思食丸。大小養脾丸。切忌生冷酒果。房色洗浴半月。

○傷寒十勸

○傷寒頭疼又身熱便是陽證不可服熱藥。傷寒傳三陰三陽共六經內大陰病頭不疼身不熱少陰病行反發熱而無頭疼厥陰病有頭疼而無發熱即是陽證。若醫者妄投熱藥以致死亡。

○傷寒當直攻毒氣不可補益。

○邪氣在經絡中。若隨證攻之三四日痊安。醫者必謂生須正氣

却行補益使毒氣流熾必多致殺人。

○傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥。輕服若陽病服之致熱氣增重或至不救。

○傷寒當直攻毒氣不可補益。

○難經云。痛爲實故仲景論。腹滿時痛之證。有曰痛甚者加大黃。大痛甚而反加大黃意可見也。腹身冷厥逆而腹痛者是陰。

須消息每見醫者多緣腹痛便投熱藥而殺人

傷寒自利當看陰陽證不可例服補藥及止瀉藥

自利惟身不熱手足溫者屬太陰身冷四肢者屬少陰欲陰外其餘身熱下利皆是陽證當隨證依仲景法治之每見醫者多緣下利便投暖藥及止瀉藥而殺人

二 傷寒脅痛及腹滿不可妄用艾灸
常見村落間有此證无藥便用艾灸多致毒氣積火而盛脹脹發喘以死不知脅痛自屬少陽腹脹滿自屬太陰此外惟陰證可灸

三 傷寒手足厥冷當看陰陽不可

一例作陰證

治有陽厥有陰厥醫者少能分辨陽厥而投撲藥殺人速於用刀蓋陽病不至於極熱不能發厥仲景所謂熱深則厥深是也熱深而更与撲藥寧有復活之理但看初得病而身熱至三四日後熱氣已深大便祕小便赤或譖語昏憒及別有熱證而反發厥者必是陽厥也宜急用承氣湯下之若初得病身不熱大便不秘自引衣蓋身或下利或小便數不見熱証而厥逆者即是陰厥也方可用四逆湯之類二厥所以使人厥者緣其脉皆沉然陽厥脉沉而弱又陽厥脉特復指瓜却溫陰厥常冷此爲可別

三 傷寒病已在裏即不可用藥發汗

傷寒病須看表裏如發熱惡寒則是在表正宜發汗如不惡寒反惡熱即是裏證若醫者一例發汗則所出之汗不是邪氣皆是真氣邪氣未除而真氣先洞死者多矣又有半在表半在裏之證及无表裏之證不惟皆不可下仍不可汗當隨證治而消息之

二 傷寒飲水爲欲愈不可令病人恣飲過度

病人太渴當爲之水以消熱氣故仲景以飲水爲欲愈人見如此說遂令病者縱飲因而爲暎爲喘爲欬逆爲下利爲腫爲浮爲水結爲小便不利者多矣且如病人欲飲一椀只可与半椀飲之常令不足爲善矣

二 傷寒病初瘥不可過飽及勞動或食羊肉行房事与食諸骨汁及飲酒

病方愈脾胃尚弱食而過飽不能消化石即再來謂之食復病方愈血氣尚虛勞動太早病即再來謂之勞復又傷寒食羊肉行房事者並死食諸骨汁飲酒者再病

太平盛民和萬物用

卷之三

公論之氣發於喉

脾胃積聚

由憂戚中或盛怒中動傷真氣致陰陽不和於胃陽少則壅滯不快飲食不下遂成陽虛之疾口渴氣散方萬覽中散而氣散沉香降氣湯分氣紫石英附子桂附湯大補陽氣之藥

氣虛腫滿者因脾氣虛而致頭面虛浮四肢腫滿腹肚膨脹如鼓上喘氣急者可散。茯苓散五苓散三和散分氣紫蘇飲木香分氣丸俞山人降氣湯小降氣湯蘇子降氣湯曹脾散嘉禾散。喘甚者可與潤金散款肺散。大便秘者与三和散。小便不通五苓散。

脚氣有數種痛不可忍者謂之寒煩而發渴者謂之熱而腫而癰者謂之濕用隨證治之不可一概論也。濕腫者可與黃芪中湯。小續命湯。風濕者可與木附湯。熱而發渴者可與紫雪。衝心悶者可與三和散麻仁丸。降氣湯。捨腰痛者可與大烏沉湯。

小腸氣膀胱奔豚等症皆因怒氣虛弱膀胱久
冷風溫乘之傷於腎經氣滯不散小腹刺痛腎經偏吊未可
服補藥先用疎導發散可興

蘇子降氣湯（五分散）
川練散（大沉香丸、白香丸）
仍炒面香燒鹽細嚼熱酒送下
或五香散（正元散、羅盤散之類）
小便不通者與雞舌香散（或五分散）如痛稍退只用平胃散
送下（同香丸）調理

癥積氣塊皆因氣虛及寒氣熱氣怒氣喜氣不和氣秋氣內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食用藥漸消

脾不能言利可与
丁氣湯 丁香丸 青木香丸 木香推氣丸 檉損丸 蓬前丸 積氣
不散腹滿物脹可與 積氣丸 三棱煎丸 心下堅硬結塊衝心
可與 温白丸 脹滿不思食者與 養脾丸 消食丸 梧柴子散 四君子湯
論脾實 久病脾泄腸滑不禁日夜無度虛羸者可與
平胃散 空心送下 向香湯 兼能調利大便 丁香豆蔻散 服諸
藥不效者可多与 人參豆蔻散 有數。更有一種大便如故只
是每日早晨水瀉一兩行日間都無事可服金鎖正丸丹酒止
即住服

婦人心脾疼及血氣刺痛者可與
通煎丸。此痛丸真拈痛丸性烈不可輕用如得升沉、安瀉分
的方可用之蟠於散舌苔散鹽煎散如意丸皆可。若
癩連腰背或小腸氣刺痛及虛弱老人宜大沉香丸兩丸作
服。立効。丈夫熱酒下。婦人醋湯下。如不喫酒姜湯下更可。與

氣散調和脾胃

七氣湯加止者與人參藿香湯。瀉者與大沉香丸。人參白瀉散建中湯。忽暴心痛者與蘇合香丸。樟氣沉香丸。

論心脾腹痛多有積或有寒積者可與溫白丸或保安丸。虛老人不可多服此二藥只與木香荊氣丸或感應丸。小獨聖丸理病丸。消去大積次與正氣散嘉禾散。脾散人參養散草薢流散橘蔥散。蘿蔥散雞矢散。枳肺散建中散。有寒者與大沉香丸兩丸作一服次與降逆丸溫中良姜丸。香薷散四君散。

姜丸。香薷散四君散。

沉香降氣湯烏沉湯青木香丸。七氣湯和氣散或人參丸。紅丸子小理中丸。沉氣沉香丸。丁沈丸。順氣散三棱散如意丸。蓬煎丸。桔梗潤肺大便秘者與青木香丸。脾痛者可與蓬煎丸之類。

肝脾鬱不快氣滯者可與

高氣散人參木香散參苓白朮散五蘭寬中散。噫氣吞酸脾痛者可與如意丸。食丸之類。

論心脾腹痛有積塊氣塊癰癧日久發歇不常者不可取轉宜漸次消磨可與

論心脾腹痛挨積丸蓬煎丸。小理中丸少喫。數丸常服漸消磨更與和脾散嘉禾散參苓白朮散四君子湯。思食丸。建脾陽建中散平胃散之類助其脾胃久而能去其根。若痛有休止或往来上下脣中槽悶時吐冷沫中脘不快嘔逆惡心者恐是虫痛可與集効丸或丸痛丸。其丸痛丸有利性不可多服。若卒然心腹暴痛脹急不得息往来攻衝悶絕惡心者恐是疰忤鬼氣可與蘇合香丸。若虛弱藏寒人可將蘇合香丸捏作餅子用火熨斗蓋之將藥餅安熨斗上燙令藥極熱以去其腦子性依法服之。若痛而不休脣鬲塞悶嘔吐不定粥藥不下者可與順氣散送下青木香丸。如无順氣散五積散送下亦得及丸痛丸三稜散。大沉香丸。

論腹脹者若因傷寒或寒熱瘡瘍或瀉痢大病之後只是喫食後便腹脹心膈不美飲食噫醋吞酸縫食些小亦齊脹者切不可用消食通化之藥若用藥動下轉加困重去生便遠也但可與

正氣散。赤朮散參苓白朮散四君子湯。曹脾散人參養散。太小養脾丸。草澄茄散思食丸。蓬煎丸。如意丸。瀉者與人參豆蔻散丁香散但得氣壯自能飲食加倍脹脹自愈。

論痰飲不化留滯脣院令頭目昏眩嘔惡不快腹中

消飲丸。宿水五苓散。有寒者与里中之青州丸丸子箭山人降氣湯。中酒渴及停食呕心者服興霸或飴酒過多者痛嘔腹痛不思飲食。与射法半夏湯。亦飲丸散。不力於砂化瘀丸。半夏湯。

小峰氣湯

大抵熱來皆從肺出。醫家細論卷第十一有因寒者有風者有熱者。則寒則外至熱則內。則寒則溫之自受其邪。則諸經腑藏之寒乘而爲病。則散之寒則溫之也。因風旨遇風則散。甚因寒者。惟寒則散。則因熱者遇熱則熱。即散更有。驗甚的。但問遇夜飲酒時。夜間如何。若喫酒後。則甚則有熱也。喫酒了。嗽減則有寒也。延青白者。有寒。稠黃者。有熱。而証幾矣。

口氣寒。寒暴發。咳壅咽不利。可與金沸草散。平下丸。吳花膏。華蓋散。五味丸。潤肺丸。敷肺散。善金丸。小兒潤肺散。窮冬柏散。論寒吸及復冷發。或吐青痰。遇夜尤甚者。可與細辛五味子湯。卷中湯。五味丸。俞山人降氣湯。人參養生湯。潤肺理中丸。溫肺細辛湯。金乳補肺湯。清飲丸。倍木丸。香牛丸。分心蜜散。參苓白术散。愚風。有寒者与小青龍丸兼服。駁肺散。又參款花膏。論熱嗽。肺兩不快。氣壅上盛。臉赤口舌乾者。可与金沸草散。大阿膠丸。人參養肺丸。養心飲子。不參款花膏。平夏丸。華蓋散。入參潤肺丸。因痰上膈。前丸。人參養肺丸。金沸草散。青州白丸子。川芎丸。雞蘇丸。久病嗽及虛老人。宜与溫肺丸。人參補肺湯。丁香半夏丸。又參藿香湯。花枝丸。寒熱相交。秋冬之间多有此証。可与欵冬花散。平夏丸。華蓋散。不參款花膏。入參潤肺丸。小兒潤肺丸。青金丸。潤金散。一貼作二服。老人尤宜服。喘急氣促。睡卧不得者。与定喘湯。喘應丸。薦煎散。深氣湯。勞瘵潤金散。入參參肺丸。華蓋散。之類。唾膿血者。与欵冬花散。九仙散。

論諸虛證候

而

痼冷

背因肺氣虛。順下元積。令腰背疼。痛脹。倦怠。面白無光輝。神不爽。唇口乾燥。眼暗。耳鳴。小便滑。數夜多異夢。盜汗失精。不思飲食。日漸羸弱。同上。

鬼絳子丸。安腎丸。八味丸。元比山藥丸。黃芪建中湯。帶香丸。脾胃虛弱者。兼服壯胃茶。虛損甚者。可與麝香鹿茸丸。沉香腎散。丸。大法據黑錫丹。金鎖正元丹。張赤馬玉霜丸。正元散。沉香散。治心氣不足。神思恍惚。言語錯繆。驚悸不定。夜多惡夢。

同上。定志丸。瀉氣丹。鎮心丸。入參山氏散。外香散。薑元湯。養華
白木散。治小便白濁。利精可與。補真心丹。降心丸。威

羌九丸。志丸。今癧虛拘急甚。今渴不固者。与李氏正元丹。

腰痛者。与青娥丸。甚者。与神應丸。黃芪丸。穿山甲。白木散。

久。退风寒。痛在筋骨者。黃芪丸。立効。虎齒散。至午后。熬

甚者。空心服安腎丸。八味丸。山藥丸。沉香鹽甲散。參苓白木散。

嘉禾散。食后服。人參當歸散。若嗽涎黃或有血者。臨卧服。人參

芥肺丸。因馬瘞用力太過。吐血不止者。与服傳降氣湯。或小

降氣湯。多加人參煎服。狀發熱。甚者。与逍遙散。胃中熱

者。与人參黃芪散。虛弱老人。可与黃芪建牛湯常服。虛汗

盜汗。心忪。氣短者。可与牡蠣散。止汗散。黃芪建牛湯。大山藥丸。
人參當歸散。加小麥煎服。自汗不止者。采附湯。正元散。心

熱盜汗。可与痕砂妙香散。

論心火。心火皆因元氣虛損。下冷上盛。致水火不交。陰陽失序。手

足厥火及傷寒陰証。霍亂轉筋。下痢。父泻。脈候沈微者。与

(黑錫丹。乘復丹。金液丹。附子理中丸。益貨正元丹。四神丹)

○論積熱証候



咽喉口齒

眼目

論頭目。上焦壅熱。心經頸渴。頸結核者。可与

(玉屑无要散。牛黃涼膈丸。消毒犀角飲。四順飲。解毒丸。積熱三
黃丸。咽喉腫痛。喉物有碍者。可与如聖湯。八正散。乃順飲。龍膽

散。甘露飲。洗心散。牛黃涼膈丸。犀角飲。薄荷前石龍散。積熱
小便不利者。可与導赤丸。五淋散)。大便不通。清心飲。三黃丸。

○心火。口舌生瘡。可与碧雪散。甚者。解毒丸。洗心散。玉屑无要散。碧雪散。

○牙齒。牙疼。其証不一。有熱痛者。滿口齒浮。因上膈有
熱而痛者。有虛痛者。皆因腸經虛熱。虛熱之氣上攻。而痛有風
神才痛者。須用子細詳証方。可服藥。齒齦浮腫。口內氣熱。滿口

齒浮。而動此熱証也。可与

阿頰飲。甘露飲。洗心散。龍膽飲。清心飲。子八正散。次煎升麻葛

根湯灌喉。吐去兼嗽些。小不妨。腎經虛熱。虛熱之氣上攻。齒
痛及老弱人。齒痛者。可与黃芪丸。安腎丸。鹿茸丸。八味丸。次用
升麻葛根湯灌喉。用麻牙齒疼痛。後生壯實者。可与細辛散。甘草散。擦去風吐出痰。良久。以升麻葛根湯灌喉。權散即吐。次与黑神丸。乳香丸。白龍丸。飲酒齒痛者。少半

水洗散或用藥煎酒陽冷食濕或細砂嘴傳通用
內寒候也或見黑花或有冷感者是肝腎俱虛不詳便服涼藥
只可與

明眼地黃丸菊花散駐馬丸涼心丸不暉不痛不赤亦無翳膜出
有風熱眼痒澁昏暗有淚視物不見以可与善薩散治之常所
睛丸發雲丸菊花散紫花散青花散青風眼痒內生物蒸氣泡
散紫金膏洗春雪膏點外障風膜侵睛丸內久病老空心可
與駐景丸菊花散食後服決明丸發雲散善薩散紫蒙花散秘
傳半肝丸點刺膜膏良以用紫金膏洗或春雪膏暴赤服昏
澁疼痛蓋明下熱決不可點亦不可洗只可与還睛丸洗心散
洗肝散八正散目露飲善薩散發雲散。睛痛不可忍者与羌
活散不睛丸兩丸只作一服立止并治頭風痛神效。臉皆赤
闊視物不明昏暗有疾者肝有風也可与善薩散發雲散洗肝
散菊花散紫蒙花散決明散少用紫金膏洗春雪膏點

龍腦丸蘇丸薄荷前頭物湯加荆芥煎

論寫病證候

暴渴水瀉此二證秋夏間多有之皆因飲食所傷及
食生冷之物暴渴不住頤用子細詢問若噫氣吞酸乾嘔氣臭
者此是傷食也可先與

感應丸二服次與理中丸入參芩蔻散守中金丸來復丹溫胃丸
已上藥性皆溫其者與附子理中丸四柱散已寒丸溫中
良薑丸二薑丸火輪散朝真丸正元散金液丹二氣丹已上藥
性皆熱丁香豆蔻散微熱溫固須用仔細審實無傷食者不可
與感應丸使用止瀉藥○吐瀉有腹痛者可服一木香推氣丸
沉香丸丁香丸感應丸○久病虛怯年高及氣弱人藏府泄瀉
久不止者可与一人參豆蔻散厚陽丸參芩散白朮散金不換正
氣散四君子湯之類是也已上丸二十三論俱也終

