

永類鈐方

三



水類鉉方卷第四

碧山李仲南集成



七氣

人稟天地陰陽之氣以生氣升降周流而四時皆自得而無窮者所以爲元氣也。蓋天地之氣於肺臟者外因也。故見於外而類例之中七情之氣乎於肺臟者內因也。二者不同氣。李子是七尚諱於陰陽有形之氣知天元真一無形之氣袒者則無病矣。六腑惟膽有者善惡竒恒。庫府非轉輪例故能蓄鬱而爲病也。六腑而膈晝癲而積聚肢滿且見客門皆藏氣不行鬱而生痰隨氣積聚癰生諸證。先明寒熱次分五藏寒則經絡凝滯故氣乘熱則發衛腠理開通氣泄而汗亦出也。中藏經氣諸氣寓肺陽中之陽居中之爲華蓋系清陽升之氣傷寒發端有太陽陽明二經屬熱可知。故仲景所用皆清利之藥簡易少氣飲之論有食益溫氣藥宜少用者合於五臟晝支陰脉之說用藥者當通論之。至於氣之爲積聚者。亦先清利而後溫散爲可法也。

脉病

積毒之脉  
盛而緊浮  
而牢牢強  
急者生盡  
弱者死

喜氣散故傷心自汗  
怒氣聚故傷肝上氣症之  
憂氣聚故傷肺夜卧不安  
思氣結故傷脾腹脹肢情

腐敗分  
木香分  
人降氣  
集葉

氣湯集局方  
水湯加減降氣  
消氣散寒

降氣湯大降  
氣湯宣滯門  
禁濕止吐養氣

大補元氣湯

水流氣散前  
散蘇合香丸

卷四

三

脉病

詒

其麻福既  
爲飲淨而  
清亦爲飲  
又曰蒸微  
清爲飲  
古子沈

懸飲	飲水流脣、咳嗽引痛
瀉飲	飲水流於咽、當重汗 不汗身寒重
支飲	咳逆倚息、短氣不 卧形如腫
痰飲	其素盛今痰留中 灌灌有聲

治

三因裏裏湯脉弦者倍本元半夏參苓湯四  
破飲元枳木元濟生枳木湯  
大青龍湯加減大青龍湯  
三因裏裏桂枝湯脉沉緊不和煎小承氣湯  
小半夏湯真經大棗鴟肺湯  
三因裏裏脉下有悸味苦蘿弦要散多本飲破  
御院不耆質卽元本事完汗元一清即愈水元

飲元  
五味子湯

卷之三

其素盛今  
漒漒有聲

瘦中

三

瘦人肺下有寒

本草綱目

卷之三

七  
飲破飲元





卷四

傷寒嘔吐 乾嘔 吐逆 一

胃家水谷脾主運化脾胃所傷遂成嘔嘔者是陽明無陽則厥無陰則嘔嘔者是陽明證不可下。胃經胸硬滿不大便而嘔古有治。但景石嘔多雖陽明證不可下。若胸脇滿而嘔日晡發潮熱着嘔不止心急鬱鬱微煩太陽少陽合病頭疼脅滿口苦咽乾嘔來寒熱自利又嘔者。

春初肌肉癟疹喉而悶但嘔清汁乾嘔來寒熱不利身熱胸脇痛利爲胃之困脉不弦爲順。谷入胃而嘔屬陽明傷寒嘔來寒熱未後嘔胃脫不餘熱。手熱心煩渴而嘔胃脫有熱表不鮮人有氣乾嘔微利發熱咳嗽。醫治因有水因下利脾胃有熱乾嘔傷寒解後虛弱少氣氣逆嘔。

虛轉死此爲巴非大黃牽牛之過也。箕城酒治病嘔吐年不愈皆曾寒食之者半甚青竹葉附種種熟燒雖燎莫殺數次愈或被割且半年大便秘燥小便亦黃余視之言諸瘻。呻吟皆属于主大便云謂上焦也火氣炎之氣謂歸熱甚而爲嘔以壯丸三十年行燥真陽始何啻如其人暑風三百頃水冰呻之漸投涼藥姜麻時時嘔。數日後大啜飲食精神衆長如昔。生平各半兩甘草去皮炙之而當歸酒洗焙錢半兩。三元承氣湯北大黃去粗皮硝即硝桂厚朴姜製大生用各半兩甘草去皮炙之而當歸酒洗焙錢半兩。夜啜每服半兩。蓋半生熟五片早不擗開同前七分。素摩熟服不拘時候。重者每服二兩加姜三片早不若不納藥須時時呷服之以通爲度。雖爲下藥有止有補卓有奇功。制河間加甘草以爲三元承氣。以甘和其中最得。但是秘試論只論四味當歸不在試論列不可用然等分不多微用亦無妨。

四生丸治一切熱常服肢體潤澤而老去大黃去粗皮酒洗紙包煨杏仁過存性。西黑牽牛二兩取頭末之兩皂角子半錢。朱砂六錢。制大黃酒參之。兩制厚朴。附桂枝。姜炒草各一兩。葛根三兩。去皮黑大黃三兩。取頭末之兩皂角。用素蜜用兩半硝生用坐兩半。爲末滴水爲丸梧桐子大每服三十丸。白湯送下。

對金橘子半錢。朱砂六錢。制大黃酒參之。兩制厚朴。附桂枝。姜炒草各一兩。葛根三兩。去皮黑大黃三兩。取頭末之兩皂角。用素蜜用兩半硝生用坐兩半。爲末滴水爲丸梧桐子大每服三十丸。白湯送下。

姜半錢。朱砂五片。玄霜。大黃。桑白皮。各一兩。蜜丸。水煎服先服承氣湯夜服半丸。效進食不格拒方用蜀金散子。然初病作且於嘔嘔胃熱類內是用清利之藥。審其虛實重輕方用前藥更佳。

脉病證

治

四

卷四

弦長而緊

脉

病

證

長大而弦

寸數

孚大而弦

脉

病

證

短小而弦



朝起嘔吐飲食酒虫積

蘇感元金露元剪紅元勝紅元青州和三種並元

夜則噉噉而走

婦人  
雜記

齊生參橘龍於蜀南平真湯

中華書局影印

因酒而醉者多矣而酒有善惡不善者不醉

後漢書

利傷寒氣。多嗛渴。亦有羸瘦。而無痛。則肺胃虛寒也。寒熱相用。則寒熱互見。虛寒者。從皮毛賴之而潤澤。邪水由蒸而生養。凡傷寒。感冒有咳嗽。為寒無咳嗽。為重以和氣柔傷。入藏也。若傳入五藏。不而咳漸、華蓋之下。開口之中。反衰。古人多作丸噙之。傷寒咳而小便利者。莫可汗。汗則更屬寒而更渴。清腹中堅。為逆脉。散署爲火。刑於肺。金氣與刑者。即。

用  
系  
詔

乾嘔發熱而咳爲水飲。夫寒相合也。  
少陰之火客於中焦，腹脹疼滿，小便有水，便不利。真武湯加五味子細辛乾姜。病在陽以青龍  
自利而嘔，爲水飲與寒氣相合也。夫病在陰以真武湯主之。  
三陽寒中風在表寒熱胸膈刺痛不食心煩。小柴胡湯去參大棗生姜加五味子乾姜。  
少陰嘔吐或吐湯邪自表傳裏動肺而咳。

卷之三

雜病咳嗽

咳嗽自肺傳至藏腑咳不已而後六府受之六府受之至三焦受之咳而腹滿不欲食其始觸於肺終則聚於胃使人多渴噏而面浮腫氣逆也治法當審肺證因若外因邪氣發發散之須厚甘廉實冷熱若內因之情則隨其部位在與氣脉相應浮緊爲虛寒沉數緩緊默弦濡爲少陰滑爲多形當以順氣爲先下藥次之有停飲而咳又須消化之功不可用薦梅鹽棗游酸之藥其寒熱除亦可借用補藥尤忌憂思過度勞倦耗傷遂成瘵疾養脾生肺

脉病證

**浮**  
風 惜寒尚熟送風自汗煩顛草弟清

**寒** 發熱無汗煩躁盜汗呻吟熱退  
止者冷也。令小兒當者自然也。

著頭疾有熱

治

卷四

六

四逆散加五味子乾姜

猪苓湯古今錄驗稿皮湯尤良

卷之二

**天陰病**多厥逆嘔吐痛或泄利而咳  
**少陰邪傳裏動肺而咳**

柳文選

卷之二

瓦繁

真武湯加生地二錢、熟地三錢、芍藥一錢、甘草一錢。此方能散寒除溼，又可止渴。

傷寒喘急

中藏經云疾風暴雨天地霑肺乃陽中之陽道氣屬肺諸喘亦屬肺居立歲之上爲華蓋無清虛而欲寧緩也陰陽不和形寒飲冷則傷肺也、素逆即行氣粗息數張口擗脣指身滾肚是爲喘也傷寒發喘有太陽陽明二證屬熱可剉河間玄參水爲陰平手連鍛熱火宜陽生平氣陽寒則息遲氣微熱則自數氣急而爲喘矣故仲景所用皆清利下藥

前五味子調酒中湯鍊乳補肺湯熟用東參  
子加藕節地黃汁搗研加蜜蒸咯無蜜童子  
小便浸杏仁凍膏入蜜少許噙

小柴胡加桑白皮麦門冬竹葉石膏湯玉液元三參散	局方溫中化痰元溫肺湯湖城理中元芩參散	救嘔吐全飲食痰物皆盡肝木克脾土	實熱胸滿咽喉赤小便澀成黃疸
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

左尺浮濶	而數
恐傷肺	懷口引肩等痛
勞咳	身疲盜汗異聲發寒熱 骨蒸或有傳
三因扶養補宣濟生園參飲子潤肺元	御院紫參元局方人參養肺元通見勞瘵門
簡易九室湯碧沉香三因平氣方參蘇飲加枳實	園參飲加木香白芷人參紫苑湯橘皮大降氣湯
理中湯加五七孚沉附湯黑錫丹	御院蠟煎散局方養肺元潤肺元三夏元參散
虛寒頭眩盜汗四肢厥小便滑	生火伏
氣結 胸滿夜卧却食不止	寒熱
靈芝	諸熱脉沉而滑



次瀉而  
舉者病數  
者竈也  
其形瘦也

## 下虛

肺滿而喘六滿七情  
陰陽失度

飲啖傷脾

吸腫肺胃滿  
喫紅肺瘡

而瀉湯送下真鍮丹次香降氣湯下黑錫丹前川陰藥湯

濟生四磨湯半升正丹紫蘇子湯

濟生六味藥壓散三因亨壓大棗湯

## 年高

咳嗽吐聲產後業  
寒感風寒

濟生志參湯四磨湯下黑錫丹

## 年少

咳嗽經水不隨道肺  
氣壅肺

三拗湯加芎歸蘇子降氣半青州人參定喘湯

## 婦人

### 產後

感寒傷生冷察其令  
熱不可發汗

血入肺脅下有痛惡寒未  
盡或遇多血氣虛聚於

### 血崩

肺為孤陽總陰難治  
所致經遇多為孤陰治

芎歸湯調瀆蘭散人參桑白皮蘇木前湯調經思

### 血滯

丹丸為瘀吐於脣風冷  
所致經遇多為孤陰治

局方紫蘇子丸其則蘇子降氣打和濟生四磨酒

### 勒喘

所致經遇多為孤陰治

金沸草二份根甜茶末七分爲末冷水調瀆清持肺之虛寒

### 血滯

所致經遇多為孤陰治

芎歸湯加人參羌活桑白皮杏附子澤蘭葉

## 傷寒咳逆

### 脉病證

### 治

咳逆古方謂之喊喘則喉中吃吃有聲也吐利後多作寒率胃寒則噫有言虛膈

熱咸父而收氣不回有噦而心下緊若喉悶乃膈間有痰傷寒久病得此其憲年高氣虛多後寒

遲年七十歲治喘嗽長年用蘇子姜皮及李一枚色立一莖入半夏一个一莖入杏仁半個用生姜汁製杏仁麻油  
製杏仁蜜製半夏右件一莖火炙黃色爲末每用一莖半夏心膈眼生姜汁調舌點哭有神效

一方青皮一个銀開入炷一立火上燒煙不爲末生姜汁酒調一呷過口即定神祕醫說

聖惠方上氣門載數方皆清利藥絕好

傷寒柴汗後外氣怫鬱不飲復汗而喘  
陽明證潮熱短氣脅脅痛鼻乾無  
汗身黃小便難大便溏而噦  
發汗後表不解飲水多乾嘔微利發熱  
咳嗽微喘爲表有水  
小便不利而嘔渴渴不眠  
傷寒嘔而腹痛或小便不利視其前後  
何部不利利之

發汗柴後半症嘔微利氣虛  
四逆散逆腹中痛或泄利而咳  
腹痛不大便頭汗出腹滿而譸語甚  
寒陽中風以火劫發汗陰陽俱虛身體  
而腹又不泉腹滿加薑不治是爲真病

緊細浮大濡緊  
沈緊

四逆湯加五味子羌姜  
不治至此極矣

# 雜病卷之三

## 脉病證

治

緊細

虛浮

吐利後胃虛寒而胃手足微冷

濟生養活附子散歸帝湯又稱帝煎湯或蘇合散

吐利後胃虛熱面紅身大溫

濟生橘皮湯桂人半夏生姜湯橘皮竹茹湯

太病後脾胃氣裏中州已無土

治人橘皮竹茹湯濟生橘皮湯又草澄茄良姜全參白芍

婦人產後久期門三焦神效婦人乳頭草木通內外燒男丁乃乳小者乳下指爲華男女右經乳正直下指心中動脈腹足少陰小直火真病亡上醫說

## 傷寒霍亂吐利

吐利與霍亂不同若止吐嘔而利絕謂之吐利心也止利躁擾煩亂乃爲霍亂傷寒吐利者邪氣所傷霍亂吐利者飲食所傷心以傷寒言者吐利而加之頭疼發熱身疼惡寒等證偏陽則多熱偏陰則多寒又以此審吐利之寒熱剝河間云霍亂者焦熱氣甚則傳化失常而吐鴻火性燥動於心或謂煩渴爲熱不渴爲寒然其始得之亦有不渴者津液過多則亦燥渴然云熱無吐鴻止是停寒者誤也但寒者

## 卷四

十

## 脉病證

治

脈沉細而運熱旁脉實大而數或內因損氣亡液過多則脉亦能實盛而反遲緩難

亦亦爲熱也脉洪大可治脉微舌捲裏縮難治脉微氣少不詳亦難治

浮數

吐利止身體痛不休和解其外

桂枝湯

浮弦

發熱汗出不解心下痞悶喘而下利

大柴胡湯

弦緊

頭疼嘔吐而利熱多而渴

五苓散

沉遲

少陰病加吐利手足冷煩躁欲絕

寒多不渴理中丸

微欲絕

百合傷寒證虛勞大病後行臥不

通脉逐逆去表藥桔梗湯麻黃升麻湯

傷寒利

安飲食或美或不飲如健人而不能行如寒不寒如熱不熱且苦

四逆湯理正湯加附子生用

乘寒利

便赤而吐利

通脉四逆湯加猪膽湯

中暑

吐下利心腹痛渴煩四肢逆

百合知母湯骨天門冬湯合地黃湯

冷汗

汗出兩脚轉筋

雞子湯桂圓七房散滑石散

虛

黃連香薷散姜蔻涼冷膏藿香正氣散

枳把散散暑涼正連姜荷乳散名一香散

## 雜病霍亂吐利

雜病霍亂吐利皆由飲食不節脾弱不運風寒所引陰陽陽絕而成甚則遍身轉筋

痛而麻者谷縫縮直用附子陳皮湯泡洗次投姜附理中湯外不當審其氣熱於其脉氣流微洪盛許而則云有乾霍亂者上不得止不得利所傷之物不得出泄壅閉正氣而脈變者有濕霍乱者皆在胃中吐利而所傷之物得以出泄水谷泄尽方哉得不死又有似而不能利而不利頃刻悶絕先多灌以鹽湯使其吐尽而食徐用藥調治之

脉病證

肺代者掌  
霍亂而  
絕亦霍亂

脉浮洪可  
滻、遲氣  
氣中 七氣鬱結陰陽不和

卷之三  
飲水眼涼過食生冷利口河間云序  
轉筋熱氣乘乘轉動

也陽也  
一內外踝

**頭暈** 腸中平乃止若極者手足厥然必死  
老弱人子金盞中散麥門冬乾姜各一兩參白朮各三兩煎服或蜜爲丸酒下  
霍亂大渴能殺人黃芩米五升水斗煮人桑根清稍飲之虛煩不眠渴生既濟湯

霍亂後煩熱多渴小便不利。濟生麥門冬湯。脈絕寒多而冷。濟生通脈四逆湯。

傷寒泄瀉自利下利

脉病登

太陽陽明合病為在表自利必發散

太陽少陽合病半表半裏及自利  
陽明少陽合病少陽邪氣入府則發  
寒中之發利胸膈不快或吐或利

下後陽熱而利利不赤下痞鞕桂枝証鹽汗而喘醫及之利蒙不止

**沉鬱**  
下利欲取水故大便濁小便自可此有抉  
下利雖有表証不可汗走津液令腎虛  
少食病口渴肉乾心腹滿而端不大便亦

而滑  
微細  
濡而  
下清水也青心不痛  
少陰病心煩但欲寐或自利而渴  
切得病便噦支逆冷足寒惡寒或引衣  
自蓋不飲水或下利清谷

卷四

十一

治

消寒加減用中湯著香散散風寒濕寒藥方  
一夏月九味五苓散黃連香薷散二香散姜附木附

諸病訛仁益能取效。用大黃中得黃差。  
清生理中湯三因氣湯理中和。烏沙湯姜鹽煎或調  
半金用北艾煎煩服。或服參鬚湯。

理中湯治中湯姜塗煎仁齋木瓜湯姜塗飲利不止手足厥濟生姜附湯加減或白朮薰酸梅煮灌吐宿食

**批酒調石草霜散**已死腹尚硬塗以鹽紙臍中灸之杜仲灸  
內外踝上內筋急灸內外筋急灸外腎心痛姜汁調藥敷令香服  
真氣近左舌邊也出灸法更詳轉筋入腹當剗去病全其

桑葉甘草各五兩附子半錢各三兩煎服或蜜爲丸酒下  
縮必死

氣清稍飲之虛煩不眠洛生既濟湯  
湯脉絕寒多因冷濟生通脉四逆湯

十一

傷寒言自利下利者不經攻下自然溏瀉也傷寒下利多協熱雜病自利多責爲寒傷寒自利者不可刻服寒藥及上寫寒心之氣又不可妄用溫藥

未詳者以陰文不可復用則棄之江曲  
不得眠

**浮** **太陽陽明合病為在表自利必發散** **葛根湯發汗之**

太陽少陽合病半表半裏者以自利  
陽明少陽合病少陽邪氣之府裏遂  
寒中大陰不利胸膈不快或吐或利

下後陽熱而利利不止不痞鞕桂枝証血汗而喘噯及下利蒙不止

**沉鬱**  
下利欲便水故大便溏小便自可此有抉  
下利雖有表証不可汗走津液令胃張  
少食病口燥肉乾心腹滿而端不大便亦

而滑  
微細  
下清水也青心下痛

切得病便吃逆冷足寒惡心  
自蓋不飲水或下利清谷

九

自利身体痛在便利而身体痛當表裏大便如常身體痛當裏

九

自利不渴屬太陰藏寒也

四逆湯等湯

白通湯白通湯加附子附湯通脉四逆湯

九

自利而渴屬少陰

少陰病泄利下重不可投熱藥

尋常胃中未和腹中陽鳴不利

河後適六經不利

下利心下痞腹中雷鳴

少陰下利六七日咳而渴心煩不得眠

少陰下利咳嗽而支沉重疼痛小便不利

利自下利而咳

身冷四肢腹中痛或泄利而咳

少陰病下利咽痛腎滿心煩

中寒下利手足指微冷

少陰下利不虛足微冷無熱候

陽毒証發躁狂妄言頭赤咽痛

身斑或下利赤黃

太陰腹滿手足溫自利身不熱不渴或腹時痛

浮

沉

浮

沉

浮

沉

浮

沉

浮

沉

浮

沉

浮

浮

浮

脉病證

卷四

十三

四逆湯理中湯

理中干姜湯

增損四逆湯

猪膏湯

桂枝湯

真武湯加五味子干姜芍藥

病在陽則小青龍湯病在陰則真武湯

四逆散加五味子乾姜

**脾腎** 氣虛清晨泄下三矢

濟生方神元丹 濟生東內元

利 轉筋 入腹痛

木附湯生料附子理中湯快易正氣和香薷散姜芝散煎或加寶螺散不煎而見霍亂門

愈大实

飲酒過度脾經受濕

平胃散理心湯酒芩木香東達元

麻疹 妒入胃或涼藥過多

生料四君子湯入肉豆蔻木香

食魚蟹

黃橘皮帶白濃煎服

筍菌菜果

姜附調射香末姜汁豆豉湯下三錢乃

脾泄久不愈黃連一兩生姜四兩同搗炒姜乾脆色去姜用黃連為末空心臘茶清調下良

腎泄五味子末米飯服之五味子焙丙淨細粒綠豆莫茱萸半同炒熟末飲調下又神元養氣丹

傷寒大使秘滯

附不大便大便難大便黑大便溏

太陽者寒癥之本傳導之官出納變化係焉人或傷於風寒濕氣盛發汗利小便過多走枯津液腸胃燥滯秘塞不通

(脉) 痘證

(治)

數傷寒數日不大便大便難及有燥屎皆知當早又有陰結陽結之異

先大柴胡湯後大承氣湯

陰結證不能食身體重大使反硬

外蒙承氣丸去消

太陽証能食寒反惡寒潮熱挾半心脹下汗出大使硬小便如常

少承氣湯以和之

腹滿而喘或譳語半足溫小便亦屬陽明

麻子仁丸六分丸

太陽病不大使六七日有燥屎

用桂枝湯

陽明病不大便六七日有燥屎

小柴胡湯

大便堅小便數不可下

大承氣湯

傷寒不大使頭痛有熱是裏証本可下若小便清

輕者白虎湯甚則承氣湯

知仍在表當汗此二証俱見

白虎湯承氣湯

心下滿食大使硬是裏證可下若頭汗出惡寒手足冷

小柴胡湯大承氣湯

無表裏証易微熱大使難此爲實可下

抵當湯

若已下後脉數不解發熱則消谷善飢至

大柴胡湯承氣湯

六七日不大便者有瘀血

輕者白虎湯甚則承氣湯

陽明似陰手足逆冷大使赤或大便黑

大柴胡湯

拘急証畏熱飲水或揚手擗足煩躁不眠大使難赤唇齦

小承氣湯微和其胃勿大

寒熱嘔吐日頻日發作无時大使秘溫瘡證

泄大柴胡湯

陽明潮熱寒差腹大滿不通者

大承氣湯

或如悶脈微濁

大柴胡湯

腹滿大使秘按之而痛者寒痛也桂枝加大黃湯黃連湯

大承氣湯

傷寒十餘日外用小柴胡不愈若大便硬

利譜語有燥屎

糞

宜小柴胡湯利氣得藥解

大承氣湯

脾約丸散神功丸

少陽病陽下硬滿不大使而嘔吐白胎欲小柴潤津液治下  
少陰口燥咽乾或腹滿不大便或不利津液下痛積証也

腳氣暑中陰所患必熱大使秘

腳氣証頭疼身熱支前痛大使祕或吐逆腳氣弱

賓郎散

協熱利者將下熱大使赤頭脣間津液始敗黃連湯三劑熟艾湯

并見腹脹門

血証不發寒熱小腹痛輕小便利大使黑身黃發紅

并見腹脹門

寒毒入胃脣下寒腹脹大使或東向或青黑色湯理中湯

四逆散加薤白

時行民病驚瘧即鴨瘧也瘧者胃小冷水谷不別華陀云寒即

瀉熱即乍汗景說初鞶後瘧有二証小便不利小便不利水谷不分

微發潮熱而大便溏滑而嘔

小柴胡湯

傷寒婦人新產陰陽未和因食房室婦人則裏急腹痛多陰陽易燒棍散當歸梟散

小便自利發狂大便黑瘀於血証

病差尚微煩坐便硬大使少不可下小便著急津液還入胃先鞶後瘧當自愈

十四

## 雜病秘結

五藏之氣貴乎平順陰陽之氣貴乎不偏則津液流通腸胃潤若三焦氣血運轉不行壅結於腸胃之間遂成五秘燥則潤之濕則滑之秘則通之寒則溫利之審証虛實脉沉澀為合

治

風秘 元用藥不適或發寒發作有時隨風氣中

三和散 脘仁元 楊氏潤腸湯 滌生枳壳元

前簡易順氣元 仁齋潤腸元

十四

寒秘 隱陽不調寒氣內搏

一术附湯加枳壳仍如醫湯除宣氣 薦元黑錫丹

熱秘 風熱傳內肺肺壅併

三黃湯 香連元敗毒散加薑蜜 玄薄荷生姜

濕秘 脾虛停積或腹脹氣

濟生賓即元 脘仁元

年高虛弱三焦氣虛津液枯竭

退奇生船木姜早加蜜一起煎 濟生橘杏元 三和散

氣秘 脈經不和喜怒所致

五仁半硫元導掩法 退奇用不蛀是角當申取寸

婦人新產亡走津液府燥乾

去皮沸湯治半益定候冷服以芻補之

飲食毒蓄三焦氣實藏府壅結

楊氏五元蘇麻蜜飲濟生潤腸元蜜導法

藥石毒氣內蓄腸胃

香連元麻仁元 濟生賓即元枳壳元

熟角燒存性爲末每服錢千金方加腹脹如破氣促火麻仁炒姜壳半兩角酒不作末生薑

研熟湯調五苓散又三和散加工不留行麥門冬

而端沉香三分淨青皮三錢砂仁各七分豆廿粒同三味炒去巴豆加凈陳皮三分  
制枳壳二兩蜜即砂仁各五分白茯苓淨香附子各五分甘草三分又姜糖  
鹽不洗淡豆豉廿立盞一捻生姜塊胡桃大同研爛炒溫填脣內以紗綢定良久即通

小

黑

求

# 傷寒下利膿血

傷寒毒熱不消日晚上極復利便利膿血

游其熱利

地榆散

黃連阿膠元通見高齋

赤石脂元

## 雜病痢

古方端平助利疾由脾胃虛而受積飲食不克化六淫所干而或當走利之藥然後辨其寒熱虛實陽熱亦者清之傷冷而自著溫之傷風濕半分利之本班葛參溫涼之藥酒食忘情然或久毒痢者則是毒積滯不可用此虛之藥宜酸苦甘鹹苦酸收苦堅甘緩鹹濡也

### 脉病證

治通見前腹瀉篇門

潔

沉

弦

數

風寒純下清無爲風身

痛或下紅水

冷 血寒則寒便清

白不渴

熱 小便數赤澁

時行無熱則鮮

小便多而清白

腰重身重

濕 下如糞汗小便一

靈 谷化

虛無

實熱 换熱下利小便澁

積冷 下利清臭寒濁

積聚 蓋有積也

酒毒

紅痢 手足少陰不渴便

不赤泄是冷証

白痢 煩便赤瀉是熱証

五色 脾胃虛風寒者濕飲

食毒所致

血 血留腸胃或過

服地榆

香連元散皆蘇子散加枳壳黃連香薷散香連元  
胃風湯味甘傷谷氣血痢脾腎素壯可服  
理中湯附子理中元二姜元芍附元駁車元朴附元紅元子  
濟生當帰元簡坊四神元御院椒艾元豆蔻兩腸元  
生料五苓散蘇子散元敗毒散加陳木香草煎獨連湯  
云黃湯加枳壳八正散黃連阿交元土暑毒小柴胡湯  
時行黃連三兩梅子水并煎并瀉姜加雞子三枚能起死

卷四

十五

正氣散和黃連赤芍散亦名香薷五苓散和除濕湯  
戊己元百一退茱蓮元

金液丹附子參葛根湯斷元調藜車黃八香散神艾參香薷  
御院椒艾元固勝元濟生當帰元桔梗八香草元生薑附子  
蓮荷鴉梅獨連湯香連元濟生歸陳阿交元烏梅元

金液丹附子理中湯附子火輪元御院椒艾濟生香薷元灸火

金散三黃湯加枳壳

濟生黑元子感應元蘇感元三棱煎元脾積元溫回元

本事景砂丹軟膏石積黃連阿交元

葛根黃連元酒連元紅元子同服桔梗李香連元獨連枳壳湯

香連元地榆飲加黃連麥門冬敗毒散下香連元

生料參苓散黃連枳壳亦芍藥

百倍大黃商連酒浸焙乾各爲末元赤術用黃連元甘草湯下

白痢茱萸元乾姜湯下赤芍和甘草乾姜湯氣痢在桂

地榆散下香連元水槿葉或桔梗炒煎湯服治腸風下氣佳  
四物湯加厚朴草霜亦可烏梅米煎使小有熱即更連亦扶勞

胃風湯濟生烏梅元芍根元木車水香散

# 氣 痛泄氣

小便不通 離熱便寒毒氣升  
小便不通 尿一藏胃或毒升

臟敗 五色不禁

瘦後 毒脾胃以作平移治若  
瘦後 小便濁解毒竄利小便

瘡瘍 挑拔下紅小便亦  
瘡瘍 毒入心脾

禁口 毒氣攻心湧清壓

休息 有積

宿菊

腹大 身熱 鴨蛋 破湯 咳逆 五色禁口 紅水 脊紅 一足冷

脾胃虛脈涼藥多脉弱閑食而唯藥一味製草大半錢炒平生同爲米飯下灌索勞禁口有病

者每連脾濕在肺不出不痢則瘡獨凍椎黃散雞子黃丹服愈者生

婦人孕瘤亦刺痛頭風雞黃散雞子黃丹服愈者生

有婦人孕中瘡瘍危困服濟生清脾湯產後自愈

血宛於上焦而吐血者謂之薄厥留於下焦而厥者謂之鬲血此由太陽隨經伏熱在裏益

爲热搏然而不行經曰太陽病七八表証仍在脉微而以火不結者其人如狂夜半熱在下焦少

腹當腰滿小便自利者下與愈抵當湯主之太陽寒必先看兩目次皆口舌然後自下至

腹覺有痛甚者當審問其小便若小便不利但可利小便血若小便自利乃鬲血証當下

瘀血又見寒病身黃脉沉結少腹腰小便不利者蓋無血也小便日利其人如狂者爲血証故

抵當元下之愈陽明病其人善惡反雜大便反易其色必黑經謂血昇於下則而毒反

督畜血証而有輕重如狂者毒也者皆為血之甚者血厥當湯元以下之若小便利者

木香調氣散 薜感元散 腹理散 姜和皮鹽散等 等簡制酒本草

山楂赤茯苓豆蔻解之高方共連阿公元挑暑者不佐

散散紫苑龍骨禹鉛危固濟生春草元金液丹竹林石斛、抗證

葛或陳米前亦可為求加元砂龍骨

外麻湯米煎消毒散 檀三七散合蘇白芷水煎煎溫服小便不通加赤茯苓少許附香

敗毒散姜米煎下香達元濟生清脾湯挑拔下紅小便少黃湯八正散橘皮酒連元食城敗毒散加黃連酒細服

葛或附後山施蘿白豆豉煎湯服已效

敗毒散陳倉米百粒姜煎前石蓮頭患心爲寒陳米飲下

八散亦桂生平胃加通面核陳米仁、烏骨雞煮汁開胃

局方刺聖散子簡易斷下湯神農縣感元培乾姜建

茶各二兩爲末烏梅肉爲元米飲下邊草子湯下壁草元百粒

薤白生薑如泥粳米粉和蜜蜜作頭丸熟矣

## 不治證

禁口 小喘

痢後 生冷飲爲急絕 小便絕不通爲胃絕

## 卷四

十六

四

急結者爲輕止瀉桃仁承氣湯以利之。如病久無表裏證，數日雖脉浮數，可少服之。已脈數不詳合熱則消，益善飢至六七日不大便，自此有瘀血抵當湯主之。當六、七日之際，又無善忘如狂之證，亦無少腹鞀滿之候，有以承氣湯下者多矣。獨能制桃仁湯下之者，用藥之妙，貴在脉浮而數，半傷衛氣，數傷榮血，熱客於氣則脉浮，熱客於血則脉數。因下之後，浮數俱去，則已。若下後數而不復浮者，是榮間熱去而衛間熱在矣。爲和解半則，創行胃經，陽熱消谷，苦飢至下焦不止，則擇治必便。懷孕不大使，血不得升，爲瘀血，瀉桃仁湯下之。邪熱散者，潮熱而發渴也。下後浮脉去而瘀乘解，是擇熱去而榮熱在矣。熱客氣合覆血下。

### 尚浮緩

太陽病不暍，然結膀胱發行血，自下者愈不愈。

宜桂枝湯。

太陽病其人適失汗，又下利。

陽明病頭疼身熱，燥渴，水不欲咽者，必即瘧無表裏。

輕者，桂枝湯；甚者，桂枝湯加黃湯。

鼻動生血

沉酒治

鼻難治

小兒下紅

二蘆保童丸和小香連平或空葉茶水飲下

有腸風下血或爲熱爲寒暑爲脾移與滲大腸皆不效渴用牛棗湯名鼻涕圓入名酸棗膏收止血取乾者爲末服之應手而愈北艾葉煎湯服愈又生豬臘入炒槐花末其半兩頭扎定用米附於磁器內燭煎細切擂爲彈丸日乾空心一元細嘴當歸熱酒下又白雞冠花防風等分爲末糊丸空心米飲下又參芥熟等分爲末糯米飲咽下

五痔

經云腸癖爲痔皆因素蘿蟄毒盛過食燒炙生酒肥膾久坐溫地肺著情慾久忍大便遂成陰陽不和閑格壅塞風熱下冲乃成五痔久不治則成漏矣切不宜用毒藥力緣割易

脉病證

此痔肛門腫痛突起五六日後漸愈  
此痔肛邊發癰數个如粟粒狀  
脉痔生在腸內更找時脉按攝不入  
氣立一憂愁則發癰 心驚則愈

釣腸元 黑玉丹 和服 磨京墨和真龍膾不養  
機羊淹食效

稍稅枳壳湯下 肠連元  
局方槐角元 槐角皮膏御院楂藤元  
三因五亥散 開易集椿皮元 玉膏元  
濟生蠅矢元 黃芪元 集成五味 丹墨子見陽元

治

卷四

一八

本防禦專科 保持九方朝貴用之安効蓋其用藥簡要有次第製造有三無一速急切要速凡痔出外或當夜不可坐卧甚者用下藥早上藥一次午少時又一次至夜者痔頭出黃水黑如漆當夜不再上藥且令黃水出盡次日晝痔消縮半寸更上藥二日為好若年高人應外腎牽引疼痛可用人以火烘熱手於大小便間熨之其火自定黃水未尽可再傳一日糞仍須勤用晚外科人早晚看照黃水流至盡是病根已去也水澄膏保護肉藥麝金白及三味各等分細末俟痔出側卧以盜湯淨洗拭用新和蜜盃內調勻却入藥末同敷在谷道四向好處留痔頭在外用紙蓋藥仍用筆蘸溫水塗紙令常潤澤却用下枯藥好白凡兩通明生硫二分半重米砂一分生研如粉細三味先用藥安建盡中火用白凡末蓋之用火燬令煙斷其硫盡隨煙未止是借硫氣在口凡中將枯凡取出為細末先着痔頭大小多繫痔頭凡末炒土掌心上加朱砂末少許二味以津唾調勻得所用箇子調塗痔頭上周遭令遍口上湏子細詳看痔頭顏色欲其轉焦黑乃收落之漸至夜自有一黃水黑出以多為好方是藥毒水切勿他疑中夜再上藥一次來日依舊上三天有小疼不如換藥用新器盛新水或溫水在痔邊以筆蘸手刷洗舊藥却上新藥仍用前護藥老弱人用藥要全無疼痛只增加朱砂末於凡末內自然力慢不可住藥但可少遍數直候痔頭焦枯方可住也次用京朴湯洗以京朴湯入瓦器時洗之潤腸元用大黃煨淨制枳壳當歸各等分蜜丸每服三十丸白湯下以防肛門急燥欲大便出無澀痛而已又龍石散用龍川煅出火毒軟石膏煅出火毒白芷黃丹作末糖薑口血又導赤散用生地黃木通黃芩等分煎以防小便赤澀又双金散用黃連蘇金草等分蜜丸用蜜水調付痔頭有小痛即付之若得硝子末付尤佳又痔頭冰煅即可服十宣散以生六

又導赤散用生地黃木通黃芩等分煎以防小便赤澀又双金散用黃連蘇金草等分蜜丸用蜜水調付痔頭有小痛即付之若得硝子末付尤佳又痔頭冰煅即可服十宣散以生六

又導赤散用生地黃木通黃芩等分煎以防小便赤澀又双金散用黃連蘇金草等分蜜丸用蜜水調付痔頭有小痛即付之若得硝子末付尤佳又痔頭冰煅即可服十宣散以生六

洗法魚腥草煎湯溫洗又本事用朴壳末炒研煎百附丸勸服而後洗又馬屎首煎洗

濟生祐丸散洗滌藥頻洗亦效木別子三不橘如泥小篋百沸湯泡熏之却洗效木槿花

炒作茶或煎湯洗用桃皮葉漬水濃研漿清者於盆中清之印有虫出又研大棗膏和水大如指頭

綿裹長守遇夜熱即痛止腫消虫辟用之名單皮白或野肉蘸蓋以空心服為患也

貼法羌杞全根炙洗木鼠少水搗絞取汁慢火熬膏以絲線於藥內度溫繫痔微疼而愈不可犯水

候燥落後以紙撲蘸少膏於痔孔內小除根也通身用丹滑石等分為末并花水調灌百二十下

又葱青烏刮取液對傅入蜜調勻先用木別子煎湯熏洗亦傅藥其妙如水三方神效

薰法馬兜令井根榧黃北艾山甲雷九蠅皮木別子百藥煎略有背餅中燒熏

灸法醫訣有持焰胡不貫于腸頭起即用柳枝濃煎湯洗俟其三五壯覺一道熱氣腸轉渴一時愈

酒釋便紅青蒿用葉末用葉煎水調糞後酒調痔不直易數次頭燒藥塗腸頭即入

## 脫肛

肛餌爲肺下主大腸肺藏實則熱熱則肛門閉塞肺虛則大腸寒寒則肛門脹急如婦人產瘻

用方過多久兒叫呼及不利後皆使肛門滯治之溫肺藏補腸胃火則自收

局方釣腸元乳香元三因膏皮散香荆散水聖散子百退用槐花槐角各分等爲末用

薑玄熟食之以酒送下或以猪脾蒸熟服亦可又以魚腥草擂如泥用朴消水先洗

日細却

用芭蕉葉托之却以糞於臀下貼坐自然又用五倍子末水二碗煎槐半入白凡二塊淋洗立效

求類錄方卷第五

東吳

卷之三

卷之三

傷寒發熱

發熱者謂怫拂於皮膚之間而成熱也。潮熱寒熱之同而互潮熱者有時  
而寒半失其時寒熱者非也。則熱相雜而慢至於發熱則無時而發  
表證則謂翕翕發熱者是翕所覆明其熱在表外即重寒客於皮膚陽氣怫鬱而發  
表志故名之桂枝麻黃發汗散之不然則表中轉俾裏熱也。  
裏熱者謂蒸蒸煥煥寒熱蒸蒸明其熱在內也即陽氣乘陷陰中所致爲裏熱  
調尚取氣易以汗之不狀裏熱甚而復還於表也。  
半表半裏者謂之表裏未分也。半表半裏者未得其熱也但熱轉於兩半裏耳。

脉  
經  
譜

卷之三

太陽主氣，溫皮膚，寒氣，而皮膚冷，則知寒，而皮膚熱，則知熱。故曰：太陽之氣，其氣也，溫皮膚，寒氣也，而皮膚冷，則知寒，而皮膚熱，則知熱。故曰：太陽之氣，其氣也，溫皮膚，寒氣也，而皮膚冷，則知寒，而皮膚熱，則知熱。

麻黃湯

留外而發熱宜汗  
竟若寒微惡寒或熱多寒少或長部頭寒項結

紫胡桂皮湯  
人參  
葛根  
湯

卷之三

卷之三

卷

知母石膏湯

卷之三

不妄采胡湯 永無害

译  
文

詩說

8

卷之三

浮  
游

卷之三

1

平生集

1

卷之六

中  
古

卷之三

卷之三

桂不漫山草木皆枯白虎氣所之



風寒濕汗出而身熱者屬熱也素陽於風因復傷於

見自汗門

莎摩導淋

麻子下之

小柴胡湯

失下經氣不通多寒冷如假此以治寒厥亦深也

寒陽易貞熱頭重目眩急腹痛手足舉

見下門

溫病汗出腹熱不爲汗妄言不食陰陽交

見目眩門

者犯發汗解半日許復熱煩脈浮濶者葛根湯汗

佳技湯

若傷寒發汗後病解虛微熱不去

竹葉石膏湯

傷寒自己大發熱首難治

甘草湯

芳復置毒物善而氣寒寒木復留力動生熱寒氣既

枳實橘子湯

還復經所除脉可者以汗解柴胡桂枝湯

生姜湯

病差後傷食多作寒寒意愈真腸鳴不利

枳實橘子湯

頭疼發寒惡寒身不疼痛傷食證

見頭疼門

更自葛根寒頭疼身痛稍見頭疼門發熱風煩躁手足溫

橘子湯

夏苦前發熱並寒頭疼身痛見頭痛

見頭疼門

不寒身不病知非傷寒頭不疼脉不至知寒裏矣日頭熱者虛煩也見虛煩門

見頭疼門

寒濕一身熱頭痛發熱身黃便不利大便反快見身痛又小便不利

見頭疼門

肤痛頭疼身熱口渴大便祕或嘔逆而身虛弱見頭疼門

見頭疼門

婦傷寒發寒惡寒經通來晝則明了暮則暗語折入五室小柴胡湯

見頭疼門

## 傷寒惡寒

附背寒寒根散

卷五

二二

## 傷寒證

附背寒寒根散

卷五

治

太陽證惟傷寒或已發熱氣發熱必西寒食解表

桂枝湯

發汗頭熱身經痛強

傷風感寒自起風煩熱

白虎加桂湯

傷寒無大熱口燥渴心煩皆微寒

傷寒寒氣汗不出

麻黃桂枝湯

發熱恶寒身体温利頭痛身小七朝陽夏口脉洪

六月傷風無汗

大橘皮湯

發汗無汗身大熱發熱是寒證身不其人頭汗出微

心不痛不欲食大便硬是寒證身不其人頭汗出微

小柴胡湯

傷寒失下氣不進不發熱而通冷寒甚大便滑

寒寒平定冷却當汗是半表半裏證

葛根湯

見自汗門

瘡醫四肢逆盜手足寒臥而惡寒引衣自蓋飲水

或下利清谷、便數大使如常

頭脣身冷拘急惡寒頭汗出多形少面色赤

腰脊拘手足溫惟不微戰不僵渴

熱多寒少不僵清便自可桂枝附子湯若

脉浮可發汗肺弱亡陽此桂枝附子湯一湯

發熱惡寒或有微煩能食苔溫而今此陽虛陰盛

築築甚寒則強慢身反張分生口噤爾病脚掌空齒

發熱惡寒發於陰宜溫裏

發熱惡寒發於陽宜散解

傷寒大下後又發汗心下痞惡寒者未解不可攻

其痞先當解表表解乃可攻寒

下之無不退陰氣弱而惡寒後乃發熱無休時

太陽病七八日而惡寒者陰陽俱虛不可汗下吐

若重反發汗則必氣虛耳導耳無熱人用

太陽傷風發熱惡寒身疼痛無汗而煩躁

太陽病自汗而拘急難忍伸心火微恐寒而

脚掌急亦便數

陽明病旦下惟惡寒日暮為病在經與太陽合病

則屬表當發汗若汗下後大便不解熱結在裏

表裏俱熱時時惡寒者

潮熱惡寒猶有表證用小柴胡湯若腹滿不通

少陰證有表寒太陰腹滿證不惡寒

下利已惡寒而躁手足溫可治

惡寒而躁時時自煩不能寧夜此表寒裏熱

夏至以前發熱惡寒頭身身體痛

夏月發熱惡寒頭疼身熱而渴

食少二益頭暉發熱惡寒嘔吐腹滿

嘔吐頭暉發熱惡寒或利

髮熱微惡寒柴胡桂枝湯發汗後反惡寒者虛也

陰陽俱虛微而惡寒不可更吐下發汗而亦有

熱者為欲解尚欲小汗

厥陰證入汗出熱不而冷惡寒不利厥逆惡寒

發熱汗出復惡寒不僵但心下痞

婦人發熱惡寒經水適來

三陽合病皆惡寒者必下不吉躁苦絕地

少陰病背惡寒者必早利以止少陰陽寒燥潤

少陰病吊利背惡寒反發熱慄急自汗而渴

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

通脈附湯當歸四逆加柴葛姜湯

廢寒湯桂枝麻黃湯雜力麻黃湯

湯不散參煩氣散

若尺脉遲緩也小建中湯加黃芪

汗之愈下之而死

見發熱門

桂枝加桂枝葛根越婢湯葛根芩桂湯

理中湯四逆湯

解表桂枝湯

火病大黃黃連瀉心湯

小柴胡湯

芍藥甘草湯附桂枝湯

大青龍湯微汗之過則恐亡陽

甘草乾姜湯

馬兜鈴微當芍藥甘草附子湯

當用白虎涼膈散發汗後大承氣湯

大承氣湯微當芍藥甘草附子湯

當用白虎涼膈散

大承氣湯微當芍藥甘草附子湯







脉病證

治

瀕塞云用藥多分熟半生分利陰陽

風熱多微寒或單熱有汗

先傷寒後陽風乾寒後熱

微用十神湯參當歸湯五積散加草果仁姜法人參胡桂丹

寒簡易平早湯用馬角附分屬寒

瀕塞平早湯露谷服

其則扶於桂姜湯麻子早湯東附湯三朱萸散

溫故扶後寒自汗風煩熱頭疼

先傷風後傷寒風爲陽寒爲陰

黃連杏仁散香散蘇苓散五苓散下消暑元

暑煩渴小便赤

先傷風後傷寒風爲陽寒爲陰

濟生加味杏需散常山散草果散濟生清脾湯

濕寒熱身重脅脣酸疼腹脹自汗

善嘔汙出後胃附浴濕

少氣短喘而渴渴於暑濕

瘡熱多頭疼額痛口跳食即吐

但熱不寒陰氣孤絕陽氣被發

加減小早利湯敗毒散白朮加桂湯麻黃羌活散

濕熱多頭疼額痛口跳食即吐

但熱不寒陰氣孤絕陽氣被發

加減小早利湯敗毒散白朮加桂湯麻黃羌活散

瘡熱多頭疼額痛口跳食即吐

但熱不寒陰氣孤絕陽氣被發

加減小早利湯敗毒散白朮加桂湯麻黃羌活散

卷五

八

食即胃癟六府無癟胃有者飲食

陽寒拔善飴咸食脹滿

三因清脾湯葛根胃下勝紅元通見續藜門

老經年不差差後再作遠行益勞力

常山飲活人柴胡桂姜湯大柴胡桂姜湯

勞數年不差結成癟瘕在腰脇

房室瘧中大忘

毛瘧飲四獸飲二陳湯熱多柴胡寒多加草果

痢即名孩瘧瘳久也

脾胃虛寒麻煩

濟生鹽甲飲平百渠碧霞丹

虛即弱面黃晝冷

脾虛虛寒肢不醒

濟生鹽甲飲平百渠碧霞丹

瘧即弱面黃晝冷

脾虛虛寒肢不醒

濟生鹽甲飲平百渠碧霞丹

胎前 落基半產後即自安

塞草果飲 草果平 胃米煎  
湘竹半夏竹茹青蒿人參只燒甘草姜早煎

片歸湯示狀、胡湯一和姜早煎又四物湯加柴胡

白芍

牡蛎增損四物湯

婦人產後

虛

四物湯加柴胡半夏草果又赤芍川芎加芎歸  
逍遙散

東南濱海風無常所食魚鹽人多停飲故風瘡食癰所由盛烏頭草果陳皮半夏施得  
其宜西北高曠降冬則水冰地烈盛夏則礫石流金人多中寒伏暑故多暑瘡寒瘡紫胡帽  
山故應合用東南西北往來其間病在未分際可與蠶桑正氣散草果飲是猶養胃湯也  
治此方瘡以馬鞭草並葉則一盞露一名服寒多加姜汁

灸法不問男女於大椎中第一骨節盡處先針後灸三七壯止效或灸革三骨節盡處亦可  
又灸百會三壯任督者久入膏肓男左女右取掌中指從指末則下至寸口相對革二紋却以  
則子於頸高於膏肓第三節骨直下盡處於發時灸三壯或七壯名心坎穴

治之薑脾胃日衰生熟飲用淡豆蔻草果各一个生熟梗厚朴二片干姜汁製一片生用又甘  
草一下半年半冬生姜三寸栗子大一顆生入作一處剝散分作二服水盞半煎分服日更初進  
二服忌薑腥未效用附子七克湯或人參建中湯不用姜早煎只作生料添草果人尾錢多  
煎日飲數盞以敵諸瘡奏功其多食豆蔻姜薄荷頭或紋側外而紋處灸三五度每灸當發日早灸  
川僧秘授常山飲芳療老人皆可服常山才通秦川山甲醋炙各一斤分夜砂半字別研草冬分  
並為粗末水二盞烏梅早子各十個不煎減半丹入酒之蓋無煎至二盞半津發日更早先刮起瓦下  
瓦砂食次刷裏子數却不服藥效續易簡

卷之五

九

傷寒渴

附煩渴引飲

傷寒渴者裏有熱也邪氣客表傳之至陽先受病爲邪在表而猶未作熱故不言渴至邪氣  
傳之陰入裏四五日食津液枯竭所謂漸耗而乾故燥舌乾而渴六日傳厥陰爲消渴爲裏  
熱極矣食水多而小便少者是以之渴欲飲水爲欲解者以其傳經口盡故也所謂少少與  
之不可多與之切多與之則多常念不足勿極意也蓋深戒飲水過多反生諸證若喘咳聲嘶乾  
嘔肺不利小便不利數者皆由飲水過傷也

脉病證

脉浮而渴屬太陽渴而有汗屬陽明

治

洪大

大陽病渴表不解半有水氣而渴小青龍葯半夏  
服桂枝大汗出後天渴裏有熱也

加柴胡根（蓋半夏辛溫燥津液故  
姜苦微寒潤燥燥也）

白虎加人参桔梗





不經汗下而煩是傳經之熱不作嘔矣。若煩善嘔或胸中煩而不嘔者，柴胡湯、麦少陰病二言，半消不得目者，黃連阿膠湯。走少陰病者，豬膚湯。走足太陰病者，豬膚湯。走足太陽病者，桂枝大湯。後大湯。

解而微熱者也。

因汗下後而煩是內陷之煩。汗後虛煩不得眠屬苦反覆類之。中懊惱者，橘子皮湯。支下後身熱不作微煩，橘子乾姜湯。若嘔者，橘子生姜豉湯。消腹滿而起不變橘子皮。桂枝湯。大風頭之狀心中虛溫欲嘔吐而無柰。非汗則不能已。若汗下後更消心下滿者，桂枝湯。東虛而煩爲虛煩與施子散。劫其汗劑之解者，莫因汗下汗脈結。滿而煩則不能食。是邪氣結於胃中，則爲腸實。與瓜蒂散是汗劑之重者。多陽明不汗，汗煩者，走肺之实者。與調胃承氣湯。真寒三言，先降而煩者，走煩之虛者。與小建中湯。補之少陽之邪。解者，煩而悸則爲熱也。大抵汗降而煩為虛煩。而悸爲換經。治法先求其本也。傷寒太陽少陰經，爲表裏煩躁。獨多棄此。煩不得眠者，心熱也。但虛煩不得眠者，膽熱也。

## 脉病證

浮緊

發熱惡風，頭暈，舌苔白，爲中風見矣。脉走筋不頭躁爲麻黃證。今又加頭躁，以革風餅。傷寒俱感故用。

浮緩

傷風自汗，体熱，頭疼，風熱多寒，少頭光煩躁，差脉緊必無汗。惟濡而緊者，首汗不可用桂枝。

濁

傷寒當汗不汗，煩躁不知痛處，其人短氣。

## 卷五

浮細

虛煩熱與傷寒相以熱，不惡寒，身不疼，知并傷寒，不可汗。頭不疼，脉不緊，若非裏實，不可汗。當

沉細

太陽病咽乾煩躁，發逆嘔吐。

沉澀

傷寒，無汗，頭暉，口燥，煩渴，渴，小便不利，利，大便秘。

澀而滑

動之未在腹，不可以發汗。汗則渴而渴，煩躁飲則吐。

滑促

陽毒發，髮狂走，妄語，赤眼，乾痛，身瘡，下利，赤痢。

沉而滑

畏寒，無汗，頭暉，口燥，煩渴，渴，小便不利，利，大便秘。

不伏水

中風發，散不收，而煩渴，小便赤，渴，不得眠，或汗多，或嘔吐。

身熱不寒，或爲表熱，或口燥，煩渴，渴，爲裏熱。

傷寒無汗，頭暉，口燥，煩渴，渴，爲裏熱。

太陽病

頭暉，大汗，後大渴。

細而澀

頭暉，煩躁，渴，或自利，而渴欲勞不吐。

寒盛，渴。

身冷煩躁，而不敢水。

## 治

太青龍湯以有煩躁證故可用。不審誤用

之，則發汗多殺。脈微，首汗，惡風不可服。三桂枝湯者，於桂枝湯或敗毒散，單桂枝湯散。

當用小建中湯。更以麻黃湯發其汗。

頭暉，汗出，寒熱，心道，此表未解。

頭暉，惡風，頭暉，不可攻熱去，則寒起矣。若溫用橘皮湯一劑。

葛根乾姜湯，後其太陽。

荅參散或陷膏丸。

柴胡桂枝干姜湯。

先服荅參散二服，空腹竹葉湯。

荅參草，苦酒浸其陰汗，則解。

升麻湯，荅參散，橘子仁湯。

白虎湯加參湯。

白虎湯加參。

理中湯，干姜甘草湯，四逆湯。

寒濕散，汗出，差或火焰散丹煎。

卷之三

少陽中風耳聾目赤胸滿而煩  
食毒舌脈涼藥渴躁轉甚

正陽散、利達散、急不散等。

沈繩

善治腹瀉藥，治腹瀉，其藥治腹瀉，而尤以之用  
痛噉噉不利，腹結痛，躁渴，渴不

辛熱之藥得汗則解  
再復多食丹藥

卷之三

身微形重據而赤或多并牛陰也發於  
裏實煩躁急陰盛而數眠矣下虛勞篤

正道湯加葱白

近謂

熱實證胸上氣躁心懊憹舌上燥渴甚鮮密  
傷寒吐不後心燒之氣甚乃不得眠

六脉育元

一  
開數  
是然而頃  
屬太陽

陽明亦不復有傷寒之說矣。此言言  
有病已姜尚服原心大便難若小便少則津液當還會  
養病吐後無大渴者明證虛躁心下難小便利身定靜  
太陽證自汗心煩若小便數  
傷風發熱五日不解而煩欲飲水而渴者表裏證  
壞寒無熱但狂言煩躁不安至令散亡錢服後熱  
止渴甚煩胸痛不得眠已見前此利手足心通證發不  
若不走六七日熱而渴渴煩不得眠朱苓湯利咽通  
少陰病寒而渴時時目煩欲走木

小承氣湯，微利之。  
不可用桂枝表裏散。  
惡寒散。  
并水一升以指刺喉吐之即愈。  
吳茱萸湯。  
而頭痛仍用前豬膚湯。  
大柴胡湯小之。

卷之三

卷五

十一

卷之三

元  
數

下後病不解，頭暈者或汗後太陽病，傷寒發厥至六日瘧，為瘧與時暫寒，為藏厥。

卷之三

卷之三

中暑者皆寒而渴，頭熱而惡心，須躁心不快，  
中暑者等利手足逆，煩躁。

五  
香  
薷  
散

卷之三

發汗後平之脉平小煩心新虛不勝食氣故也  
嘔農者憤鬱鬱不舒暢比於煩懶而其著也由下後表陽乘虛內陷鬱而  
不發結伏曾中經曰表未解反下之胃虛客氣動膈而然治法或吐之或下之  
若汗吐下後虛煩不得眠者必久覆餗倒心中懊惱與陽明病下之其外有  
熱手足溫而不結曾心中懊惱飢不能食但頭汗出一證爲邪熱結於胃中以利  
子取湯吐之以湧其結熱也若脉微弱病丁之心中懊惱而煩胃中有燥屎者與陽  
明病無汗小便不利心中懊惱者必發黃二證爲邪熱結於胃中以利承氣湯因陳  
湯攻之滌其內熱也

雜病虛煩

卷五

十一

卷之三

傷寒久病後虛煩之證如虛勞之人渴水煩心火升其氣又躁吐而後津液枯竭  
煩渴有渴治宜平和之藥清涼養生未可妄補若婦人產後去過多虛煩發熱各以類求

脉病證

治

陽細  
瘧勞  
攝養章違陽虛陰盛便多自汗  
陰虛陽盛面赤而渴

酸草仁湯或志高獨參湯養榮湯加草仁

獨連湯瀉柴草湯竹葉湯三因橘皮湯竹茹湯

虛勞久病心內蒸蒸不和或服熱藥

溫膽湯加草仁濟生竹葉湯地仙散局方石膏湯

傷寒大病後

溫膽湯加草仁濟生竹葉湯地仙散局方石膏湯

婦人產後衆液既散心神不守危矣

三因橘皮湯汗下後竹葉湯

青竹葉子散

產後衆液既散心神不守危矣

猛進強參湯

傷寒之振附戰慄

一發熱心悸頭眩身瞶動振振欲擗地者真武湯主之湯溫經益陽之筋也  
傷寒戰慄者戰者身動慄者心肺內外不同皆陰陽之爭也傷寒欲解將汗之時  
汗家發汗則寒慄而振者氣虛俱虛也但止振慄而已若汗下後心逆滿氣冲胸頭  
暎汗則動經身爲搖振者茯苓桂枝白朮甘草湯主之太陽病發汗不解仍

卷五

十四

一發熱心悸頭眩身瞶動振振欲擗地者真武湯主之湯溫經益陽之筋也  
傷寒戰慄者戰者身動慄者心肺內外不同皆陰陽之爭也傷寒欲解將汗之時  
正氣內實邪不能爭則汗出而不戰邪氣欲出其本虛邪與正爭微則振  
其則戰戰已正勝而解矣邪氣外與正氣爭爲戰戰則愈者也邪氣內與  
正氣爭爲慄慄則甚也戰者正氣勝慄者邪氣勝傷寒六七日欲解當解  
而出其有但慄戰顫身不戰者已而遂成寒逆多不得解蓋陰氣內盛正氣  
大盛不能勝邪非剛劑灼艾不可也

第五卷終



